





المواد والمصادر
بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية
والإيطالية واللاتينية واليونانية

إدوار غَالِب المَوْسُوعَة

٢٤٢٠ صَفْحَة • ٣١٤٦٤ مَادَّة
٦٩٦٢ رَسْمًا • ٢٤ لَوْحَة مَلَوْنَة

فِي عُلُومِ الطَّبِيعَةِ

تَبْحَثُ فِي الزَّرَاعَةِ وَالنَّبَاتِ وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْجَيُولُوجِيَا



Bibliotheca Alexandrina
0139993

دارالمشرق بيروت

الأستاذ غَالِبُ
مهندس زراعي

الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسماك والحشرات والفطور
والجراثيم والأمراض الحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطبيعة والحقوق
وتتألف من أربعة مجلدات يحترق أرضها على مسار المصطلحات باللغات :
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الأول
من الألف إلى الذال

مَنشورات :
دار المشرق ش.م.م
ص.ب. ٩٤٦ - بيروت ، لبنان



التوزيع :
المكتبة الشرقية - ساحة النجمة
ص.ب. ١٩٨٦ - بيروت ، لبنان



الرسوم :

جورج ديب

جورج غنطوس

جان قرطباوي

جهاد جبر

سلم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الأول : ISBN 2-7214-2149-2

يحتوي هذا المجلد من

الموسيقى في عالم الطبيعة

١١١٥٢ مادة

٢٦٠٨ رسوم

٨ لوحات ملونة

مُقَدِّمَةُ الطَّبْعَةِ الْأُولَى

يسرّنا ان نرفّ الى ابناء الضاد — ولا سيما العاملون منهم على النهضة باللغة بمجارات لأحداث العصر ، وتلبية لمختلف حاجاته وتكاليفه ؛ الغيّر على صفاتها الأصل ان تشوبه حوشية لفظ دخيل باسم العلم ، او رطانة تعبير غريب بحجة دقة البحث — هذه الموسوعة الجديدة ، شاملة علوم الطبيعة بأنواعها وتفرعاتها ، مفردة ومجتمعة ، نظرية وتطبيقية في المجتمع الانساني المعاصر . فمن الفلاحة والزراعة الى النبات في متميز ضروره ، الى الحيوان في متعدد فروعه وشعبه ، الى الطفيليات والجراثيم ، وما قد ينتج بعضها من ادواء نباتية وحيوانية ، الى الفيزياء والكيمياء ، والرياضيات ، والجيولوجية ، والفلك ؛ الى اثر كل ذلك في المجتمع وعلاقة الناس به فائدة واستخداماً ، ووقاية وعلاجاً ، ومعاملات قانونية ؛ تتوالى الابحاث وفقاً للترتيب الابجدي العربي ، يقابلها ، في كل عنوان ، اسمها باللاتينية ، لغة العلم ، وباللغات الاجنبية . هذا ، مع الحرص على الجمع بين العلم والادب بإيراد النكتة اللغوية ، والشاهد الشعري ، والقول المأثور ، والحكمة البالغة ، والمثل الجاري ، والنصيحة العملية ، بما يلائم الموضوعات المدروسة . وكل ذلك في اوجز تعبير ، وأبلغ بيان ، واشمل إحاطة ، وأوضح رسم ؛ مما يجعل الكتاب سفر علم وادب ؛ يرضى عنه الاختصاصي المدقق ، ويرحب به اللغوي البصير ، ويهش له الاديب المثقف ، ويفيد منه كل طالب علم على الاطلاق .

فشكراً للمؤلف ، وهنيئاً للمطالع ، ومرحى للبنان يشهد ، بهذا العمل ، رفع سلك جديد في صرحه اللغوي الشامخ .

بيروت في ٩ شباط ١٩٦٥

الدكتور فؤاد افرايم البستاني
رئيس الجامعة اللبنانية

توطئة الطبعة الأولى

لمست في لبنان والبلاد العربية ، حيال العلوم الطبيعية ، آراء متضاربة ونظريات متباينة ومتشابهة ، يمكن تلخيصها في نظريتين :

اولاهما تقضي بوجوب بقاء اللغة العربية على وضعها وما فيه من جمود لان قوامها تراث يرتكز على ناسوت لا يسير بركاب التطور العلمي الحديث .

والنظرية الثانية تقول بنزذ كل قديم ناقص وتجنّب كل عتيق معتلّ ثم بتعريب كلمات جديدة ونحت اخرى لتفي بالقصد العلمي الصحيح والمعنى الصريح وتجاري النزعة التطورية التي تهيمن على الطاقة الفكرية الحديثة .

أما الصواب فأن يؤخذ بالنظريتين وتطبيقهما معاً ، فالعربية غنيّة بالمبهمات التي يجب تحديدها واستعمالها . ولا يجوز حرمان لغتنا ممّا وصل اليه العلم والفنّ في عصر الكهرباء والذرة بعد عصور الابل والبخار . وهذا ما يجعلني اميناً على التكريس ومجتهداً طموحاً في مواكبة التطور الواعد .

يوم بدأت هذا العمل الضخم لم تراودني رغبة او طموح في مجازاة أية موسوعة اخرى ولا في الاتيان بسفر فريد من نوعه . انما هدفت الى ايجاد اداة عمل طيّعة للمشغلين في هذا الحقل العلمي والى ابراز موسوعة لا تعنى الا بالعلوم الطبيعية ومشتقاتها في عصر اصبح الاختصاص من لزومياته ومقومات الحياة فيه .

لا شيء اصعب من صياغة التحديد العلمي لا سيما اذا كانت المفردات غريبة عن اللغة المتداولة . ولا شيء اصعب من تعريف المفردات بمصطلحات قد يسلم بها البعض ويناقشها البعض الآخر . وبرغم هذه الصعوبات التي اعترضتني بذلت اسخى ما يمكن بذله لتلافي كل جدل ولوضع التحديدات والمصطلحات التي اقرّها كبار الباحثين في هذا الموضوع كما استنبطت ما اهمله الذين سبقوني في حقل كثرت ثروته وقلّ الباحثون فيه .

وما الموسوعة العلمية التي ازفها الآن الى قراء العربية وأضعها تحت تصرفهم سوى نتيجة جهود فرد راعه ما لمس من نقص وجمود في لغة بلاده فجاء يسدّ الكثير من الفراغ الكبير الذي اوجده ذلك التقاعس المرير والخوف الاستنباطي العقيم .

الموسوعة تحدثكم عن الطبيعة والرياضة والكيمياء والفيزياء والحصلبة والزراعة . وترشدكم الى خواص النبات وصفاته المميزة وطريقة استعماله . وتبحث في الحيوان والسمك والطير وتبيّن بين النافع منها والضارّ ثم تتناول الحشرات والفطور والجراثيم بمعظم رتبها وفصائلها وأجناسها وأنواعها وما يعترى الحيوان والنبات من امراض واوصام وطرائق معالجتها والوقاية منها .

وهي تشمل ، فضلاً عن ذلك ، مجمل علوم الزراعة والنبات والتربة وما يمتّ اليها بصلة . واثماً للفائدة اضيفت اليها ما تيسّر من الالفاظ والتعابير القانونية التي لا يستغني عنها الباحث في هذه الحقول .

عسى ان اكون قد اسديت خدمة سوف تعود بالنفع على لبنان وعلى العالم العربي اجمع . لان هدي الاقصى كان ، ولما يزل ، الاسهام قدر المستطاع في تعزيز العربية وتزويدها بموسوعة تصلح ، بحثاً وتنقيباً ونتاجاً ، لخدمة العلم والمعرفة .

الناسُ للناسِ والدنيا مكاتفةُ والحُرُّ مَنْ نفعَ الناسَ بما انتفع

بيروت في ٧ شباط ١٩٦٥

الأوارُ غَالِبُ

مُقدِّمة الطبعة الثانية

تصدر الطبعة الثانية من «الموسوعة في علوم الطبيعة» عن «دار المشرق» بعد أن أشبعها المؤلف المهندس الزراعي ادوار غالب ، تنقيحاً طوال عشرين سنة انقضت على الطبعة الأولى . وقد زاد عليها نحو سبعة آلاف مُفردة فأصبحت تضم أكثر من واحد وثلاثين ألفاً من المفردات . تتناول الموسوعة العلميّة هذه مسائلَ النبات والحيوان والطير والسمك والحشرات بالتعريف الصحيح ، الكامل والدقيق . وتشير الى ما تتعرّض له من أمراض تحملها الجراثيم ، والى سبل الوقاية والعلاج ولا تغفل عمّا يتعلّق بها في حقول الفيزياء والكيمياء والجو والأرض والقانون بحيث لا تبقى زيادةٌ لمستزيد .

إنها ميوّبة نبويّاً حديثاً تبعاً للتسلسل الأبجدي . وازاء كلّ مفردة عربيّة نظيرها في اللاتينيّة والفرنسيّة والانكليزيّة مع رسوم لمعظمها من وضع المؤلف .

استعان المهندس غالب بالمراجع العربيّة المتوفرة وبالمراجع الأجنبية الوفيرة وعاد الى خبرته الطويلة العميقة في هذا المجال . وقد جعل لموسوعته فهرساً أبجدياً ضمّ جميع الألفاظ العلميّة اللاتينيّة والفرنسيّة والانكليزيّة والالمانية والايطاليّة التي وردت في أجزائها الثلاثة مع رقم المادة تسهيلاً للرجوع إليها ، وهكذا أصبحت ستّ موسوعاتٍ في واحدة .

ابن البيطار ، أشهر علماء الطبيعة ، عند العرب في الاندلس في القرن الثالث عشر عرّف في كتابه «الجوامع لمفردات الأدوية والأغذية بالنبات وأسمائه وصفاته وأماكنه» تعريفاً بدائياً وجمع وصفات القدامى الطبيّة من المعدن والنبات والحيوان ، لكنّه ما تعدّى حدّ الدليل . والمعاجم والبحوث الطبيعية اللاحقة أعوزها الشمول والتجديد والمنطق ، حتى كانت دائرة المعارف التي تولاها البساتنة (المعلم بطرس وسليم ونجيب ثم فؤاد افرام) على مدى أجيال وما تزال في طور الأشجار .

الآبيل ، مثلاً ، في موسوعة ادوار غالب ، ليس ضرباً من النبات ، كما في القواميس السابقة التي لا تريد الباحث تعريفاً ، بل هو نوع من العرعر شجرته صغيرة القدّ تعلو من ٣ الى ٤ أمتار .

أوراقها حرشفية ، مهدبة ، متقابلة ، صلبة ، لسنة ، مدببة ، شائكة العقصة ، عابقة الخضار ، أزهارها وحيدة المسكن . ثمارها شويّة الشكل ، قطرها نحو ٨ م. وهي فردية التجميع ، مغدبة اللون ، مستطيلة الأهن المنحرفة . وبعد هذا التعريف المفصل الوافي يشير المؤلف الى فوائده الطبية .

وابن دابة ليس ضرباً من الطير ، بل هو الغراب الأبقع له خصائصه الواضحة . وكذلك الاسماك والحشرات والجراثيم والفطور .

لقد صرف ادوار غالب زهرة عمره ، أربعين سنة ، بصبر الناسك وتجرده وحرارة إيمانه في هذه الموسوعة حتى أتمّها على أكمل وجه فسدّ فراغاً كبيراً في حقل البحث العلمي بالعربية عجزت عنه جامعة دول .

من أهمّ المصاعب التي واجهها افتقار لغة الضاد الى المصطلحات الدقيقة والمصادر الوثيقة فاضطرّ أن يشتقّ مفردات جديدة قياساً او استنسباً توافق عبقرية اللغة وأصولها وتقاليدها فكان في هذا السياق راشداً خلافاً .

أمّا أسلوبها فوجيز سلس واضح دقيق بليغ . لا يخلو من استشهاد بنادرة أو حكمة أو مثل أو بيت من الشعر .

هنيئاً للمكتبة العلمية العربية بهذا العمل الأكاديمي الصارم ، وهنيئاً للمؤلف بصنيعه الرائع ولدار المشرق بجهدها الموصول في خدمة التقدّم .

الدكتور جميل جبر

رئيس نادي القلم - لبنان

تَوَظُّة الطَبِعة الثَّانِية

كان لا بدّ في هذا الثلث الأخير من القرن الحالي ، الذي اتّسم بالنهضة العلميّة ، والذي تحقّقت فيه أحلام بساط الريح : طائرة تمخر سكك الفضاء بسرعة الصوت ، وصاروخ موجّه بحاري الطيف ، ومركبة معراجيّة تهبط على القمر وأخرى تطلّ على المريخ ، وغيرها تدور حول الأرض ... كان لا بدّ من مواجهة الواقع وما تفرضه منطلّبات الذرّة وامتطاء الاجواء وارتباد الكواكب من اختزال في التعبير ودقّة في التحديد وأمانة في الاداء .

دأبني في هذه الطبعة الثانية وما حوته من موادّ إضافية وقدرها نحو ٦٠٠ ٦ ، كان سلوك النهج الذي ارتسمته منذ بداية العمل ، أي تحرير الكلمة العلميّة من بيئة الإبهام والغموض أو من مداغل التشابك وإدخالها في صميم معترك الحياة النائرة انطلاقاً مع طاقة الفكر البشري المتدفقة ، إن صحّ التعبير ، من المدفق حيث ينبع الكنه الى المسيب . حيث يتجسّد التعبير .

كنت أميناً على التكريس إن كان فيه المطلب أو المغزى ومحتهداً في مواكبة مشاعل العلوم . هديني الخروج بالتقنيّة العلميّة العربيّة من كهف الانكماش الضيق وإبلاجهما هيكل الاشعاع الرحب حيث تلتقي غيرها من لغات الحضارة التي تهيمن عليها فكرة الاستحداث المستمرّ .

وأمنيقي الآن ألاّ يقف عملي حيث وصل ، فالمتابعة ميسورة ورجال العلم والتنقيب كثر وعلى ازدياد . والله مع العاملين .

الاصطلاحات

قد رقنا ألفاظ هذه الموسوعة برقم متسلسل من واحد حتى النهاية ورتبناها ترتيباً قاموسياً ابجدياً حرفاً حرفاً ولم نعتبر الهمزة الممدودة ألفين ولا الحرف المشدد حرفين ووضعنا لمعظم النبات الاسم العلمي وقد اشرنا اليه بحرف (S) ثم الاسم الفرنسي وعلامته حرف (F) يتبعه الاسم الانكليزي وعلامته (E) وعلامة الاسم الالماني (D) والاسم الايطالي (I).

امّا الحيوان والطير والسماك والحشرات والقطور والجراثيم والأمراض فقد ذكرنا اسمها العلمي والفرنسي والانكليزي كما اقتصرنا على المسميات الفرنسية والانكليزية لسائر مواد الموسوعة.

هذا وقد خصصنا المجلد الرابع من الموسوعة فهرساً ابجدياً بجميع الألفاظ العلمية والفرنسية والانكليزية والالمانية والايطالية الواردة في هذا المؤلف مع رقم مادتها ليعود اليها من يهتّم بحثها وتفصيلها.

امّا المقتضبات التي استعملناها فهي :

كيلو	للدلالة على كيلوغرام	°	للدلالة على الاسم الموضوع من قبلنا
ل	للدلالة على لتر	*	للدلالة على وجود رسم
غ	للدلالة على غرام	م	للدلالة على متر
مغ	للدلالة على مليغرام	م ²	للدلالة على متر مربع
مي	للدلالة على ميكرون	م ³	للدلالة على متر مكعب
سغ	للدلالة على درجة سنتيغراد	سم	للدلالة على سنتيمتر
فر	للدلالة على درجة فارنهایت	مم	للدلالة على مليمتر
بم	للدلالة على درجة بومه	كم	للدلالة على كيلومتر

المراجع

لما كان ذكر مصادر هذه الموسوعة يتطلب أكثر من مئة صفحة ، اكتفينا بسرد أسماء أهم المؤلفات العربية والاجنبية التي اطلعنا عليها وكانت لنا خير دليل .

وما نحن نوردها بالتسلسل الابجدي شاكرين قادرين واضعها واصحابها العلماء الأفاضل الذين يسرّوا لنا العمل بجهودهم الشاقة سائلين الله تعالى بأنهم الخالص وباسم العلم والانسانية والثقافة الاجتماعية ان يكافئهم احسن الجزاء .

ابن البيطار مفردات ابن البيطار
ابن زكريا معجم مقاييس اللغة ، دار احياء الكتب العربية ، القاهرة ١٣٦٩ هـ .
ابن سيدة الخصاص
ابن منظور (العلامة جمال الدين)

لسان العرب ، دار صادر ودار بيروت ، بيروت ١٩٥٥-١٩٥٦
ابو النصر (عادل) مهندس زراعي
اصلاح زراعة الاشجار المثمرة في لبنان ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٣٧
البطاطا والبندورة ، مطبعة الاتحاد ، بيروت ١٩٤٨
الحشرات التي تعترى جميع المزروعات ، مطبعة الكشاف ، بيروت ١٩٣٣
الحشرات الزراعية في لبنان ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٦٢
الحشرات والامراض التي تعترى النبات
العناكب التي تصيب الاشجار المثمرة ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٩
تاريخ الزراعة القديمة ، بيروت ١٩٦٠
تاريخ النبات ، بيروت ١٩٦٢
زراعة الايكيدنيا ، المطبعة الوطنية ، ١٩٥٧
زراعة التين ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الحمضيات ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الدراق ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٧
زراعة الزيتون ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٣٩
زراعة الفستق ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الكرز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٨
زراعة الكروم
زراعة اللوز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٧
زراعة الموز ، المطبعة الوطنية ، بيروت ١٩٥٩
المشرق الآباء اليسوعيون

- الاصمعي كتاب النبات والشجر وكتاب النخل والكرم ، المطبعة الكاثوليكية ١٩٠٨
الانطاكي (داود بن عمر) تذكرة اول الالباب والجامع للعجب العجيب ، مكتبة البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٥٢
البخاري (مصطفى) وعبد الحق (توفيق) أمراض النبات ، مكتبة الانجلو المصرية
البستاني (الشيخ عبدالله) البستان ، المطبعة الاميركانية ، بيروت ١٩٢٧ و ١٩٣٠
البستاني (المعلم بطرس) دائرة المعارف ، بيروت ١٨٧٦ ، مطبعة المعارف بيروت ١٨٧٧-١٨٨٤ ،
المطبعة الأدبية بيروت ١٨٨٧ ، مطبعة الهلال بمصر ١٨٩٨ و ١٩٠٠
عجيت المحيط ، بيروت ١٨٩٧ و ١٨٧٠
الجاحظ كتاب الخيول ، مصر ١٣٢٣ هـ.
الجرجاني التمرينات ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٩٣٨
الجندي (علي) الكيمياء الحيوية ، دمشق ١٩٣٠-١٩٣٢
الحسيني (الدكتور احمد حاتم) ودميان (الدكتور اميل شنوده) بيولوجية الحيوان العملية ، دار المعارف بمصر ، ١٩٦٢
الحسيني (الدكتور احمد حاتم) وحافظ (الدكتور محمود) تشريح الحيوان ، مكتبة الانجلو المصرية ، ١٩٥٦
الحلادي (روحي) الكيمياء عند العرب
الدميري حياة الحيوان الكبرى
الشرتوني (سعيد) اقرب الموارد ، المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ١٨٨٩-١٨٩٣
الشهابي (الامير مصطفى) مهندس زراعي
الاشجار والانجم المنيرة ، دمشق ١٩٢٤
الرسالة النباتية
الزراعة العملية الحديثة (طبعة ثانية) ، دمشق ١٩٣٥
معجم الالفاظ الزراعية ، دمشق ١٩٤٣
معجم المصطلحات الحراجية ، دمشق ١٩٦٢
القاموس المحيط ، مؤسسة فن الطباعة ، مصر ١٩١٣
الفيروزبادي شرح الادوية المفردة من قانون ابن سينا
القازويني القاصي (مصطفى محمود) والبحري (محمد)
اصلاح الاراضي ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٧
المعلوف (الفريق امين باشا) معجم الحيوان ، مصر ١٩٣٢
النبوي (الدكتور صلاح محمود)
ثمار الفاكهة ، مكتبة الانجلو المصرية ١٩٥٩
النجومي (اللواء عبدالله باشا) وزين الدين (الدكتور حبيب فرح) والمنيري (الدكتور محمد عبد المنعم) وفاهد (الدكتور مصطفى كمال) الطيور المصرية ، طبعة ثانية ، دار الفكر العربي ١٩٥٠
الهلاي (الدكتور عباس فتحي) النبات (طبعة ثانية) ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٨
الياس (الياس انطون وادوار انطون) القاموس المصري عربي انكليزي (الطبعة الثامنة) ، القاهرة ١٩٥٩
الياس (الياس انطون وادوار انطون) القاموس المصري انكليزي عربي (الطبعة الثالثة عشرة) القاهرة ١٩٦٣
بديقيان- (ارمناك) المعجم المصور لاسماء النبات ، مطابع ارجوس وبابازيان ، القاهرة ١٩٣٦
بوست (الدكتور جورج) نبات سورية وفلسطين والقطر المصري وبواديها ، بيروت ١٨٨٤
بوشادي (احمد ذكي) تربية النحل ، مطبعة الشباب ، القاهرة ١٩٣٠
حسن (الدكتور احمد سالم) الحشرات الاقتصادية (الطبعة الثانية) ، القاهرة ١٩٤٤
حماد (الدكتور شاكر محمد) علم الحشرات (الطبعة الثالثة) دار المعارف بمصر ، ١٩٦١
زين الدين (الدكتور فرج) وابو طيره (توفيق محمد) الثدييات ، دار الفكر العربي ، القاهرة ١٩٥١
سولياك (علي) وقائع الاقتصاد التعاوني ، مطبعة ابن زيدون ، دمشق ١٩٥٠
شرف (الدكتور محمد) معجم العلوم الطبية والطبيعية ، القاهرة ١٩٢٦

- شبيب (الاستاذ خليل) المعجم القانوني ، مصر ١٩٤٩
- صدقي (حسن) القطن المصري ، مكتبة النهضة المصرية ١٩٥٠
- عبد الرؤوف (احد اسماعيل) زراعة الحقل ، مطبعة الامة بدمهور ١٩٤١
- علي (محمود بيومي) بساين الزيت ، مطبعة المقتطف والمقطع بمصر ١٩٢٥
- فارس (الدكتور محمد ابراهيم) وحسن (الدكتور محمد يوسف) قواعد البيولوجية العامة والتطبيقية ، دار النهضة العربية طبة ثانية ١٩٦١
- فياض (محمد محمد) وعبد السلام (حسن) وابراهيم (احد امين) الكيمياء ، مطابع مذكور ، مصر ١٩٥٤
- مجاهد وابو ريا ومنقريوس (الدكاترة) علم البيئة النباتية (ترجمة) مؤسسة فرانكلين ١٩٦٢
- جميع نوات الاول مجموعة المصطلحات العلمية والفنية
- محمود (عبد العزيز) والبرعي (محمود) وريحان (حسن) معجم المصطلحات العلمية ، مصر ١٩٥٦
- مصطفى (عبد العزيز) والزيات (احد حسن) وعبد القادر (حامد) والنجار (محمد علي) المعجم الوسيط ، مطبعة مصر ١٩٦٠-١٩٦١
- معلوف (الاستاذ تيموثي فيليب) الاشجار المثمرة (التفاح) ، بيروت ١٩٥٢
- مفتاح (الدكتور رمزي) احياء التذكر في النباتات العلية والمفردات المطارية ، مصر ١٩٥٣

ALEXANDER & ELIE B. KLOTS, *Les Insectes vivants du monde*, Hachette, 1963.

ALPHANDÉRY EDMOND, *Encyclopédie apicole*, Baillière et Fils, 1945.

ANDRÉ G., *Chimie agricole du sol*, Baillière et Fils, 1931.

ANDRÉ G., *Chimie agricole végétale*, Baillière et Fils, 1924.

Annales agronomiques de 1936 à 1962, Dunod.

AUBERT PH. et LUGEON A., *Arboriculture fruitière moderne*, 4^e édition, Maison Rustique.

AUGÉ-LARIBÉ MICHEL, *La révolution agricole*, Albin Michel, 1955.

AUSTIN O. & SINGER A., *Les Oiseaux*, Flammarion, 1962.

BACH DENIS, *Classification des plantes vasculaires*, SEDES, Paris.

BACH DENIS, *Organisation générale et reproduction des plantes vasculaires*, SEDES, Paris.

BACH DENIS, *Physiologie végétale*, SEDES, Paris.

BALACHOWSKY A. et MESNIL L., *Les insectes nuisibles aux plantes cultivées*, Établissements Busson, Paris, 1936.

BAROT A., *Les plantes mellifères*, Ch. Mendel, Paris, 1932.

BELLAIR G., *Les arbres fruitiers*, Baillière et Fils, 1935.

BELOUSSOFF W., *Les problèmes de la géologie et de la géochimie de l'hélium*, Hermann et Cie, 1935.

BERTRAND A., *Plantes grasses*, Maison Rustique, 1952.

BILANS, *L'Economie rurale*, M. Rivière et Cie, 1959.

BŒUF F., *Les bases scientifiques de l'amélioration des plantes*, Lechevalier, 1936.

BŒUF F. et VESSEREAU A., *Recherches et expérimentation en agriculture*, t. I et II, Baillière et Fils, 1948.

BOIS D., *Les plantes alimentaires*, Lechevalier, 1937.

BOIVIN ANDRÉ, *Bactéries et virus*, Presses Universitaires de France, 1947.

BONNEMAISON L., *Les parasites animaux des plantes cultivées et des forêts*, SÉIA, Paris, 1953.

BONNIER GASTON, *Les plantes des champs et des bois*, Baillière et Fils.

BOUBIER M., *Les oiseaux*, Gaston Doin et Cie, 1926.

BOULOUMOY L., s.j., *Flore du Liban et de la Syrie*, Vigot Frères, 1930.

BOUVIER-AJAM MAURICE, *Histoire des doctrines économiques*, Plon, 1952.

BOUVIER-AJAM MAURICE, *L'Economie en mouvement*, Plon, 1954.

- BOUVIER-AJAM MAURICE, *Richesse et misère du monde*, Plon, 1953.
- BOUVIER R., *Les migrations végétales*, Flammarion, 1946.
- BOVEY R., *La défense des plantes cultivées*, Éditions Payot, Lausanne, 1967.
- BREHM, *La vie des animaux illustrée*, Baillière et Fils, 1868.
- BRICOUT P., *Microénergétique*, Gauthier-Villard, 1933.
- BRUNEL A., *Traité pratique de chimie végétale*, Georges Frère, Tourcoing, 1948.
- BUISSON M., *Caractéristiques physiques et mécaniques du sol*, Dunod, 1942.
- BUSNEL R. G. et GIRAU J., *La protection acoustique des cultures*, INRA, 1958.
- CAGNY P. et GOVIN R., *Hygiène et maladies du bétail*, Baillière et Fils.
- CAILLARET H. et SOUTY J., *Monographie des principales variétés de pêchers*, Société bordelaise d'Imprimerie, Bordeaux, 1950.
- CHAIGNEAU A., *Les animaux nuisibles*, Maison Rustique, 1947.
- CHALAND GERMAIN, *La sélection végétale*, Presses universitaires de France, 1946.
- CHAMPY, *La vie cellulaire*, Flammarion, 1947.
- CHANORIN E., *Botanique agricole*, Hachette, 1946.
- CHANORIN E., *Chimie agricole*, Hachette, 1948.
- CHEVALIER A., *Révolution en agriculture*, P.U.F., 1946.
- CHOUARD PIERRE, *La multiplication végétative*, Hermann et Cie, 1934.
- CLABON W. E., *Dictionary of nuclear science and technology*, Elsevier, 1958.
- COLIN HENRI, *La chimie des plantes*, Flammarion, 1945.
- COMBES R., *La vie de la cellule végétale*, Armand Colin (3^e éd.), 1942.
- CORD E., *Géologie agricole*, Baillière et Fils, 1920.
- CORNEVIN CH., *Plantes vénéneuses*, Firmin-Didot et Cie.
- CORNUT P., *Maladies à virus des plantes cultivées*, INRA, 1959.
- COSTANTIN et FAIDEAU, *Les plantes*, Librairie Larousse, 1922.
- COUPIN HENRI, *La fécondation*, Baillière, 1934.
- CONTANCEAU M., *Arboriculture fruitière*, Baillière, 1953.
- CROZIER W. J., *Déterminisme et variabilité dans le comportement des organismes*, Hermann et Cie, 1935.
- CUÉNOT L., *L'Espèce*, G. Doin et Cie.
- CURASSON G., *Traité de pathologie exotique vétérinaire et comparée*, Vigot Frères, 1942.
- CUROT E., *Fécondation et stérilité*, Ch. Amat, 1921.
- DANGEARD P., *Traité d'algologie*, Lechevalier, 1933.
- DAUVILLIER A. et DESQUIN E., *La genèse de la vie*, Hermann et Cie, 1942.
- DECHAMBRE P., *Traité de zootechnie*, Ch. Amat, 1914.
- DEPLANDRE G., *Les flagellées fossiles*, Hermann et Cie, 1936.
- DELAGROIX G., *Maladies non parasitaires des plantes cultivées*, Baillière et Fils, 1927.
- DELAGROIX G., *Maladies parasitaires des plantes cultivées*, Baillière et Fils, 1916.
- DELICHEVALIÈRE G., *Les orchidées*, Maison Rustique, 1912.
- DEMOLON ALBERT, *Croissance des végétaux cultivés* (3^e éd.), Dunod, 1946.
- DEMOLON ALBERT, *Dynamique du sol* (4^e éd.), Dunod, 1948.
- DEMOLON ALBERT, *La génétique des sols*, Presses universitaires de France, 1949.
- DÉRIBÉRE MAURICE, *Les applications pratiques de la luminescence* (2^e éd.), Dunod, 1946.
- DIEHL R., *Agriculture générale* (t. I, 1957; t. II, 1959), Baillière et Fils.
- DIFFLOTH, *Zootechnie générale*, Baillière et Fils, 1922.
- DORVAULT, *L'officine*, Vigot Frères, 1945.
- DYBOWSKI J., *Traité de culture potagère*, Baillière et Fils, 1924.

- EMBERGER LOUIS, *Les plantes fossiles dans leurs rapports avec les végétaux vivants*, Masson et Cie, 1944.
- FAES H., STAGHLIN M., BOVEY P., *La défense des plantes cultivées* (4^e éd.), Payot, Lausanne.
- FERICELLI JEAN, *Le revenu des agriculteurs*, éd. Grenin, 1960.
- FIGUIER L., *La vie et les mœurs des animaux*, Hachette, 1868.
- FOURMARIER P., *Eléments de géologie* (4^e éd.), Masson et Cie, 1944.
- FOURNIER P., *Flore illustrée*, Lechevalier, 1951.
- FOURNIER P., *Les plantes médicinales et vénéneuses de France*, Lechevalier, 1948.
- FOURNIER P., *Les quatre flores de la France*, Lechevalier, 1951.
- FROMONT PIERRE, *La modernisation de l'agriculture*, Armand Colin, 1954.
- FRON ALBERT, *Sylviculture*, Baillièrre, 1934.
- FUNK et WAGNALLS COMPANY, *Britannica world language dictionary*, 1963.
- GALLAY, RAPIN, STALÉ, *Les engrais*, Payot, 1948.
- GAUDY M., *Manuel d'agriculture tropicale*, Maison Rustique, 1959.
- GARRAU J. G., *Les engrais* (2^e éd.), Dunod, 1955.
- DE GASPARIN CTE, *Cours d'agriculture*, Maison Rustique (3^e éd.).
- GÉROUDET P., *Les Oiseaux nicheurs d'Europe*, Éditions Silva, Zurich, 1964.
- GILLIARD E. THOMAS, *Les Oiseaux vivants du monde*, Hachette, 1962.
- GONDÉ H., CARRÉ G., JUSSIAUX PH., *Nouvelles leçons d'agriculture*, Maison Rustique, 1948.
- GRASSÉ PIERRE P., *Parasites et parasitisme*, Armand Colin, 1935.
- LE GRAVEREND J., *Les jardins méditerranéens*, Baillièrre et Fils, 1959.
- GUÉNAUX G., *Entomologie et parasitologie agricoles*, Baillièrre et Fils.
- GUILLAUMIN A., *Les plantes sauvages*, Payot, 1948.
- GUILLIERMOND A., *Le chondriome*, Hermann et Cie, 1934.
- GUILLIERMOND A., *Le système vacuolaire ou vacuome*, Hermann et Cie, 1934.
- GUILLIERMOND A. et MANGENOT G., *Biologie végétale*, Masson et Cie, 1946.
- GUYÉNOT E., *La variation et l'évolution*, Gaston Doin et Cie, 1950.
- HATT PIERRE, *Les mouvements morphogénétiques dans le développement des vertébrés*, Hermann et Cie, 1935.
- HITCHING FRANCIS, *Grands mystères du monde*, Éditions Albin Michel, 1980.
- HOMÈS M. V., *Alimentation minérale des plantes*, Masson et Cie, 1953.
- JEANNEL R., *Introduction à l'entomologie*, Boubée, 1948.
- JOUS E., LE GRAVEREND E., RÉGNIER R., *Les vergers de grand rendement* (2^e éd.), Maison Rustique, 1946.
- JOUZIER E., *Droit administratif rural*, Baillièrre et Fils, 1926.
- JOUZIER E., *Economie rurale*, Baillièrre et Fils, 1920.
- JOUZIER E., *Législation rurale*, Baillièrre et Fils, 1924.
- KAYSER ED., *Microbiologie agricole*, Baillièrre et Fils.
- KAYSER ED., *Microbiologie appliquée à la fertilisation du sol*, Baillièrre et Fils, 1924.
- KAYSER ED., *Microbiologie appliquée à la transformation des produits agricoles*, Baillièrre et Fils, 1931.
- KLOTZ L. J. et FAWCETT H. S., *Maladies des citrus*, Setco, 1952.
- KOLTZOFF N. K., *Les molécules héréditaires*, Hermann et Cie, 1939.
- KOLTZOFF N. K., *Physiologie du développement et génétique*, Hermann et Cie, 1935.
- KOSTITZIN V. A., *Evolution de l'atmosphère*, Hermann et Cie, 1935.
- KUHUHOLTZ-LORDAT G., *Précis de phytogénétique*, Hermann et Cie, 1952.
- LACEPÈDE, *Histoire naturelle*, Furne et Cie.
- LAMBERT J., *Agriculture générale* (4^e éd.), Desforges, 1959.

- LAMBERT J., *Agriculture spéciale* (4^e éd.), Desforges, 1959.
- LANGERON M., *Précis de mycologie*, Masson, 1945.
- Larousse agricole*, Librairie Larousse, 1921.
- LAUMONIER R., *Cultures florales méditerranéennes*, Baillière et Fils, 1959.
- LAVAL DR ED., *Les champignons*, Ch. Delagrave, 1912.
- LEDERER EDGAR, *Les caroténoïdes des animaux*, Hermann et Cie, 1935.
- LEDERER EDGAR, *Les caroténoïdes des plantes*, Hermann et Cie, 1934.
- LEFEBVRE A., *Les engrais*, Flammarion, 1938.
- LEMÉE ALBERT, *Dictionnaire descriptif et synonymique des genres de plantes phanérogames*, 8 vol., Brest, 1929-1941.
- LEFIGRE A. L., *Technique de la désinsectisation*, Desforges, 1947.
- LEROY A. et RIVOIRE A., *Les plantes vivaces*, Maison Rustique, 1932.
- LEUBA J., *Introduction à la géologie*, Armand Colin, 1925.
- L'HÉRITIER PH., *Génétique et Evolution*, Hermann et Cie, 1934.
- L'HÉRITIER PH., *Traité de génétique*, Hermann et Cie, 1938.
- LHOSTE JEAN, *Maladies des plantes cultivées*, Lechevalier, 1947.
- LIMASSET P., *Principes de pathologie végétale*, Dunod, 1945.
- LOTKA ALFRED J., *Théorie analytique des associations biologiques*, Hermann et Cie, 1939.
- LUTZ LOUIS, *Traité de cryptogamie*, Masson, 1942.
- LWOFF ANDRÉ, *L'Evolution physiologique*, Hermann et Cie, 1943.
- MAIRE R., *Flore de l'Afrique du Nord*, Lechevalier, 1949.
- MANSION (M. A.) J. E., *Harrap's Standard French and English Dictionary*, George G. Harrap and Company Ltd., 1961.
- MARESQUELLE H. J., *Déterminisme génétique du sexe chez les plantes*, Hermann et Cie, 1935.
- DE MARGERIE EM., *Critique et géologie*, Armand Colin, 1943.
- MARINESCO NÉDA, *Influence des facteurs électriques sur la végétation*, Hermann et Cie, 1932.
- MÉNÉGAUX A., *La vie des animaux illustrée, les mammifères*, Baillière et Fils.
- MEURICE R., *La fertilisation du sol et les engrais*, Maison Rustique, 1944.
- MONOD JACQUES, *Recherches sur la croissance des cultures bactériennes*, Hermann et Cie, 1942.
- MONTILLOT, *Les insectes nuisibles*, Baillière et Fils, 1935.
- MONVOISIN A., *Le traitement frigorifique des fruits et des légumes* (4^e éd.), Dunod, 1951.
- MORET LÉON, *Manuel de paléontologie végétale*, Masson et Cie, 1943.
- MOREUX AB. TH., *Comment prévoir le temps*, Dunod, 1925.
- MOTTET S.-HAMM J., *Arbres et arbustes d'ornement*, Baillière et Fils, 1952.
- MOUTERDE PAUL, S.J., *La flore du Djebel Druze*, Beyrouth, 1953.
- NEVEU-LEMAIRE M., *Parasitologie des plantes agricoles*, Vigot Frères, 1913.
- NOBÉCOURT PIERRE, *Contribution à l'étude de l'immunité chez les végétaux*, Bosc et Riou, 1927.
- Nouveau Larousse illustré*.
- PAGOTTET, *Viticulture*, Baillière et Fils, 1921.
- PAILLOT A., *Les insectes nuisibles des vergers et de la vigne*, G. Doin et Cie, 1935.
- PARDE L., *Les conifères*, Maison Rustique, 1946.
- PARDE L., *Les feuillus*, Maison Rustique, 1943.
- PAULIAN RENAUD, *Le polymorphisme des mâles de coléoptères*, Hermann et Cie, 1935.
- PERROT EM., *Matières premières du règne végétal*, Masson et Cie, 1944.
- PEYRE DR P., *Les cerisiers*, Lechevalier, 1946.
- PEYRE DR P., *Les pommiers*, Lechevalier, 1949.
- PIRON GAËTON, *Traité d'économie politique*, t. I et II, Lib. du Recueil Sirey, 1954.

POCHON G. et DE BARJAC H., *Traité de microbiologie du sol*, Gauthier-Villars, 1952.

QUILLET, *Dictionnaire encyclopédique Quillet*, 1965.

RABAUD ÉTIENNE, *L'hérédité*, Armand Colin, 1921.

REBOUR H., *Les agrumes*, Baillière et Fils, 1957.

RENAULT RENÉ, *Chimie agricole*, t. I: *Chimie végétale*, 1955; t. II: *Biosphère*, Eyrolles Gauthier-Villars, 1958.

RICHARD HENRI, *Productivité de la terre*, Flammarion, 1959.

ROBERT PAUL, *Les agrumes dans le monde*, S.E.T.C., 1947.

ROULE D^r LOUIS, *Les poissons*, Delagrave, 1941.

SALMON JULIEN, *La vie des animaux illustrée, les oiseaux*, Baillière et Fils.

SAUFOURCHE A., *Les engrais phosphatés*, Dunod, 1947.

SCHAEFFER L., GUINIER PH., OUDIN A., *Technique forestière* (2^e éd.), Maison Rustique, 1947.

SCHOEN M., *Problèmes d'asymétrie dans les processus biochimiques*, Hermann et Cie, 1936.

SCHMIDT K. & INGER R., *Les Reptiles vivants du monde*, Hachette, 1960.

SCHRIBAUX E. et MANOT J., *Botanique agricole*, Baillière et Fils.

SENEVET G. et ANDARELLI L., *Les moustiques de l'Afrique du Nord et du Bassin méditerranéen*, Lechevalier, 1959.

SIMON R., *Hérédité-Variation*, Dunod, 1952.

SOUÈGES RENÉ, *Embryogénie et classification*, Hermann et Cie, 1938-1939.

SOUÈGES RENÉ, *L'embryologie végétale*, Hermann et Cie, 1934.

SOUÈGES RENÉ, *La cellule embryonnaire*, Hermann et Cie, 1935.

SOUÈGES RENÉ, *La différenciation*, Hermann et Cie, 1936.

SOUÈGES R., *La vie végétale*, Flammarion, 1949.

SOUÈGES RENÉ, *La segmentation*, Hermann et Cie, 1935 et 1936.

TEISSIER G., *Les lois quantitatives de la croissance*, Hermann et Cie, 1937.

TEISSIER G., *Dysharmonies et discontinuités dans la croissance*, Hermann et Cie, 1934.

THIÉBAUT J., *Flore libano-syrienne*, Le Caire, 1936.

THOMAS P., *Manuel de biochimie*, Masson et Cie, 1946 (2^e éd.).

TOURNAY AUGUSTE, *Système nerveux végétatif*, Hermann et Cie, 1939.

ULRICH ROGER, *La conservation par le froid des denrées d'origine végétale*, Baillière et Fils, 1954.

URBAIN P., *Introduction à l'étude pétrographique et géochimique des roches argileuses*, Hermann et Cie, 1937.

VAYSSIÈRE P., *Principes de zoologie agricole*, A. Colin, 1940.

VERGIER J., *Arboriculture fruitière*, Hachette.

VERGIER B., *Culture des fleurs*, Hachette, 1932.

VERGIER J., *Culture potagère*, Hachette (8^e éd.).

VERNADEKY W., *Les problèmes de la radiogéologie*, Hermann et Cie, 1935.




VERPLANGKE GERMAIN, *Éléments de microbiologie*, Maison Rustique, 1932.

VIENNOT-BOURGIN G., *Les champignons parasites des plantes cultivées*, Masson et Cie, 1949.

VILLEMART A. et CHAUX R., *Les grandes fonctions de la chimie organique*, Hermann et Cie, 1950.

WATTIEZ N. et STERNON F., *Éléments de chimie végétale* (2^e éd.), Masson et Cie, 1942.

WILLSTAEDT HARRY, *L'analyse chromatographique et ses applications*, Hermann et Cie, 1938.



أ



آءة



آءكثار، بونيوم



آءكثار أجرد

درقاته الصغيرة الكلوية الشكل في المستحضرات الطبية .
وهو من النباتات السامة . بذوره مسهلة ودرقاته هاضمة ،
تزيل الانتفاخ وتدر البول .

آء - آب (F). Août (E).

يعرف أيضاً بأغسطس . الشهر الثامن من السنة الشمسية
وهو من شهور الصيف البالغة الحرارة . مدته واحد وثلاثون
يوماً . في عقده الثاني تهب الرياح البوارح وينتهي بها
السوم . وفيه يكثر سقوط الطل والمن || تقويمه الزراعي :
في الزراعة العامة الموسمية : إنهاء الدراس ونقل الحبوب
وخزنها . خلع السم وحفظه . متابعة قطاف التفح وتجهيفه .
قطف الذرة والدخن والبطيخ والشمام . متابعة حشر العلف
وتكديسه . مباشرة جني القطن .

في المحاصيل : توزيع آخر وجبة من الاسمدة الازوتية
المدنية . متابعة المرق والرعي ومكافحة العناكب والكهيدب .
في الأشجار المثمرة والكرمة والموز : متابعة جني
الاجاص والدراق وأنواع التفاح التي بلغت الإدراك .
متابعة ري التفاح من نوعي الستاركن والكولدن ومكافحة
الأكاروس والمن القطني ومختلف الحشرات والأمراض على
سائر الأشجار || الاستمرار في ري الموز وتسميده .
جني اللوز اليابس . قطاف العنب . متابعة التطعيم الرقمي
وقطاف التين وتجهيفه .

في البقول : تحضير التربة بعد اقتلاع البقول الصيفية
التي انتهى انتاجها ومباشرة الزراعات الخريفية والشتوية
كزراعة الخيار والاسبانخ والثفت والفجل والملفوف والجزر
والبطاطا والشندر .

في الزهور : متابعة الاعتناء بجميع الزهور الموجودة
وبجميع البذور المنتخبة . تحضير التربة للزراعات الخريفية
والشتوية . تحضير المشاغل لاقبال الاقلام .

في النواحي : متابعة الاعتناء بصحة المواشي وعدم

١ - آءة* ، سَرْحَة (F). Aegiceras (S). River mangrove (E). Unachter manglebaum (D). Eglcera (I).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الجناحيات
« القشبات » . انواعه عديدة مختلفة المنابت ، منها منقعية
وبعضها يكثر في الاودية الظليلة وغيرها يرغب في الرمل ،
جميعها شجيرات وجنبات دائمة الاوراق المتعاقبة ، المعتقة
الصغيرة ، البيضية او المستطيلة || ازهارها سنبلية او
صمغاني التجميع . ازهارها بيض . ثمارها قرنية محدبة عوجاء
الشكل مرة الطعم || اوراقها وحلها تصلح للدباغة .

٢ - آءكثار* ، بونيوم (F). Bunium (S). Bunion. Bunium (F). Earth-nut (E). Erdnuss (D). Bunio (I).

نبات عشبي بري طبي من سبط الاسباط وفصيلة
الحميميات . يعتبر من الاعشاب السامة كالكشوكران .
وهو قريب الشبه من البقدونس ، غير ان وريقاته ادق منها
والسن . اما قنبها فخارجي نصف حاض وله زهر ابيض
اللون . يوجد في جميع الاقاليم المعتدلة الحرارة وفي بعض
البيساتين الحضرية ، يستعمل في تفتيت الحصى ومعالجة
الاورام . ويستخرج منه بالتقطير زيت طيار مفاد
لغازات المعدة والمفص .

٣ - آءكثار أجرد* ، تلخوطه ، جوز أرقم

Bunium bulbocastanum (S). Conopode à zige nue, Gland de terre, Châtaigne de terre (F). Arnut, Earth chestnut, Pig-nut (E). Knollenkümmel, Saükastanie (D). Bulbocastano, Pancaciolo, Castagna di terra, Noce di terra (I).

نوع آخر من الاكثار لكنه نبات عشقولي ، سوقه جرداء
نخيلة ، اوراقه صغيرة تشبه اوراق البقدونس || ازهاره
صفراء اللون وبتلاتها كاملة وحسنة || ينبت طبيعياً في
اكثر الاقاليم المعتدلة الحرارة || كانوا يستعملون دقيق

يتميز هذا الاباج بانتشار التموليات في البحار وبانتشار الثدييات والطيور والحشرات والنباتات الكثيرة الزهر في البر. ويتميز أيضاً بظهور الرئيسات ، اصل الجنس البشري ، كما يقولون .

Ere quaternaire (F).
Quaternary era (E).

ويدعى الاباج المعاصر . مجموعة من حقبتين ، البليستوسانية والمعاصرة ، مركزهما الساف الاخير من سلم الرصف الارضي || يتميز هذا الاباج ، اولاً بشكوص المياه وارتدادها عن بعض اليابسة بعد استتباب القارات على حالتها الحاضرة || ويتميز ثانياً بمواكبة تطور الانسان المعاصر والعظم والنبوت التي نراها وتم الكون || ويتميز ثالثاً بتواتر أزمة الدفء والدميك . الزمن الذي نعيشه الآن ، مناخ معتدل دافئ ، يدرم منذ مئات القرون .

١٥ - إباصحية Libéralisme (F). Liberalism (E).
الاباصحية مذهب الذين يدينون بحرية المبادئ والآراء .

١٦ - إبادة الأعشاب ، تعشيب Désherbage (F).
De-weeding, Cleaning (E).
تقنية مختلف الزراعات وأخصبها الزروع من الأعشاب الضارة ويتم ذلك بالاختلاع باليد او بالعزق او باستعمال العواشيب والمبيدات الزراعية الخاصة || وهذه العواشيب التي سيأتي ذكرها في مواضعها تقسم اربعة اقسام :
أ : قسم عواشيب معظم النباتات الطوعية في الزروع .
ب : قسم عواشيب النباتات الطوعية في القطن والكتان ...
ج : قسم المبيدات التي تقضي على النباتات الليلية والمخشوشة
د : قسم المبيدات التي تقضي على الطحالب في المراعي ...

١٧ - أبار الأبار هو الذي يأبر النخل || والأبار هو الرصاص الاسود.

١٨ - إبارة ، أبور ، تأبير Pollinisation (F).
Pollinization (E).
هو انتقال الجدرات اي حبوب الطلع من متك الزهرة الى ميسمها او مياسم غيرها من الازهار .

١٩ - إبالة Camélogie (F). Cameleology (E).
الفرع الخاص بالابل من علم الحيوان . يتناول كل ما له علاقة بها من تحلية وتشريح وتوالد واستئثار الخ...

٢٠ - إبالة ، جرزة Fagot (F). Faggot (E).
الحزمة من الحطب الدقيق العيدان . ومن الامثال « ضفت على ابالة » اي بلية على اخرى كانت قبلها .

٢١ - إبانة Analyse du sang (F). Blood analysis (E).
الابانة هي تحليل الدم للكشف عما فيه من طفيليات وضررها .

٢٢ - أباهر Rémiges scapulaires (F).
Wing scapulars (E).
الأباهر من ريش جناح الطير ما يلي الكلى . اولها القوادم ثم المناكب ثم الخواشي ثم الاباهر ثم الكلى .

٢٣ - أبارة Ligne directe ascendante (F).
Ascending direct line (E).
الابارة هو خط النسب المرتفع اي حبل النسب الصاعد ويقابله بناوة اي حبل النسب الهابط .

اغفال مكافحة الجرب والقراد والقمل . السهر على نظافة مزارب الطيور ووقايتها من الامراض السارية .
في المناحل : وقاية النحل من الزناير التي تكثر في هذا الشهر . استمرار تفقد القفران لحفظها من عبث الصمل .

٥ - أب Prairie naturelle (F). Grass-land (E).
هو المرعى الطبيعي الذي حوى من الكلا ما تتلقفه الماشية .

٦ - أباء Raceur (F). Stud (Incows) (E).
الذكر المنتخب للانجاب من الحيل والبقر والغنم الخ...

٧ - أباءة Roselière (F). Reed-bed (E).
أجرة القصب والحلفاء الطبيعية المزمنة .

٨ - أبابيل جاء في كتاب حياة الحيوان للدميري : « واحدته إبالة . وقال ابو عبيد القاسم بن سلام لا واحد لها من لفظها وقيل واحدها ابول كمجول وقيل ابيل كسكيت وقيل ابيل كدينار ودقائير واختلفوا في قوله تعالى وارسل عليهم طيراً ابابيل . وقال سعيد بن جبير هي طير تعشش بين السماء والارض وتفرخ ولها خراطيم كخراطيم الطير وأكف كأكف الكلاب . وعن عكرمة أنها طيور خضر خرجت من البحر لها رؤوس كزؤوس السباع . وقال ابن عباس رضي الله عنها بعث الله الطير على اصحاب الفيل كالبلسان . وقيل كانت كالوطاويط . وقال عباد بن انصامت اظنها الزراير . وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها هي شبه شيء بالخطاطيف . ومنهم من قال انها السنونو التي تأوي الآن الى المسجد الحرام » .

٩ - إبات * ، مخوار Thermomètre enregistreur (F).
Self-registering thermometer (E).
آلة تدون من تلقاء نفسها وتباعاً درجات الحرارة اليومية .

١٠ - إباج Ere, Epoque (F).
Era, Epoch (E).
الاباج مجموعة عصور تميزت بآثارها المكانية والحيوية الخاصة || والاباج حصلياً مجموعة حقبة تميزت بصخورها وبآثارها المناخية والمطمية والنباتية .
راجع مادة حياة . الجدول رقم ١


١١ - إباج أولي Ere primaire (F).
Primary era (E).
ويدعى الاباج القديم . مجموعة حقبة او احقاب حصلية مركزها الساف الاول من سلم الرصف الارضي . اولها الحقبة الكمبرية ثم السيلورية فالديفونية فالكربونية فالبرمية || يتميز هذا الاباج بانتشار اللاقريات وبظهور الحياة المائية والفقريات .

١٢ - إباج ثانوي Ere secondaire (F).
Secondary era (E).
ويدعى الاباج الاوسط . مجموعة من ثلاث حقبة حصلية مركزها فوق الاباج الاول وتحت الثاني . اولها الحقبة الترياسية ثم الجورية فالطباشيرية . || يتميز هذا الاباج بانتشار الزحافات المائية والبرية وبظهور اللبونات والطيور .


١٣ - إباج ثالثي Ere tertiaire (F).
Tertiary era (E).
ويدعى الاباج الحديث . مجموعة من حقبتين التمولية والنيوجينية . مركزها فوق الاباج الثانوي وتحت الرابعي ||




إبات




أبراميس



آبرة الابط



آبرة الاوراق



آبرة البراعم



آبرة التين



آبرة السنديان

الصغيرة تنتمي الى رتبة غشائيات الاجنحة المصنوعة .
انواعها عديدة تعيش بمعظمها عيشة طفيلية على بعض
الانواع النباتية وبعض الحشرات من ذوات الجناحين .
ارصافها : حشرة صغيرة ، ملونة ، خيطية الزباني ، طويلة
الارجل ، اجنحتها قليلة العروق والاعصاب غير المشعبة ،
جوشها مسنم ، بطنها قصير مركب من سبع حلقات
وترجات تنتهي بالزوائد التناسلية ، اشربها مقوسة ومدينة
للوخز . يكثر وجودها في الاحراج لا سيما على بعض انواع
السنديان حيث يحدث وخزها العفص || مكنها صني الشكل
مستطيل . رقاتها خاضعة او واثجة تعيش داخل العفص او
على الحشرات العاقلة .

٤٠ - إبرام *Nouaison (F). Fruit setting (E).*
هو اول نمو الشجرة بعد تقطيع الزهرة او تذيئها ، وقد يتم
ذلك عند الاخصاب ويعقبه سقوط التويجات الزهرية .

٤١ - أبراميس* ، برايميس *Abramis-brama (S).*
Braine, Brème (F). Abramis, Bream (E).
جنس سمك نهري من الفصيلة الشبوطية يعيش في المياه
الجلية الباردة وفي الانهر الشمالية || انواعه عديدة جميعها
كبيرة القد مفلطحة ، شبه بيضية الشكل ، طولها نحو
٥٠ سم . كبيرة الفلوس والزعنفة الظهرية ، صغيرة الزعانف
الصدرية والجوفية ، مستطيلة الشرجية والذنبية الفارقة .
تتكاثر بسرعة ولحمها لا يقل جودة عن لحم الشبوط .

٤٢ - آبرة ، قنفسية *Cynips (F). Gall-fly (E).*
جنس حشرات صغيرة من فصيلة الآبرات . انواعه عديدة
معظمها نافع ، أشهرها آبرة التين والسنديان والاوراق
والبراعم والابط والورد .

٤٣ - آبرة الابط* *Andricus fecundatrix (S).*
Cynips de l'alselle (F).
نوع من الآبرات عقمها يشبه زهرة الحرفش تمر كزه على
ابط الاوراق عند محور انتشارها لتتمكن من امتصاص ما
هي بحاجة اليه من النسغ || تركيب السنديان ويبدو كأنها
لا تؤذي .

٤٤ - آبرة الاوراق* *Neuroterus lenticularis (S).*
Cynips des feuilles (F).
نوع من الآبرات تركيب اوراق السنديان وتحدث فيها العفص
البلسني وهو اشهر انواع العفص واعمها استعمالاً .

٤٥ - آبرة البراعم* *Cynips kollari (S).*
Cynips des bourgeons (F).
نوع من الآبرات تركيب براعم السنديان فتتمتعها من الازماع
والايراق وتحدث فيها العفص الدرني الذي يؤذيها ويحد من
نشاطها الحيوي || ويستعمل العفص الدرني في الدباغة
الا انه اقل جودة من البلسني .

٤٦ - آبرة التين* *Cynips psenes (S).*
Cynips du figuier (F).
نوع من الآبرات وهي حشرة صغيرة ناقعة تعمل على تأخير
زهر التين فاخصابه وذلك بتقليلها الوليع من زهر التين
البري الذكري الى المزدوج الانثوي .

٤٧ - آبرة السنديان* *Biorhiza pallida (S).*
Cynips des chênes (F).
نوع من الآبرات تركيب جذور السنديان وتحدث فيها العفص
الثلوي الذي يصلح للدباغة ولكنه دون البلسني والدرني .

٢٤ - أبنة *Coudée (F). Elbow (E).*
الأبنة هي الدرجة من مقياس المياه .

٢٥ - أبنة
هي الدرجة في مقياس الحرارة العادية . راجع درجة .

٢٦ - ابتدائيات
الابتدائيات هي حيوانات دنيا . راجع اوال .

٢٧ - أبتر *Anoure (F). Anourous (E).*
الأبتر هو عديم الذنب وقد يكون خلقاً كالضفدع او مفتلاً
كالكلب الذي قطع ذنبه .

٢٨ - إبتياح ، شراء *Achat (F). Purchasing (E).*
الإبتياح والشراء هو عمل قانوني يقصد منه امتلاك
مال منقول او ثابت مقابل ثمن له .

٢٩ - أبتيث *Apatite*
نسفات كلس متبلور انواعه عديدة مختلفة الالوان منها
الاخضر والازرق والبنفسجي والابيض والاصفر والخططي .
وزنه النسبي من ٣,١٦ الى ٣,٢٢ وصلابته من ٤ الى ٥ .
بحري عادة : حامض فسفوري (٤١,٥ ٪) ؛ كلس
(٤٩,٦ ٪) ؛ فليور (٣,٢ ٪) ؛ كلور (٢,٧ ٪) ؛
كلسيوم (٣,٩ ٪) || وهو من الاسمدة الفسفورية غير
المستعملة مباشرة لان الحامض الفسفوري الذي فيه لا
ينوب في الحامض النمل بوجود الفورميات || ولهذا
فالأبتيت يستعمل خاصة في صناعة السوبرفسفات .

٣٠ - أبث *Abâtardissement (F).*
Degeneracy, Degeneration (E).
تطور خصائص الاصل وانحرافها نحو السلبية او السوء .

٣١ - أبجدية
الأبجدية نبات عشبي . راجع أكلة .

٣٢ - أبيد *Femelle qui porte tous les ans (F).*
Yearly delivering female (E).
الانثى تضع كل عام . وكثر اسنادها الى الاتان .

٣٣ - أبيدقة ، أوييد *Sédentaires (F). Sedentary (E).*
صفة الحيوان الذي يقيم في منطقة ما لا يفارقها وقد كثر
اسناد هذه الكلمة الى الطير . وضدها القواطع .

٣٤ - أبذم
أبذمت الفرس والناقة ورم حياؤها من شدة الضربة ويكون
ذلك في بكرات الخيل والابل والبقر .

٣٥ - أبثر
اطلب إ بارة .

٣٦ - إبثر الحبش
راجع طرثوث .

٣٧ - إبثر الذئب
راجع طرثوث .

٣٨ - إبراء ، مخالصة ، مخالصة *Décharge, Quitus (F).*
Discharge (blood) (E).
الابراء يعني ان المدين بالالتزام قد أصبح طليقاً منه .

٣٩ - آبرات *Cynipidae (S). Cynipidés (F).*
Cynipidae, Gall wasps (E). Gallwespen (D).
وتعرف أيضاً بالفصصيات والقنفسيات . فصيلة من الحشرات

تعلوها مشحة بنفسجية ، سبلتها صغيرة لسنة مدبية قصيرة الحمة . اما ازهارها فيدوم من شباط الى نيسان || ثميرتها عفائية ثنية السنخ طويلة المردن المستدق الرأس شبه المنقار الطويل . وهذه الثمار تتأثر بالرطوبة التي تحيها نحو الارض حيث تدفن حبا || يكثر وجودها في لبنان وسورية وفلسطين حتى بادية التيه . تنبت في الاراضي البور وعلى جانب الطرقات .

٥٤ - أبرق Sirius (F.) Sirius (E).

الابرق ويسمى الشعرى اليمانية والشعرى العبور ، يعتبر من ألمع نجوم الفضاء . يبعد عن الارض نحو ٨٨ الف مليار كيلومتر . اطلب شعرى يمانية .

٥٥ - أبرم Erucaria (S).

Erucaria (F.) Erucaria (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة عشرة اعطائها حوض البحر الابيض المتوسط وبعض المناطق الداخلية || سوقها فرعاء تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ، نصالها مخمرة ريشية . ازهارها صغيرة بنفسجية اللون او زرقاء او ليلية ، اشهر انواعه :

E. crassifolia (S).

الابرم الثخين الورق

E. aleppica (S).

الابرم الحلبي

E. puberula (S).

الابرم الزغبى

E. microcarpa (S).

الابرم الصغير الثمر

E. latifolia (S).

الابرم العريض الورق

٥٦ - أبروس Abrus (S). Abre (F).

لفظة يونانية بمعنى الهش . جنس نباتات برية وتريينية من سبط الكرستيات وفصيلة القرنيات الفراشية || انواعه عديدة ، منبتها المناطق الحارة والمعتدلة وهي جنبات وجنابات مستندقة السوق العارشة || اوراقها متعاقبة ، ريشية ثنائية التفصيل ، خضراء اللون ، ازهارها أبوية الارتكاز طويلة الزناد سفلية التجميع حرام او بيضاء || ثمارها قرون خشبية مفلطحة منعقفة . بزورها قرنية اللب صلبة ملساء وكروية الشكل ، لونها الى الحمرة || جذور بعضها صناعية تستعمل استعمال السوس (راجع ششم) ويستخلص من بعض انواعها مادة سامة يدعى جوهرها الفحال أبرين (Abrine) يستعمل في الطب ويدخل في تركيب عدة مستحضرات شافية اشهرها علاجات الملشحة . اشهر انواعه واكثرها استعمالاً الأبروس العطر والششم .

٥٧ - أبروس عطر* ، عسب ، عزب ، نحلة ، سوس جيكا ، بطرقة هندية

Abrus bottae (S). Abre petit (F). Love pea, Indian licorice (E). Abrusbohne (D). Abrus (I).

نوع من الأبروس وهو جنبة عارشة برية وزراعية تريينية ساقها جميلة لولبية . اوراقها معنقة متعاقبة ريشية . ازهارها بيضاء ، شكلها جميل ، عرفها فواح مستحب || ثمارها قرنية مفلطحة لولبية . بزورها صلبة قرمزية زاهية تعلو كلاً منها نقطة سوداء . تستعمل في صناعة السبعات والفلاذ . زراعتها التريينية فسيحة الارعاء لانها تنمو في جميع الاقاليم الحارة والمعتدلة وقد تكثر طبيعياً في الهند وفي معظم المناطق الافريقية وفي امريكا الوسطى والجنوبية .

٥٨ - أبروطون راجع قبصوم .

٤٨ - آبرة الورد* Rhodites rosae (S). Cynips du rosier (F). Mossy rose gall wasp (E). Rosengallwaspe (D).

نوع من الآبرات تركيب الورود واخصها القسرين فتؤذيها اشد الاذى . وحيث تحمل تحدث في فروعها العفص الخيطي الذي يبدو ككبة من الصوف تمتلئها الخيوط الدقيقة القصيرة . لا دواء لها سوى الكشط والتطهير واذا استفحل امرها فالقطع والحريق .

٤٩ - إبرة* ، هدب Aiguille (F).

Needle, Acicular (E).

تحديد وصفي لشكل خاص من اشكال الورق قوامه نصل ضيق مستطيل منسوب العرض ، جسامد النسج الليني ، مدبب العقصة ، تتميز به بعض اجناس الاشجار الراتنجية واخصها الصنوبر والتنوب || من ذلك ان ورقة الصنوبر ابرية الشكل او هديته كما يبدو في الرسم .

٥٠ - إبرة آدم* ، يوكا ليفية Yucca filamentosa (S).

Yucca filamenteux, Yuque filamenteux (F).

Adam's needle, Bear grass (E). Fädige palmillie, Palmenillie (D). Iucca, jucca (I).

نوع من اليوكا وهو نبات صناعي وترييني معمر من فصيلة الزنبقيات || ساقه وحيدة ليفية . اوراقه من ١٠٠ الى ٢٠٠ وهي دائمة ، لحمية ، لينة ، حاصنة ، نصلية ، لسنة ، مدبية العقصة ، تنتهي بابرة صلبة حادة سوداء اللون . وهذه الاوراق تكون منتصبية في اول عهدها ثم تنحني ابتداء من السنة الثانية وتبقى على وضعها هذا . اما معدل طولها فهو من ٤٥ الى ٦٠ سم . || شتراخه الزهري عنقودي التجميع ، كبير القد ، منقصب ، يبلغ طوله من ٨٠ الى ١٢٠ سم . يظهر بعد السنة الثالثة . ازهاره زنادية جرسية طولها نحو ٥ سم . جملة القالب والهندام لا عرف لها . ثماره صغيرة ناشفة حقبة الشكل || ضروريه الزراعة التريينية اربعة تميز بعضها عن بعض بلون الاوراق التي قد تميل الى الخضرة الزاهية او القاتمة او الموشعة بالحمرة او بالحمرة المرقشة بالبياض . تقايلها ازهار لونها الى القبر او الخضرة او الحمرة القرمزية او المرجانية المؤذرة بالصفار || تكثر زراعتها الصناعية في بعض المناطق الامريكية والافريقية لانهم يستخرجون من اوراقه ، بعد تحضيرها ، اليفاف الخيطية تستعمل في عدة صناعات كالحبال وما اشبه .

٥١ - إبرة الراعي


هو غرنوق المزهل نبات عشبي بري طبي . اطلبه .

٥٢ - إبرة الراهب هو الغرنوق العطر ، اطلبه .

٥٣ - إبرة العجوز* ، دهامين شوكراي ، حشيشة الابر ، غزيل ، يا غزال دور دور

Erodium cicutarium, Geranium cicutarium (S). Erodion cicutin, Bec de héron, Bec de cigogne (F). Common Pick-needle, Pin grass (E). Gemeiner reiher schnabel (D). Cicutaria, Erba cicutaria (I).

نوع من الجزاب وهو نبات عشبي بري حولي من فصيلة الغرنوقيات . ضروريه عديدة لا تقل عن ٥٠ منبتها الاقاليم المعتدلة ، جميعها برية ترغب فيها الماشية فترعاها وتعتلفها قبل الادراك . سوقها مفصلية قصيرة فرعاء وزباء || اوراقها متعاقبة ثنائية التفصيل المشطي او الريشي ، خضارها باهت . ازهارها عشكولية ثلاثية او رباعية التجميع مستطيلة الزناد خماسية البتلات والسبلات . لونها الى الحمرة الزاهية



آبرة الورد



إبرة ، هدب



إبرة آدم



إبرة العجوز




أبروس عطر




أبرومة



أبرومية



أبريات



أبريج



أبريسيه لبنانية



أبريسيه مثلثة الزوايا



إيس التنبؤ

٦٣- إبريج*، تمخض، تمخضة

Baratte (F). Churn (E).

وعاء تمخض فيه الكثافة لاستخراج الزيت منها. الإبريج الحديثة عديدة الأشكال والأحجام منها يدوية يحركها العامل ومنها آلية تحركها الكهرباء وغيرها || أما الأدوات القديمة التي كانت تستعمل لهذه الغاية فهي: السقاء، الشكوة، النحي...

٦٤- إبريسم، حرير، سندس
Soie (F).
Silk (E).
الحرير الذي ينسج دود القز.

٦٥- أبريسيه Aubrietia (S). Aubriette, Aubriete (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط الألبونيات وفصيلة الصليبيات. أنواره قليلة جميعها نجمية. فروعها حزمية، مخشوشة، زباء اللحم. أوراقها متعاقبة، مستطيلة، ذاتية النصل الحامل البشرة على صفحته. أزهارها عشكولية التجميع، أرجوانية اللون أو ليلكية. زبدانها مستطيلة. كؤوسها منتصبة، ثنائية الحدبات القاعدية. بتلاتها ملعقة الشكل، مفروضة القوس، رباعية التجميع. أمهيتها مستعرضة مجنحة والقصيرتان منها مجهزتان بسن. غديدها المصراعية ثلثية متحدة القاعدة || بزورها قرية، ثنائية الترتيب يجمعها حق اسطواني أو مخروطي الشكل، مذهب العقصة المستطيلة اللبوسية الحمة. أشهر أنواعها المقالات التالية:

٦٦- أبريسيه لبناكية Aubrietia libanotica (S). Aubriete libanaise (F).

عشبة نجمية تعلو نحو ١٢ سم. متبها الجبال والبقاع، توجد من ارتفاع ٧٠٠ م حتى الجرد || أوراقها ذاتية النصل، كثيفة المسام، زباء. ثمارها جواء مستطيلة الزنيدات المنعرجة.

٦٧- أبريسيه مثلثة الزوايا Aubrietia deltoidea (S). Aubriete deltoide (F).

عشبة نجمية براوح ارتفاعها من ١٢ إلى ١٥ سم. متبها حوض البحر المتوسط وتزرع في الحدائق على جوانب المسرات. أوراقها طحلاء اللون، أزهارها ال حمرة القرمزية. تتكاثر بالبذر والتعقيل والتدريج. تعيش في جميع الأتربة حتى الرملية منها.

٦٨- إيس Tortue mâle (F). He Tortoise, He Turtle (E).
هو الغليم، ذكر السلاحف من أي نوع كانت.

٦٩- إيس Ips

جنس حشرات خاشبة من فصيلة الكراشيات ورتبة نمديات الاجنحة. أنواعه المعروفة ٣٠ جميعها صغيرة القد، صولجانية الزبال. أجسامها تطول من ٨ إلى ١٠ م. أنوارها الى السرة العابقة أو السواد اللامع. وقد يعلو أعواد بعض أنواعها رقشة حمراء مبعثرة أو زركشة صفراء يعترضها تجذيع اطحل دقيق || تعيش تحت لحاء الأشجار فتتخلج الشكير حيث تمتح مكنها الذي ينقف عن يرقات تتابع عمل الحشرات الكاملة. وهي لا تخرج من سراديبها إلا مرة واحدة عند زمن الكرم ثم تعود || أشهر أنواعه وأضرها إيس التنبؤ

٧٠- إيس التنبؤ Ips sexdentatus (S). Ips des ablétiées (F).

نوع من الإيس وهو حشرة صغيرة القد طولها نحو ٦ م. ثوبها الى السرة العابقة يعلوها موج اسود لامع. نغداها

٥٩- أبرومة* Abroma angusta (S). Abrome (F).

Abroma, Devil's cotton (E). Abrome (D).
Abroma (I).

الكلمة يونانية بمعنى عديم الغذاء. جنس نباتات برية وزراعية صناعية وتريينية من فصيلة البرازيات. متبها جميع الاقاليم الاسيوية المعتدلة الحرارة. تكثر في الصين ومنشوريا وفي بعض مناطق التبت حيث يستعملون الياف قشورها في صناعة الحبال || وهي جنبات حولية أو معمرة. نعر في الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الحر || سوقها مخشوشة، قشورها ليفية. أوراقها محورية الارتكاز متعاقبة، منقطة، راحية، ثلاثية الفصوص البسيطة، لونها اخضر عابق || أزهارها زنادية فردية متعاقبة مع أوراقها بتلاتها اهليجية الشكل، حراء اللون، خاسية التركيب، سبلاتها مندعمة الانتشاب حاضنة البتلات، مدبة الرأس، هدية العقصة. تزرع للتزيين، تتكاثر بالبذر. تخشى المواقع الباردة.

٦٠- أبرونية*، رشيفة، غندور Abronia (S).

Abronie (F). Abronia, Sand verbenes (E).
Softkrieche (D). Abronia (I).

من اليوناني بمعنى ناعم، لطيف. وتكتب أبرونيا وأبرونه. جنس نباتات عشبية ليفية معمرة من فصيلة الشيبات. أنواعها المعروفة قليلة جميعها مدادة وعارشة. جذورها جنتية مستطيلة. سوقها ليفية. أوراقها متعاقبة، منقطة، قلبية. أزهارها صيوانية أو نورية التجميع، ابطة الارتكاز، زاهية الالوان التي يلب فيها الاصفر والليلكي والارجواني. رائحتها عطرية مستحبة قريبة الشبه من الونيل || تنمو في جميع الأتربة، لكنها تخشى الرطوبة المستعكمة والاراضي القوية الاندماج والكتوم || أزهارها يتتابع نحو خمسة أشهر وزهرتها تدوم أكثر من اسبوعين || أشهر أنواعها:

أبرونية خمبية Ab. umbellata (S). A. en ombelle (F).

أبرونية رملية Ab. arenaria (S). A. des sables (F).

أبرونية عريضة الورق Ab. latifolia (S). A. à larges feuilles (F).

أبرونية عطرية Ab. fragrans (S). A. suave (F).

٦١- إبريات* Hydnaceae (S).

Hydnacées (F). Hydnaceae (E).

فصيلة الفطور الأبرية من رتبة الدعاميات. اجناسها وأنواعها عديدة بعضها صالح للأكل وبعضها سام ضار. معظمها فطور رمية ارضية وبعضها طفيلي يعيش على جذوع الاشجار وأغصانها || من ميزاتها الخاصة نكعتها الفارشة وكثرة هيفاتها الابرية المتمركزة على الصفحة السفلى، تحت الجراب الجرثومي، شائعة نحو الماء أو منحرفة باتجاه الأفق أو متدلية نحو الارض. اما صفحتها العليا فلحاء السطح محدودية الاطراف. تحتها شبه كروي شديد الالتصاق تعلوه ساق قصيرة غليظة، اما فليزية التركيب سريعة العطب واما لحمية قابلة الانعقاد قليلة العطب || منها جنس واحد خشن النكهة الحرفشية التركيب || اعرف وأشيع اجناسها الأرشون والبرقة والدردون.

٦٢- إبرية، هديئة Aciculaire (F).

Needle shaped, Acicular (E).

كل ورقة شكلها شكل الابرة أو كل عضو في الحشرات شكله كالابرة.

٧٩ - أَبْغُمْبِيَّة ٥
Bucorve (F).
هو الاركوم ، طائر افريقي ، اطلبه .

٨٠ - أَبَقْ* ، مَوْز لِيْفِي ، قُنْب مَنِيْلِيَّة
Musa textilis (S). Abaca, Chanvre de Manille (F).
Abaca plant, Manila hemp (E). Manila hanf (D).
Canapa di Manilla (I).
نوع من الموز يزرع لاستخراج اليافه الصناعية الشائعة
الاستعمال . موطنه بلاد منيليه ، يعيش في المناطق وفي
الاراضي الدبالية الرطبة . نصبتة تعلق نحو ٣٥٠ سم .
اوراقها كبيرة القند مستطيلة . ثمارها صغيرة ، مأكولة
لكنها ناشفة ، حامزة المذاق ، قليلة المادة السكرية .

٨١ - أَبَقْ
أبقت وأبقت الغنم : ولدت وهي مهازيل .

٨٢ - أَبَقْرَاطِيَّات
Hippocrateae (S).
Hippocratéés (F). Hippocrateae (E).
سبط نباتات نجمية وجنبية من فصيلة الفقايات . منبتها
جميع البلاد الحارة والمعتدلة المناخ . || أنواعه لا تقل عن
٥٠ جميعها معمرة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، كاملة ،
بيضية ، مدببة . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز .
ازهارها قلسوية الشكل ثلاثية او خماسية البتلات .
اشهر انواعه ابقراطية الانثيل . اوراقها زغبية . ثمارها
لوزية يأكلها الناس ويدعوها بلفتهم بجيكوس (Bejucos)

٨٣ - أَبَقْل
Bourgeonner (F). To bud (E).
أبقل الشجر يخرج وقت الربيع في اعراضه شبه اعناق
الجراد (الاساس) . وبعبارة المحكم : يخرج في اعراضه مثل
اظفار الطير وأعين الجراد قبل ان يستبين ورقه .

٨٤ - أَبَقُونِيَّات
Aponogetaceae (S).
Aponogétacées (F). Aponogetaceae (E).
سبط من المزماريات يشمل خمسة اجناس وعدة انواع من
النباتات المائية المعمرة البرية والتزيينية .

٨٥ - أَبَقُونِيَّة ، جَارَة المَاء
Aponogéton (F).
Aponogeton (E).
جنس نباتات مائية معمرة من الابقونيات وفصيلة
المزماريات . انواعه المعروفة ستة جميعها معمرة مائية
او متعنية ، اعماها زراعة واجملها شكلاً الابقونية السنبلية .

٨٦ - أَبَقُونِيَّة سُنْبِلِيَّة* ، جَارَة المَاء السُنْبِلِيَّة
Aponogeton distachum (S). Aponogéton en épis.
Asperge du Cap (F). Cape asparagus, Water
hawthorn (E). Schwimmer, Wasserähre (D).
Sparagi del Capo (I).
نوع من الابقونية يزرع في احواض الماء او في الاماكن
المستحكة الرطوبة المستمرة || اوراقه جلدية نصلية
قرصية طويلة الزناد . ازهاره سنبلية التجميع ، مزدوج
السنابل القائمة على شراخ طويلة الساق الاسطوانية .
ازهاره بيض عطرة ليفية التركيب كالساق .

٨٧ - إِبْكَار ، تَهْرِيف
Précocité (F). Precocity (E).
الاسراع في انهاء طور النشوء والنمو سواء في الحيوان او
في النبات ان حولياً او معمرأ .

٨٨ - إِبْكَالْ
هو عرق الذهب المخزفي ، اطلبه .

مسننتا الطرف الداخلي الخماسي التقويس ، السداسي التستين .
تركب التنوب والصنوبر المقطوع واليسابس . تعيش
تحت اللحم حيث تخرج الشكير وتتكاثر . جيلها الحولي
واحد . اضرارها قليلة لانها سطحية . مكافحتها صعبة نظراً
لبقاها مع يرقانها وخادراتها تحت القشور || توجد في
لبنان على الصنوبر المقطوع اليابس دون سواء .

٧١ - أَبْسَانِي
Aptien.
ساف من الطبقة الطباشيرية مركزة بين الالبيني والبرماني .

٧٢ - أَبْسَنْت* ، أَفْسَنْتِيْن ، دَفْسِيْسَة ، شِيح
رومي ، خُتَرْق
Artemisia absinthium (S).
Absinthe, Ab. amère, Grande absinthe, Alvine,
Herbe aux vers (F). Absinth, Absinthium, Worm
wood (E). Absinth, Wermut (D). Assenzio, As.
domestico, As. romano (I).
عشبة معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . تنبت
برية في جميع الاصقاع المعتدلة وتزرع لاستعمالها الصناعي .
اوراقها مركبة ، ريشية ، معنقة ، متعاقبة . ازهارها
ابطية نورية التجميع ، قصيرة الزناد ، عطرية الرائحة .
يستخرج منها زيت طيار اخضر اللون شديد العرف .
وأما جوهرها الفعال فهو الابسنتين (absinthine) وهو قليل
الرائحة ، شديد المرارة ، قليل الذوبان في الماء سريعه في
الكحول ، حامضي الرادع والانفعال || يستعمل في الطب للهضم
والايلاع والحميات والادار وطرد الدود الى آخره || ويستعمل
بنوع خاص في صنع شراب كحولي يعرف باسمه أبسنت .

٧٣ - أَبْسَنْت بَحْرِي* ، أَفْسَنْتِيْن بَحْرِي
Artemisia maritima (S). Armolse maritime (F).
Sea wormwood, Sea artemisia (E). Seewermut,
Straudbaifuss (D). Assenzio marino, Assenziolo (I).
عشبة برية معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر .
توجد في جميع المناطق المعتدلة على حافة الطرقات وفي
الاراضي البور || ساقها مستقيمة حراء مضلعة يبلغ
ارتفاعها المتر . اوراقها مفصصة ، معنقة ، متعاقبة .
ازهارها ابطية نورية كازهار الابسنت . اوراقها وازهارها
عطرية مرة الطعم تحوي مادة مقوية تحث على الايلاع .
يستخرج من تقطير اوراقها شراب كحولي لا يخلو من
اللذة وهو شائع الاستعمال في اروبه الغربية .


٧٤ - أَبْض
Jarret (F). Hough (E).
الابض هو باطن الركبة . وباطن مرفق البعير ، والمأبض
كذلك . ج آباض ومأبض .

٧٥ - إِبْط
Aisselle (F). Axil, Arm-pit (E).
هو الزاوية العليا الناتجة عن اتصال قاعدة الورقة بالساق
او الفصن او الفئ || وهو في الحيوان باطن الكتف .
ج إباط . وإبط الجبل : سفحه .

٧٦ - إِبْطَاء
Tardiveté (F). Lateness (E).
حاله اصلية او عرضية في الحيوان وفي النبات تؤخر النمو
الطبيعي . اطلب تأخر .

٧٧ - إِبْطَال
Annulation (F). Annulment (E).
هو قرار تصدره سلطة قضائية او ادارية للقضاء على عقد
مشوب بالبطلان .

٧٨ - إِبْطَال قِيَمَة النَقْد
Démonétisation (F).
هو إلغاء سعر النقد القانوني .
Demonetization (E).



أبسنت



أبسنت بحري



أبق



أبقونية سنبلية



أبكَسَة سَوْدَاء




إِبِل



أُبْلِيَس



أُبْلَقِ الْقَلْع



أُبْلَه

٩٤- أَبْلَقِ الْأَنْدَلُسِ (S). Oenante Hispanica (S).

Traquet à gorge noire (F).

عصفور من القواطع طوله نحو ١٦ سم. زوره اسود اللون.

٩٥- أَبْلَقِ الْبَادِيَةِ (S). Oenante deserti (S).

Tarier du désert, Vitrec (F).

عصفور من الأرايد طوله ١٧ سم. يألف التناثف والأجرال.

٩٦- أَبْلَقِ الْحَقْلِ (S). Saxicola rubetra (S).

Tarier des prés (F).

عصفور من القواطع طوله ١٤ سم. يألف الحقول والمراعي وضفاف الأنهر في زمن الصيف.

٩٧- أَبْلَقِ الْحَوَادِلِ (S). Oenante leucura (S).

Traquet rieur (F).

عصفور من الأوابد طوله ١٩ سم. وهو اسود الثوب ابيض الزمكي. يألف الحوادل القاحلة الصخرية.

٩٨- أَبْلَقِ الرُّعْيَانِ (S). Saxicola torquata rubicola (S).

Tarier pâtre (F). Stonechat (E).

عصفور من القواطع طوله ١٣ سم. يألف المراعي والحقول المزروعة في فصل الشتاء.

٩٩- أَبْلَقِ الْقَلْعِ *، قَلْبِي (S). Saxicola oenante (S).

Traquet moiteux (F).

Whinchat (E).

عصفور من الأوابد طوله ١٦ سم. يألف الكروم والحقول المزروعة. يكثر وجوده في جبال لبنان وسورية.

١٠٠- أَبْلَه *، أَطْيَش (S). Anous stolidus (S).

Noddi niais (F). Noddy (E).

طائر مائي من كفيات القدم. متوسط القد، ابيض الثوب، تستطيل المنقار مستقيمه. طويل الجناح والذنب. قصير الرجلين. يطير الطيران || اقليمه البحار الحارة، يحط على السفن حتى يكاد يقبض عليه.

١٠١- أَبْلُوج، طَبَرَزْد، قَنْدَق (S). Sucre candie (F).

Sugar-candy (E).

هو سكر النبات يفيد الخنجرة ويحلي الصوت.

١٠٢- إِبْلِيَّات، جَمَلِيَّات (S). Camelidae (S).

Camélidés (F). Camelidae (E).

فصيلة الابل من رتبة مزدوجات الاصابع المجترات. تشمل الجمل والفالج واللامه والألبكة.

١٠٣- إِبْلِيَز، طَمِي، غَرِين (F). Limon (F).

الابل يز والبلز هو الطين الذي تعقبه مياه الأنهر بعد فيضائها وعودتها الى مجاريها الطبيعية.

١٠٤- أَبْلِيَسَة *، ذُلْكُوفَة (S). Abelicea (S).

Zelcova (F). Zelcova (E).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الانجريات. انواعها المعروفة قليلة العدد منها بعض جبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوتها غليظة، رقيقة، تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اغصانها كثيرة الفروع. اوراقها عابدة، ثنائية الصف كالافنان. ثمارها ناشفة حصية الشكل والقذ كستنية اللون || اشهر انواعها الشريفة الورق والمؤنفة.

٨٩- أَبْكَسَة سَوْدَاء * (S). Abax ater (S).

Abax noir, Féronie (F). Abax ater (E).

حشرة دجوبة قانصة ودائمة من فصيلة العبقوسيات ورتبة غديبات الاجنحة. اعطائها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الأدنى واروية || جسمها متوسط القد يطول من ١٨ الى ٢٢ سم. ثوبها اسود لامع. رأسها معتدل الطول والعرض، قصير الخطم، ضليع التأشير. زباناها دقيقان، مرفقيان. عيناها كبيرتان جاحظتان || الانثى اصغر قدأ من الذكر واقصر زبانا منه واجت ثوباً || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في اواخر الربيع وتبقى حتى اواسط الخريف. تسرح في الليل. تسمى بسرعة وتطير بخفة. قوتها المواد النباتية المنحلة وما تستطيع اقتناصه من حشرات || تعاظم وتمتج المكن في اواسط الصيف. ينقف المكن بعد ثلاثة اسابيع عن يرقات دقيقة تتطور ببطء وتبلغ الكمال الجسموري في اواخر الربيع ثم تدخل في طور الاكمال الذي ينتهي بظهور الحشرة الجمالنة في اواسط شهر حزيران.

٩٠- إِبِل * (F). Dromadaires (F). Dromedarys (E).

الإبل والإبل: الجمال. وهو اسم واحد يقع على الجمع وليس بجمع ولا اسم جمع انما هو دال على الجنس هذا ما قاله ابن سيده. وقال الجوهري ليس لها واحد من لفظها وهي مؤنثة. ويقول الدميري «روى ابن ماجه عن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الابل عز لاهلها والقم بركة والخير معقود في نواصي الخيل الى يوم القيامة» || ويقال للابل بنات الليل. ويقال للذكر منها بعير اذا أجذع. والانثى تدعى ناقة. أشهر عروفي ابل الجزيرة وافريقية: الاربية والشذمية والبيدية والمجدية والشذية والمهرية || ومن لقب الابل: العيس وهي الشديدة الصلبة، الشلال وهي الخفيفة، اليملة وهي التي تعمل، الوجناء وهي الشديدة، الناجية وهي السريعة، الموجاء وهي الضامرة، الشردلة وهي الطويلة، المهجان وهي الكريمة، الكوماء وهي الناقة العظيمة السنام، القوداء وهي الناقة الطويلة العنق، الحرف وهي الضامرة، الشارف وهي المسنة.

٩١- إِبْلَال (F). Départ de la sève.

Montée de la sève (F). Sap movement (E).

الابلال هو ابتداء الدورة النسفية الحولية في النباتات المعمرة. وتختلف مدة هذه الدورة باختلاف النبات والاقليم والموقع.

٩٢- أَبْلَان (F). Etude des nuages.

Study of clouds (E).

هو درس تحركات السحب وما فيها من شحن كهربائية.

٩٣- أَبْلَقِ *، أَبُو بُلْسِقِ (S). Oenante (S).

Traquet, Tarier (F). Wheatear (E).

جنس طير من العصافير النافمة الصغيرة القد من فصيلة الشجوريات. انواعه زهاء ٧٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم القديم. تتميز باثوابها البلقاء اللون وبمناقدها الدقيقة المستقيمة. قوتها الحشرات والهوام. تألف الأجرال والبراص والجوادر. معظمها من القواطع وبعضها من الطير الأبدية || تدن في الاشجار والشجيرات الجفلة. اناثها تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها وحدها. بيضها اغبر اللون، ازرق المواج تعلوه رقشة خضراء || اعرف انواعه واشهرها في المقالات التالية:

garde-bœuf, H. des bœufs (F). Reef heron (E).

طائر من القواطع يألف الشطوط البحرية وبحاري الأنهار. وهو متوسط القد طوله نحو ٤٦ سم. ثوبه الى البياض الناصع يعلوه من قمة الرأس الى اعلى الجؤجؤ سفرة من الريش المذهب || يعيش اسراباً كثيرة العدد. يبدن في المناطق بين القصب والغزار والاسل. قوته الاسماك الصغيرة والصفادع والديدان وجميع انواع الحشرات. يركب الابقار والجواميس فيلثم ما يعلو جلودها من قراد وحلم.

١١٤ - ابن الماء القُنْبُرِيّ (S). Herodias intermedia (S). Aligrette orientale (F). Oriental egret (E).

طائر من القواطع يحوب البلاد الاسيوية. يعيش اسراباً كبيرة لا تفارق الشواطىء والمناطق والبحيرات واخوار الأنهار || وهو صغير القد، طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه ناصع البياض يكثر فيه الريش الاخضر الفاتح الصنف.

١١٥ - ابن آوى*، وآوى (E). Chacal (F). Jackal (E).

حيوان بري من فصيلة الكلبيات ورتبة اللوامح. وهو من السباع الخادرة التي تعيش جماعات. سمي ابن آوى لانه يأوى الى عواء بنات جنسه ولا يعوي الا ليلاً. كنيته ابو ايوب وابو ذؤيب وابو كعب وابو وائل. انشاء فهلوية، تضع في اواخر الربيع من خمسة الى تسعة جراء. اصرامه ثمانية ومنهم من جعلها تسعة. اجسامها رشيقة. طولها الكامل، مع ذيلها، يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. أما ارتفاعها فن ٥٠ الى ٧٠ سم. اثنائها سوية، ظهورها صهباء اللون او سمراء. اعناقها وبطنها الى الصفار الاخير. قوته مسا استطاع اليه سبيلاً من حيوان وطيور وجيف وثمار || اشهر اصرامه المقالات التالية :

١١٦ - ابن آوى، زَغَبَر، أبو زَهْرَا (S). Canis aureus (S). Chacal commun (F). Common jackal (E).

موطنه العالم القديم. يكثر في الشرق الاوسط واروبة. طوله نحو ٩٠ سم. ثوبه الى الصهبة الكدره وهو كثيف الصوف، جثل الذيل. يألف الاحراج ويعيش قرب الدساكر والقرى. يسرح من العصر الى الفجر وهو اجسر اصرام نوعه واحيلها. يسطر على الارانب والدجاج والبط. يأكل العناب والعنب والذره الصفراء وقصب السكر.

١١٧ - ابن آوى الإفريقي*، وعَوَع (S). Canis anthus (S). Chacal du Sénégal (F). African jackal (E).

اعطانه فسيحة الارحاء تمتد من الحبشة الى السودان فصر ليبيا فتونس فالجزائر فالسنغال. وهو متوسط القد، رشيقي القوام طوله نحو ٨٠ سم. ثوبه الى الصهبة الرمادية يعلوها موج اصفر || يسرح في الليل. قوته الطير والجرذان والفئران والدويبات || عروقه عديدة اعرفها :

ابن آوى المندي (S). Canis anthus, riparius (S). Chacal des rochers (F).

موطنه شواطىء البحر الاحمر من باب المندب الى العقبة. ابن آوى الموشح (S). Canis anthus variegatus (S). Chacal varié (F).

يعيش في الحبشة واfrica الشرقية والوسطى

١١٨ - ابن آوى الجَحْقَل*، جَحْقَل (S). Canis latrans (S). Chacal aboyeur, Coyotte (F).

اكبر بنات آوى جثة واجثلها صوتاً واروغها خلقتاً واقلها خوفاً. طوله نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى الصهبة السمراء. ظهره اعبق من ايطليه. بطنه الى الصفرة الخطية.

١٠٥ - أبليسَة شُرْمِيَّة الْوَرَق (S).

Abelicea carpinifolia (S).

Zelcova à feuilles de charme (F).

نوع من الابليسة. مهدا جبال القفقاز. ساقها فرعاء تعلو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها معنقة، تطول من ٥ الى ٦ سم. نصالها بيضية الشوزن، سداسية او ثمانية العروق المتقابلة، مسننة الحتار. || تعتبر من الاشجار السبروتية التي لا تحشى سوى الجفاف.

١٠٦ - أبليسَة مُؤَنَفَة (S). Abelicea acuminata (S). Zelcova acuminée (F).

نوع من الابليسة. مهدا الصين واليابان. ساقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. اوراقها معنقة، متعاقبة. نصالها سنانية الشكل، مؤنفة، مسننة الحتار، عشارية العروق المتقابلة، تطول من ٦ الى ٨ سم. || تعتبر من الاشجار السبروتية.

١٠٧ - ابن آوى (F). Milan d'Orient (F).

هو الخداة الشرقية؛ طائر شبه الباشق الا انه اطول جناحاً.

١٠٨ - ابن الأرض

« ثبت يخرج في رؤوس الآكام له اصل ولا يطول وكأنه شعر يؤكل وهو سريع الخروج سريع الهيج » (كتاب النبات لابي حنيفة).

١٠٩ - ابن الماء (S). Aligrette (F). Herodias, Egretta (S). Egret, Egretta, Water fowl (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البلشونيات. انواعه كثيرة العدد مهدا العالم. تتميز بأرياشها الناعمة، الفاخرة، المرغوب فيها || اشهر انواعه ما يتبع :

١١٠ - ابن الماء الأبيض، بَلَشُون أبيض

Herodias alba, Casmerodius albus (S). Aligrette blanche, Grande aligrette (F). Great white egret (E).

طائر من القواطع. اعطانه التي يحوبها كل عام تمتد من جنوبي شرقي ااروبة الى استرالية بعد الهند والصين واليابان. وهو كبير الجثة طوله يفوق المتر. ريشه الى البياض الناصع. حدقة عينه وحندرتها الى الصفار الزاهي. منقاره اسود اللون وجلاه الى الجؤوة الخضراء المواج || يألف البحيرات والمناطق وبحاري الماء. يبدن في الاشجار القريبة من الماء وبين القصب والاسل.


١١١ - ابن الماء البَيْضُوي*، بَبَاضِي (S). Herodias egretta (S). Aigrette des récifs (F).

طائر من القواطع. موطنه العالم. يبدن في العراق. منه ضربان الابيض والاسود || يألف الشواطىء واخوار الأنهار. ريشه فاتح الصنف مرغوب فيه.

١١٢ - ابن الماء الصغير، سَنَقِيل (S). Herodias garzetta (S). Aligrette garzetta (F). Little egret (E).

طائر من القواطع يكثر في الشرق الاوسط وفي بلاد النوبة. وهو متوسط القد طوله نحو ٦٢ سم. ثوبه الى البياض الناصع يكثر فيه الريش الاخضر المستطيل. منقاره اسود الجسم. اصفر الانتشاب. رجلاه الى السمرة أما اصابعه وبخاليه فصفراء.

١١٣ - ابن الماء العادي*، بَلَشُون بَحْرِي، أبو قِرْدَان (S). Herodias bulbus, Bulbus ibis (S). Héron



ابن الماء البيضي



ابن الماء العادي




ابن آوى




ابن آوى الإفريقي



ابن آوى الجحقل



إبن آوى الصحراء



إبن آوى الهندي



إبن عرس



إبن مقرص



أبنة



إبنة يوم



أبئوس



أبئوس كاذب

١٢٤ - إبن قتره

ضرب من الحيات لا يسلم من لدغته وقيل هو ذكر الانثى وهو نحو من الشبر (اللسان).

١٢٥ - إبن مقرص *
Putorius furo (S).
Furet (F). Ferret (E).

حيوان بري وأليف من فصيلة السموريات. قريب الشبه بإبن عرس لكنه أكبر جثة وأطول ظهرًا. ثوبه إلى الصبغة الغبراء يشوبها بعض الصفرة || يستعمل في صيد الارانب والقواع.

١٢٦ - أبنة *، برعمة زهرية
Bouton,
Bourgeon à fleurs (F). Bud, Pimple, Shoot (E).
نامية نباتية صغيرة في رأس الفند أو محور القصب أو ابط الورقة ... تتحول إلى برعمة زهرية.

١٢٧ - إبنة البحر اطلب خيلان

١٢٨ - إبنة يوم *، زحرف، يافؤفة
Ephemera (S).
Ephémère (F). Ephemeral fly, May-fly (E).

جنس حشرات صغيرة من اليبويات. انواعه عديدة جميعها هوام دقيقة الجسم المستطيل. مؤخرها يقبني بحطين في الذكور وبثلاثة خيوط في الاناث. اثوابها متباينة الالوان يغلب فيها الاخضر والاصفر. اجنحتها مثثة الشكل دائمة الانتصاب. وهي من الحشرات التي تعيش حياتها القراشية بضع ساعات في حين ان حياتها البرقية التي تقضيها في الماء تطول الى السنتين وأكثر.

١٢٩ - أبئوس *، ساسم
Ebenus (S).
Ebénier, Ebène (F). Ebony tree, Ebony (E).
Ebenum, Ebenholz (D). Ebanio (I).

شجرة حرجية وصناعية من مجموعة الابئوسيات وفصيلة القرنيات. ساقها رفيعة، شاحمة، قليلة الاغصان الغليظة، كثيرة الافئاد والافئاد الدقيقة، طحلاء أو سوداء اللحاء القليلة الخشونة || اوراقها معنقة، بيضيه، متفرجة الزاوية. ازهارها ابطية لا زنادية || خشبها ثمين القدر فاخر الصنف، ناعم الرقعة، ثقيل الوزن، شديد الصلابة سريع العطب اذا ما رقت الواحه وهو اسود اللون ويزداد اسوداداً مع عمر الشجرة || منبته الاصلي بلاد الهند وجزر المحيط الهندي. اجود ضرابه وافخرها ما جاء من جزيرة موريس || والأبئوس اذا وضع على الجمر فاحت منه رائحة طيبة. ويقال ان نقيعه يجلي النشاوة والبياض. وربما نشارته ينفع الرمد والحرق ويحل نفخ البطن || يتكاثر بالنبور والعقل. يرقب في الاتربة العبيقة الفور، القليلة الاندماج، المتوسطة الرطوبة، يعيش في بعض مناطق البلاد المصرية قرب ضفاف النيل.

١٣٠ - أبئوس كاذب *
Laburnum anagyroides (S).
Laburne, Pluie d'or (F). Laburnum, Base tree (E).
Falscher ebenbaum, Goldregen (D). Ebanofalso (I).

شجرة من القرنيات القراشية. منبتها البلاد المعتدلة الحرارة اخصها مناطق إقليم حوض البحر المتوسط || اوراقها مركبة ثلاثية، وريقاتها بيضيه الشكل منعكفة على الضلع يجمعها زناد مستطيل دقيق. ازهارها عنقودية التجميع، ذهبية اللون، عطرية الرائحة. خشبها ناعم الرقعة، صلب المود لونه إلى السواد الباهت يتخلله تمشيح اصفر. يستعمل في الصناعات الخشبية الدقيقة الثمينة || تزرع للتزيين

يعيش جماعات يراوح عددها من ١٢ الى ٦٠ يروح في الليل ولا يتقطع عن العواء

١١٩ - إبن آوى الصحراء *، إبن آوى الثوبية، شعهر
Canis musomeias (S). Chacal à dos noir (F).
Black-backed jackal (E).

كبير الجثة طوله نحو ٩٠ سم. وهو مستدق الرأس والأذنين. جثث الصوف الاصهب الاغبر، اسود الظهر، اصفر البطن وخوافي القوائم || عطنه شاسع الارحاء يمتد من اخيشة والثوبية الى تخوم القطب الجنوبي || يعيش في الاحراج والادغال والسهول. يقتنص القواع وام قرة واليربوع والجردون والغارة.

١٢٠ - إبن آوى الهندي *، شعهر

Canis cancrivorus (S). Chacal des savanes (F).
متوسط القد طوله نحو ٨٠ سم. ثوبه إلى الصبغة الخنطية الموج. ظهره اعقب من ابطيه وبطنه. وهو صغير الرأس، قصير الصوف، دقيق القوائم || عطنه سباب الهند والعراق. يسرح في الليل. قوته الدويبات والطيور والثمار على اختلاف انواعها كالموز والمنغو والعنب والتراخ...

١٢١ - إبن دأية
Cornelle mantelée (F).
هو الغراب الابقع سمي إبن دأية لانه اذا رأى دبرة في ظهر بعير او قرعة في عنقه نزل عليها ونقرها الى الديات اي الفقار.

١٢٢ - إبن عرس *، عرس، عرسة، سنعبه، كلكسة
Putorius (S). Putois (F). Weasel (E).

كنيته ابو الحكم وابو الوثاب. وهو حيوان من فصيلة السموريات ورثة اللوامح. صغير القد، طويل الجسم والذيل، قصير القامتين الاماميتين، صغير الرأس، اسك واصلم الأذنين. اصهب الظهر، اغبر البطن في الذكر ابيضه في الانثى || وهو من الروامس يسرح في الليل يصيد الدجاج والحمام والارانب والجردان والفئران والعطاء والافاعي التي يلتهمها ولا يخشى اقبائها وسماها. قال عبد اللطيف البغدادي انه يسرق ما وجد من فضة وذهب وهو كثير الوجود في منازل اهل مصر. وحكى ان رجلاً صاد فرخاً منها وجسه في قفص بحيث تراه امه فلما رآته ذهبت ثم جاءت وفي لها دينار فألقته بين يديه كأنها تفتدي ولها فلم يتركها لها فذهبت وعادت بدينار آخر حتى كمل العدد خساً فلما رأت انه لا يطلقه ذهبت وعادت بحرقه كأنها تشير الى فراغ حاصلها فلم يكثر لها فلما رأت ذلك منه عادت الى دينار منها لتأخذ فخشى الرجل من ذلك فأطلق لها ولها || وقد جاء في كتاب الجاحظ قول الشعمق:

وابن عرس رأس بيبي صاعدة في رأس طبقه
صبغة ابصرت منها في سواد العين زرقه
مثل هذا في ابن عرس اغيش تعلوه بلقه

١٢٣ - إبن عرس مثنين، فار الخليل، قوقدون قنذر
Putorius faetidus (S). Putois fétide (F). Polecat (E).

صرم من ابن عرس يتميز بثلاثة رنجه. موطنه الشرق الاوسط واروبه. يوجد منه في شمال سورية وفي احراج الاناضول || ثوبه إلى الصبغة الكدرة. خطمه اسود، لحيه ابيض أما ذنبه فشديد السمرة || وهو كإبن عرس يفترس الافاعي ولا يخشى سماها.

وهي فردية التجميع ، مندية اللون ، مستطيلة الاذن المنحرفة || يستخرج من ثماره قبل الادراك تمام دهن الابل المعروف ايضاً بدهن السابن وهو دهن طبي مجهض يدخل في تركيب عدة علاجات خارجية جلدية || نقيع ازهاره مدر للطمث . كان يستعمل فيما مضى كمنبه شارب وللجهاز غير انه سيء العواقب ، شديد الخطر || وهو من الاشجار الحرجية اللينانية يتكاثر باليدزر لكنه بطيء النمو ويرغب في الجبال العالية والاتربة العميقة الغور .

١٣٧- أبو أظلاف ، أبو ذقن

هو خنزير الارض ، حيوان افريقي لبون . اطلبه .

١٣٨- أبو الأبرد هو النمر اطلبه .

١٣٩- أبو الأسود هو النمر الاسود اطلبه

١٤٠- أبو الحن * ، أبو الحناء Erithacus rubecula, Rubecula familiaris (S). Rouge-gorge, Rouge-gorge familier (F). Robin, Robin-redbreast (E).

طائر من فصيلة الشحروريات ورتبة الجواثم وهو من المصافير الحائرة ، النافعة ، الصغيرة القد ، طوله نحو ١٥ سم . ظهره اشهب اللون اسمر ، عنقه وصدره احمران ، بطنه ابيض اغبر يعلوه موج فضي . منقاره اسود . رجلاه الى السمرة || موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشرقية والشمالية . وهو من المصافير الغريدة ، النزقة الطباع ، الخفيفة الحركة التي تألف الادغال والحدائق . قوته الحشرات على اختلافها من النملة الى اليرقة والدودة والفراشة || يدثن في الادغال والاشجار الغناء . انشاء تضع من ٥ الى ٧ بيضات تحضنها متوابة مع الذكر .

١٤١- أبو الخطاف ، أبو الصلث

هو الحدأة ، اطلبه .

١٤٢- أبو الرؤوس هو الزقزاق ، اطلبه .

١٤٣- أبو الزهور

هو التسير الفلسطيني من العصافير المبدولة . اطلبه .

١٤٤- أبو السيمور Couleuvre-chapelet (F).

هو الثعبان المرقط ، اطلبه

١٤٥- أبو الصلث هو الحدأة ، اطلبه .

١٤٦- أبو العنقاء هو البلسون الرأس ، اطلبه .

١٤٧- أبو التوم هو الخشخاش المنوم ، اطلبه .

١٤٨- أبو الهول

هو الصمل ، جنس حشرات من فصيلة الهوليات .

١٤٩- أبو الهول الأسمر هو صمل السمسم ، اطلبه .

١٥٠- أبو الهول الأغبر هو صمل الكرم ، اطلبه .

١٥١- أبو الهول الأفقع هو صمل اللبلاب ، اطلبه .

١٥٢- أبو الهول الأفلس * ، صمل الحدائق

Sphinx ocellata, Smerinthus ocellatus (S). Sphinx demi-paon, Sp. ocellé (F). Ocellate sphinx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة

ويستخرج من بزورها قبل تمام ادراكها مادة قلبية جمالية تستعمل في بعض المستحضرات الطبية || تتكاثر بالبذور والعقل . ترغب في المعارض الجنوية الكثيرة الشمس وفي الاتربة الغنية المتوسطة الاندماج المعتدلة التركيب .

١٣١- أبْنُس هُنْدِي * ، أبْنُس سَرَنْدِيب

Diospyros ebenum (S). Ebénier de Ceylan (F). Ceylan ebony (E). Ebenholzbaum (D). Diospiro ebano, Ebano nero, Avolio (I).

شجرة حرجية دائمة عظيمة القدر من سبط الكاكيات التابع الى مجموعة الابنوسيات وفصيلة القرنيات . هيكلها جميل الشكل والقالب . اوراقها معنقة ، بيضية ، دقيقة الاذينات . نصلها جامد الصفحة ، شديد الخضار القائم . ازهارها بيضاء اللون ، فردية او ثنائية التجميع . ثمارها كروية ، لحمية ، مأكولة اللب ، صفراء اللون . منتبها بلاد الهند وجزيرة سرنديب . خشبها اسود امفر يستعمل استعمال الابنوس وهو اشد متانة منه لكنه اقل جودة وصلابة .

١٣٢- أبْنُوسِيَّات Ebenaceae, Diospyraceae (S).

Ebenacées, Diospyracées (F).

Ebenaceae, Diospyraceae (E).

مجموعة نباتية من فصيلة القرنيات . اسباطها خمسة ، اجناسها وانواعها ٢٧٥ منها ١٨٠ تنتمي الى سبط الكاكيات . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات . اقليةها البلاد الحارة . اخشابها شديدة الصلابة ، ثقيلة الوزن النسبي ، سوداء اللون او سمراء . اوراقها بسيطة ، معنقة ، بيضية ، نصلها جامد الصفحة . جميل الخضار اللامع . ازهارها كاملة التركيب ثلاثية او رباعية او خماسية البتلات لونها الى الصفرة || ثمار بعض اجناسها مأكولة اشهرها الكاكي .

١٣٣- أبْنِيَّة زُرَاعِيَّة Bâtiments ruraux.

Constructions rurales (F). Rural buildings (E).

الابنية الزراعية عديدة الاشكال والاقسام ، مختلفة الاهداف منها البيوت والمساكن والخازن والاصطبلات والمرح والزرائب والمصارى والاهراء والمطامير || ولكل من اقسام هذه الابنية قواعد اساسية وشروط فنية لا بد من التقيد بموجباتها للوصول الى اقرب درجات الكمال الصحي والاقتصادي .

١٣٤- إِبْنَهَام Pouce (F). Thumb (E).

اول اصابع اليد واكبرها . ج اباهم واباهم

١٣٥- أَبْهَر Aorte (F). Aorta (E).

شريان كبير يخرج من بطين القلب الايسر ويحمل الدم النقي المعروف بالشرياني ، اي المؤكسد ، لتوزيعه على فروع التي تتخلل جميع اجزاء الجسم || ومنهم من دعاه وريد العنق والمصريون يدعونه الاورطة .

١٣٦- أَبْهَل * ، أَبْهَل ، سَبِينَة ، صَبِينَة

Juniperus sabina (S). Genévrier sabine, Sabine (F). Sabin, Savin (E). Sabinbaum, Sädewacholder (D). Savina, Genepero sabina, Planta dannata (I).

الابهل والابهل نوع من العرعر . شجرته صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقها حرشفية ، مهدبة ، متقابلة ، صلبة ، لينة ، مذبذبة ، شائكة العقصة ، عابقة الخضار . ازهارها وحيدة المسكن . ثمارها نووية الشكل ، قطرها نحو ٨ م .




أبْنُس هُنْدِي



أَبْهَل



أَبُو الْهَوَل



أبو الهول الافلس



أبو الهول العجول



أبو الوشي الجميل



أبو الوشي السلحفي

٦٠ مم. اما الانثى فطولها نحو ٤٠ مم. وبسطةها نحو ٧٤ مم. ثوبها الى الصهبة السمره. رأسها منقح بخطين ابيضين. جوشها وبطنها مجذعان بالكستني. زباناها قلاديان. عينها كبيرتان. مرشفاها معتدل التقويس والطول. روشنها الاماميان متراكبا التوقيع حيث يكثر الاحمر الخطي الموج. روشنها الخلفيان صغيران تعلوها عند القاعدة يقع كستنية، وعند الحثار الخارجي عصبه حمراء طحلاء. سرفتها كبيرة، مستغلطة، تطول نحو ٨٠ مم. لونها الى الخضار الالفس يعلوها من الرأس الى الشرج جده حمراء يكتنفها من جانبيها خطان اصفران ونقط سود تعلو جميع الترجات. قرنها الشرجي صغير القد، قليل التقويس. لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. والانثى تمتع الممكن لطفاً مستطيلة على اوراق النبات.

١٥٨ - أبو الهول المؤذّر هو صمل الياسم، اطلبه.

١٥٩ - أبو الهول المؤشّح هو صمل الحور، اطلبه.

١٦٠ - أبو الهول المؤشّي هو صمل الصنوبر، اطلبه.

١٦١ - أبو الوشي، أبو الحسن، طاووسية. Paon (F). Peacock-butterfly (E).

تعريف يطلق على بعض انواع الفراش من مختلف الفصائل التابعة الى حرشفيات الاجنحة. جميعها مؤذية، يرقاتها تعيش على اوراق النبات فتعطها.

١٦٢ - أبو الوشي الجميل، بشورة الحرشف

Vanessa cardui, Pyraemis cardui (S).

Vanesse du chardon, Va. de l'artichaut, Belle-Dame (F). Painted lady, Thistle butterfly (E). Distelfalter (D).

فراشة جميلة الالوان والزخرفة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الهند الى اوروبا وافريقية الشمالية. الفراشة جولة تجوب البلاد قوتها طلع الازهار ورحيقها. السرفة خاضلة قوتها اوراق النبات اغصنها الحرشف والخيازي. جسمها متوسط القد يطول من ١٧ الى ١٩ مم. بسطتها تراوح من ٥٣ الى ٥٧ مم. رأسها حنطي اللون. عينها كبيرتان. زباناها صولجانيان. مرشفاها دقيق الجرم. جوشها وبطنها الى الحنطي الالكلف. روشنها الاماميان الى الحنطي الاسمر يعلو تبيج وتجذيع وزركشة فيها الاسود والاحمر والبرتقالي والايض والاصهب. روشنها الخلفيان الى الحنطي يعلو تمشيع وتبيج اكلف وصفان من النقط السود تشغلها رقشة كستنية. لها ثلاثة اجيال في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في اذار. وفراشة الجيل الثاني في آب. وفراشة الجيل الثالث في تشرين الثاني. السرفة معتدلة الشخانة تطول من ٣٠ الى ٤٠ مم. ثوبها الى الحنطي الاصفر تعلو رقشة سوداء وخطان جانبيان اصفران وخط ثبجي تتخلله ثمول مهدبة شائكة برتقالية اللون.

١٦٣ - أبو الوشي السلحفي

Aglais urticae, Vanessa urticae (S). Paon petite tortue, Vanesse petite tortue (F). Small tortoiseshell (E).

فراشة صغيرة القد، جميلة الشكل مزركشة الالوان تظهر في الصيف من تموز الى ايلول. يرقاتها مخاضلة تركب بعض يقول اخصها نباتات الفصيلة القراصية. تكافح باستعمال احد الخواشير المغالة القليلة الرائحة العنصرية.

مختلفات الزباني. موطنها معظم اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالمين القديم والحديث. الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فقوتها اوراق الاشجار المشمرة والتزيينية. جسمها كبير القد. الذكر اصغر من الانثى بطول نحو ٣٠ مم. بسطته نحو ٨٠ مم. الانثى تطول نحو ٤٠ مم. وبسطةها نحو ١١٠ مم. ثوبها الى الصهبة الصنابية. زباناها دقيقان مستطيلان. عينها زميتان. مرشفاها مستطيل. روشنها الاماميان كبيرا القد مزخرفان وموشحان بالبي والوردي والبلكي. الخلفيان معتدلا القد موشحان بالاحمر تتوسطها بقعة سمره يطوقها حثار ابيض واسود. سرفتها كبيرة القد تطول نحو ٧٥ مم. لونها الى الخضار العابق يعلو تجذيع اسود. قرنها الشرجي معتدل التقويس اسود اللون. مدبها الى الطحلة السمره. لها جيل واحد في الحول. تمتع الممكن رزماً على الصفحات السفلى من نصاله الاوراق. طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٩٠ يوماً يتقضي ضمن صلبة يلفها غشاء من الملاط.

١٥٣ - أبو الهول العجول، صمل غيور

Deilephila celerio, Choerocampa celerio, Hippotion celerio (S). Sphinx empressé (F). Zealous sphynx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة مختلفات الزباني. موطنها يشمل معظم اصقاع العالم القديم. الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فتعيش على اوراق الكرمة واوراق الفصيلة الباذنجانية. جسمها كبير القد. الذكر يطول نحو ٣٠ مم. وبسطة نحو ٥٢ مم. اما طول الانثى فنحو ٣٤ مم. وبسطة نحو ٦٠ مم. ثوبها الى الصهبة الحنطية الوردية الموج. زباناها قلاديان. عينها زميتان. روشنها الاماميان كبيران. لونها الى السرة البنية تعلوها خطوط عاجية وتوشيع معترض وزرا كش متباينة الزخرفة. روشنها الخلفيان صغيران. لونها الى البياض الاغبر تعترضه اعصاب سود ويطوقه اطار اسود يكتنفه من الخارج حثار اغبر. سرفتها كبيرة، هسيمة، تطول من ٧٠ الى ٨٠ مم. ثوبها الى الخضار الحنطي الموج. وتحمل على جانبي ترجاتها البطنية، من السكة الثانية الى الثامنة بقعاً صغيرة بيض وسود. قرنها الشرجي محدب، اسمر اللون. لها جيلان في الحول. فراشة الجيل الاول تظهر في اواسط الربيع وفراشة الجيل الثاني تظهر في ايلول. والانثى تمتع الممكن رزماً اسطوانية الشكل على اوراق النبات.

١٥٤ - أبو الهول المُبضع هو صمل الزيزفون، اطلبه.

١٥٥ - أبو الهول المُبَقَّع هو صمل الدنلى، اطلبه.

١٥٦ - أبو الهول المُخَطَّط هو صمل اليتوع، اطلبه.

١٥٧ - أبو الهول المُرَقَّع، صمل الكرمة المُخَطَّط، دلفيلية

Deilephila livornica, Celerio lineata (S).

Deiléphile de la Vigne, Sphinx commun de la Vigne (F). White-lined sphynx (E).

فراشة من فصيلة الهوليات ورتبة حرشفيات الاجنحة مختلفات الزباني. موطنها اقاليم الكرمة في العالم القديم. الفراشة تعيش على رحيق الازهار اما السرفة فقوتها اوراق النبات ومنها الكرمة. جسمها كبير القد. الانثى اكبر قدماً من الذكر الذي يطول نحو ٣٢ مم. وبسطة نحو

منبته البرازيل . جذوره وتدية غليظة . ساقه عارشة تطول من ٣ الى ٥ أمتار . أوراقه متعاقبة معنقة كثيرة التفصيص والتشريح تطول وتعرض نحو ١٢ سم . نصلها باهت الخضار مرقط بالابيض . ازهاره عطرية العرف خضراء اللون . ثماره ارجوانية ، صغيرة القدرها قدر بيض المصفر لبابها جامد المادة سكري المذاق .

١٧٠ - أبو براقيش* ، دغناش مبدول

Pyrrhula vulgaris (S). *Bouvreuil commun* (F). *Common Bullfinch* (E).

طائر من الجواثم المخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . جسمه صغير القدر طوله نحو ١٦ سم . وهو اسود الرأس والجناحين والذنب . اطلح الظهر . ابيض الخواشي والبطن والزمكي . احمر المنقار والصدر وسائر الجسم . ريشه شديد الموج || قال فيه الشاعر : « كأني براقش كل لون لونه يتخيل » ، وهو من طيور لبنان الأبدية يألف الاحراج والادغال الجبلية . يرغب في الاشجار الدائحة الباسقة || قوته التعل والديدان والاساريع والحبوب على اختلافها || يدن في الاشجار . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٥ يوماً . بيضها مستدير . لونه الى الاخضر الموشى بالاسمر .

١٧١ - أبو بريص* ، *Gecko* (E). *Gecko* (F). *Tarentes* (F). هو الثعبان وسام ابرص . دويبة صغيرة من فصيلة الوزغيات . تعتبر من الدويبات النافعة لانها تلتهم الحوام وبعض الحشرات .

١٧٢ - أبو بشير* ، *Polypterus bechir* (S). *Polyptère Béchir* (F). *Polypterus Bichir* (E).

سمك نهري كبير الجثة مستطيلها من فصيلة الشنبيات ، يكثر في النيل وفي معظم الانهر الافريقية . ثوبه الى الخضار الاسمر . زعانفه الظهرية متتابعة كاسنان المنشار . يعيش في سحل الانهر ويسبح كالانقليس .

١٧٣ - أبو بصك* ، *Daurade rose* (F).

سمكة بحرية تدعى ربالك يرده ، اطلبها

١٧٤ - أبو بلسيق* هو الابلق ، اطلبه .

١٧٥ - أبو بوز* هو القنومة الخطاء ، اطلبها .

١٧٦ - أبو بيض* ، *Paspalum geminatum* (S). *Paspale* (F). *Millet grass* (E). *Pfannenhirse* (D). *Paspalo* (I).

نبات عشبي بري حولي كثير الاشطاء والدرنات البيضية ينتمي الى فصيلة النجيليات . منبته الاقاليم الحارة والمعتدلة . سوقه فرعاء دقيقة وقصيرة . أوراقه عصفية الشكل ، حاضرة ومستطيلة . ازهاره سنبل التجميع يتألف من ثلاث او خمس سبيلات ترتكز على زناد تخيل . يكثر بين الزروع وفي الارض البور . وهو من الاعشاب العلفية التي ترغب فيها الماشية || كان يستعمل قديماً لقطع السعال المزمن ولعلاج اوجاع الصدر والكبد . ومنهم من قال انه يزِيل الاستسقاء ووجع الرحم .

١٧٧ - أبو تمرّة* هو التير ، اطلبه .

١٦٤ - أبو الوشي الصغير* ، *Eudia payonia*.

Saturnia pavonia (S). *Petit paon de nuit* (F).

Small Silkworm moth (E). *Saturnia pavonia* (D).

فراشة ليلية خيلة الالوان المزركشة يكثر وجودها من اذار الى حزيران || يرقاتها خاضلة تركب اوراق الخوخ وبعض النباتات الزينية || تكافح باستعمال احد الحواشير الفعالة نفساً على الوراق .

١٦٥ - أبو الوشي الغيلمي* ، *Vanessa polychloros*.

Aglais polychloros (S). *Vanesse grande tortue*, *V. polychrome*, *Paon grande tortue* (F).

Nymphalis polychloros (E). *Grosser Fuchs* (D).

فراشة ليلية كبيرة القدر متعددة الالوان المتراكبة المدججة والمزركشة يغلّب فيها البرتقالي . يكثر وجودها من تموز الى ايلول || يرقاتها خاضلة تركب اوراق التفاح والكرز والمخلص والدردار... || تكافح باستعمال احد الحواشير الشديدة الوقع اخصها الزرنبيخات .

١٦٦ - أبو الوشي الليلي* ، *Saturnia pyri* (S).

Grand paon de nuit (F).

Giant Silkworm moth, *Emperor-moth* (E).

Grosser Wiener, *Nachtpfannauge* (D).

فراشة ليلية كبيرة القدر رواشنها كثيفة الزغب . لونها الى الجذرة تعلوها زراكنش مختلفة وبقع مستديرة يكثر وجودها من نيسان الى حزيران || يرقاتها خاضلة تركب اوراق الاشجار المثمرة اخصها الاجاص . طولها نحو ١٥ سم . ثوبها الى الخضار الزاهي ، تحمل عند كل مفصل من مفاصلها ثعول صغيرة زرقاء اللون تعلوها حلب طويل دقيق || صلجتها كبيرة وغليظة طولها يراوح من ٦ الى ٨ سم . تكافح بالتقاط اليرقات والصلجات .

١٦٧ - أبو الوشي النهاري* ، *Vanessa io* (S).

Petit paon du jour (F).

فراشة صغيرة الحجم متعددة الالوان المزركشة الجميلة تكثر من تموز الى ايلول || يرقاتها خاضلة تركب البقول والقنب وغيرها || تكافح باستعمال احد الحواشير المرتكزة على الروتينون .

١٦٨ - أبو البسر* ، *Sébér* المتوسط

Glareola pratincola (S). *Glareole pratincole*, *Pouffe des sables*, *Pardrix de mer*, *Hirondelle des marais* (F). *Pratincole* (E).

نوع من السبر سريع الطيران كالحطاف . صغير الجثة طوله نحو ٢٥ سم . مستطيل السقط والذنب . ثوبه متداخل الالوان ، رأسه وظهره وسقطاه وذنبه الى الصهباء الطحلاء . زوره اغبر يحوقه طوق من الريش الامفر . صدره وبطنه وزمكاه الى البياض || وهو من القواطع سر به يراوح من ٥ الى ١٠ أزواج يألف الشواطى البحرية وضفاف الانهر ومصباتها || قوته الحشرات على اختلاف انواعها من الاسروع والبرقة الى الفراشة والجراة . يلتهم قوته من العصر الى الغروب || يدن عشه في شمخايف الصخور بعيداً عن الاشجار قريباً من الماء . انشاء تضع اربع بيضات مستديرة الشكل غبراء اللون موشمة بالازرق والاسود تحضنها وحدها .

١٦٩ - أبو بوز* ، *Abobra* (S). *Abobra* (F).

نبات معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرعيات .



أبو الوشي الصغير



أبو الوشي النيلمي



أبو الوشي الليلي



أبو الوشي النهاري



أبو البسر



أبو براقش



أبو بشير



أبو بيض

أوراقها متعاقبة ، معنقة ، قلبية ، شرافية ، سنائية الزام
الاخير . أزهارها صغيرة جميلة ، احادية ، ابطية ، طويلة
الزناد ، خاسية البتلات ، شقراء اللون . بزورها صغيرة
خلية متحدة القاعدة || تتكاثر بالبذر ، ترغب في
الآتربة الدبالية الغنية بالمواد العضوية . تنحني الرطوبة
المستحكمة والمواقع الشبالية .



أبوته

١٨٣- أبو جِرَاب هو البجع ، اطلبه .

١٨٤- أبو جرادة

قال الدميري إنه الطائر الذي يسميه اهل العراق الباذنجان
ويسميه اهل الشام البصير . يؤخذ لحمه فيذوب ويتمسح
به من كانت البراسير فيه ظاهرة فينفعه نفعاً ينياً .



أبو قتلون

١٨٥- أبو جِرْيُون Chrysaora (S).

Chrysaora (F). Chrysaora (E).

جنس مدوس من قرصيات البحر . انواعه المعروفة نحو ٢٠
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة اخصها البحر
الايض المتوسط والمحيط الاطلسي . تألف المناطق
اليمة || تتميز بكبر القد وبكونها جميعها خشوية الشق .



أبو قتلون ابن سين

١٨٦- أبو جَعْرَان هو الجدل المقدس ، اطلبه .

١٨٧- أبو جَلَم هو العجهوم ، اطلبه .

١٨٨- أبو جَهْل هو النمر ، اطلبه .

١٨٩- أبو حَدَاد هو الخلع الشجري ، اطلبه .

١٩٠- أبو حَدِيج هو اللوسرج ، اطلبه .

١٩١- أبو حِرَاب هو أرخ الصحراء ، اطلبه .

١٩٢- أبو حَرْبَة Monacanth (F).

هو التنطاح من الاسماك البحرية ، اطلبه

١٩٣- أبو حَلَسَا هو إثنان أبو ساق ، اطلبه .

١٩٤- أبو حَشَش هو حارس الحبشة ، اطلبه .

١٩٥- أبو خَدَّاش هو النور ، اطلبه .

١٩٦- أبو خَطَّاف هو النمر ، اطلبه .

١٩٧- أبو خَنْجَر هو الكبوسين الكبير ، اطلبه .

١٩٨- أبو دُخْنَة هو الدخناء ، اطلبها .

١٩٩- أبو دَرَقَة* ، آذان الفيل Caladium

esculentum (S). Caladium, Pédiveau (F).
Indian kale, Elephant's ear (E). Beentwurz,
Kohl-pinte (D). Caladione (I).

نبات عشقولي معمر من فصيلة الفلقاسيات . اعطائه
البلاد الاسيوية الحارة الرطبة . سقوه ارضية عشقولية .
اوراقه قرصية التجميع ، كبيرة النصل القلبي الشكل
تقوم على محالين مستطيلة . لوئها الى الخضار الزيتي يحرقها
اطار احمر يتصل بالصلع والمروق فتبدو كالسرنج المتقاطع
الخطوط الزاهية || يزرع للزينة ضمن البيوت او في بعض
المواقع الخاصة خوفاً من البرد || يرغب في الآتربة الملائمة
التركيب العنصري الغنية بالمواد العضوية والأزوت || أما

١٧٨- أبوته* Abuta refescens (S).

Abuta, Liane amère (F). White pareira brava (E).
Abuta- wurzel (D). Abuta, Liana amara (I).

نبات مداد من فصيلة القمريات ، منبته بلاد الهند
الصينية وكوبا وهايتي . ساقه ليفية مدادة عارشة ، اوراقه
توبجية ، معنقة ، رحيمة النصل ، مصقولة النسيج .
عصارتها قابضة لاذعة . أزهاره ثنائية التجميع ثلاثية
البتلات المستديرة ، ثماره لوزية . أما دقيقها وما يحويه
من مواد دهنية فيفيد في تمدد الكبد ويستعمل لادرار البول .

١٧٩- أبو قِتلُون* ، شَجَرَة الوالك

Abutilon, Sida (S). Abutilon (F). Yellow mallow,
Indian mallow (E). Schonmalve, Schmuckmalve,
Samtmalve (D). Abutilone, Abutilo (I).

جنبه خشوشة الساق ، ليفية اللحاء من سبط السيداسيات
وفصيلة الخبازيات || ضرورها عديدة منتشرة في جميع
الاصقاع الحارة والمعتدلة . منها برية ومنها صناعية ومنها
للزينة || اوراقها كاملة ، مفترسة ، متعاقبة ، معنقة ،
قلبية الشكل . أزهارها ابطية ، احادية ، رأسية السات ،
متحدة الاقلام . غريقات المبيض خاسية البتلات .
ثمارها دولاية النظام عند النضج ، متحدة من قاعدتها او
منفصلة من الفقار || منافعها : اوراقها لعابية لزجة
تستعمل كلبنة . بزورها مقبلة للطعام ومدة للبول . أما
سوقها والياب قشورها فتصلح للغزل والنسيج .

١٨٠- أبو قِتلُون ابن سين* ، شَرَك العنم ،

جُوت منشوريا Abutilon Avicennae (S).

Abutilon ordinaire, Guimauve fausse, Jute de
Mandchourie (F). American jute, Am. velvet leaf,
Lantern flower, Manchurian jute (E). Sommer-
schonmalve, Bastardeibisch (D). Abutilo ordinario,
Malva gialla tessile, Cencio tessile (I).

جنبه حولية ليفية الساق واللحاء من سبط السيداسيات
وفصيلة الخبازيات . تزرع في بعض اصقاع منشوريا
وامريكا لاستخراج الياقها المستعملة في صناعة الخبال وفي
حياكة بعض الانسجة الوطنية الريفية || اوراقها متعاقبة ،
معنقة ، قلبية الشكل . أزهارها فردية ابطية الارتكاز
صفراء اللون || تستعمل ايضاً للزينة ، تزرع في الحدائق
تتكاثر بالبذر .

١٨١- أبو قِتلُون أسْرَح* ، حَب السُنْبُل ، قَرْقَدَان

Abutilon muticum (S). Guimauve jaune (F).
Indian mallow (E). Cencio molle (I).

جنبه حولية ليفية من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات
تزرع للزينة . منبتها المعروف بلاد الهند || اوراقها
متعاقبة ، معنقة ، قلبية القاعدة ، شرافية ، مدبة المقصبة .
أزهارها احادية ، ابطسية وهامية ، قصيرة الزناد ، خاسية
البتلات ، صفراء اللون || بزورها صغيرة عفائية ،
منفصلة من الفقار ، معلقة بعصها || تتكاثر بالبذر
وتجود في جميع الآتربة القليلة والمتوسطة الاندماج .

١٨٢- أبو قِتلُون نجمي* ، خِطْمِي هندي

Abutilon fruticosum (S). Althée, Althaea (F).
Twelve o'clock flower, Velvet leaved (E). Flore
di dodici ore, Malva Indiana (I).

جنبه حولية ليفية خلية الهيئة والملمس ، غبراء اللون ،
منتصبه الفروع من سبط السيداسيات وفصيلة الخبازيات .
تزرع للزينة . منبتها الاصلي بلاد الهند وجزرها .



أبو قتلون أسرح



أبو قتلون نجمي



أبو درقة

٢٠٨ - أبوز
Sauteur (F). Leaper (E).
الأبوز والأباز هو القفاز من كل حيوان .

٢٠٩ - أبو زريق* ، زرياب البلوط
Garrulus glandarius (S). Geai glandivore,
G. vulgaire (F). Common Jay (E). Eichelhäher (D).
طائر من الزرياب وفصيلة الغرابيات . يعتبر من الطيور
المؤذية الضارة . يألف القفص ويتقبل العلم فيقتبس
الاصوات ويردها || وهو بقدر الباعة أصداً اللون ،
اسود الذنب ، مجذع الجناحين بزرقه وخضار وسواد
ويبيض || قوته البلوط والحبوب والتفاح والثمار البانعة
وجميع انواع العصافير الصغيرة وفراخها ويبيضها والفأر
والعطاء والحشرات || يدقن في الاشجار الصغيرة على
ارتفاع بضعة اقدام . انشاه تبيض وتحفن وحدها من ه
الى ٧ بيضات .

٢١٠ - أبو زلاف
هو الثيتل ، اطلبه .

٢١١ - أبو زماره
هي زيارة البحر الابرية ، اطلبها .

٢١٢ - أبو زهرا
هو ابن آوى ، اطلبه .

٢١٣ - أبو زيدان ، أنخونوم
Anchonium (S). Anchonium (F). Anconio (I).
نبات عشبي نجسي بري جردى معمر من فصيلة الصليبيات .
مهده بلاد الشرق الادنى . يقال انه من النباتات الطيبة
التي يتداوى بها والتي تقوي المعدة والامعاء || وهو من
نباتات جرود لبنان الطويلة ، يوجد من ارتفاع ١٥٠٠
الى ٢٥٠٠ م . نجسته كوكبية فرعاء . اوراقها جذرية
الانتشاب مستطيلة الشكل ، مستدقة العقصة . نصلها
خلى البشرة ، مسنن الحافة . ازهارها حرشفية الكاس ،
ارجوانية البتلات . سفاتها اسطوانية منتصبة مستدقة الطرف
زباء الملمس . بزورها ضخمة ثنائية التجميع السنني .

٢١٤ - أبو ساق

هو الطول طائر مائي من القواطع ، اطلبه .

٢١٥ - أبو سبال
Panure (F).
هو المسبال ، اطلبه

٢١٦ - أبو سعن* ، أرغل ، مريو

Leptoptilus (S). Marabout, Cigogne à sac, Argala,
Adjutant (F). Marabou, Adjutant (E).

نوع من طير اللقاتل . سمي ابا سعن لغدة في عنقه تشبه
السمن . وهو من الطيور القبيحة المنظر ، الكبيرة الجثة
التي تعيش في البلاد الحارة وقد تكثر في بعض المناطق الهندية
حيث يجلونها ويحرمون قتلها لانها تلتهم جميع اقدار المدن .

٢١٧ - أبو سعيد
هو اللقلق الاسود ، اطلبه .

٢١٨ - أبو سفاقة
هو ابو مركوب ، اطلبه .

٢١٩ - أبو سلام* ، عيشريق
Circaea lutetiana (S). Circeé, Herbe aux sorciers (F). Enchanter's
nightshade (E). Grosses hexenkraut (D). Circea,
Erba maga, E. da incanti (I).

نبات عشبي حرجي معمر من فصيلة الاخدريات . ينبت
في بعض المناطق الباردة والمعتدلة . يوجد منه في احراج
القموعة من اعمال لبنان الشمالي || ساقه فردية تنتهي

في بلاده الحارة الرطبة وفي الاقاليم التي تماثلها فيزرع
للاكل كالبطاطا . عساقله كبيرة القد وزنها يراوح من
٢٠٠ الى ١٠٠٠ غ .

٢٠٠ - أبو دقن*
Caryopteris Incana (S).
Caryoptère (F). Blue beard (E). Bartblume (D).
Cariopteride (I).

جنتية سبروتية معمرة من فصيلة رعي الحمام . اوراقها
متقابلة ، معتقة ، افقية الارتكاز . نصلها اهليلجي
الصفحة المخزوزة || ازهارها نوري التجميع ، صاجي
الشكل ، ابطي وهامي الارتكاز . ازهارها صغيرة القد ،
ليلكية اللون لا عرف لها || تزرع للتزيين . تتكاثر
بالبذر وتجود في جميع الانربة القليلة والمتوسطة الاندماج .

٢٠١ - أبو دينار* ، مريق فينيقي

Murex trunculus (S). Murex épineux (F).
Spikly Murex (E).

نوع من المريق . حيوان بحري من الرخويات معديات
الارجل . صدفه معتدلة الحجم او صغيرة ، مستطيلة
الانبوب ، كثيرة التزيدات الشوكية الشكل الذرية
الاطراف || يكثر وجوده في المياه اللبنانية الممتدة من
رأس الناقورة الى انفه ومجادج تربل || كانوا يستخرجون
منه الارجوان في عهد الفينيقيين .

٢٠٢ - أبو دقن
هو خنزير الارض ، اطلبه .

٢٠٣ - أبو رقاش
هو النسر ، اطلبه .

٢٠٤ - أبو ركة* ، أبيد ، أبيد
Panicum
colomum (S). Blé du Dekkan (F). Dekkan grass,
Corn panic-grass (E). Dekkan grass (D).
Panico porporino, P. stellino (I).

نبات زراعي ، عشبي ، حولي ، عديم الاشطاء ، من
الفصيلة النجيلية . منته الاقاليم الحارة . كثير الشبه
بالدخن || ساقه قصية ليفية ، منكفة عند العقدة
الاولى ولذا سمي بابي ركة . اوراقه عصفية ، رحيمة ،
طويلة ، حاضنة ، متوالية كعصف الذرة . ازهاره سنابل
هامية فرقة . حبة قلبي الشكل مستطيل ، مغلف ، احمر
اللون يعلوه بعض الصفار . يستعمل في تحضير بعض المأكول
الوطنية الهندية والسودانية . ويستعمل ايضاً كمكاف الحضر
لبعض اجناس الماشية || يتكاثر بالبذر ويزرع عديداً
كالدخن في الانربة المتوسطة الاندماج

٢٠٥ - أبو رمح
Poisson-pique (F).

سمكة بحرية مشهورة باسم خدابة ، اطلبها

٢٠٦ - أبو رياح
هو اليؤثر ، اطلبه .

٢٠٧ - أبو ريش
Hedydipna (S).
Hédydipne (F). Hedydipna (E).

أبو ريش هو الاسم العربي الشائع في السودان والنوبة .
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير
وفصيلة المغثريات . موطنه يمتد من السودان الى الحبشة .
قوته رحيق الازهار والحوام والذباب || الذكر اجل
خضاباً من الانثى ، طوله نحو ١٧ سم . ثوبه الى الخضار
الاسفنج يعلوه موج ازرق وبنفسجي . بطنه جميل الصفار
الكبري . يتميز باستطالة الذنب .



أبو دقن




أبو دينار



أبو ركة



أبو زريق



أبو سعن



أبو سلام



أبو سوم




أبو صنيعة



أبو صندوق



أبو صندوق أخطم



أبو طيط

الفكوك . انواعه المعروفة ٣٥ موطنها البحار الحارة . جميعها متوسطة او صغيرة القد طولها يراوح من ٢٠ الى ٥٠ سم . اجسامها مضلعة الزوايا ، ذاتة الحسك ، عظمية السهف الذي ينطقها يدرع صلب تخرج منه الزعانف || اشهر انواعه :
أبو صندوق المقرن *Ostracion quadricornus*
موطنه المحيط الهندي والبحر الاحمر .

أبو صندوق طويل القرن *Ostracion nasus*
موطنه البحر المتوسط .

٢٣٦ - أبو صندوق أخطم* ، نجم أخطم

Ostracion nasus (S). *Ostracion cornu*, *Coffre cornu* (F). *Coffre-fish* (E).

نوع من ابي صندوق . سمكة بحرية بيوض . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من اسماك الاغواط . قوتها النباتات البحرية || جسمها بيضي الشوزن ، يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . وهو مضلع الزوايا ، ناق الحسك ، عظمي السهف الذي ينطق الجسم بدرع جامد صلب تخرج منه الزعانف والقليل من الذنب . وتعلوه اطراف وتنتوء متباينة الاشكال تمتد من الرأس الى اطراف الظهر || ثوبها الى الخضار البحري الباهت تعلوه ماجة رداء وخطوط شديدة السمرة القائمة . بطنها الى الرعدة الغبراء . اطرافها وزعانفها الى الرعدة السمرام || لحمها رديء الصنف ، لا يؤكل .

٢٣٧ - أبو صنصون هو الضبرك ، اطلبه .

٢٣٨ - أبو صوي هو صرارة المتوسط ، اطلبها .

٢٣٩ - أبو ضبة هو الدراج ، اطلبه .

٢٤٠ - أبو طبق

هو الطبق جنس اسماك بحرية من السحليات .

٢٤١ - أبو طيط* ، طيط ، زقراق شامي

Vanellus (S). *Vanneau* (F). *Lapwing* (E).

نوع من الزقراق ثوبه الى السواد اللامع تعلوه زرقة وخضرة . صدره وباطن جناحيه بيض . رؤوس قواده ومناكبه الى الشقرة الصنابية . ذنبه اشحف اللون || وهو من القواطع التي تجوب الشرق واروبه وافريقية . يألف المناقع وصفاف الانهر . يدن في افحوص يفرشه بالحشائش الناعمة . انشاء تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها .

٢٤٢ - أبو طيط متوج ، طيط متوج ،

أبو فيق ، طرطيس ، زقراق شامي .

Vanellus vanellus, *V. cristatus* (S).

Vanneau huppé (F). *Green Plover* (E).

طائر من الزقراق ورتبة طوال الساق . وهو من القواطع التي تجوب الشرق واروبه وافريقية الشمالية والشرقية حتى خط الاستواء || جسمه رشيق القوام . طوله نحو ٣٤ سم . وبسطه نحو ٤٥ سم . ثوبه العلوي الى السواد اللامع تعلوه زرقة وخضرة ومواج اسفع . قة رأسه وقزعتة وجدة زوره واعلى صدره الى السواد اللامع ، اما القسم الآخر من صدره مع بطنه وخوافيه فالى البياض العاجي . علاطا عنقه الى الغبرة . محسره الى البياض الاكدر يعلوه خط اسود ترتكز عليه العين . جناحه قضايف يلحظ الذنب .

بالعنقود الزهري . اوراقه معنقة متقابلة ، صغيرة الاذينات قلبية النصل المسن || ازهاره خشوية صغيرة ، رباعية البتلات ، عسلية اللون مندحمة . انبوبة الكاس لاصقة بالمبيض || كانوا يستعملونه في الرقية وفي الطلاسم والسحر .

٢٢٢ - أبو سُولَع هو أرخ الجزيرة ، اطلبه .

٢٢١ - أبو سوم* *Metachirus opossum* (S).

Opossum, *Sarigue opossum* (F). *Sarigue*, *Opossum* (E). *Beutelratte* (D).

نوع من السريغ من فصيلة الجرذان الجراية ، صغير القد ، رمادي اللون ، قصير الوبر ، طويل الذنب الاملط الاخاذ . اعطاه بلاد امريكا الوسطى واخصها المناطق الحارة .

٢٢٢ - أبو سيراس

قال القزويني في الاشكال انه حيوان يوجد في الفياض تكامل في قصبة انفه اثنتا عشرة ثقبه اذا تنفس يسمع من انفه صوت كصوت المزمار . والحيوانات تجتمع عليه لاستماع ذلك الصوت فاذا ادهش بعضها لذلك ، يصيده فيأكله فان لم يتهيا له صيد شيء منها وضجر صاح صيحة هائلة فتتفرق الحيوانات وتفر عنه .

٢٢٣ - أبو سيف هو سيف البحر المعروف ، اطلبه .

٢٢٤ - أبو شام هو بلسم مكة ، اطلبه .

٢٢٥ - أبو شيعاع *Polynème* (F).

سمكة بحرية من شائكات الزعانف تدعى بلنومة ، اطلبها .

٢٢٦ - أبو شلبه هو البجع ، اطلبه .

٢٢٧ - أبو شمشاخ هو السنور ، اطلبه .

٢٢٨ - أبو شكتب هو الهجرس الأسبل ، اطلبه .

٢٢٩ - أبو شوكة

هو الزمر سمكة نهريّة صغيرة ، اطلبه .

٢٣٠ - أبو صبيزة* *Tityra* (S). *Bécarde* (F).

طائر من الجواثم المشرويات المناقير وهو احمر البطن ، اسود الظهر والرأس والذنب ، قوي المنقار والمخالب . قوته الحشرات على اختلاف انواعها ولا يعف عن بعض الثمار اليابسة || يألف الإحراج والغابات . يدن في اعالي الاشجار الباسقة . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

٢٢١ - أبو صفن *Gazelle à bourse* (F).

نوع من الغزلان يدعى نزاق ، اطلبه .

٢٢٢ - أبو صفيتر هو النارج ، اطلبه .

٢٢٣ - أبو صلاح هو السرعة ، اطلبها .

٢٢٤ - أبو صمصام

Falcirostre à bec en sabre (F).

طائر يدعى قضاب أحجن المنقاد ، اطلبه .

٢٣٥ - أبو صندوق* ، نجم

Ostracion (S). *Coffre* (F). *Coffre fish* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة النجميات ورتبة ملحومات

Faux nerprun (F). Sea buck thorn, Sallowthorn, Willow thorn (E). Echter sanddorn, Weidendorn, Haftdorn (D). Gorra, Olivella, O. spinosa (I).

جنية برية معمرة شائكة من فصيلة الخلافيات تكثر في الأودية والمواقع الظليلة وعلى ضفاف الأنهار والشواطئ الرملية الرطبة || أوراقها ضيقة مستطيلة ، نصلها وحيد الضلع ، خملية البشرة ، فضي اللون . أشواكها خشبية حادة . أزهارها فردية محورية الارتكاز . ثمارها نووية الشكل ، عنبية القد ، برتقالية اللون ، وحيدة البذرة الصغيرة الصلبة . لبها حامض الطعم ، شديد الحموضة . ثمارها اللينة غنية بالفيتامين «آ» و «ث» . وبمسا أن حوضها الزائدة تحول دون أكلها المباشر لذلك يحسن استعمال ربه المطبوخ بالسكر || الكيلو من الثمر يعطي من ٧٠٠ إلى ٧٥٠ غم . عصير . والكيلو من العصير يلزمه ٤٠٠ غم . سكر ثم يغلى على النار من ١٠ إلى ١٢ دقيقة .

٢٥٦ - أبو قحنت Avocette (F). Avocet (E).
طائر مشهور باسم نكبات ، اطلبه .

٢٥٧ - أبو قروة Châtaigne (F). Chestnut (E).
ثمرة الكستنة وهي من الثمار الغنية بالمواد الغذائية . راجع كستنة .

٢٥٨ - أبو قروة* ، مرغى Casarca ferruginea (S). Casarca, Cassart (F). Ruddy shelduck (E).
طائر من البط ينتمي الى جنس الذهبيل ، رأسه وجوشه احمران . عنقه مطوق باطار اسود . قوائمه بيض . ظهره وبطنه وسائر ريشه الى الرمادي الاسمر الاسفع الموج . وهو من طيور الماء القواطع التي لا تقيم في لبنان أكثر من بضعة ايام .

٢٥٩ - أبو قصادة هي ذرة الغنم ، اطلبها .

٢٦٠ - أبو قنابس هو إثنان الفلي ، اطلبه .

٢٦١ - أبو قربة هو البجع ، اطلبه .

٢٦٢ - أبو قردان هو ابن الماء العادي ، اطلبه .

٢٦٣ - أبو قرص

هو الطبق سمكة بحرية من السحليات ، اطلبه .

٢٦٤ - أبو قرن* Naseus (S). Nason, Nason licornet (F). Unicorn fish (E).

جنس سمك بحري من شائكات الزعانف يتميز بقرنه العظمي القائم في مقدم الرأس وبشكله الاهليلجي المفلطح وبزعانفه الظهرية والبطنية المتتابعة . ظهره رصاصي اللون ، بطنه الى الرمادي الاغبر || انواعه المعروفة خمسة فوارقها اشكال فرونها وحجم جنسها . يكثر وجودها في بحار البلاد الحارة .

٢٦٥ - أبو قرن ، تمليكة Gynandropsis pentaphylla (S). Brède Caya, Gynandropsis (F). Bastard mustard, Sambo (E). Senfkapper, Kleome (D). Bretta, Cleome (I).

نبات عشبي بقلي زراعي من فصيلة الكبريات . مهدد جزر الارخبيل والانتيل وموريس . وهو يستعمل في تلك البلاد للاكل بمثابة الاسبانخ || أوراقه مركبة ، خماسية الفصوص . نصلها غليظ الضلع ، قليل العروق ، غزير العصارة والمادة الخضراء || أزهاره عنقودية التجميع ، منتصب ، قلبية ، دقيقة البتلات الغبراء اللون || بزوره

كرسوع منكبه مجهز بمنخس قرني المادة مدبب الطرف . ذنبه قصير الجرم ، ابيض النصف الاول ، اسود النصف الثاني ، حنطي الافنيك . عينه مكحلة ، كستنية اللون . منقاده اسود ، ساقاه رقيعتان جؤوبتا اللون || الانثى اصغر قدماً من الذكر وابنت ثوباً منه . يالف المناقع وضفاف الأنهر والغدران . قوته الحشرات والديدان والبراغ والرخويات والفشريات || يذبح افحوصه بين الاعشاب في حفرة يفرشها بالحشائش الناعمة . الانثى تحضن من ٣ الى ٤ بيضات اجاصية الشكل . الترخيم يستمر من ٢٤ الى ٢٧ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر في اثناء الليل || يعتبر من الطيور النافعة .

٢٤٣ - أبو ظفر هو التورم المصري ، اطلبه .

٢٤٤ - أبو عدس ، أبو عكص ، أبو عكش ، أبو عكش هو المهة ، اطلبها .

٢٤٥ - أبو عرف الاسود هو الملب الاسود ، اطلبه .

٢٤٦ - أبو عرف الاغبر هو الملب الاغبر ، اطلبه .

٢٤٧ - أبو عحي هو السبد الشائع ، اطلبه .

٢٤٨ - أبو عريف هو لث عفري ، اطلبه .

٢٤٩ - أبو عيزار هو البلشون الجبار ، اطلبه .

٢٥٠ - أبو عين هو الحسرم ، اطلبه .

٢٥١ - أبو عيون* Bucephalus capensis (S). Bucephala (F).

حية من الحفاث وفصيلة الثعبانيات . موطنها البلاد الافريقية . تكثر في الجنوب قرب مجاري الماء . وهي مستطيلة الجسم ، غليظة الرأس ، بارزة العينين ، مستدقة الذنب .

٢٥٢ - أبو غزوان هو السنور .

٢٥٣ - أبو غلام* Spargularia (S).

Spargule, Spargulaire (F). Sand spurrey (E). Spärkling (D). Spargularia (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من الفصيلة القرنفلية . تنبت في جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة . تكثر في مرتفعات لبنان والعلايين || انواعه عديدة . سوقه عشبية ، منتصبية متشعبة . أوراقه حاضنة ، متقابلة ، لحيية ، خيطية ، مدببة . أزهاره ابطية وهامية الارتكاز ، طويلة الزناد ، خماسية البتلات الوردية اللون . والبتلات متدعة في اسفل الكأس || بزوره صغيرة ، ملساء ، كروية ، سمراء ، محاطة باطار اغبر ، يحجمها حتى زيتوني الشكل رباعي الغلق . وهذه البلور تستعمل في الطب لعلاج الحصاة .

٢٥٤ - أبو غلام الرمال* ، عشبة حمراء Spargularia rubra (S). Spargulaire rouge, Sabline rouge (F).


Sand spurry, Red sand-wort (E). Roter sandkraut, Roter spärkling (D). Spargola, Lupinaia (I).

نوع من ابي غلام وهو نبات عشبي بري معمور . سوقه حمراء وأزهاره كذلك . يعيش في الاراضي الرملية || يقال ان بذوره لا تخلو من الخواص الطبية النافعة لعلاج الحصاة .

٢٥٥ - أبو فليس* ، شوك القصار Hippophae rhamnoides (S). Hippophae, Argousier, Griset,




أبو عيون



أبو غلام




أبو غلام الرمال




أبو فليس



أبو قروة



أبو قرن




أبو قلنسة



أبو لوي



أبو ليد



أبو ميخجن



أبو مخيط



أبو مركوب



أبو مسكية

٢٧٦ - أبو مالك Souchet commun (F).

طائر من البط الوحشي يدعى كبش ، اطلبه .

٢٧٧ - أبو مريخجن Ibdorhynchus (S).

Ibdorhynque (F). Ibdorhynchus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق ونضيلة دجاجيات الارض . موطنه سفوح جبال حلايا || يألف ضفاف المنافع ومجاري الماء . ملجئه الحياتي جماعي . فريجه يعد من ١٠ الى ٣٠ زوجاً . قوته الحشرات والدوريات اخصها المائية || جسده معتدل القد ، يطول نحو ٢٦ سم . منقاده احجن مستطيل . جناحاه لاحقان . ذنبه مخروطي قصير . ساقاه مستطيلتان . ثوبه الى الكهبة الرصاصية . قمة رأسه ونحره ومنقاده سود . بطنه اخضر اللون تعرضه جدة سوداء في مؤخر الصدر || يدشن عشه في افحوص يحتفوه بين الاعشاب المتكاثفة المتراكبة . الانثى تحضن وحدها من ٦ الى ٨ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٧٨ - أبو مخيط* ، أزيب البحر Diodon atinga (S).

Diodon épineux, Orbes épineux (F). Globe-fish (E). نوع من قنفذ البحر اي الشيم البحري ، من فصيلة الفهقيات ورتبة ملحومات الفكوك || وهو من الاسماك الشائكة غير المأكولة ، تكثر على شواطئ بحار البلاد الحارة .

٢٧٩ - أبو مديد هو الخرطون ، اطلبه .

٢٨٠ - أبو مركوب* ، أبو سقاقة

Balaeniceps rex (S). Balaeniceps roi, Bec en sabot (F). Shoebill stork (E).

طائر مائي من فصيلة البيلشونيات ورتبة طوال الساق . كبير القد ، رفيع الهامة ، بشع الشكل ، منقاره عجيب الطيبة يشبه الخذاء المنعطف الطرف || يكثر على ضفاف النيل الابيض والازرق وعلى شواطئ بحر الغزال وبحيرة فيكتوريا نيازا . قوته السمك والحيات والعطاء والجيف .

٢٨١ - أبو مريشة

هو شيخ البحر ، نوع من الفقمه ، اطلبه .

٢٨٢ - أبو مريشة

هو الشيق من الاسماك البحرية الماصة للدم ، اطلبه .

٢٨٣ - أبو مريشة مبدول

Murène commune (F).

سمكة بحرية مشهورة باسم شيق مبدول ، اطلبه .

٢٨٤ - أبو مريشة

« سمك في البحر على صورة الرجل يقال انها تظهر في الاسكندرية والبرلس ورشيد على صورة بني آدم مجلود لزجة واجساد متشاكلة لها بكاء وعويل » (القزويني) .

٢٨٥ - أبو مسكية Clarias laticeps (S).

Clarias d'Afrique (F). Clarias laticeps (E).

سمكة نهريه من نوع السلور توجد في النيل والنيجر وفي بعض الانهار الافريقية . وهي عادمة الحراشف . رأسها مخروطي الشكل ، شديد الصلابة . زعنفتها الظهرية تقطع ثلج الظهر من العنق الى الشرج || ثوبها رخامي اللون ، اطلح الموج .

٢٨٦ - أبو يسوط هو الملاعقي الوردي ، اطلبه .

مستديرة صغيرة سمراء اللون يجمعها حق عدسي الشكل رباعي الفلق || يتكاثر بالبذر ويزرع كالاسبانخ لكنه يخشى المواقع الباردة ويرغب في الاتربة الخوارة الغنية بالعناصر المعدنية .

٢٦٦ - أبو قرين هو البوقير ، اطلبه .

٢٦٧ - أبو قشش هو الخرشة المتوجة ، اطلبها .

٢٦٨ - أبو قلمون هو الزيت ، اطلبه .

٢٦٩ - أبو قلنسة* Sylvia atricapilla (S).

Fauvette à tête noire (F). Blackcap (E).

نوع من الدخلة وهو من عصافير التين المشهورة . صغير القد ، طوله نحو ١٤ سم . الذكر اسود الرأس يدعى الخوري والانثى مفراء الرأس تدعى الشمس . جوشنه الى الصهبة الزرقاء ، ظهره وجناحاه وذنبه الى الجوة الرمضاء . منقاره ورجلاه الى الصهبة الرصاصية . الانثى افنح كوناً من الذكر وبطنها يميل الى الغبار || قوته الحوام والحشرات الصغيرة والبار البائعة . يألف الجنائن والحدائق والبساتين والادغال . يدن في الشجيرات والجنابات الشائكة . اثناء تبيض مرتين في السنة . الاول في مطلع ايار والثانية في اواسط تموز . حضنتها من ٤ الى ٦ بيضات ، لونها اصهب امفر تعلوه نقط سمر مبعثرة بدون قياس || يألف القفص ويقتبس اصول التفريد .

٢٧٠ - أبو قيق Vanneau huppé (F).

طائر مشهور باسم أبو طيط متوج ، اطلبه .

٢٧١ - أبوكة ثمرة الاهوكاتية ، اطلب اءوكه .

٢٧٢ - أبوكاتية هي الاهوكاتية ، اطلبها .

٢٧٣ - أبوكة هي الاهوكاتية ، اطلبها .

٢٧٤ - أبو لوي* ، لواء Yunx torquilla (S).

Torcol, Torcou (F). Wryneck (E). Wendehals (D).

طائر من المتسلقات وفصيلة النقاريات يتميز بلوي رأسه في جميع الاتجاهات . وهو صغير القد ، قدره قدر الصرد ، طوله نحو ٢٠ سم . ادمس اللون من قة رأسه الى طرف ذنبه . منقاره ورجلاه الى الخضار الاصفر || قوته الحشرات الصغيرة اخصها النمل . اثناء تدن عشها في تقار الاشجار القديمة العهد . تضع من ٥ الى ٨ بيضات ، لونها الى البياض الاغبر ، تحضنها وحدها نحو ١٤ يوماً . وهو من الطيور القواطع النافعة الواجب حمايتها ومنهم من قال انه من اوابد لبنان .

٢٧٥ - أبو ليله* ، أوزيوس ، هلقى ، نشاس ،


بو الصالح ، بو الصلالة Osyris alba (S).

Osyris blanc, Osyride blanche, Rouvet (F).

Garde-robe, Poet's cassia (E). Welsser

harnustrauch (D). Cassia poetica, Genistrella (I).


جنية صغيرة من فصيلة الصندليات . منبها حوض البحر المتوسط . اوراقها بيضيه ، مستطيلة ، جامدة النصل . ازهارها كاملة ، خنثوية ، ثلاثية البتلات ، بيضاء اللون . ثمارها كروية الشكل . صغيرة القد قرمزية اللون . تنبت برية وتزرع للتزيين .



أبو مشط



أبو مشقة



أبو مشول




أبو مصقار



أبو منشار



أبو منقار



أبو مهاز

٢٨٧ - أبو مُشَط * Taenianotus triacanthus (S).

Ténianote (F).

سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الطريحيات ، أعطائها بعض مناطق المحيط الهندي || جسمها معتدل القد يطول نحو ٢٧ سم . رأسها متوسط الجرم ، خافت الجبهة ، مقطوم الخطم ، كبير الشدق ، ثلاثي المناخس الذرية الصغيرة . عينها كبيرتان ، متقاربتان ، متقدمتان . زعنفتها الظهرية كبيرة قاطبة مشطية الشكل ، تمتد من الرأس الى قاعدة الذيل . زعانفها الصدرية والخصوية والشرجية معتدلة الحجم ، مرقوشة الثوب . الذيلية شبه مستديرة . ثوبها الى الشبهة الزرقاء تسمر وتغيق في الظهر وفي طرف الذيل وتغبر في الجانبين وفي البطن .

٢٨٨ - أبو مشقة * Erodium gruinum (S).

Erode, Bec de grue (F). Stork's bill (E). Reiher-schnabel (D). Becco di gru, Gruina (I).

نوع من الحزاز وهو نبات عشبي بري وزرأحي من فصيلة الغرنوقيات . ساقه فرعاء مفصليّة قصيرة السلاميات . اوراقه مركبة ، زغبية ، نافرة العروق ، يجمعها زناد ليفي ازغب || ازهاره مزدوجة طويلة المعلق المنتصب ، خماسية البتلات البيضاء وبياضها يشوبه شيء من البنفسجي . ضرابه عديدة منها برية علفية ترعاها الماشية ومنها زراعية تزيينية تزرع في الحدائق والمراكن || يتكاثر بالبر والعل . يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج المعتدلة الرطوبة .

٢٨٩ - أبو مشول * Falculia palliata (S).

Falculie à mantelet (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة الطهدديات . موطنه جزيرة مدغسكر . يألف البراري والادغال التي لا تبعد كثيراً عن مجاري الماء . ملجئه الحيائي زوجي . قوته الحشرات المجنحة والديدان والدعابيص وبعض الثمار العنينة البرية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٣٦ سم . منقاده مشولي الشكل ، دقيق الطرف المدبب ، يطول نحو ٨ سم . رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى البياض الاغبر الدنس . رداؤه وجناحاه وذنبه الى السواد الفحمي . ذنبه متوسط الطول ، مقطوم الطرف || يدثن عشه في اعالي الاشجار الرفيعة . الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٩٠ - أبو مصقار * Scarus (S). Scare (F).

Parrotwrasse, Parrot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة بنات مصقار . انواعه عديدة جميعها زاهية الالوان كان لها شهرة عظيمة عند الفينيقيين والرومان . وهي من الاسماك المأكولة اللذيذة الطعم غير ان البعض يتحاشون أكلها في أشهر شباط واذار ونيسان خوفاً من رعاها السام الممكن انتقال مفعوله الى آكلها || أشهر انواعه : الحريت ودرة البحر وديك البحر والسيجان والغبان والغيتان .

٢٩١ - أبو مقصص ، ثاقب الاذن هو الهيك ، اطلبه .

٢٩٢ - أبو مقطم Calmar à griffes (F).

هو الجنداعة من الحيوانات البحرية ، اطلبها .

٢٩٣ - أبو ملعقة هو الملاعقي الابيض ، اطلبه .

٢٩٤ - أبو ملقط Anastome

جنس طير من طوال الساق وفصيلة القالقي يدعى سطم ، اطلبه .

٢٩٥ - أبو منبج Crex des prés (F).

طائر من القواطع يدعى صفرد ، اطلبه .

٢٩٦ - أبو منجل هو الحارس ، اطلبه .

٢٩٧ - أبو منشار * Pristis (S).

Scle (F). Sawfish (E).

جنس اسماك بحرية بيوض ولود من رتبة الاشلاق . جسمه وشعي الشكل يطول من ٣ الى ٥ امتار . مقدم رأسه مسلح بمنشار عظمي التركيب طوله نحو ١٢٥ سم . زعانفه الصدرية بعيدة عن رأسه || ثوبه الى الصبهة السمراء يزداد دكائة مع اقترابه من شبح الظهر ويغير ويبيض عند البطن || وهو من الاسماك المفترسة الشرسة الخفيفة ، منه نوعان يلي وصفها :

٢٩٨ - أبو منشار المتوسط Pristis pectinatus (S).

Scle pectinée, Vivelle (F).

صغير القد طوله نحو ثلاثة امتار . يوجد في المتوسط . قلما يقترب من الشواطئ لكنه كثير الاذى يتعدى على جميع الاسماك الصغيرة .

٢٩٩ - أبو منشار المحيط Pristis antiquorum (S).

Scle commune (F). Common sawfish (E).

كبير الجثة طوله نحو خمسة امتار . يوجد في المحيط الاطلسي . يكثر قرب الشواطئ الافريقية .

٣٠٠ - أبو منظره هو الحسم ، اطلبه .

٣٠١ - أبو منقار * Hemiramphus (S).

Hémiramphe (F). Halfbeak (E).

جنس اسماك بحرية من العظميات وفصيلة الاسقمريات الملساوات . انواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق الحارة . بعضها يعيش في البحر المتوسط ويتميز باستطالة فكه الاسفل الذي يأخذ شكل المنقار .

٣٠٢ - أبو ميمكاز Raja clavata (S).

Raie bouclée (F). Thornback (E).

نوع من الشفنين البحري وهو من الاسماك الغضروفية المفلطحة المأكولة . طوله زهاء ٢٠٠ سم . يكثر وجوده في البحر المتوسط . كنيته عقاب البحر .

٣٠٣ - أبو ميمر Gryllomorpha (F).

هو السخاخ ، حشرة من الجدديات ، اطلبه .

٣٠٤ - أبو نباح ، بوشبك ، نباح

هو اليرع ، اطلبه .

٣٠٥ - أبو نضرة هو الختر ، اطلبه .

٣٠٦ - إِبُونَيْت Ebonite

مطاط اسمر صلب يحوى نحو ٥٠ ٪ من الكبريت ، يستعمل في عدة صناعات تزيينية وكهربائية .

٣٠٧- أبو هرّون

هو الهزار . لم يذكره غير الدميري الذي قال عنه : « هو طائر في حنجرتة اصوات مليحة شجرة يفوق انشواخ و يروق فوق كل منى ، لا يسكت بالليل البتة ويصبح الى وقت الصباح وتجتمع عليه الطيور » .

٣٠٨- أبي الرقص هو القرى الشائع ، اطلب .

٣٠٩- أبيضجة ، زهر العشاء ، زهرة مايو

Epigaea (S). Epigée (F). Trailing arbutus, May-flower (E). Grundstrauch, Primelstrauch (D). Epigaea (I).

جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة الخلنجيات . له نوعان : ابيجة منتصبه وابيجة عارشة . سوقها زياء اللحاء . اوراقها كاوراق القطلب . فصلها خلي البشرة . ازهارها بيضاء اللون يشوبها موج وردى || تعيش بين الصخور في الحصاب والجبال .

٣١٠- أبيضين Epigyne (F). Epigynous (E).

اغل المبيض وهو جزء من جهاز بعض الازهار .

٣١١- أبيضد ، أبيضد اطلب ابو ركه .

٣١٢- أبيضد Toujours vert (F). Evergreen (E).

نعت وصفي للنبات الدائم الخضرة على مدار السنة .

٣١٣- أبيضول Apyrol

حاشور زراعي يرتكز على مادة تريكلوريتلان . يستعمل لوقاية الحبوب المعدة للأكل من عبث الحشرات بمعدل ٣٠٠ سم لكل مائة كيلو من الحب .

٣١٤- أبيضة * ، أم كوكولو Aberia caffra,

Doyalls caffra (S). Abérie, Umkokolo (F). Key apple (E). Aberia (I).

جنية شائكة من النفضيات . منبتها امريكة الجنوبية . تزرع للساج . ثمارها مأكولة مستديرة برقوية الشكل . لونها الى الصفرة . لها لذيذ الطعم فيه شيء من الحموضة . عرنها فواح الرائحة المستحبة المنعشة || ترغب في الارربة العميقة الغور التي لا تخلو من الرطوبة .

٣١٥- أبيضة * Epicea, Picea (S).

Epicea (F). Spruce (E).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة الصنوبريات . انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام . ثنتها مخروطية ، اغصانها يرمية ، اوراقها عروة دائمة الخضار . كرزها معلق || اشهر انواعها واعرفها ما يتبع .

٣١٦- أبيضة أموريكا Picea omorica (S).

Epicea omorica (F). Omorica spruce (E).

شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م . منبتها بلاد البلقان . قالها هرمي الشكل مستدق القنة . اوراقها صغيرة مدببة العقصة لونها الى الخضار البحري . كرزها مستدير الاسقاط العادمة التسنين ، لونه الى الجزوة البنفسجية ، طولها نحو ٥ سم . وقاعدته ٢ سم .

٣١٧- أبيضة بيضاء Picea alba (S).

Sapinette (F). White spruce (E). blanche, Epicea blanc (F). White spruce (E). Weiße fichte (D). Pece bianco (I).

شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ١٥ الى ٣٠ م منبتها كندا . اوراقها قصيرة مدببة ومنتصبه . لونها الى الاخضر الزاهي . يعلو موج فضي . نواحيها حنطية اللون . كرزها رقيق الاسقاط المقطوعة المتراكبة ، طولها نحو ٥ سم . وقاعدته ٢ سم .

٣١٨- أبيضة حمراء Picea rubra (S). Epinette

rouge, Sapinette rouge (F). Red-spruce (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ م منبتها البلاد الامريكية . اوراقها ضيقة ، جميلة الخضار العايق . كرزها صغير القد ، طولها نحو ٤ سم . وقاعدته ٢ سم . لحاء جذعها واغصانها الى الجزوة الحمرة .

٣١٩- أبيضة سامية Picea excelsa, P. vulgaris (S).

Epicea commun, Sapin de Norvège, S. blanc, S. du Nord, Pesse, Pesce (F). White fir, Norway-spruce (E). Tannenfichte, Rattanne, Fichte (D). Abeto peca, Epicea, Pezzo, Picella (I). شجرة حرجية شائخة ، مدببة القنة ، تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م . تكثر في اروبة الشمالية . اوراقها ابرية العقصة لونها الى الاخضر الزاهي . كرزها لبد الاسقاط ، طولها من ١٠ الى ١٦ سم . وقاعدته من ٣ الى ٤ سم .

٣٢٠- أبيضة سوداء Picea nigra (S). Epinette

noire, Sapinette noire (F). Black-spruce (E). شجرة حرجية وتزيينية ، تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . منبتها كندا وامريكة الشمالية . اوراقها صغيرة لونها الى الاخضر الازرق العايق . كرزها صغير القد ، طولها نحو ٣ سم . اسقاطها مستديرة مسننة لونها الى الجزوة البنفسجية .

٣٢١- أبيضة شائكة Picea spinulosa (S).

Epicea spinuleux (F). Spine-spruce fir (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٦٠ الى ٨٠ م . منبتها جبال حلايا . اوراقها نحيلة طويلة . افنادها متدلية . كرزها ضيق الاسقاط المسننة المتراكبة ، طولها نحو ٨ سم . وقاعدته ٣ سم .

٣٢٢- أبيضة شرقية Picea orientalis (S). Sapin

d'Orient, Epicea d'Orient (F). Oriental spruce fir (E). Taurische fichte (D). Abeto orientale (I). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ١٥ الى ٢٠ م . منبتها الشرق الادنى . اوراقها قصيرة مدببة جميلة الخضرة القائمة . كرزها مستدير الاسقاط طولها نحو ٨ سم . وقاعدته ٢ سم .

٣٢٣- أبيضة طنبيرجي Picea Thunbergi (S).


Epicea de Thunberg (F). Spruce of Thunberg (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م . منبتها اليابان . اوراقها صغيرة ، ابرية العقصة تكتنف الافناد والافنان من جميع جهاتها . كرزها مستدير الاسقاط المسننة الكستنائية اللون .

٣٢٤- أبيضة موريندا Picea morinda (S).

Epicea morinda (F). Morinda spruce (E). شجرة حرجية وتزيينية تعلو من ٣٠ الى ٦٠ م . منبتها جبال حلايا . اوراقها نحيلة مستطيلة جميلة الخضار القاتم . كرزها مستدير الاسقاط طولها نحو ١ سم . وقاعدته ٤ سم .

٣٢٥- أبيض Abiad (F).

الابيض كوكب في حاشية الحجر .



أبيض



أبيض

يرأوح من ٣ الى ٧ وريقات . وريقاته بيضية الشكل ، معتقة . ازهاره عنقودي التجميع ، محوري الارتكاز . تنويره يستمر من آب الى ايلول . ازهاره عطرية العرف ، ارجوانية اللون يعلوها توشيم وردي . ثماره حنابل مستطيلة قرينة الشبه باللوبياء . يتكاثر بعسقله || عسقله مأكولة كالبطاطا الا انها اجد لبا . اما متوسط تركيبها المنصري فهو : ٤,٥٠ ٪ مواد ازوتية ١,٨٠ ٪ مواد دهنية ٢٣,٥٥ ٪ هيدرات الكربون (مواد نشوية وسكرية الخ..)

٣٣٤ - أبيلوس وحيد اللون

من الحشرات يعرف بدمحور الخرشيات ، اطلبه .

٣٣٥ - أبيلون ٥

جنس حشرات صغيرة من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة لا تقل عن ٣٠٠ جميعها صغيرة القند طولها يرأوح من ١ الى ٦ مم . اثوابها متعددة فيها الاصفر والازرق والامغر والاسمر والاسود . اخطامها مستطيلة قليلة الانعكاف . قرونها الاستشعارية خيطية منحرفة || يرقاتها خاضلة ترغب في نباتات الفصيلة القرنية || اشهر واخصر انواعه الاربعة التالية اوصافها .

٣٣٦ - أبيلون الارضي شوكي ٥

Aplon de l'artichaut (F). Artichoke pear-shaped weevil (E). Artischokenspitzmäuschen (D).

حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات طولها نحو ٣ مم . لونها الى الزرقة العابقة ، تركب مع يرقاتها اوراق واضلاع الارضي شوكي || تكافح باستعمال احد الحواشير المركزة على الروتينون .

٣٣٧ - أبيلون الحمّاض ٥

Aplon violaceum (S). Aplon de l'oseille (F). حشرة من السوسيات طولها من ٣ الى ٤ مم . رأسها وخطمها سودوان . جسمها ازرق اسفع يعلوه موج اخضر . تركب مع يرقاتها اضلاع الحمّاض || تكافح باستعمال كل حاشور يرتكز على الروتينون .

٣٣٨ - أبيلون الحمص ٥

Aplon pisi (S). Aplon des pois (F). Pea pear-shaped weevil (E). Erbsenspitzmäuschen (D). حشرة من السوسيات طولها نحو ٢ مم . بطنها غليظ الشكل . رأسها وخطمها سودوان . جسمها وخطمها زرق . تنخر الحمص وسائر حبوب القطانة || تكافح باستعمال الاكسي شرنصون او الاتي بروش او اكسيد الاتيلان .

٣٣٩ - أبيلون الحنْدَقُوق ٥

Aplon tenue (S). Apion frêle (F). Sweet-Clover pear-shaped weevil (E). حشرة من فصيلة السوسيات ورقبة غمديات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشالية . تألف البراري والمروج . خناقسها تعيش على نواصي الحنْدَقُوق واوراقه الفتية . يرقاتها مرقالة تعيش على المواد النباتية التي تقترضها وتمتصها || جسمها صغير القند يطول نحو ٢ مم . رأسها مردني الشكل ، مستطيل الخطم المقوس ينتهي بمثل قاضم ثاقب . زباناها صغيران صولجانيان . عينها ناشرتان . غمداها محدبتان ، محزّزتان

٣٣٦ - أبيل ، أبيلة . Baile de foin (F). Haystack (E). الحزمة او الربطة من الحشيش المكبوس والمزوم .

٣٣٧ - أبيلية * ، أبيلية ، آبلية . Abelia (S). Abélie (F). Abelia (E). Abelia (D). Abelia (I).

جنس جنات وجنيات برية وزينية معمرة من فصيلة الخناثيات ، متبها الاصل بلاد الصين وبعض اصقاع الهند . انواعها المعروفة ثلاثة اما ضروبها فعديدة . اوراقها متقابلة ، بحيلة الخضار الزاهي . ازهارها أبطية وهامية الارتكاز ، فردية او عثكولية التجميع ، مستطيلة الشكل ، بيضاء او وردية اللون . عرفها ضعيف . تزرع لجمال زهرها .

٣٣٨ - أبيلية ثلاثية الزهر

Abelia triflora (S). Abélie triflorée (F). جنبه كبيرة القند تملو نحو ٤٠٠ سم . مهدها الهند ، اوراقها عابلة ، ازهارها كبيرة الحجم ، ثلاثية التجميع ، فواحة العرف العطر . ضروبها التزيينية عديدة || تزرع في الحدائق والمراكن .

٣٣٩ - أبيلية صينية

Abelia chinensis (S). Abélie de Chine (F). جنبه متوسطة القند تملو نحو ٢٠٠ سم . جلبابها الاخضر بحيل الشكل . ازهارها بيضاء اللون او وردية . عرفها خفيف الرائحة مستحب || ضروبها التزيينية عديدة . تجود في جميع الاتربة الخفيفة والمتوسطة الاندماج .

٣٤٠ - أبيلية عديدة الزهر

Abelia floribonda (S). Abélie floribonde (F). جنبه صغيرة تملو نحو ١٠٠ سم . فروصها دقيقة . اوراقها عرو . ازهارها كثيرة العدد ، وردية اللون ، بحيلة الشكل ، عديمة العرف || تزرع في الحدائق والمراكن .

٣٤١ - أبيلو ٥


Lucuma caimito, Pontaria calmito (S). Abiu (F). Marmalade fruit (E). نوع من اللكومة وفصيلة السبوتيات . مهده البلاد الامريكية وهو شجرة متوسطة الحجم سريعة النمو تثمر بعد بذرها بستتين . تملو من ٥ الى ٦ امتار . اوراقها معتقة مستطيلة . لمساء النصل الاخضر الزاهي . ثمارها بيضية تطول نحو ٦ سم . لونها الى الصفرة ، لها جامد مأكول . عصارته علكية لاصقة قبل الايناع || يعيش في جميع المواقع الحارة ويجود في مختلف الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة .

٣٤٢ - إبيورليس


Aepiornis (S). Aepiornis, Aepyornis (F). Aepiornis (E). الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « طائر رفيع » . طائر احفوري من الزمن البليستوساني العائد الى اوائل الاباج الرابعي ، وجدت احافيره من عظام وبيض في جزيرة مدغسكر || بيضه فائق الكبر والضخامة . البيضة الواحدة تستوعب ٨ ليتر ماء ، اي انها تعادل ١٥٠ بيضة دجاج . ارتفاعه المقدّر نحو اربعة امتار .

٣٤٣ - أبيلوس عسقلوني ٥

Aplos tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F). نبات عشبي عسقلوني معمر من فصيلة القرنيات الفراشية . مهده بعض مناطق امريكة الشالية . يزرع للتزيين || ساقه عارشة تطول من مترين الى اربعة امتار . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، مستطيلة الزناد ، ورقية العدد الذي




أبيلية




أبيو



أبيوس عسقلوني



أبيلون الارضي شوكي



أبيلون الحمّاض



أبيلون الحمص

٣٤٥- إتب عcale de l'orge (F). Sheil (E).
الإتب قشرة حبة الشعير .

٣٤٦- إتب Accession
هو أحد طرق الامتلاك الذي ينشأ عن لحاق طبيعي بين عين وعين أخرى أكثر أهمية .

٣٤٧- إتب Orientation
معرفة اتجاه الأرض الزراعية شيء ضروري. فالنباتات المعرضة للجنوب ، في أرض وجهتها الجنوب ، يصيبها مثلاً من أشعة الشمس وحرارتها ما لا يصيب المروعة باتجاه الشمال .

٣٤٨- إتب Vecteurs (F). Vectors (E).
هي الخطوط المستقيمة التي تحدد وجهة الاتجاه ومقدوره

٣٤٩- إتب Union
هو تضام افراد او جماعات تفر مبادئ واحدة وتهدف الى مصالح ومنافع معينة .

٣٥٠- إتب Union des agriculteurs (F).
هو تضام المزارعين للدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في جمعية رسمية لها نظامها وشخصيتها القضائية .

٣٥١- إتب Terrage (F). Clayng (E).
هو نقل تراب زراعي حسن التركيب وبسطه على أرض ينقصها التراب اللازم لخصبها .

٣٥٢- إتب Terrains (F). Grounds (E).
هي الاراضي الزراعية او الممكن ان تستخدم في هذا السبيل. ولما كانت تراكيها الكيماوية والحكمية عديدة وكان عنصرها الرئيسي هو المرجع المرجح . لذلك فالأترية تقسم مبدئياً الى اربعة اقسام وهي الأترية الرملية والأترية الطينية والأترية الجصية والأترية الدبالية ، ولكل من هذه الاقسام تريب وميزات فارقة . اطلب تربة .

٣٥٣- إتب Soils de mélanges (F).
Mingling soil (E).
هي الأترية المركبة من عدة انواع متساوية .

٣٥٤- أنرج Citrus medica cedrata (S). Cédratier (F). Adam's apple, Cedrat tree (E). Echte zitronu, Cedratbaum (D). Cedra (I).
نوع من الحمضيات الفصيلة النارجية . يقال ان مهد بلاد الهند الصينية . يزرع الآن في معظم الاصقاع الحارة والمعتدلة . وهو شجرة تشبه الليمون الحامض . ساقها فرعاء . اغصانها قاسية شائكة . اوراقها كبيرة معنقة متعاقبة ، نصلها بيضي القاعدة ، رمحي الطرف ، مائلش البشرة ، عابق الخضار . ازهارها قليلة العدد ، كبيرة القد ، خماسية البتلات البيض . وبياضها يشوبه حمرة بنفسجية خفيفة . ثمارها كبيرة القد ، مستطيلة الشكل ، بنفسجية اللون في أول عهدها ثم خضراء فصفراء عند الابناع . قشرة الثمرة ثولوية سميككة . لها حامض حامز مر لا يؤكل . قشور ثمارها تستعمل في المربيات || تنكأثر بالشعيل وهي من الاشجار التي تحشى الرياح العاصفة والاراضي الرطبة والأترية القوية الاندماج .

الصفحة ، تلحفان كامل البطن . ثوبها الى السمرة الرصاصية الموج . رأسها اعتم من كوسلها وكوسلها اعتم من بطنها ومغنديها || لها جيل واحد في الخول . تخرج الحشرة الجملانة من مكمنها الشتوي في نيسان . تخرج في النهار وتبيت في الليل || اليرقة صغيرة دقيقة محدودة مرقالة تطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى الغبرة الصفراء الموج ، رأسها اسمر || الطور اليرقي يستمر نحو ٣٠ يوماً ثم تتحول اليرقة الى حورية . وبعد انقضاء طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً تظهر الحشرة الجملانة وتبقى الى ان يحل الشتاء فتكمن في التربة او بين لحاء الاشجار حتى نيسان .

٣٤٠- أبيون النفل* Apion apricans (S).
Apion du trèfle (F). Clover seed weevil, Clover pear-shaped weevil (E). Kleespitzmäuschen (D).
حشرة من السوسيات . طولها من ٣ الى ٤ سم . لونها الى الحمرة الزاهية . تركب اوراق النفل فتسردها . يرقاتها تركب الازهار فتقرنها وتقضم معاليقها || تكافح باستعمال اي حاشور كان يرتكز على الروتينون .


٣٤١- إتب Productivité (F). Productiveness (E).
إتاء الأرض : ريعها وحاصلها . يقال كثر إتاء أرضه اي ريعها . ولبن ذو إتاء اي ذو زبد كثير .

٣٤٢- أنارية* Otarla (S). Otarie (F). Otariid (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة ضارية من الفقريات ورتبة زعنفيات الاقدام . موطنها بعض مناطق المحيط الهادي وبحار الجنوب || انواعها ١١ تقسم الى قسمين : قسم أسود البحر وهو يشمل انواع الأنارية الشعراء العنق ، وقسم أدهاب البحر وهو يشمل انواع الأنارية الزباء . جميعها مستطيلة العنق والرأس . لها اذنان صغيرتان . اثوابها مختلفة الالوان يغلب فيها البني الدايق || ذكورها كبيرة الجثة التي يراوح طولها من ١٧٠ الى ٤٠٠ سم . ودوحها من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم . ووزنها من ٢٠٠ الى ٤٥٠ كيلو || افانها نحيلة الجسم خفيفة الوزن . طولها يراوح من ١٠٠ الى ١٥٠ سم ودوحها من ٥٠ الى ٧٥ سم . ووزنها من ٤٠ الى ٦٠ كيلو || تعيش جماعات كبيرة مؤلفة من عدة قطعان والقطيع يتألف من ٣ الى ٥ أنث رأساها ذكر واحد || تصاد لفرائها وشحمها .

٣٤٣- أنان Anesse (F). She-ass (E).
انثي الخاريج أن وحمار . يجوز انزاها بعد بلوغها ٢٠ شهراً . ودقاتها يدوم نحو ٤٨ ساعة ويعاودها كل ٢٥ يوماً . محبلها يدوم ٣٦٠ يوماً . وقد ينزى عليها بعد الوضع بسبعة ايام كاملة .

٣٤٤- إتاوة Redevance (F). Tenure (E).
يقال ادى إتاوة أرضه اي خراجها . وضربت عليهم الإتاوة . قال جابر التغلبي :

« وفي كل اسواق العراق إتاوة
وفي كل ما باع امرؤ مكس درهم »
فالإتاوة على وجه العموم هي المبلغ المطلوب من المال ، وصفه ضريبة . والإتاوة على وجه الخصوص تأتي بمعنى الدائنة اي المبلغ المطلوب مقابل التزام او استعمال ملك او مرفق عام وما أشبه . مثال ذلك إتاوة المناجم .



أبيون الخندقوق



أبيون النفل



أنارية

٣٦٤- **أُنْسُوغَة كَنْدَا** Tsuga Canadensis (S).
Tsuga du Canada, Pruche (F).
شجرة سبروتية شاحخة سريعة النمو ترغب في المواقع الرطبة .
تعلو نحو ٢٠ م. افنانها خلية اللحماء . أوراقها قصيرة
تطول نحو ١٥ م. نصلها مخطط البشرة || كرزها صغير
القد يطول نحو ٢٥ م. || يستخرج منها بالحز مادة
راتنجية تدعى بلسم كندا .

٣٦٥- **أُنْسُوغَة يَابَانِيَّة** Tsuga Sieboldi (S).
Tsuga de Siebold (F).
شجرة سبروتية شاحخة بطيئة النمو تعلو من ٢٥ الى ٣٠ م.
أوراقها تطول نحو ٢٠ م. وتعرض ٢ م. نصلها ميزابي
الصفحة ، سميك النسيج لونه الى الخضار العابق .
كرزها صغير القد ، عناقبي اللون .

٣٦٦- **أَتْعَاب** Honoraires (F). Honorary (E).
الاتعاب اي جزاء الخدمات هي بمثابة اجر مالي يتفق
عليه ودياً بين العملاء وارباب بعض المهن الحرة .
٣٦٧- **إِتْفَاق** اطلب تعاقد .

٣٦٨- **إِتْفَاق رِضَائِي** Accord amiable (F).
Amicable bargain (E).
هو الاتفاق الذي يتم بالتراضي بين الجهات المعنية .

٣٦٩- **إِتْقَاء ، إِحْتِرَاز ، وَقَايَة** Prophylaxie (F).
Prophylaxis (E).
محمل الوسائل والطرق الفعالة الواجب اتخاذها لاتقاء
الامراض الموصوفة كالتطهير والتلقيح والعزل والحجر او
لوقاية البنات من وسم يخشى وقوعه ومن حشرة ينتظر ضررها .

٣٧٠- **آيِل *٥** Ateles (S).
Atèle (F). Spider-monkey (E).
جنس قروذ امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ١١
موطنها فسيح الارعاء يمتد من المكسيك الى اواسط امريكة
الجنوبية || اجسامها رشيقة . قوائمها نحيلة مستطيلة ،
ايديها رباعية الاصابع . اذنانها شديدة الطول اخاذة . انواها
تختلف مع الانواع || تألف الغابات الرطبة . تعيش
جماعات كبيرة العدد . قوتها الثمار والاوراق والحشرات .
اناثها تضع جروان .

٣٧١- **إِتْلَاف المَزْرُوعَات** Dévastation de récoltes (F).
هو العبث في الاراضي المزروعة بائتلاف الزرع غير
المحصود او باقتلاع الفراس من الكروم والبساتين وما اشبه .

٣٧٢- **أُنْم** هو المازريون نوع من الدفنة .

٣٧٣- **إِتْمَاك ٥** Surélévation (F).
Heightening (E).
الاتمك الزيادة الحاصلة من الارتفاع الاصاعي .

٣٧٤- **أَتْمَك ٥** Surélever (F).
To heighten (E).
زاد الشيء ارتفاعاً كالحائط والبناء وغير ذلك .

٣٧٥- **إِنْثُولُوجِيَّة** Ethnologie (F).
Ethnology (E).
الاثنولوجية علم يبحث في اصل الشعوب وأخلاقهم وانتشارهم .

٣٥٥- **أُتْرُجَّة * ، كَبَادَة ، تُرُنْجَة** Cédrat (F).
Cedrat (E).
هي ثمرة الاترج ، كبيرة الحجم ، مستطيلة الشكل وافرة
اللبن السميك المستعمل في صناعة المربيات الجافة || يقال
ان قشرها ينفع الفالج وهو جيد للبرص والقوباء واذا جعل
في الثياب يدفع عنها السوس . وعصاره قشرها تنفع نهش
الافاعي شرباً وضاداً . اما حامضها الحامز فيجلبو العين
ويذهب الكلف ويسكن غلثة النساء ويزيل الكتابة بالحبر .
وحبها اذا سحق ووضع على لسع العقرب سكن الوجع .

٣٥٦- **أُتْرُوبِين** Atropine
الجوهر الفعال لنبات ست الحسن وهو سم شبه قلوي
يستعمل للتخدير وتوسيع حدقة العين .

٣٥٧- **إِتْرَآن** Equilibre (F).
Equilibrium, Equipoise (E).
الاتزان حالة استقرار الجسم من معادلة القوى وتلاشيها .

٣٥٨- **إِتْرَآن مَظْلَق** Equilibre astatique (F).
Astatic balance (E).
حالة استقرار ثابتة من تلاشي القوى المعادلة .


٣٥٩- **أُنْسُوغَة *** Tsuga
جنس اشجار حرجية من سبط التنوبيات وفصيلة الصنوبريات
مهده المقدر بلاد اليابان وكندا . انواعه عديدة جميعها
اشجار كبيرة الحجم شاحخة . اغصانها غليظة كثيفة .
افنانها دقيقة أوراقها صندرية قصيرة المنق ، خلية الصفحة
السفلى التي تبدو بيضاء اللون . كرزها صغير القد .
يستخرج من خشبها مادة صمغية بطمية تدعى بلسم كندا .
اشهر انواعه ما يتبع .

٣٦٠- **أُنْسُوغَة بَطْنُولِيَّة** Tsuga pattoniana (S).
Tsuga de Patton (F).
شجرة سبروتية شاحخة بطيئة النمو تعلو من ٢٠ الى ٦٠ م.
أوراقها سمكية النسيج تطول نحو ٢٠ م. وتعرض ٢ م.
لونها الى الزرقة || كرزها يطول نحو ٧ سم . يبدو
جذوي اللون يعلوه موج ازرق ثم ينحرف الى السمرة الخطية .

٣٦١- **أُنْسُوغَة حَمَلَايَا** Tsuga Brunoniana (S).
Tsuga de Brunon (F).
شجرة شاحخة بحيلة الشكل بطيئة النمو تعلو من ٣٠ الى
٣٥ م. أوراقها تطول نحو ٢٥ م. نصلها مخطط البشرة
على صفحته السفلى || كرزها مستطيل دقيق . خشبها
قليل الصلابة متوسط القيمة .

٣٦٢- **أُنْسُوغَة كَارُولِيْنِيَّة** Tsuga Caroliniana (S).
Tsuga de la Caroline (F).
شجرة معتدلة الشموخ والنمو تعلو من ١٥ الى ٢٠ م.
افنانها مهدبة . أوراقها مفلوكة تطول نحو ٢٠ م. وتعرض نحو
٢ نصلها سميك النسيج لونه الى الخضار العابق || كرزها
صغير القد يطول نحو ٣ سم .

٣٦٣- **أُنْسُوغَة كَلِيْفُرِيَّة** Tsuga Mertensiana (S).
Tsuga de Mertens (F).
شجرة سبروتية شاحخة سريعة النمو تعلو من ٥٠ الى ٦٠ م.
افنانها زباء اللحماء . أوراقها تطول نحو ٢٠ م وتعرض
نحو ٢ م. نصلها فستني الصفحة العليا ، عابق السفلى
كرزها كستني اللون يطول نحو ٨ سم . || خشبها شديد
الصلابة ديمومي .




أُتْرُجَّة




أُنْسُوغَة




آيِل



أثومارية



أثومارية خطية



أثومارية ملونة



أثاب



أثاب الهند

الثام تطول نحو ٣ مم. ثوبها الى الصفار الداكن. رأسها اسمر. شرجها مجهز بكلايتين منعقتين نحو الداخل || طور الاكمال يتم في التربة ويستمر نحو عشرة أيام. تظهر الحشرة الجمالنة في اواسط آب. تسرح ساعية وراء الرزق حتى الشتاء فتخلد في مكمنها الى ان تدفنها نزعاً الغريزة الى النشاط ويكون ذلك في اوائل الربيع.

٣٨٣- أثون Chaufour, Four à chaux (F).

Lime-kiln (E).

ج أثن واتاتين. البناء الخاص لصناعة الكلس وهو يتألف من فرن تحرق فيه الحجارة الكلسية المرصوفة.

٣٨٤- أثاب*، تين البنغال Ficus Indica,

Ficus benghalensis, Urostigma bengalense (S).
Banian, Figuier des Banians, F. de Bengale (F).
Banian tree (E).

شجرة كبيرة ضخمة من فصيلة التوتيات. تتدل أغصانها الى الارض فتعلق ويتكون منها اشجار جديدة حول الساق الأم. منبها البنغال من اعمال الهند || تزرع للتزيين في جميع البلاد الحارة. تتكاثر بالعقل وتنمو في جميع التربة الرطبة القليلة او المتوسطة الاندماج || يستخرج من عصارها اللزجة التي يسببها وخز بقعة الملك صرب صفني امغر اللون يستعمل في عدة صناعات منها دهانات الآلية الخرفية الصينية.

٣٨٥- أثاب الهند*، تين المجوس، تين الاصنام

Ficus religiosa (S). Figuier des pagodes, Arbre des conseils (F). Peepul tree, Bo tree, Sacred fig tree (E). Pagodenbaum, Indischer gottesbaum (D). Albero del diavolo, Fico del diavolo (I).

نوع من الاثاب. شجرته ضخمة دائمة عذبة القد من فصيلة التوتيات. مهدها بلاد الهند، كانوا ولا يزالون يزرعونها عند معابدهم للدلالة على البقاء او استمراره || اغصانها متدلية كاعصان الاثاب. اوراقها متعاقبة ومتقابلة، كبيرة الحجم، بسيطة او مفصصة النصل || ازهارها وحيدة المسكن صغيرة. ازهارها سنبل التجميع عندما يكون ابطي الارتكاز وهو عنقودي التجميع اذا كان تاجي الارتكاز. ثمارها كثمار التين الصغيرة.

٣٨٦- إثابة هي اللاذن، اطلبه.

٣٨٧- أثر، إثر خلصة السمن اذا سلى*

٣٨٨- أثر Effet (F). Effect (E).

لفظة قانونية تشمل في عدة صيغ اشهرها ما يلي :

٣٨٩- أثر رجعي Effet rétroactif (F).

Retroactive effect (E).

الاثر الرجعي ورجعية الاثر والفاعلية الرجعية هي نقل اثر الحكم او القانون او اي عمل شرعي الى الماضي.

٣٩٠- أثر كاشف Effet déclaratif (F).

Declaratory effect (E).

هو الذي تحدثه العقود المقررة او الكاشفة.

٣٩١- أثر ناقل Effet dévolutif (F).

Devolutive effect (E).

هو الذي تحدثه ايلولة الحق الى صاحبه.

٣٩٢- أثر واقف Effet suspensif (F).

Suspensive effect (E).

هو الذي يؤجل به وقتياً تنفيذ الحكم المعارض فيه او المستأنف اذا لم يكن مشمولاً بالنفاذ الوقفي.

٣٧٦- إتهاب Acceptation de donation (F).

هو قبول الهبة.

٣٧٧- إتهام Accusation

الاتهام هو نسبة جريمة الى شخص معين واحالته بسببها الى المحاكمة.

٣٧٨- أثوفيكس Atofix

فاطور زراعي يرتكز على الكبريت الميكروني القابل البلبل. يستعمل سائلاً محلولاً ٢,٢٪ في مكافحة الازماداد على الاشجار المثمرة والكرمة.

٣٧٩- أثوم Atome (F). Atom (E).

هو الذريرة اي الجوهر الفرد او الجزء النهائي من المادة الذي لا يقبل التحطيم.

٣٨٠- أثومارية* Atomaria (S).

Atomaire (F). Pigmy mangold beetle (E). Moosknopfkäfer (D).

وتدعى خنفساء الشوندر. حشرة صغيرة من غمديات الاجنحة طولها نحو ٢ مم. ثوبها الى البني، زباناها صولجانية الشكل. تلثم اوراق الشوندر عقب انتشار البذور ثم تركب الجذور فتخرها مع جمام التربة.

٣٨١- أثومارية خطية*، خنفساء الشوندر Atomaria linearis (S).

Atomaire linéaire, Atomaire de la betterave (F).

Pigmy mangold beetle (E). Mooskopfkäfer (D).

حشرة صغيرة نحيلة من فصيلة الشوزريات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة. تألف المواقع التي تكثر فيها زراعة الشوندر. خنفساء تلثم اوراق الشوندر عقب انتشار البذور يرقاتها تركب الجذور فتقرضها عند جمام التربة || جسمها يطول نحو ٢ مم. ثوبها الى البني الاسمر الموج ثعلوه خلة صهباء. حنار ظهرها الى الاحمر الفاتح. رأسها مستعرض الجرم. عينها صغيرتان. زباناها صولجانيان احمران. كوسلها مربع. ظهرها منقسط عادم التحزيز. ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الربيع وتسافد في اوائل حزيران وتعيش حتى اواسط تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل || والبرقة عند بلوغها الادراك الثام تطول نحو ٣ مم. جسمها اسطواني الشكل عاجي اللون، اسمر الرأس. شرجها مجهز بكلايتين صغيرتين محجبتين نحو الداخل.

٣٨٢- أثومارية ملونة* Atomaria analls (S).

Atomaire coloré (F). Atomaria Analls (E).

حشرة صغيرة نحيلة من فصيلة الشوزريات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها موطن الاثومارية الخطية. تألف المناطق الجبلية المشرفة على البحر، خنفساء تعيش على المواد النباتية الخضراء. يرقاتها تعيش على المواد النباتية الجافة || جسمها بيضي الشكل يطول نحو ٢ مم. رأسها مستعرض الجرم اسود اللون. عينها صغيرتان. زباناها صولجانيان احمران. كوسلها مقوس المقدم، اسود اللون. ظهرها محزز القشار، اسود النصف الاول، احمر النصف الاخير. جرامزها حر. ارساغها خماسية العقل || تخرج الخنفساء من مكمنها الشتوي في اوائل الربيع. تسرح في طلب المرتع وتتأهب للسفاد || البرقة عند بلوغها الادراك

٣٩٩ - أثلييات Tamaricaceae (S). Tamaricacées.

Tamariscinées (F). Tamaricaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ، عديدة القعالات . اجناسها وأنواعها قليلة أشهرها الأثل والمرتن .

٤٠٠ - إثمار Fructification

لفظة شائعة المعنى تستعمل عادة للتعبير عن تكوين الثمار أو للدلالة على المقدور الثمري أو على قوة احتفاظ الشجرة بثمارها .

٤٠١ - أثمان* Ipomaea (S).

Ipomée (F). Ipomaea, Bind weeds (E).

جنس نباتات عشبية مدادة حولية وبحولة ومعمرة من فصيلة اللبلبيات . أنواعه عديدة منها للتزيين وبعضها للأكل كالبطاطا الحلوة ومنها طبية تدخل في تركيب عدة عقاقير ويستحضرات كالجلاب والجلبة || أشهر أنواعه :

Ip. purpurea أثمان أرجواني ، شب النهار

Ip. batatas (S). أثمان الكمر ، بطاطا حلوة

Patate douce (F). Sweet potato (E).

Ip. turpethum أثمان تربد

Ip. jalap أثمان جلاب

Ip. purga أثمان جلبة

Ip. hederacea أثمان عجب ، حب النيل ، جلاب النيل

Ip. coccinea أثمان قرمزي

Ip. bona-nox أثمان نور الليل

٤٠٢ - إلمد ، أنتيموان Antimoine (F).

Antimony (E).

معدن رصاصي اللون ، بين الأبيض والأزرق ، صفيحي التركيب ، بلوري الرقعة ، سريع المطب والسحق ، عديم الملوحة . رمزه (Sb - نت) وزنه النسبي يراوح مسن ٦٧٠ الى ٦٨٦ وزنه الاتومي ١٢١ يذوب عند ٤٤٠ درجة حرارة || مناجمه عديدة واستعماله الصناعي كذلك .

٤٠٣ - أثنّا ، أثنّه ، أوثنا Othonna (S).

Othonne (F). African ragwort (E). Schfeler-blume (D). Othonna (I).

جنس نباتات برية عشبية ونجمية من الحرشيات وفصيلة المركبات . أنواعه عديدة لا تقل عن ٨٠ جميعها افريقية المنبت . اوراقها متعاقبة درماء أو غشائية . أزهارها ثورية رؤسية صفراء أو زرقاء || أشهرها الأثنا الحبشية المعروفة بالاحيون التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر ، اوراقها تشبه اوراق القرنفل ، تزهر للتزيين .

٤٠٤ - إثنّا عشري Duodénium (F).

Duodenum (E).

الإثنا عشري هو الممي المتصل بقعر المعدة . ويدعى أيضاً المعج ، اطلبه .

٤٠٥ - أثنّة Forêt d'acacia gommier (F).

الأثنة غابة من الطلع . ج أثن .

٤٠٦ - أثيدّة Ecidie, Aecidie (F). Aecidium (E).

شكل من الاشكال الثمرية الخاصة بالفطور الصدئية من فصيلة السحاميات التابعة لرتبة الدعاميات .

٤٠٧ - أثير Atmosphère éthérée (F).

Ethereal atmosphere (E).

الأثير عند علماء الطبيعة هو مادة تقع تحت الوزن تتخلل الأجسام ويكون امتداد الصوت والحرارة بواسطة تموجاتها .

٣٩٣ - إثارة هي عود الريح اي البربريس

٣٩٤ - أئغم Aethéogame (F). Aetheogamous (E).

نعت تعريفي يطلق على النباتات الخفيات الزهر من ذوات الاعضاء التناسلية .

٣٩٥ - إئصال Sédimentation (F). Sedimentation (E).

عملية حكيمة تقوم على ترك السائل المقصود بعض الوقت لتفرقة أجزائه وتجهيدها .

٣٩٦ - أثل* ، طرفاء ، عبل Tamarix (S).

Tamaris (F). Tamarisk, T. salt tree (E). Tamariske (D). Tamarice, Mircia, Bruca (I).

جنس اشجار وشجيرات وجنبات من فصيلة الاثليات . أنواعه المعروفة تقارب ١٤٠ ، معظمها من نباتات حوض البحر المتوسط ، بعضها صحراوي ومنها جبلي ينبت في الاصقاع المعتدلة . جميعها برية وقد تزرع للتزيين ولصد الرياح || ساقها قصيرة ، اغصانها غليظة متفرعة متدلية ومنها ساقطة . افئادها قليلة ، افئانها كثيرة ودقيقة . اوراقها حرشفية . أزهارها سنبلية التجميع صغيرة بيضاء أو وردية اللون خشوية التركيب أو ثنائية المسكن . بتلاتها من ٤ الى ٦ ، اسديتها مندعمة لا يقل عددها عن ٤ ولا يفوق ١٠ ، اقلامها من ٣ الى ٥ || أشهر أنواعه أثل المن اي الطرفاء التي يحث منها مادة سكرية غذائية تسببها حشرة غشائية الاجنحة توخر الزهر وجراة الاملوج فتعمل المن المعروف بالطرفة || يتكاثر الاثل بالبذور وبالعقل . يعيش وينمو في جميع الأتربة من التربة الصحراوية الى الطينية ، ومن الجافة الى المنقعية . وهو يصلح للسياجات الحية قرب الشواطئ لانه لا يخشى الاملاح البحرية || اخشابه مرغوب فيها تستعمل في صناعة السفن والقصع والادوات الزراعية || من أنواعه المعروفة :

Tamarix Jordants	أثل أردني
» smyrnensis	أثل زمري
» africana	أثل افريقي
» mannifera	أثل المن ، طرفاء المن ، حطب أحمر
» anglica	أثل انكليزي
» campanulata	أثل جرسي
» tetrandra	أثل رباعي الاسدية
» tetragyna	أثل رباعي الاقلام
» hispida	أثل زغبى
» syriaca	أثل سوري
» arborea	أثل شجري
» passerinoide	أثل صحراوي
» chinensis	أثل سيني
» tigrensis	أثل عراقي ، اثل دجلة
» gallica	أثل فرنسي ، عذبة
» macrantha	أثل كبير الزهر
» orientalis, T. articulata	أثل مفصلي ، عبل
» nilotica	أثل نيلي ، طرفة
» indica	أثل هندي

٣٩٧ - أثلب ، إئلب Tesson de pierre (F).

Fragment of broken stone (E).

الأثلب والإثلب ثنات الحجر . ج أثالب .

٣٩٨ - أئلمة ، بلاسمه Plasma

هي المادة الميولية الذرية الشديدة الميوعة التي تحضن نواة الخلية .



أثل



أثمان

٤٠٨ - أثينة* ، رغل ، تاخيم ، رجل الإوز ، إكشون ، أنصيرين

Chenopodium (S). Ansérine, Chénopode (F). Goose-foot (E). Gänsefuss (D). Chenopodio (I). جنس نباتات من فصيلة السرمقيات. أنواعه نحو ٦٠ جميعها أعشاب وجنبات حولية ومعمرة. أكثرها طيبة ومنها الغذائية المأكولة. مهدا البلاد الحارة والمعتدلة || يستخرج من بذورها زيوت طيارة تستعمل في الطب.

٤٠٩ - أثينة بيضاء ، رجل الإوز البيضاء ، ركب الجمال ، أنصيرين بيضاء

Chenopodium album, Ch. anthelminticum (S). Ansérine blanche, Chénopode anthelmintique, Poule grasse, Grasselline (F). Fat-hen, Lamb's quarters, White goose-foot (E). Welser gänsefuss, Weiße melde (D). Chenopodio blanco, Atriplice salvatico, Gallina grassa, Farinaccio (I).

نوع من الاثينة يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه تطول نحو ١٥ سم. فصلها مسنن الخافة || وهو نبات طيب بري كان ولا يزال يستعمل في عدة علاجات ومستحضرات تقوي الهضم وتدر الطمث وتضاد التشنج. بذوره طاردة للديدان. يعرف في البلاد المصرية باسم «فساء الكلب» والكلاب والسنانير تأكله علاجاً من تخمة أو عارض معوي.

٤١٠ - أثينة عطرية. Chenopodium ambrosioides (S). Chénopode fausse ambrosie, Ambrosine, Thé du Mexique, Thé des Jésuites (F).

نوع من الاثينة وهو نبات طيب حولي بري وزراعي، أزغب العروق والأوراق، يعلو نحو ٨٠ سم. || أوراقه صغيرة أهليلجية. أزهاره هامية. أوراقه وأزهاره تستعمل استعمال الشاي.

٤١١ - أثينة كبيرة. Chenopodium giganteum (S). Chénopode géant (F).

جنبية تزيينية تعلو نحو المترين ، ساقها مضلعة ، أوراقها مثلثة الزوايا كبيرة الحجم طويلاً وعرضها نحو ١٤ سم. فصلها خلي اللبس تعلو زغبة الى الجؤوة الزاهية. أزهارها هرمي الشكل ، هامى الارتكاز. تزهى من أوائل آب الى أواخر تشرين.

٤١٢ - أثينة كينوا Petit riz (F).

هي الكينوا ، نبات زراعي مأكول الثمار ، اطلبه .

٤١٣ - أثيؤفس* Salvia Aethiopis (S). Ethiopienne, Sauge d'Ethiopie (F). Ethiopian sage (E). Ungarische salvei (D). Salvia di candia, S. lanata (I).

جنس نباتات نجمية معمرة برية وزراعية ، عطرة وطيبة من فصيلة الشفويات || أنواعه عديدة أشهرها القويسة والقصمين والخرنه والمردكوش الاحمر . اطلبها .

٤١٤ - أثيؤنيمه* ، غيريبة Aethionema (S). Aethionème (F). Candytuft (E). Steintsächel (D). ätionema (I).

جنس نباتات جنبية او عشبية من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة منها الحولية والحولة والمعمرة . أوراقها لاطنة ، مستدقة النصل ، متناوبة الارتكاز او متقابلة . أزهارها تاجية ، وردية اللون او أرجوانية او بيضاء . ثمارها زورقية مستطيلة || أشهر انواعه ما يلي وصفها .

٤١٥ - أثيؤنيمه أرمنية Aethionema armenum (S). Aethionème arménien (F).

بجلة معمرة صغيرة القد فرعاء تعلو نحو ٢٥ سم. ساقها وفروعها منتصبه أوراقها قصيرة النصل ، هدية الختار ، مدبة العقصة . أزهارها صغيرة مستطيلة أرجوانية اللون .

٤١٦ - أثيؤنيمه قلبية الورق Aethionema cordatum (S). Aethionème cordé (F).

بجلة صغيرة معمرة قليلة الفروع . أوراقها قلبية الشكل والسفل منها متقابلة . أزهارها كبيرة القد. كبريتية اللون . وهي من نباتات الجرود الطوعية يوجد منها قرب اورز لبنان وفي الجبل الشرقي .

٤١٧ - أثيؤنيمه قلمية Aethionema stylosum (S). Aethionème stylé (F).

بجلة صغيرة معمرة ، قصيرة الساق ، قليلة الفروع. أوراقها رحيمة النصل . أزهارها مستطيلة الاطلام ، سنبلية التجميع ، كبيرة القد ، وردية اللون . اقليمها الجرود اللبنانية.

٤١٨ - أثيؤنيمه قنبرية Aethionema cristatum (S). Aethionème huppé (F).

عشبة حزمية حولية . أوراقها السفلى بيضية الشكل اما العليا فقلبية . أزهارها صغيرة وردية . تثبت في الاتربة الطينية . اقليمها البلاد الداخلية البعيدة عن الرياح البحرية.

٤١٩ - أثيؤنيمه كبيرة الزهر Aethionema grandiflorum (S). Aethionème à grandes fleurs (F).

بجلة صغيرة معمرة تعلو ٣٠ سم. ساقها فرعاء . أوراقها مستدقة ، نصلها خيطي الصفحة البحرية اللون. أزهارها أرجوانية ، سنبلية التجميع ، متقاربة الابعاد .

٤٢٠ - أثيؤنيمه لبنانية Aethionema libanotica (S). Aethionème libanais (F).

بجلة معمرة تعلو نحو ٢٥ سم. ساقها فرعاء . أوراقها متعاقبة ، نصلها خطي الصفحة الباهة الخضار. أزهارها كبيرة القد ، أرجوانية اللون . ثمارها زورقية . تكثر في الجرود اللبنانية حتى ارتفاع ١٤٠٠ م.

٤٢١ - أثيؤنيمه متقابلة الورق Aethionema oppositifolium (S). Aethionème à feuilles opposées (F).

بجلة حزمية معمرة . ساقها فرعاء . فروعها قصمة. أوراقها لحمية ، اسطوانية النصل ، متقابلة الارتكاز . ثمارها خرنبية ، أهليلجية ، مجلونة ومفروضة القمة . أزهارها صبي . أزهارها أرجوانية متوسطة القد . توجد في معظم القمم اللبنانية .

٤٢٢ - أجاج Saumâtre, Salé (F). Briny (E).

الأجاج هو الملح الشديد الملوحة والمرارة .

٤٢٣ - إجارة Bail (F). Lease (E).

هو عقد يدعى احد طرفيه مزجراً فيلتزم به الطرف الثاني الذي يدعى مستأجراً ان يمكنه من استغلال العين المؤجرة واستعمالها الى اجل معين مقابل بدل معلوم .

٤٢٤ - إجارة ، كراء Louage (F). Letting (E).

عقد يلتزم به احد الطرفين بتمكين الطرف الآخر من الانتفاع بالشيء المؤجر وقتاً معيناً مقابل قدر من المال



أثينة



أثيؤفس



أثيؤنيمه

٤٣٦- إجاص ، إجاص شائع ، إنجاص ، كُمثري

Pirus communis (S). Poirier, Poirier commun (F). Pear tree (E). Echter birnbaum (D). Pero (I).

شجر مشر من سبط الأجاصيات وفصيلة الورديات. أنواعه الأصلية عديدة سنذكرها فيما بعد. أما ضرابه الزراعية فلا تقل عن ٧٠٠ تغرس لثمارها || والأجاص من الأشجار الطرية الشكل، الغليظة الساق، العمودية الجذور، العابلة الأوراق || أوراقه متعاقبة، بسيطة، مسننة الحافة، معنقة، بيضبة. وأما النصل فصفحة السفلى زباء في أول عهدها ثم ملساء لامعة || أزهاره نوري التجميع. أزهاره كبيرة البتلات، بيضاء اللون غالباً وقد تكون وردية. ثماره شبه كروية مستطيلة أو كروية، معظمها مأكول لذيد الطعم ذكي الرائحة سكري العصارة ومنها ما يستعمل في صناعة المربيات وغيرها لاستخراج الكحول وبعض المشروبات الكحولية || والأجاص من الأشجار التي تتطلب بعض العناية ولا تجود إلا في إقليمها الخاص وفي الأراضي الصالحة. ولكل ضرب من الأجاص تربة وأقليم يجدر معرفتها قبل القيام بأي عمل زراعي إحصائي كان. والأجاص بوجه عام يخشى شدة الحر وصبارة القفر ويرغب في التربة الطينية الرملية الجصية العميقة الغور، المتوسطة الاندماج، القليلة الرطوبة، الغنية بجميع العناصر الغذائية. يتكاثر الأجاص بالبذر وبالتطعيم ولا يستعمل البذر إلا للحصول على أنواع جديدة وأما التطعيم فشائع الاستعمال وهو يمتناول الجميع وقد يتم على عدة أشكال من الرقعة حتى المذلولف. ويطعم على الأجاص البري والزعرور والسفرجل. ضرابه عديدة لا تقل عن ٧٠٠ كما ذكرنا أعلاه، منها وطنية كانت كثيرة الانتشار وقد قلت زراعتها الآن ومنها اجنبية كثرت زراعتها ولا تزال على ازدياد نظراً لجودة صنفها || وفي الجدول التالي نذكر جميع الضروب الوطنية وأشهر الضروب الاجنبية مع صفاتها وخواصها المميزة :



بوره هردي



دوشس انغولم

يتفق عليه || وهذه الاجارة قد تكون اجارة اشياء او عمل او خدمة.

٤٢٥- إجارة اشياء Louage de choses (F).

عقد يلتزم المؤجر فيه بتسكين المستأجر من الانتفاع بالشيء المؤجر سواء أكان ثابتاً أم منقولاً.

٤٢٦- إجارة الماشية Bail à cheptel (F).

هي الاجارة التي تنعقد على قطع من الماشية باعتباره مجموعاً. ويتحم على المستأجر حفظ المواشي وإطعامها والاعتناء بها بالشروط التي يبرمها بينه وبين المؤجر. وقد تأتي هذه الاجارة على ثلاثة اشكال.

٤٢٧- إجارة الماشية العادية Bail à cheptel simple (F).

هي التي تنعقد على قطع من الماشية يكون جميعه ملكاً للمؤجر. وينتفع المستأجر وحده بضرعها وروثها وعملها. أما صوفها ونتاجها فيقسم مناصفة بين المؤجر والمستأجر. فاذا هلكت كلها بالجائحة كان هلاكها على المؤجر أما اذا هلك بعضها فيضمن المستأجر النصف.

٤٢٨- إجارة الماشية بالمناصفة Bail à cheptel à moitié (F).

هي الاجارة التي يكون للمؤجر نصف القطيع المنعقد عليه، وللمستأجر النصف الآخر. وبمقتضى هذا العقد ينتفع المستأجر وحده باليان الماشية وروثها وعملها مقابل اعتنائه بها. أما الصوف والنتاج فيقسم بين المتعاقدين.

٤٢٩- إجارة حديدية Bail à cheptel de fer (F).

هي اجارة مزرعة بما عليها من الماشية. ويوجب فيها على المستأجر ان يرد عند انقضاءها عدداً من الماشية مساوياً، في القيمة، ما اخذه. فيكون النقص عليه والزيادة له.

٤٣٠- إجارة خدمة Louage de services (F).

عقد يستخدم به أحد الطرفين نشاط الآخر وعمله الفني بطريقة يكفل بها لنفسه عمله تحت اشرافه.

٤٣١- إجارة زراعية Affermage (F). Farming (E).

هو ان يؤجر المالك ارضاً زراعية مقابل اجرة سنوية معينة سواء كانت نقوداً او عيناً.

٤٣٢- إجارة عمل Louage d'ouvrage (F).

عقد يلتزم به احد الطرفين ان يعمل للطرف الآخر شيئاً معيناً يتقاضاه عليه ثمناً معلوماً.

٤٣٣- إجارة مزرعة Fermage, Bail à ferme (F).

Rent (of a farm) (E). ما يجب على مستأجر المزرعة دفعه الى صاحبها. وبعبارة اخرى هي نصيب صاحب المزرعة من غلة الارض. يعين مقداره في العقد بخلاف المزارعة (métayage) التي لا يعين في عقدها مقداره بل نسبة مثوية من الحاصلات.

٤٣٤- إجارة ، رخصة Licence

هي في القانون التجاري، بوجه عام، اباحة الاتجار بالبضائع غير الحرة.

٤٣٥- إجارة النفس للصيد البحري Charte de pêche (F). Charter of fishing (E).

يراد بها اجارة النفس التي يعقدها النوتي في سفينة مجهزة للصيد البحري.




شجرة إجاص



الكسندر



برغاموت



بكخس



بوره انجو


الثمرة	الشجرة			زمن الادراك	اسم شهرة الصرب	
	ميزاتها الخاصة	صفاتها الجنسية	شكلها وحجمها		الضروب الوطنية	
صفراء خضراء صغيرة الحجم	غذاء	متوسطة النشاط	متباينة وسطى	آب	Baladi	بلدي
صفراء حمراء كبيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	نصف مردنية فارشة	ايلول	Roumi	رومي
صفراء حمراء متوسطة الحجم	متوسطة الاتاء	متوسطة النشاط	نصف مردنية	تشرين الثاني	Chatawi	شتوي
صفراء كبيرة الحجم	مريعة	نشطة	متباينة كبيرة	ايلول	Ousmani	عثماني
صفراء صغيرة الحجم	متوسطة الاتاء	متوسطة النشاط	كروية متباينة	اواخر آب	Ousayfiri	عصيفيري
خضراء كبيرة الحجم	متوسطة الاتاء	نشطة	نصف متباينة	ايلول	Moukh al Baghl	مخ البغل
خضراء كروية كبيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	نصف مردنية	آب	Mourrab	مرآب
صفراء حمراء صغيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية وسطى	اوائل تموز	Miskawi	مسكاوي
فستقية اللون كبيرة الحجم	متوسطة الاتاء	متوسطة النشاط	هرمية	اوائل تموز	Masdaghani	مصدغاني (ابو سطل)
					الضروب الاجنبية	
خضراء متوسطة الحجم	غذاء	شديدة النشاط	مردنية	تشرين الاول	Alexander (Beurré Bosc)*	الكسندر*
	غذاء	متوسطة النشاط	هرمية	تموز	André Desportes	اندره ديپورت
	غذاء	شديدة النشاط	متباينة	كانون الثاني	Pergamotte Esperen*	برغاموت إسبرن*
	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية	شهر آب	Précoce de Trévoux	بريكوس تريفو
صفراء حمراء	غذاء	نشطة	مردنية	ايلول - تشرين	Packham's Triumph*	باكخمس تريومف*
	غذاء	نشطة	مردنية	تشرين الاول	Beurré d'Anjou*	بوره أنجو*
	مريعة	متوسطة النشاط	متباينة وسطى	تموز	Beurré Giffard	بوره جيفار
	متوسطة الاتاء	نشطة	هرمية	تشرين الاول	Beurré Diel	بوره دبال
خضراء صفراء متوسطة الحجم	غذاء	نشطة	متباينة وسطى	تشرين الثاني	Beurré clairgeau	بوره كلارجو
	غذاء	نشطة	مردنية	تشرين الثاني	Beurré d'Hardenpont	بوره هردنپون
	مريعة	شديدة النشاط	هرمية	ايلول	Beurré Hardy*	بوره هردى*
	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية وسطى	كانون الاول	Passe-Crassane*	باس كراسان*
خضراء صفراء صغيرة الحجم	مريعة	متوسطة النشاط	متباينة	كانون الاول	Président Drouard	بريزيدان دروار
				-	Triomphe de Vienne	تريومف فيانا
	متوسطة الاتاء	نشطة	نصف مردنية	تشرين الاول	Jeanne d'Arc	جاندرك
	غذاء	متوسطة النشاط	نصف متباينة	شهر آب	Docteur Jules Guyot	دكتور جول غويو
لوزيون أرفنش	غذاء	متوسطة النشاط	مردنية	تشرين الاول	Duchesse d'Angoulême*	دوشس انغولم*
	متوسطة الاتاء	شديدة النشاط	فارشة	تشرين الاول	Doyenné du Comice*	دوينه كوميس*
	مريعة	نشطة	مردنية	شهر آب	Clapp's favourite	كلابس فافوريت
	غذاء	متوسطة النشاط	مردنية	تشرين الاول	Conférence*	كونفرانس*
صفراء وردية صغيرة الحجم	غذاء	نشطة	نصف مردنية	تموز	Coscia	كوشيا
	مريعة	شديدة النشاط	مردنية	تشرين الثاني	Comtesse de Paris*	كونتس باريس*
	غذاء	متوسطة النشاط	فارشة ومتباينة	تشرين الاول	Louise Bonne*	لويز بون أرفنش*
	متوسطة الاتاء	نشطة	مردنية	تشرين الاول	William's Duchess	ويليام دوشس
	مريعة	متوسطة النشاط	مردنية	ايلول	William's*	ويليامس*



باس كراسان



لويز بون أرفنش




ويليامس



كونتس باريس



كونفرانس



دوينه كوميس

٤٤٦ - إجاص مُفَرَّض الورق. *Pirus trilobata* (S).*Poirier à feuilles trilobées* (F).

شجرة برية تعلو نحو ٦ أمتار . منبتها سورية ولبنان .
أوراقها ثلاثية أو خماسية التفريص ، مسنة الحافة ،
ملاء النصل || أزهارها عريضة ، أقلامها ملحومة القاعدة
فصلاتها زباء || ثمارها مستديرة كالتفاح .

٤٤٧ - إجاص هَاتِلِك *Pirus heterophylla* (S).*Poirier hétérophylle* (F).

شجرة كبيرة القد تعلو نحو ١٠ أمتار . منبتها التركستان .
أوراقها مفروضة شديدة الخضار ملاء النصل الامرط .
أزهارها صغير النورة . أزهارها عريضة ، أقلامها خماسية
طليقة || ثمارها صغيرة جامدة اللب .

٤٤٨ - إجاص يُنَّان *Pirus yunnannensis* (S).*Poirier de Yunnan* (F).

شجرة برية تعلو من ٦ الى ٨ أمتار . منبتها الشرق الأقصى .
أوراقها بيضية قليلة التفريص ، زغبية الصفحة السفلى .
أزهارها وردية اللون || ثمارها صغيرة ، بشرتها حمراء اللون
تعلوها وثمة بيضاء .

٤٤٩ - إجاصة ، كُمَثْرَاة *Poire* (F), *Pear* (E).

ثمرة الاجاص . الاجاصة في تصنيف الثمار وبالنسبة الى
فكاهتها واقبال الناس عليها تأتي بالمرتبة الثالثة بعد الدراق
والنفاحة || يختلف لون الاجاصة وشكلها وحجمها وطعمها
ومقدار عصيرها باختلاف ضربها وموقع زراعتها وبيئتها
التربة . ومع ذلك وبرغم التفاوت الاكيد نقول بناء على
تحاليل «كونيغ» ان متوسط ما يحواه لباب الاجاصة من
مواد غذائية هو :

/ .. ١٧٢	مستخلص جاف
/ .. ٢٥٧	حامض تفاحي
/ .. ٩٠	سكر محلل (غلوكوز وفيلوز)
/ .. ١٣	سكروز
/ .. ٣,٥	رماد
/ .. ٣,٥	بروتين (أزوت X ٦,٢٥)
/ .. ٥٦٧	حريرات او سعرات حرارية

أما الصربيت الموجود في لباب الاجاصة فنسبته تراوح
من ١٠ الى ٣٥ / .. والقيتين «ث» من ٢ الى ١٠ / ..

٤٥٠ - إجاصي ، كُمَثْرِي *Piriforme* (F), *Pyriform* (E).

نمت وصفي لشكل خاص من اشكال الثمار يشبه الاجاص .

٤٥١ - إجاصيات *Pirées, Poiriers* (F).

سبط الاشجار والشجيرات المعروفة بالاجاصيات من الفصيلة
الوردية . منبتها جميع الاصقاع المعتدلة الحرارة من الصين
حتى اوروبا الشمالية الشرقية || انواعها المعروفة قليلة .
أوراقها معنقة ، متعاقبة ، بسيطة ، بيضية الشكل ، منها
مسنة الحافة ومنها مقعوفة ومنها زغبية الك ن || أزهارها
نورية او فردية التجميع . ثمارها شبه كروية او مستطيلة
محصورة ، مستدقة العنق . اهانها لبني قوي تحرف السرة والقيد .

٤٥٢ - إجاجة *Angophora* (S), *Angophore* (F).

من اليونانية بهذا المعنى الماعا الى شكل الشجرة . جنس
اشجار حرجية وزينية من سيلة الآسيات . انواعه قليلة
العدد ، منبتها استرالية . وقها شاحنة ترتفع من ٢٠ الى
٢٥ م . اغصانها فارشة . أوراقها عروية متقابلة كاملة النصل
الاملس البشرة المذهب المعصية . أزهارها عذقية التجميع .
واليك اعرف انواعه .

٤٣٧ - إجاص البر اطلب برقوق البر .

٤٣٨ - إجاص باشيا *Pirus Pashia* (S).*Poirier Pashia* (F).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٦ الى ٨ أمتار . منبتها جبال
حلايا || أوراقها عميقة التفريص ، مثلثة الزوايا ،
شديدة الخضار . أزهارها منفرجة عريضة البتلات الوردية
اللون . اسديتها كثيرة تعد من ٣٠ الى ٣٥ || ثمارها
جلدية اللب ، صغيرة الحجم ، قطرها نحو ٢ سم .

٤٣٩ - إجاص بتوني الورق *Pirus betulaefolia* (S).*Poirier à feuilles de bouleau* (F).

شجرة متوسطة القد تعلو نحو ٦ أمتار . منبتها الصين .
أوراقها بيضية لونها الى الاخضر الزيتوني || أزهارها
منفرجة ، بتلاتها الى البياض . التبي . اسديتها نحو ٢٠ .
ثمارها مردنية صغيرة الحجم فستقية اللون تعلوها رقشة بيضاء .

٤٤٠ - إجاص تشُونُسْكِي *Pirus Tschonoskii* (S).*Poirier de Tschonoski* (F).

شجرة صغيرة القد منبتها اليابان . أوراقها قليلة التفريص ،
زغبية الصفحة السفلى || أزهارها عريضة وردية اللون .
ثمارها صغيرة صفراء اللون ، لها غزير العصارة .

٤٤١ - إجاص ثلجي *Pirus nivalis* (S).*Poirier nival* (F).

شجرة كبيرة القد تعلو نحو ١٧ متراً . منبتها اروبة .
زمناتها زباء . أوراقها بيضية الشكل . أزهارها كبير
النورة ، أزهارها بيضاء اللون . ثمارها مستديرة طويلة الاهن .

٤٤٢ - إجاص سُوري *Pirus syriacus* (S).*Poirier de Syrie* (F).

شجرة صغيرة القد تعلو نحو ٤ أمتار . منبتها سورية .
أوراقها مسنة ، زاهية الخضار ، زغبية الصفحة السفلى .
أزهارها متوسط النورة . أزهارها وردية اللون ، ثمارها
مردنية الشكل طويلة الاهن ، حامزة الطعم .

٤٤٣ - إجاص صَفَصَافِي الورق *Pirus salicifolia* (S).*Poirier à feuilles de saule* (F).

شجرة متوسطة القد ، شائكة الجذع والاصقان تعلو من ٥
الى ٨ أمتار . منبتها ارمينية والقوقاز || فروعها افقية
الالتشاب ، افنادها متدلية الاطراف || أوراقها كاملة ،
مسنة ، زغبية الصفحة السفلى || أزهارها كبير النورة ،
أزهارها تبينة اللون . ثمارها مردنية الشكل ، حامزة الطعم .

٤٤٤ - إجاص صيني *Pirus sinensis* (S).*Poirier de Chine* (F).


شجرة كبيرة القد تعلو من ١٠ الى ١٥ متراً . منبتها الصين .
أوراقها بيضية طويلة المنقصة ، مسنة ، هلبية
الاسنان ، لونها شديد الخضار اللامع || ثمارها كبيرة ،
غزيرة العصارة ذكية الطعم والنكهة .

٤٤٥ - إجاص لَوَزِي *Pirus amygdaliformis* (S).*Poirier amandier* (F).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٣ الى ٦ أمتار . منبتها اروبة .
شكلها شكل اللوز . أوراقها سمكية جلدية ، نصلها
زغبية الصفحة السفلى في طور نموه || أزهارها وردية
اللون . ثمارها خذروفية الشكل قصيرة الاهن .

٤٦٥ - أجرّة ، جعالة Salaire (F). Salary (E). هي مكافأة تدفع عادة نقوداً واستثناء عيناً الى من يعمل لغيره بمقتضى عقد العمل او وكالة مأجورة .


٤٦٦ - آجرة التفاح *^٥ Sesia myopaeformis, Aegeria myopaeformis (S). Sésie du pommier (F). Small red-belted clearwing (E). Apfelbaumglasflügler (D). حشرة من الآجريات طولها نحو ١٢ مم. رواشها جميلة التخطيط والزراش الملونة. رقتها صغيرة تطول نحو ١٥ مم. رأسه كسفي اللون ، جسمها برتقالي ، شبح ظهرها احمر. تركيب السوق والاغصان فتتخر اللحاء والشكير والخشب. تكافح باستعمال احد المواكين او الزيوت الصيفية وذلك للقضاء على مكن الحشرة قبل فقغه وتطوره الى يرقة .



آجرة التفاح

٤٦٧ - آجرة الحور *^٥ Aegeria apiformis, Trochilium apiformis (S). Sésie du peuplier (F). Poplar hornet clearwing (E). Bienenschwärmer (D). حشرة من الآجريات تفعل لعل آجرة التفاح ، تركيب الحور وتؤذيها .

٤٦٨ - آجرة الكشمش *^٥ Aegeria tipuliformis, Sesia tipuliformis, Synanthedon tipuliformis (S). Sésie du groseillier (F). Currant clearwing (E). Schnaken-glasflügler, Johannisbeer-glasflügler (D). حشرة من الآجريات تركيب الكشمش فتتخر سوقه . تكافح كآجرة التفاح باستعمال احد المواكين او الزيوت .




آجرة الحور

٤٦٩ - أجرد Aphylle (F). Aphyllous, Leafless (E). نعت تعريفي يطلق على كل نبات عادم الورق كالامسوخ والكشوث . م. جرداء .

٤٧٠ - أجرد Penis (F). Male organ (E). الاجرد والمجرد : قضيب ذوات الحافر .

٤٧١ - آجريات^٥ Aegeriidae, Sesilidae (S). Aegeridés, Sésilidés (F). Aegeridae, Clear-winged moths, Clearwings (E). Glasflügler, Glasschwärmer (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها زهاء ٨٠٠ . جيمها متوسطة او صغيرة الحجم . خطمها قصير جداً او أري ، رواشها طويلة ، ضيقة ، قليلة الزغب . جسمها دقيق مستطيل بين الحلقات . حشراتا نهارية الممرج ، سريعة الطيران . رقاتها تعيش على الالياف النباتية في سراديب تحفرها تحت اللحاء بين الشكير والخشب .



آجرة الكشمش

٤٧٢ - إجمال Rut des carnassiers (F). Rutting of carnivorous (E). أجملت واستجملت اللبوة والكلبة والهرة وكل ذات مخلب اشبهت الفعل وطلبت السفاد .

٤٧٣ - أجل ، مدّة ، ميعاد Délai (F). Delay (E). هو الفترة من الزمن يوقتها المتعاقدون لاجل القيام بعمل ما .

٤٧٤ - أجل ، ميثقات Terme (F). Term (E). التوقيت القانوني او التعاقدية لتنفيذ الالتزام او تحديد زواله .

٤٥٣ - إجانية سنائية الورق Angophora lanceolata (S). Angophore à feuilles lancéolées (F). شجرة سبروتية تعلو نحو ٣٥ م. اوراقها معنقة سنائية النصل . ازهارها بيض || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٤٥٤ - إجانية قلبية الورق Angophora cordifolia (S). Angophore à feuilles cordiformes (F). شجرة سبروتية . تعلو نحو ٢٠ م. اوراقها لاطئة المنق ، قلبية النصل . ازهارها الى الصفار الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى آب .

٤٥٥ - إجباء Vente de la récolte avant l'éplage الاجباء هو بيع الزرع قبل ان يبدو صلاحه او يدرك . يقال أجبأت الزرع .

٤٥٦ - إجتيرار Rumination عمل خاص بحيوانات فصيلة المجترات وهو اعادة الاغذية من الكرش الى الفم لمضغها .

٤٥٧ - إجتزاز ، جزّ ، قصّ Tondage (F). Clipping (E). قطع صفوف الحيوانات او شعرها ووبرها من غم وماعز وغيرها .

٤٥٨ - إجتشفّ Déshydrater (F). ازال الماء من الشيء .

٤٥٩ - إجتشفاف Déshydratation (F). Dehydration (E). ازالة الماء من الشيء .

٤٦٠ - أجدرّ ، أرشمّ ، أرشمّ ، أورس Débourrer (F). To put forth (E). يقال اجدر او ارشم او ارشم او اورس الشجر اذا اخرج ورقه .

٤٦١ - أجدل هو الصقر ، اطلبه .

٤٦٢ - آجر اطلب اكري .

٤٦٣ - آجر Briques (F). Bricks (E). قريد من الغضار مستطيل الشكل منسوب القالب يذهب في النار ضمن افران خاصة تطبخه حتى اشي . يستعمل في البناء . وان ذهب في الشمس فهو اللبن || الواحدة آجرة .

٤٦٤ - إجرّاء Formalité (F). Formality (E). هو تنفيذ بعض الشروط التي تتناول ظاهر العقد حتى يصبح صحيحاً . والاعجراءات عديدة أهمها :

اجراءات باطنية Formalités intrinsèques (F). Intrinsic formality (E).

اجراءات جوهرية Formalités substantielles (F). Substantial formality (E).

اجراءات خارجية Formalités extrinsèques (F). Extrinsic formality (E).

اجراءات سابقة Formalités antécédentes (F). Preceding formality (E).

اجراءات عرضية Formalités accidentelles (F). Accidental formality (E).

اجراءات لاحقة Formalités subséquentes (F). Subsequent formality (E).

اجراءات مصاحبة Formalités concomitantes (F). Concomitant formality (E).

اجراءات مزهلة Formalités habilitantes (F). Qualified formality (E).

٤٨٩ - أجوف، مقعر
Concave
خلاف المحدث .

٤٩٠ - أجوف المنقاد
Cavirostre (F).
Cavirostre (E).
نعت تعريفي يطلق على كل طائر مكثف المنقاد .

٤٩١ - أجيد الأدغال *
Augiades comma (S).
Augiade des buissons (F). Augiades comma (E).
حشرة من فصيلة المسيريات ورقية حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأدنى الى اوروبا المعتدلة الحرارة . فراشاتها تجوب البراري والادغال قوتها رحيق الازهار . اساريها خاضعة تعيش على اوراق نباتات الفصيلة القرنية || جسمها صغير القد يطول نحو ١٥ مم . بسطتها نحو ٣١ مم . رأسها كبير الجرم حنطي اللون . عيناها زُميتان ، ناشزتان . زبانها صولجانيان دقيقان . جوشها وبطنها كثيفا الحمل لونها الى الحنطي الاسمر || رواشنها متباينة التخضب بين الشقين . رواشن الذكر الى الغبرة الحنطية يعلوها في الزوج الامامي جدة برتقالية يطوقها اطار بني ، ويعلوها في الزوج الخلفي فسحة خضراء صفراء || رواشن الانثى الى البي العنابي يطوقها اطار كستني || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تعاغل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح المكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، ملس القشار ، اسود النقط الجانبية . ثوبها الى الخضار الالسن تعلو اربعة خطوط قاطبة سوداء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي ضمن صلبة تنسجها السرفة بين افنان النباتات الدغلة .

٤٩٢ - أجير
Salié (F). Salaried, Paid (E).
كل عامل عادي يتقاضى اجرة عمله .

٤٩٣ - أجيتراتوم

الأجيراتوم هو الغولان نبات من المركبات ، اطلبه .

٤٩٤ - أجيل *
Aegialia (S).

Aegialie (F). Aegialia (E).
جنس حشرات من فصيلة الخنطيات غديات الاجنحة صفيحيات القرون . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد . اطوالها تراوح من ٤ الى ٦ مم . اجسامها شبه كروية الشكل . ألوانها سوية اللون منها الاسود والاسمر والحنطي الاغبر || اعطائها سواحل البحر الابيض المتوسط . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى منتصف الصيف || يرقاتها صغيرة ، دقيقة ، غبراء اللون ، سمراء الرؤوس تتركب بدور النباتات المختلفة فتقرضها وتعطها وتسيء الى نموها .

٤٩٥ - أجيل

الاجيل : الطين يجمع حول النخلة جمعه أجيل .

٤٩٦ - أجيئة
Urne (F). Urn (E).
هي الوعاء الجرابي الشكل الذي يحفظ بويغات الطحالب .

٤٩٧ - أجيئة *
Céphalote (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الاجينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها ممررة ، فريشة ،

٤٧٥ - إجل
Harde (F). Herd (E).
جمع من الايائل والغلباء وبقر الوحش الخ...

٤٧٦ - أجم
Bélier sans cornes (F).
Ram without horns (E).
كباش لا قرن له .

٤٧٧ - إجماعية
Unanimisme (F).
Unanimism (E).

الاجماعية مذهب ادبي يقول ان الاخرى بالكاتب الاديب اظهار السيكولوجية البيئية العامة من عرض السيكولوجية الفردية الخاصة .

٤٧٨ - إجمال ، جمل ، ضم
Remembrement.
Réunions parcellaires (F). Reconstitution (E).

هو ضم الاراضي الزراعية او توحيد القطع في الارض المجزأة .

٤٧٩ - إجمام ، جث
Recépage (F).
Cutting down close (E).

قطع الشجرة او الجنبه او الكرمة إما لتجديد نشاطها وإما للتعليم

٤٨٠ - أجمصة
Perchis, Fourré de bois (F).
Furry, Thicket (E).

كل حرج لا تزال اشجاره دون العشرين سنة وقطرها دون العشرين سم . وهذه الاجمة قد تكون :

أجمة عالية السوق
Haut perchis
أجمة قصيرة السوق
Bas perchis, gaulis

٤٨١ - أجن
s'altérer (F).
To be impaired, To degenerate (E).

أجن الماء : تغير لونه وطعمه فهو آجن واجين .

٤٨٢ - إجناف ، إعتداء
Empiétement (F).
Encroaching (E).

هو وضع اليد على جزء من ملك الغير وضه الى ملكه .

٤٨٣ - أجنبي ، أعجمي
Exotique (F). Exotic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات غريب عن المحيط الذي استجلب اليه .

٤٨٤ - أجنف
Partial (F). Partial, Unfair (E).
ذو محاباة . او من مال عن الحق .

٤٨٥ - أجنهر ، خفش
Nyctalope (F).
Nyctalopic (E).
الاجهر من لا يبصر الا في الليل .

٤٨٦ - أجهزة زراعية
Matériel agricole (F).
Agricultural material (E).

الاجهزة الزراعية والعتاد الزراعي والمعدات الزراعية هي مجموعة العدة الزراعية التي يتألف منها الجهاز الاستثماري .

٤٨٧ - أجوائي
Météorologiste,
Météorologue (F). Meteorologist (E).


عالم بالحوادث الجوية اي الجويات .

٤٨٨ - أجر
Gages, Salaires (F).
Pawns, Hires, Wages (E).


هي ما يتقاضاه خدم المنازل والاجراء الزراعيون من بدل .



أجيد الادغال



أجيل



اجينة

٥٠٧ - أحافير أولية
Fossiles de la couche primaire (F). Primary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الاولى تندرج تحتها احافير الحيوانات اللافقارية والاسماك والفواذب .

٥٠٨ - أحافير بدائية
Fossiles de la couche archéenne (F). Primeval fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية البدائية تندرج فيها النباتات العديمة الزهر والنباتات الصنوبرية .

٥٠٩ - أحافير ثلثية
Fossiles de la couche tertiaire (F). Tertiary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الثلاثية تندرج تحتها متحجرات الثدييات والحشريات والنباتات المزهرة .

٥١٠ - أحافير ثنائية
Fossiles de la couche secondaire (F). Secondary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الثانوية تندرج تحتها احافير الزحافات والطيور والاصدف والحيوانات القشرية والمرجانية وبعض انواع الحشرات من فراش وتل وجنادب .

٥١١ - أحافير رباعية
Fossiles de la couche quaternaire (F). Quaternary fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الرباعية وفيها تقع احافير الانسان .

٥١٢ - أحال اطلب أسند .

٥١٣ - إحالة ، إستحالة ، فسَاد
Altération (F). Alteration (E).
هي تغيير جوهر الشيء وطبيعته حتى يفسد وضد استعماله وقيمه .

٥١٤ - أحسن
Hydropique (F). Dropsical (E).
أحسن ومحبون : مصاب بداء الحبن .

٥١٥ - إحتباس البول
Rétention d'urine (F). Retention of urine (E).
عارض يصيب الحيل والبقر والفم يمنعها عن التبول .

اسبابه مختلفة وعلاجه ايضا لذلك يحسن استدعاء الطبيب البيطري الذي يستطيع القيام بالواجب بعد تشخيص السبب .

٥١٦ - إحتجاز ، إحتجاز
Clôture (F). Enclosure (E).
هو اقامة حاجز او كل ما يفصل بين عقارين يملكها مالكان على ان يقام هذا الفاصل وفقاً لما نص عليه القانون .

٥١٧ - إحتراز راجع اتقاء .

٥١٨ - إحتراق
Combustion
عمل الاشتعال وهو مجموعة الحوادث الكيماوية التي ترافق انفعال الجرم مع الاوكسجين .

٥١٩ - إحتش ، حش
Faucher (F). To mow (E).
قطع بالمنجل او بالحشة نباتات الكلاء من المربة او المرعى .

٥٢٠ - إحتشاش *
Fauchage (F). Mowing (E).
قطع النباتات العلفية او الكلاء في الحقول او المروج اما بالمنجل او بالحشة الآلية .

عامة الساق . منبتها الطوعي مناطق البلام الحارة || اوراقها معتقة اهليلجية اتصال يتخللها معاليق متوجة بحبوب حقيّة الشكل ، مصراعية الاغلاق تنفتح وتغلق عند الحاجة . جيوها تفرز مادة سكرية تجذب الحشرات حيث يقضى عليها بعد وصد الاغلاق . ازهارها شبه سنبل التجميع يرتكز على شمراخ نحيل ليفي المادة . ثمارها أخينية || تزرع للتزيين في المراكن وفي المواقع التي لا تخشى الصقيع في الشتاء .

٤٩٨ - أحياتيات
Cephalotaceae (S). Céphalotacées (F). Cephalotaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات . اجناسها

وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو الاستوائية . يكثر وجودها على ضفاف المناطق والقدرا || جميع انواعها اعشاب فريشة ، عديمة السوق ، اهليلجية الاوراق المعتقة المختلطة بحبوب حقيّة الشكل مصراعية الاغلاق . ازهارها عديمة التويج ، صغيرة الحجم ، سداسية البتلات الشخينة اتصال ، سنبلية التجميع ترتكز على شمراخ منتصب ليفية التركيب . ثمارها اخينية ، فقيرة . || اشهر اجناسها الاجينة .

٤٩٩ - آح ، آحين ، السومين ، سويداء
Albumine (F). Albumin, Albumen (E).
مادة لزجة بيضاء اللون مالحه المذاق تعتبر من المصادر

المباشرة للاجسام المركبة || وهو تركيب تألفي عضوي عيم الانتشار يؤلف بياض البيضة ومصل الدم ويدخل في تركيب الكيلوس واللحفا وبعض الافرازات الجسدية . وهو كذلك مادة ازوتية توجد في انسجة الحيوان والنبات . تكثر في حبوب النباتات الزيتية وفي اللوباء والفاصوليا والفول والهلين .

٥٠٠ - أحاث

Paléontologiste, Paléontologue (F). Palaeontologist (E).
الاحاث من تعاطى الإحاثه اي علم مطورات الارض من حيوان ونبات .

٥٠١ - إحاثه
Paléontologie (F). Palaeontology (E).
الاحاثه او علم الاحاثه هو علم انواع مطورات الارض من النبات وغيره .

٥٠٢ - أحادي المحور
Uniaxe (F). Uniaxis, Monaxial, Monaxonie (E).
حيوانات بحرية من الاسفنجيات .

٥٠٣ - أحادية الفروع
Monactinellidés (F). Monactinellidae (E).
حيوانات بحرية من الاسفنجيات .

٥٠٤ - إحاشة
Rabattage (F). Beating (E).
حصر الصيد وتسييره من جهة الصيادين .

٥٠٥ - أحافير ، متحجرات
Fossiles (F). Fossils (E).
هي البقايا العضوية المتحجرة في مختلف الطبقات الارضية .

٥٠٦ - أحافير أصلية
Fossiles de la couche primitive (F). First fossils (E).
هي احافير الطبقة الارضية الاصلية تندرج فيها احافير ذوات الارجل المهنحة والحيوانات شبه المفصليّة والحيوانات الشعاعية والاسفنجية .



إحتشاش

٥٢٠ - إِحْتِكَاكِيَّة (F). Tribométrie (F).

Tribometry (E). الاحتكاكية فرع من الفيزياء يبحث في مقاييس الاحتكاك ، قوتها ومفاعيلها .

٥٣١ - إِحْتِلَاب ، حَلَب (F). Traite, Mulsion (F).

Draw milk (E). اخراج الحليب من ضرور اناث الدواجن وقد يتم ذلك اما باليد او بواسطة حلابات آلية .

٥٣٢ - إِحْتِيَاطِي (F). Réserve (F) Réserve (E).

هو حفظ الحق وقد يستعمل في عدة صيغ يتبع أشهرها .

٥٣٣ - إِحْتِيَاطِي الضمان Réserve de garantie

وهو المال المحبب في التأمينات لمواجهة الفرق بين الواقع والمتوقع ومن الواجب ان يصل الى ١٠ ٪ من الاحتياطي الحسابي .

٥٣٤ - إِحْتِيَاطِي حسابي Réserve mathématique

هو المبلغ المأخوذ من قسط التأمين على الحياة والمفروض على المؤمن رسمته حفظاً للتأخران بين قيمة تعهداته وبين تعهدات المؤمن له .

٥٣٥ - إِحْتِيَاطِي قانوني Réserve légale

هو المال الذي يجب على كل شركة مساهمة تجهيزه من ارباحها الصافية بنسبة ٥ ٪ على الاقل حتى يصل مجموعه الى عشر رأس المال .

٥٣٦ - إِحْتِيَال (F). Swindling (E).

الاحتيال هو ابتزاز مال الغير بالخدعة .

٥٣٧ - أَحْدَاث جَوِّيَّة Phénomènes

météorologiques (F). Meteorological phenomena (E). هي مجمل الظواهر الجوية المميزة الموصوفة

٥٣٨ - إِحْدَاثِي (F). Co-ordinate (E).

تعريف للقضايا الاحتمالية المتناظرة او المتناسبة .

٥٣٩ - أَحْدَل Anorchide (F). Anorchid (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ذكر من الانسان والحيوان تنقصه خصية او تليسة .

٥٤٠ - أَحْدَل

أحد م. حذاء: خفيف شعر الذنب . فرس أحد . قطاة حذاء: لقصر ذنبها وقلة ريشها وسرعة طيرانها . قال النابغة يصف القطا :

« حذاء مقبلة سكاء مدبرة

للماء في النحر منها فوطه عجب »

٥٤١ - إِحْرِيض إطلب قرطم .

٥٤٢ - إِحْسَاب ، إَغْرَاب (F).

Albinisme (F). Albinism (E). حصول حذول مفاجئ في لون النبات او في الحيوان . يقال اغرب النبات فهو مغرب واحسب الفرس .

٥٤٣ - أَحْسَب ، مُغْرِب (F). Albino (E).

من يكون قد احسب او اغرب من الدواب والنبات

٥٢١ - إِحْتِضَان ، تَرْخِيم Accoupage (F).

Hatching (E). هو حضن البيض للتفقيس . لذلك يحسن تنظيف الحاضنة او السل او الصندوق المعد لاقتبال البيض قبل وضع البيض ومن الافضل رشه بمسحوق الفريدب او الكبريت الناعم لوقايته من القمل والقراد .

٥٢٢ - إِحْطَاب Affouage (F).

The communal right of cutting wood (E). يكون حق الاحتطاب اي جمع الحطب نافذاً عند اعلان اللائحة الاسمية بالسكان الذين يحق لهم الاحتطاب من حرج القرية المشاعي .

٥٢٣ - إِحْطَار ، تَقْعِير Excavation

٥٢٤ - إِحْطَان ، تَبْيَغ Congestion

الاحتقان تدفق الدم بكثرة على محل معين من الجسم .

٥٢٥ - إِحْطَان الرِجْل Fourbure (F).

Foundering, Inflammation of the feet (E). احتقان ويلي التهاب في التسيج الحي من حافر الفرس وظلف البقرة || اسبابه عديدة منها ثقل الجسم والاستراحة الطويلة يعقبا العناء والعلف الغني بالمواد الازوتية . عوارضه : اكتئاب وقه ثم انحطاط ورجفة وحرارة . العناية : فصد الحيوان ، تمرير قوائمه بالحدول ، تجريعه نقيع الالوة اي المقر بمعدل ٣٠ او ٤٠ غرام .

٥٢٦ - إِحْطَان رِئَوِي Congestion pulmonaire (F).

Pulmonary congestion (E). مرض يصيب الحيوان سببه تدفق الدم بكثرة على الرئة . عوارضه : جود عن الحركة ، فج في القوائم ، استرسال الرأس على العنق ، اكتئاب وحرارة ، استعجال في التنفس ، امتداد في المنخرين ، سيلان راغ لا يخلو من بعض خيوط الدم || العناية : بذل المستطاع لتسهيل التنفس وذلك بتمرير القوائم وسلسلة الظهر بمسحوق الحدول .

٥٢٧ - إِحْطَان مَعَوِي Congestion intestinale (F).


Intestinal congestion (E). اصابة الامعاء بالاحتقان الذي سببه تدفق الدم على هذا العضو || عوارضه : مغص ألم ينتاب الحيوان فيرتجي ارضاً ثم يقوم بنزقة ليرتمي من جديد ويطث في التنفس وانخفاض وتقطع في النبض وعرق غزير || العناية : فصد الحيوان وتمرير جسمه بالحدول ثم تجريعه بعض السوائل المسكنة .

٥٢٨ - إِحْتِكَار ، حَصْر Monopole (F).


Monopoly (E). هو حق يؤثر به شخص واحد او جماعة او شركة مغفلة تستغل به ولا ينافسها فيه احد . والاحتكار قد يكون نسبة الى مصدره : قانوني ، واقعي ، خاص ، عام ، مالي ، اداري .

٥٢٩ - إِحْتِكَار ، حَكْر Accaparement (F).

Monopolizing, Forestalling (E). هو ان تحصر البضائع او الاطعمة او السندات المالية عامة او خاصة حصراً مفتعلاً على يد فرد او جماعة للاستطاعة من فرض الثمن وكسب الارباح الباهظة .



احتلاب



أحقب



أحيون



أخاطة



أخبل

٥٦٠ - إحياء ، عِمَارَة Défrichement (F).
Clearing, Breaking up (E).
اعداد الارض للزراعة وذلك بمسد تنظيفها من مختلف النباتات البرية او الحرجية التي لا تلائم الزراعة المرغوب فيها.

٥٦١ - أحيائي ، عالم أحيائي ، بيولوجيست Biologiste (F). Biologist (E).
الأحيائي من تعامل في البيولوجية اي علم الاحياء .

٥٦٢ - آحين راجع آح .

٥٦٣ - آحين عضلي ، ميوزين Myosine (F). Myosin (E).
مادة آحسية تستخرج من النسيج العضلية الموجودة في الجثث والجيف .

٥٦٤ - آحيئي Albumineux (F). Albuminous (E).
حاوي الآحين من مختلف المصادر اخصها النباتات .

٥٦٥ - آحيون* ، كرشون ، رأس الأفقي ، أثنأ حَبَشَة Othonna cheirifolia (S).
Souci d'Afrique (F). Barbary ragwort (E).
Fiorrancio d'Africa (I).

نبات عشبي طبي معمر من فصيلة المركبات وهو نوع من الاثنا يزرع للتزيين || سوقه فرعاء يبلغ ارتفاعها نحو المتر . أوراقه قرنفلية الشكل باهتة الخضار . ازهاره هامية وقاجية الارتكاز || يتكاثر بالبذر والمقل . يوجد في جميع الأتربة المعتدلة التركيب ولا يخشى سوى الرطوبة المستحكة .

٥٦٦ - أخاذ Préhensile (F). Prehensile (E).
نعت وصفي يطلق على كل عضو يتميز بخاصة الاقتلاف والاخذ كاللسان والذنب في بعض الحيوانات والحشرات .

٥٦٧ - أخاطة* Achatina (S).
Achatine, Agathine, Agatine (F).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحلزونيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة اخصها افريقية . تعيش في المواقع الرطبة || اصداؤها كبيرة شبه اهليجية الشوزن جميلة الالوان الزاهية المتجانسة . اجسامها كبيرة لا تختلف عن اجسام الحلازين . جميع انواعها مأكولة || اشهر انواعها أخاطة مدغسكر بيضاء اللون مجذعة بالبنفسجي .

٥٦٨ - أخبع ، أوجن Apprivoiser (F).
To tame (E).
أخبع الطائر جعله أليفاً والوحش كذلك .

٥٦٩ - أخبل* Sula (S). Fou (F). Gannet (E).
جنس طيور مائية من كفيات القدم وفصيلة البجديات . انواعه ستة جميعها كبيرة الجثة . بسطة سقطها نحو ٢٠٠ سم . انواها الى البياض والبياض الازرق . مناقيرها كبيرة مقطوعة . أرجلها قصيرة السيقان || تعيش اسراباً كبيرة العدد . تتميز بطيشها وخجلها .

٥٧٠ - أخت الرمال اطلب الق الرمال .

٥٧١ - إختات Ravir (F). To ravish (E).
خطف . إختات الصقر الطائر : خطفه .

٥٤٤ - إحشاش Fauchaison (F). Mowing-time (E).
زمن الاحشاش او الحش وذلك عندما يصح قطع النباتات الملفية او الكلاء .

٥٤٥ - أحص ، حصيص قليل شعر الشنة والذنب وهو عيب في الخيل . الاسم الحصص .

٥٤٦ - إحصاء ، تعداد Recensement (F).
Census (E).
هو اجراء يراد به معرفة عدد الشيء المقصود او بعض الوقائع المعينة .

٥٤٧ - إحصائي ، باني Staticien, Statisticien (F).
Statistician (E).
من تخصص بعلم الاحصاء .

٥٤٨ - إحصائية ، بابة Statistique (F).
Statistical, Statistics (E).
علم يبحث في جمع الشوارد وترتيبها وتفصيلها .

٥٤٩ - أحفوري Paléozoologique (F).
Paleozoologic (E).
نعت تعريفية يطلق على كل ما هو مختص بالحفارة .

٥٥٠ - أحقب* Onagre (F). Onager, Wild ass (E).
حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حقويه والانثى حقباء .

٥٥١ - أحقل أحقل الزرع : تشعب عصفه قبل ان تغلظ سوقه .

٥٥٢ - إحلال ، إستبدال ، إبدال ، تغيير الإحلال هو امكان سلطة أو فرد Substitution
من إحلال سلطة اخرى أو فرد آخر فيما لها من قدرة .

٥٥٣ - أحلظ أحلظ وأخلط الرجل البعير : ادخل قضيبه في حياء الناقة .

٥٥٤ - إحليل Canal du pis (F).
الإحليل : مخرج البول من الانسان او الحيوان او مخرج اللبن من الثدي . ج إحليل .

٥٥٥ - إحتام اطلب آس .

٥٥٦ - أحتمق ، طارئ ، عارض Adventif (F). Adventitious (E).
نعت وصفي لبعض اعضاء النبات كالبزاعم مثلاً التي تظهر عرضاً في مواضع من النبات لم تألفها .

٥٥٧ - أحتناز غذائية* Equivalents nutritifs (F).
Equivalents nourishing (E).
هي معادلات المقادير اللازمة من اعلاف معينة تحوى العناصر المنسوبة الى وحدة مقررة من الشعير أو الشن . راجع جدول المواد الغذائية .

٥٥٨ - أحتج يقال أحتج الفرس اي ضم .

٥٥٩ - أحوار Jupiter (F). Jupiter (E).
الاحوار كوكب من مجموعة النظام الشمسي . ويدعى المشتري والهرجيس . اطلب مشتري

٥٨٣ - إختداج ، إستقاط ، إختفاد

Avortement (F). Abortion, Miscarriage (E).
هو القاء الدابة ولدها قبل تمام الايام . فان كان تام
الخلق فهو خديج وهي خادج وان كان ناقص الخلق
فهو مخدج وهي مخدج .

٥٨٤ - إختداج معدي (F). Avortement épizootique (F).
مرض معدي يصيب الابقار . Epizootic abortion (E).

٥٨٥ - أختدر* ، أختدري Equus asinus onager,
Asinus indicus (S). Onagre (F). Onager, Wild ass (E).
نوع من حمر الوحش وفصيلة الخيليات . اكبر جثة
من العير وأسرع منه ، موطنه بلاد فارس والهند الشرقية .
يقال ان تصالبه مع الحمار العادي كان دائماً جيد النتائج .

٥٨٦ - أختدريات (S). Oenotheraceae, Onagraceae (S).
Oenothéracées, Onagracées, Onagrarilées (F).
Oenotheraceae, Onagraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات .
انواعها نحو ٣٠٠ جميعها اعشاب وجنبات صغيرة .
منبتها العالم بمختلف اصقاعه || اوراقها بسيطة
متقابلة او متعاقبة . ازهارها خشوية رباعية الخدر .
ازهارها سنبل التجميع ، ناجي الارتكاز || معظمها
نباتات برية ومنها انواع تستعمل للتزيين ونوع آخر يزرع
لثماره التي تشبه الكماة وتؤكل .

٥٨٧ - أختدرية* Oenothera biennis (S).
Oenothère, Enothère, Onagre, Herbe aux ânes (F).
Evening primrose, Large ramplon (E). Echte
nachtkerze (D). Enagra, Rapunzia, Erba asina (I).

نوع من الاختدريات وهي جنبسة محولة مستندقة السوق
والفروع نحسة الهندام . اوراقها حاضنة بيضيه متعاقبة .
ازهارها جميلة زاهية لا قياسية التجميع والارتكاز ، رباعية
البتلات الكبيرة ، فواحة العروق المستحجب . لونها ابيض
ومنها ضروب تميل الى الاصفر || تتكاثر بالبذر ،
تبذر مشاتلها في اذار وتنقل الى مستقرها في ايار . تزه
ابتداء من ايلول || تجود في جميع الأتربة العميقة الغور
القليلة او المتوسطة الاندماج . تفضل المواقع الجنوبية
الكثيرة الشمس .

٥٨٨ - أختدود ، خدّ ، خدّة Blillon (F).
Ridge thrown up by plough (E).

حفرة سطحية ضيقة تحفرها في الارض مستطيلة .

٥٨٩ - آخر الشهر Akharnar, Achernard (F).
Acamar, Achernar (E).

آخر النهر نجم من المرتبة الاولى من كوكبة النهر المعروفة
ايضاً بكوكبة اريدانوس . يبعد عن الارض نحو ٧٠ سنة
ضوئية . مركزه في اواسط مؤخر النهر ويليه على مسافة
قريبة نجم آخر يدعى العظيم .

٥٩٠ - إختراج ، رفع ، نشل Déterrage (F).
Disinterred (E).

اخراج المحراث من التراب في آخر التلم .

٥٩١ - أختراس Pyrus silvestris, Achras (S).
Achras, Poirier sauvage (F). Achras, Wild pear (E).
Wolliger birnbaum (D). Pero salvatico (I).

ويدعى اجاص بري وكثري بري . نوع بري من الاجاصيات

٥٧٢ - إختبار Expérimentation (F).

Experimentation (E).
هو تجربة الشيء للوصول الى معرفة كل ما يمكن ان علمياً
او زراعياً او اقتصادياً وخاصة اذا كان ملائماً للغاية التي
من اجلها صار الاختبار

٥٧٣ - إختباز ، خبازة Panification
صناعة الخبز . تحويل الطحين اي الدقيق خبزاً .

٥٧٤ - إختبتار Condensabilité (F).
Condensability (E).

هي قابلية التختير .

٥٧٥ - إختزال Réduction (F). Reduction (E).
الاختزال ، اصطلاح كيميائي يقصد به فقد الاكسيجن
من مادة من المواد ليتحد مع مادة اخرى مكوناً بذلك مخلوطاً
كيمياوياً جديداً . فلهيدروجن اذا مر على اكسيد النحاس
الساخن ينتزع منه اكسيجنه ويتحد معه ليكون الماء .
فلهيدروجن يسمى عندئذ عامل اختزال اذ انه المادة التي
تنزع الاكسيجن .

٥٧٦ - إختصاص Compétence (F).
Competence, Cognizance (E).

هو اهلية الشخص للقيام بالعمل المنوط به او المولج بعمل ما .

٥٧٧ - إختصاص Spécialisation (F).
Specialization (E).

تفرد سلالة حيوانية بوجه واحد من اوجه الانتفاع .

٥٧٨ - إختصاص عقاري

Affectation hypothécaire (F).
هو حق رهن خوله القانون من صدّر له حكم يلزم
خصمه بدفع مبلغ معين له فيقيد على عقار مديته هذا الحق
وفاء لمطلوبه بطريق التفضيل على سائر الدائنين غير
المقيدين او المقيدين بعده .

٥٧٩ - إختيار Fermentation

الاختيار هو التحلل وتحول المواد العضوية بتأثير الخمائر .
وقد يأتي الاختيار على عدة اوجه : اختمار خلي ، اختمار
نشادري ، اختمار لبني ، اختمار زبدي ، اختمار كحولي الخ .

٥٨٠ - إختيار سميني Fermentation butyrique (F).
Fermentation butyric (E).


هو تحول بعض المواد العضوية كالسكر والنشا والآح الخ .
الى حامض سميني . وقد يتم ذلك تحت تأثير بعض العوامل
المجهريّة ولا سيما قضيمة الزيدة فيما يختص بالحامض اللبني .

٥٨١ - إختناق ، بثق ، رصع Asphyxie (F). Asphyxia (E).

اختناق تستعمل للحيوان . بثق ورصع تستعملان للنبات . وهو
بطء التنفس او امتناعه وسببه كثرة الماء في التربة او
عمق غرس النصبوب في الاتربة المماسكة الشديدة الاندماج .

٥٨٢ - إختياريّة Electisme (F).
Electism (E).

الاختياريّة مذهب فلسفي قوامه اختيار الآراء المستعسنة
والنظريات الصائبة من مصادرها المختلفة .




أختدر



أختدرية



أخراس أمريكي



أخروس



أخروط امرط



إخریط مجنح

٥٩٦ - أخروس صغير

Pirola minor (S).

Pirole petit (F).

نوع من الاخروس . منبته قم المضاب . ساقه تعلو من ٥ الى ١٥ سم . اوراقه معنقة وشبيهة باوراق الاجاص . ازهاره عديدة ، صغيرة القذ ، وردية اللون || تنويره يستمر من حزيران الى آب .

٥٩٧ - أخروس متوسط القذ

Pirola media (S). Pirole intermédiaire (F).

نوع من الاخروس . منبته المضاب والروابي . ساقه تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقه معنقة قريبة الشبه باوراق الاجاص . نصالها منشارية الحثار . ازهاره كثيرة العدد ، وردية اللون ، تتميز بفصلها المستطيلة || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٥٩٨ - أخروس مستدير الورق

Pirola rotundifolia (S).

Pirole à feuilles rondes (F).

نوع من الاخروس . منبته يمتد من الروابي الى الجبال . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه معنقة ، شبه مستديرة الشكل . نصلها بحيل الخضار العابق . ازهاره عديدة ، بيضاء اللون او وردية . فصلها مستطيلة || تنويره يستمر من حزيران الى تموز .

٥٩٩ - أخروس وحيد الزهرة

Pirola uniflora (S). Pirole uniflore (F).

نوع من الاخروس . منبته الجبال العالية . ساقه تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقه رهلة . زهرته واحدة ، كبيرة ، طرفية الارتكاز ، بيضاء اللون || تنويره يستمر عدة اسابيع ابتداء من اواسط ايار .

Pirolaceae (S).

Pirolacées (F). Pirolaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها نباتات عشبية معمرة ، معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || أشهر اجناسها الاخروس والكيا فيل .

٦٠١ - أخروط امرط

Beckerella inermis (S).

Achorute inerma (F).

حشرة مؤذية من الكهدليات ، قافزات الذنب . جسمها صغير نحيل . طولها نحو واحد مليمتر وثلاثة خطوط . ثوبها الى الطحلة يعلوها موج بنفسجي . جهازها القفزي نحيل ودقيق || يكثر وجودها على البطاطا المخزونة السائرة نحو الانحلال من جراء اي سبب كان .

٦٠٢ - إخراج هر الفرس الجواد الشديد الدو .

Ammobium (S).

Ammobie, Ammobion (F).

جنس نباتات عشبية ليفية برية من فصيلة المركبات ، مهدا البلاد الحارة || منها أنواع تزيينية كالاخریط المنج .

٦٠٤ - إخریط مجنح

Ammobium alatum (S).

Ammoble ailée (F). Winged everlasting (E).

Australische papierknöpfchen (D). Sempervivi (I).

نوع من الاخريط الزراعي التزييني . ازهاره كبيرة الحجم بيضاء اللون لا تذبل . يرغب في الاربة الرملية والمواقع الجنوبية المعرضة لأشعة الشمس . يتكاثر بالبذر .

الورديات . اشجاره متوسطة الحجم شديدة المناعة تصلح لتطعيم معظم الانواع الزراعية . تعيش نحو ٨٠ سنة لكنها بطيئة النمو ولا تثمر قبل عمر عشر سنوات .

٥٩٢ - أخراس أمريكي * ، سبوتة ، زعرور أمريكي

Achras sapota, Sapota achras (S). Sapotillier, Sapotier, Néflier d'Amérique (F). Sapota, Sapodilla plum, Naseberry (E). Sapota apfel, Gemainer breiapfel (D). Sapotiglia, Sapotillizio, Sapota (I).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة السبوتيات . مهدا امريكا الجنوبية وقد انتشرت زراعتها في جميع البلاد الحارة . ثمارها - شجرة عظيمة الهيكل غليظة الساق والاغصان الافقية الارتكاز المتشعبة الصفوف . كثيفة الافناد والافنان مستديرة القمة . افنانها وأهن ثمارها زغية القشور وزغبها اصفر اللون || اوراقها اهليلجية الشكل معنقة متقابلة تكثر في اطراف الافنان . نصلها جلدي امرد عابق الخضار ، عروقه متوازية الابعاد || ازهارها فردية ، ابطية سداسية الفصلات . تويجها جربي الشكل ابيض اللون سداسي الفلقات التي تقابلها من الداخل ست حراشف . اسديتها ست وخنود مبيضا ١٢ || ثمارها مستديرة او بيضية الشكل بقدر البرتقالة الصغيرة . بشرتها رقيقة خشنة طحاء اللون . لبانها بلون النار كثير المادة السكرية ، لذيق الطعم والتكهة ، مستحب العرف يذوب في الفم . يزورها مستطيلة مفلطحة سوداء اللون طويلة الانقود الابيض تستعمل لدر البول ولطرد الديدان المعوية || زراعتها ، تتكاثر بالبذر والتعقيل والتدريج . ترغب في الاربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور . تحشى الرطوبة المستحكمة والبرد . لذلك يجدر غرسها في المواقع المعرضة للجنوب والمكن رها . زراعتها لا تتطلب عناية خاصة لانها من النباتات البرية التي يضيئها التشذيب والتقليم || منافها : ثمارها المأكولة هي على موسمين في السنة . ثم عصارتها الصمغية الملحية الشائعة الاستعمال التي تدعى شيكل (Chicle) والتي تستخرج من حر السوق واستزافها .

٥٩٣ - إخراج

كل فرس ابيض البطن والجنين الى منتهى الظهر فقط . وكل فرس خرج تحجيلها من الزراعين والساقين . والاخرج من المعزى الذي نصفه ابيض ونصفه اسود .

٥٩٤ - أخروس

Pirola (S).

Pirole (F). Pirola (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الاخروسيات . انواعها المعروفة عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تزييني || سوقها قصيرة تعلو من ١٠ الى ٤٠ سم . اوراقها معنقة جلدية النصال . ثمارها الزهرية مضلعة . ازهارها بيضاء اللون او وردية ، مستطيلة المعالقي ، متدلية || زراعتها تتطلب عناية خاصة لانها تستوجب وجود بعض القطور المجهرية في التربة || اعرف انواعها واشهرها الخمسة التالية .

٥٩٥ - أخروس أخضر

Pirola chlorantha (S).

Pirole verdâtre (F).

نوع من الاخروس . منبته الجبال . ساقه تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه معنقة قريبة الشبه باوراق الاجاص . نصالها غبراء اللون ، ضيقة التسنين الحثاري . ازهاره كثيرة العدد لونها الى الخضار الزيتي . فصلها متساوية الطول والعرض || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٦١٧ - **أخطبوط جبّار** ° Architeuthis (F).
هو الارشيطوط ، حيوان بحري من القشريات ، اطلبه .

٦١٨ - **أخطبوط شائع* ، دَوَلَة**
Octopus vulgaris (S). Poulpe commun, Pleuvre (F).
Common devil-fish, C. octopus, C. poulpe (E).
نوع من الاخطبوط كبير القد عدو المنع و سرطان البحر يطاردهما بدون هودة .

٦١٩ - **أخطبوطيات**
Octopodes (F).
Octopodan, Octopedes (E).

رتبة حيوانات مائية من الرخويات المزدوجات الخيشوم الرأسيات الارجل || اجناسها خمسة جميعها تحمل في رؤوسها ثمانية جراميز تكسوها المحاجم اللاصقة التي تمكنها من امتلاك فريستها .

٦٢٠ - **أخطرديوم***
Ochthodium (S).
Ochthodie (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية من الصليبيات ، قليلة الانواع ، سوقها فرعاء . اوراقها السفلى ريشية او قيثارية والعليا رحيمة متعاقبة || ازهارها صفراء اللون . ثمارها خريشات مستطيلة ثنائية الغريقات عرضاً . بزورها فردية في الغريقات .

٦٢١ - **إخفاائية** ° Esotérisme (F).
Esoterism (E).

الاخفاائية مذهب الذين يقولون ان الجهارة لا تجوز إلا للذين أَلُمُوا بالمبادئ الاولى في العلم المنشود .

٦٢٢ - **إخفاد**
Avortement (F). Abortion (E).
أخفدت الناقة : أَلقت ولدها قبل ان يتم وهي خفود .

٦٢٣ - **أخفى الشرطين**
Mesartim
أخفى الشرطين نجم نير من كوكبة برج الحمل . مركزه على القرن بالقرب من انور الشرطين .

٦٢٤ - **أخفى العوائد**
Grumium
أخفى العوائد نجم نير من كوكبة الثنين مركزه على رأس الثنين .

٦٢٥ - **أخفى الفرقدين**
Pherkad
أخفى الفرقدين نجم نير من كوكبة الدب الاصفر مركزه ازاء انور الفرقدين .

٦٢٦ - **إخلاء**
Exponse
هو ان يترك المستأجر الارض المؤجرة له ليتخلص من دفع البدل المتفق عليه الذي يعد مقابل الايجار .

٦٢٧ - **إخلاف**
Repeuplement (F).
Repeopling, Restocking (E).
الاخلاف هو العمل على إعادة الحرج الى ما يجب ان يكون عليه وذلك اما بتعهد الاخلاف التي قنبت واما بغرس النصبوب اللازمة او ببذر البذور المطلوبة .

٦٢٨ - **أخمي**
Scalène (F). Scalene (E).
مثلث مختلف الاضلاع .

٦٢٩ - **إخنيم** . اطلب نفس مصري .

٦٠٥ - **أنخل** ° Brevicaule (F).
Short-stemmed (E).
الانخل من النبات القصير الساق .

٦٠٦ - **أخشم** ° Dicranobranche (F).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على من كانت خياشيمه منشعبة مفترقة .

٦٠٧ - **إخشيشاب**
Lignification
نشاف يحصل في بعض النسيج النباتية اخصها الليفية يقودها الى التسلب .

٦٠٨ - **إخصاب**
Fécondation (F). Fecundation (E).
هي العملية التناسلية الطبيعية التي تتم بعد تأبير الزهرة ان تفتطحاً او تنبيهاً . قوامها اندغام جيلة الخلية الذكرية في جيلة الخلية الانثوية لتكوين الرشم الذي به يستمر النسل ويتتابع .

٦٠٩ - **أخصب ، أمرع**
Fertiliser (F).
To fertilize, To manure (E).
هو اضافة المواد الخصبه ان عضوية او معدنية الى التربة لتصير خصبة او لزياة خصبها .

٦١٠ - **أخضر** عصفور يعرف بالخضيري ، اطلبه .

٦١١ - **أخضر النحاس**
Verdet (F). Verdigris (E).
اسم شامل لانواع اسيتات النحاس وقد اطلق عليه اسم اخضر النحاس لاختصار لونه || أكثر انواعه تستعمل في الحبال الزراعية لمعالجة الامراض الفطرية في النبات .

٦١٢ - **إخضيرار**
Verdissement
مرض يعترى خمر التفاح فيعطها . سببه تدني نسبة الحامض وتحويل بعض املاح الحديد الى املاح حديدية .

٦١٣ - **أخط**
Agate
ضرب من المرمر يتميز برسف طبقاته المتتفة الشكل ، المختلفة الالوان المتداخلة ، الوحيدة الظل || منه العقيق اليافى واليشم .

٦١٤ - **أخطب**
الأخطب الشقراق وقيل الصرد لان فيها سواداً وبياضاً . اما الديميري فيقول انه الصرد وانشد لبعضهم :
« ولا أنثى من طيرة عن مريرة
إذا الاخطب الداعي على الدوح صرصرًا »
والاخطب هو الحمار الذي يعلو ثبج ظهره خط اسود . والأنثى خطباء .

٦١٥ - **أخطب**
تلون . الخطب المنظل : اصفر وصار فيه شطوط خضر . حنظلة خطباء . وكذلك في الحنظلة اذا لونت (اللسان) .

٦١٦ - **أخطبوط**
Octopus (S). Poulpe (F).
Octopus, Devil-fish (E).
جنس حيوانات بحرية هلامية من الاخطبوطيات العالية من الهيكل الفقري . انواعه عديدة منتشرة في جميع البحار . رؤوسها شبه كروية ، عيونها كبيرة جاحظة . تحمل ثمانية جراميز مستطيلة تقوم عليها من الداخل محاجم كثيرة العدد تمكنها من الالتصاق بفريستها || من انواعها الدولة .



أخطبوط شائع



أخطرديوم



أخوين



أخيرانتوس



أخيرانتوس شرقي



أخيليا أغيراطن



أخيليا بقلة العطاس



أخيليا سوداء



أخيليا طريفة



أخيليا عطرة



أخيليا منعشة

نبات طبي بري معمر يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم. يوجد في مختلف الأماكن والأقاليم المعتدلة. يرغب في المواقع الرطبة || أوراقها بسيطة، أهليلجية، مسنة، خشنة، دابقة. نصلها امرط وكثيف الجيوب العطرية || ازهارها صفر. ازهارها يدوم من ايار الى آب || أوراقها وازهارها تفيد المعدة وتقويها.

٦٤٢ - أخيليا أم الف ورقة

Achillea millefolium (S). Achillée millefeuilles, Herbe aux charpentiers, Saigne-nez (F). Milfoil, Nose bleed, Yarrow (E). Schafgarbe, Tausend-augbraun, Achillenkraut (D). Millefoglia, Erba da Carpentieri, E. da tagli (I).

عشبة برية وزراعية معمرة، رقيقة الاروبة، نمل من ٣٠ الى ٧٠ سم. أوراقها مستطيلة. ازهارها كثيفة البتلات القرمزية، عديدة الالوان فيها الابيض والوردي والكرزي والاحمر. ازهارها يدوم من ايار الى تشرين || تتكاثر بالبر وحبود في جميع الأتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة.

٦٤٣ - أخيليا بقلة العطاس، سَعُوط

Achillea ptarmica (S). Achillée sternutatoire, Herbe à éternuer, Ptarmique, Bouton d'argent (F). Sneezewort, Bastard pellitory (E). Betramgarbe, Niesgarbe (D). Achillea starnutatoria, Bottone d'argento, Erba da starnuti (I).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. سوقه فرعاء. أوراقه ضيقة لسنة مسنة. ازهاره بيض. ازهاره يدوم من تموز الى آب || يوجد في معظم المناطق المعتدلة. يكثر في الارض البور وقرب انصخور.

٦٤٤ - أخيليا سوداء

Achillea atrata (S). Achillée noire (F). Black milfoil (E). Trauergarbe (D). Achillea nera (I).

نبات بري طبي معمر. يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. أوراقه ضيقة، نصلها امرط البشرة مسنة الحافة || ازهاره قرصية كثيفة التجميع حنطية الكأس. ازهاره يدوم من تموز الى ايلول || يرغب في الاراضي الكلسية.

٦٤٥ - أخيليا طريفة

Achillea nobilis (S). Achillée noble, Achillière élégante (F). Showy milfoil (E). Edelgarbe, Edle garben (D). Achillea elegante, A. nobile (I).

نبات زراعي تزييني معمر جميل الشكل والازهار. يتكاثر بالبر وحبود في جميع الأتربة الزراعية || يعلو من ٢٠ الى ٨٠ سم. ازهاره عديدة الالوان منها الابيض والاصفر والوردي والاحمر. ازهاره يدوم من اوائل تموز الى اواخر آب.

٦٤٦ - أخيليا عطيرة، قيسون

Achillea moschata (S). Achillée musquée, Gènepi, Gènepi musqué (F). Musk milfoil, Swiss genepi (E). Bisamgarbe, Genepi, Moschus-garbe (D). Erba livia, Millefoglia muschiato (I).

نبات بري طبي معمر عديد الفوائد الصحية. يوجد في الارض البور حيث تكثر نسبة الرمل || يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. اروسته مدادة، أوراقه مستطيلة مسنة، مرطاه النصل الاخضر الزاهي تملوه الجيوب العطرية العابقة. ازهاره وردية اللون. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٦٤٧ - أخيليا منعشة، قيصوم جبلي، بعيشتران

Achillea fragrantissima (S). Achillée suave, Garde-robe, Santoline, Aurone femelle (F). Lavender

٦٣٠ - آخور اطلب اسطبل.

Pernoptère (F).

Egyptian vulture (E).

الاخوق طائر من الكواسر مشهور باسم رجمة، اطلبها.

٦٣٢ - أخوى

Engraisser (F). To fatten (E).

أخوى المال من بقر وغنم وباعز وطير الخ... بلغ غاية السمن.

٦٣٣ - أخوين

Cineraria, Senecio cineraria (S). Cinéaire, Cendriette (E). Cineraria, Sea-sid ragwort (E). Aschenpflanze, Aschenkraut (D). Ceneraria, Cineraria, Cenerina (I).

جنس نباتات من سبط الشرونيات وفصيلة المركبات. انواعه كثيرة العدد جميعها اعشاب او جنبيات صغيرة. منبتها افريقية الجنوبية. سوقها زغبية اللحاء رمادية. أوراقها متقابلة، حاضنة، نصلها خلي البشرة الفضية. ازهارها نورية التجميع، تاجية الارتكاز، صفراء اللون، يجمعها زناد دقيق طويل || اشهر ضروبه التزيينية تلك التي نتجت عن التهجين. يوجد منها الآن في البستنة الزهرية عدة ضروب مختلفة الاحجام والالوان تزدهر في جميع المناطق المعتدلة الحارة.

٦٣٤ - أخيدناز

Echidnase (F).

Echidnasa (E).

مادة جعالية مؤذية توجد في سموم الافاعي.

٦٣٥ - أخيرانتوس

Achyranthes (S). Achyranthe, Cadelari, Irésine (F). Chaff flower (E). Spreblume (D). Sciamito, Sciamitro (I).

نبات طبي عشبي من سبط الفطيفيات وفصيلة السرمقيات. ساقه فرعاء منتصبه تملو نحو ٥٠ سم. أوراقه مدعقة، متقابلة، بيضية الشكل، منسجة النصل. ازهاره سنبلية، هامية، وردية اللون.

٦٣٦ - أخيرانتوس شرقي، محوط، نعيم

Achyranthes aspera (S). Achyranthe aspère, Herbe d'Inde (F). Rough chaff tree (E). Sciamitro (I).

هو نوع من الاخيرانتوس يتصف بذات التحلية العلمية الا انه اكبر قدماً وأوراقه اكثر زغباً واعم لوناً. يكثر في اقليم البحر المتوسط.

٦٣٧ - أخيفير

هو الدراج النافط، اطلبه.

٦٣٨ - أخيل

نوع من الشقراق، اطلب شقراق.

٦٣٩ - أخيلابين

Achilléine (F).

غلوكوزيد مر المذاق يستخرج من الاخيليا ام الف ورقة.

٦٤٠ - أخيليا

Achillea (S). Achillée (F). Milfoil (E). جنس نباتات عطرية عشبية معمرة من سبط الشعاعيات وفصيلة المركبات || انواعه كثيرة معظمها بري ينبت في مختلف المناطق والاصقاع ومنها تزيينية تزرع لزهرها وعطرها الفواح || اشهر انواعه ما يتبع.

٦٤١ - أخيليا أغيراطن

Achillea ageratum, Achillea viscosa (S). Achillée agérotoire, Eupatoire de Mésué (F). Sweet maudlin, Milfoil (E). Balsamgarbe, Gewürzgarbe (D). Achillea viscosa, Eupatoria di Mesué, Erba zolfina (I).

de plantain (F). Purple viper's bugloss (E). Wege-
richnatterkopf (D). Viperina (I).

نوع من الاخيون وهو من النباتات المحولة . ساقه وحيدة
تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه رحيمة ، لسنة تشبه اذان
الثور . ازهاره ليلية او بنفسجية اللون ، يبلغ طولها نحو
٣ سم . ازهاره يدوم من ايار الى تموز || يوجد في
الاراضي الرطبة .

٦٥٥- أخيون تخري* ، ألكحالي

Echium rubrum (S). Vipérine rouge (F). Red
flowered viper's bugloss (E). Natterkopf (D).
Viperina color di rosa (I).

نوع من الاخيون العشبي الحولي ، ساقه وحيدة تعلو نحو
المتر . اوراقه ضيقة مستطيلة حاضنة . ازهاره حر خمرية .
ازهاره سنبل يدوم من حزيران الى تموز || يتكاثر
بالبر . يوجد في اكثر الاودية المتوسطة الاندماج والرطوبة .

٦٥٦- أخيون معروف* ، حشيشة الافعى ، إقريطشية

Echium vulgare (S). Vipérine commune, Herbe
aux vipères (F). Snake flower, Blue weed, Viper's
bugloss (E). Gemeiner natterkopf (D). Echio, Erba
delle vipere, Viperina (I).

نوع من الاخيون الحول . يعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم . ازهاره
جميلة القالب زرقاء اللون . ازهاره سنبلي التجميع يدوم
من ايار الى تموز || يزرع للتزيين . يوجد في جميع
الآودية ولا يخشى الرطوبة

- وهناك انواع اخرى من الاخيون نكتني بسرد اسماء
اعرفها وهي :

٦٥٧- أخيون إكربتني

E. Creticum (S).
Vipérine de Crète (F).

نبات بري حولي . ساقه مشعبة خمرية . ازهاره بنفسجية

٦٥٨- أخيون إيطالي

E. Italicum (S).
Vipérine d'Italie (F).

نبات بري محول . ازهاره سنبلي متشعب . ازهاره وردية .

٦٥٩- أخيون بسيط

E. simplex (S).
Vipérine simple (F).

نبات بري محول . ساقه زباء . ازهاره بنفسجية او بيضاء اللون .

٦٦٠- أخيون جبّار

E. giganteum (S).
Vipérine géante (F).

نبات بري محول يعلو من مترين الى ثلاثة . ازهاره بيض .

٦٦١- أخيون حريري

E. sericeum (S).
Vipérine soyeuse (F).

نبات بري محول . ساقه ليفية تعلو نحو المتر . ازهاره ليلية .

٦٦٢- أخيون خيطي

E. strictum (S).
Vipérine effilée (F).

نبات بري محول . ساقه ليفية تعلو نحو المتر . ازهاره ليلية .

٦٦٣- أداة

Engin (F). Engine (E).

لفظة شاملة تستعمل للدلالة على مختلف الادوات والاجهزة
فتقول مثلاً أداة زراعية وأداة صيد وأداة رصد .

٦٦٤- أَدَاج

Odag

حاشور زراعي يرتكز على مادة الرتيبون . يستعمل
تغذية على النبات بمعدل ٢ كيلو للواحد في مكافحة
الحشرات .

cotton (E). Cypressengarbe (D). Guarda roba,
Abrotano femina, Santolina (I).

نبات بري طبي معمر زكي الرائحة الفواحة . يوجد في
الارض البور ويرغب في الآتربة الكنسية || يعلو من
١٥ الى ٤٠ سم . اوراقه مفروضة ، مسننة ، زباء متصل ،
كثيفة الجيوب المطرية . ازهاره صفر . ازهاره يدوم من
ايار الى تموز .

٦٤٨- أخين ، فقيرة

Achaine, Achène,
Akène (F). Achène, Akene (E).

ثمرة صغيرة جافة صلبة مفردة الخلية والحببة مصمتة لا
فتحة لها .

٦٤٩- أخينوس*

Echinus (S).
Oursin (F). Sea-urchin (E).

جنس حيوانات بحرية صدفية كروية او صناعية الشكل ،
كثيرة الشوك . سماها بعض كتاب العرب قنفذ الماء
والقنفذ البحري في حين ان القنفذ البحري هو غير هذا .
انواعه عديدة مختلفة الحجم والشكل بعضها سام يميت وبعضها
مأكول نافع يستعمل في الطب لادار البول || اشهر
انواعه المأكولة التوتيا والسفور .

٦٥٠- أخينوفورا*

Echinophora (S).
Echinophore (F). Sea-parsnip (E). Stacheldolde (D).
Finocchio cervone (I).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من الفصيلة الصليبية .
انواعه قليلة منبها حوض البحر المتوسط ، جميعها شائكة .
اوراقها صغيرة . ازهارها صفراء اللون .

٦٥١- إخيور

Echiurus (S).
Echiure (F). Echiurus (E).

جنس دوبيات بحرية من الجفريات المسلحة وفصيلة
الاخيوريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض
مناطق البحر الابيض المتوسط والبحار المحيطة باروبة .
اجسامها صغيرة القد ، دودية الشكل ، عادية السكم ،
يملوها في مؤخراتها هلب دقيق مستطيل يستعمل للدفاع
وللوخز .

٦٥٢- إخيوريّات

Echiuridae (S).
Echiuridés (F). Echiuridae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من الجفريات المسلحة . اجناسها
وانواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطائها معظم بحار البلاد
المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، دقيقة ، مسلحة
اما بمحارج او بهلب دقيق || اشهر اجناسها الاخيور
والثلاثمة والبونيلية .

٦٥٣- أخيون

Echium (S). Vipérine (F).

من اليوناني بمعنى الافعى . جنس نباتات طبية عشبية
وجنبية من فصيلة الحمحميات . يقال انها مدرة للبول ،
تقتل الحصى وتنفع من المفاصل || جذورها حراء اللون .
اوراقها متعاقبة رحيمة منقطة ، عنقها قصير اسمر اللون .
سوقها واوراقها زغبية وزغبها دائم الثور || ازهارها سنبل
التجميع ، ابطي وهامي الارتكاز . بتلات زهرها عديدة
الالوان منها الازرق والليلكي والبنفسجي والاحمر والايض .
انواعها عديدة لا تقل عن الثلاثين . اشهرها الثلاثة الآتية .

٦٥٤- أخيون آذان الثور*


Echium plantagineum (S). Vipérine à feuilles




أخينوس



أخينوفورا



أخينون آذان الثور



أخينون خري



أخينون معروف

٦٦٥ - إدّاد هو نبات الاشقيص . اطلبه .

٦٦٦ - إدّارة Gestion (F). Management (E).

هي تدبير ذمة مالية او اموال معينة يقوم بها صاحبها او من انتدب للمهمة .

٦٦٧ - إدّاسة Dépiquage (F).

Threshing or treading out (E).

احدى طرق الدراس اي فصل الحب عن السنابل . تم عادة بواسطة الثورج .

٦٦٨ - إدّام ، أدّم ، تابيل Condiment

هو ما استعمل لتبيل الاطعمة كالملح وغيره .

٦٦٩ - إدّباس ، ثنّط Levée des semis (F).

هو اول ظهور النبات على سطح التربة . Seedling (E).

٦٧٠ - إدّبال ، تدّيل Humification

نقل وبسط الدبال على المساكب بعد تحضيرها او على كامل التربة ان كان من لزوم .

٦٧١ - أدّبج ، عانيس Anthropoïdes (S).

Anthropoïde (F). Anthropoïdes (E).

جنس طير من طوائ الساق وفصيلة الكركيات . انواعه المعروفة اربعة ، جميعها من القواطع . تألف السهول والقيافي والمناقع . قوتها الحشرات والجراد والديدان والضفادع والعطاء والافاعي والبزور والحبوب والثمار || اجسامها كبيرة القيد متناقدها مخززية الشكل . رؤوسها مزينة بكشّتين جانبيتين . الريش الناعم المستطيل . اجنحتها كبيرة ، رافلة ، تلتصق اذنانها الصغيرة المخروطية الشكل . اعرف انواعه واشهرها أدّيج نميدة .

٦٧٢ - أدّبج نميدة * ، عانيس نميدة *

Anthropoïdes virgo (S). Anthropoïde demoiselle, Demoiselle de Numidie (F).

طائر من الاديج . اعطانه فسيحة الارعاء تشمل معظم مناطق البلاد الاسيوية والافريقية . وهو من القواطع التي تجوب مناطق الشرق الاوسط في رحلتها الصيفية والشتوية || يألف السهول والمناقع . قوته الحشرات والجراد والوزغ والعطاء والافاعي والبزور والحبوب || جسمه كبير القد . طوله نحو ١٠٠ سم . ثوبه الى الزبدة الزرقاء المواج . محسراه ومقدّم عنقه الى السواد اللامع . قوادمه الى السواد العابق . كشّتا رأسه الى البياض الناصع . حدقة عينه حرام اللون . منقاده اسود يعلوه مواج اخضر يصفر عند الملقط . ساقاه الى السمرة السوداء || يدثن في الفياقي . عشه كومة من العيدان الدقيقة تعلوها فرشة مقعرة من القش والحشيش الناعم . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو اربعة اسابيع || يألف حياة الاسر ويدجن بسهولة ويستعمل كحارس في مزارع الدجاج والبط والحيش والفرغر .

٦٧٣ - أدّيس * Ourebia (S).

Ourébi, Scopophore (F). Ourebia (E).

جنس حيوانات لبونة مجترة من الايليات . انواعه المعروفة خمسة موطنها يمتد من الصوبال الى الحبشة وكينيه والكونغو والسنغال والترمغال ... تألف التهام والهضاب والجبال

والانجاد . ملجئها الحياقي جماعي . آجالها تعد من ٥ الى ٩ انفار تقودها ذكور مائة . قوتها الاعشاب وبعض اوراق الاشجار || اجسامها صغيرة . شوزنها يماثل شوزن الاروس . اطوالها تراوح من ٩٥ الى ١٢٠ سم . بما فيه الاذنان التي تطول من ٩ الى ١٢ سم . ارتفاعها يراوح من ٦٠ الى ٦٤ سم . قرون ذكورها تطول من ١٠ الى ١٣ سم . وهي مخروطية الشكل ، حديدية الزام الاول ثم ملساء حتى الاطراف المنحرفة قليلاً نحو الامام . عيونها كبيرة مطوقة بالاسود . اذانها كبيرة كاسية مدببة الاطراف السود . دوارجها شديدة النشط . اظلافها الامامية محرمة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان تسود فيها الدبسة || اناثها جها الرؤوس ، رباعية الاخلاف ، فردية التناج . ترضع يعافيرها نحو اربعة اشهر . انواعه الخمسة تتبع .

٦٧٤ - أدّيس أسود الذكّب °

Ourebia nigricauda (S).

Ourébi à queue noire (F).

نوع من الاديس . موطنه يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى السنغال . جسمه يطول نحو ١٠٠ سم . ذنبه ١٠ سم . ارتفاعه ٦٢ سم . ثوبه الى الدبسة الشقراء المواج يعبق في الرأس والظهر والفخذين ويشتر ويبيض في البطن والحوافي . ذنبه اسود اللون وينتهي بضمة حالكة السواد .

٦٧٥ - أدّيس جبلي ° Ourebia montana (S).

Ourébi montagnard (F).

نوع من الاديس . موطنه نجد وجبال الحبشة . جسمه يطول نحو ١٢٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٢ سم . ارتفاعه ٦٤ سم . ثوبه الى الدبسة يعلوها مواج اسود في الرأس والظهر ، يتحول الى صنائي في الايطلين والفخذين . بطنه وخوافيه الى البياض العاجي . ذنبه جزوي الضمة الصغيرة .

٦٧٦ - أدّيس ذو مكائيس °

Ourebia scoparia (S). Ourébi à balais (F).

نوع من الاديس . موطنه يمتد من جنوب الصحراء الكبرى الى الترسغال . جسمه يطول نحو ١٠٥ سم . ذنبه ١١ سم . ارتفاعه ٦٣ سم . ثوبه الى الصفحة الصنابية المواج بطنه وخوافيه الى البياض العاجي . ركبته الاماميتان مجللتان بكشّتين من الوبر الجليل مما دعى الى نعته بذي المكائيس .

٦٧٧ - أدّيس رُمحري ° Ourebia hastata (S).


Ourébi hasté (F).

نوع من الاديس . موطنه يمتد من كينيه الى اوغندا وروديزية . جسمه يطول نحو ٩٥ سم . ذنبه ٩ سم . ارتفاعه ٦٠ سم . ثوبه الى الدبسة تشتد سمرته في الرأس والظهر والفخذين وتنحرف الى البياض التبي في البطن والحوافي . ذنبه صغير الضمة المخروطية الشكل ، اتم الصفحة الخارجية ابيض الداخلية ، يشبه الرمح مما دعى الى نعته بالرُمحري .

٦٧٨ - أدّيس هَجّار ° Ourebia Haggardi (S).

Ourébi de Haggard (F).

نوع من الاديس . موطنه تهام وجبال الصوبال في مقلها البحري . جسمه يطول نحو ١٠٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٩ سم . ارتفاعه نحو ٦٠ سم . ثوبه الى الدبسة السمره تشتد سمرتها في الرأس والظهر وتخت في الايطلين . بطنه الى الصفار التبي . ذنبه يرمعي الضمة الشديدة السمرة .



اديج نميدة



أدّيس

٦٩١- أدْرَع (F). Cap-de-maure (F).
نعت وصفي يطلق على الفرس الذي رأسه اسود دون سائر جسمه.

٦٩٢- أدْرَع * (S). Dalm vulgaire,
Cerf mégacère, Platycerque (F). Deer,
Fallow-deer, Buck (E).

طبي اغبر اللون ابقع ، احمر العنق والصدر ، امغر الرأس ،
عيناه مظلومتان باطار اسود . قوائمه اصفر وأنخل من قوائم
الاييل وكذلك عنقه واذناه وذنبه . ومنه سلالات ثوبها الى
السمره وغيرها الى الحسبة . علوه يراوح من ٩٠ الى ١٠٠ سم .
وطوله من ١٤٥ الى ١٥٥ سم . || موطنه بلاد حوض
البحر المتوسط ، يرغب في الاراضي الحرجية وفي الهضاب
المتوسطة الارتفاع .

٦٩٣- إدْرِياس هو الدرياس نبات بري طبي .

٦٩٤- أدْسَم (F). Boucher à l'émeri (F).
To cork, To shut up (E).

استعمل الدسام في سد الاناء والقارورة وما اشبه .

٦٩٥- أدْعَل (F). Apneume (F). Apneumous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان لا رئة له كبعض
الصفدييات .

٦٩٦- أدْعَال الصَيْد (F). Couverts (F). Covered (E).
الغابات والاحراج وغيرها التي اقتطعت للصيد .

٦٩٧- أدْقَى الادقي من البقر والغنم والماعز من كانت
قرونها مستطيلة ومنعقدة نحو الارض .

٦٩٨- إدْل (F). Lait caillé (F). Curdled milk (E).
هو الحليب الرائب المعروف باللبن . وله اسماء كثيرة
منها الصرب والخائر .

٦٩٩- إدْلاف (F). Ionisation (F). Ionization (E).
الادلاف انتاج الايونات . راجع ايون .

٧٠٠- أدْلَم * (S). Adlumia cirrhosa, A. fungosa (S).
Adlumie fongueux, Fumeterre fongueuse (F). Clim-
bing fumitory, C. colicweed, Mountain fringe (E).
Klimmender erdrauch (D). Fumaria fungosa (I).

نبات محمول طبي وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحشخاشيات
ساقه عارشة تطول نحو ٥ امتار . اوراقه مركبة ريشية ،
فصلها حبل الخضار . ازهاره حيلة الشكل وردية اللون .
يزرع للتزيين يتكاثر بالبزور والعقل .

٧٠١- أدْلِيَّة (F). Adelia (F). Adelia (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « وضعي القدر » جنس
شجيرات برية وزراعية تزيينية معمرة من فصيلة الزيتونيات .

مهددا بعض مناطق امريكة الشمالية . سوقها فرعاء تمار
من متر الى ثلاثة امتار . اوراقها عابلة ، متقابلة بسيطة .
ازهارها ثنائية المسكن ، الذكورية منها رباعية النصل
والاسدية ، الانثوية وحيدة المتك . ازهارها ضمي التجميع ،
محوري الارتكاز .
انواعها المعروفة قليلة العدد أشهرها التالية .

٦٧٩- أدْبُو ، نين مدَغَسْكَر (S). Ficus sakalavarum (S).
Adabo, Figuier de Madagascar (F).

شجرة مشرة من التوتيات . مهددا مدغسكر . ضررها
المشهورة سبعة جميعها اشجار كبيرة الحجم ، ضخمة الساق ،
منبسطة الاغصان . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام
يغلب فيها الشكل التيني واللون الاصفر والاحمر . طعمها
حلو المذاق حامز اللدغة || ثمارها مأكولة ويستخرج
منها بالتخمير والتقطير كحول لا بأس بها . ومنهم من
استعملها كعلف للخيل والبقر التي تأكلها بشهية .

٦٨٠- أدَّة (F). Scinque (F). Skink (E).
هو السقنقور والاسقنقور ينشط الباء والانعاظ . كانوا
يعتقدون في الماضي انه يشي من داء الفيل والجذام .

٦٨١- أدْجَن ، دَجَن (F). Domestiquer (F).
To domesticate To tame (E).
جعل الحيوان الوحشي حيواناً أليفاً داجناً

٦٨٢- أدْجِي * (F). Oudji
نوع من الذباب الصغير الذي يؤذي دود القز في بلدان
الشرق الاقصى كاليابان والصين .

٦٨٣- أدْحُوَّة
مبيض النعام في الرمل . ومدحى النعام : موضع بيضها .

٦٨٤- أدْحَى النَعَام (F). Azha
ادحى النعام خمسة انجم في المنعطف الرابع من كوكبة
النهر المعروفة ايضاً بكوكبة اريدانوس .

٦٨٥- إدْخَار ، تَوْفِير (F). Epargne (F). Saving (E).
نظام تتبته مصارف خاصة قوامه حل الناس على الاقتصاد
وتشجيعهم على التوفير .

٦٨٦- إدْخَال ، غَرْز (F). Implantation (F).
Implantation, Grafting (E).
هو وضع الفرزة في الحبل المناسب من النسيج الخلوي تحت
الجلد .

٦٨٧- إدْخَالِيَّة (F). Interventionnisme (F).
Interventionism (E).
مذهب سياسي يفرض تدخل الدولة بشؤون الرعية او تدخل
الدولة بشؤون دولة اخرى .

٦٨٨- إدْرَاج ، نَشْر (F). Insertion
الادراج هو اقحام صيغة او شرط خاص في تعاقب محرر
كادراج شرط الفسخ في عقد اجارة || اما النشر فهو
الاعلان او الاذاعة بواسطة الصحف عملاً بما يفرضه القانون
كاعلان بيع الممتلكات بالمزاد او نشر حكم الافلاس الخ...

٦٨٩- إدْرَاك (F). Début maturité, Pré maturité (F).
Prematurity (E).
بلوغ الشرة كماها الصنفي ويكون ذلك عند ابتداء النضج .

٦٩٠- أدْرَق ، قَبْلَة (F). Hydrocèle (F).
Hydrocele (E).
هو انتفاخ يحصل من تجمع المصل في الحبل المنوي .



أدجي



أدرع



أدلم




أدلية باسمية الورق



إدليس



آدم ، غزال الصحراء



إدميرة نيلة



أدهاتودة

متراففة متساكة يكسوها غلاف خارجي دقيق يدعى بشرة .

Adsorption

٧٠٩ - إدصاص

هو التبلل والتشرب .

Epidermique (F).

٧١٠ - أدمي

Epidermic, Epidermal (E).

٧١١ - إدميرة نبيلة *

Oedemera nobilis (S). Oedémère noble (F). Oedemera nobilis (E).

حشرة واسعة دامتة من فصيلة الإدميريات ورتبة مقدمات الاجنحة . تألف المروج والمراعي والادغال . خنافسها تعيش على الازهار . يرقاتها دامتة قوتها المواد النباتية المنحلة والسائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم . ثوبها الى الخضار الالسن . رأسها كبير الجرم . فكها نسيطان . زباناها خيطيان . عيناها بارزتان . ظهرها فارق النمدن . روشاها الى الصفار الاخضر الوردى الموج || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في نيسان وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد في حزيران . اناتها تهريق المكن بين قشور الاشجار اليابسة وتحت اللحاء وفي الجفالة والعليل || البرقة ، عند تمام نموها ، تطول نحو ١٦ مم . جسمها وردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليع التأشير الفكية ، حنطي اللون ، اصفر الموج ، جزوي الرأس والشرح ، اسمر الرواجب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي في الجفالة او تحت اللحاء .

٧١٢ - إدميريات *

Oedemeridae (S). Oedémérédés (F). Oedemeridae (E).

فصيلة حشرات واسعة دامتة من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة . تألف ازهار النباتات الدغلية والجنينية . مسرحها لاقياسي الزمن ، منها الضوئي والدغوشي والدجوي || اجسامها صغيرة القد او متوسطة . جميعها مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، ناشرة الاخطام ، غيظية الزباني المركبة من ٩ الى ١٢ فصلة . كواسلها واغمادها وجرامزها متباينة الاشكال . ارساغها الخلفية رباعية العقل ، ارساغها الوسطى والامامية خماسية || يرقاتها دامتة تعيش حيث تنقف ، على الاخشاب السائرة نحو الانحلال || اشهر اجناسها الادميرة والانكوميعة .

٧١٣ - أدنسون ، أدنسي

Adansonia (S). هو البوباب اي الحبب . جنس نبات افريقي المنبت معقود التعريف العلمي على اسم الباحث المواليدي ميشال ادنسون .

٧١٤ - أدهاتودة *

Adhatoda vasica (S). Carmantine, Justice, Noyer de Malabar (F). Malabar nut tree (E). Malabarische nuss, Malabarnuss (D). Noce del Malabar, Justicia (I).

جنبه طيبة من فصيلة الاقنثيات . منبتها الاصقاع الحارة . ساقها اسطوانية فرعاء . اوراقها معنقة اهليلجية متقابلة . ازهارها زنبقية الشكل ، أبطية وهامية الارتكاز || اوراقها تفيد الامراض الجلدية واخصها الحصف . نقيع اوراقها يفيد الرجفة والتشنج . جذورها مقيئة || تستعمل للتزيين لكنها تخشى المواقع المعرضة للرياح والبرد .

٧١٥ - أذهان طيارة ، زبوت طيارة

Huiles volatiles (F). Volatiles oils (E).

٧٠٢ - أدلية مذبذبة الورق *

Adelia acuminata (S).

Adélie à feuilles acuminées (F).

نوع من الادلية ، جنبه سبروتية تزيينية . ساقها فرعاء تدلو من متر الى ثلاثة امتار . افنادها شائكة . اوراقها ضيقة القواعد والاطراف ، تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصالها ملسة ، حيلة الخضار الالسن . ازهارها الى الصفار الكبيرتي || تنويرها يستمر من اذار الى نيسان .

٧٠٣ - أدلية ياسمية الورق *

Adelia ligustrina (S).

Adélie à feuilles de troène (F).

نوع من الادلية التزيينية السبروتية . ساقها فرعاء تدلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . افنادها مزغبة اللحاء ، حمراء اللون . اوراقها شبيهة باوراق الياسم . تطول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصالها بحرية الخضار ، خلية البشرة على الصفحتين . ازهارها الى الصفار الباهت || تنويرها يستمر طوال فصل الربيع .

٧٠٤ - إدليس *

Acanthocinus aedilis (S).

Aedile (F). Aedilis (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد . اجسامها صغيرة القد تطول من ١٥ الى ١٨ مم . قرونها الاستشعارية تطول عند الذكور من ٧٥ الى ٨٥ مم . وتطول عند الاناث من ٣٠ الى ٣٥ مم . اثوابها الى السمرة الطحلاء يعلوها تجذيع متعرض جزوي . كواسلها شبه كروية الشكل ، رباعية النقط الصفير . بطون اناتها تنتهي بقصيصات مرزية تستعمل في متع المكن داخل الخشب || مسرحها نهاري . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . رمتها احراج الصنوبر || يرقاتها غاشبة تعيش تحت لحاء اشجار فصيلة الصنوبريات .

٧٠٥ - آدم ، غزال الصحراء

Gazella dorcas (S). Gazelle dorcade (F).

نوع من الظباء من ذوات الاظلاف الخبوة القرون . ضرابه عديدة منتشرة من تركيا حتى الجزيرة بما فيها ايران والعراق وسورية . ومن افريقية الشرقية حتى الشمالية . جسمه رشيق القوام ، منسوب التكوين ، جميل الخلقة . طوله من ١١٥ الى ١٥٠ سم . ارتفاعه نحو ٦٥ سم . ثوبه الى الصهبة الغبراء ، ظهره يميل الى السمرة ، بطنه الى البياض ، عنقه طويلة ، قرناه اسودان احيدان ، قوائمه نحيلة || يألف الصحاري الرملية حيث يكثر السنت التتوفي .

٧٠٦ - إدماج

Intromission هو العمل الطبيعي اي الفيزيائي الذي يحصل عند ولوج جسم في آخر .

٧٠٧ - أدمان

Khamedj du dattier (F). هو خنج النخيل ، وصم يصيب قلب النخلة وكافورها . اطلب خنج النخيل .

٧٠٨ - أدمة

Epiderme (F). Epidermis (E). هي في الحيوان غشاء خارجي رقيق يحيط بالجلد . وهي في النبات الجزء الخارجي منه . تألف من مجموعة خلايا

bâtard (F). False hellebore, Ox-eye (E). Früh-
lengsadonisblume, Falsche meswurz, Adonisroschen
(D). Elleboro bastardo (I).

نبات عشبي بري وزراعي معمر. أزهاره صفراء اللون
كبيرة تنور في آذار ونيسان.

٧٢٧- أدونيس صغير* ، زخليل ، دم النعسان
Adonis microcarpa (S). Adonide, (F). Adonis (E).
Adonis (D). Adonide (I).

نبات عشبي بري حولي. أزهاره صغيرة حمراء اللون. منه
ضروب زراعية تزيينية تبذر في أوائل الربيع فتتور في
الصيف.

٧٢٨- أدونيس صيفي ، عين الحجل ، عين التدرج
Adonis aestivalis (S). Adonide estivale, Adonide
d'été, Œil de perdrix (F). Summer adonis, Tall
adonis (E). Sommeradonisblume (D). Adonide
d'estate, Occhio del diavolo, O. di fagiano (I).

نبات عشبي حولي يكثر في الحقول البور والمزرعة. منه
ضروب زراعية تزيينية تزرع في الحدائق ، أزهارها جميلة
حمراء اللون. تنور في الربيع وفي الصيف.

٧٢٩- أدونيس حلبي
Adonis aleppica (S).
يكثر في منطقة حلب وضواحيها.

٧٣٠- أدونيس طويل المنقار
Adonis longirostra (S).
يوجد في منطقة بعلبك.

٧٣١- أدونيس فلسطيني
Adonis palestina (S).
يوجد في فلسطين والأردن.

٧٣٢- أدونيس لهبيبي
Adonis flammea (S).
يوجد في مرجعير وفي شمالي سورية.

٧٣٣- أدونيس مسنّن
Adonis dentata (S).
يوجد في رمل السواحل من صور حتى غزة وفي باديه التي
وقرب الاسكندرية وفي منطقة تدمر.

٧٣٤- أدونيس وبّري الكأس
Adonis ericalycina (S).
يوجد في ضواحي بيروت.

٧٣٥- أدويّة
Traitements (F). Treatments (E).
هي مجمل العلاجات المستعملة في تطبيب الحيوان وإسائه.
النبات شافية كانت أم واقية أو قاضية على الحشرات
والأمراض الفطرية والطفيليات. اطلب علاجات.

٧٣٦- أدويّة زراعيّة
Traitements
antiparasitaires (F). Parasiticide treatments (E).

الادوية الزراعية كثيرة العدد وازدياد عددها يسير باطراد
مستمر غير أن هذا لا يحول دون ترتيبها ولا يغير شيئاً من
أقسامها الرئيسية الخمسة وهي :

(١) قسم الحواشير وهو يشمل جميع الادوية المستعملة ضد
الحشرات من أي نوع كانت وفي أي موقع كان.

(٢) قسم الموالكين وهو يشمل جميع الادوية المستعملة
لقضاء على مكن الحشرات

(٣) قسم الفواطير وهو يشمل جميع الادوية المستعملة
ضد الفطور والأمراض الفطرية من أي نوع كانت

٧١٦- أدھان عطريّة ، زيت عطريّة

Huiles aromatiques (F). Aromatic oils (E).

٧١٧- أدھم
Noir (F). Black (E).
من اثواب الخيل هو الاسود وقد يكون ايضاً :

٧١٨- أدھم غيّهت
Noir de jais (F).
هو الاسود الذي يلعب من فرط سواده
Jet-black (E).

٧١٩- أدھم شاحب
Noir mat (F). Mat-black (E).
هو الاسود الذي لا يلعب.

٧٢٠- أدوات ، آلات
Outillage (F). Stock of tools (E).

٧٢١- أدوكسا
أدوكسا هي عشبة المسك ، نبات طبي من الفويات.

٧٢٢- أدوكسيّات
Adoxaceae (S).
Adoxacées (F). Adoxaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القملات اجناسها
وانواعها قليلة العدد ، موطنها معظم اقاليم البلاد المعتدلة
الحرارة || جميع انواعها جذورية تفرخ وتنو في الربيع .
جذورها واوراقها وزهارها فواحة العرف المسكي العطر ||
اشهر انواعها عشبة المسك .

٧٢٣- أدوميس* ، عقّاصة العنب

Polychrosis botrana (S). Tordeuse de la grappe,
Eudémis de la vigne (F). Vine moth, Grapeberry
moth (E). Bunter Traubenwickler, Bokreuzter
Wickler (D).

حشرة من الفاتلات ورتبة حرشفيات الاجنحة . طولها نحو
١٠ مم. موطنها من ١٢ الى ١٤ مم. روشنها الاماميان
الى الرمادي يعلوها تدبج بني او حنطي || تسرح من
الشفق الى الليل . اجيالها الحولية ثلاثة . انثاها تمتع
مكنها في اسفل زمرعات الكرمة واقربها من التربة فيثقف
عن يرقات دقيقة لونها الى الخضرة تلثم الاوراق وتفتلها
وتنخر الحب وتمنطقه بنواصها الحريري العنكبوتي .
تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة .

٧٢٤- أدونيس

Adonis
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الخوذانيات
سوقها اسطوانية فرعاء ، تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها
مزراقية متعاقبة ، أزهارها تشبه زهر الشقار وهي فردية
التجميع طويلة الزناد خماسية البتلات . ثمارها تشبه ثمار
الخوذان || انواعه عديدة منها ما يزرع نزهه ومنها بري
تنبت الطيبة في اماكن مختلفة || المعمر يتكاثر بالعقل
والاخلاف . اما الحولي فبالبذر . ان بذري الخريف نور في
الربيع وان بذري آذار نور في تموز . اشهر انواعه مايتبع .

٧٢٥- أدونيس خريفي* ، حنّون البواز ، ناب
الجممل ، نقطة دم
Adonis autumnalis (S).

Adonide automnale, Goutte de sang (F). Pheasant's
eye, Autumn adonis (E). Herbstadonisblume,
Gartenadonis (D). Adonide d'automne, Occhio di
dimice, Goccia di sangue (I).

نبات عشبي بري حولي . أزهاره الى الحمرة القانية . منه
ضروب زراعية تزيينية تزهر في الخريف .

٧٢٦- أدونيس ربيعي ، عين البز ، عين الثور
Adonis vernalis (S). Adonide printanière, Hellebore



أدوميس



أدونيس خريفي



أدونيس صغير

(٤) لسم العواشب وهو يشمل جميع الادوية المبيدة للاعشاب الضارة أن في الاراضي المزروعة أو المستحالة .

(٥) قسم الديدانيات وهو يشمل جميع انواع الطعوم والسموم والمستحضرات المستعملة للقضاء على الفقريات الضارة كالغربان والجردان والمنساجذ وفتران الزرع والذئبات والمرائب الخ.

٧٣٧ - أديم ، أدمة Surface de la terre (F).
الاديم والادمة : وجه الارض Surface of the earth (E).

٧٣٨ - أذاب ، أمسح Dissoudre (F).
To dissolve (E).

٧٣٩ - آذار Mars (F). March (E).
يعرف أيضاً بمارس . الشهر الثالث من السنة الشمسية وهو من شهور الشتاء والربيع . مدته واحد وثلاثون يوماً . في الرابع منه آخر أيام العجوز وفي الحادي والعشرين يعتدل الليل والنهار وهو أول فصل الربيع .

تقويمه الزراعي - اعماله الزراعية عديدة ومختلفة اخصها :
(١) في الزراعات العامة : يصار الى بذر الذرة الصفراء والفصة وفستق العبيد وعباد الشمس الخ ... والى زرع البطاطا في المناطق الداخلية وذلك بعد تحضير التربة بحراثة جيدة وبعد ذر الاسمدة الكيماوية المركبة اللازمة . والى متابعة استعمال العواشب للقضاء على الاعشاب الضارة في جميع الزراعات الحقلية واخصها الحنطة التي تبدأ بالاسبال في اواخر العقد الثالث . والاعتناء بمشاتل التبغ من تعشيب وترييب وسقاية وتغذية . ويصار أيضاً الى حرث الباقية والترمس وغيرها من النباتات المزروعة للتسميد الخضري . والى توزيع الاسمدة الكيماوية المركبة على الحواكير المعدة لزراعة التبغ والتنباك

(٢) في الأشجار المثمرة : كشط قشور الاشجار وتنظيفها . متابعة غرس النصبوب في المناطق الجبلية العالية ومتابعة التطعيم . المباشرة بالمكافحة الوقائية ضد الامراض الفطرية والحشرات التي تصيب وتركب هذه الاشجار مع بدء اوراقها وانقصاد ازهارها . ويصار الى غرس الموز بعد تحضير التربة وتسميدها بالاسمدة العضوية والكيماوية المركبة

(٣) في الحمضيات : متابعة وانجاز جميع الاعمال التي بوشرت في شباط مع التشذيب والتقليم وذر الاسمدة الكيماوية المركبة الكاملة

(٤) في البقول : متابعة زرع البقول والخضار الصيفية بما فيها الباذنجان والبندورة والخيار والكوسى والبامية والكرفس والرشاد والبقودونس الخ ... ومتابعة العناية بما قام منها
(٥) في الزهور : متابعة زرع الزهور والعناية بها بعد نقلها من المشاتل الى المراكز او الى امكنتها الثابتة
(٦) في النحل : اعداد وتحضير القفران والخلايا المهجورة والمستحدثة وتثبيتها لاقبال الاثوال الجديدة .

٧٤٠ - آذان الارنب اطلب لسان الكلب .

٧٤١ - آذان البحر ، حلتزونييات البحر

Haliotidae (S). Haliotidés (F). Haliotidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل امايات الحياشيم . خياشيمها في تجاويف طيلسانية تفتح من الامام || اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، تعيش لاصقة بالصخور البحرية . معظم انواعها يحمل اصداًفاً

لؤلؤية الصفحات الداخلية .
احرف اجناسها واشهرها آذن البحر .

٧٤٢ - آذان الجدي اطلب لسان الحمل .

٧٤٣ - آذان الحمار * Knautia arvensis (S).
Knautie, Scabieuse des champs, Orelles d'âne (F).
Field scabious, Field knautia (E). Ackergindkraut, Feldscabiose (D). Orecchio d'asino (I).

نبات عشبي بري طوي من فصيلة الدبساسيات كانوا يستعملونه قديماً في معالجة الامراض الجلدية والزهرية ومنها السفلس .

٧٤٤ - آذان الدب اطلب بوصير .

٧٤٥ - آذان الدب الوحشي ، آذان الضبع هي الزعدة الأذينية ، اطلبها .

٧٤٦ - آذان العتار اطلب مزار الراعي المائي .

٧٤٧ - آذان الفأر ، ميوزوتيس Myosotis
جنس نباتات عشبية حولية محولة بعمرة من فصيلة الحمحميات . انواعه عديدة منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة . سوقها عشبية زياء ومنها مخشوشة . اوراقها سنائية صغيرة لاطئة متعاقبة . ازهارها ابوية وتاجية الارثكاز . الابوية منفردة ، اما الناجية فمذكولة او عنقودية التجميع . يغلب فيها اللون الازرق ثم الابيض ثم الوردى || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٧٤٨ - آذان الفأر البري * Myosotis arvensis,
Myosotis stricta (S). Myosotis des champs, Orelles de souris (F). Field forget me not, Mouse ear (E). Feldmauseohr (D). Orecchio di sorcio (I).

نبات عشبي بري يكثر في الاماكن الرطبة . يقال انه من النباتات الطبية . يفيد في تفتيت الحصى ، ينفع من السموم ، يضاد الاسهال . عصارته شابة .

٧٤٩ - آذان الفأر الجبلي * Myosotis alpestris (S).
Myosotis des Alpes, Myosote (F). Forget me not, Rockscorpion grass (E). Alpenvergissmeinnicht (D). Myosotide, Orecchio di pipistrello (I).

نبات عشبي بري منبته الجبال الرفيعة . يقال انه طيب لكنه مهم المنافع . منه ضرور زراعية تزيينية تجود في حدائق البلاد الباردة .

٧٥٠ - آذان الفأر المنقي * Myosotis palustris (S). Myosotis palustre, Gremillet, Souvenez-vous de moi (F). Water forget me not (E). Echte vergissmeinnicht, Sumpfvergissmeinnicht (D). Talco celeste, Non ti scordar dime (I).

نبات عشبي بري وزراعي يكثر في المناطق وعلى ضفاف الانهر . ضروره الزراعية التزيينية عديدة جميعها جميلة الازهار الصغيرة النحيلة .

٧٥١ - آذان الفيل راجع ابو درقة .

٧٥٢ - آذان الكتبش اطلب لسان الحمل السناني .

٧٥٣ - إذخر ، طيب العرب ، زين مكة

Andropogon schoenanthus (S). Citronnelle, Junc odorant, Schénanthe, Vétiver (F). Camel's hay, Scenanth (E). Cameleshov, Citronengras (D).



آذان الحمار



آذان الفأر البري



آذان الفأر الجبلي



آذان الفأر المنقي

مستنقعات البلاد المعتدلة الحرارة ، ساقه اسطوانية قصيرة .
اوراقه ملازمة معلاقية ، أحادية ، قليلة النصل العائق
الخضار . ازهاره تاجية مثلثة وطويلة الزناد . بتلاتها
خاسية . بيضية الشكل صفراء اللون تستعمل في تلوين الزبدة .

٧٦٠ - آذريون مخزني* ، آذريون الحدائق ، قرقنهان ، زبيدة ، جهنجان

Calendula officinalis (S). Calendule officinale, Souci
des jardins (F). Pot marigold, Hen and chickens (E).
Gartringelblume (D). Calta dei giardini, Fior
rancio, Calendola (I).

نوع من الاذريون وهو نبات عشبي بري طبي . منبته
حوض البحر المتوسط . اوراقه لاطقة متعاقبة . فصلها
رحي الشكل ، ازغب البشرة . ازهاره تاجية فردية مكتنزة
البتلات الصفرة || كان ولا يزال يستعمل في بعض
المستحضرات الطبية . وهو ينبت عادة في معظم الاراضي
المزدرة || اما الاذريون الخزني المعروف باسم «سوسي»
فهو هجين من الاذريون المخزني والقوقحاني ثبت استمرار
الاستنخاب والتأصيل بعد ان جملة اطول زناداً واكبر زهراً
واسرع نمواً || يشكّر باليد ويحود في جميع الارربة الغنية .

٧٦١ - أذن

Oreille (F). Ear (E).
عضو من أعضاء الجسم مختص بالسمع . يختلف مظهرها
الخارجي بالنسبة الى الحيوان غير انها جميعها تحس الاصوات
وتدركها وتميز مصدرها || وهي تنقسم تبعاً لوظيفتها
وتركيبها ثلاثة اقسام :

- (١) الأذن الخارجية التي تتركب من الصيوان الأذني ومن
القناة السمعية المعروفة بالصماخ
- (٢) الأذن الوسطى المعروفة بالتجويف الطبلي تعوي الطبلة
والطرق والسندان والعظايا الهلالية السمعية
- (٣) الأذن الداخلية التي تتركب من التيه العظمي الذي
يحتوي الياف العصب السمي || وللأذن وظيفة اخرى غير
السمع هي حفظ التوازن في الوقوف وفي جميع الحركات التي
يقوم بها الحيوان || والحيوان الفقري اذنان موجودتان على
جانبي الرأس . اما في الحشرات ، ومعظمها صماء . فتركزها
عند وجودها يختلف باختلاف الرتبة والفصيلة . اذن الجرادة
مثلاً وهما تجويفان كاملا العدد يرتكزان على جانبي الحلقة
البطنية الاولى . ومن الحشرات من قامت زباناها بمقام الأذن .

٧٦٢ - أذن الأرنب اطلب حبلاب خشوب .

٧٦٣ - أذن البحر* ، حلتزون بحري

Halotis (S). Halotis, Halotide, Oreilles de mer (F).
Sea-ear, Ear-shell (E).

جنس حيوانات بحرية من المعديات الرخويات ذوات
الصدفتين . انواعه لا تقل عن ٧٥ بعضها مأكول . تعيش
لاصقة بالصخور البحرية . تصاد لاصداقها اللؤلؤية
المرغوب فيها والكثيرة الاستعمال الصناعي .

٧٦٤ - أذن الحمار* ، أنوسما

Onosma echinoides (S). Onosma (F). Hairy onosma (E). Sandlotwurz (D).
Borrana salvatica, Onosma (I).

نبات عشبي بري معمر من سبط الانشوصيات وفصيلة
الحمحميات . منبته الجرد العالية . اوراقه سنالية زغبية
لاطئة . ازهاره قنابية صفراء اللون ، عنقودية التجميع .
ينبت عادة في الاماكن الجافة . رائحته كريهة فواحة .

Spigo digitato, Fieno di camello, Giunco odorato (I).
نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات يكثر في المناطق
الحارة || اوراقه عطرة ليمونية الرائحة وازهاره كذلك .
يستعمل استعمال الشاي وفي بعض المستحضرات الطبية .
الهنود يسمونه سنبل الطيب ويحضون اوراقه فتحدث تنبيهاً
شديداً . يستخرج منه بالتقطير زيت عطري جيد الفائدة
وكثير الاستعمال في صناعة الروائح العطرية || يقال ان
سوقه مدرة للبول وعلى كل فهو من النباتات العلفية التي ترغب فيها
الماشية || ومن قائل انه كان معروفاً في زمن القراعة وكانوا
يستعملونه في الاطياب وان اسمه الهير وقلبي «دحرت» .

٧٥٤ - إذخير مكّي* ، سنبل هندي ، طيب مأموني ، حلفاء مكة

Andropogon nardus (S). Nard indien, Spicanard (F).
Spikenard, Ginger grass (E). Indiantischer nardus,
Spikenard (D). Spigo nardo, Nardo indiano, Nardo
siriaco, Gramigna cedrata vera (I).

نبات عشبي حولي من فصيلة النجيليات . منبته المناطق
الحارة . يكثر في الهند . رائحته عطرة . يستعمل في بعض
المستحضرات الطبية ولوقاية الثياب الصوفية من عبث العث .

٧٥٥ - أذرع

Vêler (F). To calve (of cows) (E).
أذرع البقرة : صارت ذات ولد فهي مذرع . والذرع
هو ولد البقرة الوحشية .

٧٥٦ - أذرنج

Bulbe de cyclame (F).
Cyclamen bulb (E).
هو درنة السكع . حجمه حجم قبضة اليد ، مستدير الشكل
مفلطح ، لونه حنطي اسمر . كان ولا يزال من المواد الطبية
يستعمل كسهل وماسط وطارد للدود . وهو غني بجوهر السكمين
وبالمواد النشوية والمنيت والحامض السكيني .

٧٥٧ - آذريون

Calendula (S). Calendule, Souci (F).
Marigold (E). Ringelblume (D). Calendola (I).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة المركبات
الانبوية الزهر . انواعه نحو ٢٠ معظمها من نباتات حوض
البحر المتوسط . اوراقها حاضرة متعاقبة . فصلها رحبي
الشكل خلي البشرة . ازهارها هامية شعاعية حيلة الصفار
الزاهي . ثمارها فقيرة || أشهر انواعه الاذريون المخزني
واذريون البر .

٧٥٨ - آذريون البر* ، آذريون الحقل ، قوقحان ، كحلته


Calendula arvensis (S).
Souci des champs, Fleur de tous les mois (F).
Goofs, Field marigold (E). Wilderlingelblume,
Feldringelblume (D). Fioranco, Calta dei campi (I).

نوع من الاذريون وهو نبات عشبي بري حولي . منبته
حوض البحر المتوسط . اوراقه متعاقبة ، فصلها رحبي
الشكل ، خلي البشرة لونه الى الخضار الاغبر . ازهاره
هامية الارتكاز ، عديدة البتلات البرتقالية اللون || يكثر
في البور والمروج وفي بعض الاراضي المزدرة فيصبح
اذ ذلك من الاعشاب الضارة .

٧٥٩ - آذريون الماء* ، ضرغوس

Caltha palustris (S). Caltha, Populage, Souci d'eau
(F). Marsh-marigold, Water butter-cup, King-cup
(E). Sumpfdotterblume (D). Calta palustre, Far-
faruglio, Margheritina gialla (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الشقيقيات . يكثر في



إذخير مكّي



آذريون البر



آذريون الماء



آذريون مخزني



أذن البحر



أذن الحمار



أذن الدب



أذن الشيطان



أذن يهوذا



أذينة



آرا حمراء



أرايمه

٧٧٧ - أذينة* ، عيزارة لرجة

Phlomis viscosa, *Phlomis orientalis* (S). *Phlomis visqueuse* (F). Syrian wick weed (E). Syrische flammenlippe (D). *Salvia dei Syria* (I).

نوع من العيزارة وهي بحلة سبروتية جبلية عطرية من فصيلة الشفويات . منبتها جبال لبنان وسورية . ساقها ليفية ، تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . أوراقها أهليلجية مستطيلة لرجة . ازهارها ضمية متتابعة متباعدة الرئاج لونها الى البياض الاخير ، قناباتها وفصلها مديبة شائكة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٧٧٨ - أذينيةات *Auriculariaceae* (S). *Auriculariacées* (F). *Auriculariaceae* (E).

هي فصيلة الفطور الدفرية من رتبة الدعاميات . اطلب دفریات .

٧٧٩ - آرا *Are* (F). Square of ten metres (E). قياس سطحي يساوي مئة متر مربع .

٧٨٠ - آرا *Sittace* (S). *Ara* (F). *Ara* (E).

جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . انواعه المعروفة خمسة موطنها امريكا الجنوبية || تألف الغابات النائية . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٧ أزواج . قوتها الثمار والحبوب || اجسامها كبيرة القد . تتميز بكبر المنقار وباستطالة الجناح والذنب الرئاجي الشكل . اثنائها تختلف مع الانواع ، جميعها بحيلة الالوان الزاهية || اعرف انواعها واشهرها الآرا الحمراء .

٧٨١ - آرا تحمراء* *Sittace coccinea* (S). *Ara macao*, *Macao* (F). *Macaw* (E).

اشهر انواع الآرا . موطنها البرازيل . تألف الغابات وضياف تجاري الماء . ملجئها الحياتي جماعي . قوتها الثمار والحبوب وبعض الحشرات || جسمها كبير القد يطول نحو ٦٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٣ سم . بسطتها نحو ١٠٠ سم . ثوبها براكب الالوان يكثر فيه الاخضر . رأسها وعنقها وصدرها وبطنها الى الحمرة الارجوانية . ظهرها وذنبها الى الزرقة السفراء . جناحها الى الزرقة الخضراء المواج . رفال ذنبها ١٢ ، الوسطى منها وعددها ٤ حمراء اللون || تألف القفص لكنها لا تقتبس الكلام بسهولة .

٧٨٢ - أرايمه* *Arapaima gigas* (S). *Arapaima géant* (F). *Arapaima gigas* (E).

الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي والبرازيلي . سمكة نهريه وحيدة الجنس والنوع من فتشحات المشاة عظميات الرؤوس . موطنها نهر الامازون || جسمها كبير القد ، يطول نحو خمسة امتار اما وزنها فيراوح من ١٧٠٠ الى ٢٥٠٠ كيلو . ثوبها الى الطحلة الرصاصية المواج . تتميز بضخامة الرأس المصفتح وبكبر الفم وبذراية الاسنان الكثيرة العدد . زعنفتها الظهرية خلفية الارتكاز ، صغيرة الجرم ، مستطيلة الشكل ، تناخم الزعنفة الذيلية ، تقابلها وتماثلها الزعنفة الشرجية || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٧٨٣ - إرانة *Topographie* (F). *Topography* (E). هي رسم الموقع ووصف حالته الطبيعية اخصها الانحدارات

٧٦٥ - أذن الدب* ، يفض الشيخ *Arctotis grandis* (S). *Arctotide* (F). Bear's ear, Wind seed (E). Barenohr, Windsamenkraut (D). Orsa, Arctotis (I).

نبات عشبي بري من سبط القوسيات وفصيلة المركبات . منبته افريقية الجنوبية وبلاد الحبشة . أوراقه لحمية سنانية زغبية وزغبها ابيض اللون اسفح المواج . ازهاره بحيلة الشكل فستقية اللون .

٧٦٦ - أذن الواهب اطلب لوف الحية .

٧٦٧ - أذن الشيطان* ، لقمة القاضي *Otella alismoides* (S). *Ottelle* (F). *Ottelle* (E). *Otella* (I).

نبات ربي نجمي بري من فصيلة كلويات الماء يعيش على ضفاف الأنهر المغمورة بالماء . يكثر وجوده في افريقية والهند واسترالية || أوراقه رحيمة طويلة المعلق . ازهاره زنادية فردية قرصية الارتكاز ، بحيلة الشكل .

٧٦٨ - أذن الغزال اطلب لسان الكلب .

٧٦٩ - أذن الفارة اطلب سيراسيوم مزغبر .

٧٧٠ - إذن القبض *Bon* (F). *Bond* (E).

هي ورقة تقرر لصاحبها حقاً في قبض مبلغ من المال أو المطالبة بالتزام معين .

٧٧١ - إذن لدى الاطلاع *Bon à vue* (F). *Sight draft* (E).

تدفع قيمة هذا الاذن لدى تقديمه دون اخطار سابق .

٧٧٢ - أذن يهوذا* ، سرّة النجف *Fungus sambuci* (S). *Auriculaire*, *Oreille de Judas* (F). Jew's ear, Judas ear (E). Holunder, Judasohr (D). *Auriculare* (I).

جنس فطور مأكولة سمراء اللون من الأذينيةات . انواعه عديدة تعيش على جذوع واغصان الاشجار القديمة العهد اخصها الملبور وبعض اشجار المواقع الرطبة .

٧٧٣ - أذناب الخيل

انظر سلسفيل المرج وهي عشبة تحدد عصاريتها .

٧٧٤ - أذينة ، زئمة *Stipule* (F).

Stipule, *Stipula* (E).

زائدة ورقية مزدوجة تكون في قاعدة معلق الورقة في بعض النباتات كالورد والسنت والفلول . وقد تكبر فتصير غمداً ملتصقاً كما في عصفة الخنطة أو تستحيل شوكة أو حائلاً .

٧٧٥ - أذنين *Oreillette* (F). *Auricle* (E).

تجويف علوي في تركيب القلب ينقسم الى ايمن وايسر . يدخل الدم بواسطة الاذنين الايسر الذي يدفعه الى البطين الايسر ويخرج عن طريق الاهر . اما الاذنين الايمن فيصل اليه الدم عن طريق الوريد الاحدب العلوي .

٧٧٦ - أذينة *Auricle* (F). *Auricula* (E).

زائدة نصلية النسيج مختلفة الحجم والشكل تكتنف ضلع الورقة عند انتشائها . وها اذنينتان || والأذينة قد تكون بالنسبة الى شكلها وارتكازها جالسة ، مستديرة ، قدية ، متموجة ، عمودية ، أفقية ، حاضنة ، الخ .

غبراء اللون || ثمارها عنبية مأكولة صفراء اللون
أخشابها وأفنانها مستحبة الطعم والعرف يستاك بها .

٧٩٨- آرآكيات (S). Salvadoraceae (S).

Salvadoracées, Salviniacées (F). Salvadoraceae (E).

فصيلة نباتية ثنائية الفلقة . وحيدة الجنس ، عديدة الأنواع .
نباتاتها شجيرات وحبشات متقابلة الاوراق الرخمية المستطيلة .
نصلها لحمي النسيج باغت الحصار || ازهارها عنقودية
التجميع ، هامة الارتكاز .

٧٩٩- آرآليات (S). Araliaceae (S).

Araliacées (F). Araliaceae (E).

تعرف أيضاً بالقسوسيات والعشقيات . فصيلة نباتية من
ذوات الفلقتين عديدة القعالات . مهدا جميع المناطق
الحارة الاسيوية والامريكية || أنواعها عديدة جميعها
نباتات عشبية او نضوشية الالياف . اوراقها معنقة او
لاطئة ، كاملة او مفرصة . ازهارها صغيرة قلسوية الشكل
لاقياسية الارتكاز يجمعها زناد ابطي || سوقها دماعة
غزيرة العصارة والمادة الراتنجية || جذورها مستحبة الطعم ،
عطرة ، تستعمل في بعض المستحضرات الطبية || اشهر
أنواعها الاربعة التالية .

٨٠٠- آرآلية جلنسة* ، آرآلية خماسية الورق

Aralia quinquefolia (S). Aralie, Ginseng (F).
Ginseng (E). Gensang (D). Aralia (I).

جنبه من الاراليات بحيلة الشكل والازهار . تزرع للتزيين
غير انها تحشى المواقع الباردة || تتكاثر بالبذور والمقل .
تميش في المراكز لكنها تبقى صنيرة . وهي من النباتات
الطبية المعروفة .

٨٠١- آرآلية شجرة الملاك* ، آرآلية شائكة

Aralia spinosa (S). Angélique épineuse, Angélique
sauvage (F). Angelica tree, Hercule's club (E).
Angelikbaum, Falsche esche (D). Angelica
spinosa (I).

جنبه برية وزراعية تزيينية ، غزيرة العصارة والمادة
الراتنجية ، كثيرة الشوك .

٨٠٢- آرآلية عارية* ، فشاع امريكيه ، عشبة برية

Aralia nudicaulis (S). Salsparilla d'Amérique (F).
Sarsaparilla, Wild sarsaparilla (E). Amerikanische
krafwurzel (D). Aralia a stelo nudo, Salsaparilla
della virginia, S. falsa (I).

عشبة زراعية وتزيينية . مأكولة الاوراق والجذور .

٨٠٣- آرآلية عاامرة (S). Aralia papyrifera (S).

Angélique à papier (F). Rice paper plant (E).
Fatsia (I).

جنبه زراعية صناعية يستخرج من اليانها ورق جيد
الصنف مرغوب فيه .

٨٠٤- آرآم ، آرآم الطباء البيض البطون .

٨٠٥- آرآلب البحر (S). Aplysiidae (S).

Aplysiidés (F). Aplysiidae, Sea hares (E).

فصيلة حيوانات صدفية بحرية من الرخويات . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد جميعها خسارية ومنها السامة والتي تفرز
اخلاطاً قمرزية تصبغ الماء حولها || اشهرها الارنب البحري .

٨٠٦- أرآولة هي الكريرنم ، اطلبها .

٧٨٤- أرآد Cépée (F).

Tuft of shoots from a pollarded stump (E).

هي سجاع النواهي التي تفرخ حول ارومة الشجرة المقطوعة .

٧٨٥- أرآرو هو الأشبور ، اطلبه .

٧٨٦- أرآسان Arasan

مسحوق ناعم يرتكز على مركبات خاصة ، يستعمل لوقاية
بذار الشوندر من الامراض الفطرية والتخر || يلزم
٦٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو بذار .

٧٨٧- أرآص أولية Terrains primaires (F).

Primary grounds (E).

هي اول اراض جيولوجية رسوبية تعقب الارض الاصلية .

٧٨٨- أرآص بركانية Terrains volcaniques (F).

Volcanic grounds (E).

هي الاروض الجيولوجية المتأثرة عن ثوران البراكين وقد
تكون غنية غالباً بالحامض الفسفوري وبالبيوتاس .

٧٨٩- أرآص ثالثة Terrains tertiaires (F).

Tertiary grounds (E).

من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية . تأتي بعد الحقبة الثانوية .

٧٩٠- أرآص ثانوية Terrains secondaires (F).

Secondary grounds (E).

من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية . تأتي بعد الحقبة الاولى .

٧٩١- أرآص رابعة Terrains quaternaires (F).

Quaternary grounds (E).

من الاحقاب او الاراضي الجيولوجية . تأتي بعد الحقبة الثالثة .

٧٩٢- أرآص زراعية Terrains agricoles (F).

Agricultural grounds (E).

هي جميع الاراضي المزروعة والممكن زرعها لان تركيب
عناصرها الحكمية والكيمياوية يسمح بذلك .

٧٩٣- إرآضة Géodésie (F). Geodesy (E).

علم هيئة الارض ومساحتها .

٧٩٤- إرآضي Géodésien (F). Geodesic (E).

علم هيئة الارض ومساحتها .

٧٩٥- أرآط Azoospermie (F). Azoospermia (E).

هو عدم وجود الحويثات المنوية في المني .

٧٩٦- أرآفيلدا Orphie de castraine (F).

سمكة بحرية تدعى خرمان المتوسط ، اطلبها .

٧٩٧- آرآك* ، كبات* ، شجر السواك

Salvadora persica (S). Salvadore, Arac, Mésuak (F).
Tooth brush tree (E). Senfkorn (D). Salvadora (I)

جنبه من الاراكيات تعتبر من النباتات الطبية ، مهدا
يلاد المعجم والهند . جذورها حريفة منقطة . ساقها قصيرة
اغصانها قليلة ، افنادها فروع متشعبة كثيرة الافنان
الطويلة المنتصبة || اوراقها متقابلة ، معنقة ، رخية
النصل ، شبه لحمية النسيج ، لونها الى الرماد الاطلعل .
مقوية المعدة ومسهلة || ازهارها عنقودية التجميع ، هامة
الارتكاز ، رباعية البتلات والاسدية ، صغيرة الحجم



آراك



أرآلية جنسة



أرآلية شجرة الملاك



أرآلية عارية

٨٠٧ - أرب Nouveau-nés (F). New-born (E).
الأرب : صغار الهم ساعة تولد (القاموس).

٨٠٨ - أوت أرب بالمكان : لزمه واقام به . طير مرب .

٨٠٩ - أربنة Laisse, Lesse (F). Leash, String (E).
قلادة الكلب التي يقاد بها وكذلك الدابة (لسان العرب) .

٨١٠ - أربجان Alyxia (S). Alyxia (F).
Brushland box (E). Alyxienbaum (D). Alissia (I).
جنس نباتات دماء معمرة من فصيلة الدفليات . مهدا البلاد الآسيوية الحارة . أنواعها عديدة جيمها شجيرات أو شجيرات . سوقها منتصبه فرعاء . أوراقها معتمة متقابلة نصلها سناني الشكل ، لونه الى الخضار اللبس . أزهارها عكولية التجميع يغلظ فيها الأبيض .

٨١١ - أربند* ، عربند* ، شجاع Echis carinata (S). Echis à carène, Vipera des pyramides (F). Echis (E).
أفعى سامة خبيثة طولها نحو ٧٠ سم . رأسها نوزي الشكل ، عنقها دقيق مستطيل ينتفخ عند الغضيب . ثوبها بلون الرمل المابق يعلوه تدبيج اغبر ورقشة وخطوط كدر || موطنها اواسط افريقية ومصر واليمن . وهي من الافاعي التي يستعملها الحماوي ولا يخشى منها لانه يقتلع أو يسحق انيابها العاطبة .

٨١٢ - أربيس* Arabis (S). Arabette (F).
Araby, Wall-cress (E).
جنس نباتات عشبية برية من سبط الحيرانثوسيات وفصيلة الصليبيات . انواعه عديدة منها المرطام والزباء والحولية والمحولة والمعمرة . اكثرها من اشباب الجرود والمناطق الداخلية وبعضها ينبت على الساحل || أوراقها صغيرة مستطيلة . أزهارها بنفسجية أو بيضاء اللون . كؤوسها منتصبه . بتلاتها ذات محالب ، سماتها غير منقسمة . بزورها على صف واحد ومنها على صنفين . معظمها مجنح الختار || اشهر انواعه الشرقية ما يتبع .

٨١٣ - أربيس أبيض Arabis albidia (S).
نوع من الاريس . الساق قصيرة قليلة الفروع . الاوراق بيضية منفرجة التسنين . الأزهار كبيرة . البتلات بيض . البزور ضيقة الخواجب || يكثر وجودها تحت جرود لبنان .

٨١٤ - أربيس أذني Arabis auriculata (S).
نوع من الاريس . الساق فرعاء . الاوراق مستطيلة ، غير منتظمة التسنين . الزيدة اطول من الكأس . الأزهار صغيرة . البتلات بيض . البزور مطوقة بظ || يكثر وجودها في جبل الشيخ والجبل الشرقي .

٨١٥ - أربيس أوشتر Arabis aucheri (S).
نوع من الاريس . الساق فرعاء كثيفة الزغب . الاوراق مستطيلة مسننة . الزيدة صغيرة اقصر من الكأس . الأزهار صغيرة بيضاء اللون || يكثر وجودها بين عيتاب ودمشق .

٨١٦ - أربيس برجي Arabis turrita (S).
نوع من الاريس . الساق قليلة الزغب والفروع . الاوراق مستطيلة مستدقة الاسنان . الأزهار صغيرة بنفسجية . الحرنوبيات طويلة مفلطحة ومعقدة . البزور عريضة الجناح . يكثر وجوده في جبل اللكام .

٨١٧ - أربيس ربيعي Arabis verna (S).
نوع من الاريس . الساق قليلة الزغب والفروع . الاوراق بيضية مسننة . الأزهار بنفسجية . الحرنبية منضغطة منتصبه . البزور عادية || يوجد في السواحل اللبنانية السورية وفي فلسطين .

٨١٨ - أربيس سماقي Arabis thyrsoidea (S).
نوع من الاريس وهو نجمة صغيرة . أوراقها بيضية قليلة التسنين ، أزهارها بنفسجية ، حرنبياتها قصيرة منتصبه . توجد في محيط ظهر القضيبي .

٨١٩ - أربيس سهمي Arabis sagittata (S).
نوع من الاريس . الساق غفائية . الاوراق مستطيلة منفرجة التسنين . الأزهار بيض . الحرنبيات خطية منتصبه ، البزور ضيقة الخواجب || يوجد في جميع المناطق اللبنانية .

٨٢٠ - أربيس قصير الاوراق Arabis brevifolia (S).
نوع من الاريس . الساق حزمية قصبة . الاوراق صغيرة قليلة التسنين كثيفة الزغب لينة ، الحرنبيات منتصبه . يوجد في لبنان والجبل الشرقي .

٨٢١ - أربيس مسترسل Arabis laxa (S).
نوع من الاريس . الساق عالية فرعاء . الاوراق مستطيلة لسنة عريضة الأذينات . الأزهار كبيرة بيض . الحرنبيات رباعية الزوايا المنفرجة . البزور محرفة || يوجد في الجبل الاقصر .

٨٢٢ - أربيش ، أرمش
أربش وأرمش الشجر : اوراق وثظطر وقيل اخرج ثمره كانه حص .

٨٢٣ - أربيع Hydrophyte (F).
كل نبات يعيش في الماء . وهي مربعة .

٨٢٤ - أربنعه ثلاثي اللخاص* ، رنآن*
Chasmarhynchus tricarunculatus (S).
Araponga à trois caroncules, Sonneur (F).
طائر من فصيلة القطنجيات . موطنه الفويان . يألف الغابات النائية . صوته يشبه رنين الجرس || جسمه كبير القد يطول نحو ٣٠ سم . عند الذكر ونحو ٢٧ سم . عند الانثى . والذكر يتميز بثلاث لحاص سود مستطيلة ترتكز على قاعدة الافك العلوي من المنقاد . ثوبه الى السمرة الكستنية السفعاء باستثناء الرأس والعنق والصدر فانها عابجة البياض . عيناه كبيرتان مكحلتان بالاسود . حدقة عينه الى الخضار الزيتي . منقاده كبير القد ، عريض القاعدة ، واسع الشدق . ساقه الى السمرة الخنطية . ثوب الانثى الى الخضار الزيتي . علاطها وصدرها مشيزان بالاصفر . عيناها مملوكتان بالخنطي || يعتبر من الطيور الشديدة الخلد . مجسمه العادي فن الاشجار الرفيعة . قوته الثمار والحبوب || يدشن عشه في اعالي الاشجار الرفيعة بين الافنان الكثيفة . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٧ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٨٢٥ - أربونين Arbutine (F).
خلوكوزيد يستخرج من ورق العيسران . يستعمل طبياً لإدرار البول .




أرب



أربس



أربنعه ثلاثي اللخاص



أربيان

٨٤٠ - إِرْتِفَاع (F). Hauteur (F). Height (E).

٨٤١ - إِرْتِفَاق ، حَقِّقْ ، مُرْتَفَقٌ (F). Servitude (F). Easement (E).

تكليف مرتب على عقار لمنفعة عقار آخر يملكه الغير . والارتفاق قد يكون تكليفاً بالفعل فهو اذ ذلك ايجابي او بعدم الفعل فهو سلبي || اما الارتفاقات فمديدة اشها ما يتبع .

٨٤٢ - إِرْتِفَاقٌ إِتِّفَاقِي (F). Servitude conventionnelle (F). هو الذي أنشأ اتفاق بين اصحاب الشأن .

٨٤٣ - إِرْتِفَاقُ الشِّفَةِ ، حَقِّقْ الشِّفَةَ (F). Servitude d'abreuvement, Servitude d'abreuvoir (F). هو ارتفاق يلزم صاحب عقار فيه مورد ماء بان يترك جيرانه يسقون مواشيهم منه .

٨٤٤ - إِرْتِفَاقُ النِّظَرِ (F). Servitude de visibilité (F). هو ارتفاق قانوني مستحدث يراد به رفع الحواجز والشجار التي تعوق النظر عند منعطفات الطرق ومنعرجاتها وتقاطعها لاجل سلامة المرور .

٨٤٥ - إِرْتِفَاقُ خَطِّ التَّنْظِيمِ (F). Servitude de reculement (F). هو ارتفاق اداري يمنع من له عقار خارج عن التنظيم ان يزيد عليه في البناء ويوجهه على تركه كما هو حتى ينداعى ويضطر الى هدمه فتستولي الادارة حينئذ على ارض الجزء الخارج عن التنظيم وتدفع له التمييز المستحق .

٨٤٦ - إِرْتِفَاقُ زِرَاعِي (F). Servitude rurale (F). هو الذي يكون محله أرضاً زراعية .

٨٤٧ - إِرْتِفَاقُ طَبِيعِي (F). Servitude naturelle (F). هو الذي ينشأ من طبيعة العقارين كحق مسيل مياه المطر .

٨٤٨ - إِرْتِفَاقُ ظَاهِر (F). Servitude apparente (F). هو الارتفاق الذي تنبئ عن وجوده اعمال ظاهرة كارتفاق مرور المياه .

٨٤٩ - إِرْتِفَاقُ عَدَمِ الْبِنَاءِ (F). Servitude non aedificandi (F). هو الالتزام بعدم اقامة بناء على ارض معينة .

٨٥٠ - إِرْتِفَاقُ مُسْتَمَرٍّ (F). Servitude continue (F). هو الذي يظهره وضع العقارين فلا يقتضي استعماله مجهوداً كارتفاق مرور المياه وعدم التعلية ...

٨٥١ - إِرْتِفَاقُ (F). Evolutionnisme (F). Evolutionism (E).

الارتقاء نظرية بيولوجية تقول بارتقاء الانواع الحية وبعدم استقرارها على حالة معينة ، وهي بذلك تعاكس نظرية الركافة .

٨٥٢ - إِرْتِفَاقُ (F). Récidivité (F). Recidivité (E). هو الرجوع ، بالزروع العدائي ، في السلالات النباتية المتحدرة الى بعض الصفات الدفينة .

٨٥٣ - إِرْتِفَاقُ (F). Gonflement (F). Swelling (E).

٨٥٤ - إِرْتِهَاش (F). Atteinte (F). Affected (E). جرح القائمة بان يصك الفرس بمرض سحافه عرض عجايبه

٨٢٦ - أَرْبُوعَات (F). Tetraspores (F).

هي الابواغ الرباعية التركيب .

٨٢٧ - أَرْبِيَانٌ* ، رُوبِيَانٌ ، قُرَيْدِسٌ ، عَجَبَارٌ ، جَمْبَرِي ، جَمْرِي ، قُرُونٌ

(F). Crevettes (F). Prawn, Shrimp, Crangon (E). مجموعة اجناس وانواع من القشريات المشاريات الاقلام منها نهريه وبحيرية تعيش في المياه الحلوة ومنها بحرية . اكثر الانواع النهريه تنتمي الى جنس غروس (Gamarus) اما البحرية فانها من القريدسيات (Carididés)

٨٢٨ - أَرْبِيَّةٌ ، خُرَاجٌ ، دُمْلٌ ، هَبَسَجٌ ، وَرَمٌ (F). Tumeur (F). Tumor, Swelling (E). عطب عارض او دائم يصيب الحيوان . اسبابه مختلفة منها خارجية تعود الى رضة او صدمة او ضربة او جرح ومنها داخلية تعود الى عوامل شتى يرجع تقريرها ومعالجتها الى الطبيب البيطري .

٨٢٩ - أَرْبِيَزُولٌ (F). Arbisol ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في المكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات وضد بعض الامراض الفطرية .

٨٣٠ - إِرْتِبَاطٌ (F). Association هو في العرف العدائي الصلة التي تربط الصفات والعوامل الخلقية .

٨٣١ - إِرْتِبَاطٌ ، عِلَاقَةٌ (F). Corrélation (F). Correlation (E). هو نسبة تجمع بين شيئين .

٨٣٢ - أَرْتَمَةٌ (F). الشمر الذي على رأس الحرباء .

٨٣٣ - أَرْتَجٌ (F). يقال أرتجت الاتان وهي مرتج اذا حملت . وارتجت الناقة وهي مرتج اذا قبلت ماء الفحل فاغلقت رحمها عليه . ويقال للحامل من الحيوان مرتج لانها اذا عقدت على ماء الفحل انسدت فم الرحم (لسان العرب) .

٨٣٤ - إِرْتِجَاجٌ ، إِهْتِزَازٌ (F). Vibration حالة الشيء الذي يتحرك بسرعة .

٨٣٥ - إِرْتِجَاجِيٌّ ، إِهْتِزَازِيٌّ ، زَلْزَالِيٌّ (F). Séismique, sismique (F). Seismic (E). نعت تعريفى يطلق على ما هو منوط بالزلزال والاهتزاز الارضي .

٨٣٦ - إِرْتِشَاحٌ ، نَتَحٌ (F). Exsudation (F). Exudation, Sweat, Perspiration (E). هو ما ترشحه او تلتصحه الاجسام الحيوانية والنباتية

٨٣٧ - إِرْتِشَاحٌ عَجِيثٌ (F). Septicémie gangréneuse (F). Gangrenous septicæmia (E). تقيح يسبب عن الدم .

٨٣٨ - إِرْتِشَاحَاتٌ (F). Transudats هي ما تفرزه بعض الاجسام من سوائل خاصة .

٨٣٩ - إِرْتِفَاحٌ ، إِنْفَاحٌ (F). Gonflement (F). Swelling (E). خاصة طبيعية تنحلل بها بعض النسيج الحيوانية والنباتية تجعلها مستعدة لقبول الزايد الحجمي والاستيعابي .

من اليد الأخرى فيدميها .

٨٥٥ - أرثوازي

Artésien (F). Artesian (E).

نعت يطلق على المياه الجوفية التي ترتفع عن مركز تفجيرها عمداً بالنظرية الطبيعية القائلة : أن السوائل ، من مياه وغيرها ، المتصلة السطح تميل الى التساوي النسبي .

٨٥٦ - أرثوسيد

Orthocide

فاطور زراعي يحوي ٥٠ ٪ من مادة كابتان (Captan) الفعالة . وهو مسحوق ناعم يذوب في الماء ويستعمل في معالجة عدة أوصام فطرية تفتك بالخضار وبالأشجار المثمرة . يحل بمعدل ٢,٥ ٪ .

٨٥٧ - أرثو فلتان

Ortho-Phaltan

فاطور زراعي -حديث العهد شديد الفاعلية يستعمل في مكافحة عدة أوصام نباتية أخصها الأعداد والتسنة والريفة والبلاكروت والدغيلة والقاروية التي تتركب الأشجار المثمرة والكرمة والبقول ونباتات الزينة .

٨٥٨ - أرثو كرس

هي الجاكا أي شجرة الخبز .

٨٥٩ - أرثوليت الخلتج *

Ortholitha mucronata (S).

Ortholithe des bruyères (F).

Ortholitha mucronata (E).

حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصناع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشاتها جارسة قوتها رحيق الازهار . أساريعها تعيش على اوراق الخلتج والزنان . جسمها صغير القند يطول من ١١ الى ١٢ مم . بسطتها تراوح من ٣٢ الى ٣٦ مم . رأسها معتدل الجرم حنطي اللون . عيناها زهميتان صنيرتان . زبانها مشطيان عند الذكر ، شريطيان عند الانثى . جوشها وبطنها الى الحنطي الاكلف الموج . روشنها الامايمان الى الحنطي تعلوه ثلاثة خطوط معترضة عنابية وخط من النقط يكتنف الحثار الخارجي . روشنها الخلفيان الى الحنطي تعلوه مشعة سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح من الغروب الى فحمة الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الممكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٢٤ الى ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل : نوبها الى الحنطي الوردي الموج تعلوه رقشة غبراء وثلاثة خطوط قاطبة سمراء اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجشالة ضمن صلجة تنفلق عند انطلاق الفراشة .

٨٦٠ - أرث ، كهر

الأرث نبات له قضيب واحد في وسطه وفي رأسه مثل الفهر المصنوب غير ان لا شوك فيه فاذا جف لطاير . ليس في جوفه شيء وهو مرعى للابل تسمن عليه (لسان العرب) .

٨٦١ - أرث

Borner (F). To limit, To bound (E).

أرث الارضين : جعل بينها أرثة اي حداً (التاج) .

٨٦٢ - أرثة ، متار

Borne (F).

Limit, Boundary (E).

الحدي بين الارضين

٨٦٣ - إرثد* ، سرساد ، بنجنگشت ،

فنجنگشت ، شجرة ابراهيم ، كف مريم

Vitex agnus-castus (S). Gattilier commun, Agneau-chaste, Arbre au poivre (F). Chaste tree, Agnus-castus, Hemp tree, Abraham's balm (E). Kenschbaum müllen, Abrahamsbaum (D). Agno-casto comune, Pepo falso, Vitice, Peperella (I).

جنبه طيبة وتزيينية معمرة من فصيلة رعي الحمام . ساقها فرعاء تعلو من ٢ الى ٤ امتار . عودها صلب كعود الزمان . اوراقها متقابلة معنقة زباء النصل . ازهارها جيلة الشكل عطرية العرف ، زرقاء اللون ، يستمر ازهارها من حزيران الى آب || ثمارها حب كالفلفل يقال له حب الفقد لان استعماله يفقد شهوة الجماع ويمنع النسل لذلك فهو لا يزال رمز الطهارة وكانت الراهبات تتخذنه فيما مضى فراشاً هن في الاديرة وهذا سبب تسميته حب الفقد وكف مريم || نقيعه حاضم وطارد للغازات . اما بزوره فتندفع السموم حتى القتالة .

٨٦٤ - إرثد الصين

Vitex incisa (S).

Gattilier incisé, G. de Chine (F).

نوع من الارثد وهو جنبه طيبة معمرة مهادها الصين . ساقها فرعاء تعلو من المتر الى المترين . عودها صلب ، اوراقها متقابلة ، معنقة ، اذينية ، زباء النصل . ازهارها صغيرة زرقاء اللون خلية الكأس والبتلات . ازهارها يدوم من تموز الى ايلول .

٨٦٥ - إرثين ، جين

Gène (F). Gene (E).

عامل الوراثي الاول وهو اصغر وحدة فيزيولوجية حية .

٨٦٦ - إرثيني ، جيني

Génique (F).

Genic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالارثين او الجين .

٨٦٧ - أوج

Vestibule (F). Hall (E).

جزء من نباك الارضة قوامه دهليز فسيح مستطيل يتأخم قاعة الملك تأوى اليه الشرطة .

٨٦٨ - أوج

Odoriférant (F). Odoriferous (E).

فاحت منه رائحة طيبة .

٨٦٩ - أوجاء

Parturition

الارجاء والاضراع دنو نتاج كل حامل من اناث الخيل والبقر والابل والغنم ... واذا دنت ان تخرج ولدها فهي مرجى .

٨٧٠ - أوجاب

Intestins (F). Bowels (E).

هي امعاء البهم اي مذاخرها .

٨٧١ - إرجاس

Sondage (F). Sounding (E).

تحري عمق وعناصر الطبقات الارضية .

٨٧٢ - أرجان اطلب أركان

٨٧٣ - أرجة القرون اطلب بوهينيا

٨٧٤ - أرجعية

Probabiliorisme (F).


Probabiliorism (E).

الارجعية مذهب فلسفي اجتماعي يقول بلزوم السلوك حسب الرأي الأرجح .

٨٧٥ - أوجن

Apprivoiser (F). To tame (E).

ارجن الطائر والحيوان جعله أليفاً داجناً .



ارثوليت الخلتج



إرثد

جسمها متوسط القد يطول من ٢١ الى ٢٣ م. بسطها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ م. رأسها معتدل الجرم. عيناها زهميتان ، كبيرتان . زباناها صولجانيان مستطيلان . مرشفها دقيق مستطيل . جوشنها وبطنها كثيفا الحمل ، بنيا اللون . روشنها الاماميان الى الصحرة الصنابية يعاوها بجذيع وتقليم ورقشة وزرا كش كستنية . روشنها الخلفيان الى الصحرة تعلوها مشحة كستنية وخطان قاطبان وبعض النقط والزرا كش . لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بثمانية اسابيع وتمتج المكن على نصال اوراق النباتات العائلة . السرفة عند بلوغها الادراك تطول نحو ٣٨ م. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مبعر الهلب . ثوبها الى السواد الجوزي الموج يعلوه خطان اصفران وعشرة اطواق سكرية خضراء وثمانية ازواج من الثعلب الحمر . طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة .

٨٨٢ - أرخ

هو الوعل المنبسط الظلف والاثنى رجاء ج. رُح .

٨٨٣ - أرخ، ماريّة

Oryx جنس حيوانات لبونة مجترة من بقر الوحش . انواعه خمسة . جميعها كبيرة الجثة ، ثوبها الى الجؤوة الغبراء ، بطنها ابيض ، رأسها مستطيل يحمل سيالة سوداء ويعلوه قرنان طويلان كسيفين احدين . عنقها قصير غليظ ، ذنبها متوسط الطول اسود الشعر . الاثنى قرناء وضربها رباعي الاختلاف كالبقر . تألف الحياة الجماعية . آجالها كبيرة العدد تأوى القفر والبيداء . مهدا افريقية والجزيرة والعراق وسورية . الذكر يدعى الارخ والاثنى أرخة وقيل هي الفتية دون سواها .

٨٨٤ - أرخ افريقي * ، ماريّة افريقية ، بئسة ،

متهمة Oryx beisa (S). Beisa antelope (E). موطنه الحبشة والصومال والكردفان الشمالي حتى علو ١٠٠٠ متر . وحوض البحر الاحمر . يتميز بكثافة عرفه الاسود ويخلو صدره من الوبر الطويل . جهته موشحة بالاسود ، سيالته تبتدى ضيقة ثم تعرض . طول قرن الذكر نحو ٣٠ سم. والاثنى ٣٣ . اجله كبير العدد يراوح من ٣٠ الى ٦٠ . يألف السهول والاماكن الكثيرة العشب . ينفر من الادغال والاحراج .

٨٨٥ - أرخ البادية * ، ماريّة البادية .

Oryx callotis (S). Oryx callotis, Oryx à pinceaux (F). موطنه السهول الافريقية وجوانب الصحاري . قد قد الارخ الافريقي لكه اغبس اللون وسواد جهته اقل انتشاراً .

٨٨٦ - أرخ الجزيرة * ، ماريّة الجزيرة ، وضيحي ،

أبو سوتج Oryx Beatrix (S). Oryx Béatrix, Antilope Béatrix (F). Princess Beatrix's antelope (E). موطنه البلاد العربية . جثته اسفر من جثث رفاقه . ارتفاعه نحو ٨٦ سم. ثوبه اغبر ، رأسه ابقع وقوامه كذلك . طرف ذنب اسود . قرنه نحو ٣٧ سم. . اجله من ٢٠ الى ٣٠ . يألف الصحاري والهضاب الوعرة .

٨٨٧ - أرخ الصحراء ، ماريّة الصحراء ، أبو حوآب

Oryx gazella (S). Oryx gazelle, O. algazelle, O. du Cap, Pasan (F). Gemsbok, White oryx (E).

٨٧٦ - أرجوان * ، أرجوان العرب ، أرغوان

خزريق ، زهزريق ، سيجريق ، شجرة اليهود Cercis (S). Gaiier, Arbre de Judée (F). Red bud, Judas tree, Love tree (E). Echter Judasbaum (D). Chiantanella, Tregano, Arbero di Giuda (I).

نوع اشجار حرجية من فصيلة السنفيات . منبتها حوض البحر المتوسط . ضرورها ثلاثة جيمها حرجية وزينية . سوقها لمساء اللحاء منتصب . اخشابها موشحة بالسمر ، شديدة الصلابة تستعمل في صناعة الادوات الخشبية . اوراقها متتفة متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل قائم الخضار . ازهارها محورية الارتكاز تنضج على الافناد والاغصان وهي وردية اللون ، ارجوانية الموج ، مستدة يجمعها زناد قصير . ثمارها قرنية ، مفلطحة ، رقيقة ، عقفاء المقصة المدببة الحادة . نقيع بزورها يربط المدة . تتكاثر بالبذر ، تعيش في جميع الاثربة . تفضل المواقع الرطبة .

٨٧٧ - أرجيا

Orgyia (S). Orgyie (F). جنس حشرات فراشية من فصيلة القزيات ذكورها مجنحة . انثاها عديمة الجناح . اساريها زباء ، تلثم اوراق الاشجار المثمرة والحرجية . اشهر انواعه : أرجيا أنثيكا .

٨٧٨ - أرجيا أنثيكا *

Orgyia antiqua (S). Orgyleantique, Bombyx étoilé, Étoilé (F). Vapourar moth (E). Schlehenspinner, Aprikosenspinner (D). نوع من الارجيا . فراشها صغيرة القد عنابية اللون زباناها مشطية . عروق رواشها سمر . لطخة روشنها الاماميين كلوية الشكل ، صغيرة القد ، بيضاء اللون . رقتها تدعى « الدورة الزباء » لانها كثرة الهلب الدقيق . تركب الاشجار المثمرة والحرجية فتعبلها وتؤذيها . لها جيلان في السنة . اما بياتها الشتوي فكئي والاثنى تمتج مكنها في غالب الظروف على الصلجيات القارغة وبين شقوق لحاء السوق والاغصان . الزيتوث الشتوية تقضي على المكن والحواشير تبدي اليرقات .

٨٧٩ - أرجير *

Argyrolobium (S). Argyroloba (F). Silver-leaf (E). Silber blatt, Silberhülse (D). Argirofilla (I).

جنس نباتات عشبية وجنية من سبط اللوتيات وفصيلة القرنيات . مهده البلاد الافريقية الحارة . انواعه عديدة منها برية علفية ترغب فيها الماشية ومنها زراعية تزيينية ، ازهارها جميلة مستحبة العرف والالوان .

٨٨٠ - أرجيرية

Argyreia (S). Argyrée (F). نبات زراعي تزييني عارض من فصيلة المحموديات . اوراقه بيضيه كبيرة او مفصصة ، نصلها امس الصفحة العليا الجميلة الخضار ، ازغب الصفحة السفلى الموشحة تحمل فضي . ازهاره خشتوية جميلة الشكل حراء اللون . يتكاثر بالبذر والمقل ، سريع النمو ، يوجد في جميع الاثربة ، ينحش المواقع الباردة الرطبة .


٨٨١ - أرجيفيس البراري *

Argynis aglaja (S). Grand Nacré (F). Argynis aglaja (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض المناطق المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروية . فراشها تميز على رحيق الازهار وطلماها . اساريها خاضعة تركب اوراق المومج والبلان والقراص .




أرجوان




أرجيا أنثيكا



أرجير



أرجيفيس البراري



أرخ افريقي



أرخ البادية



أُرْخ الجزيرة



أُرْخ سوداني



أُرْخيس



أُرْذية



أُرْز

٨٩٧- أُرْزوت Arrow-root

مادة نشوية غذائية تستخرج من جذامير المرتطة .
تحتوي على : مواد ازوتية من ١ إلى ١٧٠ ٪
مواد دهنية من ١٥ إلى ٢٥ ٪
مواد نشوية وسكرية من ٨٢ إلى ٨٦ ٪

٨٩٨- أُرْزوتته اطلب مرتطة قصية .

٨٩٩- أُرْز * وُرْز Oryza sativa (S). Riz (F).

Rice plant (E). Reis (D). Riso (I).
نبات زراعي عشبي متعمر من فصيلة النجيليات . يقال ان موطنه الاصلية كانت بعض مناطق الصين واليابان والهند . وهو يزرع الآن في معظم البلاد الحارة والمعتدلة كاليابان والصين والهند وسرنديب والعراق وسورية ومصر والسنگال وفرنسا وإيطاليا وأمريكا والبرازيل ... || أنواعه المعروفة الشائعة اربعة منها ثلاثة تعيش في الماء وهي :

الارز المزروع المعروف بالارز O. sativa (S).
Riz cultivé (F). Cultivated rice (E).

الارز الصمغي O. glutinosa (S). Riz gluant (F).

الارز الطواف O. fluitans (S). Riz flottant (F).

اما الرابع وهو المعروف بالارز الجبلي O. montana (S).
Riz de montagne (F). Mountainous rice (E).

فانه من النباتات التي تكتفي بالري العادي والتي يمكن زرعها عذبة حتى علو ١٨٠٠ م || ضروب الارز كثيرة العدد وقد صار ترتيبها بالنسبة الى بلادها المنتجة لذلك يقال الضروب اليابانية والصينية والهندية والمصرية والاطالية والامريكية . ولكل منها ميزات خاصة وفوارق شكلية || جذوره خفية سطحية ، سوقه قائمة سلامة دقيقة اسطوانية فارغة طولها يراوح من ٨٠ الى ١٥٠ سم . فأكثر || شرافقه مستطيلة سهمية خشنة مسننة الحافة || ازهاره عنقودي هامي منقصب زهرته مخضونة . بعصيفتين مستطيلتين || حبتة تدعى شلبة وهي مستطيلة مبرزية يابسة منلفة بعصيفتين تلحفانها كاللباس . حبة المقشور المعروف بالرز مأكول شائع الاستعمال . غني بالمواد النشوية ، يحوى نحو : ٨٥ ٪ من النشا او المواد الهيدروكربونية - ٢ ٪ من المواد الازوتية - ١ ٪ من المواد الدهنية - ١٢ ٪ من الماء || انتاج الرز العالمي السنوي لا يقل عن ١٠٠ مليون طن وقد يأتي بعد الحنطة والذرة الصفراء . وتقدر الشعوب التي تعتبر الرز غذاء اساسياً بنحو نصف سكان العالم || يستخرج من شلب الارز بعد تخميره وتقطيره نوع من الكحول القليل الضرر يدعى «سكي» يستعمل استعمال جميع المشروبات الكحولية ، ومن المعروف ان ١٠٠ كيلو من الشلب تقطر ٣٠ ليتر من الكحول عيار ٣٦ درجة ستغراد .

زراعته : يزرع ويحصد في الآتية الطينية الرملية والطينية الكلسية وهو لا يحصى الاراضي المالحة ولا يفسيه اندماج التربة . ولكنه يتطلب الري الغزير المستمر اي الغمر بالماء وقد يزرع في المكان الواحد بضع سنين متوالية دونما ضرر او نقص في المحصول شرط ان يسد سنوياً بالاسمدة الكيماوية المركبة المناسبة || اما التربة المعدة لزراعة الارز فيجب ان تكون جالسة مستوية لتمكين غمر الماء واستقراره واستبداله . وبعد حرثها وتقسيمها الى مساكب (احواض) مربعة او مستطيلة الشكل ، مساحة واحدتها من ١٠٠٠ الى ٥٠٠٠ م ، تحضن باعصاد عريضة وقوية تحميها من انسياب الماء . ثم يصار الى ديا ولا يذر الشلب الا بعد تقلص الماء . اما كمية البذار فمعدلها نحو ٨ كيلو للواحد

موطنه صحاري وسهول افريقية الشاسعة الفسيحة . جثته كبيرة طولها نحو ٢٣٥ سم . وارتفاعها لا يقل عن ١١٥ ، قرنه من ٩٠ الى ١١٠ سم . ثوبه ارمي اغبر ، رأسه ابلق مؤذر . بطنه ابيض || اجله من ٥٠ الى ٨٠ . ذكوره لا تتخالط انثاه الا في زمن السفاد .

٨٨٨- أُرْخ سوداني * ، ماريّة سودانية ، ناشيط ، هَيْطَلَة

Oryx leucoryx (S). Oryx de Nubie (F). Sabre-horned antelope (E).
يكثر في صنار والكردفان وبلاد النوبة والسودان . وهو بطيء الحركة ، ريع الجثة غليظها . طوله نحو ٢٠٠ سم . وارتفاعه ١٣٠ || ثوبه اصهب اغبر ، رأسه ابلق تعلوه ست بقع سود ، عنقه عابق اللون . بطنه ابيض . طرف ذنبه اسود . قرنه نحو المتر || اجله من ٢٥ الى ٤٠

٨٨٩- أُرْخيس * Archaeoptéryx.

Archéoptéryx (F). Archaeopteryx (E).
هو اقدم طائر معروف حتى الآن . وجدوا حفيرته في شس اشتاد في بافاريا . من هيكله يتبين انه قريب الصلة بالزحافات . قد قد الغراب الحالي . ذنبه مؤلف من ٢٠ فقره وكل فقره تحمل زوجاً واحداً من الريش . منقاده مسنن واسنانه مخروطية الشكل . جناحاه وقائمتاه مجهزة بمخالب .

٨٩٠- أُرْخَم

هو من الخيل ما كان رأسه ابيض وساثره اسود وهي رخاء .

٨٩١- إِرْدَب

- الإردب مكبال يأخذ اربعة وعشرين صنعا . والأردب اربعة وستون مناً || الإردب القناة التي تجري فيها الماء على وجه الارض .

٨٩٢- أُرْدَسِيمُون هو الاريسيموم ، اطلبه .

٨٩٣- أُرْدَع

الاردع من الغنم الذي صدره اسود وباقيه ابيض . يقال كبش اردع وشاة ردعاج . ردع .

٨٩٤- أُرْدِيَة Brique refractaire (F).

Fire-brick (E).
هي الاجرة او القرميدة النارية التي تستعمل في الافران والتي تتحمل اقصى درجات الحرارة .

٨٩٥- أُرْدِيَّات Ardisiaceae (S).

Ardisiacées (F). Ardisiaceae (E).
سبط من فصيلة انقسيات . اجناسه وأنواعه قليلة العدد جميعها جنات متوسطة او صغيرة القد منبها فسيح الاربعاء يشمل اكثر الاصقاع الجبلية الاسيوية والافريقية .

٨٩٦- أُرْدِيَّية * Ardisia crenata (S).

Ardisia, Téneller (F). Spear-flower (E). Spitzblume, Ardisia (D). Ardisia (I).
جنبة تزيينية من الاردييات . ساقها اسطوانية ملساء . اوراقها معنقة متقابلة ، نصلها يبيض الشكل ، مأروف الطرف . ازهارها عنقودي النجيج ، محوري وتاجي الارتكاز . ازهارها خاسية البتلات والاسدية ، وردية اللون . ثمارها عنبة صفراء اللون لا تؤكل || كانت ولا تزال تستعمل ضد الحميات في بعض البلاد الشرقية ومنها سرنديب .

٩٠٦ - أرزوز*
Oiseau des Cèdres (F).
Cedar bird (E).
جنس طيور من الجواثم . قليل الانواع . لونه زيتوني
احمر الموج والجناح ، اقم الصدر ، ارجل المؤخر ، اصفر
البطن ، اسود اللحيين ، ابيض الزمكي || يدثن في شجر
الارز والدوح . يعيش اسراباً كبيرة ويعطير بسرعة فائقة
بمعاني الجو || من انواعه الارزوز الامريكي الذي تنطبق
عليه التحلية المذكورة والارزوز الياباني الاطلس الجناح .

٩٠٧ - أرزوم*
Arisema (S).
Arisème (F). Arisema (E).
جنس نباتات عشبية عسقلية معمّرة من فصيلة القلقاسيات .
منبتها يمتد من الهند الى اليابان وامريكا الشمالية ||
اوراقها مركبة مستطيلة الوريقات الورتية العدد . شراخها
مضلعة ، ملونة . ضبابها اسطوانية الشكل . شراخها
محدودة تنعطف على ضبابها || تزرع للتزيين ولا تخشى
البرد . ترغب في الاقربة المتوسطة الاندماج ، المتناسبة
التركيب العنصري ، الغنية بالمواد العضوية والازوت .
انواعها عديدة اشهرها الثلاثة التالية :

٩٠٨ - أرزوم أرجواني العنبر
Arisema atropurpureum (S).
Arisème brun-pourpre (F).
نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقلية معمرة .
منبتها امريكية الشمالية . تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها
مستطيلة المعاليق ، ثلاثية الوريقات الضيقة . شراخها
يطول من ١٠ الى ١٥ سم . شراخها ارجواني العنبر || تنويرها
يستمر من حزيران الى تموز .

٩٠٩ - أرزوم أعقف
Arisema tortuosum (S).
Arisème tortueux (F).
نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقلية معمرة . منبتها
بعض جبال الهند والافغان . تملو نحو ٣٥ سم . اوراقها
مستطيلة المعاليق تتألف من ١٣ او ١٥ او ١٧ او ١٩
او ٢١ وريقة سنانية النصل . شراخها اقصر من ضبتها
المقوسة الشكل . شراخها يطول نحو ٣٠ سم . || تنويرها
يستمر من حزيران الى تموز .

٩١٠ - أرزوم تيشيني
Arisema dracontium (S). Arisème dragon (F).
نوع من الارزوم . عشبة سبروتية عسقلية معمرة . منبتها
اليابان . تملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستطيلة
المعاليق ، خماسية او سباعية او تساعية الوريقات السنانية
النصل ، المستدقة الرأس . شراخها اقصر من ضبتها
المقوسة الشكل . شراخها معتدل الطول || تنويرها يستمر
من ايار الى حزيران .

٩١١ - إرزيز
Grêle fine (F). Thin hail (E).
البرد الصغير بحجم العدس وما دونه .

٩١٢ - أرز
Exercer l'agriculture (F).
تعاطى الزراعة عملياً .

٩١٣ - إرز
Essence
إرز الطيب : اصله وجوهه .

٩١٤ - أرز
أرز الشيء جعل له علامة .

(اي للألف م) وبعد نثر الشلب يصار الى طمره ثم
الى عمره بالماء ولا تصرف عنه الماء الا مرة في الاسبوع او
مرة كل خمسة ايام اذا كانت الارض صاخة || وزراعة
الارز تستقيم في التربة نحو ١٦٠ يوماً . يبذر في نيسان
وايار ويحصد في ايلول وتشرين || اما انتاج الدمن فيراوح
بين ٣٠٠ و ٥٠٠ كيلو من الشلب . ونسبة الرز اي
الحب المقشور الى الشلب تراوح من ٦٠ الى ٧٠ ٪ .

٩١٥ - أرز ، أرزة
Cedrus (S).
Cèdre (F). Cedar (E).
جنس اشجار حرجية كبيرة القد ، دائمة ، أبيدة من
التنوبيات . انواعه المعروفة اربعة : ارز لبنان والاطلس
وحمايا وقبرس .

٩١٦ - أرز الأطلس*
Cedrus atlantica (S).
Cèdre de l'Atlas (F). Atlas cedar, Atlantic
cedar (E). Atlasceder (D). Cedro affricano (I).
ويدعى الارز الفضي والمداد . نوع من الارز هرمي
الشكل ، منبسط الاغصان كبيرها . شجرته عظيمة ، دائمة ،
تملو من ٣٠ الى ٤٥ م . اوراقها عروية فضية اللون .
اكرازا يرمية الشكل تطول نحو ٥ سم . لونها الى الجؤرة
البفسجية || منبتها جبال الاطلس في افريقية الشمالية .
يستخرج منه بالحز دهن رائحي شفاف يدعى دهن الارز .

٩١٧ - أرز حملايا* ، أرز الهند ، شجرة الجن
Cedrus deodara (S). Cèdre déodar, C. de l'Hima-
laya, Déodar (F). Deodar, Himalaya cedar, Indian
cedar (E). Indische ceder (D). Cedro deodara (I).
نوع من الارز منبته جبال حملايا في الهند . اشجاره ضخمة ،
هرمية ، ملتوية القنة ، تملو نحو ٥٠ م . اغصانها منبسطة
متدلية الاطراف . اوراقها هدية قصيرة بحرية اللون يحلوها
مواج اغبر . اكرازا مردنية تطول نحو ١٠ سم .
اخشاشها خفيفة الوزن اللسبي ، ناعمة الرقة ، متوسطة
الصلابة لونها الى الصفار التبي .

٩١٨ - أرز لبنان*
Cedrus Libani (S).
Cèdre du Liban (F). Cedar of Lebanon (E).
Libanonzeder (D). Cedro del Libano (I).

ارزة لبنان شعار الجمهورية اللبنانية || نوع من الارز .
منبته جبل لبنان وقد رافق اسمه وذكره تاريخ الأمم منذ
التاريخ وهو لا يزال تلك الشجرة الضخمة الشاخة الجلييلة
التي لا يقل متوسط ارتفاعها عن الخمسين متراً ومتوسط
قطر دوحها عن الثلاثين . ساقها ضخمة ، منتصبة ، مستقيمة
دقيقة عند قننها المستمرة الانحناء والاتجاه نحو الشمال . لحاء
ساقها حرشة وخشفة . اغصانها غليظة افقية الانبساط ،
كثيفة الظل الوارف || اوراقها عروية ، متراصة ، دقيقة ،
لونها الى الخضار الاغبر . ازهارها وحيدة المسكن تبشر
بالربيع . ثمارها اكراز مسطحة يرمية الشكل كستنية اللون .
يزورها مفلطحة مجنحة ، جناحها عريض المادة الغشائية .
وهو من الاشجار الشاخة البطيئة النمو ، المديدة العمر .
خشبه ناعم الرقة ، متوسط الصلابة ، يبقى على الدهر
لا تشوبه شائبة لانه وافر المواد الراتنجية والادهان
الطيارة . لونه الى الصفار الامنر . عرفه رائحي فواح .

٩١٩ - إرزاح
Echalassage (F). Propping (E).
غرز المرازح بجانب الجفنة لدعها .

٩٢٠ - أرز
الارز شجر صلب تتخذ منه العصي .



أرز الأطلس



أرز حملايا



أرز لبنان



أرزوز



أرزوم

من حدود الألسكا الى الاريزونا والمكسيك || يألف الاحراج الكثيفة . يتسلق الاشجار بحفة ورشاقة . قوته نوامي ولحاء قن الاشجار اخصها الحور والدردار والاسوخة . جحره وكن يديره في صدع جذع شجرة غليظة . انشاء تحمل اربعة اطباء وتضع من الدوصين الى الثلاثة ادراس مرة واحدة في العام .



أرسول

٩٢٦- أرستوكس Arsetox
حاشور زراعي وهو لمسحوق ناعم يرتكز على زرنبيخات الكلس يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٥٥ سم. / في مكافحة اكثر الحشرات وخصها بنفساء البطاطا .

٩٢٧- أرستيندور نحاسي Arsedor cuprique (F).
فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١٥٢ / في مكافحة الامراض الفطرية التي تصيب البطاطا .

٩٢٨- أرستينوكس Arsenox
فاطور زراعي يستعمل في مكافحة اوصام البطاطا يحل ١ / وتنضج به الأوراق .

٩٢٩- أرسيور Arseor
حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الرصاص يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٨ سم. / في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

٩٣٠- أرشم Debourrer (F). To burst (E).
أرشم الشجر : اخرج ورقه .

٩٣١- أرشون* Hydnum repandum (S).
Hydne sinuée, Arresteron, Baquette, Barbe-de-vache, Brouquichon, Erinace, Eurchon, Pied-de-mouton, Farinet, Lurchon, Moissins roux, Penchenille, Rignoché, Urchin (F).

نوع من الفطور الصالحة للأكل ينتمي الى فصيلة الابريات ورتبة الدعاميات || ضروريه عديدة مختلفة الالوان والاحجام منها الاصفر والاغير والاطحل والاشهل والبني . جميعها صغيرة القد تغلو الارض من ٤ الى ٨ سم. ارسوسها لا قياسية الاستدارة والاحديداد ، تطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم. لهاها وافر السماكة ، جامد المقطع ، ابيض اللون ، مستحب الطعم || يكثر وجوده في الادغال والاحراج . يظهر في آب ويبقى حتى تشرين الثاني .

٩٣٢- أرشبة* ، حاليق ، عطفة .

Vrille (F). Tendril (E).
ورقة تحول نصلها الى ضلع لبني التركيب خيطي الشكل يمكن النبات من التعلق كما في الكرمة واليقطين وما اشبه .

٩٣٣- أرشيطوط ، أخطيطوط جبّار Architeuthis (S). Architeuthis, Poulpe géant (F). Giant devil-fish (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل . انواعه المعروفة قليلة العدد ، جميعها لجية قل ما تقترب من الشطوط || اجسامها تطول من ٣ الى ٥ امتار ، اما بسطها اي بسطة جرامزها فتراوح من ١٠٠ الى ١٦ متراً .

٩٣٤- أرضوصة

ترايد طبيعي مكور او بلوطي او طيني او درني الشكل يكون عند خاتم الثمرة .

٩١٥- إرساء المزاد Adjudication (F).

Adjudication, Auction (E).

هو ان يرمو المبيع بعد المناقصة على من يعرض ادنى ثمن يلتزم به القيام بالعمل على الوجه المشروح في دفتر الشروط وفي المقايضة اي البيان التفصيلي المعروف لتنافس المتنافسين .

٩١٦- إرساب Débourage (F).

Cleansing, Clearing (E).

عملية صناعية تقوم على ترك السوائل بعض الوقت ليذهب سفاك كل ما فيها من لواقظ وزغل .

٩١٧- أرسان Arsan

حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الرصاص يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ٨ سم. / في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

٩١٨- أرسطولوجية ، أرسطولوجية

هو الزراوند من النباتات الطبية ، اطلبه .

٩١٩- أرسطولوجية ثعبانية

هو الزراوند اشعابي نبات طبي نافع ، اطلبه .

٩٢٠- أرسطولوجين

هو الزراوند ين جوفرمال يستخرج من جذور الزراوند .

٩٢١- أرسوسة ، رسة ، قلنسوة ، كمة

Calotte (F). Brain-pan (E).

٩٢٢- أرسوسي ، رسي ، قلنسوي

نعت تعريفي زراعي يطلق على اشكال الازهار التي تقارب شكل الارسوسة .

٩٢٣- أرسول* Urcaeola (S). Urcéole (F).

جنس نباتات متسلقة معمرة برية من فصيلة الدفليات . مهدها بعض احراج برمانية وماليزية || ساقها متسلقة فروعها . أوراقها متقابلة ، معتقة ، اهليلجية النصال الجامدة . ازهارها عذقي التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة لونها الى الخضار الباهت || يستخرج من سوقها بالخز عصاره لزجة مطاطة تستعمل في صناعة بعض انواع المطاط .

٩٢٤- أرسون Erethizon (S). Urson (F).

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الثدييات . انواعه قليلة موزنها البلاد الامريكية . اجسامها ضخمة . رؤوسها غليظة . مقاضها مقطوعة . اذانها مسترة بالهلب . خناياها صغيرة صامية المنشق . جرامزها الامامية رباعية الاصابع والخلفية خماسية . اطرافها قوية مستطيلة . اذانها قصيرة كاسية لا أخاذا || اعرف انواعه أرسون كوكو .

٩٢٥- أرسون كوكو* Erethizon dorsatus (S).

Urson coquau, U. dorsal (F).


نوع من الارسون كبير الجثة غليظها وزنه نحو ١٠ كيلو طوله يراوح من ٦٠ الى ٩٥ سم. وذنبه من ١٨ الى ٢٠ ، هلبه كاس دقيق يتخلله شوك كالمسال يطول نحو ٨ سم . بينما يبلغ طول الهلب اكثر من ١٠ سم . ثوبه مزيج من الاسود والابيض والاسمر || موطنه فسيح الأرجاء يمتد



أرسون كوكو



أرشون



أرشية

٩٤٢- أرضة كبيرة* Termes grandis (S).

Termite grand (F).
موطنها البلاد الحارة ، نياكها يشبه نياك الأرض العظيمة .
غير أنها ترغب في المرتفعات وفي اطراف الغابات .

٩٤٣- أرضة ناقضة* ، أرضة مخربة

Termes destructor (S). Termita destructeur (F).
أرضة صغيرة القد شديدة الاذى تنقض الاكواخ والبيوت .
نباكها برج مستدير رفيع متراكب القباب المظلية الشكل .
موطنها البلاد الشديدة الحرارة . تقضي على كل ما تصل
اليه من اخشاب وورق وثياب وجلود وجيف وعظام .

٩٤٤- أرضة ° Géognosle (F). Geognosy (E).
هي علم طبقات الارض .

٩٤٥- أرضي Agraire, Terrestre (F).
Agrarian, Earthly (E).
كل ما له صلة بالارض او كل ما يتعلق بها .

٩٤٦- أرضي شوكي* ، خرشوف Cynara scolymus(S).
Artichaut (F). Artichoke (E). Echte artichoke (D).
Artichocco, Cardo senza spine (I).

نبات بقلي من سبط الحرشفيات وفصيلة المركبات الانبوية
الزهر . ضرره عديدة جميعها صالحة للأكل . وهو من
المأككل الصحية السريعة الهضم الغنية ببعض الفيتامينات
والمعادن الضرورية للجسم || يتكاثر بالبذر وبالفسائل
والطريقة الاخيرة هي الافضل لانها تنقل جميع صفات
وميزات الضرب وتحفظ بها . تزرع البذور في مشاتل
خاصة غنية بالدبال والسرقي ، اما في ايلول او في شباط
واذا رثم تنقل الى مستقرها حيث تفرس انفاقاً ، تراوح
مسافاتها البيئية والمتخللة من ٨٠ الى ١٠٠ سم . وكذلك
تعامل الفسائل لكنها تفرس في مستقرها ابتداء من كانون
الثاني || والارضى شوكي يفضل الاتربة المتوسطة الاندماج
المبيقة النور الغنية بالدبال وبالعناصر الغذائية .
زراعته تستوجب بعض العناية اهمها العزق والري عند
الحاجة . ثم مكافحة الحشرات واخصها الأرق .

٩٤٧- أرضيات Termitids (F). Termitidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة العقفاليات . اجناسها وانواعها
عديدة معظمها من الحشرات الدالة السياء لها يافوخ
وشفران . كلها قارض وبعضها مفترس . اشهر اجناسها
الارض .

٩٤٨- أرضيني ° Géodésique (F). Geodesic (E).
كل ما هو مختص بعلم هيئة الارض .

٩٤٩- أرضاء* Gelsemium sempervirens (S).
Gelsémie, Jasmin de la Caroline (F). Carolina
jasmine, Yellow jasmine (E). Gelber jasmin,
Glanzen Jasminbignonie (D). Gelsemino della
Carolina, G. giallo odoroso (I).

جنية فرعاء برية وزراعية تزيينية من فصيلة اللوغانيات .
ازهارها لوري التجميع ، زهرتها تشبه زهرة الياسمين وهي
صفراء اللون مستعبة العرف . ج . أرضيات وأراطى وأراط .

٩٥٠- أرضاء أنيقة* Gelsemium elegans (S).
Gelsémie élégante (F).

جنية معمرة ملتفة برية وزراعية تزيينية من فصيلة
اللوغانيات . مهدا امريكة وقد انتشرت زراعتها في معظم

٩٣٥- أرض Terre (F). Earth (E).

الارض كوكب يدور في الفلك الشمسي . يتميز بموقعه
المتوسط من الطاقة الشمسية اذ انه ابعد من مرمى الحرارة
القوية التي تطغي على عطارد واقرب من زحل الذي يكتشفه
البرد والصقيع . ومركزه المتوسط هذا كان الحافز الى
الحياة فثبت على سطحه وتنوعت عليه الكائنات || والارض
كرة مفلطحة تدور اولاً حول الشمس ودورانها هذا يسبب
الفصول المعروفة من ربيع وصيف وخريف وشتاء . وتدور
ايضاً حول نفسها وهذا ما يسبب الليل والنهار . والارض
مغطاة بقشرة صلبة جامدة لا يقل سمكها عن ٥٠ كم .
يعلوها غلاف مائي يغمر اكثر من ثلاثة ارباعها ، وهو
المحيطات وبحاره . ويمتطها غلاف شفاف غازي
هو الجو || محور الارض قائم بين القطبين وينتهي بهما .
اما قطرها فيبلغ نحو ١٢٨٧٠ كم . ومحيطها يبلغ نحو
٤٠٠٠٠ كم . اما وزنها فلا يقل عن ستة آلاف مليون
مليون مليون طن . ويبلغ طول دورة الارض حول الشمس
نحو ١٤٩ مليون كم . وسرعة سيرها تفوق ٢٧ كم . في
الثانية اي ما لا يقل عن ٩٨٤٧٠ كم . في الساعة || اما
الارض من الوجهة الزراعية فهي تلك الطبقة السطحية
المعروفة بالتربة التي يعيش فيها النبات ، اطلب تربة .

٩٣٦- أرض بؤ Terre inculte, Vaine, Friche (F).
Waste or fallow land (E).
الارض التي تترك بلا زرع لأسباب .

٩٣٧- أرض مستحالة ، خيرس Jachère (F).
Fallow (E).
هي التي تركت حولا أو اكثر بلا زرع .

٩٣٨- إرضاع Allaitement (F). Suckling (E).
التغذية بالخليب من الولادة حتى الفطام .

٩٣٩- أرضة Termes (S). Termita (F).
White Ant (E).


جنس حشرات من فصيلة الارضيات ورتبة العقفاليات .
انواعها عديدة معظمها غساء اللون طولها نحو السني .
بطنها مستطيل مؤذر ، لها مشفران تقرض بها الخشب ونحوه .
تبني لنفسها نياكاً رفيعة نسيجة عديدة الدهاليز والارجاء
والصحون المتتابعة المتراكبة || موطنها البلاد الحارة
وبعض الاقاليم المعتدلة . نظامها نظام النمل والنحل .
تعيش داخل نياكها تحت امرة ملك وملكة ومجلس شورى
يدبر حالتها الاقتصادية وشرطة تحافظ عليها من الاعداء
وتؤمن نظافة النياك وراحة المقيمين فيه . يقال للانثى المالكة
ياروض ومنهم من استعمله للذكر ايضاً || اشهر انواعها يتبع .

٩٤٠- أرضة شريسة* ، أرضة شجاعة


Termes bellicosus (S). Termita belliqueux (F).
موطنها البلاد الحارة . تتميز بنياكها النسيجة الرفيعة التي
تبنيها على الارض بالتراب واللحاف والتي تتألف من عدة
قاعات متراكبة ومسا لا نهاية له من السرايب والدهاليز .
تقضي على جميع انواع الاخشاب والورق والثياب والجلود .

٩٤١- أرضة عظيمة* Termes giganteus (S).
Termita gigantesque (F).

اجسم انواع الارض واكلها بطشاً . موطنها البلاد الحارة .
نباكها قليلة الارتفاع ، نسيجة الدوحة ، عديدة الارجاء
والقاعات والدهاليز والسرايب المتتابعة المتراكبة .
تعيش على المواد الخشبية ولا تعف عن شيء .




أرضة شريسة



أرضة عظيمة



أرضة كبيرة



أرضة ناقضة



أرضي شوكي



أرطاء



أرطاء أنيقة



أُرْطُس



أُرْطُلَان



أُرْطَاسِيَا جِيلِيَّة



أُرْطَاسِيَا



إِرْغَات



أُرْغَش الطير

Calligonum (E). Hackenkopf (D). Calligono (I).
جنس جنبات برية وتربينية من فصيلة اللبنيات . مهدها
بعض المناطق الاسيوية الشمالية وافريقية القطبية || انواعه
قليلة منها واحد تزييني يتكاثر بالبذر والعقل . ازهاره
زاهية اللون جميلة الشكل .

٩٥٨- أُرْطَمُون Erythrochiton

جنس جنبات وشجيرات حرجية من القسياريات وفصيلة
السذابيات . انواعه ستة اشهرها الارطمون الاحمر ساقه
فرعاء ملساء جرداء . اوراقه كبيرة بحرية انخضار ازهاره
جميلة التكوين لونها الى الاحمر القرمزية .

٩٥٩- إِرْعَاء Paissance, Dépaissance (F).

Forest-pasture (E).
هو ان تربي الحيوانات الالهية في الغابة بدون اذن صاحبها .

٩٦٠- إِرْعَال Eborgnage (F).

Nipping off of useless buds (E).
الغاية من الارعال اي نزع البراعم هي تحويل النسج بمقدار
اوفر الى الاغصان او الى الزيمات الباقية .

٩٦١- أُرْعَل

الارعل ما تهدل من النبات وما انثى من العشب وطال .
نبت ارعل : طويل مسترخ .

٩٦٢- أُرْعَوَة Joug (F), Yoke (E).

الأرعوة : نير الفدان .

٩٦٣- أُرْعَى ، أَمْرَج ، أُنْجَل Faire paitre (F).

To graze, To feed (E).
ارسل اندابة في المرج .

٩٦٤- إِرْغَات Ergates faber (S).

Ergate, Ergate forgeron (F).

حشرة من فصيلة القرنبيات ورقة نغديات الاجنحة .
ذكرها اكبر قدأ من انثاها ، طوله نحو ٤٥ مم . رأسه
وصدره الى السمرة المفراء . بردها وصاير الى الجؤوة . زبانه
خيطية طويلة منعكفة الى الوراء || اما الانثى فطولها نحو
٤٠ مم . لونها حنطي يعلوه موج اسفع . رأسها وصدرها
الى السمرة القاتمة || تمتح مكها في قشور جذوع الصنوبر
فيقف عن يرقات خاشبة تنخر وتمطب الشكير والحشب .

٩٦٥- أُرْغَالَة طائر من اللقلق . اطلب ابو سن .

٩٦٦- أُرْغَش الطير * ، أُرْغَش عجمي

Argas persicus, A. reflexus (S). Argas de Perse (F).
قراد من الارغشيات بيضي الشكل ، مفلطح الخنقة يركب
الطير وخاصة الدجاج فيمتص دمه ويضعفه وقد ينقل اليه
بعض الامراض الوبائية الوخية العاقبة || يكافح
باستعمال التريديب ومشتقاته تقيراً في صناديق خاصة
تنضبط على الطائر دون رأسه .

٩٦٧- أُرْغَشِيَّات Argasidae (S).

Argasidés (F), Argasidae (E).
فصيلة من القراديات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد .
جميعها صغيرة القد بيضية الشكل مفلطحة . طول ذكورها
نحو ٤ مم . واناثها نحو ٧ مم . تتميز بخلوها من الدقة
وباختباء رأسها وتواجعه تحت مقدم الجسم || معظم انواعها
من القراد الذي يتطفل على الطير والحيوان .

حدائق العالم || سوقها مرطاه تطول من ٤ الى ٦ امتار .
اوراقها ابيدة متقابلة ، مننقة ، سنائية النصال . ازهارها
محوري الارتكاز . ازهارها شبه بوقية الشكل ، خماسية
الفلق والاسدية ، لونها الى البياض العاجي تعلوه مشعة
وردية . تنويرها يستمر من اوائل حزينان الى اواخر تموز .

٩٥١- أُرْطُس * ، أُلُوريت

Aleurites moluccana (S). Aleurite, Bancoulier,
Arbre à vernis (F). Candle nut, Varnish-tree (E).
Bancouluss, Mehlbaum (D). Albero della vernice (I).

شجرة حرجية من فصيلة الفريونيات ، يستخرج من ثمارها
الدهنية اللوز نوع من الطلاء الصيني الفاخر الصنف يدعى
بنكول . ولثاها ايضاً خواص طبية نافعة اعلمها استعمالاً المشاء .
وقيل ان نقيع ازهارها منه للباه ، وبعض الخنود يفسنون
بذوره التي تتضمن مواد صمغية فيها شيء من المنبهات .

٩٥٢- أُرْطُل الارطل من الحيوان ما كانت اذناه متدليتين .

٩٥٣- أُرْطُلَان * ، بُنْبُل الشعير ، صَعْوَة الخطب

Emberiza hortulana (S). Ortolan, Bruant ortolan (F). Ortolan (E).

عصفور غريد من الدخليات ورقة الجواثم المشروحات
المناقير . يتكاثر في لبنان . طوله من ١٥ الى ١٦ سم .
رأسه وعنقه واعل جوشنه الى الصهبة الرمضاء . ظهره الى
الصهبة العابقة ، اسفل جوشنه وبطنه الى الصفار الاطلحل
جناحاه موشان وموشان بالجؤوة العابقة . زمكاه الى
الصهبة الزاهية . ذيله بلون الاباهر والقوادم . منقاره احمر
اللون ورجلاه كذلك || قوته الحشرات والحيوب . يألف
الادغال والمراعي . يعيش من المرتين الى الثلاث مرات في
السنة . انثاه تبيض نحو ٤ بيضات تحضنها سنوبة مسع
الذكر . يبيضها وردي اللون يعلوه وشم اسمر ونقط سود .

٩٥٤- أُرْطَمَاسِيَا ، أُرْطَمِيس ، أُرْطَمِيسِيَا

هو الشيح . اطلبه .

٩٥٥- أُرْطَمَاسِيَا جَبَلِيَّة * Artemisia glacialis (S).

Génépi glacal, Artémise glaciale (F). Silky
wormwood, Glacier wormwood (E). Silberrauce,
Alpen beifuss (D). Genepl (I).

نوع من الارطيس وهي عشبة برية معمرة من فصيلة
المركبات الانبوية الزهر . تنبت في الجبال العالية ، يقال
انها لا تخلو من الخواص الطبية النافعة التي تفيد الامعاء .

٩٥٦- أُرْطَنَسِيَّة * ، إِيْدْرَانْجِيَّة ، يَابَانِيَّة

Hydrangea hortensia (S). Hortensia, Rose du
Japon (F). Hydrangea, Chinese guilder-rose (E).
Hortensia, Japanische rose (D). Idrangea, Ortensia,
Rosa de Giappone (I).

جنبية تربينية من فصيلة القلييات . منبها الاصلي بعض
الاقاليم اليابانية الصينية . سوقها كثيرة متفرعة . اوراقها
مننقة متقابلة شبه بيضية . ازهارها تاجية الارتكاز عشكولية
التجميع لبدة . ضروبها عديدة مختلفة الالوان || وهي
من النباتات التي تخشى البرد القارس وأشعة الشمس اللاذعة ،
ترغب في المواقع القليلة التمرض للشمال والجنوب || تتكاثر
بالتمثيل وتعود في المراكز وفي الاتربة القليلة الاندماج
الغنية بمعدني النحاس والحديد .

٩٥٧- أُرْطُتِي ، رِسُو Calligonum (S).

Calligone, Oblone Ptérocoque, Trachytelle (F).

٩٧٦- أرغوس جبّار* Argus giganteus (S).

Argus géant (F). Gigantic argus (E).

طائر من الارغوس يشبه الطاووس ويختال أختياله وهو مثله موهور الريش المرقط الملون الجميل. طوله يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما فيه الافنيك الذي يبلغ ١٢٠ او ١٣٠ سم. || مهدد ملقه وسومته وسيام. يألّف الغابات الجبلية الكثيفة || قوته الحشرات على اختلافها والبذاق والخلزون والديدان والنوامي النباتية ويختلف البزور والحبوب انشاء تبيض من ٨ الى ١٢ بيضة تخصبها وحدها نحو الشهر. تدثن عشها في مكان رفيع بين الادغال وفي الظل.

٩٧٧- أرغول Argulus (S). Argule (F). Argulus (E).

جنس دويبات من القشريات المجذافيات الارجل تتطفل على الاسماك البحرية والنهرية.

٩٧٨- أرغوليات Argulidae (S).

Argulidés (F). Argulidae (E).

فصيلة دويبات حشرية من مجذافيات الارجل اجناسها وانواعها عديدة، اشهرها الارغول.

٩٧٩- أرغون Argon

غاز خامل يؤلف احد عناصر الهواء بنسبة ١٪ يستخدم في صناعة الاضواء الكهربائية القليلة العنف المعروفة بنصف وات.

٩٨٠- أرغوني Urganien

ساف من الطبقة الطباشيرية يعرف بالبرماني، اطلبه.

٩٨١- إرغيس Ecorce du vinettier (F).

Bark of barberry (E).

حاء اصول شجر عود الريح (ابن البيطار). تستعمل في الطب كقابضة ومقوية وقد تنفع موضعياً في التهاب الملتحمة وباطنياً في بعض الحميات اخصها الملاريا..

٩٨٢- أرقة، جالون Jalon (F).

Levelling-staff, Picket (E).

علامة من خشب او حديد على شكل العصا تستعمل في مسح الاراضي.

٩٨٣- أرفش

الارفش من الحيوان ما كانت اذناه كبيرتين، م. رَفْشاء ج. رُفْش.

٩٨٤- إرفنجية* Irvingia (S).

Irvingie (F). Irvingia (E).

عوبة هو الاسم المشهور في الغابون. جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة السمروبيات. انواعها المعروفة لا تتجاوز الستة اعطائها بعض المناطق الاستوائية والحارة من العالم القديم اخصها الغابون في افريقية والانام في آسيا || اشجارها معتدلة الارتفاع مرطام اللحاء. افتادها الفتية محفوفة العقد باطواق تبدو كالدمالج. اوراقها متعاقبة، معنقة. نساها اهليلجية الشكل، سنائية الاطراف، جامدة الوثل. ازهارها عشكولي التجميع، ابطي الارتكاز. ازهارها صغيرة القد، خماسية البتلات، عشارية الاسدية، صفراء اللون، عطرية العرف. ثمارها ثوبية مأكولة قدرها قدر البيضة الكبيرة. عجائها دهنية المادة يستخرج منها سمن «الديكا» الذي يماثل سمن الكاكاو، اما دهن

٩٦٨- أرغل Monter en graines (F).

أرغل الزرع: جاوز سنبله الاحلام. والاسم الرغل.

٩٦٩- أرغمون* Argemone (S). Argémone (F). Devil's fig, Yellow

thistle, Prickly poppy (E). Doppelklappen, Stachelmohn (D). Argemone (I).

جنس نباتات عشبية طيبة حولية من فصيلة الخشخاشيات. انواعه نحو ١٢ معظمها بري وبعضها تزييني. سوقها حلبيّة شائكة. اوراقها متعاقبة، حاضنة، ريشية، مخزومة. فصلها مزركش، ابيض التصليع. ازهارها فردية مختلفة الالوان. ثمارها كمار بيضية الشكل، بزورها دقيقة حنطية اللون || يستخرج من سوقها عصارة لبنية، لزجة كاوية، صفراء اللون، تستعمل في تطبيب بعض الامراض الجلدية || اشهر انواعه الزراعية التزيينية ما يلي.

٩٧٠- أرغمون أبيض Argemone alba (S).

Argémone blanche (F).

نوع من الارغون. مهدد امريكة الشمالية. يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم. ازهاره مستطيلة الزناد، كبيرة القد، قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى البياض العاجي || ازهاره يشمر من ايار الى حزيران.

٩٧١- أرغمون المكسيك* Argemone mexicana (S).

Argémone du Mexique (F).

نوع من الارغون. مهدد بلاد المكسيك. يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره صفر، قطرها نحو ٦ سم. ازهاره يشمر من حزيران الى تشرين.

٩٧٢- أرغمون كبير الزهر Argemone

grandiflora (S). Argémone à grandes fleurs (F).

نوع من الارغون. مهدد امريكة الجنوبية. ساقه واوراقه قليلة الشوك. يعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره كبيرة القد، قطرها نحو ١٠ سم. لونها ابيض او وردي. ازهاره يشمر من تموز الى ايلول.

٩٧٣- أرغن بحري* Tubipora (S).

Tubipore, Orgue de mer (F).

Tubipore, Organ-pipe coral (E).

مجموعة حيوانات بحرية ركنية من المجوفات. قوامها انابيب كلسية التركيب، مترابطة، حراء اللون، تعيش في داخلها حيوانات مزهارية. || مدنها، اي مجموعات انابيبها، يطول ويعرض مئات الامتار ويرتفع من مترين الى عشرة امتار وأكثر || يكثر وجودها في بعض مناطق المحيط الهندي.

٩٧٤- إرغوتين Ergotine (F). Ergotin (E).

هي العاكوبين والدابرين مادة شبه قلوية توجد في الحبوب المصابة بالعاكوب.

٩٧٥- أرغوس Argus

جنس طير من فصيلة التدرجيات. كبير الحجم، يتميز بكشته الدقيقة المنتصبة، بطول عنقه، بوفرة ريشه الجميل، باستطالة خوافيه الناعمة الريش وبافنيكه المهدب المهدل المترامي || النوع المعروفة قليلة اشهرها الارغوس الجبار.



أرغون المكسيك




أرغن بحري




أرغوس جبّار




إرفنجية



أرقيّة الختان




أرقيّة الخوخ



أرقيّة الشتاء




أرقيّة الصنوبر



أرقيّة الكشمش



أرقيّة عابلة



أرق أسود

Cheimatoble, Phalène hiemale, Verreau (F). Common wintermoth (E). Kleiner frostspanner (D).

فراشة صغيرة ثوبها ورواشنها الى الصهبة الحنطية . يرقاتها يمداء اللون تركب جميع انواع الاشجار الحرجية والمشمرة . تلهم البراعم والاوراق الفتية || تكافح كغيرها باستعمال احد الحواشير الفعالة .

٩٩١- أرقيّة الصنوبر* ، صندل

Bupalus piniarius (S). Phalène du pin (F).

Pine looper moth (E).

Gemeiner Kiefernspanner (D).

فراشة صغيرة القد ، حنطية اللون ، عابطة الرواشن التي تعلوها في وسطها يقع صفر . الانثى اكبر حجماً من الذكر واقتم لوناً . تمتع مكثها ، الذي يراوح عدده من ٣ الى ١٥ ، صفاً مستقيماً واحداً على نصل الورقة الهديئة . فينقف عن يرقات صغيرة تمشي كامل حياتها اليرقية على اهداب الصنوبر فتقتضها وتؤذيها .

٩٩٢- أرقيّة الكشمش* (S). Abraxas grossulariata

Phalène du groseillier, Zérène du groseillier (F). Common magpie moth (E). Stachelbeerspanner (D).

حشرة صغيرة حنطية اللون يعلو ثيج ظهرها نقط سود . رواشنها الى الغبار الازرق تعلوه رقشة سوداء . تظهر في حزيران وتموز . الانثى اكبر حجماً من الذكر وأعم ثوباً وأقل رقشة || اليرقة صغيرة ، دقيقة ، حنطية المدب ، بيضاء الجانب ورقشاء الظهر ، تركب الكشمش واللوز فتعريهما من الاوراق || تكافح عند ظهورها قبل تفاقم شرها .

٩٩٣- أرقيّة عابلة* (S). Hybernica defoliaria

Erannis defoliaria (S). Hibernie, Phalène défeuillante (F). Mottled-umber moth (E). Grober frostspanner (D).

فراشة صغيرة حنطية الثوب ، مزرقة الرواشن المرقشة . الانثى عديمة الجناح . اليرقة بنية اللون يعلو ظهرها وبطنها خضوط سود مستطيلة . رأسها احمر . مدبها اسمر || تفتك بالاوراق فتعبلها وتعري الاشجار منها .

٩٩٤- أرقيط* (S). Aerophyte

هو كل نبات يعيش في الهواء بعكس النباتات المائية التي تعيش في المياه .

٩٩٥- أرق* (F). Aphidiphage (F). Aphidiphagous (E).

كل حشرة نافعة من غشائيات الاجنحة تفتك الارق .

٩٩٦- أرق ، من ، أفييس ، ندوة عسلية

Aphis, Puceron (F). Aphidis, Aphis (E).

جنس حشرات من فصيلة الاقيات وربة متجانسات الاجنحة . معظم انواعه تعمل ، حيث تستقر على النبات ، مادة لزجة حلوة تعرف بالبن او الندوة العسلية ولذلك اطلقوا عليها اسم فعلها || يكافح الارق باستعمال النيكوتين ومشتقاته وبعض انواع الحواشير || اما انواع الارق فعديدة لا تقل عن ٧٥ تخص منها بالذكر :

٩٩٧- أرق أسود*

Aphis rumicis, Doralis rumicis (S).

Puceron noir, Puceron de l'oseille (F).

Dock aphid (E). Ampferblattlaus (D).

حشرة صغيرة من الاقيات طولها من ٣ الى ٤ مم . تركب ما لا يقل عن ٢٠٠ نوع من النبات وقد تؤذيها جميعها .

الانواع الانثامية ويدعى «كاي كاي» فانه يستعمل في صناعة الشمع .

٩٨٥- أرقي ، مساح

Géomètre, Arpenteur, Chaîneur (F). Geometer, Land-surveyor, Surveying (E).

هو من اخص بعلم المساحة . فيسح الارض والمقادير يعين الحدود ...

٩٨٦- أرقيات ، ذارعات (S). Geometridae

Géométridés, Phalénidés (F). Measuring worms, Inchworms, Spanworms, Loopers (E). Spanner (D).

فصيلة حشرات من مختلفات القرون وربة حشرقيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها صغير الحجم يغلب فيها اللون الرمادي تعلوه الزراكش الجميلة النقش . يرقاتها مستدقة الجسم تتميز بخلو حلقاتها البطنية الوسطى من الارجل لذلك فهي تنقوس عند الانتقال . اما الوانها فمختلفة منها الاخضر والاكر والاسمر والمخطط .

٩٨٧- أرقيّة ، ذارعة (F). Phalène (F). Phalaena (E).

جنس حشرات فراشية من الارقيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد ، الوانها الى السمرة ، رواشنها الى الغبرة تعلوها زراكش مختلفة || يرقاته صغيرة ، دقيقة ، مستطيلة . تركب اوراق النبات على اختلاف فصائله واجناسه . اشهر انواعه وأعمها ضرراً ما يتبع .

٩٨٨- أرقيّة الختمان*

Ourapteryx sambucaria (S).

Phalène du sureau (F).

Ourapteryx sambucaria (E).

حشرة من الارقيات وربة حشرقيات الاجنحة . موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبة . تألف المواقع الرطبة . فراشاتها جارية قوتها رحيق الازهار . اساريها خاضعة قوتها نصال الاوراق || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٩ الى ٢١ مم . بسطتها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان ، فاشتان . زباناها خيطيان مستطيلان . مرشفها معتدل الطول والفلاظة . جوشنها وبطنها الى الصفار الاشقر المواجه || رواشنها الاماميان الى الصفار الكبريتي تعلوه خضوط معتزة سمراء اللون . رواشنها الخلفيان الى الصفار الكبريتي يتوسطه خط معترض اسمر ونقطة جزوية قريبة من الطرف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تسرح في الليل . تعاغل بعد ظهورها بنحو مة اسابيع وتمتج الممكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من ٥٠ الى ٦٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل يبدو كأنه قطعة من قضيب مالمس القشار ، ثلاثي الشعول . راجعها البطنية الوسطى شديدة القصر مما يحدها الى التنقوس ثم الشب عند الانتقال . ثوبها يمانن البيئة التي تعيش فيها .

٩٨٩- أرقيّة الخوخ*

Lygris prunata (S).

Phalène du prunier (F).

يرقها خضراء اللون في اول عهدها ثم طحلاء واخيراً ترابية . تركب عدة نباتات اخصها الخوخ فتقرص اوراقه . تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الشديدة الميوعة والاتصاق.

٩٩٠- أرقيّة الشتاء* ، ماشوط

Cheimatobia brumata, Operophtera brumata (S).

١٠٠٧- أرق الذرة * *Aphis sorghi* (S).

Puceron du sorgho (F).
يركب الذرة ويضر بها كثيراً اذا صادف غزوه وقت الازهار.

١٠٠٨- أرق الذرة الاسمر * *Aphis maydis*.

A. avenae (S). *Puceron sombre des céréales* (F).
Corn leaf aphid (E). *Maisblattlaus* (D).

حشرة صغيرة مستطيلة سمراء اللون خضراء البطن ، طولها من ١ الى ٢ مم. يكثر وجودها في البلاد الحارة . تتركب الذرة والذرة الصفراء والقصب والحنطة والشعير والشوفان .

١٠٠٩- أرق الرمان * *Aphis punicae* (S).

Puceron du grenadier (F). *Pomegranate aphid* (E)
يركب اوراق الرمان وازهاره وهو صغير القد اخضر اللون اسود المويينات .

١٠١٠- أرق الزان * *Phyllaphis fagi* (S).

Puceron du hêtre (F). *Woolly beech aphid* (E).
Buchenzielerlaus, *Buchenblattbaumlau* (D).

حشرة صغيرة صفراء اللون مغطاة بخيوط زغبية شمعية بيض . تتركب اوراق الزان وتؤذيها .

١٠١١- أرق الزرع * *Paracletus cimiciformis* (S).

Puceron des céréales (F). *Grain aphid*, *Greenbug* (E). *Getreidelau* (D).

يركب جنود الزروع واخصها الحنطة والشعير والشوفان فيمتص عصارتها ويؤذيها .

١٠١٢- أرق الزرع المجنح * ، أرق النجيليات

Anoecia corni (S). *Puceron ailé* (F).
حشرة صغيرة القد ضخمة الشكل كبيرة الاجنحة ، طولها نحو ٢ مم. زباناها مركبة من ٦ فواصل . لونها اخضر فاتح يعلو ثليج ظهرها خط اخضر عابق || تتركب جميع انواع الزروع اخصها القمح والشعير .

١٠١٣- أرق الزيتون * *Aphis tilliae*.

Eucallipterus tilliae (S). *Puceron du tilleul* (F).
Brasswood aphid (E). *Lindenzielerlaus* (D).

حشرة صغيرة القد مجنحة لونها الى الصفار الوردي . رأسها اسود ، زباناها خيطية مستطيلة ، ارساغها سمر || تتركب اوراق الزيتون فتؤذيها كثيراً .

١٠١٤- أرق الصقلاب * *Aphis asclepiadis*.

Anuraphis nerli (S). *Puceron du laurier* (F).
حشرة صغيرة طولها نحو ٢ مم. لونها اصفر ذهبي . تتركب اوراق الصقلاب وتؤذيها .

١٠١٥- أرق الفول * *Aphis fabae* (S).

Puceron de la fève (F). *Bean aphid* (E). *Schwarze bohnenoder*, *Rübenblattlaus* (D).

يركب السوق والاوراق والازهار وقد يحول دون العقد او يمنع النمو .

١٠١٦- أرق القت الاسود * ، أرق البقول ، من البقول

Aphis laburni, *A. crassivora*, *A. medicaginis*,
A. robiniae, *A. leguminosae* (S). *Puceron noir de la luzerne* (F).

حشرة صغيرة نائمة من الارقيات ، شائعة الانتشار ، لونها الى السواد اللامع ، رأسها وجوشنها اشد اسوداداً من سائر جسمها . ارجلها سمر ، اما سيقانها فقبراء اللون . يرقاتها صغيرة القد ، تبدو خضراء اللون ثم تعمق تدريجياً الى ان تستقر على اللون البني القاتم || وهو من اضر

٩٩٨- أرق الاجاص * *Aphis pyri* (S).

Puceron du poirier (E). *Pear aphid* (E).
يركب الافنان النضرة والنوامي وجديد الاوراق فيؤخرها عن النمو ويعرضها لانتقال الامراض .

٩٩٩- أرق البازيلا * ، أرق البستة

Aphis pisti, *Macrosiphum pisti* (S). *Puceron du pois* (F). *Pea aphid* (E). *Erbsenblattlaus* (D).

يركب الفروع النامية والاوراق المستجدة والازهار فيحد من نشاطها الحيوي وقد يسبب سقوط الزهر قبل عقده .

١٠٠٠- أرق التبغ * *Aphis tabaci* (S).

Puceron du tabac (F). *Tobacco aphid* (E).
يركب هامة الشتل مع اوراقها العليا . فيمتص النسغ ويعمل منه اللزج . يشل النشاط الحيوي ويؤذي الازهار ويحول دون سلامة التجفيف الصحيح .

١٠٠١- أرق التفاح * *Aphis pomi*, *Aphis mali* (S).

Puceron du pommier, *P. vert du pommier* (F).
Green apple aphid (E). *Grüne apfelblattlaus* (D).
يركب الزعمات النامية والاوراق الفتية فيؤذيها .

١٠٠٢- أرق الجوز * *Callipterus juglandis* (S).

Puceron du noyer (F). *Dusky-veined walnut aphid* (E). *Gestrelfte Walnusszielerlaus* (D).

حشرة صفراء اللون مؤذرة باربعة خطوط سود . طولها من ٣ الى ٤ مم . زباناها الى الصفار القاتم ، عويناتها الى الحمرة المرجانية || تتركب نوامي الجوز وازهاره واوراقه الفتية .

١٠٠٣- أرق الدراقن الاخضر * *Hyalopterus*

arundinis (S). *Puceron vert du pêcher* (F). *Mealy peach aphid* (E). *Mehlige pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة مستطيلة طولها نحو ٢ مم. لونها الى الخضار الاطحل . عويناتها سمر ، زباناها خيطية مستطيلة . المجنحة منها سوداء الرأس || تتركب نوامي واوراق الدراقن فتتوقع بها اشد الاذى .

١٠٠٤- أرق الدراقن الاسود * *Anuraphis persicae*.

Anuraphis persicae-niger (S). *Puceron noir du pêcher* (F). *Black peach aphid* (E). *Schwarze Pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة القد مكورة الشكل متعددة الالوان التي يغلب فيها الاسود والبني الاسفع || تتركب الدراقن وجميع الاشجار اللوزية فتتوقع بنواميها واوراقها الفتية شديد الاذى .

١٠٠٥- أرق الدراقن الأطحلى * *Myzodes persicae*.

Aphis persicae, *A. vulgaris* (S). *Puceron gris du pêcher* (F). *Green peach aphid*, *Peach aphid* (E). *Grüne pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة القد بيضوية الشكل طولها نحو ٢ مم. تتركب جميع الاشجار اللوزية اخصها الدراقن ولا تعف عن التبغ والبطاطا .


١٠٠٦- أرق الدراقن البني * *Pterochlorus persicae*.

Lachnus persicae (S). *Puceron brun du pêcher* (F). *Peach aphid* (E). *Pfirsichblattlaus* (D).

حشرة صغيرة اجاصية الشكل طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها بني ، ظهرها يحمل ٧ اتيق متوازية من النقط السود . مهدها الشرق الاوسط ، تتركب الدراقن ولا تعف عن المشمش والتفاح والسفرجل .



أرق الذرة



أرق الاجاص



أرق الذرة الاسمر



أرق البازيلا



أرق الرمان



أرق التبغ




أرق الزان



أرق التفاح




أرق الزرع



أرق النجيليات




أرق الزيتون



أرق الدراقن الاخضر




أرق الصقلاب



أرق الدراقن الاسود




أرق الفول




أرق الدراقن البني



أرق القت الاسود




أرق الدراقن البني



١٠٢٤- أَرْقُ النَجِيلِيَّات *
Aphis graminum,
Toxoptera graminum (S). Puceron des graminées (F).
Spring wheat aphid (E). Getreideläus (D).

حشرة صغيرة لونها أخضر تظهر في أواخر الشتاء وأوائل الربيع فتركب حذف النجيليات على اختلاف أنواعها وأخصها الزروع فتتمتص عصارتها وقد تمتعها عن الأسبال .



١٠٢٥- أَرْقُ الورد الأخضر *
Macrosiphum rosae.
Siphonophora rosae (S). Puceron vert du rosier (F). Rose aphid (E). Rosen blattlaus (D).


حشرة صغيرة القد مستطيلة الجسم والأرجل والزباني . طولها من ٣ إلى ٤ مم . لونها الغالب الأخضر وقد تكون ليلكية . رأسها أخضر عابق وقرونها سود . تركب أزهار الورد وأوراقه الفتية .



١٠٢٦- إِرْقَاقِي ، إِمْلَاص *
Véraison (F). Ripening (E).
حال حبة العنب بعد الحصرمة وقبل الإيناع .

١٠٢٧- أَرْقَان * ، أَرْجَان ، لَوَزُ البَرْبَر *
sideroxylon (S). Arganier, Olivier du Maroc, Bois de fer (F). Argan tree, Morocco Iron wood (E). Arganbaum, Eisenholz (D). Argania, Albero legnoferro (I).

شجرة حرجية شائكة من فصيلة السبوتيات منبتها بلاد المغرب تكثر في الأحراج المراكشية . أخشابها قاسية شديدة الصلابة . أوراقها معنقة متعاقبة . نصلها صغير القد ، رمحي الشكل ، جلدي النسيج . أزهارها أبطية الارتكاز ، خنثوية ، حاسية الثلاث والأخية . ثمارها نووية ، جوزية الحجم . سؤذقها يفلت عجة صلبة تحوى في داخلها لوزة يستخرج منها زيت البربر أو زيت الأرقان الكثير الاستعمال في البلاد المراكشية .



١٠٢٨- أَرْقَة قُطْنِيَّة اطلب من قلبي .

١٠٢٩- أَرْقُط *
Moucheté (F). Flea-bitten (E).
الرقطة هي نكت شعر اسود مبعثرة في ثوب الفرس . والفرس أرقط .

١٠٣٠- أَرْقُطِيُون * ، عَمِي خُدْلي مَعَكَ

Arctium lappa, A. tomentosum, A. bardana (S).
Bardane, B. tomenteuse (F). Burdock, Beggar's buttons (E). Filzklette, Grossbergk, Klette (D).
Bardana, Lappolone, Cappellacci (I).

نبات طبي بري معمر من فصيلة المركبات . يكثر في البور وعلى حافة العرقات . جذوره درياء ، غليظة وطويلة . ساقه فرعاء اسطوانية ، ليفية . أوراقه مننقة ، متعاقبة ، نصلها كبير الصفحة القلبية الشكل المجددة . أزهاره رؤسية التجميع ، تاجية الارتكاز . رؤسائها تملأ بثياب من اقرب منها || جذوره تستعمل في معالجة الأمراض الجلدية .



أرقطون



أرقطون رأس الحمامة

١٠٣١- أَرْقُطِيُون رَأْس الحَمَامَة *

Arctium lappa major (S). Bardane majeure, Glouteron, Herbe aux teigneux (F). Bachelor's buttons (E). Grosse klette, Dockenkrout (D).
Lappola, Persolata (I).

ضرب من الأرقطون . يملكه كبيرة الحجم ، جذوره تستعمل في علاجات الأمراض الجلدية . يحوى بعض المواد الحريفة وعلى زيت عطري ينفع السعال . وقد قيل عنه انه « لا يعده شيء في أمراض الفم والاسنان » .

أنواع الأرق لانه لا يعف عن نبات . يركب جميع نباتات الفصيلة القرنية والقطن والائل والورد الخ .

١٠١٧- أَرْقُ القُطْن * ، أَرْقُ الشَّمَام * ، مَن القُطْن مَن الشَّمَام

Aphis frangulae, A. gossypii,
A. citrifolii, A. citrulli, A. cucumeris, A. cucurbitae,
A. malvoides, A. parvus (S). Puceron du cotonnier,
P. du melon (F). Cotton aphid, Melon aphid (E).
Gurkenblattlaus (D).

حشرة صغيرة من الأرقيات . اسمائها العلمية عديدة . طول الحشرة المجنحة نحو ٢ مم . لونها إلى الخضار الأزرق . رأسها اسود بطنها برتقالي . اما غير المجنحة فلونها إلى الصفار الليموني . وهذه الحشرة شائعة عند مؤخر بطنها تفرز منها مادة شمعية تستعملها لحماية نفسها من الإعداء . تركب الأوراق والأفنان فتتمتص العصارة النسفية وتنشي اللسج بمادة سكرية لزجة تسبب عدم استمرار النمو وتسقوط الأزهار قبل مناعة معاليقها || اما النباتات التي تركبها فعديدة أخصها القطن والقرعيات .

١٠١٨- أَرْقُ القُوقِحَان *

Macrosiphonella chrysanthemi, Macrosiphum Ch. M. samborni (S). Puceron des chrysanthèmes (F).
Chrysanthemum aphid (E). Dunkle chrysanthemenlaus (D).

حشرة صغيرة مستطيلة مفلطحة طولها من ٢ إلى ٣ مم . لونها لون الأكاجو اللامع ، زباناها عابقة ، أرجلها سود || تركب الكرزينم وجميع أنواع القوقحان .

١٠١٩- أَرْقُ الكُرُز *
Myzus cerasi (S).

Puceron noir du cerisier (F). Cherry black fly (E).
Schwarze kirschenblattlaus (D).

حشرة صغيرة سوداء اللون طولها ٢ مم . تركب الأوراق الفتية فتجمدها وتلفها ، تمسل الكثير من المن لذلك فالنمل لا يفارقها وقد يربها .

١٠٢٠- أَرْقُ الكَشْمَش *
Capitophorus ribis.

Aphis ribis (S). Puceron jaune du groseillier (F).
Currant blister aphid. (E). Gallenblattlaus der Johannisbeere (D).

حشرة صغيرة القد مستطيلة ، طولها أقل من ٢ مم . لونها من الاصفر إلى البرتقالي . عويناتها حر ، زباناها مستطيلتان . تركب الكشش فتجمد أوراقه وتؤذيه .

١٠٢١- أَرْقُ اللُوز *
Rhopalosiphum nymphaceae (S).

Puceron de l'amandier (F). Almond aphid, Plum aphid, Waterlily aphid (E). Sumpfpflanzenlaus (D).

يركب اللوز والمشمش والخوخ فيؤذي الأوراق ويجمدها .

١٠٢٢- أَرْقُ الملفوف *
Aphis brassicae (S).

Puceron cendré de chou (F). Cabbage aphid, Mealy cabbage aphid (E). Kohlblattlaus, Mehliger Kohlblattlaus (D).

يركب الملفوف وأكثر النباتات الصليبية . لونه رمادي . طولها نحو ٢ مم . رأسه احمر ، عويناته سود ، زباناها قصيرة مركبة من ٦ فواصل .

١٠٢٣- أَرْقُ الموز *
Pentalonia nigronervosa (S).

Puceron des bananiers (F). Banana aphid (E).
Bananenblattlaus (D).

حشرة صغيرة مستطيلة ، لونها أخضر ، طولها نحو ٣ مم . تركب الموز وتنقل اليه مرض تورّد القمة .

١٠٣٧ - إَرْكَان ٥ ، قَرْكَين ٥
Investissement (F). Investment, Investing (E).
الاركان او التركيب ، توظيف المال واستثماره .

١٠٣٨ - أَرْكَة *
Orca (S). Orque, Epaulard (F).
Orc, Whale or grampus (E).

جنس دلافين كبيرة من الحوتيات اللبونة . له نوعان فقط المقتال والمستأنف . موطنها جميع البحار . جشها غليظة وطويلة ، حجمها العادي من ٥ الى ٦ امتار وبعضها يبلغ عشرة امتار || تعيش جماعات وتنتقل بسرعة مذهشة . تلهم كل ما وصلت اليه .

١٠٣٩ - أَرْكَة مِسْتَأَف
Orca rectispina (S).
Epaulard armé (F).
نوع من الاركة يكثر في المحيط الهادي . ضخم الجشة طوله نحو خمسة امتار . ثوبه الى السرة الكدرة ، ظهره شديد السواد يتميز بكبر وارتفاع زعنفته الظهرية .

١٠٤٠ - أَرْكَة مِقْتَال
Orca gladiator (S).
Epaulard commun (F).
نوع من الاركة يوجد في جميع البحار غليظ الجشة مستطيلها طوله يراوح من ٦ الى ١٠ امتار ، ابلق اللون سواد ظهره ادم غيب وبياضه لا يخلو عن الصفار . وهو شرس الخلق جسور لا يعف عن شيء .

١٠٤١ - أَرْكَوتين
Arkotine D. 10
حاشور زراعي يرتكز على مادة « د.د.ث. » يستعمل سائلاً محلولاً بمعدل ١٪ في مكافحة دودة الثمار وغيرها من الديدان والحشرات .

١٠٤٢ - أَرْكُوم ٥ ، أَبْغُمْبَه ٥
Bucorvus (S).
Bucorve, Bucorax (F). Bucorvus (E).
أركوم وأبغمبه هما اشيع اسماء هذا الطائر في بلاد الحبشة والنوبة || جنس طير من فصيلة الاركوميات . انواعه قليلة العدد ، اعطائها بعض البلاد الافريقية اخصها الحبشة والسودان وكنيه وأوغندا ... جميعها كبيرة الاجسام ، غليظة المناقيد المتوجة بخوذ قرنية مجلوبة الطرف الامامي الاجوف . وتتميز ايضاً برعاشها الجرابية الجفوية اللون الممتدة والمتدلية من اشدائها الى اطراف اعناقها || اشهر انواعه واعرفها أركوم الحبشة .

١٠٤٣ - أَرْكُوم الحَبَشَة ٥
Bucorvus abyssinicus (S).
Bucorve d'Abyssinie (F).

نوع من الاركوم . اعطانه الحبشة والبلاد المجاورة الخاضعة لنفس العوامل التنوخية والمناخية || جسمه كبير القد يطول نحو ١١٠ سم . ثوبه الى السواد الفصحي الاسفع الموج باستثناء القوازم فانها الى البياض المظوب ببعض الصفار || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يعدو على الارض بسرعة ويحلق في الفضاء بعيداً . وهو اذا غضب يصفق بجناحيه ثم يرفع ذنبه كما يفعل ديك الحبش ويرفخ جراب رعشته فتبدو كالضرب الاحمر || قوته الحشرات والديدان والحللاذين والعظام والصفادع والافاعي والقنار والجردان وبعض حبوب وجذور النباتات البرية || يدشن عشه في صدوع جذوع الاشجار الضخمة او بين انقاضها المنبطحة . الانثى تضع من ١٠ الى ١٢ بيضة صغيرة القد ، كروية الشكل ، بيضاء اللون ، تحضنها بمثابة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .


١٠٣٢ - أَرْقَم ، أَيْم ، أَيْن
Zamenis
جنس حيات من فصيلة الثعبانيات ، انواعه عديدة منتشرة في جميع الاصقاع العالمية . جميعها حفت رقشاء طويلة دقيقة ربداء مريقة بحمرة وسواد وكدره وبذشة ، مرقطة الجانين . مذهبها الى البياض او منقط بالسواد . ولها خط اسود تحت كل من عينيها .

١٠٣٣ - أَرْقِيَّات ٥ مَنِّيَّات ٥
Aphididae (S).
Aphidides, Aphidiens, Pucerons (F). Aphids, Plant lice, Green flies (E). Echte Blattläuse (D).
فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفية الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد عديمة الاجنحة وفي حال وجودها تكون شفافة قليلة العروق . قرونها الاستشعارية مركبة من ٣ الى ٦ فواصل . ارساغها مزدوجة العقل . جميعها تحمل زوائد بطنية تفرز مادة قلووية . وبعضها يحمل غدداً خاصة تفرز مادة شمعية بيضاء كندف القطن او كالحبوط الدقيقة || اثوابها مختلفة الالوان يغلظ فيها الاسود والاسمر والاخضر والاصفر || تركب النبات وتغذى من نسفه . اشهرها وأفتكها الفيلوكسرا والارقي والمن القطني .


١٠٣٤ - إَرْقِيس * ، مَسْن ، مِفْصَلِيَّة
Desmodium gangeticum (S). Desmodie (F). Tick trefoil (E). Bündelhülse (D). Desmodio (I).
جنية تزيينية معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية ، منبها البلاد الاستوائية ، سوقها ليفية منتصبه ، اوراقها معنقة طويلة المعاليق ، متعاقبة ، رحيمة ، جلدية ، مسترسلة نحو الارض . ازهارها عثكولي التجميع تاجي الارتكاز . زهرتها جميلة الشكل مستحبة العرف || ثمارها قرنية شرافية مستطيلة تضم عدة بزور مفلطحة جوزية اللون .

١٠٣٥ - إَرْقِيس هندي ، دَسْمُودِيوم ، مِفْصَلِيَّة البنغال
Desmodium gyrans (S). Desmodie du Bengale, Sainfoin oscillant (F). Moving plant, Telegraph plant (E).
Telegraphen bündelhülse (D). Sanofiemo viva (I).
نوع من الارقيس مهدد البنغال من اعمال الهند . وهو جنية صغيرة محولة تزرع للتزيين ترتفع نحو المتر . تتميز بوريقاتها المعلقة العنق ، الصغيرة أنصل التي تدور على نفسها دورة كاملة . مدة من الزمن لا تقل عن الدقيقتين ولا تزيد على الخمس . هذا عندما تكون الحرارة البيئية من ٢٢ درجة سنغراد وما فوق .

١٠٣٦ - أَرْكَتَارِي *
Pteroglossus aracari (S).
Pteroglosse, Aracari commun (F).
طائر من المتسلقات وفصيلة الطوقانيات . موطنه غابات البرازيل . يألف اوحش المواقع القاصية ولا يقترب من الحدائق والاماكن الآهلة الا في فصل الشتاء . ملجئه الحياتي جماعي . جماعته قليلة العدد . قوته الثمار والحشرات الكبيرة والوزغ ... = جسمه كبير القد يطول نحو ٤٥ سم . يتميز بكبر منقاده الغليظ المحدودب وباستطالة ذنبه المستدير الطرف . ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الاصفر والاخضر ثم الاحمر والابيض || الانثى اكبر قدماً من الذكر وأهت ثوباً منه || يدشن عشه في تجاويف الاشجار . الانثى تحضن وحدها من بيضتين الى ثلاث بيضات بينما الذكر يؤمن لها الغذاء . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع .




إَرْقِيس



أَرْكَارِي



أَرْكَة



أَرْكُوم الحَبَشَة

فطر مجهري يركب الاوراق وزلساد الازهار. مظهره الخارجي، كتل من المشيج الأرمد اللون، لا قياسي التجميع والحجم يسبب اسمرار وجفاف وسقوط الاعضاء الموصومة. يكافح باستعمال السوائل الفاطورية المركزة على اوكسيكلورير النحاس.

١٠٥٣- إرميداد التبغ *Erysiphe cichoracearum*,

Oidium ambrosiae (S). *Oidium du tabac* (F).

فطر شديد الاذى واسع الانتشار يصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية اغصنها التبغ والباذنجان والبطاطا والبنندوره. ويصيب ايضاً نباتات فصيلة المركبات ومنها الخس والهندباء والديج والطرخشقون والطرطون والاذريون وعباد الشمس والاسطر الخ... || مظهره الخارجي بقع بيض خلية مبعثرة بدون انتظام تركب نصل الاوراق السفلى ثم تنتشر على كامل النصل ومن ورقة الى اخرى اعلى منها اذا لأمها العوامل الجوية || اضراره في التبغ فادحة لانه يعطب نسيج النصل ويفقده جميع خواصه المميزة || يكافح بالكبريت تعفيراً على الثرية فقط او بالكورتان على الشتول.




أرباك

١٠٥٤- إرميداد التفاح *Podosphaera leucotricha*,

Sphaerotheca mali (S). *Oidium du pommier*, *Blanc du pommier* (F). *Apple mildew* (E). *Apfelmehltau* (D).

فطر اغبر اللون يركب نواحي التفاح والاجاص والسفرجل قيمنطق الاوراق الفتية بوشاح من الحمل يعطب نسيج النصل ويسبب جفافه || وهر في التفاح اشد وقعاً منه في الاجاص والسفرجل || يكافح باستعمال الكبريت او الفوطيم النحاسية او السوائل السلفوكلسية.



إرميداد

١٠٥٥- إرميداد الثوت *Phylactinia moricola* (S).

Oidium du mûrier (F).

فطر اغبر اللون الاطحل يركب اوراق الثوت فيؤذيها ويسبب عطلها لامتناع دود القز عن أكلها || مظهره الخارجي بقع فسيحة خلية غبراء اللون تركب صفحة النصل السفلى فتعطبها بعد القضاء على خلايا نسيجها.

١٠٥٦- إرميداد الحمحميات

Erysiphe horridula (S). *Blanc des borraginées* (F).

يركب نباتات فصيلة الحمحميات. مظهره الخارجي بقع مستديرة خلية تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى السمرة. تسبب جفاف نسيج الاوراق وقد تعطب الازهار وتسبب انملاصها || يكافح باستعمال احد المركبات الكبريتية.



إرميداد الثوت

١٠٥٧- إرميداد الحمضيات

Oidium tingitanum (S). *Oidium des citruses* (F).

فطر مجهري يركب الاوراق في زامها الاخير وعلى صفحة النصل العليا. مشيجه لبد النواص ارمد. يعرقل سير النسج الطبيعي وقد يسبب سقوط الاوراق || يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية.

١٠٥٨- إرميداد الخرنوب *Oidium ceratoniae* (S).

Oidium du caroubier (F).

فطر مجهري يركب اوراق الخرنوب فيمنطقها بمشيجه اللبد الذي يسبب جفافها وسقوطها || يكافح باستعمال الكبريت ومنهم من فضل استعمال الفوطيم المركزة على مادة النحاس.

١٠٥٩- إرميداد الزُّعْرُور *Podosphaera oxyacanthae*,

Oidium crataegi (S). *Oidium de l'Aubépine* (F).

فطر ابيض اللون يركب اوراق الزعرور والسفرجل

١٠٤٤- أُرْكُومِيَّات ٥ *Bucerotidae* (S).

Bucérotidés (F). *Bucerotidae* (E).

فصيلة طير من الجواثم. اجناسها قليلة العدد تتميز بكبر اجسامها وبضخامة مناقبها الغليظة وما يعلوها من نتوءات مستغربة الاشكال || خيها مباشرة قوتها المواد الحيوانية والنباتية. اعطانها تشمل معظم المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والاسترالية || اشهر اجناسها الاركوم والبوقير والخنو والطق.

١٠٤٥- أُرْكُومِيَّات *Prépuce* (F). *Prepuce, Foreskin* (E).

الارلة هي الغرلة عند الحيوان.

١٠٤٦- أُرْكُومِيَّات *Improductif* (F). *Unproductive* (E).

الارض الآيلة هي التي لا تثبت شيئاً

١٠٤٧- أُرْمَاك* ، لُطْر عُقُودِي

Symplocos racemosa (S). *Symplocos en grappe* (F).

Lohd tree (E). *Lotbaum* (D). *Lotoura* (I).

نوع من اللطير وهو شجرة حرجية من فصيلة الاصطركيات. مهدها الاقاليم الاستوائية يستخرج من لحاء جذوعها واغصانها مادة قلوئيدية تدعى لطرين (Loturine) تدرب في الكحول والايتير والاسيتون.

١٠٤٨- أُرْمَاك *Dent* (F). *Tooth* (E).

أُرْمَاك ج اوارم: هي السن عند الحيوانات الضارية.

١٠٤٩- إرميداد* ، رَمْد، بَيَاض دَقِيقِي *Oidium*

وصم يعزري اكثر النباتات الزراعية سببه فطر مجهري من النوسيات وفصيلة الوطحيات || مظهره الخارجي غبار اطحل اللون يغزو نصل الاوراق وبشرة الثمار ولحاء الاقان والقضبان فيمنطقها بوشاح خلي الهشة يفسد عليها وظائفها الحياتية ويؤذيها اشد الاذى || يكافح باستعمال الكبريت ومشتقاته كما والكورتان والكيتان.

١٠٥٠- إرميداد أْبْقَع ، إرميداد البندق

Phylactinia guttata, *P. corylea*, *P. suffulta* (S).

Oidium du noisetier (F).

فطر اطحل اللون اغبر يركب اوراق البندق والمران والكستنة والبتولا || يتكاثر في تموز وآب. مظهره الخارجي بقع صندرة مختلفة الاشكال والقدر مبعثرة بدون انتظام تنتشر على صفحة النصل السفلى فتسبب احمرارها ثم يباسها || يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكلسية.

١٠٥١- إرميداد أُرْقَع *Oidium leucoconium*,

Sphaerotheca pannosa (S). *Oidium du rosier*, *Blanc du rosier* (F). *Powdery mildew of roses* (E).

Rosenmehltau (D).

فطر ابيض اللون اطحل يركب الورد والدراقن واللوز. مظهره الخارجي بقع صندرة غبراء اللون تركب النواحي والاوراق الفتية فتعجبها وتوقف نموها ثم تركب الازهار والثمار فتعطبها وتسبب جفاف البشرة واللحاء || اضراره في الورد والدراقن فادحة اذا تملك منها || يكافح باستعمال احد الفوطيم الفعالة الكثيرة العدد. ومنهم من استعمال برمنغنات البوتاس بمعدل ٢ / ١٠٠ او بيكربونات الصودا بمعدل ٧ / ١٠٠

١٠٥٢- إرميداد البيغونيا *Oidium begoniae*,

O. chrysanthemi (S). *Oidium du begonia* (F).

Echter mehltau, *Chrysanthemum mehltau* (D).

وقد يصيب الأزهار فيسبب انملاصها || يكافح بالكبريت
وبالمركبات النحاسية .

١٠٦٦- إرميداد النجيليات
Erysiphe graminis, Oidium monilioides (S). Oidium des graminées, Blanc des graminées (F). Powdery mildew of cereals (E). Getreidemehltau (D).

فطر يركب معظم النجيليات اخصها الحنطة والشعير
والشوفان والشيلم . يبدو في اواخر الربيع على الشرائف
التي تلامس التربة . مظهره بقع بيض مبعثرة على النصل
بين الشرايين ثم تعم القصبه وتمتد من شراف الى شراف
حتى السبله . هذا اذا واثته ونشطته العوامل الجوية .

١٠٦٧- إرميداد مضلع
Erysiphe polygoni, Oidium erysiphoides (S). Oidium du pois (F). Powdery mildew of peas (E). Erbsenmehltau (D).

فطر شديد الاذى واسع الانتشار يصيب ٣٥٧ نوعاً من
النبات تنتمي الى فصائل القرنيات والقرمييات والصلبييات .
مظهره الخارجي بقع متعددة الاشكال ، من نقطة صغيرة الى
بقعة ، تتركب نصل الاوراق ومعاليقها فتبدو بيضاء اللون
ثم يملوها موج وردي وتستقر على الاطلح . وقد يصيب
السوق والفروع والازهار والثمار اذا وافقت العوامل الجوية .
يكافح في الصليبيات والقرنيات باستعمال احد الفواطير
المرتكزة على الكبريت والنحاس . ويكافح في القرعيات
اخصها البطيخ والشام باستعمال بثناسلفور البوتاسيوم .
بمعدل ١ %

١٠٦٨- إرميداديات
Erysiphaceae (S). Erysiphacées, Erysiphées (F). Erysiphaceae (E).

مجموعة فطور مجهرية طفيلية ورمية عديدة الاجناس والانواع
معظمها من الفطور التي لا علاقة لها بالزراعة وبعضها
يركب النباتات فيؤذيها .

١٠٦٩- أرميدات
Vélé (F). To bring forth (E). ارمدت الشاة والبقرة والناقة : اضرعت .

١٠٧٠- أرميديل
هو التاتر او المدرع حيوان من الثدييات ، اطلبه .

١٠٧١- أرمش
راجع أجدر .

١٠٧٢- أرمش هو الغاليون الابيض نبات بري طبي .

١٠٧٣- أرمور
هو اللذان نبات ترابي من الزنبقيات ، اطلبه .

١٠٧٤- أرموس
Eremostachys (S). Erémotachys (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من فصيلة الشفويات .
انواعه المعروفة قليلة العدد ، منها الشرق الادنى ||
سوقها منتصبه ، قليلة الفروع ، تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
اوراقها متقابلة ، كبيرة ، شبه كفية النصال الجميلة
الحضار . ازهارها سنبلية التجميع ، مستطيل السنابل .
ازهارها ارجوانية ، صغيرة . اوراقها وازهارها خافتة المرف
المستحب . تنويرها صيفي .

١٠٧٥- إرموفيلس
Eremophilus (S). Erémophile (F). Eremophilus (E).

جنس اسماء نهرية من مفتوحات المثانة وفصيلة السوردريات
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض انهر امريكة

والاكيدنيا والكياكي والغبيراء وقد يركب ايضاً الكرز
والعناب || مظهره الخارجي بقع بيض نسيحة تكتنف
صفحة النصل المليسا فتعطب النسيج وتسبب جفافه .
يكافح باستعمال احد السوائل السلفوكلسية بعد ان يضاف
اليه نحو ٦ . ١ / من سلفات الحديد لان وجوده يحول دون
شعط النسيج .

١٠٦٠- إرميداد السنديان
Microsphaera alphitoides, M. quercina, M. alni (S). Oidium du chêne (F). Oak mildew (E). Eichenmehltau (D).
فطر اغبر اللون اهر يركب نواحي السنديان واوراقه الفتية
فيغشيها ببقع نسيحة متقاطعة لينة خلية تعطب نسيج النصل
وتعجه وتوقف نموه وتسبب يباسه || وقد شوهد على الكستنه
وهو يفعل فيها فعله بالسنديان .

١٠٦١- إرميداد الكرمة* ، رمد الكرمة
Erysiphe Tuckeri, Uncinula necator, Erysiphe necator, Uncinula spiralis (S). Oidium de la vigne (F). Powdery mildew of grape (E). Echter mehltau der weinstocks (D).

فطر مجهري يعترى اوراق وازهار وثمار الكرمة فيغشيها
بوشاح من النبار الابيض الاطلح الذي لا يلبث ان
يتحول الى ارمد || وهو شديد الاذى وخيم العواقب لانه
يشنج الاوراق ويفقد لها لونها ، يعقم الازهار ويسبب
سقوطها ، يصيب الثمار فتتخلص او تتشقق ويتغير
طعمها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تعفيراً
على جميع اعضاء الكرمة . تبتدى المكافحة مع الازهار وتقوم
حتى الحصرمة . قوامها التعفير الشامل من ست الى سبع مرات .

١٠٦٢- إرميداد الكريزانتيم
Oidium chrysanthemi (S). Oidium du chrysanthème (F).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الكريزانتيم فيسقطها بوشاح
خفيف النواص يبدو اغبر اللون ثم ينحرف الى الرعدة
فيسبب جفاف الاوراق وسقوطها || يكافح باستعمال
الكبريت الميكروني وغيره من الفواطير المرتكزة على
الكبريت . كما وانه يحسن اجتناب كثرة الرطوبة ونضج او
رش الاوراق بالماء .

١٠٦٣- إرميداد الكشمش
Erysiphe mors-uvae, Sphaerotheca mors-uvae (S). Oidium brun du groseillier, O. américain du groseillier (F). Powdery mildew of currants (E). Amerikanischer stachelbeermehltau (D).

فطر ارمد اللون يظهر عند اواخر الربيع ويستمر حتى
الخريف . يركب نواحي الكشمش واوراقه الفتية ثم يمتد
الى سائر الاعضاء فيسقطها بوشاح . قطبي الشكل فضي
المواج || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير القمالة .

١٠٦٤- إرميداد المضاض الياباني
Oidium evonymi Japonici (S). Oidium du fusain du Japon (F).

فطر مجهري يركب اوراق المضاض الياباني على صفحتها .
مظهره الخارجي بقع حر لا قياسية الشكل والحجم والترتيب
الى ان يملوها مشيج القطر اللبد الكثيف فتبدو بيضاء اللون
ثم يبداء || وقد يصيب الافنان والتواهي فيسبب ذبول
اوراقها || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني او بعض
السوائل السلفوكلسية .

١٠٦٥- إرميداد المطاط
Oidium heveae (S). Oidium des hévées (F).

فطر مجهري يركب اطراف نصل الاوراق فيجمعها ويقودها
الى الجفاف بعد ان يمتطقها بنواص مشيجه اللبد الاصفر ،



إرميداد الكرمة



إرموفيلس

ووبرها فهي من اجل ذلك تقسم الى ثلاثة اقسام :

(١) قسم الارانب المنتجة اللحم . اشهر ضروبها وعروقها :

Lapin géant des Flandres	الارنب العليج البلجيكي
Lapin géant blanc	الارنب العليج الابيض
Lapin b��ller	الارنب الكبشي
Lapin normand	الارنب النورمندي
Lapin hollandais	الارنب الهولندي
Lapin commun	الارنب المبدول
Lapin papillon	الارنب الفراشي
Lapin japonais	الارنب الياباني

(٢) قسم الارانب المنتجة الفراء . اشهرها :

Lapin argent��	الارنب الفضي
Lapin bleu	الارنب الازرق
Lapin poionais	الارنب البولوني
Lapin russe	الارنب الروسي
Lapin chinchilla	ارنب شنشيله
Lapin rex	ارنب ركس

(٣) قسم الارانب المنتجة الوبر ، وهو يشمل ضرباً واحداً تحدثت منه بعض السلالات . اما الضرب فهو :

Lapin angora	ارنب انقره
--------------	------------

هذا من الوجهة الاقتصادية الشاملة . اما من الوجهة الجسورية العلمية والعملية فاننا سنقتصر في البحث على وصف وتحلية بعض الضروب والعروق المشهورة . منها :

١٠٨١ - أرْنَب أَزْرَق *

Lapin bleu
متوسط القد وزنه من ٤ الى ٥ كيلو . ثوبه الى الزرقة الرصاصية الجميلة . وبره قصير ناعم الملمس . وهو من الارانب السهلة التربية ، القوية البنية ، الجيدة التاج والفائدة .

١٠٨٢ - أرْنَب أنْقَرَه

Lapin angora
كانت تربيته لبضع سنوات تحتل مركز الصدارة . وهو متوسط القد طويل الوبر جميل الشكل يربي للاستفادة من وبره الناعم الطويل الكثير الاستعمال الصحي والصناعي لانه يفيد الالوجاع العصبية . اما الانتاج الوبري السنوي للارانب الواحد فيراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ غرام يقتف على سبع او ثمان مرات في السنة . اجوده ما استخرج من العنق والصدر ووبر الاناث افخر صنفاً من وبر الذكور . ويطلب من يتعاطى هذه التربية ان يعتني بنظافة المرنية وان يسهر بدقة على الارانب ويسرح ووبرها من مرتين الى ثلاث مرات في الاسبوع .

١٠٨٣ - أرْنَب بَرِّي ، أرْنَب وَحْشِي

Li vre (F) Hare (E).
هو القواع ، اطلبه .

١٠٨٤ - أرْنَب بُورْغُونِي

Lapin de Bourgogne
معتدل القد شديد النشاط والحيوية . ثوبه الى الكهية الصهباء . بطنه ابيض اغبر . وزنه يراوح من ٤ الى ٥ كيلو . لحمه جيد الصنف . وهو من العروق المرغوب فيها لانه سهل التربية ، جيد التاج .

١٠٨٥ - أرْنَب بُولُونِي

Lapin polonais
من الارانب التي تربي لفرائها . صغير الجشة وزنه نحو ٢ كيلو . ابيض الثوب ، اكليج الحلق ، شرس الطباع ، ناعم الوبر الحريري الملمس . فروته تشبه فروة القاقم (الهرمين) .



أرْنَارِيه



أرْنَب اَزْرَق

الجنوبية . اجسامها تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . رؤوسها مخروطية الشكل . اعظامها معتدلة الجرم . رباعية المذبات . اشداقها متوسطة الانفراج زعانفها الظهرية فردية ، صغيرة ، تقابل الشرجية وتمائلها ، زعانفها الذيلية مخددة ، مستطيلة . انوابها الى الرمكة الخضراء تسمر في الظهر وتنحرف الى الفضي في البطن . لحوبها مأكولة ، مبتذلة الصنف .

١٠٧٦ - أرْمُولَة (F). Rhizoma, Rhizome (E).

الارمولة : الجذمور القصير . ج آرامل وأراميل .

١٠٧٧ - أرْمِيرِيَة اطلب عود احمر .

١٠٧٨ - أرْنَارِيَة * ، زَهْرَة الرِمَال ، رَمْلِيَة

Arenaria (S). Ar  naire, Sabline, Sablinier (F). Sea purslane, Sea chickweed, Sand-wort (E). Dicke salzmier (D). Arenaria, Morgellina (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة القرنفلية . يعيش في الاراضي الرملية . ساقه فرعاء سلامية . اوراقه لسنة حاضنة قرنفلية . ازهاره صغيرة جميلة الشكل لونها الى الحمرة الوردية .

١٠٧٩ - أرْنَب

Li vre (F). Lepus (E).
الارنب كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت الجبار . وجه الارنب الى المغرب ومؤخره الى المشرق . عدد نجومها ١٩ والعرب تسمي الاربعة ، التي اثنان منها على يديه واثنان على رجله ، عرش الجوزاء . جميع نجوم هذه الكوكبة من المرتبة الخامسة والسادسة باستثناء نجم واحد من المرتبة الثالثة يدعى « الارنب » .

١٠٨٠ - أرْنَب ، أرْنَب أهْلِي ، أرْنَب دَاجِن

Oryctolagus cuniculus, Lepus domesticus (S). Lapin, Lapin domestique (F). Rabbit, Tame rabbit (E).

حيوان لبون قاضم من فصيلة الارفليات وهو وحيد الجنس والنوع ، عديد الضروب والعروق والسلالات . وكلمة ارنب تطلق على الذكر والانثى ومع ذلك فلذكر الارنب يدعى خنز وقيل الجمع قعال وأخزة وخزان والانثى تدعى عكرشة . والخرنق ولد الارنب فهو اولاً دروس الى ان يبصر ويكتسي ثم خرنق فسحلة فارقب . وخرنق تطلق على الذكر والانثى وقد يقال للانثى خرنقة . والارنب يعيش جماعات . والانثى تضع بعم ثمانية اشهر . يحملها يدوم من ٣١ الى ٣٢ يوماً وعدد ادراسها يراوح من ٣ الى ١٢ تخلق عيها مرطاء . تبصر وتكتسي بعد اسبوع . وهو من الحيوانات الاقتصادية السريعة النمو والادراك . يربي في المنازل وفي حظائر خاصة تدعى مخززة او مرنية للحصول على لحم وفرائه ووبره . يتميز بخفته وسرعة عدوه وهو طويل الرجلين ، قصير اليدين ، حاد البصر قوي السمع له عينان جاحظتان تكتمان المرليات في كل اتجاه وأذنان طويلتان تحسان اخفت الاصوات . ينام مفتوح العين . وهو من الحيوانات الشابة . انشاء نشوة وقد تساقد وهي حيل فيؤدي بها ذلك ، في بعض الاحيان ، الى الاستلجاب اي الى محبل ثان ووضع ثان يعقب الاول باسبوع واكثر وهي المدة الفاصلة بين الكومين . والارنب حيوان تعود حياة الدجن . وهو يعيشها ولا تؤله لكنه لا يألفها وان استطاع الهرب من مرنبته يذهب ولا يعود . ضروبه وعروقه وسلالاته عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم وبعضها ابد واستوحش فأصبح من الآفات الزراعية كما هي الحال في بعض مناطق استراليه . تربي الارانب للحوبها وفرائها

وضروبها وأنواعها كثيرة العدد تنتمي الى جنسين: الارنب والقواع. جميعها عاشبة، دجوية، جامة. انماها سريعة النمو مبكرة، نشوة كثيرة الولد.

١٠٩٥- أرنة، روبة
Caillé (F).
Coagulum, Curd (E).
هو اللبن الحامض الذي يضاف على الحليب فيروب

١٠٩٦- أرغفة اطلب نخلة السكر.

١٠٩٧- أرئود*
Alucita pentadactyla (S).
Ornéode (F).

فراشة من فصيلة القويقيات. صغيرة القد، اسطوانية الجسم تتميز برواشها الريشية التركيب المجذعة بالاسود. زباناها حنطية دقيقة. لها جيلان في الحول الواحد. يرقتها تعيش على اللبلاب وحب المي.

١٠٩٨- أرئوس*، أرئوس، أرئسة

Erinus (S). Erine, Mandeline (F). Erinus, Liver balsam (E). Alpenbalsam (D). Erinus (I).

نبات عشبي نجي بري معمر من فصيلة الخنازريات يصلح للزينة. اقلية المناطق المعتدلة من اسيا الصغرى واروبه. وهو عشبة ابدة رائحة الجبال. سوقها دقيقة فراء، اوراقها ضمية زغبية مسنة لونها الى الاحمر البنفسجي ازهارها صغيرة وردية. يتكاثر بالتبذير والتعجيل والتدريج، يزرع في الحواشي وعلى جوانب الممرات.

١٠٩٩- أرئسة هي الاطن، اطلبه.

١١٠٠- أرئسين*
Arnicine (F).

غلوكوزيد حامز الطعم يوجد في ازهار الارنيكا وفي اوراقها وجذورها.

١١٠١- أرنيكا*، خانيق الفهند، زهرة العطاس

Arnica (S). Arnique, Aronique, Bétoine des montagnes, Tabac des Vosges, Plantain des Alpes (F). Arnica, Mountain alkanet, M. tobacco (E). Arnika, Echtes wolferlei, wohlverleih (D). Arnica, Polmonaria di montagna (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الشعاعية. اكثر انواعه بري ومنها طبي وبعضها زراعي زينة. ساقه ثنائية او رباعية الفروع تعلق من ٢٠ الى ٧٠ سم. اوراقه متقابلة. ازهاره كبيرة القد هامة الارتكاز لونها الى الصفرة. بزوره ريشية القنبرة القطبية. يقال انه من النباتات الطبية العديدة المنافع المهمة. يتكاثر بالبذر والمقل. يرغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والرطوبة.

١١٠٢- أرهاب، رهام مالا يصيد من الطير كالبغات.

١١٠٣- إرهام
Luxuriance
تناهي النبات في الخصب والنضارة.

١١٠٤- أرهم
Luxuriant
نعت تعريبي يدل على فرط النمو في النبات.

١١٠٥- أرنا، تنجير
Agrostis (S).
Agrostide (F). Agrostis (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. انواعها عديدة جميعها من النباتات الصغيرة القد اوراقها

١٠٨٦- أرنب روسي
Lapin russe
صغير الجثة وزنه نحو ٢ كيلو. ثوبه ناصع البياض حريري الملمس. اما انفه واذناه وذنبه واطراف جرابه فسود واسودادها حالكة. وهو سهل التربية لكنه يفضل المراتب القليلة الاشعاع الضوئي ويفضل الحبوب على العشب والخضار.

١٠٨٧- أرنب علج*، أرنب مارد
Lapin géant
مهده بلجيكية وهو كبير الجثة مستطيلها. وزنه يراوح من ٧ الى ٩ كيلو. ثوبه اكهب اطحل ينحرف عند بطنه الى الشبهة الغبراء. اذناه كبيرتان مستطيلتان. وهو من الارانب الشديدة النشاط والحوية يستعمل في تهجين بعض العروق المتوسطة القد لتحسينها وزيادة حجمها ووزنها.

١٠٨٨- أرنب فضي*
Lapin argenté
معتدل الجثة وزنه من ٣ الى ٤ كيلو. ثوبه فضي اللون حريري الملمس. سلالاته عديدة تختلف باختلاف موج وبرها الفضي. وهو سهل التربية، قوي البنية، حسن النتائج.

١٠٨٩- أرنب كبشي*
Lapin bélier
اكبر الارانب جثة وارزنها لهما. رأسه صمغوري الشكل عيناه كبيرتان جاحظتان، اذناه مستطيلتان متدليتان. ثوبه العادي اكهب اغبر ومنه الاسمر والاسود والابيض. وهو من الارانب البطيئة النمو الضعيفة النتائج الهادئة الكسولة.

١٠٩٠- أرنب نورمندي*
Lapin normand
معتدل القد، سريع النمو والادراك، شديد النشاط والحوية. ثوبه الى الكهبة اليرداء. بطنه ابيض اصفر. وبره بالغ القصر، حريري الملمس. وزنه من ٥ الى ٦ كيلو. لحمه جيد الصنف. وهو من العروق الواسعة الانتشار لانه سهل التربية، كثير النتائج والفائدة قوي البنية قليل العطش.

١٠٩١- أرنب هفانه*
Lapin de Havane
صغير الجثة وزنه نحو ٢ كيلو. ثوبه اصهب بني قريب الشبه من لون التبغ. يعتبر من العروق النشيطة الجيدة النتائج، السهلة التربية.

١٠٩٢- أرنب هولندي*
Lapin hollandais
متوسط القد، ابلق الثوب يمتاز بكثرة تناسله وسرعة ادراكه. وزنه من ٢ الى ٣ كيلو. وهو من الضروب القنوعة الصبورة الشديدة الاحتمال التي لا تضيحها حالة عابرة ولا يؤذيها رطاب مستمر.

١٠٩٣- أرنب بحري
Aplysia depilans (S).
Aplysie (F). Sea hare (E).

حيوان رخوي صدف من فصيلة ارانب البحر يكثر في المتوسط. وهو بطي الرجل كالخلزون. رأسه كرامس الارنب، ثوبه عديد الالوان التي تختلف باختلاف المكان. يقال انه هو ومسحوق صدفه يبرطان الشعر. وهو من ذوات السموم يفرز عند شعوره بالخطر مادة سامة حمراء اللون تخفب الماء حوله من المثر الى المترين.

١٠٩٤- أرنبات
Leporidae (S).
Léporidés (F). Leporidae (E).
فصيلة الارانب من رتبة القواضم. موطنها العالم سلالاتها



أرنب علج



أرنب فضي



أرنب كبشي



أرنب نورمندي



أرنب هفانه



أرنب



أرئوس



أرنيكا




أروا أبيض



أروا أحمر




أروا عابق



أروس القطب



أروس دربي



أرومية



أروكارية

الانتظام . أزهارها بيض . ثمارها خريشمية . بزورها صغيرة مستديرة || أشهر أنواعه :

- Erophila minima (S). أروفيلا صغرى
Erophila vulgaris (S). أروفيلا عادية
Erophila praecox (S). أروفيلا مبكرة
Erophila setulosa (S). أروفيلا هليبية

١١١٤- أروكاريات

Araucariées (F).
Araucariae (E).
جنس اشجار حرجية شائخة هرمية الشكل من فصيلة الصنوبريات . منبتها أمريكا الجنوبية وجزر أوقيانيا حيث يوجد منها أحراج شائعة الاطراف || يستخرج من سوقها بالحز عصارة رائحة شائعة الاستعمال .

١١١٥- أروكارية

Araucaria excelsa (S).
Araucarie (F). Bunya, Bunya pine (E). Bunya tanne, Zimmertanne (D). Altingia (I).
شجرة حرجية من الأروكاريات وفصيلة الصنوبريات . وهي شجرة كبيرة شائخة ، هرمية الشكل ، متقابلة الأغصان الاسطوانية ، الافقية الانتشاب والارتكاز ، الحرفقية الاوراق . يستخرج من جذعها عصارة رائحة شائعة الاستعمال . تزرع للتزيين في الحدائق والمراكن . ترفع في المواقع الحارة الرطبة .

١١١٦- أروم ، تريباق ابيض ، لوف مبقع

Arum maculatum (S). Arum, Pied de veau, Couque-rot, Arum maculé (F). Calf's foot, Cuckoo-pint, Wake robin, Water robin (E). Fleckenzebrwur, Aronenkraut, Aronswur, (D). Aro comune, Giglio d'oro, Pié di vitello. (I).
نبات عشبي تزييني معمر من اللوليات القلقاسيات . ضروبه عديدة . يرغب في الاراضي الرملية الرطبة ، ساقه قرصية ارضية . اوراقه منتصبه سهمية مستطيلة . أزهاره شمراخية زنادية مغلفة بلفافة تنتهي كالمزراق يكثر فيها اللون الابيض والابيض المرقش || يتكاثر بشحفه القرصية . يرغب في التربة الرطبة القليلة الاندماج .

١١١٧- أروم ايطالي ، لوف جعد ، ذريرة
Arum italicum (S). Arisare, Gouët d'Italie (F). Italian arum, Large cuckoo-pint (E). Italienische zehrwurz (D). Aro d'Italia, Cavolaccio di macchla, Gicaro (I).
نوع من الأروم وهو نبات عشبي معمر بري وزادعي تزييني . يتكاثر كالاروم ويرغب في التربة الرملية الرطبة .

١١١٨- أرومة

Racine principale (F).
Principal Root (E).
هو الاصل الذي يكون مقابل الساق وامتداداً لها . وفي الغالب هو الجذر الاصل الذي يتحول الى ارومة . ولا ارومة في النباتات ذوات الفلقة الواحدة ولا في النباتات ذوات الجذور المتفرعة الا في بدء حياتها .

١١١٩- أرومة
Souche (F). Stump (E).
هو ما يبقى في الارض من الشجرة بعد قطعها .

١١٢٠- أرومية مسكية ، قرنسي مسكية

Aromia moschata (S). Aromie musquée, Capricorne musqué (F). Aromia moschata (E). Moschusbock, Grüner weidenbock (D).
حشرة من فصيلة القرنبيات طولها من ٢٠ الى ٢٥ مم . لونها اخضر نحاسي يعلوه موج ذهبي . يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كالسك || يرقاتها تركب سوق

١١٢١- أرومية مسكية ، قرنسي مسكية

Aromia moschata (S). Aromie musquée, Capricorne musqué (F). Aromia moschata (E). Moschusbock, Grüner weidenbock (D).
حشرة من فصيلة القرنبيات طولها من ٢٠ الى ٢٥ مم . لونها اخضر نحاسي يعلوه موج ذهبي . يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كالسك || يرقاتها تركب سوق

١١٢٢- أرومية مسكية ، قرنسي مسكية

Aromia moschata (S). Aromie musquée, Capricorne musqué (F). Aromia moschata (E). Moschusbock, Grüner weidenbock (D).
حشرة من فصيلة القرنبيات طولها من ٢٠ الى ٢٥ مم . لونها اخضر نحاسي يعلوه موج ذهبي . يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كالسك || يرقاتها تركب سوق

١١٢٣- أرومية مسكية ، قرنسي مسكية

Aromia moschata (S). Aromie musquée, Capricorne musqué (F). Aromia moschata (E). Moschusbock, Grüner weidenbock (D).
حشرة من فصيلة القرنبيات طولها من ٢٠ الى ٢٥ مم . لونها اخضر نحاسي يعلوه موج ذهبي . يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كالسك || يرقاتها تركب سوق

عصفية الشكل والتركيب . أزهارها عشكولي منتصب بزورها صغيرة لا حستك فيها .

١١٠٦- أروا أبيض ، نجير أبيض

Agrostis alba, A. palustris (S). Agrostide blanche, Traine, Fiorin, Pavine (F). White bent grass, Fiorin grass (E). Weisses strausgrass, Fioringras (D). Agrostide blanca, Pennacchini (I).
نوع من الأروا وهو نبات عشبي بري علي . وجوده وكثرته في المراعي تفيد الماشية ، اما كثرته بين الزروع وفي الاراضي المروية فضره .

١١٠٧- أروا أحمر ، نجير أحمر
Agrostis rubra (S). Agrostide d'Amérique, Foin rouge (F). Herd grass, Red top grass (E). Herden-grass (D). Fieno rosso (I).
نوع من الأروا وهو نبات عشبي بري علي وقد يندر ويوجد في المراعي الرطبة .

١١٠٨- أروا عابق ، نجير عابق

Agrostis nebulosa, A. capillaris (S). Foin capillaire (F). Bird grass, Cloud grass (E). Pratchvoti (D). Agrostide capillare, Erba d'uccello (I).
نوع من الأروا وهو نبات عشبي بري وزراعي تزييني ، يزرع في الحواشي والممرات . يتكاثر بالبذر .

١١٠٩- إرواء
Abreuvement (F). Watering (E).
هو اسقاء الحيوانات الداجنة .

١١١٠- أروس ، إيلند ، بقعة ، مجع

Taurotragus orias (S). Oréas, Taurotrague, Antilope élan (F). Eland (E).
جنس حيوانات لبونة عاشبة من فصيلة الايليات . موطنها مراعي وغابات افريقية . جشها كبيرة يبلغ ارتفاعها نحو ١٧٥ سم . وزنها ٧٥٠ كيلو . ثوبها اصهب احمر . عيونها مكحلة كبيرة ، قرونها لولبية الانتشاب مستقيمة . غيها فضفاض في الذكر والانثى . خصر الانثى رباعي الاخلاف كالبقرة . ذنها دقيق طويل ينتهي بضمة من الشعر الاسود . تعيش جماعات ، اجلها لا يقل عن العشرة وقد يفوق المئة || منها نوعان اروس القطب و اروس دربي .

١١١١- أروس القطب

Oreas canna.
Taurotragus oryx (S). Oréas canna, Elan du Cap, Taurotrague oryx, Antilope oryx (F).
كبير الجثة ضخمة ، ارتفاعه نحو ١٧٥ سم . وزنه نحو ٧٥٠ كيلو . موطنه افريقية الجنوبية . يكثر في الترسفال والناثال . يعيش على مراعيها الطبيعية وبين ادغالها وغاباتها .

١١١٢- أروس دربي

Oreas Derbians (S).
Oréas de Derby, Bosélaphe de Derby, Elan de Derby, Elan du Sénégal (F).
اصغر جثة من اروس القطب واجمل شكلاً وافتح ثوباً . موطنه واسع الارحاء يعم لصف افريقية . يألف المراعي الطبيعية والغابات المبعثرة الاشجار .

١١١٣- أروفيلا

Erophila (S).
Erophile (F). Nailwort, Withlow grass (E). Gemeines hungerblümchen (D). Erofla (I).
جنس نباتات عشبية برية من الصليبيات . انواعه قليلة جميعها نجمة عديدة الساق . اوراقها صغيرة مستطيلة ضمية

١١٢٩- **أروية الهند، أوريال** (S). *Ovis cycloceros* (S).
Mouflon des Indes (F). **Urial** (E).
 موطنه السند والبنجاب والافغان وإيران . وهو متوسط القد ،
 صغير القرن احبب اللون يألف الجبال العالية من ارتفاع
 ٢٠٠٠ الى ٤٥٠٠ م.

١١٣٠- **أروية أمريكة** (S). *Ovis cervina*, *O. montana* (S).
Mouflon d'Amérique, **Bighorn** (F). **Bighorn** (E).
 هو النوع الامريكى الوحيد . موطنه امريكا الشمالية
 وكندا . ضروبه خمسة جميعها كبيرة القرون الغليظة .
 تعيش جماعات اجلها من ٨ الى ١٢ . تألف الغابات
 والاحراج الوعرة || ثوبه ابيض اسفع . طوله نحو ٢٠٠
 سم . وارتفاعه ١٠٠ سم . الانثى اصغر جثة من الذكر .

١١٣١- **أروية كورسكة * ، مفلون**

Ovis musimon (S). **Mouflon d'Europe** (F).
 موطنه جبال كورسكة وسردينية . صغير الجثة ربع القامة
 ثوبه الى الصبغة ، بطنه ابيض اللون . الانثى جماء الرأس
 واصغر جثة من الذكر . اجله من ٥ الى ٩ انفار .
 يألف الجبال الوعرة .

١١٣٢- **أروي** هو العسل ، اطلبه .

١١٣٣- **إرياس إينسولانا * ، قراشة كشافج القطن**
Earias Insulana (S).

فراشة من فصيلة الليليات موطنها اقليم القطن . توجد في
 آسية وافريقية وأروبه وامريكا واستراليا || طولها نحو
 ٩ سم . بسطها من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها وصدرها الى
 الخضار الاصفر يملوه موج حنطي . بطنها فضي اللون
 والمواج . زباناها خيطية مستطيلة . روشناها الاياميان
 بلون صدرها تمتزجها ثلاثة خطوط سم . روشناها الخلفيان
 الى البياض الصدفى الاسمر المواج || تسرح في الليل
 وتستقر في النهار وقد تستكن في اكمام البزاعم الزهرية .
 الانثى اكبر حجماً من الذكر . تمتج افرادياً نحو ٢٠٠
 مكنة على أي جزء كان من النبات فتتقف بعد اربعة ايام
 في الصيف وتسعة ايام في الربيع والخريف و بعد نحو
 ثلاثة اسابيع في الشتاء . يرقها تدعى « دودة القطن الشوكية » .
 اطلبها . تنسلخ خمس مرات وتتحوّل الى عذراء داخل شرنقة
 حريرية شكلها كالزورق لونها الى السمرة || اجيالها
 الحولية من الخمسة الى الستة . الصبي منها يدوم نحو ٥
 اسابيع والربيعي ٨ والخريفي ١٠ والشتوي نحو ١٥

١١٣٤- **أريال**

الاريا على نوعين رقم ١ ورقم ٢ ، وهو فطور زراعي
 يرتكز على سلفات النحاس و كربونات الصودا . يستعمل
 سائلاً في مكافحة التسة فتتضخ به جميع اوراق النبات .
 الاريا على رقم ١ يحل بمعدل ٤ ٪ ورقم ٢ يحل بمعدل ٣ ٪

١١٣٥- **أرية**
Box, stalle (F). **Box, stall** (E).
 الارية والمرقد والحبس والبكس وشقة الفرس هو الحبل
 تحبس فيه الجياد منفردة بدون رباط .

١١٣٦- **أرينتون * ، أسنان الكلب** *Erythronium*
dens-canis (S). **Erythron**, **Dent de chien** (F).
Dog's tooth (E). **Hundszahnlilie**, **Hundszahn** (D).
Dente di cana, **Mitridacea**, **Ermodattilo falso** (I).
 نبات بصلي من الفصيلة الزنبقية يشبه التوليب . ساقه فردية
 قنية شراخية جوفاء تنهي بزهرة كبيرة ساجدة او منكسة
 سداسية البتلات والاسدية وردية اللون || تزرع لجمال

واغصان الصفصاف فتتغرها وتعطبها .

١١٢٢- **أرون** *Poison violent* (F). **Violent poison** (E).
 الأرون هو السم الصاعق من اي مصدر كان .

١١٢٣- **أروية * ، آرونية** *Aronia* (S).
Aronie (F). **Red chokeberry** (E). **Kanadische fel-**
senbeere (D). **Aronia** (I).

جنس جنيات برية وتزيينية من فصيلة الورديات . انواعه
 قليلة شديدة الشبه بالغيراء . منبها البلاد الامريكية .
 تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها وفروعها زباء اللحاء .
 اوراقها اهليلجية مفصصة . نصلها خلي الصفحة السفلى ،
 مسن الحافة . ثمارها عنبية ، ارجوانية اللون غير مأكولة .

١١٢٣- **أرويا** اطلب قوقحان ذهبي .

١١٢٤- **أروية** (F). **Mouflon**, **Wild sheep** (E).
 جنس حيوانات عاشبة بحجرة لبونة من قسم الضأقيات
 وفصيلة الفتيات . انواعه المعروفة لا تقل عن ١٩ أشهرها
 واعها وارقاها الاروية الاعلية اي الضأن ج . اروي واروي .

١١٢٥- **أروية الاناضول** *Ovis anatolica* (S).
Mouflon anatolien (F).

من اكبر انواع الاروي جثة واغظها قرناً . يبلغ ارتفاعه
 نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبغة العابقة التي تميل الى الجؤوة
 عند ثيغ الظهر || الانثى اصغر حجماً من الذكر وهي
 جماء الرأس بيضاء الظهر من الحاروك الى الاطل || موطنه
 جبال الاناضول وارمينيا والكرديستان والعراق وشرقي ايران .
 يعيش جماعات صغيرة . اجله لا يزيد على الثانية . يألف
 الجبال والادوية المرتفعة .

١١٢٦- **أروية الثلج** *Ovis nivicola* (S).
Mouflon nivicole, **M. des neiges** (F).

موطنه منشوريا وسبيريا . اجله من العشرين وأزود .
 وهو ربع الجثة ، كبير القرن وغليظه ، اربد الثوب ، اسمر
 الظهر ، اشهب البطن والعنق ، صغير الأذن مستديرها
 قصير الذنب ، كبير الاطلاف المفلوجة .

١١٢٧- **أروية الشرق *** *Ovis ammon*, *O. argali* (S).
Mouflon argali, **Argli**, **Archar** (F). **Archar**, **Argaly** (E).

اكبر انواع الاروي واصلها عوداً ووسعها انتشاراً .
 موطنه الشرق من الهند والافغان وإيران وبحر قزوين الى
 سبيريا والصين . يعيش جماعات صغيرة . اجله من ١٢
 الى ٢٠ || كبير الجثة طوله نحو ٢١٥ سم . وارتفاعه
 ١٣٠ ، وزنه نحو ١٥٠ كيلو . له قرنان كبيران وزنها
 لا يقل عن ١٥ كيلو || ثوبه اربد اسفع يزداد سمرة
 مع اقترابه من الرأس . بطنه الى البياض . قوائمه بلون ثوبه
 تنحرف نحو البياض . قوته الاعشاب والحشائش والطحالب .

١١٢٨- **أروية المغرب * ، أروية الأرذان**

Ovis ammatragus (S). **Mouflon à manchettes**,
M. de Barbarie (F). **Barbary wild sheep** (E).
 موطنه شاسع الاطراف يمتد من مراکش حتى النوبة . قريب
 الشبه من الماعز . جثته كبيرة ، طوله ٢٠٠ سم . وارتفاعه
 نحو ١٠٠ ثوبه اربد اسفع . عنقه طويل الصوف المتدلي
 كالاردان . قرنه غليظ اعقف || يعيش جماعات قليلة
 العدد اجلها من ٤ الى ٧ انفار .



أروم




أروم ايطالي



أروية مسكية



أرونة




أروية الشرق



أروية المغرب



أروية كورسكة



إرياس إينسولانا



أريترية



أريترية



أريترية مرجانية



أريترية الشحم



أريترية الغاب



أريترية خاتلة



أريترية



أريغارون

١١٤٥ - أريترية خاتلة* ، دُبَابَة خاتلة

Phaonia erratica (S). Aricle vagabonde (F).
حشرة من الذبابيات طولها من ١١ إلى ١٣ مم. زباناها
حديدية اللون. ملامسها سود. يكثر وجودها من أيار
إلى تشرين الثاني. تسرح في الشمس. مرتعها الاعشاب
وسوق الاشجار البرية والزراعية.

١١٤٦ - أريترية شوكية

Aristotelia (S).
Aristotèle, Aristotélie (F). Wine berry (E).
Aristotelle (D). Aristotelia (I).
جنس جنات وشجيرات برية وزراعية من فصيلة اليزونيات
انواعها قليلة ، اوراقها بسيطة متقابلة. ثمارها عنبية.
اشهرها النوع الشيلي ثماره مأكولة تعتبر من المربطات النافعة.

١١٤٧ - أريترية

Aristée (F). Aristate (E).
شكل خاص من اشكال القرن الاستشعاري تتميز به
الحشرات التابعة الى قصيرات الزباني من ذوات الجناحين.

١١٤٨ - أريترية* ، أريترية

Erysimum (S).
Erysimum, Vêlar, Erysimon (F). Erysimum (E).
جنس نباتات عشبية برية طيبة حولية ومعمرة من فصيلة
الصليبيات. انواعه عديدة. اوراقها مستطيلة ، زغبية
التصل. ازهارها صفراء اللون او ارجوانية. ثمارها خريشبات
رباعية الزوايا ومنها المفلطحة والاسطوانية. يزورها
بيضية الشكل || اشهر انواعه :

Er. scabrum (S). أريترية أحمرش
Er. purpureum (S). أريترية أرجواني
Er. smyrnaeum (S). أريترية أزرق
Er. crassipes (S). أريترية الشحم
Er. verrucosum (S). أريترية ثؤلولي
Er. repandum (S). أريترية جوفي
Er. uncinatifolium (S). أريترية شصني الورق
Er. barbarea (S). أريترية طبي ، حشيشة الحفر

١١٤٩ - أريترية

Plumeux (F). Plumous (E).
نمت تمريري يطلق على بعض الاعضاء النباتية التي شكلها
يشبه الريش.

١١٥٠ - أريغارون* ، شبنم الربيع

Erigeron (S).
Erigeron, Vergeretta (F). Erigeron, Flea-bane (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات
الانبوبيات الزهر. انواعه لا تقل عن ٧٠ معظمها نباتات
عشبية نجمية زغبية. سوقها فرعاء ليفية زنادية تنهي بالازهار.
اوراقها حاضرة متعاقبة مستطيلة لونها الى الخضار الاطحل.
ازهارها فردية تاجية طويلة الزناد عديدة الالوان || اشهر
انواعه الزراعية التزيينية :

Er. glabellus (S). أريغارون أملوط
Erigeron glabrescent (F).
Er. aurantiacus (S). أريغارون برتقالي
Erigeron orangé (F).
Er. speciosus (S). أريغارون بهي
Erigeron gracieux (F).
Er. hybridus (S). أريغارون نفلي

Erigeron hybride (F).
واعرف انواعه البرية الطيبة التي تستعمل في المستحضرات
المضادة للسعال والمدرية للبول : الاريفارون الازرق
والاريفارون الجبلي.

زهرها الذي يبشر بالربيع. ومن الشعوب من يأكل بصلها
بعد سلقه بالماء.

١١٣٧ - أريترية*

Erythrée (F). Erythraea (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الجنطيانيات. انواعه
المعروفة ٢٥ جميعها برية ، منبها المناطق المعتدلة من
القطب الجنوبي. اوراقها لاطئة متقابلة ، نصلها ضيق
الصفحة اللثة البحرية اللون. ازهارها عشكولي التجميع ،
تاجي الارتكاز ازهارها صغيرة القد وردية اللون او بيضاء.
منه انواع طبية دافعة للحميات. اطلب مراره الخشخ.

١١٣٨ - أريترية

Erythrina (S).
Erythrine (F). Erythrina (E).
جنس نباتات من الفصيلة القرنية القراشية. انواعه عديدة
تبلغ ٦٠ منها اعشاب ومنها جنات وشجيرات شائكة مختلفة
القدر يبلغ ارتفاع بعضها خمسة امتار وهي « الاريترينا
الخالدة » || اوراقها ثلاثية معنقة بيضية رحيمة زاهية
الخضار || ازهارها كبيرة الحجم جميلة وعديدة ، عنقودية
منسوبة ومستطيلة ، غالباً قمرية اللون. والازهار في جميع
انواعها يسبق الاوراق بعدة ايام || يزورها كروية حمراء
لامعة تعلوها فكتة سوداء واحدة صغيرة ومستديرة. وبزورها
هذه تستعمل في صناعة القلائد والعقود والسبحات || اعشابها
صلية صفراء اللون سهلة الاستعمال لا يؤثر فيها الزمن ولذلك
لقبها بالخالدة || اشهر انواعها وافخرها واكثرها طلباً
هي الاريترينا المرجانية.

١١٣٩ - أريترية مرجانية*

Erythrina cristagalli (S). Erythrine crête de coq (F).
Cock's-spur, Coral tree (E). Hahnenkammkorallen
baum (D). Eritrina, Albero del corallo (I).
افخر انواع الاريتريية واعمها زراعة. ازهارها مرجانية
جميلة. خشبها اصفر امفر ثمين القيمة || تتكاثر بالبذر
ترغب في التربة الحوارة العميقة النور المتوسطة الاندماج.

١١٤٠ - أريترية ، عُرْف ، رائحة

Arôme (F). Aroma (E).
نفحة الشيء تفوح منه فتدركها حاسة الشم.

١١٤١ - أريترية النوس

Eridan (F).
Eridani, Eridanus (E).
كوكبة نجوم جنوبية الموقع مشهورة باسم النهر ، اطلبها.

١١٤٢ - أريترية

Agricuteur (F).
Agricuteur, Husbandman (E).
الأريس والاريس ج. أريسون وإريسون وأزاريس وأزارسة.
من تعاطى الزراعة.

١١٤٣ - أريترية الشحم* ، دُبَابَة الشحم

Polietes lardaria (S). Aricie du lard (F).
حشرة من الذبابيات طولها من ٩ إلى ١٢ مم. عويناتها
الى الحمرة. سرية الطيران. يكثر وجودها من نيسان
الى تشرين. تسرح في الحقول وقرب الطرقات. تبيت
على الاشجار. لا تدخل البيوت ولا تقرب الشحم ، وقد
دميت غلطاً بدبابة الشحم.

١١٤٤ - أريترية الغاب* ، دُبَابَة الغاب

Mydaea lucorum (S). Aricie des bois (F).
حشرة من الذبابيات. طولها من ٧ إلى ٨ مم. يكثر
وجودها من نيسان الى ايلول. مرتعها الاعشاب والازهار
البرية والحدائقية من اي نوع كانت.

١١٦١- أريغريسة

عشبة شبيهة بالنصي إلا أنها أرق وأضعف وألين وهي ناجمة في المال جداً ولها إذا جفت سقى كلما حرك تطاير فارز في العيون والمناخر (اللسان).

١١٦٢- أريغريسة راجع أرنوس.

١١٦٣- إريغريسة

هي الرفنا نبات عشبي من النجيليات.

١١٦٤- أريغريسة، شهباء، Erino (F). Erinos (E). آفة تسببها بعض أنواع الحاشية عندما تلتصق برقاتها نصل الورقة لامتصاص نسفا فتلف المسام والبشرة وتحدث في النصل تنفطاً وتعمجاً وانتفاخات قلبية تضيق النسيج وتؤدي النبات.

١١٦٥- أريغريسة هو الارنوس، راجعه.

١١٦٦- أريغريسة

فرد امريكي من فصيلة السيوسيات، اطلب براكييل.

١١٦٧- أريغريسة، Erlostémon, Crowéa جنس جنات وشميرات برية وزراعية تربية من فصيلة السدييات، منبتها أستراليا. ازهارها جميلة الشكل زغبية الاسدية وحاملها || تنكاث بالزور والمقل، ترغب في الاماكن المتوسطة الاندماج المعتدلة الرطوبة.

١١٦٨- إزاج، Hangar (F). Outhouse, Cart-shed (E). سقيفة تستعمل دريئة ومراً للمحاصيل والآليات الزراعية.

١١٦٩- آزاد، آزاد هو الزنبق الابيض.

١١٧٠- إزار، درقة

Clypeus, Epistoma (F). هو في الحشرات الغدية الجناح الجزء الامامي من الرأس يتلئ عند البهق ويتهي عند الجاهض.

١١٧١- إزار، Murette de soutien حويط يلزق بالخائط لتقويته ج أزر.

١١٧٢- إزالة اللون، Achromatisme (F). Achromatism (E).

هي ازالة اللون الصورة بواسطة العدسة او الموشور.

١١٧٣- آزاليه

جنس نباتات معمرة من الخلنجيات يعرف بالجلسان.

١١٧٤- أزب

أزيت الابل: لم تجر فهي آزية. وقد يكون السبب اعياء او مرض.

١١٧٥- أزب، Pubescent (F). Pubescent, كل عضو يفشاء زغب دقيق وقصير. Downy (E).

١١٧٦- إزباب، تزيب، Passerillage اسدى عمليات تجفيف العنب ليصير زيباً.

١١٧٧- أزج أزج العشب: طال.

١١٧٨- أزج

ذكر النعام الذي فوق عينيه ريش ابيض، واما الانثى فزجاء.

١١٥١- أريغارون أزرق

Erigeron acris (S). Erigéron âcre, Vergerette âcre (F). Blue fleabane (E). Berufskraut, Echtes beschreikraut (D). Cespita acre, Cespita salvatica (I).

نوع من الاريفارون البري. ينبت في المواقع الرطبة. ازهاره الى الزرقة اليلكية || يقال انه طبي يفيد الصدر والمعدة.

١١٥٢- أريغارون الجبل

Erigeron linifolius (S). Erigéron à feuilles ligneuses, Erigère (F). Flea-bane (E). Beschreikraut, Flohkraut (D). Cespita campestre, Erba della cimici (I).

نوع من الاريفارون البري الجبل ينبت قرب الصخور وفي الاماكن الرطبة. اوراقه مستطيلة ليفية النصل. يقال انه طبي يفيد الرأس والصدر.

١١٥٣- أريغريسة

Columelle (F). Columella (E). دعامة صغيرة وحيدة تقوم كالشاهد في بعض اجناس وانواع الفطور المجهرية.

١١٥٤- أريغل، جفت

Arille (F). Aril, Arillus (E). غشاء ثاقوي لاحق مفروض الاطراف مهدبها ينشب قرب أنقور بعض بذور النباتات.

١١٥٥- أريغل

Gazella saemmeringi (S). Gazelle de Saemmering (F). ظبي متوسط الجثة، منعطف القرن. الاحيد، حنطي الظهر الاسمر الموج، ابيض البطن والعجز، اكحل العين والحد.

١١٥٦- أريغل، طقطق، فشفاش

Statice Armeria (S). Statice (F). Statice (E). Wied-erstoss, Sandhelke, Strandflieder (D). Statice (I). نبات عشبي نجمي عسقولي معمر من الاريليات وفصيلة الرصاصيات، يزرع للتزيين. اوراقه قرصية التجميع جميلة الخضار الفاتح الزاهي. ازهاره صغيرة القد ضية التجميع مختلفة الالوان ترتكز على زناد قرصي الانتشاب. يتكاثر بالزور.

١١٥٧- أريغل أحمر، عرق إنجبار

Statice limonium (S). Statice maritime, Béhen rouge, Saïadelle, Lavande de mer (F). Sea lavender, Wild marsh beet (E). Echter widerstoss (D). Statice mar- timo, Behem, Butola d'acqua (I).

نبات عشبي عسقولي من فصيلة الرصاصيات يزرع للتزيين. اوراقه كبيرة جميلة الخضار. ازهاره الى الحمرة القرمزية.

١١٥٨- أريغلان

Arilane ساحوم لاصق يزيد ميوعة الحواشير وانتشارها وثبتيها على مختلف اجزاء النبات الظاهر || يستعمل بنسبة ١/١٠٠

١١٥٩- أريغريسات

Staticées سبط نباتات عشبية معمرة من فصيلة الرصاصيات. اشهرها الأريل. جميعها عسقولية نجمية. اوراقها حزامية جامدة بيضية مستطيلة لاطئة. ازهارها نوري التجميع يرتكز على زناد ليني دقيق قرصي الانتشاب يعلو الاوراق على قدرها ثلاث مرات. ازهارها صغيرة متعددة الالوان يغلب فيها الازرق.

١١٦٠- أريغريسة الزرقاء، نصارية الزرقاء


Arima marginata (S). خنفساء صغيرة القد من فصيلة النصاريات. طولها نحو ٨ مم. لونها الى السمرة. لها غمدان قصيران احمر الحافة الخارجية. ترتكب مع رقاتها اكثر انواع الشفويات اخصها الزرقاء والحزام.



أريغل



أريل، طقطق



أريغريسات

١١٧٩ - إزدج : إزدج الثبت : اشتدت خصاصه .

١١٨٠ - إزد رخت* ، زلزلخت ، زتنزلخت ،

شجرة مُرّة Melia azadirachta (S).

Azédarach, Margousier, Lilas des Indes (F). Bead tree, Margosa tree, Indian Iliac, Azedarach (E). Zederach, Margoza, Indianischer lilak (D). Azadarac, Perlaro, Lilacco delle Indie (I).

شجرة برية كثيرة الاستعمال الصناعي والزراعي من فصيلة الازدرختيات . جذعها مستقيم الساق . أوراقها مركبة متعاقبة شديدة الخضار اللامع ، تستعمل بعد ازربابها في تخضير الابزار لكنها تؤخر في طعم الحليب ولونه . ازهارها عشكولية ليلكية اللون صغيرة القد . ثمارها نورية مرة الطعم لا تؤكل يستخرج منها مادة فعالة سامة . تقبع قشورها يدفع بعض الحميات ويقتل الحشرات . اخشابها صناعية كثيرة الاستعمال || تشكأثر بالبنور . تعيش في جميع الأتربة لكنها تغطي الاقاليم الباردة .

١١٨١ - إزد رختيات Meliaceae (S).

Méliacées (F). Meliaceae (E).

نباتات فصيلة الازدرخت وهي من ذوات الفلقتين العديدة الفعالات . جميعها أشجار وجنبات ، مهدا البلاد الحارة والاستوائية || سوقها مستقيمة ، قشورها ليفية غزيرة المصارة تجف وتلفظ وتتشق طولاً مع العسر || أوراقها مركبة معقبة متعاقبة . ازهارها محوري فردي أو جماعي الارتكاز ، عنقودي أو سنبل التجميع . ازهارها صغيرة مختلفة الألوان الزاهية . ثمارها عنبية سامة . بزورها صغيرة كروية سمراء اللون || يعرف من أنواعها نحو ٢٥٠ تنتمي الى ٣٦ جنساً تعود الى أربعة اسباط || يستخرج من أكثر أنواعها مواد طبية ذات شأن وتستعمل اخشاب بعضها في مختلف الصناعات الخشبية .

١١٨٢ - إزد واج الاسدية Diandrie (F).

Diandrous (E).

من صفات بعض النباتات التي تزودج فيها الاسدية .

١١٨٣ - إزدواج شكلي Dimorphisme (F).

Dimorphism (E).

الازدواج الشكلي أو اختلاف الهيئة الفصلي أو الشقي ظاهرة جسمورية طبيعية تتميز بها اشكال بعض الحيوانات والنباتات التي تختلف بين الذكور والاناث أو التي تتبدل في مختلف فصول السنة .

١١٨٤ - أزر ، أزرر

أزر وأزرر الثبت الأرض : غطاها . قال الاعشى :

« يضاحك الشمس منها كوكب شرق »

مؤذر بعميم الثبت مكهل

١١٨٥ - إزر Epistern (F). Episternum (E).

هو في معظم الحشرات كل جزء من الاقسام الامامية الطرفية من خوشر الجوشن . ومنهم من سماه أعلى القص وامام القص .

١١٨٦ - إزررب

أزرب البقل اذا بدا فيه اليبس بخضرة وصفرة .

١١٨٧ - إزرباب Maturité des feuilles (F).

Maturity of leaf (E).

بلوغ الورقة كامل ادراكها ودخولها في طور القمامة .

١١٨٨ - أزرَم Chat (F). Cat (E).

الازرم هو السنور المرقط الثوب الصغير القد .

١١٨٩ - أزرَم Brévicaude (F).

Brevicaudate (E).

الازرم من الحيوان القصير الذنب .

١١٩٠ - أزرَب Petit de taille (F). Dwarf (E).

الازرب من الحيوان ما كان صغير قداه فاضحاً وبمبدأ عن متوسط قد نوعه . م زعباء . ج زعب .

١١٩١ - أزرَب Pubescent

نعت لاعضاء النبات التي يكسوها الور الناعم الدقيق .

١١٩٢ - أزرَب الكرم

جرى فيه اللسع وبدأ يورق . أو صار في أبن السروع التي تخرج منها العنايد .

١١٩٣ - أزرغل ، أزرَم ، زق

Abecquer, Abéquer (F). To feed (E).

أزرغل وأزرم وزق الطائر فرخه : اطعمه بمنقاره وأبلعه الاكل قابله .

١١٩٤ - أزلام Membres (F). Members (E).

أزلام البقر والغنم والاعز : قوائمها .

١١٩٥ - إزلقب

إزلقب الطائر : شوك ريشه قبل أن يسود ويتلون .

١١٩٦ - أزلق Glabrescent (F). Glabrous (E).

ما كان من النبات مالمس البشرة ناعماً . م زلقاء .

١١٩٧ - أزمع ، مَسَنَاقِل Hétérogène (F).

Heterogeneous (E).

نعت وصفي للنبات الذي يشد أن وثناً أو شكلاً عن رفاقه من نباتات الضرب الواحد أو الهجين الواحد .

١١٩٨ - أزوم أ Asemum (S).

Asemum (F). Asemum (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . أنواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطائها مناطق الصنوبر || اجسامها صغيرة القد تطول من ١٢ الى ٢٠ مم . اثوابها سوية الألوان العابقة اعتمها الاسود والاطحل والاسمر ، خرمها فضية الحمل الدقيق || تسرح في النهار . تظهر في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها ازهار النباتات الحرجية || يرقأها خاشبة تركب الجلود اليابسة من جميع انواع الصنوبر باستثناء الصنوبر البحري .

١١٩٩ - أزوم مُخَدَّد*


Asemum striatum (S). Asemum strié (F).

Asemum striatum (E).

حشرة غاضلة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . تألف احراج الصنوبر . خنافسها تعيش على ازهار واوراق النباتات البرية . يرقأها خاشبة تعيش على الجلود والاغصان اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٤ الى ٢٠ مم . ثوبها الى السواد الكامد يعلوه خمل اربد . رأسها صغير القد . عينها صغيرتان بارزتان . زبانها غليظيان مقوسان . فكها صغيران ذربان . غمداه



إزدرخت



أزوم مخدَّد

غير ان كثرة تحد من الأثمار وتؤدي الصنف فتبخثه .
اما الأزوت النيتريكي المعروف تجارياً تحت اسم نيرات
الجير ونيرات الشيلي ونيرات الصودا فانه يوافق مزاج
جميع النباتات ويصلح لجميع الأتربة وينوع خاص للأتربة
التي تفتقر الى الكلس ولكنه يشكو من قلة استقراره وشدة
انجذابه الباطني في التربة . لذلك ينصح باستعماله سطحياً
وعلى دفعات متتابة . يذر على التربة قبل الزراعة
وبعدها وفي اثناء الطور الخضري وقبل الازهار وبعده .
ثم الأزوت الأمونيكي المعروف بسلفات الأمونيك فانه
يطي الانحلال والترجة وسبب ذلك ما يتخلل هذه العملية
من تحاويل وانفعالات عامة وموضعية تقرر حاله التربة
الكيمية وظروفها الحكيمة وبيئتها الجرثومية بعد الرطوبة
والحرارة ودرجة الحمضية . وسلفات الأمونيك يصلح مبدئياً
لكافة النباتات ولجميع الأتربة التي لا تفتقر الى الكلس
بنسبة فاضحة والتي مقياسها الحمضي يشير الى ست درجات .
ومن الواجب استعماله باكراً قبل حاجة النبات اليه ليتمكن من
اجتياز شتى التحاويل والاختارات اللازمة لنترجه وتمثيله .
ومن الواجب ايضاً طمره في التربة بعد نثره لئلا تجرفه الأمطار
او تسربه مياه الري في الزراعات المروية || وأخيراً
الأزوت المركب والمعروف تجارياً تحت اسم نيرات
الأمونيك ونيترا مونيكال وسلفونيرات الخ... فهذا الأزوت
يجمع بين صفات النيرات التي تقوم على سرعة الزوبان
وقابلية التمثيل المباشر وبين صفات الأمونيك التي ترتكز
على الانحلال التدريجي وطول مدة الاستقرار النفعي .
وبعد هذا الموجز عن ماهية الأزوت ، ودوره في حياة
النبات ، وأخص مركباته ، لا بد من ذكر بعض الشيء
عن مقدوره العنصري وما ينجم عن سوء استعماله || لقد
اثبت العلم والاختبار ان قوة انطلاق المحرك النباتي أي
طاقة النشوء الاندفاعية يستمدتها النبات ، لجميع أعضائه ،
من الجذور حتى الاوراق والخلايا ، من الأزوت . وان
الأزوت هو العنصر الرئيسي الذي يقرر مصير كل نبات .
غير ان كثرة تنشيط النمو الخضري والارهام وتطوح بالازهار
فتتخلص وقد تمنع تكوينها او تحول دون اكتماله . وقد
تكسب الثمار قشوراً سمكة وبشرة خشنة الخلس ولباً
ناشفاً او قليل العصارة . واما قلته فتفقّد الاغصان والافئان
بعض زهورها وكامل غضاصتها وتسبب شحوب لون الاوراق
بعد اجهادها وادبار نضارتها || لذلك فخير ما جاء
مطابقاً لواقع الحال بعيداً عن التفتير الذي يعقبه الضعف
والسقم وبعيداً عن الافراط الذي ينجم عنه الاسراف
والانحطاط الصنفي .

١٢٠٥ - أزوت أمونيكي Azote ammoniacal (F).

Ammoniacal nitrogen (E).

وسم من قال ازوت نشادري ونوشادري || هو الأزوت
المرتكز على الأمونيك وهو بطي الانفعال يفيد النبات من
أي جنس كان لانه يمدّه تدريجياً بالأزوت اللازم لنموه
وحياته || اصنافه التجارية عديدة ، اعلمها استعمالاً
سلفات الأمونيك (اطلبها) .

١٢٠٦ أزوت عضوي Azote organique (F).

Organic nitrogen (E).

هو الازوت غير المعدني كالذي في الروث والبول واللحم
والكسب الى آخره .

١٢٠٧ - أزوت مُطلق Azote libre (F).

Nitrogen free (E)

معتدلاً الصلابة ، متتابعاً التحزير القاطب . ارساغها
خماسية التكوين ، رباعية العقل الظاهرة || الانثى اكبر
قدماً من الذكر واضخم بطناً منه واقصر زبناً || جيلها
ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى
حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل ||
البرقة مرقالة ، بطيئة النمو ، تدرك الكمال الجسموري بعد
النقف بنحو ٣٢ شهراً فيصبح طولها نحو ٤٠ مم . جسمها
مستغلق المقدم مستدق المؤخر . ثوبها الى الصفار التبي .
وأسمها اسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٤٠ يوماً
ويتنضي ضمن صلجة مركبة من فئات المواد النباتية
المجمونة بالريال .

١٢٠٠ - أزتم أزتم البقل : صار صالحاً للاستعمال .

١٢٠١ - إزهار ، تنوير . Fleuraison, Floraison (F).
Efflorescence, Flowering season (E).

هو تفتح الزهر او الالوان الذي يزهر فيه النبات وينوع
خاص الالوان الذي يتفتح فيه المنبر لخروج طلع التفطيط .

١٢٠٢ - أزهر Taureau sauvage (F). Savage bull (E).

هو الثور الوحشي ذكر الابقار الوحشية .

١٢٠٣ - إزهرار Inflorescence

هو نظام وشكل تجتمع وارتكاز الازهار على النبات .
اوفره السنبل والمتفودي والعشكولي والنوري والصيواني
التجميع ثم الهامي والتاجي والابطي الارتكاز .

١٢٠٤ - أزوت ، نيتروجين Azote, Nitrogène (F).

Azote, Nitrogen (E).

جسم بسيط غازي (اطلب ازوت مطلق) وهو من العناصر
الاساسية التي ترافق النبات في جميع اطواره من الانتاش
والنمو الخضري حتى الاثمار واكتمال الدورة الحياتية .
وهو الذي يدخل في تركيب الخضيب ، مختبر الغذاء
الطبيعي ، وفي تركيب النسيج ومختلف المواد الحيوية
والزلاية التي لا نشوء بدونها ولا اقبال || كانت مشكلة
الأزوت لعدة سنوات خلّت تعتبر من اعظم المشاكل
الاقتصادية البشرية . حتى توصل العلم الى فك حصار
الانتاج المحدود المغنن فزال شبح قحط الأزوت وتقلص
معه خطر جود وتقهقر الاقتصاد البشري || يعتبر الأزوت
او النيتروجين من أهم العناصر الطبيعية الحياتية وهو موجود
في الهواء الذي يغمر الكرة الارضية ويوجد في اللحم والدم
والحليب ويدخل في تركيب جميع الحماضات الحيوانية
والخلايا النباتية لذلك فانه من الزم ضروريات الكائنات
الحية مهما كانت الشعبة التي تنتمي اليها والصف الذي
يميزها || ورغم كثرة وجوده في المحيط الجوي وبلوغ
حجمه اربعة أخماس حجم الهواء . فالنبات لا يستطيع
اليه وصولاً ولا يستفيد منه الا جزئياً ذلك لان النباتات
الموهوبة التي منحها الطبيعة خاصية امتصاصه المباشر وقدرة
خزنها هي نباتات الفصيلة القرنية وبعض الطحالب والاشنة
دون سواها || اما الأزوت الذي يستفيد منه النبات فهو
الذي يمكن النبات منه ويصله عن طريق المركبات القابلة
للتشيل . والمركبات الأزوتية اربعة وهي العضوية والنيترية
والامونيكية والنيترية - الامونيكية || فالأزوت العضوي
يوجد في سلح الطير وروث الخيل والدواب ونخي البقر
والجاموس ووبر الضأن والماعز . وفي الدم المخفف ونفايات
الجلود وقامة المدن وجلود النباتات القرنية الخ... استعماله
شائع عام . منافعه عديدة جليها في صالح التربة والنبات

غاز شفاف عديم اللون والطعم والرائحة . يكون أربعة
الخماس حجم الهواء || رمزه (N)، وزنه الاتومي ١٤.٠٠٨
رقه ٧ وهو ثنائي التكافؤ أي أن ذرته تتألف من اثنين .

١٢٠٨ - أزوت نيتريكي

Azote nitrique (F).
Nitric nitrogen (E).

هو الازوت الصناعي المعدني الذي يرتكز على النيترات
السريع الانفعال والتحويل || اسماءه واصنافه التجارية
عديدة . أهمها نيترات الشيلي ونيترات البوتاس ونيترات
الجير ونيترات الصودا ، اطلبها .

١٢٠٩ - أزوتوبكتيري

Azotobacter

اطلب بكتيرييه الازوت .

١٢١٠ - أذور

Diagonale (F). Diagonal (E).

هو الخط الجاري من زاوية الى اخرى مقابلة لها . ويعدى
خط الزاوية .

١٢١١ - أذوم

هو التساح الهندي .

١٢١٢ - أزيب

Vent du Sud-Est (F).

South-easterly wind (E).

هي الريح الجنوبية الشرقية . ريح مهبها بين الجنوب والشرق
وجهتها بين الغرب والشمال .

١٢١٣ - أزيب البحر

راجع ابو محيط .

١٢١٤ - أزيدا

Asida

خنفساء صغيرة القند من فصيلة النبشيات طولها من ١١
الى ١٤ مم . لونها الى الصهبة الكدراء يعلوها موج احمر .
تكثر في الاربة الرملية وبين الحجارة ، تركب الكرمة
ولا تؤذيها لان اضرارها النافعة لا تتعدى قضم اطراف
بعض الاوراق .

١٢١٥ - أزيدة راملة

Asida sabulosa (S).

Aside des sables, Asida sablonneux (F).

Asida sabulosa (E).

حشرة خاضعة دامتة من فصيلة النبشيات ورتبة غديات
الاجنحة . موطنها يشمل معظم اقاليم الكرمة من الشرق
الايوسط واروبة . تألف الاراضي القليلة الاندماج . خنافسها
تعيش على اوراق النباتات البرية ولا تعف عن خلب
الكرمة . يرقاتها دامتة تعيش على المواد النباتية والعضوية
المتحللة || جسمها متوسط القند يطول من ١١ الى ١٤ مم .
ثوبها الى الصهبة الكدراء يعلوها موج جوري في الرأس
والكوسل وموج حنطي في الظهران . رأسها صغير الحجم
يبدو كأنه مفروس في قوس الكوسل . زباناها خيطيان
مستطيلان . عيناها صغيرتان بارزتان . ظهراتها قليل
الاحدياد ، رباعي التحزيز الغمدي . ارساغها الامامية
والوسطى خفاسة العقل اما الخلفية فرباعيتها . الانثى اكبر
قداً من الذكر واهبت ثوباً منه واقصر زياناً || لها جبل
واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالانة في نيسان وتبقى
حتى اواخر كانون الاول . تسرح من العصر الى فحمة
الليل || واليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو
٢٠ مم . جسمها مبطل الشكل ، سداسي الارباع ،
مستغلظ الرأس ، ضليع التأشير ، اغبر اللون ، اطحل
المواج ، يسر في الرأس والسرك .

١٢١٦ - أزيمنشة

Asimina (S).
Asiminier (F). Papaw (E). Pappawbaum (D).
Porcellia (I).

جنس نباتات معمرة من فصيلة القشديات . انواعه عديدة
جميعها اشجار وشجيرات وجنبات مهدا الاقاليم المعتدلة
الامريكية . اشهرها الازيمية المفصصة (*) (A. Triloba)
التي يستخرج من عصير ثمارها بعد الاختار شراب لذيد
الطعم والنكهة قليل المادة الكحولية . ثمارها عينية مستطيلة
طولها من ٥ الى ٨ سم . تصفر مع الادراك وتفرح منها
رائحة مستحبة . والثمرة تحوى من ٤ الى ٧ بذور غليظة .

١٢١٧ - آس ، حبلاس ، حبلاس ، ريحان

Myrtus (S). Myrte (F). Myrtle (E). Echte myrte (D).
Mirto, Martellina, Mirtella (I).

جنس نبات من فصيلة الآسيات . انواعه كثيرة تقرب
من الستين جميعها شجيرات وجنبات متقابلة الاوراق المنعقة
الريحية المدببة || ازهارها بيضاء اللون او لرجوانية زاهية ،
خفاسة البتلات المنفرجة ، عديدة الاسدية ، احادية الميسم .
ثمارها شبه نووية بنفسجية او حمراء اللون والابيض
فيها قليل || جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة
الحارة . تعيش وتنمو في معظم الاربة . تتكاثر بالبذر
والتعقيل والترقيد || اوراقه وثماره عاقصة قابضة تستعمل
في ضعف المعدة وتفيد الاسهال . الفسيل بتقيعه يقوي
الاعضاء المسترخية وينشط الباه || يستخرج من ازهاره
واوراقه بالتقطير عطر يدعى ميرتول (Myrtol)
زيتي التركيب قوي العرف الفواح || ومن فوائد الآس
ان ورقه يطيب رائحة البدن ويقال انه يقوي اصل الشعر
ويطيله ويسوده ويمنع تساقطه . ورماد الآس ينقي الكلف
ويجملو البق وينفع من غضة الريلاء || اشهر انواعه يتبع .

١٢١٨ - آس جوي ، حبلاس ، حبلاس ،

ميرسين ، هندس ، حلموش

Myrtus communis (S). Myrte commun (F).

نوع من الآس ينبت برياً في بعض المناطق اللبنانية السورية
يزرع لثماره المأكولة رغم عفوصتها وكثرة بزرها .
يتكاثر بالتعقيل والتدريج . يعيش في جميع الاربة .
اجوده ما غرس في تربة مروية معتدلة الاندماج || اما
ثمرة فيدعى حب الآس وحبلاس ويطلس وشلمون وتكمام .

١٢١٩ - آس قطني ، أنجم

Myrtus tomentosa (S).

Myrte cotonneux (F).

جنبية صغيرة جميلة الشكل والهندام تستعمل في التزيين .

ثمارها الى الحمرة البنفسجية .

١٢٢٠ - آس لومة ، مرء

Myrtus luma (S).

Myrte luma (F).

جنبية كبيرة القند فرعاء . اوراقها زباء . ثمارها شديدة

الحمرة والمفوصة تستعمل في الصناعات الخمرية .

١٢٢١ - آس محدب الورق ، قمام

Myrtus bullata (S). Myrte builleux (F).

جنبية فتاء متوسطة الحجم . ثمارها حمر ، اجاصية الشكل مأكولة .

١٢٢٢ - آس مسكي ، ريحان ، عمار

Myrtus ugni (S). Myrte musqué (F).

جنبية برية صغيرة كثيرة الفرائيق . ثمارها صغيرة باذنجانية
اللون شديدة العفوصة . تستعمل في الصناعات الخمرية



أزيدا



أزيدة راملة



أزيمنشة



أزيمنشة مفصصة



آس جوي



آس مسكي

نسيجي لا متجانس وأما نقص في بعض العناصر المعدنية .

١٢٣٢- إسبكال ، سنبلية Epiage, Epilaison (F).
هو تكون السبل في النبات اخصه الزرع . Earing (E).

١٢٣٣- إسبانخ* ، سبانخ ، إسفانخ ،
إسفانخ ، رحي Spinacia oleracea (S).

Epinard (F). Spinage, Garden spinach (E). Echter spinat, Garten spinat (D). Spinace, Spinacci (I).
بقلة من فصيلة السرمقيات . مهدا المقدر بلاد العجم .
منها البري الشائك الذي قل استعماله الآن ، ومنها
البستاني العديم الشوك الواسع الانتشار الزراعي والمأكول
من أكثر شعوب العالم || يعيش أينما زرع ولكنه يفضل
الآتربة الحوارة الغنية بالمواد الأزوتية التي تنشط الورق .
يتكاثر بالبذر ، زراعته تستوجب بعض العناية وانحصها
العزق والري || والاسبانخ يحوي بعض الحديد الذي
يفيد الاجسام السلية ويحوي أيضاً سلات البوتاس التي
ترسب في الكلى وتضر المصابين بالحصى || وكما أنه
يتزعم البقول الشتوية من حيث وفرة الحديد فانه يتزعمها أيضاً
بما يحويه من فيتامين « آ » وفيتامين « ث » وفيتامين « ك »
وهو الفيتامين الذي يساعد على تجلط الدم تجلطاً طبيعياً .

١٢٣٤- إسبانخ أبيض اطلب بازيله بيضاء .

١٢٣٥- إسبانخ بري*

Chenopodium Bonus Henricus (S). Epinard sauvage, Bon-Henri (F). Allgood, English mercury, Good king Henry, Wild spinach (E). Allgut, Heinrichsgansse fuss (D). Chenopodio untuoso, Bono Enrico, Mercorello lunga, Spinacio salvatico (I).
نوع من رجل الأوز وهو نبات عشبي بري وزراعي من
فصيلة السرمقيات يزرع لأوراقه المأكولة المستعملة استعمال
السبانخ || يتكاثر بالبذر ويعود في جميع الآتربة الغنية
بعنصر الأزوت .

١٢٣٦- إسبانخ زيلندة اطلب ترغون .

١٢٣٧- أسبد

أسبد النبات اذا نبت منه شيء حديث فيما قدم منه .

١٢٣٨- أسبراجين Asparagine (F). Asparagin (E).
هو الهليونين شبه قلوي الهليون .

١٢٣٩- أسبرولة هي الجويسة : اطلبها .

١٢٤٠- أسبوب Générateur (F). Generator (E).
هو ميكانيكياً كل آلة تحول طاقة الفاعلية الى قوة كهربائية .
وهو رياضياً الخط الذي تولد حركته سطحاً مستويًا .

١٢٤١- أسبور* Sparus (S).
Spare (F). Sparid fishes (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات . انواعه عديدة
جميعها مأكولة تكثر في البحر المتوسط || أشهرها الحفارة
والسرب والتجاج والكندارة .

١٢٤٢- أسبوريات Sparidae (S).
Sparidés (F). Sparidae (E).
فصيلة اسماك من رتبة شائكات الزعانف تشمل الفريدي
والجريدي والسرغوس والسرب ونحوها .

والروحية ، اما غرائيقها فتستعمل في تزيين القبور في
الاعباد الاسلامية .

١٢٢٣- أس* Exposant (F). Exponent (E).
عدد يدل على مقدار الازدياد المطلوب .

١٢٢٤- أس ، أسس Fondations (F). Foundation (E).
أس الدار واسسها : حدودها وقواعدها . وأس الدار
واسسها : بني حدودها ورفع من قواعدها .

١٢٢٥- إساءة الاستعمال ، إستباحة ، تعسف
Abus (F). Abuse, Grievance (E).

تعريف شامل يطلق للدلالة على حالات مختلفة منها :
استباحة الحق
استغلال القاصر
تجاوز السلطة
تجاوز حد الانتفاع
خيانة الامانة
خيانة التوقيع على بياض
Abus de droit
Abus d'un mineur
Abus d'autorité
Abus de jouissance
Abus de confiance
Abus du blanc seing

١٢٢٦- أسارون* ، ناردن بري

Asarum europaeum (S). Asaret, Nard sauvage, Cabaret (F). Asarabacca, Cabaret, Wild nard (E). Gemeine haselwurz, Wilde narde (D). Asaro, Orchio d'uomo, Nardo salvatico, Baccaro (I).

عشبة طيبة معمرة من فصيلة الزرافديات . سوقها مدادة
جارية حشوية عند نهايتها . أوراقها كلوية طويلة الزناد .
أزهارها صغيرة عديدة الاسدية وحيدة الميسم رباعية البتلات
اللحمية القوية المنتصبة المدبة القمة . جذورها فواحة
الرائحة الغلغلية . طعمها حامز مر . تستعمل في بعض
المستحضرات الطبية ويستخرج منها لون اخضر تفاحي
يستعمل في الدروس المجهرية || اما بذورها فقيئة تستعمل
حتى يومنا في روسيا وفي بعض البلاد الشرقية لحالات السكر
الشديد . ولهذا السبب تسمى بالفرنسية الحمار (cabaret)
والاسارون يعتبر من المنهات الجنسية الشديدة الوقع
ولكنه ملهه ومؤذ للأمنجة . ويستعمل في الطب البيطري
لمرض السراجة عند الخيل .


١٢٢٧- أساس ، قاعدة ، عماد Base
جسم كئوي كالصودا أو الكلس ... مركب من امتزاج
معدن بالاكسجين . تعريفه الكئوي اصل يتحد مع
حامض ليكون ملحاً .

١٢٢٨- أساس اللستب Base d'un logarithme (F).
Radix of logarithm (E).

١٢٢٩- أسافة Sol peu profond
الإسافة هي الارض الرقيقة يهيج فيها بسرعة .

١٢٣٠- أسب أسب الكبش : كثر صوفه فهو كبش مؤسب . والاسب
شعر الركب . ج أسوب (الجوهري) .

١٢٣١- أسباب المرض Causes de la maladie (F).
Illness motives (E).
يتحلل النبات كالحويان وكل مخلوق حي بمناعة ذاتية
تختلف قوتها باختلاف النبات ومؤهلاته ومدى استعداده
وهذا ما يدعى درجة المناعة || فالنبات القوي يقاوم
المؤثرات الخارجية ويدفعها اما الضعيف فيتأثر بها وتصرعه .
والضعف مصدره اما بنية ركيكة واما تركيب خلوي او



أسارون




إسبانخ



إسبانخ بري



أسبور



أسبيديسترا

١٢٥٩ - إسْتَحْطَاب ، إقْطَاع . Exploitableté (F).
إمكان قطع الأشجار أو تحطيمها . Work-ability (E).

١٢٦٠ - إسْتَحْقَاق . Echéance (F). Falling due (E).
الاستحقاق أو حلول الاجل هو التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ .

١٢٦١ - إسْتَحْدَام . Emploi (F). Employ (E).
يراد بها عادة الاشتغال تحت إمرة رئيس سواء أكان العامل أجيراً أم مستخدماً أم موظفاً .

١٢٦٢ - إسْتَحْلَاص . Dédouaner (F). To clear (E).
استخراج البضاعة من الجمرک بعد تميم الاجراءات المطلوبة ودفع الرسوم .

١٢٦٣ - إسْتَدْرَ .

يقال للمعزى اذا ارادت الفحل : قد استدرت .

١٢٦٤ - إسْتِدْرَاك ، رُجُوع . Rétraction (F).
Retraction (E).
رجوع المرء عن عمل قام به بمحض ارادته تفادياً من اثاره القانونية .

١٢٦٥ - إسْتِرْدَاد ، تَحْب . Retrait (F).
Right of pre-emption (E).
عمل يصرح به القانون ، في بعض الاحوال ، للمسترد ان يحل محل المسترد منه . وهو من كان قد اكتسب ملكية مال او اموال . فيأخذ لنفسه ملكية هذا المال ويتحمل اعباءه ويكون عليه ان يدفع للمستهلك الثمن والمصاريف .

١٢٦٦ - إسْتِرْدِيَّة ، أسْتِرْدِيَا . هو المحار ، اطلبه .

١٢٦٧ - إسْتِرْنَّة ، قُوْبَّة زَرْقِيْن . Sternite
هي مفصل من مفاصل بطن الحشرة الذي يتركب من عدة استرنات او قوب او زرفينات .

١٢٦٨ - أسْتِرْومَة . Asteroma
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفييات . انواعه المؤذية قليلة تتطفل على الاوراق فتوشها ببقع سماء او جزوية اللون تبدو صغيرة ثم تنتشر فيبلغ قطرها نحو ١٠ مم . يركب اوراق الزيزفون والموز والآنناس .



ورقة زيزفون تركبها الاسترومة

١٢٦٩ - إسْتِرِيْكْنِيْن ، سْتِرِيْكْنِيْن . Strychnine (F).
Strychnin, Strychnina (E).
مادة شبه قلوية سامة جداً وطبية تستخرج من بعض انواع الستريكنوز اخصها جوز القى وقول اينياس .

١٢٧٠ - إسْتِسْبَار . Doxométrie (F).
Doxometry (E).
الاستسبار نوع من الاستفتاء الشعبي تقوم به بعض الاجهزة للوقوف على ردود فعل الرأي العام في قضية معينة .

١٢٧١ - إسْتِسْقَاء ، حَبَن . Hydropisie,
Hydramnios (F). Dropsy (E).
تجمع مصل في بعض انسجة او تجاويف الجسم عند الحيوان || يصيب بنوع خاص اناث الحيل والحمير . عوارضه : ضيق وطف في التنفس ، عدم الاتبال على العلف ، عدم الاجترار ، امساك شديد ، ثم ضعف وهزال .

١٢٧٢ - إسْتِسْقَاء الدماغ . Hydrocéphalie (F).
Hydrocephalus (E).
مرض يصيب الحيل في بعض اغشية الدماغ .

١٢٤٣ - إسْفِيدَاج ، إسْفِيدَاج . Céruse,
Céruite (F). Ceruse, Cerusite, Lead carbonate (E).
هو كربونات الرصاص الطبيعي . ثقله النوعي ٦,٥ وصلابته ٣,٥ . مظهره الخارجي بلورات ابرية الشكل متراصة التجميع لونها الى البياض وقد يكون لامعاً شفافاً .

١٢٤٤ - إسْفِيدَار . هو الصمصاف الابيض .

١٢٤٥ - أسْفِيدِيسترا* . Aspidistra (S).
هي الدريقة نبات تزييني ينمو في المراكن .

١٢٤٦ - إسْت ، سُرم ، شَرْج . Anus
طرف المعي المستقيم وهو مخرج البعر والثفل .

١٢٤٧ - إسْتَأْجَر ، إسْتَكْرَى ، أَكْرَى . Arreuter (F). To rent, To let out (E).

١٢٤٨ - إسْتِبَاحَة الحق . Abus de droit
هو الإساءة في استعمال الحق وقد يكون تصرفاً قانونياً او عملاً مادياً يلحق الضرر بالغير فيتوجب على المتصرف ازالة الضرر بالتعويض عنه .

١٢٤٩ - إسْتِبْكَار . Sondage (F). Sounding (E).
تحري عمق الطبقات الارضية .

١٢٥٠ - إسْتِيْقَاقِي . Préoral (F).
نعت تعريفي يطلق في الزوولوجية ، علم الحيوان ، على شكل زائدة تتقدم الفم عند الحيوان .

١٢٥١ - إسْتِبْدَال . Conversion
هو ان يزيل الدائن ديناً قديماً ويستبدل به ديناً آخر يقوم على شروط تختلف عن شروط الدين الاول .

١٢٥٢ - إسْتِبْدَال السْتَد . Conversion de titre (F).
هو ان يحول حامل السند شكله . مثال ذلك ان يكون لحامله فيجعله اسماً او اسماً فيجعله لحامله .

١٢٥٣ - أسْتِبُون اطلب موزده .

١٢٥٤ - إسْتِثْهَار ، إسْتِغْلَال . Exploitation (F).
Working, Improving, Cultivation, Using (E).
هو استخراج منافع الارزاق على انواعها وقد يكون ذلك بالزراعة والصناعة والتجارة الى آخره .

١٢٥٥ - إسْتِجْلَاء البَيْض . Mirage des œufs (F).
Try eggs (E).
هو تمييز البيض المكوش بواسطة آلة خاصة تدعى مستجلي . ومن المستحسن اجراء هذه العملية على مرتين الاولى قبل الترخيم وذلك لنفي البيوض غير المكوشة . والثانية بعد الحفن بثلاثة ايام للتاكيد من وجود الكيشة .

١٢٥٦ - إسْتِجْلِي . Mirer (F). To try (E).
هو فحص البيض او استشفافه على الضوء .

١٢٥٧ - إسْتِحَالَة . Convertibilité (F).
Convertibility (E).
صفة ما هو قابل التحويل .

١٢٥٨ - إسْتِحْرَام . Rut
زمن اشتها الفحل عند ذوات الظلف . يقال استحرمت البقرة عندما تسعى الى الثور .

المعلومات التي تعتبر دعامة المعارف البشرية ان في الحقول التقنية المختلفة الاهداف او الاجتماعية . وهذه المعلومات ، علمية كانت ام غير علمية ، يقوم بها جهاز آلي خاص يستوعب كل ما يتلقه للاستفادة .

١٢٨٨ - **إِسْتِسْقَاتَاب** (F).
Polarimétrie (F).
Polarimetry (E). قياس زوغان أو تقطيب الضوء .

١٢٨٩ - **إِسْتِسْقَطْر ، قَطْر** (F). To distil (E).
استخراج المادة تبخيراً على النار .

١٢٩٠ - **إِسْتِسْكَفَاء** (F).
Autarcie (F).
Autarchy (E). حالة الشعب الذي ينعم بالاستقلال الاقتصادي .

١٢٩١ - **إِسْتِسْكَتَان** (F).
Diapause (F).
Diapause (E). هو وقوف كل نشاط أو نمو أو تحوير عند الحشرة في أي مرحلة كانت من مراحل تطویرها الأربع ان جملاء أو عذراء أو يرقة أو مكنة .

١٢٩٢ - **إِسْتِسْكَاب** (F).
Superfétation (F).
Superfétation, Superfaetation (E).
إستلعبت النحلة اذا اطلعت طلعاً وفيها بقية من حملها الاول .
والاستلعب يحصل في بعض الحيوان كالارنب مثلاً اذا تلد الانثى على دفعتين بين الاولى والثانية نحو الاسبوع وأكثر وهي المدة الفاصلة بين كونهما الاول والثاني . وهو ما يدعى « حل على حل » أي اخصاب بويضة بعدد اخصاب اخرى من طمست سابق .

١٢٩٣ - **إِسْتِسْمَتَاع** (F).
Hédonisme (F).
Hedonism (E).
مذهب فلسفي يقول ان اللذة هدف الحياة . اللذة بجميع مفاهيمها ومنها المصلحة .

١٢٩٤ - **إِسْتِسْمَرَاء** (F).
Nutritionnel (F).
Nutritional (E). اطلب اغتذاء .

١٢٩٥ - **إِسْتِسْمَرَائِي** (F).
Nutritionnel (F).
Nutritional (E). راجع اغتذائي .

١٢٩٦ - **إِسْتِسْمَصَال** (F).
Sérothérapie (F).
Serothérapie (E).
المعالجة بالمصل . اتقاء مرض خبيث أو مداواته بالمناعة ويتم ذلك بحقن الحيوان بالمصل المقصود الحاوي على مقدار معين من جراثيم المرض المتوقع .

١٢٩٧ - **إِسْتِسْمَلَاك** (F).
Expropriation (F).
الاستملاك أي نزع الملكية هو سلب المالك ملكه قانونياً للنفع العام على ان يدفع ثمنه المقدم اليه .

١٢٩٨ - **إِسْتِسْمَنَاء** (F).
Insemination (F).
Artificial Impregnation (E).
نكاح اصطناعي عم استعماله في الابقار ، يقوم على نقل ذنين الثور أو بعض الذنين المحفوظ الى رحم البقرة المستحرة

١٢٩٩ - **أَسْتَنْ**

ربما كان اليبروج . قال أبو حنيفة : « الاستن شجر

١٢٧٣ - **إِسْتِسْقَاءُ الصَّفْنِ** (F).
Sarcocèle (F).
Sarcocele (E).
علة تصيب الخيل والحمر سببها ورم في الخصية يكون رخواً ثم يتصلب فيؤلم الحيوان ويؤذيته .

١٢٧٤ - **إِسْتِسْقَاءُ المَفَصَل** (F).
Hydarthrose (F).
Hydarthrosis (E).
علة تحصل من تجمع سائل مصلّي في أحد المفاصل فتسبب العرج . تكثر في الخيل التي يجهدا التعب .

١٢٧٥ - **إِسْتِسْقَاءُ عام** (F). Anasarque (F).
Anasarca (E).
مرض عضال يصيب الخيل والبقر والغنم في نسجهما المجروية || عوارضه : سيلان اغبر اخر يعقبه ورم في الرأس وفي جميع الاعضاء الامامية .

١٢٧٦ - **إِسْتِسْشَال** (F).
Anglaiser (F).
To dock (a horse's) tail (E).
الاستشالة هي ازالة بعض عضل الذنب الخافضة لتظل الذنب شائلة . وقد تستعمل هذه العملية في الخيل .

١٢٧٧ - **إِسْتِسْشَرَاد** (F).
Transmutabilité (F).
Transmutability (E).
الاستشراء خاصة ما هو قابل الشروء أي التحول .

١٢٧٨ - **إِسْتِسْشَفَاف** (F).
Chandelage (F).
هو استجلاء أو نقد البيض بالفضوء الصناعي كالشمعة والتنديل والكهرباء استيضاحاً لكوشه .

١٢٧٩ - **إِسْتِسْشَرَاد** (F). Cryoscopy (F).
Cryoscopy (E).
معرفة درجة جمد المائعات المشتتة على مواد مذابة أو معلقة فيها .

١٢٨٠ - **إِسْتِسْجَعَالِيَّة** (F). Activisme (F).
Activism (E).
الاستعجالية نظرية فلسفية تربط الفكرة بالعمل الفعلي .

١٢٨١ - **إِسْتِسْجَاد** (F).
Aptitude, Disposition (F).
Natural disposition (E).
هي القابلية والاهلية الذاتية التي تمكن الاستيعاب المعنوي والمساوي .

١٢٨٢ - **إِسْتِسْجَرَق ، إِعْشَرَق ، شَرَش** (F).
Enraciner (F). To take root (E).
هو بروز وامتداد جذور النبات في التربة . فيقال نصوب مشرقة وممرقة .


١٢٨٣ - **إِسْتِسْغَلَال** (F).
Enraciner (F). To take root (E).
راجع استنار .

١٢٨٤ - **إِسْتِسْغَلَال الخرج** (F).
Aménagement d'une forêt (F). Management of a forest (E).
هو فن تنظيم الاستغلال من قطع وخلافه للحصول على مقدار من الخشب في كل سنة أو سنتين أو أكثر على الشكل الاجدى والافضل .

١٢٨٥ - **إِسْتِسْغَلَال مُبَاشَر** (F).
Faire-valoir direct (F).
هو أن يستغل صاحب الأرض أرضه بنفسه أو لحسابه .

١٢٨٦ - **إِسْتِسْغَاغ ، إِسْتِسْغَاد** (F).
Épuisement (F).
Exhaustion (E).
إستسغائية

١٢٨٧ - **إِسْتِسْغَائِيَّة** (F).
Informatique (F).
Informatic (E).
الاستقصائية أو المعلوماتية علم حديث محوره اجلاء



سا يظهره إستشفاف البيض

١٣١٤ - **إِسْتَنْصَال ، جَثَّ**
Dessouchage,
Dessouchement, Essouchage (F). Grubbing up (E).
قلع أرومة الشجرة من الأرض بعد قطعها .

١٣١٥ - **إِسْتَنْصَال ، بَثَر**
Ablation (F).
Ablatio. Ablation (E).
هو قطع جزء من عضو أو انتزاع عضو بكامله . فَبَثَر
الذنب هو قطع جزء منه واستئصال الخصى هو انتزاعها .

١٣١٦ - **إِسْتِي ، سُرمي ، شَرْجي**
Anal
نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة بطرف المعى المستقيم .

١٣١٧ - **أَسْتِيرُول**
Esterol
حاشور زراعي يرتكز على مادة الباراسيون يستعمل سائلاً
محولاً بالماء بمعدل ٢,٥ ٪ في مكافحة جميع أنواع القراد
والحلم ومنها الترانيك والاكاروس .

١٣١٨ - **إِسْتِيْعَاب السَّيْفِيَّة**
Jauge (F). Gauge (E).
هو مقدار ما تستطيع خزنة ونقله من بضاعة وخلافها .

١٣١٩ - **أَسْتِيكْس**
Astix
حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الرصاص يستعمل
سائلاً محلولاً بمعدل ٧,٥ ٪ في مكافحة دودة الثمار
وغيرها من الديدان والحشرات .

١٣٢٠ - **أَسْتِيكْس نحاسي**
Astix cuprique A.F.
فاطور زراعي يرتكز على مادتي النحاس والزنك . يستعمل
سائلاً محلولاً بمعدل ١,٥ ٪ في مكافحة التسنة .

١٣٢١ - **إِسْتِيْلَاء ، إِشْغَال ، وَضْع البِد**
Occupation
مقدمة لتصرف بالمقار أو لتملكه .

١٣٢٢ - **أَسْتِيلِب *٥**
Astilbe (S).
Astilbe, Hoteia (F). Astilbe, False goat's beard (E).
Prachtspiere (D). Astilbe (I).
جنس نباتات معمرة من فصيلة القلييات . مهدبا الصين
واليابان . أنواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي
تزييني جميل الأزهار الملونة الزاهية .

١٣٢٣ - **إِسْخَار**
قال أبو حنيفة : « نبات يشبه الفجل غير أن لا فجلة
له وهو خشن يرتفع في وسطه قصبة في رأسها كعبرة فيها
حب له دهن يؤكل ويتداوى به رفي ورقه حروقة » .
وقال الأزهرى : « الاسحارة بقلة حارة تنبت على ساق لها
ورق صغار ولها حبة سوداء كأنها الشهيذة » || ونحن
نرجح أنه السحار ، اطلبه .

١٣٢٤ - **أَسْخُفَان**
نبت له قرون كاللوبياء لا يؤكل ولا يعى يتداوى به
(عن أبي حنيفة) .

١٣٢٥ - **إِسْجَل**
شجر يستاك به . « اتخذ مساويك إسجل » (اللسان) .

١٣٢٦ - **أَسْجُمَان**
قال ابن سيده : « الاسمان ضرب من الشجر » (اللسان) .

١٣٢٧ - **أَسْد**
Felis leo (S). Lion
حيوان مفترس من فصيلة السنوريات . يلتب بملك الحيوان

يفشو في منابته ويكثر ، فاذا نظر الناظر اليه من بعد
شبهه بشخص الناس » (اللسان) .
وقال النابغة :

« تحيد عن استن سود أسافله
مثل الإماء الفوادي تحمل الحزما »

١٣٠٠ - **أُسْتَنْة**
الأستنة ج . استنان : اصول الشجر البالية .

١٣٠١ - **إِسْتَنْجَاء** اطلب انجاء .

١٣٠٢ - **إِسْتَنْزَال**
Délibation (F). Delibation (E).
تعبير يدل على حسم أو اقتطاع جزء من المجموع كحسم
الموصى به من أصل التركة .

١٣٠٣ - **إِسْتَنْفَاد الحق**
Abusus
هو تصرف مادي أو معنوي يستنفد المالك به حقه على
العين فيبيعها أو يتلفها .

١٣٠٤ - **إِسْتِهْلَاك**
Amortissement (F).
Redemption, Buying up (E).

الاستهلاك شرعاً هو دفع الدين اقتساطاً موفقة حتى يتم
وفاءه . وهو أيضاً ما يلحق بالموجودات والأدوات الميكانيكية
وخلافها من هبوط في ثمنها بسبب القدم والاستعمال ، لذلك
فالاستهلاك يعني كل مبلغ يقتطع أو يجب من الارباح
مقابل تراجع قيمة الأشياء الموجودة .

١٣٠٥ - **إِسْتَوَائِي**
Equatorial
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو تابع للمناطق الاستوائية .

١٣٠٦ - **إِسْتَوَائِي**
Tropical
مختص بدائرة الانقلاب .

١٣٠٧ - **إِسْتَوْبَائِي *٥**
Epidémiologique (F).
Epidemiologic (E).
ما كان له صلة بالوباء .

١٣٠٨ - **إِسْتَوْفِي ، سُدِّد**
Acquit (F).
Receipt, Received (E).
لفظة بصينة المجهول يذيل بها سند دين للدلالة على وقائه .

١٣٠٩ - **إِسْتَوْكَح** استوكحت الفراخ : كبرت وغلظت .
١٣١٠ - **إِسْتَوْلَبَ**
يقال للغسان إذا ارادت الفحل : قد استولبت .

١٣١١ - **إِسْتَوْلَى ، شَغَلَ**
Occuper (F).
To occupy (E).
وضع يده على مال سائب أو مرسل أو لا مالك له بغية امتلاكه .

١٣١٢ - **أَسْتَوْمَة *٥**
Astoma (S).
Astome (F). Astoma (E).
نبات عشبي بري بضبابي الجذور من سبط الامينييات
وفصيلة النيميات . ساقه ملساء فرعاء . أوراقه ريشية
ثنائية التفصيل . أزهاره صغيرة . ثماره كروية مفلطحة
منحنية . بزوره منبعجة توأمية || يوجد في البقاع
قرب الماء .

١٣١٣ - **إِسْتِجَار**
Location (F).
Letting out, Hiring, Renting (E).
هو اكتراء المنازل والأراضي والأعيان المنقولة .



أَسْتِيلِب

١٣٣٢ - أسد العجم * Felis leo persicus (S).
Lion de Perse (F).
ربع الجثة ، صغير القد ، كثيف العفرة السمراء ، ثوبه
الى الصهبة الكدرة . موطنه إيران والهند والافغان كان
معروفاً في الجزيرة وفلسطين ولبنان وتركيا .

١٣٣٣ - أسد الهند * Felis leo googratensis (S).
Lion du Guzerat (F). Manelass lion of Guzerat (E).
كبير الجثة ، أزعر اللبدة القليلة الكثافة . اصهب اللون
من منكبته الى ذيله . بطنه الى البياض التبي . موطنه الهند
والبلاد المجاورة حتى الجزيرة .

١٣٣٤ - أسد أصغر le Petit Lion (F).
Leo minor (E).
الأسد الاصغر كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين
برج الاسد والذئب الاكبر || عدد نجومها ٥٣ أشهرها
«المليك» و«رأس الأسد» و«قلب الأسد» و«عرف
الأسد» و«ظهر الأسد» و«صغيرة الأسد» .

١٣٣٥ - أسد أمريكي اطلب كوجر .
١٣٣٦ - أسد الارض * Cardopatum corymbosum (S). Cardopate, Cardo-
patie, Caméléon noir (F). Black chameleon (E).
Schwarze eberwurz (D). Cardopate (I).
نبات عشبي بري من الشوكيات وفصيلة المركبات الانبوية
الزهر . ينبت في الاراضي المذحاة والبور . تأكل بزوره العنايفر .

١٣٣٧ - أسد الأرق * Hemerobius (S).
Chrysope, Hémérobe. Lion des pucerons (F).
جنس حشرات مفيدة من عصبيات الجناح . انواعه ٧
جميعها نافعة . انشاء تعلق مكنها على حافة فصل الاوراق
التي يركبها الارق فتتنقف عن دعاميص آفة تفترس الارق .

١٣٣٨ - أسد البحر * Otaria jubata, O. stellari (S).
Otarie à crinière, Lion marin (F). Sea lion (E).
نوع من الاتارية الشعراء العنق . ذكره كبير الجثة غليظها
طوله نحو ٤٠٠ سم . ودوحته ٢٥٠ سم . ثوبه الى البني
العابق اللامع . انشاء نحيلة الجسم ، هيفاء القد ، ثوبها الى
الصهبة . يعيش في بعض مناطق المحيط الهادي . يكثر
قرب شواطئ البيرو والشيلي والريو .

١٣٣٩ - أسد آف ٥ Mélanisme (F).
Melanism (E).
تلوين اسود او اسمر يصيب الجلد في بعض المواقع .

١٣٤٠ - أسد آف ٥ Mélanos (F). Melanous (E).
من يكون قد اصابه الاسداف في جلده .

١٣٤١ - أسديات الأرق Chrysopidae,
Hemerobidae (S). Chrysopidés, Hémérobidés (F).
Chrysopidae, Hemerobidae (E).
فصيلة حشرات نافعة تشبه الذباب من عصبيات الجناح .
اجناسها وانواعها عديدة . ألوانها مختلفة يكثر فيها الاسود .
تتميز باستطالة اجسامها وبقرورها الاستشعارية الحيطية .
دعاميصها مفترسة ، آفة ، نافعة .

١٣٤٢ - أسر الأسر هو الزباج .

١٣٤٣ - إسراب Encavement (F). Cellaring (E).
الاسراب وضع النبيذ وسائر الخمور في الاتية المخصصة لها .

وهو اشدها قوة وبأساً واعظمها بطشاً وانبلها خلقاً . يقال
وليس بثبت أنه لا يدنو من المرأة الحائض ولو بلغ الجهد .
طوله من قة رأسه حتى طرف ذيله يراوح من ٣٢٠ الى
٣٥٠ سم . وذيله نحو ٨٠ سم . ارتفاعه نحو المتر ووزنه
من ٢٣٠ الى ٢٧٠ كيلو . طفرته تفوق ٤ امتار وقطرته
من ١٢ الى ١٥ متراً . يعيش من ٣٠ الى ٤٠ سنة .
يبلغ كامل نشاطه بعد الثلاث سنوات ، يتميز بلبدته
الكثيفة . ثوبه الى الصهبة ، سري اللون يعلوه موج يختلف
 باختلاف النوع ولكنه يتحرف نحو الصفرة || للأسد
اسماء كثيرة اكثرها مشتق من صفاته . قال ابن خالويه :
للأسد خمائة اسم وصفة وزاد عليه علي بن قاسم بن جعفر
اللغوي مائة وثلاثين اسماً ، فن أشهرها : أسامة ، البيس ،
التاج ، الجحذب ، الحرث ، حيدرة ، الدواس ، الرثيال ،
الزفر ، السبع ، الصعب ، الضرغام ، الضيفم ، الغنياس ،
العوف ، الغضنفر ، الفرافصة ، القسورة ، الكهمس ،
الليث ، المتبيب ، الهرماس ، الهزبر والورد || ومن
كناه المشهورة ابو فراس ، ابو الابطال ، ابو حفص ،
ابو الانخيف ، ابو شبل ، ابو العباس ، ابو الحرث وابو
الفرهد || ويقال للثلاثي اسدة ولبوة ولبوة || ويقال لولده
الشبل والحفص والفرهد || وللأسد من الصبر على الجوع
وقلة الحاجة الى الماء ما ليس لغيره من السباع . وهو محموم
وكسول في النهار يستعيد نشاطه وشجاعته ويطشه في الليل
من غروب الشمس حتى بزوغها . ومن أكل نهس من
غير مضغ ولعابه قليل جداً ولذلك يوصف بالبحر .
ويقال أنه لا يأكل من فريسة غيره فاذا شبع من فريسته
تركها ولم يعد اليها واذا جاع ساءت اخلاقه واذا امتلأ
من الطعام ارتاض ولا يشرب من ماء ولغ فيها كلب وقد
اشار الى ذلك الشاعر بقوله :

«واترك حبها من غير بغض
وذاك لكثرة الشركاء فيه
اذا وقع الذباب على طعام
رفعت يدي ونفسي تشبهه
وتجتنب الأسود ورود ماء
اذا كان الكلاب ولعن فيه»
انواعه ستة : اربعة منها افريقية واثنان اسيويان .

١٣٢٨ - أسد البربر * Felis leo barbarus (S). Lion de barbaria (F). Lion (E).
كبير الجثة ، شامخ الرأس ، كثيف العفرة السمراء .
ثوبه صحر أصهب ، أغصير الموج . موطنه الصحراء
الكبيرة وجبال الاطلس .

١٣٢٩ - أسد الرأس * Felis leo capensis (S). Lion du Cap (F).
ربع الجثة ، غليظ العفرة الكثيفة . ثوبه صحر عابق .
موطنه افريقية الجنوبية .

١٣٣٠ - أسد السنغال * Felis leo senegalensis (S).
Lion du Sénégal (F).
اكبر الأسود جثة واشدها بطشاً . كثيف اللبدة . ثوبه صحر
أصهب . موطنه افريقية الشمالية والشرقية . يكثر في السنغال .

١٣٣١ - أسد الصومال * Felis leo somaliensis (S).
Lion de la Somalie (F).
ربع الجثة شديد البطش ، كثيف اللبدة السمراء الممتدة
حتى الاسدرين ، ثوبه اكهب أريد تغشاء غيرة سمراء .
موطنه الصومال والحيشة وافريقية الشرقية .




أسد البربر



أسد الرأس



أسد السنغال



أسد الصومال



أسد العجم



أسد الهند



أسد الارض



أسد الارق



أسرّوع




إسطبل



أسطر



أسطراطيقوس



أسطراغالوس الحليب



أسطراغالوس جبلي



أسطراغالوس دبقي

١٣٥٢ - أسطر كبير الزهر (S). Aster grandiflorus (S).

Aster à grandes fleurs (F).

نوع من الاسطر قليل الفروع ، بعيد الفواصل ، كبير الازهار بحيلها . يزرع للتزيين .

١٣٥٣ - أسطر كثير الزهر (S). Aster multiflorus (S).

Aster multiflore (F).

نوع من الاسطر متوسط القد ، حزمي الفروع عديدها كثير الازهار الكثيفة التجميع . يزرع للتزيين .

١٣٥٤ - أسطر مختصوري (S). Aster caespitosus (S).

Aster gazonnant (F).

نوع من الاسطر الحزمي الشكل ، صغير القد ، قصير الفواصل ، بحيل الازهار . يزرع للتزيين .

١٣٥٥ - أسطراطيقوس* ، خرّام

Aster Tripolium (S). Astère attique, Astère maritime, Tripolium (F). Sea-starwort, Sea aster, Tripoly (E). Strandaster, Sternblume (D). Astero (I).

نبات عشبي معمر من فصيلة المركبات الاسطرية الزهر . ينبت طوعياً في بعض المناطق والاراضي الرطبة . يقال انه طيب ويدخل في تركيب بعض العقاقير النافعة . منه ضروب زراعية تستعمل في التزيين ، تتكاثر بالبذر والمقل وتجود في جميع الارربة الرطبة .

١٣٥٦ - أسطراغالوس ، مختلب العقاب ،

عنزروت ، قدّاد ، أسترأغلس

Astragalus (S). Astragale (F). Astragal, Milk vetch (E). Astragal (D). Astragalo (I).

جنس نباتات عشبية وجنبية حولية ومحولة ومعمرة ، معظمها بري وبعضها طيب وصناعي وزيني وهي من فصيلة القرنيات الفراشية . يوجد منها في جميع المناطق المعتدلة ومنها انواع مبذولة في جبال لبنان وسورية || ازهارها قد تكون عنقودية او سنبلية او عنكبوتية التجميع ونادراً فردية . وهي غالباً بيضاء اللون ومنها الاصفر والبفسجي والقرمزي || يعرف منها ما لا يقل عن الألف نوع اشتهرها الاسطراغالوس العربي الذي يستخرج منه الصمغ ثم الاسطراغالوس اللبناني ثم الاسطراغالوس النجمي المستعمل في مكافحة السفلس . ومن انواعها الشائعة :

١٣٥٧ - أسطراغالوس الحليب* (S). Astragalus glaucus (S).

Glauce, Galax, Glaux (F). Sea milkwort, Milkwort (E). Astragalo, Galega (I).

نبات عشبي بري دماغ يستخرج منه جوهر فعال يستعمل في الصيدلة .

١٣٥٨ - أسطراغالوس جبلي* ، حمص جبلي

Astragalus cicer (S). Chiche de montagne (F). Vetch Mountain chickpea (E). Kichertragent, Wilde kichern (D). Astragalo a frutto rotondo, Cece di terra (I).

نبات عشبي بري يستخرج منه جوهر فعال يستعمل في الصيدلة .

١٣٥٩ - أسطراغالوس دبقي* ، كُثِيرَاء بَيْضَاء ،

قَتَاد الصمغ (S). Astragalus gummifera (S).

Astragale gommifère (F). Astragal, Milk vetch (E). Tragant, Astragal (D). Astragalo, Dragante (I).

نوع عديد الضروب منبها الشرق الاوسط ، يستخرج من سوقها عصارة صمغية طيبة مشهورة الاستعمال .

١٣٦٠ - أسطراغالوس عِرْق السُّوس* ، عِرْق السُّوس

Astragalus glycyphyllos (S).

Astragale réglisse, Réglisse sauvage (F). Liquorice

١٣٤٤ - أسرار

قال داود الانطاكي انه نبات بسواحل البحر ينبت في الصخر الى ذراع له ورق وزهر يخلف ثمرأ كاليندق ومنها مستطيل وله صمغ لزج اذا جف يشبه الكندر . وهو نبات طيب .

١٣٤٥ - أسرب

Graphite (F).

Graphite, Plumbago, Black lead (E).

الأسرب والأسرب والأسروب والبرغشت والغرافيت والغملول والقملول والكملول : معدن مركب من الكربون رمزه «C» مثل الالماس . صلابته تراوح من ٥ الى ١ بينما هي ١٠ في الالماس . وزنه النسبي يراوح من ١٥٩ الى ٢٥٣ . يتميز بخاصية تكليس الذهب وتحزيز الالماس وايصالية الكهرباء || يستعمل في صناعة الاقلام الرصاصية .

١٣٤٦ - إسرّنج

هو الزرقون والزرقون والسليقون : أكسيد الرصاص الاحمر . وزنه النسبي ٤٥٦ ، صلابته من ٢ الى ٣ . محلوله بزيت البويا يستعمل في دهان الحديد لانه يمنع الصدأ .

١٣٤٧ - أسرّوع* ، يسرّوع ، سرّقة

Chenille (F). Caterpillar (E).

اسم تعريفي يطلق على جميع يرقات وديدان الفراشات الحشرية الاجنحة منذ نفقها حتى دخولها في طور الخادرة .

١٣٤٨ - أسرّوعي

Larvaire (F).

Larval, Immature (E).

اسرّوعي ودعوصي ويرقي ، ثلاثة اسماء تطلق على طور معين تكون فيه الحشرة بين النقف والانسلاخ الاخير .

١٣٤٩ - أسط

Acesta (S). Aceste (F). Acesta (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات الصفيحيات الحياثيم يتميز بقنابه العميق الهزبة وبالشوك المسطوح المقوس القائم عند فجوة القناب مع العديد من المصبات .

١٣٥٠ - إسطبل* ، إسطبل ، آخور ، ياخور

Ecurie (F). Stall (E).

هو المسكن المعد لربط الدواب من فصيلة الخيليات . الشروط الصحية والاقتصادية الواجب مراعاتها في هذا المبنى هي : (١) انتقاء موقع الاسطبل في مكان يصرف الماء بسهولة معرضه الشرق اذا امكن . (٢) جعل سقف المبنى على علو ٣٥٠ او ٤٠٠ سم . (٣) إمالة ارض المبنى نحو ١٥ او ٢٠ ٪ تسهيلاً لصرف البول والماء . وتبليطها او توتيرها بأحدى المواد الصلبة التي لا تمتص الماء . (٤) تفريق الخيل عن بعضها بحواجز من خشب معلقة غير ثابتة . (٥) تخصيص المساحة الضرورية للرأس ، افضلها طول ٢٥٠ سم . بمرص ١٥٠ سم . ما عدا المعلق الذي يراوح عرضه من ٥٠ الى ٦٠ سم . (٦) فتح النوافذ الضرورية لتجديد الهواء مع الانتباه الكلي لعدم تعريض الخيل لهجاري الهواء .

١٣٥١ - أسطر* ، نجمية

Aster (S). Aster (F).

Starwort (E). Aster, Asterblume, Sternblume (D).

Astero (I).

جنس نباتات زراعية زهرية معمرة من الاسطريات وفصيلة المركبات . انواعه وضروبه عديدة جميعها تزيينية تختلف باحجامها واشكالها ولوانها || يتكاثر بالبذر والتعقيل والتدريج . يعيش في جميع الارربة .

١٣٨١ - أَسْطُرَاغَالُوس قَصْلِي ، خُنْصَر العُروس
Astragalus trimestri (S).

١٣٨٢ - أَسْطُرَاغَالُوس فَضِّي الورق
Astragalus argyrophyllus (S).

١٣٨٣ - أَسْطُرَاغَالُوس قِدَادِي (S).
Astragalus echinus (S).

١٣٨٤ - أَسْطُرَاغَالُوس قَزِم
Astragalus nanus (S).

١٣٨٥ - أَسْطُرَاغَالُوس قَزِي ، دُرَيْس
Astragalus bombycinus (S).

١٣٨٦ - أَسْطُرَاغَالُوس قَشِي
Astragalus tramineus (S).

١٣٨٧ - أَسْطُرَاغَالُوس كَثِير الزوايا
Astragalus angulosus (S).

١٣٨٨ - أَسْطُرَاغَالُوس لَبَادِي
Astragalus tomentosus (S).

١٣٨٩ - أَسْطُرَاغَالُوس لَحَافِي
Astragalus stromatodes (S).

١٣٩٠ - أَسْطُرَاغَالُوس لِسَان المِزْمَار
Astragalus epiglottis (S).

١٣٩١ - أَسْطُرَاغَالُوس لُكَّامِي
Astragalus amarus (S).

١٣٩٢ - أَسْطُرَاغَالُوس مُتَصَالِب ، خَزَام القَط
Astragalus cruciatus (S).

١٣٩٣ - أَسْطُرَاغَالُوس مُجَعَّد (S).
Astragalus corrugatus (S).

١٣٩٤ - أَسْطُرَاغَالُوس مُزدَوِج
Astragalus conduplicatus (S).

١٣٩٥ - أَسْطُرَاغَالُوس مُشْطِي
Astragalus pectinatus (S).

١٣٩٦ - أَسْطُرَاغَالُوس مُقَدَّس
Astragalus sanctus (S).

١٣٩٧ - أَسْطُرَاغَالُوس مُلْتَبِس
Astragalus ambiguus (S).

١٣٩٨ - أَسْطُرَاغَالُوس مُجَمِّي
Astragalus excapus (F).

١٣٩٩ - أَسْطُرَاوُن اَطْلَب مَحَار .
١٤٠٠ - أَسْطُرَاوُن *

Astrolabe (F).
Astrolabe (E).

آلة يقيس بها الفلكيون ارتفاع الكواكب مع تحديد دوائر
الطول والعرض . كما وانها ركيزة مراجع الابحاث المتعلقة
بدوران الارض وبسير الكواكب .

١٤٠١ - أَسْطُرِيَّات (F). Asteroidae (E).
سبط من فصيلة المركبات ، انواعه زهاء ٤٠٠ مهنها
المالم معظمها بري وبعضها زراعي تزييني .

١٤٠٢ - اِسْطُرْفَلِين اطلب جزر ابيض .

١٤٠٣ - اِسْطُرْفَانَات بَشْرَوِيَّة
Cylindres épithéliaux (F). Epithelial cylinder (E).

١٤٠٤ - اِسْطُرْفَانَة
Cylindre (F). Cylinder (E).

١٤٠٥ - اِسْطُرْفَانَة دائريَّة
Cylindre circulaire (F). Circular cylinder (E).

vetch (E). Barentragant, Lackritzwicke (D). Rego-
lizia bastarda, Astragalo liquirizia, Falsa liquirizia,
Liquirizia salvatica (I).

نبات عشبي بري يستخرج منه مادة طيبة تدفع الحميات .

١٣٦١ - أَسْطُرَاغَالُوس كَثِيرَاء* ، كَثِيرَاء ، حَلُوسِيَا
Astragalus tragacantha (S). Adragant, Tragacanth

(F). Gum-tragacanth plant, Goat's thorn (E). Adra-
gant, Bocksdistel (D). Dragante, Spina di becco,
Barba di volpe (I).

نبات طبي يستخرج منه جوهر فعال يستعمل ضد الحميات
انحصها المعودة والبردية .

١٣٦٢ - أَسْطُرَاغَالُوس نَوَارِس ، نَوَارِس ، شَجَرَة
القُدس ، عَصَب
Astragalus annacantha (S).

Astragale annacanth (F). Small goat's thorn (E).
Kicherarnakant (D). Astragalo aracanta (I).

نبات بري طبي يستخرج منه جوهر فعال يستعمل ضد
الغصص والديدان .

ومن اشهر انواعه المبذولة نخس بالذکر :

١٣٦٣ - أَسْطُرَاغَالُوس أَرْزِي (S).
Astragalus cedreti (S).

١٣٦٤ - أَسْطُرَاغَالُوس بِيروني
Astragalus berytheus (S).

١٣٦٥ - أَسْطُرَاغَالُوس ثَلَمِي القَرْنَة
Astragalus aulacolobus (S).

١٣٦٦ - أَسْطُرَاغَالُوس حَرْمُونِي
Astragalus hermoneus (S).

١٣٦٧ - أَسْطُرَاغَالُوس حَلَبِي
Astragalus aleppicus (S).

١٣٦٨ - أَسْطُرَاغَالُوس حَلَقِي ، حُرْبُث
Astragalus annularis (S).

١٣٦٩ - أَسْطُرَاغَالُوس دُرْزِي ، قُطْبُط
Astragalus drusorum (S).

١٣٧٠ - أَسْطُرَاغَالُوس دَرَلِي
Astragalus tuberculosus (S).

١٣٧١ - أَسْطُرَاغَالُوس دَمَشْقِي
Astragalus damascenus (S).

١٣٧٢ - أَسْطُرَاغَالُوس ذَهَبِي الورق
Astragalus chrysophyllus (S).

١٣٧٣ - أَسْطُرَاغَالُوس رَحَال ، كُرَيْشَة الحام
Astragalus peragrinus (S).

١٣٧٤ - أَسْطُرَاغَالُوس سِيَارِي ، أَصَابِع العُروس
Astragalus sieberi (S).

١٣٧٥ - أَسْطُرَاغَالُوس شَصِي ، قُرَيْن
Astragalus hamosus (S).

١٣٧٦ - أَسْطُرَاغَالُوس صَنْبُورِي
Astragalus pinetorum (S).

١٣٧٧ - أَسْطُرَاغَالُوس صُوفِي
Astragalus lanatus (S).

١٣٧٨ - أَسْطُرَاغَالُوس ضَيْق الورق
Astragalus angustifolius (S).

١٣٧٩ - أَسْطُرَاغَالُوس عَفْي
Astragalus hirsutissimus (S).


١٣٨٠ - أَسْطُرَاغَالُوس عَنْدَمِي
Astragalus cruentiflorus (S).



أَسْطُرَاغَالُوس عَرَق السوس



أَسْطُرَاغَالُوس كَثِيرَاء



اِسْطُرَاوُن



أسطوانة البر

خسة تكثر في مياه البحار الحارة وهي كبيرة القد مستطيلة الجسم والحطم ، حادة الاسنان القوية ، مأكولة مستحبة الطعم ، مبدولة في السواحل اللبنانية السورية .

١٤١٨ - إسفيريات ، إسفيريات

Sphyrinae (S). Sphyrinids (F). Sphyrinae (E). فصيلة اسماك بحرية من رتبة شالكانات الزعانف تشمل جنساً واحداً يدعى الاسفري .

١٤١٩ - أسفق

أسفق الماشية : لم يحلبها في اليوم إلا مرة واحدة .

١٤٢٠ - إسفننج

Spongia (S). Eponge (F).

Sponge, Spongia (E).

حيوان مائي بسيط التركيب من الاسفنجيات المجوفات ، انواعه عديدة معظمها يعيش ملتصقاً بصخور القاع في المياه المالحة الضحلة . لونه الطبيعي براون بين الاخضر والاصفر والبني . ومنه انواع تعيش في المياه العذبة لونها الى الخضرة . والاسفنج يتغذى بالتغذية المائية التي يدفعها التيار الى تجاويفه حيث تدخل من الفتحات الصغيرة فيضم منها ما هو بحاجة اليه ويطرده ما هو بغنى عنه من فتحاته الواسعة . يصطاد بالنطس على السواحل البحرية . يكثر وجوده في المياه اللبنانية وعلى بعض السواحل المصرية وفي اليونان وايطاليا .

١٤٢١ - إسفننجيات

Eponges, Spongiaires (F).

Spongiae (E).

شعبة حيوانية من المجوفات او اللاحشويات تشمل عدة اقسام منها الصالحة للاستهلاك ومنها تزيينية وغيرها لا حاجة لها حتى الآن .

١٤٢٢ - أسفند

هو الخردل الابيض .

١٤٢٣ - أسفندان

هو القيقب .

١٤٢٤ - أسفنداليات

هي القيقبات فصيلة نباتية .

١٤٢٥ - إسفيداج

Céruse, Cérusite (F).

Ceruse, White lead, Cerusite (E).

هو كربونات الرصاص الطبيعي . حجر شفاف لا يخلو من اللعنة . لونه الى البياض أو الصفرة . وزنه النسبي ٦,٥ ، صلابته ٣,٥ || يستعمل في عدة صناعات اخصها دهان الخشب والجبس .

١٤٢٦ - إسفيدار

هو الخردل الابيض . اطلبه .

١٤٢٧ - إسفيني ، سفروطي

Cunéiforme (F).

Cuneliform (E). لغت وصفي لشكل خاص هيئته كالاسفين .

١٤٢٨ - إسقاء ، إرواء ، سقي ، ري

Arrosage, Irrigation (F). Watering, Sprinkling,

Irrigation (E).

الاسقاء هو اعطاء المزروعات ما يلزمها من ماء . اما طرق الاسقاء فعدة اخصها :

Irrigation

الري

وهو سقي الزراعات الواسعة

par aspersion

الاسقاء بالرش

par infiltration

الاسقاء بالرشح

par déversement

الاسقاء بالسيح

par submersion

الاسقاء بالغمر

١٤٠٦ - أسطواناتي

Cylindrique (F). Cylindrical (E).

١٤٠٧ - أسطوخودوس

اطلب خزامى بحرية .

١٤٠٨ - أسطوانة البر

Tenebrioides mauritanicus, Trogosita mauritana (S). Cadelle (F). Cadelle (E). Gemeiner Brotkäfer (D).

خنافس من فصيلة الاسطومييات طولها نحو ٨ مم . لونها اسود تعلوه ماجة حنطية لامعة . تعيش بين محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء حيث تفترس الحشرات التي تتركب هذه الاغلال . يرقها تعيش على الحبوب التي صار نحرها من قبل غيرها ، وهذه البرقة تدعى « كادل » .

١٤٠٩ - أسطوانة الصنوبر

Temnochila caerulea (S).

حشرة من الاسطومييات طولها نحو ١٥ مم . لونها اسود تعلوه ماجة زبرجدية لامعة . تعيش تحت لحاء الصنوبر وفي حطبها اليابس تفترس الحشرات .

١٤١٠ - أسطوانة الصوفان

Thymalus limbatus (S).

خنافس من الاسطومييات طولها نحو ٦ مم . شكلها مستدير ، لونها اسفع لامع تشوبه زغبة خفيفة . تعيش على الصوفان حيث تفترس ما وصل اليها من هوام وحشرات .

١٤١١ - أسطوانة اللحاء

Nemosoma elongatum (S). Némosome élongé (F).

حشرة من الاسطومييات طولها نحو ٥ مم . مستطيلة الشكل رأسها وصدرها الى السرة ، عندها متباينة الالوان نصفها الى الشقرة ونصفها الآخر الى السمرة السوداء || تعيش تحت اللحاء في سرايب السكوليت وغيرها .

١٤١٢ - أسطومييات

Ostomatidae (S).

Ostomatidés, Ostomidés (F). Ostomatidae (E).

فصيلة حشرات نافعة من رتبة عمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها مستطيلة الشكل . قرونها الاستشعارية مركبة من ١٠ او ١١ فاصلة . ارساغها خاسية ، مكها اسطواناتي الشكل ، اغبر اللون . يرقاتها صغيرة . اجسامها غبراء اللون . رؤوسها وشروجها سود . تعيش تحت اللحاء وبينها وعلى الصوفان . تفترس ما وصل اليها من حشرات .

١٤١٣ - إسقاد ، ترأصع ، كوش

Reproduction des oiseaux (F). Reproduction of birds (E).

هو تزاج الطير من دجاج وغيرها . يقال تسافت الطيور وسفد بعضها على بعض .

١٤١٤ - إسقاقس

اطلب قويسة مخزنية .

١٤١٥ - إسقافخ

راجع اسبانخ .


١٤١٦ - أسفراج

هو المليون منه الزراعي والتزييني والبري . اطلب هليون .

١٤١٧ - إسفري ، إسفري ، إسفري ، إسفري ، إسفري

Sphyrina (S). Sphyrène, Brochet de mer, Lussi, Espet (F). Barracuda, Spet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسفريات . انواعه المعروفة



أسطوانة الصنوبر



أسطوانة الصوفان



أسطوانة اللحاء



أسفري



اسفنج

فصيلة اسماك بحرية من العظميات الشائكات الزعانف .
اجناسها خمسة وهي :

Scombres	الإسقمري
Pélamydes	البكورة
Bonites	البونيت
Thons	الثن
Germons	الكتعد

١٤٣٧ - إسقنقور* ، سقنقور ، أدّة

Scinque (F). Skink (E).
الاسقنقور عظاية بقدر الشبر شبيه بالورل يكثر في الرمال التي تلي النيل في نواحي الصعيد . راجع سقنقور وقد وصف الدميري الاسقنقور فقال : « قال ابن نختيشوع : انه التساح البري . وقال ابن زهر هي دابة بمصر شكلها شكل الوزغة . ومن المعروف ان التساح يبيض في البر فا وقع من بيضه في الماء صار تمساحاً وما بقي في البر صار اسقنقوراً » .

١٤٣٨ - أسقورديون بري* ، منضار

Teucrium scordioides (S). Germandrée sauvage (F). Garlic sage, Wood germander, Wood sage (E). Waldgamander, Waldsalvi (D). Teucro salvatico, Camendrio salvatico (I).
نوع من الطوقريون من فصيلة الشفويات . وهو نبات عشبي لبني طربي متقابل الاوراق الزغبية النصل المسنن . كان ولا يزال يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

١٤٣٩ - أسقورديون مائي* ، ثوم الحبة

Teucrium scordium (S). Germandrée aquatique, Scordion (F). Scordium, Water germander (E). Lauchgamander, Wassergamander (D). Camendrio zquatico, Teucro acquatico, Scordio (I).
نوع من الطوقريون من فصيلة الشفويات يكثر في المناطق وعلى ضفاف الماء وهو من الاعشاب الطبية الجزيلة النفع .

١٤٤٠ - أسك

كل حيوان قصير الأذن صغيرها فهو اسك وبني سكاء .
ج سك .

١٤٤١ - أسك ه . Asque (F). Ascus, Sporangium (E).
هو الزق ، اطلبه .

١٤٤٢ - إسكاه . Esca
هو الصوفان الكاذب فطر من السيات ، اطلبه .

١٤٤٣ - أسكاكوير . Ascacuire sacfa
فاطور زراعي يرتكز على مادتي النحاس والزنك . يستعمل سائلاً محلولاً ١ ٪ في مكافحة القسنة (الميلديو) .

١٤٤٤ - أسكريد . Ascaride (F). Ascaride, Thread-worms (E).
هو الصفر ، اطلبه .

١٤٤٥ - أسكرين ه . Ascarinus (S). Ascarine (F).
جنس نباتات برية ، جنينية ، معمرة من فصيلة العطروريات . انواعه المعروفة ثلاثة منبتها بعض جزر المحيط الهادي || سوتها منتصبه فرعاء . اوراقها بسيطة ، متقابلة . ازهارها ثنائية المسكن ، سنبلية التجميع . ثمارها نووية ، آحية اللباب المتناسك .

ويسمى هذه الطريقة الترييض والرباص .
الاسقاء بالنضج par pulvérisation (tourniquet)

١٤٢٩ - إسقاط راجع اسداج

١٤٣٠ - إسقاط . Défalcaion (F). Ded iction (E).
الاسقاط حذف شيء من كمية معينة .

١٤٣١ - أسقع

طائر كانه عصفور في ريشه خضرة ورأسه ابيض ، يكون بقرب الماء - ج . اسافع (لسان العرب) .

١٤٣٢ - إسقمري ، طراخور

Scomber (S). Maquereau scombra (F). Mackerel (E).
جنس سمك من العظميات الشائكات الزعانف ينتمي الى فصيلة الاسقمريات . انواعه عديدة جميعها من سمك البحار الحارة والمعتدلة . وهي من الاسماك القواطع التي تجوب البحار في اوقات معينة فتعبر مثلاً مضيق جبل طارق عند دخولها البحر المتوسط في اوائل الربيع من كل عام . والاسقمري بوجه عام ، سمكة مستطيلة الشكل . يبلغ طولها نحو ٥٠ سم . ظهرها مختلف الالوان الزاهية التي يعلوها الاخضر والازرق والاسود ، بطنها يلون اللؤلؤ ولحمته لحمها لذيق مرغوب فيه برغم وفرة زيتته || اشهره نوعان وهما :

١٤٣٣ - إسقمري طراز* ، طزر

Auxis thazard, Scomber thazard (S). Scómbre thazard, Tazard, Bonitou (F). Scomber thazard (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من الاسماك اليمية القواطع . اسرارها وافرة العدد || جسمها وشقي الشكل بطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . ثوبها الى الزرقه يخالطها الاخضر تشتد وتعتق في الرأس والظهر وتعلوها زركشة سوداء في القسم الاعلى من الجانبين ، ويدخلها الفضي والذهبي في القسم الاسفل . يطنها الى الفولاذي الفضي المواجه . وتحمل تحت كل من عينيها بقعجة صغيرة زرقاء اللون . زعانفها الصدرية والحوضية والشرجية الى الطحلة الفضية . زعنفتها الظهرية الاولى الى الزرقه اما الثانية فالى الربدة وكذلك الذيلية || لحمها دمعك . تبني اللون ، مستحب الطعم ، مرغوب فيه .

١٤٣٤ - إسقمري كلناس* ، بيار

Scomber colias (S). Maquereau colias, Biar, Cava-luca (F). Colias mackerel (E).
نوع من الاسقمري العابق اللون ، طوله يقارب ٤٥ سم . يكثر قرب السواحل اللبنانية السورية وهو من الاسماك التي تصاد في الليل .

١٤٣٥ - إسقمري معروف* ، طراخور شائع

Scomber scomber (S). Maquereau commun, Bizet (F). Common mackerel (E).
نوع آخر من الاسقمري لونه اخضر ازرق لامع المواجه طوله يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم . يصاد في الليل على الشواطئ اللبنانية السورية .


١٤٣٦ - إسقمريات . Scomberidae (S). Scomberidés (F). Scomberidae (E).



اسقمري طراز



اسقمري كلياس




اسقمري معروف



اسقنقور



اسقورديون بري



اسقورديون مائي



أسل الهند



أسل عربي



أسل كولاني



إسليخ

١٤٥٨ - أسلييات
Joncaceae (S).
Joncaceae, Joncinées, Juncacées (F). Juncaceae (E).
فصيلة الاسل من ذوات الفلقة الواحدة. اجناسها ١٥
اما انواعها فكثيرة العدد جميعها منقعية منبها الاقاليم المعتدلة
والباردة. نباتاتها معمرة، جذاميرها مدادة، اوراقها
متعاقبة عصفية النصل المستطيل المنتعبد. ازهارها عنقودي
كثيف التجميع. ازهارها خنثوية.

١٤٥٩ - إسليخ، إسليحة، كُرْدُون، طُفْبُون
عشبة تشبه الجرجير تنبت في حقوف الرمل. وقيل هو نبات
سهلي ينبت ظاهراً وله ورقة دقيقة لطيفة وسنفة محشوة حباً
كحب الخشخاش يسليح الماشية (لسان العرب).
وقال الانطاكي: «هو نبات قصي دقيق الاوراق اغبر
اصفر ومنه مزغب مراكم الاكاليل بغلف كالبنج محشوة
بزراً اسود مر الطعم حريف».

١٤٦٠ - إسليخ*، لِسْرُون
Reseda asolaich (S). Réséda sauvage (F). Wilder reseda (E). Wilder
wau (D). Reseda salvatica (I).
هو الخزام البري نبات طبي عطر مهدد بلاد حوض البحر
المتوسط.

١٤٦١ - أسماك
Poissons (F). Fishes (E).
الاسماك صف من الحيوانات الفقارية المتباينة الاشكال
والاحجام. جميعها تعيش في الماء. فصائلها واجناسها
وانوعها كثيرة العدد كان التصنيف الماضي يقسمها الى
خمس اقسام: الماصات والغضروفيات والزعانف والمزدوجات
التنفس واللامعات والعظميات | اول تصنيف تمهيدي
للالسماك يعود الى ارسطو في الجيل الرابع قبل الميلاد. ثم
جاء العلامة «لينه» في الجيل الثامن عشر، فوضع
هيكلية التصنيف التي لا تزال قائمة حتى اليوم مع بعض
التعديلات التي فرضتها المعارف الشوزبية والاعلامية
الحديثة || التصنيف المعمول بها الآن ثلاثة. اما
التصنيف المختصر الذي نورد في هذا يلي فهو اشيعها منذ
عام ١٩٧٠.

١٤٦٢ - إسماك
Empoisonnement (F). Poisoning (E).
اعمار الخوض او النهر بالسك.

١٤٦٣ - إسماكية
Ichtyologia (F). Ichthyology (E).
مبحث الاسماك وطبائعها.

١٤٦٤ - أسمر
Lait de gazelle (F). Milk of gazella (E).
الاسمر: لبن الظبية.

١٤٦٥ - إسمرار
Brunissure (F). Burnishing (E).
وصم سببه الاشعاع الشمسي يعطب المادة الخليوية في الورقة
يفسدها ويسبب استمرار نسجها. يصيب بعض النباتات
اخصها الكربة.

١٤٦٦ - إسمنت، تْرَابَة
Ciment (F). Cement (E).
ضرب من الكلس يحصل من طليخ احجار كلسية تحوي
نحو ٢٠ او ٣٠٪ من الغضار الصفر. وهو اذا ما
جبل بالماء يقسو ويحجر فيستعمل على اشكال شتى في
البناء وفي صنع الحجارة والبلاط الخ.

١٤٤٦ - أسكوشيتا
Ascochyta (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يعرف بالحنكلة
(اطلب حنكلة).

١٤٤٧ - أسكوشيتولا
Ascochytella (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يعرف بالحنكيلة
(اطلب حنكيلة).

١٤٤٨ - أسكوشيتولا
Ascochytula (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يعرف بالحنكولة
(اطلب حنكولة).

١٤٤٩ - إسكينومين
Aeschynomène
اطلب صولة

١٤٥٠ - أسل، سَمَار
Juncus (S). Junc (F). Rush (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الاسليات منبها
المناطق والاراضي الرطبة في جميع اقاليم البلاد الباردة والمعتدلة.
اوراقها عصفية الشكل طويلة منتصبة تستعمل في صناعة
الحصر والسلاسل وما اشبه.
انواعه عديدة، اشهرها العربي والكولاني.

١٤٥١ - أسل الهند*، قَصَب دَرَاكُو
Calamus rotang (S). Rotang, Rotin, Junc de l'Inde (F).
Chair-bottom cane, Rattan cane (E). Rotang, Ro-
tangpalme (D). Canna d'India, Giunchi, Rotang (I).
جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة النخلات مهددا
البلاد الحارة. سوقها قصبة الشكل طويلة منتصبة شائعة
الاستعمال الصناعي.

١٤٥٢ - أسل عربي*، سَمَار الحصر، تَمَص
Juncus arabicus (S). Junc, Junc des nattiers (F). Ruch,
Sea rush (E). Arabischer binse (D). Giunco marino,
Giunco (I).
نوع من الاسل الضيق الورق ترعاه الماشية فيسمه ان
كان عذياً ويؤذيها ان كان منقياً || ثماره مدرة للبول.
اوراقه عطرية تستعمل في صناعة الحصر والسلاسل.

١٤٥٣ - أسل كولاني*، سَمَار شائك
Juncus acutus (S). Junc aigu, Junc piquant (F). Sharp
rush, Dutch rush (E). Binse (D). Giunco spinoso,
Giunco rigido, G. che buca (I).
نوع من الاسل ومنهم من سماه فتايل الرهبان. ثماره مدرة
للبول واوراقه تحلل الاوجاع ضحاً حيث كانت. ويقال
انه ينفع من الاستسقاء.

١٤٥٤ - إسلا ب
Défeuillaison (F). Defoliation (E).
اسلب الشجر فقد اوراقه وقد يكون اما طبيعياً وذلك عند
الاعبال او اسراً من جراء آفة او حشرة.

١٤٥٥ - إسلاس
Ameublissement (F). Loosening, Mellowing (E).
تنعيم التربة بالحرث او بالدمل لجعلها خوارة.

١٤٥٦ - أسلة
أسلة البعير: طرف قضيبه.

١٤٥٧ - أسلي
Junciforme (F). Rush-shaped (E).
نعت وصفي يطلق على مختلف الاعضاء النباتية الأسلية الشكل.

Les Poissons
Classification sommaire actuelle

الاسماك
موجز التصنيف الحديث

Genre	الجنس	Famille	الفصيلة	Ordre	الرتبة	Super-Ordre	الطائفة	Sous-Classe	الطائفة
Myxine	ميكسين	Myxiniidés	عاطيات					Cyclostomes	حلقيات اللقواء
Lamproie	جلهكي	Petromyzontidés	جلاكيات						
Chondrichthyeus غضروفيات									
Requin à colerette	جندر مطوق			Hexanchiformes	جندريات الشكل	Pleurotrèmes	جائيات العذاف	Sélaciens	أشلاق ، شلقيات
Perlon	رسانة حمراء								
Requin de Port-Jackson	جندر جاكسون			Hétérodontiformes	منابات الاسنان				
Requin-tapis	كوسج زربي	Orectolobides	كوسجيات	Galéiformes	خوذيات الشكل				
Odontaspé	دوتوس	Odontospidés	دوتوسيات						
Tonille	قصف ، لاء	Isuridés	نمغيات						
Requin blanc	لخم ابيض								
Requin-pèlerin	جواب	Cétorhinidés	جرايات						
Requin-baleine	ايلس	Rhincodontidés	ايلسيات						
Roussette	غراء	Scythorhinidés	غرايات						
Requin bleu	بنك ازرق	Carcharhinidés	بنكيات						
Requin-marteau	مطارق البحر	Sphyrnidés	سفيريات						
Squaliformes قوشيات الشكل									
Aiguilaf	قوش شاك	Squalidés	قوشيات						
Laimargue	موتقة	Seymourhinidés	سموريات						
Pristiophore	مشار	Pristiophonidés	مشاريات						
Ange de mer	سقطين	Squatinidés	سقطيات						
Raiformes شفقيات الشكل									
guiare de mer	غياط	Rhinobatidés	غياطات						
Scie (Poisson-Scie)	ابو مشار	Pristidés	مشاريات						
Raie	شفين	Rajidés	شفقيات بحرية						
Pastenague	طرقون	Trygonidés	طرقونيات						
Aigle de mer	عقاب البحر ، مورينة	Myliobatidés	موريات						
Diable de mer	كواجة	Lophnidés	كواجيات						
Hypotrèmes سفليات العذاف									
Torpille	رسانة	Torpedinidés	رسانات	Torpediniformes	رسانات الشكل				

Chimère	خُرْأَة	Chimérîdes	خُرْأِيَّات		كاملات الرؤوس
Coelacanth	قَلْبَانِيَّة	Coelacanthidés	قَلْبَانِيَّات		كاملات الرؤوس
					Holocéphales
Cératode	سُرْقُود	Cératodidés	سُرْقُودِيَّات		Crossoptérygiens
Lépidorène	دَفَّاقَة	Lépidosirenidés	دَفَّاقِيَّات		Dipneustes
Protoptère	رَحاشِيَّة	Protoptéridés	رَحاشِيَّات		مزدوجات النفس
Esturgeon	حَفْشِي	acipensérîdes	حَفْشِيَّات		شُعاعِيَّات الرِغَاف
Squalaire	رِغَافَة	Polyodonidés	رِغَافِيَّات		Chondrostéens
					جَنَائِيَّات
Lépisostée	لَبِوسَة	Lépisostéïdes	لَبِوسِيَّات		Actinoptérygiens
Anie	أَبِيَّة	Amiïdés	أَبِيَّات	Amiiformes	
					Holostéens
Polypière	شَمَم	Polypéridés	شَمَمِيَّات	Polypétiiformes	كاملات الاسنان
Tarpon	خَنَجُولَة	Elopidés	لَحْشِيَّات		
Aragaina	أَرَابِيَا	Ostéoglossidés	عَظْمِيَّات الرُّؤُوس		
Mormyre	مُورْمِيَر	Mormyridés	مُورْمِيَرِيَّات		
Hareng	رَنَكَة	Clupéïdés	صَابُوعِيَّات		
Sardine	سَرْدِين				
Anchois	بَلَم	Engraulidés	بَلَمِيَّات		
Truite	تُرُوتَة				
Saumon	سَلْمُون	Salmonidés	سَلْمُونِيَّات	Clupéiformes	صَابُوعِيَّات الشَّكَل
Ambie	لَفَافَة				
Ombre	عَلُوس				
Eperlan	رُؤَانَة	Osmeridés	رُؤَانِيَّات		
Poisson abyssaux	أَسْمَاك بِلْجَة	Stomiatiidés	رِغَافِيَّات		Téléostéens
Brochet	زَنْجُور	Esocidés	زَنْجُورِيَّات		كاملات العظام
Piranha	بِرَهَة	Characidé	فَرَصَانِيَّات		
Gymnote	جَمْنُوت رِغَافِي	Gymnotidés	جَمْنُوتِيَّات		
Carpe	شَبُوط	Cyprinidés	شَبُوطِيَّات		
Loche	لَح	Cobitidés	لَحِيَّات	Cypriniformes	شَبُوطِيَّات الشَّكَل
Poisson électrique	مُفْرِقَة	Malaptéruriidés	مُفْرِقِيَّات		
Silure	جَرِي	Siluridés	سَلُورِيَّات		

Genre	الجنس	Famille	القبيلة	Ordre	الرتبة	Super-Ordre	الطبقة	Sous-Classe	الطائفة
Anguille	انقليس	Anguillidés	انقليسيات	Anguilliformes	انقليسيات الشكل	Téleostéiens	كاملات النظام	Actinopterygiens	شماخييات الزعانف
Murène	شبق	Murénidés	شبقيات						
Congre	زردقوم	Congridés	زردقويات						
Orphie	خوخان	Aélonidés	خوخانيات	Beloniformes	خوخانيات الشكل				
Exocet	خطاف الماء	Exocoetidés	خطاف الماء						
Epinoche	نمر	Gasterostéidés	نمرات	Gasterostéiformes	نمرات الشكل				
Hippocampe	حصان البحر	Syngnathidés	نمات البحر	Syngnathiformes	نمات الشكل				
Syngnathe	نمارة البحر								
Cyprinodon	بجن	Cyprinodontidés	بجنيات	Cyprinodontiformes	بجنيات الشكل				
Mulet	بوربي	Magilidés	بوريات	Mygiliformes	بوريات الشكل				
Atherine	فتفتش	Atherinidés	حماشيات						
Morue	غادس	Gadidés	غادسيات	Gadiformes	غادسيات الشكل				
Merlan	غير ليط								
Lote									
Zée	مولاك	Zéidés	مولكيات	Zéiformes	مولكيات الشكل				
Bar	قاروس	Serranidés	صرايات	Perciformes	فريجات الشكل				
Méron	لقس								
Serran	صران								
Perche	فريخ	Percidés	فريجات						
Saadre	صندر								
Chinchard	طوخوره	Carangidés	شيميات						
Carangue	شيم								
Pilote	ريان								
Ronget-barbet	طرسج	Mullidés	طرسجيات						
Pagelle	فريدي	Sparidés	اسبوريات						
Poisson-papillon	سحل	Chaetodontidés	سحليات						
Chelmon	تقع								

نصلها كامل بسيط تغشاء نقط دهنية شفافة || ازهارها قياسية ، خنثوية ، مندعمة البتلات ، عديدة الاسدية ، فردية الاقلام والسمات . سفلية المبيض الكثير الغريقات . ثمارها بمعظمها شبه نووية مأكولة ويستخرج من بعضها ادوية مقوية وقوايض وزيتون وعطور .

١٤٨٠ - **أَسْبَانْتُوس** * Acianthe

نبات من الشحاريات جميل الوراق والزهر يزرع للتزيين في الحدائق والبيوت .

١٤٨١ - **آسِيَة** Myrthées (F). Myrtus (E).

سبط من فصيلة الاسيات اشهر اجناس الآس .

١٤٨٢ - **أَسِيَّتَات ، خَلَاقَة** Acétate (F). Acetate (E).

كلمة شاملة تستعمل للتعريف عن المركبات المشتقة من الحامض الخلي والمعروفة تجارياً بالاملاح .

١٤٨٣ - **أَسِيَّتَات النحاس** Verdet (F). Verdigris (E).

ويعرف ايضاً بالمسحوق الاخضر . هو مركب نحاسي كثير الاستعمال الزراعي تداوى به عدة اوصام فطرية .

١٤٨٤ - **أَسِيَّتَال** Acétal, Ethidene diethylate (F).

Acetal (E).

سائل عديم اللون ، عذب الرائحة ، ثقله النوعي ٨٢١ ، يغلو عند ١٠٤ °سغ . يذوب في الكحول والايتر . قليل الذوبان في الماء || يوجد في الخمر وتكثر نسبته مع العتيق .

١٤٨٥ - **أَسِيَّتُون ، خَلْتُون** Acétone (F).

Acetone (E).

سائل طيار حريف ، لا لون له ، قابل للاشتعال . يذيب المواد الدهنية والصغية والراتنجية . يستعمل كمخدر وقاتل للدود . يوجد في بعض المشروبات الروحية بمقدار قليل .

١٤٨٦ - **أَسِيَّتِيلَان** Acétylène (F).

Acetylene, Kiumene (E).

غاز عديم اللون كبريه الرائحة قابل للاشتعال يستعمل للانارة يصطنع بطرق عديدة اخصها تأثير الماء على كربور الكلسيوم .

١٤٨٧ - **أَسِيْس** Aborigène (F). Aboriginat pi.

ما كان من حيوانات البلاد او نبتها .

١٤٨٨ - **أَسِيل** Homozygote

هو الجنيس أي جنيس الزغطة . اطلب جنيس .

١٤٨٩ - **أَسِيْنَاَة** Acineta (S). Acinète (F).

نبات من الشحاريات . جذموري الجذع ، وحيد الورقة المستطيلة . ازهاره جميلة الشكل لونها الى الجؤوة يملوها وشم قوميدي . ازهاره قرصي الانتشاب يرتكز على زناد لبني دقيق يستطيل استطالة الورقة .

١٤٩٠ - **آشَاءَة** Rejet (F). Spring (E).

الاشاء صغار النخل .

١٤٩١ - **إِشَابَة** Croisement (F).

Cross-breeding (E).

هي في الحيوان تهجين سلالتين مختلفتين من نوع واحد كإزاء ثور هولندي على بقرة بلدية .

١٤٦٧ - **أَسْمِيُوم** Osmium

معدن شديد الصلابة يوجد في الطبيعة مع البلاتين (الذهب الابيض) رمزه « Os » ، ثقله الذوي ٢٢٤ ، لذلك فهو من اثقل المعادن المعروفة . يذوب عند ٢٥٠٠ °سغ .

١٤٦٨ - **إِسْتَان** Dentition

هو تكوين الأسنان ونموها وبروزها وحالتها .

١٤٦٩ - **أَسْنَان الكلب** راجع اريرون .

١٤٧٠ - **أَسْنَجَة** Stagonospora (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . انواعه قليلة غير ضارة تتميز ببيكنيدات المردنية الشفافة ، الشغية الانقسام العلوي .

١٤٧١ - **أَسْنَجِيَة** Stagonosporopsis (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات يتميز ببيكنياته الاسطوانية الشكل التي تعيش منفردة تحت بشرة النسيج الآدمي . بويغاته تكون في اول عهدها ثنائية الخلية ، متوورة ، شاذية الاخبية ثم تصبح عند نضجها ثلاثية الخلايا وذلك بعد انقسام الخباء الكبير على نفسه . انواعه قليلة تتطفل على بعض القرنيات . اشهرها واعرفها اسنجية هورتنسي .

١٤٧٢ - **أَسْنَجِيَة هورتنسي** * Stagonosporopsis hortensis (S).

فطر مجهري واسع الانتشار يركب اوراق اللوبياء فيوصم النصل في مستوى عروقه ببقع مستديرة راوح قطرها من ٨ الى ١٢ مم . تبدو شبيه اللون ثم دمء . تقضي على اللون الذي يحف ويبس . يكافح بالكبريت ومشتقاته . مع اجتناب اكثار الماء لان الرطوبة تشجع انتشاره .

١٤٧٣ - **أَسْنَدَ ، أَحَال ، وَجَهَ** Déferer (F).

To confer, To bestow (E).

يقال اسند المنصب واحال القضية ووجه اليمين .

١٤٧٤ - **أَسْهَاء** Radiation lumineuse (F).

Luminous radiation (E).

اسهاء النور او اشعة الشمس .

١٤٧٥ - **إِسْهَال** Diarrhée (F). Diarrhoea (E).

خلل عارض يقع في عمل جهاز الهضم ينتج عنه خروج براز مائع في فترات قصيرة .

١٤٧٦ - **أَسْهَر** Canal déferent (F).

Canalis deferent (E).

هي القناة ناقلة المذي .

١٤٧٧ - **أَسْهَرَان ، حَالِبَا الرُكْبَة** Canaux déferents (F). Vas deferens (E).

هما القناتان ناقلتا المذي .

١٤٧٨ - **أَسِي** Exponentiel (F). Exponential (E).

١٤٧٩ - **أَسِيَات** Myrtaceae (S).

Myrtacées (F). Myrtaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل زهاء ١٨٠٠ نوع يجمعها ٨٠ جنساً تنتمي الى ٥ اسباط : الآسية والخويرية والرمائية واللطية والشرمية . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات مهددة البلاد الحارة والمعتدلة . اوراقها سحائية معتقة



أَسْنَجِيَة هورتنسي



أَسِيَانْتُوس

١٤٩٢ - أشجار

أشجار الحجر والناقة والبقرة : جوانب حياتها .

١٤٩٣ - إشاعية

Collectivisme (F).

Collectivism (E).

مذهب اقتصاد سياسي يركز على المشاركة في وسائل وامكافات الانتاج .

١٤٩٤ - إشال *٥

Cordons

شكل من اشكال القيادة الشجرية قوامه فروع متقنة التشذيب والتقليم ترتكز على مساند من السلك || والإشال قد تكون افقية وعمودية ومعرضة . اما الاشجار التي تنصاع الى هذه الطريقة فهي بعض ضروب الاجاص والقليل من التفاح .

١٤٩٥ - إشامة ٥

Régession (biol.) (F).

Regression, Recesson (E).

عودة بعض الصفات البيولوجية الى ما كانت عليه قبل التهجين الذي قادها الى التحسين .

١٤٩٦ - إشباع ، ترؤيع

Saturation

١٤٩٧ - أشباه الانسان

Anthropomorphes (F).

Anthropomorphous (E).

فصيلة قرود من سلفيات المنخرين تشمل اربعة اجناس : البومة والجبن والسلافة والفول . جميعها كبيرة القد ، مستطيلة الايدي ، موطنها احرار المناطق الحارة الاسيوية والافريقية .

١٤٩٨ - أشباه الديدان

Vermidiens (F).

Vermineous (E).

١٤٩٩ - أشباه الشحوم

Lipoides (F). Lipoid (E).

١٥٠٠ - أشباه عصبيات الأجنحة ٥

Archiptères, Orthonévoptères, Pseudo-névoptères (F). Pseudo-neuroptera (E).

فئة من الحشرات تنتمي الى رتب مختلفة تجمعها بعض الصفات والعوامل المشتركة اخصها : اجنحة غشائية ناعمة ، جهاز فكي ساحق ، اكمال ناقص || اما الرتب التي تنتمي الى هذه الفئة فهي : الرعاشات ، العقفانيات ، القلذيات ، القهبليات ، اليوميات (بنات يوم) .

١٥٠١ - أشبور* ، أرارو

Polyborus (S).

Caracaras (F). Polyborus (E).

طائر من الجوارح وحيد الجنس والنوع من فصيلة الاشبوريات . وهو مستطيل السقط . ربيع الجثة ، طوله نحو ٥٥ سم . ثوبه الى الصبغة يملوها توشيم ابيض وخطوط معترضة تميل الى القبرة . يحمل على رأسه قنبرة صغيرة سوداء اللون || موطنه البلاد الاسيوية والامريكية . يعيش ازواجا لا يفصلها سوى الموت || قوته الجيف والحشرات والحيات لا يمت عنها ايما شامدها || انشاء تبيض اربع رفقات تحضنها بمثابة الذكر نحو اربعة اسابيع .

١٥٠٢ - أشبوريات

Polyboridae (S).

Polyboridés, (F). Polyboridae (E).

فصيلة طير من الصقور تنتمي الى فئة كواسر النهار تشمل ثلاثة اجناس وبعض الانواع . . جميعها متوسطة

القد . مستطيلة السقط والذنب . جالسة المنسر المنعطف البهرة . عارية الرسع . حادة الخالب || قوتها ما تصيبه من جيف وقامة عضوية مع ما تحويه من ديدان وحشرات . صوتها بازق مزعج . موطنها الشرق الاقصى وافريقية وامريكية . اما اجناسها فهي الاشبور والاكد والقوقش .

١٥٠٣ - أشتَر

Défectueux (F). Defective (E).

من به عيب .

١٥٠٤ - اشتراط حصّة الاسد ، اشتراط ضمني

Clause léonine (F).

هو شرط تكون نتيجة تنفيذه ان يحصل احد المتعاقدين او بعضهم على فوائد عظيمة جداً على حساب المتعاقدين الآخرين .

١٥٠٥ - اشتراك

Cotisation (F). Assessment (E).

هو ما يدفعه المشترك في النقابات والتعاونيات .

١٥٠٦ - اشتراك

Abonnement (F). Subscription (E).

هو تعاقد الى اجل معين بشئ اجالي يحول صاحبه تسلم ما اشترك به كنشرة دورية ومقدار من الماء او الكهرباء وغيرها .

١٥٠٧ - اشتراك بالفاصل

Mitoyenneté (F).

Joint property (E).

هو الاشتراك بالحاجز القائم بين ارضين متاخمتين . وقد يكون هذا الحاجز حائطاً او حفرة او سياجاً .

١٥٠٨ - اشتراكية

Socialisme (F). Socialism (E).

الاشتراكية مذهب اجتماعي سياسي ينادي بابدال الملكية الخاصة بالملكية العامة .

١٥٠٩ - أشترب أبيض

Rascasse blanche (F).

سمكة بحرية تدعى كورب اخشن ، اطلبه .

١٥١٠ - أشترب أحمر

Rascasse rouge (F).

سمكة بحرية تدعى جلاخ رثي ، اطلبه .

١٥١١ - أشترب أسمر

Rascasse brune (F).

سمكة بحرية تدعى جلاخ عفري ، اطلبه .

١٥١٢ - أشترب غار

Alhage (F). Alhagi (E).

هو العاقول ، شوك معروف تأكله الابل بشهية . وقد قيل فيه انه جيد للمعدة ويفتح الشهوة ويعين على الهضم .

١٥١٣ - اشترب العسل

Récolte du miel (F).

هو استخراج الشهد وجمعه .

١٥١٤ - أشجار حرجية

Arbres forestiers,

Essences forestières (F). Forest-trees (E).

الاشجار الطوعية او المزروعة في الاحراج كالصنوبر والتنوب والسنديان والبطم والمرعر الخ .

١٥١٥ - أشجار زينة

Arbres d'ornement (F).


هي الاشجار التي تزرع للزينة . Ornament-trees (E).

١٥١٦ - أشجار صناعية


Arbres industriels (F).

Industrial-trees (E).

هي الاشجار التي يستفاد من بعض اجزائها في الصناعات المختلفة كالمطاط والكيما والخور الخ .



إشال



أشبور

يستخرج من بعضها الشراس المعروف بلبن الطير . ومنها أنواع تزرع للتزيين . أشهرها ما يلي .

١٥٢٦ - إشراس الحنّش* ، صاصل الحنّش

Ornithogalum tenuifolium (S). Ornithogale vipérine (F). Fine leaved star of Bethlehem (E). Vogel milch (D). Ornithogalo a foglie strette (I).

نوع من الاشراس ازهاره وردية اللون . ينبت برياً في أكثر المناطق اللبنانية ويزرع للتزيين || يستخرج من بصله نوع من الشراس الجيد الصنف .

١٥٢٧ - إشراس خنّشي* ، Ornithogalum stachyoides, Ornithogalum arabicum (S). Ornithogale d'Arabie, Etoile de Bethléem (F). Star of Bethlehem (E). Milchstern (D). Ornithogalo, Stella di Betlemme (I).

نوع من الاشراس كبير الازهار . ازهاره خضر . ينبت برياً في بعض المناطق اللبنانية الفلسطينية السورية . يزرع للتزيين ويستخرج من بصله نوع من الشراس الجيد الصنف .

١٥٢٨ - إشراس صاجي* ، صاصل خنّشي* ، زنبطة

Ornithogalum umbellatum (S). Ornithogale en ombelle, Belle de onze heures, Dame de onze heures (F). Eleven o'clock lady, Common star of Bethlehem (E). Doldiger milchstern (D). Bella di undici ore. Latte d'uccello (I).

نوع من الاشراس . ازهاره صاجي التجميع . ازهاره بيض . يزرع للتزيين .

١٥٢٩ - أشران ، سُرة ، طغلق (S). Cotylédon (F). Cotyledon (E).

جنس نباتات عشبية حصيية معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه المعروفة ٦٠ معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها خمية متقابلة او متعاقبة . ازهارها سنبل التجميع او عنقودي . ازهارها انبوية ، مستطيلة ، متدلية بحيلة الالوان الزاهية || أشهر انواعه : اشران السحر والاشران السري .

١٥٣٠ - أشران السحر ، سُرة السحر ، زلائف الملوكة

Cotyledon horizontalis (S). Cotylédon horizontal Cotylet, Nombrii de Venus (F). Kidney-wort, Venus' navelwort (E). Venusnavelkraut (D). Ombellico di venere, Erba bellica (I).

نوع من الاشران البري والزراعي التزييني . اوراقه لحمية عريضة فارشة . شمراخه يعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره صغيرة القند ، قصيرة الالهان ، انقية الجلوس . تطول نحو ١٠ م . لونها الى الحمرة الزاهية الجميلة || ازهاره يستمر من اوائل ايار الى اواخر تموز .

١٥٣١ - أشران سري ، سُرة الارض ، خببر القنّاق

Cotyledon umbilicus (S). Colylédon ombillque, Gobelets (F). Navelwort, Pennywort (E). Gemelnes nabelkraut (D). Cappelloni, Ombellini, Scodelijne (I).

نوع من الاشران يكثر في الجبال بين الصخور . شمراخه يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره متدلية لونها الى الخضار الفستقي يعلوه موج وردي . ازهاره يستمر من ايار الى تموز وهو من النباتات الطبية ، عصيره مضاد للصرع ، يثير الشهوة الجنسية ويدبر البول .

١٥٣٢ - أشرة ، هرز ، طوي

Oviscapte, Tarière (F). Ovipositor (E).

١٥١٧ - أشجار مُثمرة* ، Arbres fruitiers (F).

Fruit-trees (E).

الاشجار التي تغرس لثمرها كالتفاح والاجاص والكرز والخوخ والبرتقال .

١٥١٨ - إشنخاص* ، أفبوس ، شلجم بري ، رحل

Euphorbia apios (S). Euphorbe à racine de navet (F). Pear-rooted spurge (E). Knollige wolfsmilch (D). Euforbio per terra (I).

نبات بري طهي من فصيلة الفربيونيات . جذوره غليظة يستخرج منها زيت طيار يشبه زيت الخردل . وهو من اقوى مضادات الحفر ، يسيل اللعاب وينضج العرق ويدبر البول وقد يفيد في الاوجاع العصبية المزمنة .

١٥١٩ - أشختر* ، دُتزيّا ، Deutzia (S). Deutzie (F).

جنس نباتات برية . وتزيينية معمرة من فصيلة القليبات مهددا الهند والصين واليابان . انواعها المعروفة نحو ١٥ بعضها تزييني . جميعها جنبات فناء تعلو من ٦٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها متقابلة بيضيه او مستطيلة الشكل نصلها جامد النسيج ، بارز العروق ، منشاري الحافة . ازهارها عنقودي او عنكولي التجميع ، ابطي الارتكاز ازهارها بيضاء اللون او وردية .

١٥٢٠ - إشنخيص* ، إداد ، شوك العلك

Atractylis gummifera (S). Atractyle, Carthame gommifère, Caméléon blanc (F). Spindle wort, White chameleon (E). Mastixdistel (D). Cameleone bianco (I).

نبات شوكي من فصيلة المركبات . سحاشفه كثيفة ، طويلة ، خلية ، غبراء اللون . اوراقه مختلفة الالوان لانها تأخذ لون النبات الذي يجاورها وهذا ما دعا الفرنج الى تسميته بالحرباء . ويسمى ايضاً اسد الارض لانه يقضي على اكثر النباتات القريبة منه . ومنهم من سماء قاتل الاسد لان بذوره اذا خلطت باللحم وأكلها الاسد قتله || جذوره سامة وطاردة للديدان . ويستخرج من عصارة سوقه مادة علكية تدخل في عدة مستحضرات طبية .

١٥٢١ - أشدق ٥ ، Sénestre (F). Sinister (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل النفاق لولبي يسير نحو اليسار اي بعكس سير عقارب الساعة .

١٥٢٢ - أشدق ٥ ، Mégastome (F). Megastomous (E).

الاشدق من كان مستعرض الفم واسع الشق .

١٥٢٣ - آشعر

شوكه ساق الحشرة اخصها الجرادة ، ج أشراه .

١٥٢٤ - إشرآب ، Imprégnation, Télégonie (F).

Impregnation (E).

هو في الوراثة عند الحيوان ان تلد الانثى من ذكر ثان اولاداً فيها صفات الذكر الذي سفدها قبل ولدت منه .

١٥٢٥ - إشراس ، صاصل ، صوصلاء

Ornithogalum (S). Ornithogale (F). Ornithogalum (E). جنس نباتات بصلية من فصيلة الزبقيات . سوقها قرصية ، شمراخها منتصب اجوف يحمل الازهار . اوراقها لحمية شبه خيطية طويلة جامدة . ازهارها عنقي التجميع . ازهارها سداسية البتلات منها البيض والخضر والصفر .



إشنخاص



أشختر




إشنخيص



إشراس الحنّش



إشراس خنّشي



إشراس صاجي

العضو الذي تستعمله بعض الحشرات كالجراد مثلاً لتغرز بيوضها في التربة .

١٥٣٣ - أشرج

هو من الدواب الذي له خصية واحدة .

١٥٣٤ - أشرف

Nésonyctéris (F).

هو الحيتوش نوع من الوطاريات . موطنه الشرق الأدنى . قوته البار على اختلافها .

١٥٣٥ - أشرف أبتر

Nésonyctéris tronqué (F).

حيوان من فصيلة الوطاريات يدعى حيتوش أبتر . اطلبه .

١٥٣٦ - أشريبات

Térébrants (F).

Terebrant, Burrowing (E).

مرتبة حشرات من رتبة هذبيات الاجنحة . تتميز بكبر روشنها الامامين ويمرر الانثى المنشاري الشكل .

١٥٣٧ - أشص

أشصت البقرة اذا غل لبنها وهي شصوص .

١٥٣٨ - إشنطاء

Tailage (F). Tilling, New shoots, Stools (E).

حصول سوق عرضية من براعم جانبية تنشأ في جنث الزرع الاصلي يقال لها الوالبة || وعدم الاشطاء في الزرع يدعى سمهرة . ويقال سمهر الزرع .

١٥٣٩ - إشعاع

Irradiation (F).

Irradiation (E).

الاشعاع كل حركة تنطلق من مركز وتشتع في جميع الاتجاهات .

١٥٤٠ - إشعاع

Radiation, Rayonnement (F).

Radiation, Radiance (E).

خاصة في الاجسام وهي ان تطلق حولها الحرارة التي تجمعت فيها || يقال لاشعاع النار : الاشعاع النوري والضياء .

Rayonnement diurne, Radiation diurne

Diurnal radiance (E).

ويقال لاشعاع الليل : الوضاء .

Rayonnement nocturne, Radiation nocturne

Nocturnal radiance (E).

١٥٤١ - إشعاعي

Radioactif (F). Radio-active (E).

١٥٤٢ - إشعاعية

Radioactivité (F).

النشاط الاشعاعي او الاشعاع الذاتي . Radio-activity (E).

١٥٤٣ - أشعة بارزة

Rayons émergents (F).

Emergent rays (E).

١٥٤٤ - أشعر

Villeux (F).

Villous, Villose (E).

من الحيوان ما هو كثيف الشعر .

١٥٤٥ - أشف

Jus de fruit (F). Juice (E).

الاشف هو عصارة نباتات الفصيلة القرعية ومنهم من خصه بعصارة النار فقط .

١٥٤٦ - أشق

هو الدورم ، اطلبه .

١٥٤٧ - أشق

Sagapénium, Gomme sérapique (F).

عصارة صمغية طبية لزجة تستخرج من القنمة الفارسية . ويدعونها لزاق الذهب لانها تلحمه .

١٥٤٨ - أشقح

اشقح البسر : لون واحمر واصفر . وشقح النخل : حسن باحماله (اللسان) .

١٥٤٩ - أشققر

Alezan (F). Chestnut (E).

من اثواب الخيل وهي صخرة ضاربة الى صفرة . واطراف الاشقر شقراء وكذا العرف والذنب .

١٥٥٠ - إشنقيل ، عنصل

Scilla (S). Scille (F).

Scilla, Squill (E).

جنس نباتات بصلية معمرة من فصيلة الزنبقيات . اوراقها قرصية مستطيلة وشاحية الشكل . ازهارها ساقى الازنكاز ، ازهارها فردية التجميع ، قصيرة الزناد ، سداسية البتلات ، يكثر فيها اللون الازرق وفيها الابيض والاحمر || انواعه المعروفة لا تقل عن ٨٠ اكثرها اسيوية ومنها افريقية واروبية || انواعه البرية الطبية كثيرة وعديدة المنافع تدخل في تركيب عدة مستحضرات وعقاقير . وهي تدر البول وتنشع الصدر || اما انواعه الزراعية فتستعمل للزينة وهي كثيرة الضروب جميلة الشكل مختلفة الالوان .

١٥٥١ - إشنقيل الخريف ، عنصل جرسى ، بصل الحبة

Scilla autumnalis (S). Scille

d'automne (F). Autumnal squill, Winter hyacinth (E).

Herbstblaustern (D). Scilla autumnale (I).

نوع من الاشقيل البري قوامه بصلة غليظة اجاصية الشكل بيضاء اللون . اوراقه قرصية مستطيلة ضيقة شديدة الخضار لامعة المواج ازهاره عنقودي التجميع يرتكز على ساق وحيدة . ازهاره صغيرة لبدية وردية اللون . بصله طبي لكنه اقل جودة من بصل الاشقيل البحري .

١٥٥٢ - إشنقيل الغاب ، عنصل منحن

Scilla nutans, Scilla nonscripta (S). Scille penchée,

Jacinthe des bois (F). Blue bell, Wild hyacinth (E).

Hasenblaustrern (D). Giacinto die boschi, Giacinto piccolo (I).

نوع من الاشقيل البري والزراعي قوامه بصلة متوسطة القد يرمعية الشكل بيضاء اللون . اوراقه قرصية غيولة مستطيلة ضيقة شديدة الخضار . ازهاره صغيرة زرقاء اللون فواحة العرف المستحب || ومنه ضروب زراعية زهرها الى الابيض والوردي والبنفسجي || زراعته لا تتطلب عناية خاصة غير انه يرغب في الاتربة القليلة الاندماج لانه يخشى الرطوبة المستحكمة كما ينضر من الاسفدة العضوية الجديدة .

١٥٥٣ - إشنقيل بحري ، عنصل بحري ، بصل الفار

Scilla maritima, Urginea maritima (S). Scille mari-

time, Squille, Charpentaire, Oignon marin (F).

Medicinal squill, Sea onion (E). Echte meerzwiebel,


Mauszwiebel (D). Scilla marina, Squilla, Cipolla ma-

rina (I).


نبات طبي بري وزراعي وهو اشهر انواع الاشقيل واعرفها . بصلتها كبيرة الحجم هرمية الشكل يبلغ طولها نحو ٢٠ سم وقطرها ١٥ سم . || منها ضربان مختلفان بلون اسدطهما وبسميتهما التجارية . الضرب الاحمر السفط المعروف



إشنقيل الخريف



إشنقيل الغاب



إشنقيل بحري

يستعمل للفسل كالصابون ويستخرج منه بالحريق والترييد ملح القلي .

١٥٦٢ - **أشنتان القصارين** هو الخرض ، اطلبه .

١٥٦٣ - **إشنتان القلي** * ، قلي ، أبو قباس ، خريس

Salicornia herbacea (S). Salicorne herbacé (F). Glasswort, Marsh samphire (E). Echtes glasschmalz (D). Salicornia herbacea (I).

نوع من الاشنان وهو نبات عشبي مداد يكثُر على الشواطئ البحرية . كانوا يستعملونه استعمال الصابون ويستخرجون منه بالحريق والترييد ملح القلي .

١٥٦٤ - **أشنتان داود** اطلب زوفا .

١٥٦٥ - **أشنة** Usnea (S). Usnée (F). Usneae (E).

جنس من الحزاز ، انواعه عديدة جميعها نباتات خيطية تعيش وتنمو على الاشجار والصخور || ومن اسمائه كشة العجوز وشية العجوز ومسوك القروء .

١٥٦٦ - **أشنة الصباغين** ، سادر وان

Orseille tinctoriale (F). Dyer's moss (E).

نوع من الحزاز يعيش وينمو على الصخور البحرية والجبليية . يستخرج منه صبغ احمر ارچواني . اجوده البحري وهو ما جاء من جزر المحيط ومدغسكر والهند .

١٥٦٧ - **أشنة خسية** هو الخس البحري ، اطلبه .

١٥٦٨ - **أشنة مهازية** * ، ديكرا Dicranum (S).

Dicrane, Bifurque (F). Dicranum, Forkmoss (E). Gabelzahnmoos (D). Dicrano (I).

جنس نباتات طحلبية من سبط المهازيات . انواعه زهاء ١٠٠ جميعها برية تكثُر في الغابات والخراج وعلى ضفاف الانهر . اوراقها صغيرة خيطية متقابلة ثنائية التصنيف . ازهارها جرابية الشكل ترتكز على زناد دقيق وتفتحي بقلنسوة محرابية مدببة مفلوجة الجانب .

١٥٦٩ - **أشنج**

هو من الدواب الذي احدى خصتيه اصفر من الاخرى .

Usnaceae (S).

Usnéacées (F). Usnaceae (E).

فصيلة من الحزاز عديدة الاجناس والانواع تتميز بمشراها الدقيق المستطيل . تعيش طفيلية على الاشجار فتتدل من الاغصان .

١٥٧١ - **أشهب** Gris (F). Grey (E).

لون من اثواب الخيل وهو اجتماع شعرات بيض وسود .

١٥٧٢ - **أشياء مباحة** Choses sans maître (F).

الاشياء المباحة هي التي لا مالك لها بينما هي بطبيعتها مقدورة التملك كالحیوانات الآيدة .

١٥٧٣ - **إشيانبات** Notopteridae (S).

Notoptères (F). Notopteridae (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة . اقليمها المناطق الجبلية المرتفعة . ارساغها مفصليية لخاسية العقل . اناثها مسلحة بممرز قوي .

١٥٧٤ - **أشيب** Hétérozygote (F). Heterozygote (E).

هو من الهجن ما كان زامع الصفات المتباينة البعيدة عن الاعتدال الوسطي .

بالاشقييل البحري الذكر او الاشقييل الاسباني . والضرب الابيض السقط المعروف بالاشقييل البحري الانثى او الاشقييل الايطالي || يستخرج من بصله جواهر ومواد وسوامض طيبة شائعة الاستعمال عديدة المنافع || والاشقييل الذكر انفع من الانثى واوفر مادة وخواصا .

١٥٥٤ - **إشقييل نجمي** * ، عنصل نجمي ، عيسلان

Scilla Amaena (S). Scille agréable, Jacinthe étoilée (F). Star hyacinth, S. flowered squill (E). Lieblcher blaustern (D). Scilla dei giardini, Giacinto di maggio Giacinto stellato (I).

نوع من الاشقييل الزراعي وهو نبات تزييني قوامه بصلة مستديرة الشكل بنفسجية اللون . اوراقه قرصية غيولة مستطيلة شاحبة الخضراء سوقه الزهرية عديدة وكل منها يحمل من الزهرة الى الثلاث زهرات ، لونها الى الزرقا السماجونية || ازهاره يدوم من نيسان حتى اواخر ايار .

١٥٥٥ - **أشكال الشجر** Formes des arbres

الهيئة الخارجية التي تأخذها الاشجار او نعطيها لها بالتشذيب والتقليم . ومن هذه الاشكال القدحي والهرمي والمردني والصيواني الى آخره .

١٥٥٦ - **أشكة** ، كولب Coulomb

وحدة قياس معقودة التعريف على اسم العالم الفرنسي كولب . تستعمل في قياس كمية الكهرباء التي تمر مدة ثانية واحدة في موصل مقاومته اوم واحد وقوته الحركة قولت واحد .

١٥٥٧ - **إشلاخ** Spermatogonie (F).

Spermatogonium (E).

هو الامار الثانوي في بعض الفطور المجهرية .

١٥٥٨ - **أشلاق** Sélaciens (F).

Selachian, Cartilaginous fishes

هي الشلفيات رتبة من السمك عديدة الفصائل والاجناس والانواع ، تتميز بخلوها من الهيكل العظمي ، باقحافها واعنتها الفقرية الفصروفية ، باعكامها الخشوية الخماسية الازواج ، بكبر زعانفها الصدرية ، بعظم جشها وبكونها بأكثريتها من السمك الولود || اشهر اجناسها الكوسج .

١٥٥٩ - **إشماس** ، سطرع ، ضبح Insolation (F).

Insolation, Sunstroke (E).

هي المدة من الزمن النهاري التي تتعرض فيها التربة ونباتها الى اشعة الشمس المباشرة .

١٥٦٠ - **إشنتان** Salicornia (S). Salicorne (F).

Salewort (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة السرمقيات . انواعه ثمانية ، اقليمها شواطئ حوض البحر المتوسط والمحيط الاطلسي || سوقها مفصليية امصوخية دقيقة . فروعها متقابلة عديدة الورق ، ازهارها سنبلية التجميع لا تويع لها ولا بتلة . ثمارها حقبة الشكل صغيرة . يستخرج منها بالترييد ملح القلي .

١٥٦١ - **إشنتان أبر ساق** * ، غاسول ، غسول ، أبو حنسا

Salicornia fruticosa (S).

Salicorne corail de mer (F). Lead grass, Crab grass, Frog grass (E). Glassch malz, Seekrappe (D). Salicornia legnosa, Erba kali (I).

نوع من الاشنان ينبت طبيعياً على الشواطئ البحرية .



إشقييل نجمي



إشنتان أبو ساق



إشنتان القلي




أشنة مهازية



أصابع العروس



اصبغة



أصدف



أصطرك

وفصيلة المحاريات ، أنواعها المعاصرة لا تتجاوز الخمسة اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي فبحار الصين || اصداقها مستطيلة الشكل ، قرينة الشبه بالاصابع ، لامتناهية المصاريح ، اغشيتها الداخلية لؤلؤية المادة . تكثر فيها الزرقاء الخضراء الموج || تعيش كامل حياتها على الاسفنج .

١٥٨٩ - إصداق Critère, Critérium (F).

Criterion (E).

الاصداق هو طابع الصواب الفاصل أو سمة الحقيقة الحاسمة . ج اصداقات ومصادق .

١٥٩٠ - أصدف Panard (F).

With out-turned feet (E).

الفرس الذي التوى سنكهة الى الخارج . وعكسه الاقصد . يقال اصدف اليدين واصدف الرجلين ، وهو من عيوب الخيل .

١٥٩١ - أصيرة Affinité (F). Affinity (E).

الأصرة والالفة والتجانس هي القرابة الشكلية مها كان مصدرها .

١٥٩٢ - أصيرة Goujon (F). Gudgeon (E).

رباط من حديد يستعمل في البناء لتقويته .

١٥٩٣ - أصص Empoter (F). To pot (E).

زرع في أصيص أو في مكن .

١٥٩٤ - أصطرك * ، لُبْنَى ، مَبْعَة

Styrax officinale (S). Aliboufier, Storax (F). Officinal storax, Styrax tree (E). Echter storaxbaum (D). Storace, Mellaina, Meluzzo salvatico (I).

جنية معمرة من فصيلة الاصطركيات مهددا الاقاليم الحارة . اوراقها متعاقبة معنقة بيضية . ازهارها خشوية ابطية صفراء اللون . تزرع لاستخراج صمغها الشهير المعروف باسم الميعة والذي يستعمل في تثبيت العطور . وهي تعرف ايضا باسم اسطراسه والطنست واسترك ولبنى عنبر ولبنى الرهبان ولبنى مسك .

١٥٩٥ - أصطركيات Styraceae (S).

Styracées (F). Styraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين متحدة القعالة ، مرتفعة المبيض . اجناسها ٧ والنوعها ٢٢٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والاستوائية || منها الاشجار والشجيرات والجنبات . ازهارها نظامية خشوية . اوراقها مختلفة الاشكال .

١٥٩٦ - إصطفاء Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

الاصطفاء هو احدى طرائق الاسفاد . قوامه ان يكون الذكر والانثى من نوع حيواني واحد وسلالة واحدة وعرق واحد كالأزواج جواد معني على حبر معنقة .

١٥٩٧ - إصطفاق Fluctuation

هو عدم الاستقرار على حالة معينة أو التغير الدوري المتناوب من حالة الى حالة .

١٥٩٨ - إصطفيلين اطلب جزر .

١٥٧٥ - أشيم ، ناكص Regressif (F).

Regressive (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الاحياء على من يرتد الى ما كان عليه قبل تطوره وارتقاؤه .

١٥٧٦ - أص هو الفنك الفضي .

١٥٧٧ - إصابات العمل Accidents du travail (F).

Injuries to workmen (E).

هي اصابة العامل ويراد بها وقوع اصابة في جسم العامل من جراء عمله ولتناسبة عمله . ويشترط ان يكون العامل مرتبطاً بعقد العمل أو باجارة النفس . وتختلف اصابة العامل عن مرضه لان المرض حالة لا تقع نتيجة مباشرة لحادث بعينه على ان من الامراض ما يسمى مرض الحرفة أو المهنة وهو يجري مجرى الاصابات ويكون رب العمل مسؤولاً عنه وان لم يخطئ . وتقتضيه مسؤوليته تعويضاً للمصاب .

١٥٧٨ - إصابَة ، حادث ، طارئ Accident

هو حادث عارض يقع فجأة ويسبب ضرراً بالنفس أو بالمال ويكون للمصاب الحق في مطالبة فاعله بتعويض اذا كان مسؤولاً قانوناً عن الاصابة .

١٥٧٩ - إصابَة ، عَدْوَى ، مِرَائِيَة Infection

انتقال الجراثيم المعدية الى جسم الحيوانات واصابتها بالمرض الذي تحدثه تلك الميكروبات بتكاثرها .

١٥٨٠ - أصابع العروس ، قَرْنَبُوش ، بِسَلَّة سَكْرِيَة

Tetragonolobulus (S). Lotier cultivé, Lotier pourpre (F). Four winged pea (E). Garten spargelerbse (D). Loto dei giardini (I).

نبات بري وزراعي من سبط اللوتيات وفصيلة القرنيات الفراشية . ثماره قرنية حبها حلو الطعم مأكول ومنهم من يستعمله ، بعد تمام ادراكه وتجفيفه وتخميصه ، استعمال البن . وهو من النباتات العلفية وازهاره تنفع في معالجة البواسير ونفيعها يفيد من التهابات العين .

١٥٨١ - أصابع الفينات اطلب ريحان بري .

١٥٨٢ - أصابع صُفر اطلب كركم صباغي .

١٥٨٣ - أصابع هَرْمِس اطلب شقيل .

١٥٨٤ - إصَاد ، إصَادَة Chape (F). Cap. Cover (E).

غطاء الانبيق وكل غلاف يمنع ترشيع الماء أو نفوذه .

١٥٨٥ - إصَار Herbe (F). Herb, Grass (E).

الاصار والاصارة : الخشيش .

١٥٨٦ - إصْبَع العَدْرَاء اطلب ديجيتال .

١٥٨٧ - إصْبَعِي Dactylé, Dactyloïde, Digital (F).

Dactyloid, Digital (E).

نعت نباتي وصفي يدل على ما شكله شكل الاصبع .

١٥٨٨ - إصْبَعِيَة * Vulsella (S). Vulselle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم

١٦١٢ - أصليّ ، خلقيّ ، فرجيّ (F). Congénital (F).
Congenital (E).
الأصلي كالحلق والفرجي نعت يدل على صفة حنة أو سيئة يتصف بها الحيوان منذ ولادته .

١٦١٣ - أصليات (S). Pythonidae (S).

Pythonidés, Pythoniens (F). Boidae (E).
فصيلة حيات من عديمات الاخاديد فيها البواء والأصلة وغيرها .

١٦١٤ - إصماغ اطلب تصنع .

١٦١٥ - أصوف ، صائف (F). Lanifère, Lanigère (F).
Laniferous (E).

١٦١٦ - أصول مباشة (F). Principes immédiats (F).
Immediate elements (E).
آخر مواد يمكن تجزئتها افراداً بوسائل ميكانيكية دون حلها بالوسائل الكيماوية . كالسكر والنشا والآح والدهن .

١٦١٧ - آصى

آصى وابن آصى : طائر من الخدء يعرف بالخدأة الحمراء .

١٦١٨ - أصيص (F). Pot, Vase en terre, Terrine (F).
Pot, Earthen pan, Dish (E).
الاجانة الصغيرة التي تزرع فيها الرياحين . وقد يسمى نسبة الى ما هو منه كما يلي : اصيص اذا كان من فخار . مكن وغضسارة اذا كان من خزف . صواع اذا كان من معدن .

١٦١٩ - أصيل (F). Pur-sang (F). Thorough-bred (E).
نعت يطلق على كل حيوان اهلي صريح السلالة الصافية المنتخبة .

١٦٢٠ - أصيل ، بازيد ، دعامه (F). Baside (F).
Basidium (E).
خلية فطرية طرثوية كبيرة مستطيلة محمولة على الغشاء الارثوئي تتكون فيها البزور .

١٦٢١ - إضاءة ، إنارة (F). Luminescence (F).

١٦٢٢ - إضاضة (F). Géophysique (F).
Geophysis (E).

الاضاضة علم يبحث في وثل الكرة الارضية .

١٦٢٣ - أصاليا ، دهلية (S). Dahlia (S).
Dahlia, Georgine (F). Dahlia, Georgina (E). Gärten-dahlia, Georgine (D). Dalia, Glorgina pruinosa (I).
جنس نباتات عشبية عشقوية معمرة من فصيلة المركبات . انواعه عديدة جميعها مكسيكية المهد وقد صار تهجينها وتاصيلها واستنخابها بعد ان شاع استعمالها التزييني نظراً لضخامة زهرها وجمالها وبهاء ألوانه || يستخرج من عساقها الاهليلجية الشكل مادة نشوية تجانس الانولين وتستعمل استعماله تدعى دهلين (Dahline) || تتكاثر الاصاليا عادة بزرع درناتها خلال شهري نيسان وايار ، وقد تتكاثر بالبذر بيد انه لا ينتج الا ازهاراً قليلة الطاقة قليلة البتلات || اما انواعها المشهورة التي كانت ولا تزال محور التهجين والتصلب واساس معظم الضروب الحالية المعروفة فهي ما يتبع .

١٥٩٩ - أصعل (F). Brachycéphale (F).
Brachycephalic (E).
من نعوت تصنيف الدواجن معناه قصير الرأس .

١٦٠٠ - أصغريّات ، صغروريّات (S). Ptilidae (S).
Ptilidés (F). Ptilidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة تضم اصغر انواع الغمديات . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شبه بيضية الشكل ، شديدة الصغر . أطوالها لا تتجاوز ١ سم . رواشها مهدبة . اغمارها لاحقة || تعيش في الجثالة والدودي النباتي . يبدو ان قوتها بوج العفنيات || اشهر اجناسها الصغورور .

١٦٠١ - أصف (F). Oreille de lapin (F).
Ear of rabbit (E).

الاصف هو اذن الارنب وكل اذن ضيقة مستطيلة منتصبة .

١٦٠٢ - أصف الاصف والأصف هو الكبر الشائك .

١٦٠٣ - إصفاق (F). Soutirage (F). Drawing off (E).
الإصفاق والصفق والتصفيق تحويل الخمر وما اشبه من اناء الى اناء لتصفو .

١٦٠٤ - إصفرني

سمكة بحرية مأكولة ، اطلب اسفربي .

١٦٠٥ - أصفع أصفع الزرع : افرك وبلغ الادراك .

١٦٠٦ - أصفق القواديم (F). Crassipenne (F).
نعت تعريفي يطلق على كل جناح كثيث القواديم والريش .

١٦٠٧ - أصل (F). Sélectionner (F). Select (E).
أصل النبات تأصيله اصلحه وحسنه .

١٦٠٨ - أصل ، مهّد ، منشأ (F). Origine (F).
Origin (E).
مرتكز الشيء ومستنده الطبيعي الطوعي .

١٦٠٩ - إصلاحات زراعية (F). Améliorations agricoles (F). Agricultural améliorations (E).
هو التعبير عن كل تحسين من شأنه الاصلاح لزيادة الفائدة ان في البذار او الزرع او البقول او الموائج او الآلات الى آخره .

١٦١٠ - أصلّة (F). Python (F).
جنس ثعابين كبيرة من فصيلة الاصليات . انواعها ٩ جميعها من ثعابين المناطق الحارة وهي اكبر واضخم زحافات هذه الفصيلة ، يبلغ طول بعضها الثمانية امتار وقطرها لا يقل عن ٢٥ سم . وهي غير سامة تبتلع فريستها وتسحقها ثم تهضمها . تعيش بين اسل المناقع وفي وحل الانهر . تسرح وتصيد في الليل . ترغب في السمك لانها تقضي معظم اوقاتها في الماء .

١٦١١ - أصلّم (F). Essorillé (F). Ears-cut (E).
الأصلّم من الحيوان هو المقطوع الاذنين . ج صلّم .



أصلة



أصاليًا أرجوانية

nule odorante (F). Gland bell-flower (E). Liliender usenglocke (D). Campanula odorosa (I).

نبات عشبي زراعي تزييني جميل الأزهار العطرية من فصيلة الجريسيات . جذوره درلية . أوراقه صغيرة مستطيلة . أزهاره يدوم نحو أربعة أشهر . يتكاثر بالبزور والدرن . يرغب في الأتربة الحوارة . يخشى أشعة الشمس اللاذعة .

١٦٣٦ - إطار Cadre (F). Frame (E).
الإطار هو كل محيط بشيء .

١٦٣٧ - إظام داء يصيب الهم فلا تبول ولا تبعر .

١٦٣٨ - إطان Echan
حاشور زراعي سائل يرتكز على مادة الباراسيون يستعمل محلولًا بالماء بمعدل ٢,٥ ٪ في مكافحة دودة التمار وغيرها من الديدان والحشرات .

١٦٣٩ - أطباء الكلبة اطلب دبق .

١٦٤٠ - أطلد هو الخفض ، اطلبه .

١٦٤١ - أطر ، عثر ، بدلية Buddleia (S).
Buddleie, Buddleie (F). Orange ball-tree, Buddle (E). Sommerfließer, Buddleie (D). Budleja (I).

جنس نباتات برية وتربينية معمرة من فصيلة الخنازيريات . مهدها البلاد الحارة . أنواعها نحو ٥٠٠ منها الأشجار والشجيرات جميعها قدحية الهيكل والشكل فناء الفروع . أوراقها متقابلة معنقة سنانية النصل . أزهارها نورية تاجية الارتكاز سنبلية التجميع رباعية البتلات ، مأنوسة العرف . تخشى البرد لذلك يحسن غرسها في المزارع الدافئة مع اجتناب المعارض الشمالية .

١٦٤٢ - أطر أو ندي هو الراوند الذكر .

١٦٤٣ - أطرُب اطلب بلادون .

١٦٤٤ - أطرة Couronne (F). Crown (E).
هي اكليل الحافر مركزها اعلى الحافر تحت الرسغ .

١٦٤٥ - أطرَد

اطرد النعم والماعز : ارسل ليهب الاكباش والنيوس .

١٦٤٦ - أطرُعامة هي الرغبة ، اطلبها .

١٦٤٧ - أطرور * Atherurus (S). Achérure (F).
جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الشبميات . انواعه قليلة موطنها بعض المناطق الاسيوية والافريقية . اجسامها ربعة تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . اذنانها كاسية تطول نحو ١٥ سم . وتنتهي بخصلة من الهلب سنبلية الشكل مبطلة || رؤسها مستطيلة . مقاضها مقطومة . اذنانها بادية منتصب . جرامزها قصيرة . اطرافها قوية حادة . ظاهر اجسامها يكسو الهلب والشوك الذرب القصير . تالف الحقول والمراعي والقباني والقيعان . احببها اتفاق تلشي بردها تغور في التربة نحو ٦٠ سم . تخرج في الليل . قوتها الاعشاب والجذور وجميع المواد النباتية والحشرات والوزغ والعطاء والافاعي || انثاها تضع من درصين الى اربعة ادراص تخلق باصرة كاسية .

١٦٤٨ - أطروط Truite (F). Trout (E).
سمكة نهريّة من السلمونيات تعرف بالتروته .

١٦٢٤ - أصاليًا أرجوانية * Dahlia coccinea (S).

Dahlia écarlate, D. cocciné (F).
نوع من الاصاليات عديد الضروب والسلالات . يعلو من ٤٠ الى ١٣٠ سم . ساقه وفروعها بحرية اللون . أوراقه مركبة متقابلة . وريقاته مدببة الاطراف ، نصلها الى الخصار القاتم . أزهاره كبيرة القد مستعرضة البتلات المتماوجة الكثيرة العدد الزاهية الالوان احمر . يكثر فيها الارجواني .

١٦٢٥ - أصاليًا إمبراطورية * Dahlia imperialis (S).
Dahlia impérial (F).

نوع من الاصاليات وهو جنبه كبيرة القد تعلو من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم . ساقها غليظة ، فروعها عديدة متشعبة . أزهارها متدلية ، جرسية الشكل تطول من ٦ الى ٨ سم . بينا قطرها لا يقل عن ١٠ سم . لونها الى البياض العاجي . طرفها اصفر . أزهارها خريفي .

١٦٢٦ - أصاليًا شائعة ، أصاليًا حدة ثقيفة

Dahlia variabilis, D. pinnata (S). Dahlia commun, D. des jardins (F).

تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها فرعاء . أوراقها باعثة الخصار اللامع . أزهارها كبيرة القد ، متباينة الاشكال والالوان ، مستطيلة البتلات المنبسطة او الملتفة على نفسها ضروبها كثيرة العدد منها المكسبة والطاوية . أزهارها خريفي .

١٦٢٧ - أصاليًا وردية * Dahlia rosea (S).

Dahlia rose (F).
نوع من الاصاليات عديد الضروب والسلالات . يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه عديدة الفروع ، خضراء اللون . أوراقه مركبة متقابلة شديدة الخصار . أزهاره كبيرة القد ، وردية اللون . أزهاره خريفي .

١٦٢٨ - إضبارة نباتية ، إضيامة نباتية ، إضشاشة

Herbier (F). Herbarium (E).
مجموعة اعشاب او نباتات مختلفة جففت وحفظت للدرس والاستشهاد . ج اضابير واضاميم واحاشيش .

١٦٢٩ - إضحيان نبات كالاتحوان .

١٦٣٠ - أضرار Dégâts (F). Havas (E).

هي الخسارة المادية التي تقع من جراء عمل ما او جائحة مماثلة .

١٦٣١ - أضراس الكلب اطلب بسبايج .

١٦٣٢ - إضراع ، ترميد Parturition (début) (F).

Parturition (lead) (E)
اضرعت البقرة والشاة والعنز : اشرق ضرعها قبل الشاج وعظم ، فهي مضرع .

١٦٣٣ - إضرام Caloricité (F). Caloricity (E).

الاضرام خاصة يتمتع بها كل حيوان ، من ذوات الاعضاء . تمكنه من نشر بعض الحرارة .

١٦٣٤ - أضنفور Adénophore (F).

حامل صغير بعض الغدة الرحيقية الزهرية في بعض النباتات .

١٦٣٥ - أضنفوره ، غرّ الجميل ، فطومه


Adenophora communis (S). Adénophore, Campa-



أصاليًا إمبراطورية



أصاليًا وردية



أطر



أطرور

Feeding (E).

هو مد النجسل الذي خلت قفرانه من العسل بالقوت
الضروري أثناء فصل الشتاء .

١٦٥٧ - إطفار

الاطفار نجم ثير صغير يتقدم النسر الواقع في كوكبة
نجوم القيثارة .

Flanc (F). Flank (E).

١٦٥٨ - إطل

جزء الجسم ما بين الاصلع والحجبة .

Loup argenté (F). Silver wolf (E). ١٦٥٩ - أطلنس

هو الذئب الذي في لونه غبرة الى سواد .

Atalantia

١٦٦٠ - أطلنثيا

جنس اشجار وجنبات شائكة من الحمضيات السذابيات .
انواعها قليلة مهدا آسية الاستوائية وبعض مناطق استراليه .
ثمراها لا تؤكل وهي برتقالية الشكل والحجم واللها ،
طعمها الى المارة الحامزة كما في النارج . || تزرع لزهورها
العطرية وتستعمل كطعامات لمختلف انواع البرتقال .

Atlanta (S).

١٦٦١ - أطلنطة

Atlante (F). Atlanta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعها المعروفة قليلة
العدد جميعها يمية لا تقرب الشطوط . اسرابها وافرة العدد ||
اصداؤها نحيلة شفافة ثنائية الجراب الخلزوني الاكثر .
دورتها الخلزونية يمينية تنتهي عند السرة . سقاطها دقيق
جامد شفاف . زعنفتها وحيدة ورقية الشكل بمجزة بمحجم .
رأسها كالخطم ، لها يحتل المقدم . لوامسها انبوية .
عيونها جاحظة . خياشيمها مشطية الشكل .

Atlantidae (S).

١٦٦٢ - أطلنطيات

Atlantides (F). Atlantidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
اللامتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد بعضها
من متحجرات الحلقة الكربونية والبعض الآخر يمي لا
يقرب الشطوط || اعطانها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة . تسبح وتعم على ظهورها . تتميز باصداؤها
الرقيقة الشفافة وبالوانها القسطنائية || اعرف اجناسها
واسمها الاطلنطة والاكسيجيرس والبلرفون .

١٦٦٣ - أطماط هو الكوئل من النخلات ، اطلبه .

١٦٦٤ - أطموط اطلب عند قارح .

١٦٦٥ - أطن* ، فهنة ، أرنبية

Arnebia (S). Arnébie (F). Russian bugloss (E). Arne-
bie (D). Arnebia (I).

جنس نباتات عشبية من فصيلة الحمحميات انواعها عديدة
منها البرية والصباغية والتزيينية التي تزرع لزهورها .

١٦٦٦ - أطوم* ، زليخة ، ملىصة ، نافلة البحر

Halcore cetacea (S).

حنفاء

Dugong (F). Halicore, Dugong (E).

جنس حيوان بحرية لبونة عاشبة من نبات الماء الخيلان .
مؤخرها كؤنخر الحوت ولها يدان كأنها زعنفتان . موطنها
المحيط الهندي والبحر الاحمر وجوارها . تعيش جماعات ،
سرحها الليل . ترعى الاعشاب البحرية الساحلية . اجسامها

Buddléées (F). Buddleae (E). ١٦٤٩ - أطريات

سبط من فصيلة الينازيريات . انواعه زهاء ٧٥ جميعها
اشجار وشجيرات وجنبات . اقليمها المناطق الاستوائية
والجنوبية الاسيوية والامريكية || اشهر انواعه الزراعية
الأطر ، اطلبه .

١٦٥٠ - أطريال* ، سرفل ، جزر الشيطان

حشيشة البرص ، حشيشة البهاق ، رجل الغراب

Carum ammioides (S). Cerfeuil (F). Cerfollum,
Chervil (E). Kerbel (D). Cerfoglio (I).

نوع من الاطريلال وهو نبات طبي بري جزيل النفع
لانه يشفي البهاق ويدخل في عدة علاجات اخصها علاجات
الصدر والكلبي والمثانة || اوراقه متعاقبة منعقة مركبة
شديدة التفريص . ازهاره صيواني التجميع طويل الزناد .
ازهاره بيض . ثماره بزور صغيرة سود البشرة الملساء .
السوق والاوراق والازهار والبزور جميعها عطرية العرف
المستحب .

Eleotris (S).

١٦٥١ - إطرير

Eléotris (F). Eleotris (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة
القويونيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار
المناطق الحارة . معظمها يعيش قرب مصبات الأنهر ||
اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبطيط ، متفاوتة
الطول الذي يراوح من ٧ الى ٣٠ سم . تتميز بظهورها
الجالسة الخط وبزعانفها الكبيرة المزخرفة التي تبدو كأنها
مطرزة . زعانفها الذيلية كبيرة القد ، مستديرة الاطراف .
اخطامها قصيرة ، منفرجة الاشدق || لحومها كاعنة
الصنف ، قل من يرغب فيها .

Menyanthes (S).

١٦٥٢ - إطريفل

Ményanthe (F). Menyanthes (E).

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة الجنطياتيات .
انواعه قليلة . سوقه جذمورية . اوراقه مركبة ثلاثية
الفصوص ، متعاقبة منعقة طويلة المعاليق . ازهاره عشقودي
او سنبل التجميع يرتكز على زناد امرط طويل . ازهاره
بحيلة الشكل لونها الى الياض الوردية || مهدا سناع
البلاد المعتدلة ، اشهرها الاطريفل النفلي .

١٦٥٣ - إطريفل نفلي* ، نفل الماء ، بوسم الماء

Menyanthes trifoliata (S). Ményanthe, Trèfle d'eau,
Trèfle des marais (F). Buck-bean, Bog-bean, Marsh
trefoil (E). Sumfieberklee, Fieberklee, Bocksboh-
ne (D). Scarfano, Trifoglio d'acqua (I).

نوع من الاطريفل وهو نبات عشبي بري طبي معمر
يكثر وجوده في المناطق ويزرع في احواس المساء .
يستخرج من اوراقه مادة طيبة فعالة تدعى منيانثين
(Ményanthine) || وفي بلاد الانكليز والمانيا
يحققون الاوراق ويستعملونها استعمال الجنجل .

Carum

١٦٥٤ - أطريلال

جنس نباتات محولة او معمرة من فصيلة الخيميات ، انواعه
نحو ٥٠ معظمها بري وبعضها زراعي . اشهرها الاطريلال
والسرفل والكراويه والكمون والبقدونس والتفوطه .

١٦٥٥ - أطريون هو القشاة البري .

Nourrissement (F).


١٦٥٦ - إطعام النحل




أطريال



إطرير



إطريفل نفلي



أطلنطة



أطن



أطوم

١٦٧٦ - أَظْفَار الذِّئْب

كوكبان أبيضان صغيران قدام الذئبين من كوكبة التنين ، بين العوازل والفرقدين .

١٦٧٧ - أَظْفُور

Crampon (F). Cramp-iron (E). جذر عرضي هوائي دقيق وقصير يتخذ النباتات المتسلق أداة للتثبيت بالجدران وغيرها من العوائل .

١٦٧٨ - أَظْلَف

Bisulque (F). نعت تعريفي يطلق على كل حيوان من ذوات الظلف .

١٦٧٩ - إِعَارَة

Prêt (F). Loan (E). عقد يدفع به المرء الى غيره منقولا او عيناً او شيئاً معيناً بنوعه ليستعمله زمناً محدداً ثم يرد .

١٦٨٠ - إِعْبَال

Effeulaison, Effeullement (F). Fall of the leaves (E). سقوط الورق الطبيعي او اقتزاعه والقائه أرضاً .

١٦٨١ - أَعْبَل * ، غرانيت

Granit (F). Granite (E). حجر متبلور شديد الصلابة مختلف الالوان اعماها الوردي والاشهب والاسود .

١٦٨٢ - إِعْتْدَاء

Empiètement (F). Encroaching (E). هو وضع اليد على جزء من ملك الغير وضه الى ملكه .

١٦٨٣ - إِعْتْدَال

Equinoxe (F). Equinox (E). مدة معادلة الليل والنهار .

١٦٨٤ - إِعْتْدَالِي

Equinoxial (F). Equinoctial (E).

١٦٨٥ - إِعْتْدَالِي ، تَوَازُئِي

Statique (F). Static (E).

١٦٨٦ - إِعْتَرَق

راجع استغرق .

١٦٨٧ - إِعْتَشَاب

Herborisation (F). جمع النباتات ودرسها وتصنيفها . Herborization (E).

١٦٨٨ - إِعْتَمَد

Accréditer (F). To give credit (E). الاعتماد في لغة التجار هو ارسال كتاب الى احد المعاملين مع الطلب او الرجاء بفتح ائتمان مالي لاحد العملاء .

١٦٨٩ - أَعْثَل

Acère (F). Acerous, Hornless (E). نعت تعريفي يطلق على الحيوان العادم القرون وعلى الحشرة العادمة الزباني وعلى الدويبة العادمة اللوامس . م. عثلاء .

١٦٩٠ - أَعْجَف ، جَعَف ، نَكَد

Dépaissance, Pacage (F). Pasture-land (E). المرعى القليل الكلا أو الردي الأنواع العشبية .

١٦٩١ - أَعْجُوبَة ، مِيرَا

Etonnante, Mira (F). Mira (E). الاعجوبة او اعجوبة قيطس او ميرا ، نجم نير من كوكبة قيطس مركزه في العنق . راجع قيطس .

١٦٩٢ - إِهْدَاء ، عَدْوَى ، دَتَس

Contamination (F). انتقال المرض من جسم مصاب الى جسم سليم لا يتمتع بالمناعة الذاتية .

غليظة ، متوسط طولها نحو ٣٠٠ سم . لحمها مأكول . جلدها يصلح للتعال || وهي من الحيوانات الشديدة الخدر تصعد الى سطح الماء للتنفس فقط ثم تغوص . تزواجها خفي تمارسه في البحر . يقال ان الانثى تحمل نحو ١٢ شهراً .

١٦٩٧ - أَطُومِيَّات

Halicoridae (S). Halicoridés (F). Halicoridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة عاشية من رتبة الخيلان اي بنات الماء || انواعها عديدة يجمعها جنس واحد الاطوم . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي وشطوط استراليا وغينيا الجديدة || ملجئها الحياقي جماعي . تخرج في الليل مرتعها الاعشاب البحرية الساحلية || ذكورها اكبر قدماً من اناثها . ويتميز الذكر ايضاً بنباب كبير بارز يخرج من الفك العلوي || اعرف انواعها واشهرها الاطوم ويدعى الزالحة والحنفاء وناقة البحر .

١٦٩٨ - أَطْيَار

Oiseaux (F). Birds (E). الاطيار والطيور والطيء صف حيوانات من الفقاريات يقسم الى الجوزجريات والموادي .

١٦٩٩ - أَطْيَرَة *

Avícula (S). Avicule (F). Avicula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم عادات المتاعب وفصيلة الاطيريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصداقها متباينة الاشكال والاحجام ، بعضها مستدير الشكل قريب الشبه بالشمع . مصاريعها محدبة لامتناهية صفيحية الخارج ، لؤلؤية الداخل || تعيش لاصقة بالصخور المنعمرة .

١٦٧٠ - أَطْيَرِيَّات

Aviculidae (S). Aviculidés (F). Aviculidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم عادات المتاعب . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها الغابرة المبعثرة في الاراضي الجورية والطباشيرية ومنها المعاصرة المنتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها شبه مستديرة ، صفيحية ، محدبة ، لامتناهية المصاريح ، لؤلؤية الغشاء الداخلي المتفاوت السماكة || معظم انواعها يعيش لاصقاً بالصخور المنعمرة والبعض الآخر متنمناً في الرمال || اعرف اجناسها واشهرها الاطيرة والملاسة والصيرم والملطاس والبرنة والشمع .

١٦٧١ - أَطْيَش

راجع ابله .

١٦٧٢ - أَطْيَمَة

Foyer (F). Fireplace (E). الاطيمة : موقد النار . ج اطائم .

١٦٧٣ - أَطْيَنِي


اطلب شجعية .

١٦٧٤ - أَظْفَار

Aladfar الاظفار وتدعى ايتا الشلياق مجموعة نجوم صغيرة من كوكبة القيثارة المعروفة ايضاً بالسلفاء .

١٦٧٥ - أَظْفَارُ الْجَنِّ

قال داود الانطاكي : « هو نبات بلا نور ولا ورق ولكنه يخرج مصاليج الى الارض ما هي كأنها فراصة الظفر الى سواد وغبرة » || وهو من النباتات الطيبة العربية - اليونانية .



أطيرة



أعبل

١٧٠٣ - **إِعْصَال** (F).
Ridding of caterpillars (E).
القضاء على الاسباع والديدان .

١٧٠٤ - **إِعْفَاء**
الاعفاء : كلمة شاملة عديدة المعاني اخصها .
إعفاء (F). Dispensation (E).
هو ان يعفى المرء من القيام بعمل نيظ به .
إعفاء (F). Exonération (E).
هو ان يعفى المرء من واجب فرضه القانون .
إعفاء (F). Acquittal (E).
هو الحالة المتوسطة بين التبرئة والادانة .

١٧٠٥ - **أَعْقَرُ*** ، ظبي عَرَبِيّ (S).
Gazelle de l'Arabie (F). Gazelle arabica (E).
نوع من الظباء وهو اضعفها عدواً . متوسط القد ، اهيف القوام ، قصير العنق ، صغير الرأس ، ثوبه الى الجؤوة الغبراء يزيد اسمراراً مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنه الى البياض || اجله من ٥ الى ٥٠ ، موطنه الجزيرة ، شائع في الحجاز ويكثر في بلاد الشام .

١٧٠٦ - **أَعْقَى** ، أَفْرَخَ ، أَمْلَحَ (F).
Drageonner (F).
هي قابلية الاشجار الى الاعقاق والافراخ والملمخ .
Sucking (E).

١٧٠٧ - **إِعْقَال** (E).
Bouturage (E).
Propagation by slips (E).
الاعقال اي غرس العقلة هو تكثير النبات بغرس اجزاء منه قطعت من اغصانه وفروعه وما اشبه .

١٧٠٨ - **أَعْقَى**
أعقت الفرس ، اذا لم تحمل وهي عقوق .

١٧٠٩ - **أَعْقَصَ**
الاعقص من التيبس ما التوى قرناه على اذنيه من خلف .

١٧١٠ - **أَعْقَفَ** ، مَعْقُوف (F).
Crochu (F).
Hooked (E).
شكل هرة منسر جوارح الطير .

١٧١١ - **إِعْطَافَ الْمَاشِيَةِ** (F).
Affouragement (F).
تقديم الحشيش والعلف للبهيم .
Foraging, Foddering (E).

١٧١٢ - **إِعْلَان** ، إِقْرَار ، شَهْر ، تَصْرِيح (F).
Déclaration, Notification, Signification (F).
Déclaration, Notification, Signification (E).
هو الابانة عن حالة قانونية او فعلية قائمة .

١٧١٣ - **أَعْلَفَ الْمَاشِيَةِ** (F).
Affourager (F).
قدم لها العلف ، راجع جدول العلف .
To fodder (E).

١٧١٤ - **إِعْلِيْطَ** (F).
Dénudé (F).
Dénudé (E).
ما سقط ورقه من الاغصان والقضبان .

١٧١٥ - **إِعْمَار** (F).
Mise en valeur (F).
Développement (E).
الاعمار القيام بالاعمال اللازمة للاستثمار .

١٧١٦ - **أَعْنَسَ** ، أَعْنَشَ (F).
Ayant six doigts (F).
Six-fingered (E).
من كان سداسي الاصابع .

١٦٩٣ - **أَعْرَاضُ الْمَرَضِ** (F).
Symptômes (F).
Symptoms (E).
هي العلامات غير الطبيعية التي تبدو في الحيوان او تظهر على بعض اعضاء النبات || اخصها في الحيوان عدم الشهوة الى الأكل او الامتناع عنه ، ارتفاع حرارة الجسم ، الكربة ، القلق ، الاضطراب ، اللهث ، العطش ، الامساك ... || اما في النبات فظهورها الخارجي يقع في الاوراق او تجعد او ذبول . جفاف في بشرة النسيج . ظهور تزايدات او افرازات ، الخ .

١٦٩٤ - **أَعْرَقَ** ، عَرَّقَ ، شَرَّشَ (F).
Enraciner (F).
To root, To implant (E).
مكن النبات من ابراز جذوره ومدها .

١٦٩٥ - **أَعْرُوَان** ، عُرُوَّة (F).
Plante à feuilles persistantes (F).
Persistent leaf (E).
من النبات ما لا يسقط ورقه في الشتاء .

١٦٩٦ - **إِعْسَار** ، تَوَى (F).
Insoiabilité, Déconfiture (F).
Insoiency (E).
هي الحالة التي يكون فيها من لا يقوى على دفع ديونه .

١٦٩٧ - **أَعْسَامُهُ تَحْلِيَّة** (F).
Zoomorphie, Morphologie externe (F).
Zoomorphy, External morphology (E).
هو التعريف الواقعي والوصف الشكلي للجسم والحلقة في الحيوان والنبات || اما درس التركيب الباطني فيسمى شوزبة .

١٦٩٨ - **إِعْشَاب** (F).
Essartage, Essartement (F).
Grubbing (E).
اقتلاع الاعشاب المضرة .

١٦٩٩ - **أَعْشَابُ مُضَرَّة*** (F).
Herbes nuisibles (F).
Hurtful herbs (E).
الاعشاب المضرة هي التي تنبت طبيعياً في الحقول والبساتين والحدائق وهي كثيرة الاجناس والانواع معظمها من النباتات الطوعية التي تستنزف عناصر التربة الغذائية وتمنعها عن الزروع والبقول || اضرها واعها انتشاراً ما يلي : الأخيليا أم الف ورقه والاريفارون والاسل والامسوخ والانجبار والانجرة والببش والتفاف والنوم البري والشيل والجمعيل والخرمل والحلوب والحميمس وحميمس المنافع والحوذان والخردل البري وخرطال فتوا والخرم والمان والدوسر وذيل الثعلب والرينثوس وزهر الكشائبين والزوان والسراخس والسعادي والشقار وشقائق النمان وشمر الكلب والشوك والشوكران والطحالب والعراوة وعشبة القوى والعليق وعوى الدجاج والفيطل والفجيل والفريون والفرفارة والفوننج والقرطب والقصوان والقنطريون والكرسنة البرية والكرفس النبطي والكشوث واللباب واللبنى واللبن واللحاح ولسان الحمل واللوف المبقع والمشغيل والتجير والمهدال .

١٧٠٠ - **أَعْشَار** ، عَوَاشِر (F).
Rémiges primaires (F).
Wing primaries (E).
الأعشار والعواشر هي قوادم ريش الطائر .

١٧٠١ - **أَعْصَابُ الْحِسِّ** (F).
Sensilles tactiles (F).
Tactile sensils (E).

١٧٠٢ - **إِعْصَار** (F).
Cyclone (F).
هي الزوبعة الهائلة السرعة والضغط التي تخرب كل شيء .



زوان




تفاف



شوكران



ثيل



فريون



حلوب



قرطب



حميمس



لباب



خرطال فترا

أَعْشَابُ مُضَرَّة



أعفر

١٧١٧ - أعشش

الأعشش من له ست أصابع .

١٧١٨ - أعششون

هو الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات .

١٧١٩ - أعشج

Oblique

هو الخط المنحرف المائل بين اتجاهين عمودي وأقي .

١٧٢٠ - أعشور ، ميمرغمة

Caecum (F).

Caecum (E).

الاعور هو القسم الرئيسي من المعى الغليظ ، يتميز بشكله الاسطوانى .

١٧٢١ - أعشبار

الأعبار كواكب زهر في مجرى قديم سهل .

١٧٢٢ - أعشبان

Biens corporels (F).

هي الاموال المادية .

١٧٢٣ - أعشير

Crassinervé (F).

الاعير من النبات ما كانت نصال اوراقه مستضخمة العير والاعصاب .

١٧٢٤ - أعشوسمة ، زكية

Agathosma (S).

Agathosme (F). Agathosma (E).

جنية برية وزراعية من السذابيات ، مهدها رأس الرجاء الصالح . اوراقها عطرية زكية العرف تستعمل في تحضير الشرابات الحاضمة والمقوية الشابة .

١٧٢٥ - أعشاق

Agati

شجرة هندية من القرنيات الفراشية . سف قرونها مرة الطعم حامزة طيبة تعتبر من المقويات وتدخل في تركيب عدة علاجات اخصها الصدرية || اوراقها تستعمل لتبيض النسل . حبوبها مأكولة تشبه الفاصوليا .

١٧٢٦ - أعشار ، عصيدة نباتية

Agar-agar

مادة غروية تستخرج من بعض الخثيات التي تكثر على شواطئ البحار الاسيوية كالهند وسرنديب وجاوا . تستعمل علمياً لزراع وتكاثر مختلف الفطور المجهرية والجراثيم كما تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعات الاقشة والورق .

١٧٢٧ - أعشبر

Rouan, Gris rouanné (F). Roan (E).

الفرس الذي شملت شهبته شقرة .

١٧٢٨ - أعشس

Isabelle (F). Isabel (E).

الفرس الذي شمل لون بياض كدرة وهو لون الحليب خالطه القهوة .

١٧٢٩ - أعشس

Loup du Hedjaz (F).

Hedjaz wolf (E).

هو الذئب الاغبس .

١٧٣٠ - أعشش

Opalescent (F). Opal (E).

نعت يطلق على الاشياء المضيئة الالامعة او غير الالامعة دون ان تكون شفافة .

١٧٣١ - إغشداء ، إستمراء ، تغذية

Nutrition

حالة الظواهر التي تجعل الاحياء تغذي وتنمو .

١٧٣٢ - إغشذائي ، إستمرائي

Nutritionnel (F). Nutritional (E).

ما كان له القدرة على تمثيل الاغذية وتحويلها .

١٧٣٣ - إغشذائي ، قوتي

Trophique (F). Trophic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بتغذية النسيج .

١٧٣٤ - إغشذائية

Sitologie (F).

Sitology (E).

الاغشذائية علم يبحث في الاطعمة وقيمتها الغذائية . اطلب قيمة غذائية .

١٧٣٥ - إغشصاب ، إنتحال

Usurpation (F). Usurpation (E).

كاغشصاب السلطة وانتحال الصفة والاسم واللباس ...

١٧٣٦ - إغشلام ، غشمة ، شبق

Nymphomanie (F). Nymphomania (E).

ازدياد شهوة السفاد في اناث الحيوانات لاسباب داخلية عديدة . والانثى المغلیم لا تحمل .

١٧٣٧ - إغشمد ، غش

Invagination

دخول جزء من نسيج في نسيج آخر . وهو اذا حصل في المصران يكون قتالاً (الامير مصطفى الشهابي) .

١٧٣٨ - أغشتر

قال ابن سيده : هو طائر من طير الماء ملتبس الريش طويل العنق .

١٧٣٩ - أغشدي

Très fertile (F). Very fertile,

Prolific fruitful (E).

صفة النبات الوافر الانتاج .

١٧٤٠ - أغش

Marqué en tête (F).

كل فرس له غرة اي بياض في الجبهة .

١٧٤١ - إغشراب

Albinisme (F). Albinism (E).

راجع إحساب .

١٧٤٢ - إغشراب ، شجعة

Fasciation

تشويه يحصل في سوق او اغصان النبات فترق وتبدو كأنها مزدوجة . يكثر وجوده في سوق التبغ وشماريخ الورد وافنان البرتقال الهمة . عامله الرئيسي فرط النمو الذي يسبب ازدواج الخلايا الليفية دون غيرها .

١٧٤٣ - إغشراض ، مطالب

Fins (F). End,

Design (E).

هي النهاية التي يذهب الطلب اليها ، فهي أذن موضوع الطلب والهدف الذي ترمي اليه .

١٧٤٤ - إغشرة

Algrette (F).

Algrette, Tuft or plume (E).

خصلة من الريش تعلو رأس بعض الطيور كالبلشون والقنبرة .



أغاني



إغشراب

١٧٤٥ - أُغْرُوَان *، لَيْتِكَ أَزْرَق

Syringa vulgaris (S). *Lilac commun* (F). *Common lilac* (E). *Turkscher flieder* (D). *Lilacco comune, Ghianda unguentaria* (I).

ومنهم من قال أعروان. نوع من الليلك ينتمي الى فصيلة الزيتونيات وهو جنبة تزيينية جميلة الشكل. ازهارها عذقي التجميع قاجي الارتكاز. ازهارها عطرية، لونها الى الزرقة المستحبة. وله ضروب ازهارها الى البياض وغيرها الى الحمرة. || يتكاثر بالبذر والتعليل والتلقيح والتدريج. الزهارون يفضلون المملوخة لأنها انشط من الدريخة والعقلة. يوجد في جميع الاتربة لكنه يخشى الرطوبة المستحكمة.



أغروان


١٧٤٦ - أُغْرُوَيْس *o

Agrotis جنس حشرات فراشية من فصيلة الفسقيات. انواعه كثيرة العدد. اجسامها وانماها مختلفة القد واللون طولها يراوح من ٢ الى ٥ سم. يقلب فيها الرأس الاسمر الجفوي والصدر البني والبطن الرمادي. رواشها الامامية عابقة الالوان. مزركمة. رواشها الخلفية سوية الالوان الباهتة. عروقها الى السمرة. حثارها، عند وجوده، هلاكي الشكل عابق اللون || انماها اكبر من ذكورها. تمتنع مكها بعد التساقد بأسبوع. متحها لا قبامي الترتيب يدوم نحو عشرة ايام تضع الانثى بخلاها نحو ٢٠٠٠ مكنة على صفحات الاوراق السفلى وعلى الاوراق الجافة والعابلة. مكها كروي الشكل يبدو اصفر اللون ثم يحمر ويسود. ينقف بعد اربعة ايام من متحه في الصيف وبعد اسبوع في الربيع والحريف وبعد ثلاثة اسابيع في الشتاء || يرقاتها تلسخ ست مرات ثم تتحول الى عذارى داخل شراقي من الطين وبعض المواد العضوية || اجياها الحولية من الاربعة الى الخمسة || عوائل يرقاتها عديدة الاجناس والانواع تخص منها بالذكر النفل والبرسيم والغصه والخنطة والشعير والخرطال والعدس والحمص والفول والقطن والتبغ والذره ومعظم البقول والنباتات التزيينية. اشهر انواعه :


- Agrotis angur* (S).
- Agrotis baja* (S).
- Agrotis brunnea* (S).
- Agrotis castanea* (S).
- Agrotis comes* (S).
- Agrotis glareosa* (S).
- Agrotis musiva* (S).
- Agrotis nigrum* (S).
- Agrotis orbona* (S).
- Agrotis plecta* (S). *Cordon blanc* (F).
- Agrotis pronuba* (S). *Hilbou* (F).
- Agrotis putris* (S).
- Agrotis rhomboldea, Stigmatica* (S).
- Agrotis rubi* (S).
- Agrotis triangulum* (S).
- Agrotis xanthographa* (S).
- Agrotis ypsilon* (S).




أغروتيس



أغروتيس ايسيلون



أغروتيس احلس



أغروتيس زنجي

١٧٤٧ - أُغْرُوَيْس اَيْسِيلُون *o، غَسْقِيَّة

Agrotis ypsilon, *قارضة*
Lycophotia ypsilon (S). *Noctuelle ypsilon* (F).
Lycophotia (agrotis) ypsilon (E).

حشرة مبدولة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقطار العالم. فراشها تحبب المزارع والمباقل والحدائق قوتها رحيق الازهار.

سرفها تدعى «الدودة القارضة» تسطو على سوق الكثير من النبات || جسمها متوسط القد يطول من ١٨ الى ٢٠ سم. بسطها تراوح من ٤٤ الى ٤٨ مم. رأسها معتدل الجرم. عيناها كبيرتان ناشرتان. زباناها مشطيان مستطيلان. مرشفها معتدل الجرم والطول. جوشها حنطي اللون بني الموج. بطنها اربد اللون، حنطي الموج. شرجها غليظ الاشارة عند الانثى. رواشها الاماميان الى الطحلة الخنطية يعلوها موج اصهر وتبضيع بني وتبقيج اسمر وحتار كستني يستبق الاهداب الفضية. رواشها الخلفيان الى البياض التبيني الموج عند الذكر والى البياض الاغبر عند الانثى || لها ثلاثة اجيال في الحول. تسرح في الليل وتبيت في النهار. تعاظم بعد ظهورها بمدة قصيرة تراوح من اسبوع الى اسبوعين. تمتنع المكن لطخاً تغلفها مادة غروية تشبهها بنصال الاوراق التي تلامس التربة || السرفة عند بلوغها الادراك تطول من ٤٥ الى ٥٠ سم. راجع دودة قارضة.

١٧٤٨ - أُغْرُوَيْس اَحْلَس *o، غَسْقِيَّة حَلَساء

Agrotis baja (S). *Noctuelle baie* (F).
Agrotis baja (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية. فراشها تحبب البراري والاحراج قوتها رحيق الازهار. سرفها خاضلة قوتها اوراق النبات || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٦ مم. بسطها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ مم. رأسها متوسط الجرم، فأسى الشكل. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان، مستطيلان. مرشفها معتدل الطول. جوشها احلس اللون، بطنها حنطي اللون احلس الموج || رواشها الاماميان الى السمرة يعلوها موج احس وبقعة مربعة شديدة السمرة وثلاث نقط سود وخط حثاري اسمر يستبق الاهداب الخنطية. رواشها الخلفيان الى الخنطي الاصهر يسمر عند الطرف الخارجي ويعود الى الصخرة في الاهداب || لها جيل واحد في الحول. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتنع المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة تسرح في الليل وتطول عند بلوغها الادراك نحو ٣٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها يستقر على الخضار الاليس بعد الخضار الزيتي ويعلوه خط ثنجي اغبر وخطان جانبيين احمران وزوج من الدريئات السود في كل سكمة باستثناء السكم الصدرية. رأسها اسود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي داخل جلياب من الطين ينفلق عند انطلاق الفراشة

١٧٤٩ - أُغْرُوَيْس زَنْجِي *o، غَسْقِيَّة زَنْجِيَّة

Agrotis C. nigrum (S). *Noctuelle basanée* (F).
Agrotis C. nigrum (E).
حشرة مبدولة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة. موطنها يمتد من اليابان الى اطراف اروبة وافريقية الشالية والولايات المتحدة الامريكية. فراشها تعيش على رحيق الازهار. سرفها خاضلة قوتها اوراق الاشجار الحرجية والمثمرة والنباتات البقلية والمرعوية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ مم. بسطها تراوح من ٢٦ الى ٤٠ مم. رأسها معتدل الجرم، فأسى الشكل. عيناها كبيرتان ناشرتان. زباناها خيطيان مهدبان. جوشها حنطي اللون اسمر الموج. بطنها احلس اللون، حنطي الموج. شرجها مستغلف الاشارة عند الانثى ||

١٧٥٧ - أغريل ٥
Agrilus (S). Agrile (F).
Twig girdlers (E). Heckenprachtkäfer, Schmal-
bauchkäfer (D).

جنس حشرات من الناصعات ورتبة غمديات الاجنحة .
انواعها لا تقل عن ٤٠٠ شائعة في جميع اقطار العالم .
جميعها مستطيلة الشكل مخضبة الجوشن الزغبى . اثنائها
اغلف من ذكورها - تمسح مكنتها على بشرة اللحله فينقف عن
يرقات خاضعة خاشبة تلغم وتحفر جذوع واغصان الاشجار
الخرجية والمثمرة . || اشهر انواعه واضرها :

١٧٥٨ - أغريل الاجاص ٥
Agrilus sinuatus (S).

Agrile du poirier (F). Sinuate
pear-borer (E). Birnbaum-pracht- käfer (D).

نوع من الاغريل مستطيل القد طوله نحو ٨ مم . لونه الى
الزنجاري يعلوه مزاج اسفع . يرقاته خاضعة تركب اغصان
الاجاص فتلغم الشكير بين اللحاء والخشب وتحفر السرايب
الشبكية التي تقضي على مرور النسغ فتذوي الاغصان
وتموت || يكافح باستعمال الحواشير والمواكين للقضاء على
الحشرة او على مكنتها قبل نقفه .

١٧٥٩ - أغريل الحور ٥
Agrilus Roberti (S).

Agrile du peuplier (F). Agrilus Roberti (E).

نوع من الاغريل صغير القد طوله نحو ٥ مم . رأسه وصدره
الى الجوزة العنابية . غمداه الى الخضرة السفعاء || يرقاته
تركب سوق الحور واغصانها الفروع الجديدة .

١٧٦٠ - أغريل السنديان ٥
Agrilus biguttatus (S).

Agrile du chêne (F). Oak borer (E). Schmal-
er Eichenprachtkäfer (D).

نوع من الاغريل طوله نحو ١٠ مم . لونه الى الخضار
الزبرجدي تشوبه زغبة غبراء || يرقاته خاشبة تركب شكير
جذوع وفروع السنديان فتسربها بانفاقها المتشبكة وتمطها .

١٧٦١ - إغريل العوسج ٥

Agrilus chrysoderes (S).

Agrile des ronces, Agrile du framboisier (F).

Agrilus chrysoderes (E). *

نوع من الاغريل ينتمي الى فصيلة الناصعات ورتبة
غمديات الاجنحة موطنه معظم اصقاع العالم القديم . يألّف
المواقع التي يكثر فيها العوسج والنسرير خنافس ويرقاته
تقضم الاوراق || جسمه صغير القد ، نحيل الشكل ،
يطول من ٦ الى ٧ مم . ثوبه الى الخضار الزيتي تعلوه ماجة
سفعاء . رأسه قليل النشوز ، قصير الخطم ، ضليع
التأشير . عيناه صغيرتان . زبانه مستدقان || الانثى اميز
قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبانا || له جيل
واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى
حتى ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقاتها
مرقالة ، عشارية السكم ، بيضاء اللون ، غليظة الرأس
الفائر ، ضليعة التأشير السود ، سمراء الزائدة القرنية التي
تعلو الشرج والتي يتألف منها الملقط الثلاثي الاسنان
الداخلية . طولها عند ادراكها التام يراوح من ١٥ الى
١٧ مم .

١٧٦٢ - أغريل الكرمة ٥
Agrilus deraso-fasclatus (S).

Agrile de la vigne (F). Agrilus deraso-fasclatus (E).

نوع من الاغريل ، دقيق الشكل صغير القد طوله نحو
٥ مم . لونه الى الخضار الاسفع الشديد المزاج || يرقاته
صغيرة نحيلة تركب سروع الجفنة تحت القلفة فتتخرها
وتسربها وتمطها .

روشناها الاماميان الى الجوزة السمراء يعلوها تمسح ولطخة
سوداء واشعري بيضاء ردية المواج . روشنها الخلفيان الى
البياض الاغبر يطوقه حنار اسمر || لها ثلاثة اجيال في
الحول . تسرح في الليل . تعاغل بعد ظهورها باسبرعين
وتتمسح الممكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق ||
السرفة عند بلوغها الكمال تطول من ٢٠ الى ٣٥ مم . ثوبها
الى الخضار الاسمر . رأسها الى الجوزة . سكمتها البنية
باستثناء التاسعة - مزركشة بالاسود على الجانبين . مدتها
ورواجها سمر . هذبها قليل العدد ، اصفر اللون يرتكز
على درينات دقيقة يراوح عندها من زوج الى زوجين في
كل سكمة .

١٧٥٠ - أغروتيس موشى ٥ ، غسقية مصاحبة

Agrotis pronuba, Triphaena pronuba (S).

Noctuelle fiancée, N. pronubée, «Hilbou» (F).

Yellow Underwing, Large Yellow Underwing
moth (E). Hausmütterchen (D).

حشرة من فصيلة الغسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة .
موطنها يمتد من اليابان الى اوروبا وافريقية الشمالية .
فراشتها تجوب البراري والمحاقل والمباقل قوتها رحيق الازهار .
سرفتها تعيش على النجيليات وحب الكرمة واوراق البطاطا
والجزر والملفوف || جسمها معتدل القد يطول من ٢٤
الى ٢٦ مم . بسطتها تراوح من ٥٢ الى ٥٨ مم . رأسها
صغير الجرم . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفاها
معتدل الجرم والطول . جوشها وبطها الى الصحرة الكستنية
المواج . شرجها مستنظ الاشارة عند الانثى || لها ثلاثة
اجيال في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في مطلع ايار
تسرح في الليل . تعاغل بعد ظهورها بنحو عشرة ايام
وتتمسح الممكن على سوق النبات العاقل او على الاوراق التي
تلامس التربة || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من
٤٥ الى ٥٠ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار ،
مبعثر الملب القليل ، اخضر اللون حتى الانسلاخ الرابع
ثم ينحرف الى الطلحة السمراء الحمراء المواج يعلوها خط
ثبجي اغبر وخطان جانبيان . رأسها الى الجوزة . مدتها
الى السمرة . تسرح في الليل وتتكاثر عندما تسرح بالخطر .

١٧٥١ - أغرولوجية
Agrologie (F). Agrology (E).

علم التربة اي دراسة التربة حكماً وكماوياً وميكانيكياً
وجيولوجياً . ودراسة التربة الزراعية وصلاتها بالزروع .

١٧٥٢ - أغروميذا الفاصوليا ٥
Mouche du haricot

اطلب لاغمة اللربياء .

١٧٥٣ - أغروميذا ألدسيسة ٥
Mineuse de l'artichaut

هي لاغمة الارضي شوكي ، اطلبها .

١٧٥٤ - أغروميذا مبهمة ٥
Mineuse des céréales

اطلب لاغمة الزرع .

١٧٥٥ - إغريفي
Pollen (F). Pollen (E).

الاغريفي والفريفي والطلع والصواح واحد . راجع صواح .

١٧٥٦ - إغريفي ٥
Pollinifère (F).

Polliniferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات او عضو منه ، كالزهرة ،
يحمل اللويح او يحواه .



أغريل الاجاص



أغريل الحور



أغريل السنديان



إغريل العوسج



أغريل الكرمة

Productivité du sol (F). ١٧٧٠ - إخلال
Productiveness of soil (E). اطلب انتاج .

١٧٧١ - أغلوب تيميس *
Aglaope infausta (S). Aglaope malheureuse (F).
Aglaope infausta (E).

حشرة من فصيلة البرقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يشمل معظم الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط . تألف المواقع التي يكثر فيها اللوز والزعرور . قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة تعيش على اوراق اللوز والبرقوق والزعرور || جسمها صغير قصيف يطول من ٩ الى ١٠ مم . بسطتها تراوح من ٢٤ الى ٢٦ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان جيلتان . زباناها مشطيان ، مستطيلان . جوشها وبطنها قرفيا اللون ، كثيفا الحمل || روشناها الاماميان الى القرني الاكلف الاسفع الموج يعلوه طوق حتاري اسود . روشناها الخلفيان مخضبان بالقرني تعلوه بقعة حمراء تمتد من القاعدة الى اواسط الصفحة . اهدابها برتقالية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بخمسة اسابيع وتمتدح المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تطول من ١٦ الى ١٧ مم . جسمها اهليلجي الشكل . ثوبها الى الربعة السمرء يعلوها ثلاثة خطوط جؤوية قاطبة وثلاثة صفوف من الشعول المتوجة بالهلب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صالحة مناسكة النسيج تحبكهما السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء .

١٧٧٢ - أغلوج
Turion (F). Tip, Scion (E).
ساق الهليون النامية . ج أغاليج .

١٧٧٣ - أغلوصة نحاسية *
Aglossa cuprealis (S).
Aglosse cuivrée, Fausse teigne des cuirs (F).
فراشة . من فصيلة الناريات ورتبة حرشفيات الاجنحة . الذكر اصفر قدام من الانثى ، طوله نحو ١٠ مم . وبسطته من ١٨ الى ٢٠ مم . الانثى تطول نحو ١٤ مم . وبسطتها من ٢٦ الى ٢٨ مم . || رأسها وجوشها الى السمرة النحاسية . روشناها الاماميان الى السمرة السفعاء تعرضها لخطوط متعرجة حمراء اللون ، نحاسية الموج تتخللها نقط سود . روشناها الخلفيان الى الحمرة الخفيفة الزاهية . بطنها الى الحمرة الصنابية || يرقها مؤذية تقرض الجلود وسائر المواد الجلدية ايما كانت ، تبدو سبورية اللون ثم تنحرف نحو السواد اللامع مع اقترابها من زمن الاكمال حيث تنسج صلبة مردية الشكل حباكه حرير ابيض || تظهر الفراشة من حزيران الى ايلول . مسرحها دجوي لذلك فهي تشاهد في النهار جاثمة على الحيطان وعلى مختلف انواع اثاث المنازل .

١٧٧٤ - أغن ، أوهم ، زخور
Luxuriant

١٧٧٥ - أغنام
الاغنام بعض نجوم كوكبة حور وحية ، مركزها في الروضة بين النسقين الشامي والياني .

١٧٦٣ - أغريل الوزال *
Agrilus cinctus (S).
Agrile des genêts (F). Agrilus cinctus (E).
نوع من الاغريل متوسط القد طوله نحو ٨ مم . لونه الى الخضرة النحاسية يعلوه موج اسفع اغبر . || يرقته تركيب الوزال وتعيش عليه من يوم متحها مكنة حتى نهاية طورها اليرقي || اما الحشرة فتعيش على جميع نباتات الفصيلة القرنية لانها تغذي برحيق ازهارها .

١٧٦٤ - أغصن
الاغصن هو الثور بذنه بياض .

١٧٦٥ - أغصوم
Aegosoma (S).
Aegosome (F). Aegosoma (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة من اوروبا الى الصين || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣٠ الى ٤٥ مم . اثوابها الى السمرة الحنطية تعبق في بعض الانواع وتزهو في الاخرى || مسرحها دجوي . تظهر في تموز وتبقى حتى اواخر ايلول . تمتدح مكها على لحاء الاشجار التي تؤمن الغذاء لليرقة || يرقاتها متوسطة القد ، غليظة الصدر ، مستدقة الاطراف ، سمر الاجسام ، سود الرؤوس || تركيب السنديان والزبان والكستناء والبندق والزيزفون والاجاص والكوز ... فتتخر اللحاء وتتركز في الشكير فتعطيه وتسيء الى الاشجار .


١٧٦٦ - أغصوم حرش الزبان *

Aegosoma scabricorne (S). Aegosome
scabricorne (F). Aegosoma scabricorne (E).
حشرة خاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمديات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الادنى واروبة . تألف الاحراج والحدائق والجنان . خنافسها ويرقاتها تعيش على مختلف انواع الاشجار اليابسة باستثناء الصنوبريات || جسمها كبير القد ، ضيق الكوسل والظهران ، يطول من ٣٥ الى ٤٢ مم . ثوبها الى الصهبة السمرء يعلوها موج اشقق تشد سمرته في الكوسل والرأس . رأسها مستطيل الجرم . عينها كبيرتان ، جاحظتان . زباناها مستطيلان حرشا الحتار المسن . فكها ضليمان ، ذربان ، متراكبان . غمداها شديدا الصلابة ، متنابعتا التحزيز اللدقيق . برداها كبيرتا القد ، غشائيتا المادة الشفافة ، صنابيتا اللون . جراسمها مستطيلة الظنايب || الانثى اكبر قدما من الذكر واضخم بطناً منه واكمد ثوباً واقصر زبانا . || جيلها ثلاثي الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتبقى حتى اواخر ايلول . مسرحها دجوي يستمر من الشفق الى الفجر || اليرقة بطيئة النمو ، تساعة الانسلاخات ، تدرك الكمال الجسموري بعد النقف بنحو ٣٢ شهراً فيصبح طولها نحو ٦٥ مم . جسمها حيددي التركيب ، حنطي اللون ، سمر الموج ، اسود الرأس ، عادم الهلب .


١٧٦٧ - أغصنف
الاغصنف : الكلب المسترخي الاذن .

١٧٦٨ - أغلفى
اغلفى الشجر إغفاء : تدلت اغصانه .


١٧٦٩ - أهلاجون ، أهلاجون
Agalloche (F).
Agallochum (E).
الاغلاجون والاغاليجي ، وضع ابن سينا ، هو عود اللد* اطلبه . عصيره حريف منقطع كان يستعمل دواء للبرص والجلد .



أغريل الوزال



أغصوم حرش الزبان



أغلوب تيميس



أغلوصة نحاسية

1788 - إفتراغ (F). Défleuraison, Défloration (F).
سقوط الازهار (E). Fall or withering of the blossom (E).

1789 - إفتسكال

هو تعقيل الاجزاء الناجمة عن الفسائل دون غيرها من اعضاء النبات .

1790 - أفْتَيْمُون اطلب كشوث السعتر .

1791 - أفْحَجُ الرُّكْبَةِ * (F). Cambré (F).
Cambering, Having a curved back (E).
من عيوب الخيل كما يبدو في الرسم .

1792 - أفْدَع (F). Distors (F). Distort (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان ملتزم او اعوج .

1793 - إفْرَاز (F). Excreta (F). Excreting (E).
الافراز مجمل نفايات الاغذاء التي يدفع بها الجسم الى الخارج .

1794 - إفْرَاز (F). Sécrétion (F). Secretion (E).
هو ما تفرزه الاجسام الحية ، حيوانية ونباتية ، من مواد ضرورية لحياتها او للدود عنها || والافراز في النبات يدعى نتحاً .

1795 - إفراز ظاهري (F). Exocrine (F). Exocrin (E).

1796 - إفْرَاق النحل ، تفْرِخ (F). Essaimage (F).
Swarming, Swarming-time (E).
هو خروج ثول النحل من الخلية الأم ليعمر خلية جديدة . والثول من النحل يدعى فرقا .

1797 - أفْرَخَ راجع أمخ .

1798 - أفْرَكَ

افرك السنبل صار فريكاً وهو حين يصلح ان يفرك فيؤكل || تقول للزرع اول ما يخرج من الأرض: قصع ثم مقر او نجم ثم شطاً وقصب وأعصف وسبل وسنبل وأحب وألب وأسفى ثم أفرك ثم أحصد .

1799 - إفْرِيز ، كُنَّة (F). Auvent (F).
Pent-roof, Porch-roof (E).
نتوء لا قياسي العرض يشرف على الحائط وما اشبه يبدو كأنه لوقاية ما استظله .

1800 - إفْسَاد ، تعطيل ، تعْييب ، عَيَاب (F). Dénaturation (F). Denaturing (E).
هو تغيير طبيعة الشيء .

1801 - أفْسَد ، شَوّه ، عَيَّب ، عطّل (F). Dénaturer (F). To denature (E).
هو ان يصار الى تغيير طبيعة الشيء وحالته لغرض ما .

1802 - أفْسُفُور ، تصَلَّب المتخاض (F). Aphosphorose
علة في الجسم مفصلية سببها نقص في كمية الفسفور الواجبة .

1803 - أفْسَتْنين راجع أبسنت .

1804 - أفْسَتْنين بحري راجع أبسنت بحري .

1776 - إغورار (F). RéSORption (F). Reabsorption (E).
امتصاص ثان تصف به بعض الاعضاء .

1777 - أغُوطي * ، أغُوتي (S). Dasyprocta (S).

Agouti (F). Dasyprocta (E).
جنس حيوانات لبونة قاضمة عاشبة من الشردفيات . انواعه ١٣ ، مهدها البلاد الامريكية . جشها جثة الارنب الكبير . رأسها أقطم . لها اذنان صغيرتان مستديرتان . قوائمها رفيعة رباعية الاصابع في الاماميتين وثلاثية الاصابع في الخلفيتين . صوفها كثيف قصير لونه الى الشبهة || تعيش منفردة في جحرها الذي تحفره بين جذور الاشجار . تألف الاحراج والغابات الكثيرة العشب || تدجن بسهولة لكنها لا تستأنس الانسان وتفر من اللبس || اشهر انواعها وافخرها لحماً وصوفاً الاغوتي المذهب .

1778 - أغُوطي مُذهَّب (S). Dasyprocta aguti (S).
Agouti commun, Lièvre doré (F). Dasyprocta aguti, Common aguti (E).

اشهر انواع الاغوتي واكبرها جثة وألذها لحماً . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه اشقر مذهب . صوفه كثيف ناعم . يألف المراعي الطبيعية وصفاف الأنهر . يسرح في الليل . يمدو بسرعة فائقة . انشاء نشورة تضع أربع مرات في السنة وفي كل مرة من الجروين الى الاربعة جراء .

1779 - أغْيَان (F). Asperion
هي السقاية الآلية بواسطة الآلية او الاواقي .

1780 - آغِيَّة (F). Tourniquet (F).

Turnstile, Turnpike (E).
الآغية والآغية : مفعرة مروحية تدور بتأثير ضغط وجريان الماء فتثريه كوثم المطر || تستعمل في حدائق التزيين وفي بعض البساتين . ج أواقي .

1781 - أغْيَد ، أمْلَد ، رَخْص ، مَرِن (F). Flexible

1782 - أف ، صمْلَاح (F). Cérumen (F).
Cerumen, Ear-wax (E).
ما تفرزه الأذن من وسخ .

1783 - آفَاقِي * ، دُنْدُرَان (S). Vicia cracca (S).
Vesce craque, Pois à crapaud (F). Tufted vetch, Cracca, Cowvetch (E). Vogelwicke (D). Vecchia multiflora, Cracca, Vecchia spicata (I).

ضرب من البيقة وهو نبات عشبي بري حولي من فصيلة القرنيات القراشية يكثر في بعض الاصقاع الجبلية . رعاه البهم . ازهاره بنفسجية زاهية وافرّة الرحيق تجرسه النحل .

1784 - أفَانِيَّة (F). Morelle noire (F).

هي الربرق ، اطلبه . وقد جاء في رسالة النفران للمري : « ان في مسكني حياطة ما كانت قط أفانية ولا الناكزة بها غالية » .

1785 - إفْتِجَاء ، فِجء (F). Mutation (biol.) (F).
Change (E).

هو كل تغيير او تبدل فجائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع او ضرب من الاحياء .

1786 - إفْتِشْحار (F). Délétion (F). Deletion (E).

الافتشاح حادث تعرض له النطشة فيسبب تلف بعض اجزائها ويقودها الى الانتحاء .


1787 - إفْتِراض ، فِرْضِيَّة ، رَجْم ، حَدْس (F). Hypothèse (F). Hypothesis (E).



أغوطي



آفَاقِي



أفحج الركبة

غليظ الجرم ، مستدق العنق والذنب ، يطول من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. ثوبها الى الصبغة الطحلاء يعلوها من رأسها الى طرف ذنبها بقع حنطية مطوقة باطار جؤوي مفتوح الحلقات الانظامية الترتيب . رأسها كراس الافعى المبدولة غير انه اكبر حجماً . عيناها مستديرتان فاشرتان . عدد اسنانها ٥٢ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٦ في الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تبلغ كامل نموها بعمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة . تألف البراري والاحراج والبيوت المأهولة . تسرح في الليل وفي النهار . قوتها الدويبات من الجرذ الى العفاء والضفادع والحيات || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٦ - أفعى مبدولة * ، عقنود الجوز

Vipera vulgaris (S). Vipère commune (F). Common Viper (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٦٥ سم. الذكر أغلظ من الانثى . ثوبها الى الكهبة المنمعة يعلوها من رأسها الى طرف ذنبها سلسلة سوداء من التعاريج والتجاذيع المعترضة وصفتان ايمن وايسر من النقط السود . رأسها حرسامي الشكل . عيناها حادتان لامعتان . لسانها جزل الطرف يندفع من غمده ويعود اليه كالسهم . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان ذلقتان متحركتان . عنقها محذوقة قصيرة || يقال انها تعيش من ٦٠ الى ٦٥ سنة . تبلغ كامل نموها بعمر ٨ سنوات وتسافد بعمر اربع سنوات || تسرح في النهار قوتها كل ما دب وطار .

١٨١٧ - أفعى نميرة * ، غطرب

Vipera aspis, Vipera maculata (S). Vipère aspic, Vipère tigrée, Aspic (F). Asp. (E). حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٩٠ سم. رأسها لوزي الشوزن . عنقها معتدلة القصير والشخانة . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان . || ثوبها الى السمرة الصنابية المواج يعلوها ثلاثة خطوط من البقع المشابهة الاشكال الحنطية اللون المطوقة بالاسود || وهي سريعة الغيظ ، نزقة . انذارها فحيح خافت متقطع . بيئاتها الشتوي يستمر نحو ١٤٠ يوماً . تبلغ كامل نموها بعمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة || قوتها كل ما دب وتمكنت منه ولا تعف عن العصافير . تسافد بعمر خمس سنوات . جراب الانثى يحوى من ١٤ الى ١٨ بيضة تنقف وتخرج ، في اواخر الصيف ، جوارن صغيرة طولها من ١٠ الى ١٢ سم. تسرح وتسمى حينها || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٨ - أفعيات

Viperidae (S). Viperidae (F). Viperidae (E).

الافعيات والافاعي فصيلة من الحيات الانبوبيات الاخاديد . اجناسها وانواعها عديدة جميعها سامة . قلما تتعرض للانسان . وقد تكون مؤذية عند اضطرارها الى الدفاع .

١٨١٩ - أفقى

Tanner (F). To tan (E). أفق الجلد : دهنه فخر افق .

١٨٢٠ - أفقة

Flanc (F). Flank (E). الأفقة والآفة هي الحاصرة .

Synchronisme (F).

١٨٠٥ - إفشان

هو الفشن ، اطلبه .

١٨٠٦ - أفشع هو الكبش ذهب قرناه يمين وبصرة .

١٨٠٧ - أفصح

يقال أفصحت البقرة والشاة والعنز والناقة اذا انقطع لبؤها وجاء اللبن خالصاً .

١٨٠٨ - أفصح

أفصح البسر اذا بدت الحمرة فيه .

١٨٠٩ - أفطح

Eurycéphale (F). الافطح المريض القحف اي الرأس .

١٨١٠ - أفطس ، أقعم Camard, Camus (F).

Flat-nosed, Snub-nosed (E). نعت وصفي لأنف الحيوان المنتشر عرضاً .

١٨١١ - أفظور

Ophisure (F). هو الرستان من الاسماك البحرية ، اطلبه .

١٨١٢ - أفعى Vipera (S). Vipère (F). Viper (E).

هي الحية السامة من اي نوع كانت .

١٨١٣ - أفعى سوداء * ، غطرب أسود

Vipera nigricans (S). Vipère noire (F). Black viper (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٦٥ سم. رأسها وعنقها قريباً الشبه من الافعى المبدولة . ثوبها الى السمرة السوداء يعلوها تجذيع متعرض فحسي المواج . شدقاها مطوقان ببعض النقط البيض . عيناها فرتان حادتا البصر / عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تبلغ كامل نموها بعمر ٨ سنوات وتعيش نحو ٦٥ سنة . تعتبر من ابطش الافاعي واسرعها غيظاً . تألف الجبال الوعرة والادوية الدغلة وقلما تقترب من المساكن الآهلة . تسرح في النهار وفي الليل . بيئاتها الشتوي لا يتجاوز خمسة اشهر || قوتها الدويبات والعصافير || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٤ - أفعى شرسة * Vipera cherssea (S).

Vipère cherssea, Aesping (F). Aesping (E).

حية سرلودة سامة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها يطول نحو ٧٠ سم. رأسها حرسامي الشكل . عنقها محذوقة معتدلة الطول . ثوبها الى الكهبة الفولاذية المواج . ظهرها منمش بخط قاطب من البقع السود المستديرة المتتابعة بدون قياس من العنق الى طرف الذنب || عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل و ٢٦ في الفك الاعلى من اصلها عقافتان اماميتان متحركتان || تألف الادغال والاحراج . تسرح في النهار وفي الليل . تبلغ كامل نموها بعمر ثماني سنوات . وهي شرسة سريعة الانفعال ، شديدة البطش || تعتبر من الافاعي الخبيثة الشديدة الاذى .

١٨١٥ - أفعى عبرية * Bitis arietans (S).

Vipère hébraïque (F). Hebraic Viper (E).

حية سرلودة خبيثة من الافاعي انبوبيات الاخاديد . جسمها



افعى سوداء



افعى شرسة



افعى عبرية



افعى مبدولة




افعى نميرة



أفلوس أمرد



أفلوس تلجي



أفلوس غاري



افلوس اسود



أفنون

١٨٣٣ - أفلوس منثي الورق
V. plicatum.
V. à feuilles plissées

١٨٣٤ - أفلوطن، بِلُتُون
Pluton (F). Pluton (E).
كوكب سيار يتبع النظام الشمسي. دورته حول الشمس تستمر نحو ٢٤٨ سنة و ١٥٥ يوماً. سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ١٧٠٢٨ كيلومتر بالساعة.

١٨٣٥ - أفلوس الفصاح
Aphelinus mali (S).
هو دنفصة المن، اطلبها.

١٨٣٦ - أفن
Déséquilibre (F). Want, Lack (E).
الافن انعدام التوازن.

١٨٣٧ - أفنوس
Euphone (F).
طائر من التنغريات يدعى عزاف، اطلبه.

١٨٣٨ - أفلوس أسود
Aphanisticus ater (S).
Aphanistique noir (F). Aphanisticus ater (E).

حشرة ناهمة من فصيلة الزقشقيات ورقية مخمدات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم. تألف البراري والرياض وضفاف مجاري الماء. خنافسها تعيش على الاذخر والسمار والاسل والقصب والفزار. يرقاتها تسردب الارومات ولها تقارب من الكعابر || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى السمرة السوداء. رأسها معتدل الجرم، مدبب الحظم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان، منشاريا التركيب. غداها شديدا الصلابة، متشابها التحزير التحيل، ارساغها خماسية العقيل || الاثنى اميز قدأ من الذكر وابنت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ارائل ايار وتبقى حتى اواخر آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة مرقالة تطول نحو ١٠ مم. جسمها سلمي التركيب، مستطيل الرأس المدبب الطرف، مستدق المؤخر التحيل. ثوبها الى البياض الاغبر. تأشيرها وفواصل سكمها بنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صانجة خاوية النشاء المركب من مواد نباتية معجونة بالريال.

١٨٣٩ - أفنون *، ثعبان ابو جوس
Crotala (F).
Crotalus (E).

حية سامة خبيثة من الافنويات.

١٨٤٠ - أفنويات
Crotalidae (S).
Crotalidés (F). Crotalidae (E).

هي الصنجيات فصيلة حيات سامة من انوبيات الاخايد. اطلب صنجيات.

١٨٤١ - إفنيك
Rectrices de la queue (F).
Tail-feathers (E).

الافنيك هو ريش زمكي الطائر ومنهم من قال الزمكي ومن قال منبت ذنب الطائر.

١٨٤٢ - أفوديوس
Aphedius
جنس خنافس من فصيلة الجعليات. انواعه اكثر من ٢٠٠ جميعها صغيرة القد نافمة يكثر فيها اللون الاسود

١٨٢١ - أفقي
Horizontal

١٨٢٢ - أفقية
Horizontalité (F). Horizontality (E).

١٨٢٣ - أفك
Mâchoire, Mandibule (F).
Mandibular (E).

هو فك متقار الطائر. وهما اثنان الافك الاعلى والافك الادنى.

١٨٢٤ - إفلاس
Faillite (F). Bankruptcy (E).
حالة التاجر او الصناعي الذي توقف عن الدفع وحكمت بذلك المحكمة المختصة || والافلاس قد يكون واقعي او فعلي.

١٨٢٥ - أفلوس، رباطية، جنبه الرباط
Viburnum (S). Viorne (F). Viburnum, Wayfaring tree (E).

جنس جنبات معمرة برية وزينية من فصيلة الجليات. انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اسيوي وبعضها امريكي. اوراقها متقابلة، معتقة، كفية، مفصصة. ازهارها عادية، خنثوية، صغيرة القد، عشكولية التجميع، خماسية البتلات والاسدية || اشهر انواعه العالمية ما يلي.

١٨٢٦ - أفلوس أمرد *، خبان الماء، بلسان الماء
Viburnum lobatum (S). Viorne lobé, Aubier, Obier, Bureau d'eau (F). Water elder, Guelder-rose, Dog elder (E). Schingbaum, Schneeball-schlinge (D). Viburno loppo, Maggio, Palla dineve (I).

نوع من الافلوس البري الصناعي. قضبانته مرنة، سهلة الالتواء، كثيرة العدد، تستعمل في صناعة المذارى والسلال وما أشبه. اوراقها منفطة.

١٨٢٧ - أفلوس تلجي *، بلسان ابيض، كرة الثلج، منقار الكركي
Viburnum opulus roseum (S).

Boule de neige, Pain blanc, Rose de Guelder (F). Red Guelder-rose, Snow ball tree, Rose elder, Cranberry tree (E). Deutscher schneeball, Gelder-rosen (D). Palla di neve, Rosa di Gueldria (I).

نوع من الافلوس يزرع للتزيين عشكوله الزهري لبد التجميع، جميل الشكل، ابيض اللون كالثلج. وهو دواء نافع لفص البطن ورجع الرحم.

١٨٢٨ - أفلوس غاري *، رباطية غارية
Viburnum tinus (S). Viorne tin, Laurier tin (F). Laurestine, Wild bale tree (E). Lorbeerschlinge (D). Viburno lauro-timo, Alloro tino (I).

نوع من الافلوس يستعمل للتزيين وهو من الجنبات العررية الجبيلة الوراق الشديدة الخضار. نقيع اوراقه سهل. وفي الافلوس انواع تزيينية عديدة لكنها اقل شهرة نقص منها بالذكر:

١٨٢٩ - أفلوس شرقي
V. orientale,
V. d'Orient

١٨٣٠ - أفلوس قيقبي الورق
V. acerifolium,
V. à feuilles d'érable

١٨٣١ - أفلوس كبير الزهر
V. macrocephalum,
V. à grosses inflorescences

١٨٣٢ - أفلوس محرز الورق
V. dentatum,
V. à feuilles dentées

القد يطول من ٣ الى ٥ سم. ثوبها لاقياسي اللون معظمه سوي الاسوداد العابق وبعضه اسمر الظهران وبعضه الآخر مرقوش جوانب الكوسل بالاحمر القرميدي. رأسها مستعرض الجرم، قصير الخطم، ضليح التأشير. عيناها صغيرتان، بارزتان. زباناها صفيان، دقيقان. غمداها متتابعتا التحزيز القاطب. ارساغها خماسية العقل || لها جيلان في الحول. تظهر خنفساء الجيل الاول في اواسط نيسان وتعيش حتى اواسط ايلول. وتظهر خنفساء الجيل الثاني في اواخر ايلول وتعيش حتى اواسط شباط || اليرقة عند الادراك التام تطول من ٨ الى ١٢ سم. جسمها مقوس الشكل، عشاري السكم، سداسي الرواجب، اسمر اللون. رأسها صغير اسود. فكها قويان اسمران. رواجبها ومدبها الى السمرة. || يستمر طور الاكمال في الجيل الاول نحو ٢٥ يوماً، ويستمر من ٣٥ الى ٤٠ يوماً في الجيل الثاني.

١٨٤٦ - أفون الرمال *
Ophonus sabulicola (S). Ophonus sabulicola (E).

حشرة خاضعة من فصيلة الهربلوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. تألف الاثربة الرملية والكلسية ولا تقترب من الاراضي المروية. خنفسها تعيش على بزور نباتات الفصيلة الصيوانية. يرقاتها خاضعة || جسمها متوسط القد يطول من ١٤ الى ١٧ سم. ثوبها ثنائي اللون. رأسها وكوسلها الى السمرة السوداء. غمداها وبطنها الى الزرقة. زباناها خطيان دقيقان. عيناها صغيرتان. ظهرانها معتدل الاحديداب، مستدير الطرف اللاحف، متتابع التحزيز الغمدي الهزيل الخطوط. ارساغها خماسية العقل || الانثى اصغر قدماً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في حزيران وتبقى حتى ايلول. تسرح في الليل. تساعد في تموز. تمتح الممكن على صفحات الاوراق التي تلامس التربة || اليرقة، عند بلوغها الادراك التام، تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، سداسي الرواجب، اسمر اللون، تعلوه وتقطعه خمسة خطوط صفر || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينقضي في التربة على عمق ٥ او ٦ سم.

١٨٤٧ - أفياء
Nounat (F).

سمكة صغيرة دقيقة تدعى نونه، اطلبها.

١٨٤٨ - أفياء *
Spizaete (F). Spizaetus (E).

الافياء والفي، طائر من العقبان وفصيلة الصقريات. يتميز بقزاعته الطويلة الريش المنعطف على المنق. جشته مستطيلة، طوله نحو المتر. عيناها عسلتان، سقطاء متوسطا الطول، رأسه وظهره الى الكهبة الريداء، تغشاها خطوط ضيقة مستعرضة غبراء اللون. صدره وبطنه الى البياض المرقش يعلوه موج ازرق. زمكه طويلة تعترضها ستة خطوط سمر. نحاله الى الخضرة السمر. || موطنه البلاد الافريقية من مراكش الى الحبشة والبحر الاحمر والجزيرة وفلسطين والاقليم السوري || وهو من الطيور الاوابد التي تعيش ازواجاً لا يفرقها غير الموت. يبني عشه في رؤوس الاشجار الباسقة او بين الصخور الناتئة || انشاء تبض دفنتين كبيرتين طول الواحدة من ٨ الى ٩ سم. والافياء تعيش من قنصها اذ تصيد الغزال والارانب والمصافير وماشبهه.

والبي والاحمر. || تعيش على المواد العضوية وعلى جميع انواع الزبل.

١٨٤٣ - أفوديوس أزرق الكوسل *

Aphodius luridus (S). Aphodius livide (F).
Aphodius luridus (E).

حشرة نائلة تنتمي الى فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها معظم اصقاع العالم القديم. تألف الاماكن التي يكثر فيها الماعز والغنم لانها تعيش على المواد العضوية الموجودة في البعر || جسمها صغير القد، منفلطح الشكل، يطول من ٧ الى ٩ سم. ثوبها ثنائي اللون، اترأس والكوسل الى الزرقة العابقة، الغمدان الى السمرة الخنطية تعلوها رقشة سوداء. رأسها مستعرض الشكل، قصير الخطم، ضليح التأشير. عيناها صغيرتان مائحتان. زباناها صفيان دقيقان. ظهرانها مستدير الطرف اللاحف، متتابع التحزيز الدقيق القاطب. ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قدماً من الذكر وافتح ثوباً منه || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتعيش حتى اواسط ايلول. مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى قمحة الليل ومن الفجر العميق الى الشروق || اليرقة عند الادراك التام تطول من ١٤ الى ١٦ سم. جسمها مقوس الشكل، عشاري السكم البنية، سداسي الرواجب، اغبر اللون الدنس. رأسها صغير الجرم، اسود اللون. فكها ضليعان. رواجبها ومدبها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر من اواخر شباط الى اوائل نيسان ينقضي في التربة.

١٨٤٤ - أفوديوس تائه *


Aphodius erraticus (S). Aphodius errant (F).
Aphodius erraticus (E).

حشرة نائلة تنتمي الى فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها معظم اصقاع العالم القديم. تألف الاماكن التي تكثر فيها الدواب لانها تعيش على روث الخيل والبغال والحمير... || جسمها صغير القد، شبه بيضي الشكل، يطول من ٥ الى ٧ سم. ثوبها ثنائي اللون، الرأس والكوسل الى السمرة السوداء، الظهران الى الصفار الخنطي الدنس. رأسها مستعرض الجرم، قصير الخطم. عيناها صغيرتان بارزتان. زباناها صفيان دقيقان. ظهرانها مستدير الطرف اللاحف. غمداها متتابعتا التحزيز. ارساغها خماسية العقل || الانثى اميز قدماً من الذكر وافتح ثوباً منه واقل حركة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى ايلول. تسرح في الليل اما في زمن التسافد فسرحتها يستمر طول الليل والنهار || اليرقة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. جسمها مقوس الشكل، عشاري السكم، سداسي الرواجب، ابيض اللون الاغبر الدنس. رأسها اسود فكها ضليعان. تعيش على المواد العضوية في الروث وفي التربة حتى اوائل اذار حيث تتحول الى حورية ومنها الى حشرة جملانة تظهر في ايار.


١٨٤٥ - أفوديوس مبدول *

Aphodius granarius (S). Aphodius commun (F).
Aphodius granarius (E).


حشرة نائلة من فصيلة الجعليات ورتبة غمديات الاجنحة. موطنها يشمل معظم اقاليم العالم القديم. تألف الاماكن المأهولة لانها تعيش على مختلف انواع البراز من الغائط الى الروث والحي والجله والبعر... || جسمها صغير




أفوديوس أزرق الكوسل



أفوديوس تائه



أفوديوس مبدول



أفون الرمال



أفياء

١٨٤٩ - **أفيبكتس** * Epipactis grandifolia (S).
Epipactis, Helleborine (F), Epipactis (E), Grüne
dingelwurz (D), Elleborina (I).
ضرب من الشحاريات التي تزرع للزينة . ساقها مستقيمة
اسطوانية جوفاء . أوراقها متعاقبة رحيمة حاضرة . أزهارها
سنبل التجميع هامي الارتكاز . أزهارها جميلة الشكل
ارجوانية البتلات ، فواحة العرف العطر الذي يشبه الفينيلة .

١٨٥٠ - **أفيت** Ophite
الافيت ونهم من قال حجر الحية نوع من الرخام
الاخضر المبقع .

١٨٥١ - **أفيتامين** Avitaminose
علة في الجسم سببها عوز الفيتامين .

١٨٥٢ - **إفيجينية** ° Iphigenia (S), Iphigénie (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة الدونسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها
مثلة الزوايا ، سمكة الاصفاذ ، متساوية المصاريح
لامتساوية الاضلع . مشاعها انبوية الشكل ، طليقة ،
مستطيلة || تعيش بين الرمال والاسمال عند مصبات الانهر .

١٨٥٣ - **أفيديوس الخرطال** ° Aphidius avenae (S).
هو دحور الأرق ، اطلبه .

١٨٥٤ - **أفيس** Aphis
هو الأرق .

١٨٥٥ - **أفيقة** Peau tannée (F), Fell, Hide (E).
الجلد المدبوغ ويقال له السبت .

١٨٥٦ - **أفيقون** اطلبه هيبقون .

١٨٥٧ - **أفيال** Chamelet (F), Young camel (E).
الأفيال : صغير الابل .

١٨٥٨ - **أفيور** ° Ophiure
جنس حيوانات بحرية من فصيلة الافيوريات توجد في
معظم البحار ، تدب زحفاً وتعيش في العمق || قوامها
رأس اسطواني الشكل مصفح الغلاف يحمل جرامز مستطيلة
دقيقة هلية شائكة .

١٨٥٩ - **أفيوريات** ° Ophiuridés (F).
Ophiuridae (E).
صف حيوانات بحرية من الشوكيات الزواحف : فصائل
واجناسه وانواعه عديدة منتشرة في جميع البحار واطرها
بحار البلاد الحارة .

١٨٦٠ - **أفيوس** راجع إشتامس .

١٨٦١ - **أفيوكلايوم** ° Ophiocladum
جنس فطور مجهرية من عمارة الزيكيات وفصيلة الطحيات .
الوانه قليلة منها نوع يتطفل على الشجر وبعض النجيليات
الآخري . يتميز بمشجعه الخيطي الشكل ، الرزني التجميع ،
الذي يركب بشرة النصل تحت السمة . اما كنيذاته فردية
شفافة || مظهره الخارجي على نصل العصف بقع ضيقة
مستطيلة رمداء اللون تعلوها بشور بيض . || اخراره قليلة
جداً لا تستوجب المكافحة .

١٨٦٢ - **أفيون** Opium
هو العصارة اللبنة اللزجة المستخرجة من جراء الخشخاش
الحلوية بعض المواد المخدرة والمنومة ، اشهرها المورفين ثم
التركوتين والكوداين والترسين والتباين والخشخاشين
واللودنين || اجوده نوعاً ما كان امغر اللون وهو الذي
يستزف من جراء الخشخاش الاحمر ، واما النوع الابيض
الذي يستزف من جراء الخشخاش الابيض فهو اقل جودة .
والافيون يستعمل في الطب مخدراً ومسكناً للآلام .
تعالجه بمنوع ويمنع محرم لانه وخيم العواقب يحطم الاعصاب
ويسبب الى الصحة .

١٨٦٣ - **أفيونيكس** ° Avionex
طعم زراعي يرتكز على مادة مثالدهيد . وهو مستحضر
معد للاستعمال يحوى ٥ ٪ من جوهر المادة . يستعمل في
مكافحة جميع انواع الرخويات من حلزون وبزاق وغيرها
١٨٦٤ - **أفافية** اطلبه سنط .

١٨٦٥ - **إقامة السدود** Endigage,
Endiguement (F), Damming in, Damming up (E).
هي ان تبني السدود في وجه المياه الجارية منعاً لطفائها .
١٨٦٦ - **أقب**
هو الفرس الدقيق الحصر الضامر البطن . والاثني قباء .
ج قب .

١٨٦٧ - **أقبح** Hanneton commun (F).
Common may-bug (E). اطلبه .

١٨٦٨ - **أقبى** * Akebia (S), Akébie (F), Akebia (E).
جنس نباتات ليفية عارشة معبرة من فصيلة اللريزياليات .
مهدها الشرق الأقصى . تكثر في الصين واليابان . أشهر
انواعها : الاقبى الخماسية الورق (Akebia Guinata) .
تزرع للزينة . أزهارها عنقودي التجميع ، أزهارها وردية .
ثمراها قرون . بزورها كملوية الشكل مقلطحة .

١٨٦٩ - **إقتباس** Réceptivité (F), Receptivity (E).
امكانية التقاط الشيء .

١٨٧٠ - **إقتصاد** Economie (F), Economy (E).
الاقتصاد هو التوفير وهو علم يبحث في ترتيب النفقات
والدخل وادارتها وفقاً لمقتضيات الحال .

١٨٧١ - **إقتصاد زراعي** Economie rurale (F).
Rural economy (E).
الاقتصاد هو التدبير وحسن الادارة . والاقتصاد الزراعي
هو فرع من الاقتصاد السياسي . يختص بطرق انتاج
مختلف انواع الثروة الزراعية ووسائل توزيعها واستهلاكها .

١٨٧٢ - **إقتطاع** Avulsion
هو ان يقتطع تيار الماء قطعة من ارض ويضيفها على
الارض المجاورة او المقابلة لها .

١٨٧٣ - **إقتلاع** Déplantage, Déplantation (F).
Displanting (E).
قلع الاشجار ونقلها .

١٨٧٤ - **إقتناص** Chasse (F), Hunting (E).
الاقتناص هو الصيد البري ويملك الصائد قنصه بالاستيلاء .



أنيقطة



أفيور



أقبى

١٨٨٣ - **أَقْحُونُ المُرُوجِ** Marguerite des prés
اطلب بابونج ابيض .

١٨٨٤ - **أَقْحُونُ حَمِينِ*** ، قَحُونُ ، مَارُوتُ ٥
Anthemis cotula (S). Camomille puante, Maroute (F). Dog's fennel, Stinking may-weed, Stinking chamomile (E). Stinkhunds-kamille, Hunds-kamille (D). Camomilla fetida, Cotula fetida (I).
نوع من الاقحوان وهو نبات عشبي بري حولي . منافعه الطبية عديدة فهو مضاد للتشنج ، طارد للديدان ، مدر للطمث ويستعمل منبهاً في حالات انقباض الرحم . ومنهم من قال انه يسقط الاجنة ويفتت الحصى .

١٨٨٥ - **أَقْحُونُ شَرِيف*** ، بَابُونَج ، بَهَارِ نَبِيلِ
Anthemis nobilis (S). Anthémis noble, Camomille odorante, C. romaine (F). Camamel, Chamomile, Roman chamomile (E). Edle hunds-kamille, Romische kamille (D). Camomilla odorosa, C. romana, C. noble (I).
نبات عشبي بري حولي عديد المنافع الطبية والصحية فواح العرف المستحب || يقوي المعدة ويساعد على الهضم ويمنع الغازات ويخفض الحرارة ويذهب بالسعال الخفيف ويساهل الاطفال || ومنهم من نسب اليه زيادة القوة الجنسية وقد تكون المدأومة على استعماله وما تحدثه من تنظيف الامعاء هي السبب في ذلك .

١٨٨٦ - **أَقْدُومُ** Accidium
مدرج من مدارج الباء في بعض الفطور .

١٨٨٧ - **إِقْرَارُ ، إِعْتَرَا ف** Aveu (F). Avowal (E).
هو ان يعترف من عزى اليه امر بصحة هذا الامر .

١٨٨٨ - **إِقْرِيطَشِيَّة** راجع اخيون معروف .

١٨٨٩ - **أَقْرَامُ القُرُودِ** Hapallidae (S).
Arctopithèques, Hapallidés (F). Hapallidae (E).
هي القرد الدبية ، اطلبها .

١٨٩٠ - **أَقْرَلَانُ** Pennes médianes (F).
Middle feathers (E).
الاقزلان : ريشتان وسط ذنب العقاب .

١٨٩١ - **أَقْسُونُ*** ، رَأْسُ الشَّيْخِ ، شُكَا عَيِ ، طُوبِيَّةُ ، قَصَّ الحَمَارِ
Onopordon acanthium (S).

Chardon acanthe, Artichaut sauvage, Cardonnette, Chardonnette sauvage, Pet d'âne (F). Cotton thistle, Scotch thistle, Wild artichoke (E). Gemeine eselsdistel, Wilde artichoke (D). Cardacclone, Acantino, Peto d'asino (I).
نبات عشبي بري طبي معمر من الحشيشيات وفصيلة المركبات وهو اشد شبيه بالباذورد والارضي شوكي الا انه اقصر قدماً منها له ساق غليظة واوراق مفرصة متموجة هدية الحافة || يقشر طرياً ويؤكل فيدفع التشنج والكزاز . يوجد في الاراضي البور وعلى جوانب الطرقات .

١٨٩٢ - **أَقْسِيَانُ*** Adenogramma (S).
Adénogramme (F).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية من فصيلة المغيريات . منبهاً بعض مناطق افريقية الجنوبية . انواعها المعروفة قليلة العدد . سوقها نحيلة . اوراقها متعابلة ، خاسية العدد ، عصفية النصال ، صغيرة القد . ازهارها عنقودي

١٨٩٥ - **أَقْتَنِي*** ، أَقْطَنِي

Actaea (S). Actée, Herbe de St. Christophe (F). Baneberry, Grapewort, Herb Christopher (E). Ahriges Christophskraut, Schwarzwurz (D). Actea d'Europea, Cristoforiana (I).
جنس جنبات وجنبيات معمرة من سبط الحشيشيات وفصيلة الخوذائيات . اوراقها مركبة ثلاثية مفصصة متعاقبة طويلة الزناد بحيلة الاخضرار || ازهارها صغيرة عنقودية التجميع تاجية الارتكاز لوها الى الخضار الارجواني . بتلاتها صغيرة خضوية شفوية افقية . اسديتها عديدة . ميسمها وحيد ثمارها عنبية ، شبه كروية ، سوداء اللون ، سامة || انواعه عديدة معظمها بري ينبت في جميع الاصقاع المعتدلة وبعضها يستعمل للتزيين . اشهرها واعمها :

١٨٩٦ - **أَقْتَنِي بَيْضَاءُ** Actaea alba (S).
Actée blanche (F).
تزرع للتزيين . ازهارها بيضاء اللون . ثمارها سامة .

١٨٩٧ - **أَقْتَنِي سُنْبُلِيَّةُ** Actaea spicata (S).
Actée en épis (F).
تزرع للتزيين . ازهارها سنبلية التجميع ارجوانية اللون . ثمارها سامة .

١٨٩٨ - **أَقْتَنِي عُنُقُودِيَّةُ ، قَاتِلُ البَقِّ** Cimicifuga racemosa (S). Actée à grappe, Cimicaire (F). Bug-bane, Rattle-root, Black snake-root (E). Schwarzes wanzenkraut (D). Actea cimicifuga (I).
نوع من الاقنى وهو نبات عشبي بري يقال انه يقتل البق وبعض الحشرات .

١٨٩٩ - **إَقْتِنِيَات** Trophisme, Trophie (F).
Trophism (E).
حالة التغذية .

١٨٨٠ - **أَقْحُونُ** Anthemis
ومنهم من قال بهار وهو غلط فافصح || جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من سبط العذقيات وفصيلة المركبات الانبوية الزهر . || انواعه عديدة معظمها اسبوي واروبي المنبت . جميع اعضائها عطرية . قناها مستدير يتألف من حراشف مرصوفة شفاقة الاهداب الناشفة . قرص الزهرة مغمم بالشذور تتوسطه زهيرات نخشوية صفراء اللون من انواعه المشهورة ما يتبع .

١٨٨١ - **أَقْحُونُ أَصْفَر*** ، عَيْنُ القَطِّ ، بَهَارِ حَقْلِي
Anthemis arvensis (S). Camomille des champs, Fausse camomille (F). Corn chamomile (E). Ackerhunds-kamille, Feldkamille (D). Camomilla dei campi, Banbagella campestre (I).
نبات عشبي بري يكثر في بعض الحقول وبين الزروع فيصبح من النباتات الضارة || يستخرج منه زيت طيار يستعمل في الطب .

١٨٨٢ - **أَقْحُونُ الصَّبَاغِيْنِ*** ، عَيْنُ الثَّورِ ، بَهَارِ الصَّبَاغِيْنِ ، بَابُونَجِ أَصْفَرِ

Anchemis tinctoria (S). Camomille des teinturiers, Œil de bœuf (F). Golden Margaret, Dyer's anthemis, Yellow camomile (E). Farberhunds-kamille, Gold-blumen (D). Camomilla dei tintori, Bambagella, Occhio bovino (I).
نبات عشبي بري يستخرج منه صباغ اصفر اللون وزيت طيارة طبية .



أقنى



أقحوان اصفر



أقحوان الصباغين



أقحوان حن




أقحوان شريف



أقسون



أَقْصِلَان




أَقْصُور



أَقْطَبَان



أَقْفَد



أَقْلَح الشَّوْاطِي

الاجنحة . تألف المناطق وضفاف الأنهر ومجاري الماء .
خنافسها ويرقاتها تعيش على ما يتيسر لها من الحشرات
الدنيا والهوماء || جسمها صغير القدر بطول من ٦ الى ٨ مم .
ثوبها الى الخضار النحاسي الاسفع الموج . ظهراتها
مزخرف السطح . رأسها مستعرض الجرم ، قصير الخنصر .
عينها صغيرتان جاحظتان . زباناها محيطيان مستطيلان .
غذاها ثمانية الاخاديد المتوازية . جرامزها الى الخضار
الانمس . افخاذاها الى الحرة . ارساغها خماسية العقول || الانثى
اصغر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبناً || لها
جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اواسط
الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسرح في النهار .
تسافد في اوائل ايلول . تمتع المكن بين لحاء الاشجار
وتحت قشورها || اليرقة مردنية الشكل ، سداسية الرواجب ،
تطول عند تمام الادراك نحو ١٢ مم . ثوبها الى الطحلة
الفراء . رأسها وشرجها ورواجبها الى السمرة القاتمة || طور
الاكتمال الذي يستمر من ٥٠ الى ٦٠ يوماً ينقضي
في نفق تحتفره في التربة .

١٩٠٧ - أَقْلَحِيَّات ٥ Elaphridae (S).

Elaphridés (F). Elaphridae (E).

فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غمديات الاجنحة .
اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الاقاليم
الباردة . تألف الشطوط وضفاف الأنهار ومجاري الماء ||
جميعها صغيرة القد ، مستعرضة الرؤوس ، مستطيلة
الزباني المركبة من ١١ فصلة . اغداها ثمانية الاخاديد
المتوازية . جرامزها دقيقة . مستطيلة الساق في الزوج
الخلفي . تجاويها الحرقفة الامامية ملحوبة اما الخلفية
فمنفصلة . وهي سريعة الحركة ، خفيفة الطيران ، تسرح
في النهار وتبيت في الليل . تغرس ما تيسر لها من الحشرات
الصغيرة والديدان والهوماء || اشهر اجناسها الاقلم .

١٩٠٨ - إَقْلَرَقِيَّة Clarkie, Eucharidia (F).

اطلب كلاركيه .

١٩٠٩ - أَقْلَم Acclimater (F). To acclimatize (E).

كيف النبات او الحيوان بشئ الوسائل ليألف اقليماً
جديداً لم يتعوده بعد .

١٩١٠ - إَقْلِيد Euclidium (S). Euclidion (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض مناطق الشرق الادنى ||
سوقها منتصبه فروعاً تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها
متعاقبة ، سنانية النصال الصغيرة . ازهارها صغيرة بيضاء
اللون || اشهر انواعه الاقلم السوري E. syriacum (S).

١٩١١ - إَقْلِيم ، مَنَاح Climat, Climatologie (F).

Climate, Climatology (E).

هو في العرف العام تقسيم واقعي لختلف بقاع الارض
يرتكز على العوامل الطبيعية اخصها الحرارة والامطار
والرياح || لذلك فالاقاليم كثيرة وقد حددها العلم بعدد
خطوط العرض || اما الاقليم من الوجهة الزراعية فهو
تعبير خاص يدل على امكانية زراعة جنس معين من
النبات كقولك اقليم الزيتون واطليم الكرمة واطليم البرتقال
الخ... || والاقليم من الوجهة العامة ، بصرف النظر
عن الترتيب الزراعي ، يقسم الى ستة اقسام او اقاليم :

Climat maritime (F).

Maritime climate (E).

اقليم بحري

التجميع . ازهارها خماسية التركيب بيضاء اللون او خضراء .
ثمراها عجمات صغيرة شبه مخروطية الشكل .

١٨٩٣ - أَقْصَلِيص هو الحماض .

١٨٩٤ - أَقْصَلِيص صَغِير اطلب حماض العيد .

١٨٩٥ - أَقْصَلِيص عَسْقُولِي اطلب حماض عسقولي .

١٨٩٦ - أَقْصُور * Oxyure (F). Oxyuris, Pin-worm (E).

منهم من سماها حادة الذيل . جنس ديدان من السلكيات
الاسطوانية المستدقة الطرف . انواعه عديدة تصيب الانسان
وبعض الدواجن كالخيل والدجاج . طول ذكورها يبلغ
٦ مم . واناثها نحو ١٢ مم || تعيش طفيلية في الامعاء .

١٨٩٧ - إَقْطَاع راجع استقطاب .

١٨٩٨ - إَقْطَاعَة Latifundium (F).

Latifundium (E).

الاقطاعة اراض اميرية او مملوكة فسيحة الارعاء مترامية
الاطراف مهمل لا تستثمر . ج . إقطاعات .

١٨٩٩ - أَقْطَبَان * ، طَوَلَق Stratiotes (S).

Stratiote (F). Water soldier, W. house leak (E).
Wasserfeder (D). Erba coltella, Stiletti d'acqua (I).
عشبة مائية من الاقطنانيات وفصيلة كلويات الماء . وهي
نجمه عسقلية الجذور ، قرصية الاوراق الخزمية الرخية
الالوية . زهرتها وحيدة يحملها شراخ دقيق يعلو الاوراق .
بتلاتها ثلاثية التركيب ، وردية اللون . اسديتها تساعية
تعيش في المياه العذبة وفي المستنقعات .

١٩٠٠ - أَقْطَبَانِيَّات ، طَوَلَقِيَّات

Stratiotées (F). Stratiotae (E).

سبط النباتات الاقطنانية او الطولقية التي تنتمي الى فصيلة
كلويات الماء . اكثرها نباتات نجمية عديمة السوق تعيش
في المياه العذبة .

١٩٠١ - أَقْطَة Gésler (F). Gizzard (E).

هي القانصة من جيوب الجهاز الهضمي في الطير .

١٩٠٢ - أَقْطَع الاقلم هو كل حمام في بطنه بياض .

١٩٠٣ - إَقْطَاء Ttirer au renard (F).

عيب في الخيل يحملها على شد الرمن للاقواء اي الجلوس
على اسبها .

١٩٠٤ - إَقْطَعَال Débourrement (F).

Brusting of the down of the buds of trees (E).

اقطع الزهر : انشق عن قعائلته . ويقال اقل التفتح
واقلم الكرم .

١٩٠٥ - أَقْطَد * Cagneux (F).

Knock-kneed, Splay-footed (E).

الققد هو التواء السنبيكين الى الداخل . وهو من عيوب
الخيل . ويقال فرس اقد لمن كان كذلك .

١٩٠٦ - أَقْلَح الشَّوْاطِي * Elaphrus riparius (S).

Elaphre des rivages (F). Elaphrus riparius (E).

حشرة قانصة من فصيلة الاقلميات ورتبة نمذات

فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١.٢٥ ٪ في مكافحة امراض البطاطا الفطرية .

١٩٦١ - إكزودرم Exoderme (F). Ectoderm (E).
اطلب بشرة خارجية .

١٩٦٢ - إكزوران Exoran
مسحوق ناعم يرتكز على مركبات الزئبق . يستعمل لوقاية البذار المخزون من النخر وذلك بمعدل ٢٠٠ غرام لكل ١٠٠ كيلو بذار .

١٩٦٣ - إكزيمه ، قوباء Eczéma (F).
Eczema, Tetter, Moist tetter (E).
مرض جلدي يمتري معظم الحيوانات الداجنة اخصها الخيل والابل .

١٩٦٤ - إكزيمه رطبة ، ومحة ، حصف Impétigo, Eczéma humide (F). Impetigo (E).
هي القوباء الرطبة ، مرض جلدي .

١٩٦٥ - إكس Aix
جنس طير من البط البري يتميز بهاء اياه الريشي ، باستطالة جسمه وذنبه ، بكبر رأسه ، بدقة عنقه ، بقصر منقاره الاعقف الملقط ، باعتدال وضيق جناحه ، بصغر ساقه وبوفرة الوانه الزاهية المتراكبة || انواعه عديدة منها اثنان شهيران : الاكس الشرقي والاكس الامريكي .

١٩٦٦ - إكس أمريكي Aix Sponsa (S).
Aix de la Caroline, Canard de la Caroline
لا يختلف عن الشرقي الا بثوبه الذي ينحرف فيه الاخضر نحو الجؤوة وبأغرته الزرقاء المحفوفة بالبياض .

١٩٦٧ - إكس شرقي Aix galericulata (S).
Aix mandarin, Canard mandarin (F).
موطنه اليابان وشمال الصين وحوض نهر الأمور . يعيش قرب المياه العذبة . يتميز بحسن وجمال ريشه الزاهي وبأغرته الفستقية اللون || قوته النباتات المائية والحشرات والضفادع والحبوب والثمار العنينة || وهو كالحمام الفة ووداً يألف الذكر انشاء ولا يقترب من غيرها || يدئن في الاشجار ويحضن البيض مناوبة .

١٩٦٨ - أكسع
هو الطائر الذي اجتمع تحت ذنبه ريش ابيض . ج كسع يقال حمام اكسع .

١٩٦٩ - إكسور اطلب مغريب .

١٩٧٠ - إكسوس صيني Yxos Sinensis (S).
Yxos de Chine (F).
طائر غريب من الجواثم سنيات المناقير ينتمي الى فصيلة الكميقيات . موطنه يمتد من الصين الى بورنيو . يألف البراري والادغال . ملجئه الحياتي جماعي . اقواجه قليلة العدد الذي يراوح من ١٠ الى ٣٠ زوجاً . قوته الحشرات واليزور البرية والحبوب والثمار اليانعة || جسمه صغير النمد يطول نحو ١٧ سم . ثوبه العلوي الى الشقحة المسنجة بالاسود . جبهته وقفله ومخسراه وجناحاه وذنبه الى السمرة السوداء . صدره وبطنه الى الغبرة . ذنبه معتدل القد ، مقلوق الطرف || يدئن عشه في الادغال على ارتفاع يراوح

١٩٤٩ - أكر Acre
مقياس مساحي ، يستعمل في انكلترا والولايات المتحدة ، يعادل ٤٠ آر ونصف الآر اي ٤٠٥٠ م ٢ او ١٦٠ قسبة انكليزية مربعة او ٤٨٤٠ ياردة مربعة او ٤٣٦٥٠ بوصة مربعة .

١٩٥٠ - إكترار Hélotrope
اطلب هليوتروب .

١٩٥١ - إكترالية * Aposphaeria (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغبيات ، انواعه عديدة قليلة الأذى تعيش باكثريتها على اللحاء والاعضاء الخشبية . يتميز بغلاظة بكنيده الذي يتكون وينمو داخل القشرة ثم يرقى حتى البشرة فيسبب انتفاخها وانفجارها اعرف واشيع انواعه اكرالية التفاح .

١٩٥٢ - إكترالية التفاح * Aposphaeria pomi (S).
فطر يركب ثمار التفاح والاصاص المحفوظة فيعفنها ويهرها مظهره الخارجي بقع مبعثرة طحلاء اللون صفيرة الحجم تمتد وتنتشر بسرعة فتسبب انكماش وتجميد البشرة ثم انحراف لونها الى السمرة والسواد .

١٩٥٣ - إكتراه ، ضغط Contrainte (F).
Constrained, Forced, Affected (E).
هو حل المرء على ان يعمل او لا يعمل تحت تأثير شديد يسلبه حرية ارادته .

١٩٥٤ - أكرون Acron (F). Acron (E).
الاكرون الطرف الامامي من الجسم عند الحيوانات متماثلات الاجزاء . اما الطرف الخلفي فيدعى تلسون .

١٩٥٥ - أكرونيكتا درامة * Acronycta lièvre (F).
حشرة تدعى عسقودة درامة ، اطلبها .


١٩٥٦ - أكرونيكتا هزيلة * Acronycta décharnée (F).
حشرة تدعى عسقودة هزيلة ، اطلبها .

١٩٥٧ - أكريبتول Acryptol
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في مكافحة الشتوية للقضاء على مكن الحشرات من اي نوع كانت .

١٩٥٨ - أكريسيد Acricide
حاشور زراعي يحوي ٢٥ ٪ من مادة هكزاكلورو - سيكلوهكزان اي ما يربو على ٣ ٪ من الايزومير غاما . وهو مسحوق اغبر اللون يستعمل تعفيراً او مزوجاً مع النخالة المرطبة بالماء || ويستعمل في مكافحة الجراد والجنادب والنمل والديدان بمعدل ١٥٠٠ غ للدم الواحد .

١٩٥٩ - إكزام Exam
حاشور زراعي يرتكز على مادة الليندان ، يستعمل اما تعفيراً على النبات بمعدل ٢ كيلو للدم الواحد اما سائلاً محلولاً ١.٢٥ ٪ .

١٩٦٠ - إكزام نحاسي Exam cuprique



إكرالية



إكرالية التفاح



إكس شرقي



إكسوس صيني

من مترين الى ثلاثة أمتار . الانثى تحضن بملأ فمها الذكر من ٤ الى ٦ بيضات || يألف حياة الاسر وقد يجاري البلبل في التغريد .

١٩٧١ - أكسيديات °
Axiidae, Cimeliidae (S).
Axiidés, Cimeliidés (F). Axiidae, Cimeliidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها المعروفة خمسة جميعها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، قضيعة ، وشعبة الشكل . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الشقين . ملاسها قصيرة منفردة الزوايا . مراشها متوسطة الطول . بطونها سفلية الزغب . حذراتها صغيرة تقع على جانبي السكة البطنية السابعة . رواشها متوسطة الحجم ، جملونية الاسر سال عند الراحة ، الامامية منها مزخرفة متراكبة الالوان ، اما الخلفية فوحيدة اللون . جرامها تامة النمو . ظنايبها الخلفية مجهزة بمناخس مستطيلة || اساريها مفضنة ، متقبضة ، مشعللة . خادراتها ملحونة بفيالنج بيضية الشكل ، متينة النسيج الناعم .

١٩٧٢ - أكسيية مرغريت °

Axia margarita, Cimelia margarita (S).
Axie marguerite, Cimelie marguerite (F).
Axia margarita, Cimelia margarita (E).

حشرة من فصيلة الاكسيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها خاضعة تعيش على اوراق الفربيونيات || جسمها صغير قضيض يطول نحو ١٠ مم . بسطها تراوح من ٢٨ الى ٣٠ مم . رأسها معتدل الجرم حنطي اللون . عيناها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الشقين . جوشها حنطي اللون . بطنها اصفر . روشناها الاماميان الى الوردي تعلوه بقعة طرفية كبيرة صفراء وبقعة وسطى فضية وبقعة قاعدية صفراء مذهبة . روشناها الخلفيان الى البياض العاجي القديم الدنس || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في ايار وتبقى حتى حزيران وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح الممكن لطخاً تلفها مادة غروية تثبتها على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ١٨ مم . جسمها مفضن مشعل ، اطحل اللون اسمر الموج . رأسها مكور ، احمر . مدنها الى الطحلة . رواجها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن صلجة مثينة النسيج تحببها السرفة تحت الاوراق والفضبان والاشخاب التي تلامس التربة .

١٩٧٣ - أكسيجين ، أكسيجين
Oxygène (F).
Oxygen (E).

ويدعى مولد الحموضة ، جسم بسيط غازي عادم اللون والرائحة والطعم . رمزه (O) وزنه الاتومي ١٦ وزنه اللاري ٣٢ . يكثر في الهواء ويمتزج بمعظم الاجسام البسيطة . قليل الذوبان في الماء . نسبة وجوده في الجو تقارب خمس حجم الهواء || فوائده عديدة واستعماله الصناعي واسع الانتشار .

١٩٧٤ - أكسيجينيرس °
Oxygyrus (S).
Oxygyre (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد الحارة . جميعها يمتة لا تقرب الشطوط || اصداها بوقية محلونة نحيلة مستعرضة السقاط الشفاف المثلث الزوايا .

١٩٧٥ - أكسيد ، أوكسيد
Oxyde (F).
Oxid, Oxide (E).

هو المادة الناتجة من اتحاد بعض العناصر بغاز الاكسيجين او بالاكسيجين الموجود في الهواء . وهذه العملية تعرف بالتأكسد . والاكاسيد على نوعين منها ما يتكون من اتحاد المعادن بالاكسيجين وتسمى اكاسيد قلووية مثل اكسيد الكالسيوم ومنها اكاسيد حمضية وهي التي تتكون من الاتحاد بغير المعادن مثل الكبريت ، فاذا وضعت في الماء يكون لها طعم لاذع .

١٩٧٦ - أكسيد الكربون
Oxyde de carbone (F).
Carbon oxide (E).

غاز لا لون له ولا رائحة يحترق فيولد غاز الكربون .

١٩٧٧ - أكسيلوب ، أكسيلوبيوم
Oxylobium (S).
Oxylobe (F). Oxylobium (E).


جنس نباتات ترينية من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها استراليا . انواعه الزراعية المعروفة لا تقل عن الثمانية . جميعها جنات وجنابات متقابلة الاوراق البسيطة . ازهارها عشكولي التجميع ابطي او طرفي الارتكاز . ازهارها مختلفة الالوان الزاهية || تنكأثر بالزور والعقل . تجود في جميع الاثربة ، تختفي المواقع الرطبة الباردة .

١٩٧٨ - أكسيلية عتيقة °


Axylla vetusta, Calocampa vetusta (S).
Axyllie vétuste (F). Axylla vetusta (E).

فراشة مبدولة من فصيلة النسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشها تجوب البراري والاحراج قوتها مغثر الازهار . سرفها تعيش على اوراق النباتات الحولية والمحولة || جسمها كبير القدر يطول نحو ٢٣ مم . بسطها تراوح من ٥٦ الى ٦٠ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان ناشزان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . مرشفا معتدل الجرم والطول . جوشها ويطنها الى الحنطي الاشقيع الموج . روشناها الاماميان الى الحنطي يعلوه تمشيع اسمر وتبضيع اغبر وطوق حناري اسود . روشناها الخلفيان الى الحنطي الاشقيع الموج ينتهي بختار اغبر . اهدابها ثبينة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى نيسان . تسرح في الليل || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤٥ مم . جسمها اسطواني الشكل ، اطحل اللون يعلوه تجذيع معترض جزوي . رأسها اسمر ، مدنها اغبر ، رواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة حيث تنغم السرفة على عمق ٦ سم . ملتصقة بجلباب من الطين .

١٩٧٩ - إكسين °
Exine
هو غلاف الجذرة الخارجي الذي يغطي الأنثيين .



اكسيه مرغريت




أكسيجينيرس



أكسيلوب



اكسيلية عتيقة



أكشوث



أكلة



إِكْلِيل الْجَبَل

١٩٨٠ - أَكْسِين °
Auxine
مادة نباتية لها تأثيرها المباشر على الجهاز الحليوي من حيث الاستطالة والفضخامة والتكاثر .

١٩٨١ - أَكْشُوث *
Cuscuta (F). Dodder (E).
أطلب كشوث وهو نبات طفيلي لا ورق له سر الطعم جداً . يقال ان نقيعه عجيب لليرقان وأنه يدر البول والحيض وينفع من المغص .

١٩٨٢ - إِكْعَال ° ، كَعْل °
Métamorphose (F). Metamorphosis (E).
هو التغير من شكل الى شكل آخر . وهو التحول الشوزي الذي يحل بالاسماك وبالحشرات عند غلوطها العذري بعد اكتمال دورتها الحياتية الاولى .

١٩٨٣ - أِكْعَل ° ، كَعْل °
Métamorphoser (F).
To metamorphose, transform (E).
غير طبيعة الشيء او شكله .

١٩٨٤ - آكِل
Corrodant (F). Corroding (E).
هو كل حامض او مادة اكلة تقرض المعادن .

١٩٨٥ - آكل العسل هو الراتل : حيوان من السرعوييات .

١٩٨٦ - آكِل النَّطَّاط الْأَنْمَر
Locustelle tachetée (F).
هو الشنل الأنمر ، اطلبه .

١٩٨٧ - آكِلَات الثمر ، ثامِرَات °
Frugivores (F).
Frugivorous (E).
هي الحيوانات او الحشرات من اي نوع كانت تأكل الثمار او قوتها الثمر .

١٩٨٨ - آكِلَات الْحُبُوب ، حَابِيَات °
Granivores (F). Granivorous (E).
هي الطيور من اي نوع كانت تفتدي بالحب . بعضهم يطلق عليها اسم حبيات .

١٩٨٩ - آكِلَات الْحَشَرَات ، حَاشِرَات °
Insectivores (F). Insectivorous (E).
هي الحيوانات والطيور والدوييات من اي جنس كانت تقتس الحشرات .

١٩٩٠ - آكِلَات الْخَشَب ، خَاشِبَات °
Xylophages (F). Xylophagous (E).
هي الحشرات من اي نوع كانت تفتدي من الياف النبات الخشبية حية كانت او ميتة .

١٩٩١ - آكِلَات الْكُرُوم ، جَافِنَات °
Ampélaphages (F). Ampelophagous (E).
الحشرات من اي نوع كانت تقضم وتقرض الكرمة .

١٩٩٢ - آكِلَات اللَّحُوم ، لَاحِمَات ، لَوَاحِم ، لَحِيَات
Carnassiers, Carnivores, Fauves (F). Carnivorous, Flesh-eating, Fallow-deer, Fawn-coloured (E).
رتبة من الحيوانات الثدييات عديدة الفصائل والاجناس والانواع . أشهر فصائلها : السنوريات والكليبيات والضبعية والزباديات الخ .

١٩٩٣ - آكِلَات النَّمْل ، نَامِلَات °
Myrmecophagidae (S). Myrmécophagidés, Fourmilliers (F). Myrmecophagidae, Ant-eaters (E).
فصيلة حيوانات من رتبة الدرد الحشريات قوتها النمل .

١٩٩٤ - آكِلَات الْوَرَق ، خَاصِلَات °
Phyllophages, Phytophages, Mélolonthidés (F). Phyllophagous, Phytophagous, Melolonthidae (E).
هي الحشرات المضرّة من اي نوع كانت تركب اوراق النبات وزرعاته فتقرضها وتؤذيها .

١٩٩٥ - إِكْلَاس °
Chaulage (F). Liming (E).
هو اصلاح التربة بالكلس . فوائده التي يحققها في التربة مع الادوار الرئيسية التي يهيمن عليها فوجزها بما يلي :
(١) يخفف صلابة التربة الطينية واندماجها ويؤهلها لزيادة استيعاب الماء ولنشاط البورة الجرثومية ؛ (٢) يفيد السجام التركيب الغذائي لان نسبته الغذائية تراوح من ١ الى ٤ ٪ ؛ (٣) يدمل التربة باعماله التحليلية العضوية وينشط الترجمة ويقودها الى التمثيل ؛ (٤) يذكي قوة الامتصاص وهي خاصة في التراب تجعله يحتفظ بين ذراته بأكبر كمية ممكنة من العناصر الغذائية البوتاسية والأمونيائية .

١٩٩٦ - آكِلَة *
Chancre (F). Chancre, Canker (E).
اسم شامل يطلق على عدة امراض نباتية ناجمة عن فطور مجهرية مختلفة || مظهرها الخارجي قرحة في اللحاء تمتد الى الشكير وتغور في الخشب || وصفها وطرق مكافحتها مذكورة مع المرض الذي يسببها .

١٩٩٧ - آكِلَة ، أَكْلَان ، هَرَشَان
Prurigo (F).
مرض جلدي يمتري البقر .

١٩٩٨ - آكِلَة الشفاح
Chancre du pommier (F).
أطلب هدكة حنطية .

١٩٩٩ - آكِلَة الحور
Chancre du peuplier (F).
أطلب هدكة قرمزية .

٢٠٠٠ - آكِلَة الزان
Chancre du hêtre (F).
أطلب هدكة سوداء .

٢٠٠١ - آكِلَة الصَّنُوبَرِيَّات
Chancre des conifères
أطلب هدكة صنوبرية .

٢٠٠٢ - إِكْلِيل ، أَطْرَة
Couronne (zoot.) (F).
من اعضاء الفرس . اكليل الحافر وهي بين الرسغ والحافر .

٢٠٠٣ - إِكْلِيل
الإكليل منزل من منازل القمر الهانية . وهو رأس العقرب . ويتألف من ثلاثة انجم زاهرة مصطفة معترضة . رقيب الاكليل يدعى الثريا .

٢٠٠٤ - إِكْلِيل الْجَبَل * ، حَصَا الْبَان ، نَدَى البحر ، قِرْمَانَا
Rosmarinus officinalis (S).
Romarin, Encensier (F). Common rosemary, Old-man (E). Echter rosmarin (D). Rosmarino, Rame-rino, Tresmarino (I).
نبات عطري طبي معمر عرووي دائم الاخضرار . من فصيلة الشفويات . وهو جنبة صغيرة شابة مخشوشة الساق دقيقتها . اوراقها متقابلة لسنة ضيقة كثيفة . ازهارها

الهند وفي المناطق الامريكية الجنوبية الحارة . يقال انه يحوى خاصية حل عقدة اللسان لذلك يعطونه للاطفال الذين يتأخرون بالنطق فيلوكونه ويمضغونه وهو يستعمل في المستحضرات الطبية ضد فساد الدم .

٢٠١٢ - أكمته Aveugle de naissance (F).

Blind from birth (E).

نعت تعريفي يطلق على من كان عادم البصر خلقة . راجع كنه وطليس .



إكليل الملك

٢٠١٣ - أكمته Achaine (F). Achene, Achenium (E).

هي كل ثمرة باسطة مطبقة وحيدة البذرة اللامتنصقة بغلافها كالبندقة واللوزة ... راجع ثمرة فقيرة .

٢٠١٤ - أكمته Aquarium

هو حوض أو أناء كبير الحجم يملأ ماء وترى فيه الاسماك أو النباتات المائية .

٢٠١٥ - أكمته Aucuba japonica (S).

Aucube du Japon (F). Japan laurel, Gold leaf plant (E). Goldorange (D). Aucuba, Foglio dorata (I).

جنية تزيينية معمرة من فصيلة الشؤميات . مهدا اليابان . ساقها مستقيمة ، اغصانها شاعبة ترتفع نحو المتر . اوراقها دائمة ، ملساء النصل ، لونها الى الخضار القائم الموشم بعدة نقط صفر . وهذه الاوراق معنقة بيضية مستطيلة مشرفة . ازهارها ثنائية المسكن صغيرة عذقية ابطية وقاجية ، قصيرة الزناد مقطوعة الكأس الرباعية الغرف ، رباعية البتلات والاسدية وحيدة الميسم والمدقة || تستعمل للتزيين . تعيش في الاصيص والمركن مهما بلغ عمرها . تحشى الاماكن الباردة . تكثيرها يكون بالتعجيل والتشكير .

٢٠١٦ - أكمته Accotox

حاشور زراعي يحوى ٥٠٪ د.د.ت. وهو مسحوق ناعم اغبر اللون قابل الذوبان في الماء . يستعمل محلولاً بالماء بنسبة ٥ ٪ في مكافحة أكثر الديدان وانحصها دودة الثمر وقاطوع العنب وديدان الملفوف والبندورة والبطاطا والشوندر والتبغ ... ويستعمل تعفيراً بمعدل ٣ كيلو للمد .

٢٠١٧ - أكمته Ecoriol

ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران . يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في مكافحة الشتوية للقضاء على مكن الحشرات من اي نوع كانت كما يستعمل ضد بعض الامراض الفطرية .

٢٠١٨ - أكمته Acomas

جنية برية طبية من فصيلة اليكساسيات . مهدا المناطق الحارة الامريكية . اوراقها متقابلة معنقة ، بيضية الشكل مسننة الحافة لونها الى الخضار القائم . ازهارها عنقودي التجميع تاجي الانتكاز . ازهارها غبراء اللون منتصبه صغيرة الحجم قصيرة الرجيلة عديدة البتلات الافقية الانتشاب كثيرة الاسدية وحيدة الميسم غليظة المدقة || تستعمل في علاج الامراض المهبيلة والتناسلية .

٢٠١٩ - أكمته Aconitum (S). Aconit (F). Aconitum, Aconite (E).

جنس نباتات عشبية معمرة سامة من فصيلة الخوذانيات منتشرة في جميع الاصقاع والاقاليم ، انواعها عديدة اشهرها واعها بيش البهر او قاتل النمر || وهي نباتات جنية



أكربة



أكوماس

فردى او ثنائى التجميع ابطى الانتكاز . ازهارها جميلة اللون الازرق وافرة الرحيق تجرسها النحل || بعد من الافاويه . خواصه الطبية عديدة . نقيع ازهاره ناعوظ معروف . يستخرج من ازهاره واوراقه عطر عزيز شائع الاستعمال || يتكاثر بالبذر والتعجيل والترقيد . تبذر مشاتله في اذار وتغرس عقله في كانون وشباط || يعيش ويوجد في جميع الاثرية الزراعية لكنه يخشى الرطوبة المستحكمة .

٢٠١٥ - إكليل الملك * ، عرّار قيصري

Fritillaria imperialis (S). Fritillaire impériale, Couronne impériale (F). Crown imperial, Crown imperial fritillary (E). Kelzerskroon (D). Giglio regio, Corona imperiale (I).

نبات يصلي من التزيينات يزرع للتزيين يعلو نحو ١٠٠ سم . ازهاره عشكولي التجميع يرتكز على شمراخ اجوف املس مستطيل . ازهاره متدلية جرسية الشكل جميلة القلب لونها الى الحمرة البودية ومنها ضروب صفراء اللون وبعضها حنطى مرقوش بالابيض || يزرع كسائر انواع الزنبق ويظهر من نيسان الى ايار . ازهاره فواحة العرف المستهجن الرائحة . عصارته سامة .

٢٠١٦ - إكليل جنوبي Couronne australe (F).

Corona australis (E).

الإكليل الجنوبي كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها تحت برج الرامي ، تظهر في اوائل تموز || عدد نجومها ثلاثة عشر . بعض نجومها من المرتبة الخامسة . ومن العرب من يسمي هذه الكواكب « القبة » لاستدارتها ومنهم من يسميها « ادحى النعام » وهو عشه لانها على جنوب النعامين الصادر والوارد .

٢٠١٧ - إكليل شمالي Couronne boréale (F).

كوكبة نجوم شمالية الموقع تدعى الفكّة ، اطلبها .

٢٠١٨ - إكليل شوكي * ، فريون بهي

Euphorbia splendens (S). Euphorbe splendide (F). Crown of thorns (E). Euforbo lattaria (I).

نوع من الفرييون وفصيلة اليتويعيات وهو جنية شائكة برية وزراعية تزيينية . منبتها أكثر الاقاليم الحارة من حوض البحر المتوسط . ترغب في المواقع المعرضة للجنوب . تعيش في جميع الاثرية لكنها تخشى الرطوبة || ازهارها جميلة الشكل لونها الى الحمرة القرمزية || تتكاثر بالعقل ولا تنرس النقلة الا بعد انقطاع حوضها وجفاف جرحها . وهي تعيش وتجد في المراكن والقصع .

٢٠١٩ - إكليل ، إكليل ، تقطين

Débourrement, Efflorescence (F).

هو تحرك الزينات للاوراق . يقال اكح الكرم اذا تحرك للاوراق . وأكسحت الزيمة اذا ابيضت وخرج عليها مثل ندف القطن .

٢٠١٠ - أكمته Colline, Monticule, Butte (F).

Hill, Hillock, Knoll, Mound (E).

تل او مكان ارفع من الرابية واعرض ظهراً .

٢٠١١ - أكمته Acmella (S).

Acmelle, Abécédaire (F). Alphabet plant (E).

Fleckenblume (D). Acmella (I).

نبات بري عشبي حولي من فصيلة المركبات . يوجد في

٢٠٢٥ - أكيدنيا*، إيكى دنيا، مُشملة يابانية

Eriobotrya japonica (S). Bibacier, Bibassier du Japon, Néflier du Japon (F). Loquat, Japan medlar (E). Japanische mispel (D). Nespola del Giappone, Pruno de Giappone (I).

شجرة مثمرة من فصيلة الورديات سبط الاجاصيات. مهدا اليابان وقد انتشرت زراعتها وعت جميع البلاد المعتدلة الحرارة. وهي شجرة ائشة متوسطة الارتفاع مستديرة القمة، جذورها عمودية، جذعها قصير، ساقها منتصبه، افنادها وافنادها كثيرة. اوراقها معنقة اذينية كبيرة الحجم مستطيلة رحيه جلدية مسنة، سطح نصلها العلوي اخضر ارمد والسفلي بحري اللون يكسوه الزغب || ازهارها عنقودي التجميع، ازهارها قصيرة الزناد وردية اللون || ثمارها كروية او يرمية الشكل لحية مأكولة اللب || زراعتها مبذولة على الشاطئ* اللباني حيث يوافقها الاقليم. وهي تحشى المعارض الجنوبية الشديدة الحرارة والمواقع الرطبة والأتربة الطينية المندجة || تتكاثر بالبذر والتطعيم. تزرع انباقاً او مخمسات بابعاد بينية تراوح من ٦ الى ٨ امتار. ومن المستحسن تطعيم الاكيدنيا على الزعرور في الاراضي الخفيفة الجافة وعلى الاجاص في الاراضي الخصبة العميقة الغور وعلى السفرجل في الاراضي الرطبة القدر اما صروبها فعديدة نخص منها بالذكر :

الضروب البلدية وعددها سبعة

أكيدنيا الابيض، مستكاوي، رازبان الشجرة متوسطة القند وافرة المحصول مبكارة ثمارها تدرك عند منتصف نيسان. الثمار كبيرة الحجم بيضية الشكل لونها الى البرتقالي الاصفر. لها سميكة غزير العصارة لذيد النكهة. نواها من ٢ الى ٣.

أكيدنيا الاجاصي

الشجرة متوسطة القند، جيدة المحصول الذي يدرك في العقد الثالث من نيسان. الثمار اجاصية الشكل لونها الى الصفرة لها سميكة غزير العصارة الحلوة لذيد الطعم والنكهة. نواتها فردية كروية صغيرة.

أكيدنيا الاحمر، باكير

ان شجرة كبيرة القند وافرة المحصول، مبكارة ثمارها تدرك في العقد الاخير من اذار. الثمرة كبيرة الحجم لونها الى البرتقالي العايق. لها اصفر اللون سميكة غزير العصارة مستحب النكهة. نواها من ٢ الى ٤.

أكيدنيا الاصفر، خوري

الشجرة متوسطة القند وافرة المحصول ثمارها تدرك في العقد الاول من نيسان. الثمرة كبيرة الحجم لونها الى الصفار الناري. لها اغبر سميكة غزير العصارة لذيد النكهة. نواها من ٢ الى ٣.

أكيدنيا الخضري

الشجرة كبيرة رقيقة متوسطة المحصول ثمارها تدرك في العقد الثاني من ايار. الثمرة كبيرة الحجم بيضية الشكل لونها الى الخضار الزاهي يعلوه موج اصفر. لها ابيض اللون سميكة جامد لذيد الطعم والنكهة. نواها من ٢ الى ٣.

أكيدنيا العادي

الشجرة متوسطة القند وافرة المحصول ثمارها تدرك في ايار. الثمرة كروية الشكل صغيرة الحجم لونها الى الصفار الناري. لها اغبر اللون قليل السماكة والمصير. نواها من ٣ الى ٤.

الجذور غليظتها، طويلة الساق التي يبلغ ارتفاعها نحو المتر. اوراقها ريشية معنقة متعاقبة لونها الى الخضار القاتم. ازهارها عنقودية التجميع، محورية وهامية الارتكاز كثيرة الالوان من اليلكي والازرق الى الاحمر بعد الابيض. عصارتها تحوى على سم زعاف تزداد فاعليته مع حرارة الاقليم || يستخرج منها مادة قلووية تدعى اكونيتين (Aconitine) تستعمل طبياً ضد الامراض العصبية والصداع... || اشهر انواعه الطبية والزراعية ما يلي.

٢٠٢٠ - أكونيت أحجن* Aconitum uncinatum (S).

Aconit d'Amérique (F). Monk's-hood, American wolf's-bane (E). Amerikanischer sturmhut (D). Aconito d'America (I).

نوع من الاكونيت، مهدا البلاد الامريكية. يزرع للزينة. ازهاره جميلة المنظر منعطفة الارتكاز || يتكاثر بالبذر يفضل الأتربة المتوسطة الاندماج النية بالعنصر الكلسي.

٢٠٢١ - أكونيت أسود Aconit anthora, Maclou

اطلب أنتله سوداء.

٢٠٢٢ - أكونيت خالق الذئب* Aconitum luteum,

A. lycoctonum (S). Aconit tue-loup, Etrangle-loup (F). Dog's-bane, Wolf's-bane (E). Gelber sturmhut, Wolfs-gift (D). Aconita luparia, Erba della volpe (I).

نوع من الاكونيت البري والزراعي، ازهاره جميلة صفراء اللون. ازهاره يدوم نحو الثلاثة اشهر. يتكاثر بالبذر. يرغب في الأتربة المعتدلة الاندماج يحشى المواقع الجنوبية الكثيرة الاشعاع الشمسي.

٢٠٢٣ - أكونيت هرمي* Aconitum napellus (S).

Aconit napel, Napel, Casque de Jupiter, Char de Vénus, Capuchon de moine, Tue-loup bleu (F). Aconite, Helmet flower, Monkshood (E). Echter sturmhut, Wolfswurz, Heimbloom (D). Aconito napello, Carro di Venere, Erba luparia (I).

اشهر انواع الاكونيت منه البري والزراعي. ينبت طبيعياً في الاماكن الظليلة والمواقع الرطبة. اوراقه وازهاره وجذوره وافرة المادة القلووية التي تجعله من النباتات الطبية || ازهاره الى الزرقة الشديدة، ازهاره هرمي الشكل يدوم من تموز الى تشرين || يتكاثر بالبذر كجميع انواع الاكونيت. وتنرس الشتول في مستقرها عند اواخر حزيران || وهو من النباتات التي ترغب في الأتربة الطينية الجصية المتوسطة الاندماج والرطوبة والتي لا تتعرض كثيراً لأشعة الشمس.

٢٠٢٤ - أكونيت هلهل* Aconitum ferox (S).

Aconit féroce, Aconit d'Inde (F). Indian aconite, Bikhpoison (E). Indische aconitknollen (D). Aconita d'India (I).

هو اسم انواع الاكونيت واغناها مادة قلووية. مهدا بلاد الهند وقد عمت زراعته جميع البلاد الحارة والمعتدلة || ازهاره جميلة الشكل ليلكية اللون || وهناك انواع زراعية تزيينية اخرى، منها :

Ac. rubicundum (S).

الاكونيت الاحمر

Ac. autumnale (S).

الاكونيت الخريفي

Ac. cammarum (S).

الاكونيت السرطاني

Ac. variegatum (S).


الاكونيت الموشم

Ac. japonicum (S).

الاكونيت الياباني



أكونيت أحجن




أكونيت خالق الذئب



أكونيت هرمي



أكونيت هلهل



أكيدنيا

ومهم من دعاها حشيشة الاسد في حين ان حشيشة الاسد هي نوع من الجعجيل يعرف أيضاً بالهالوك الريحي . الاكيلاجيا جنس نباتات عشبية نجمية معمرة برية وزراعية تزيينية من الحوذانيات وفصيلة الشقيقيات اوراقها معنقة ، كبيرة الحجم ، مفرصة ، لونها الى الاخضر البحري || ازهارها هامية الارتكاز ، متعددة الالوان ، جميلة الشكل ، فردية التجميع منعقفة نحو الارض || ترغب في الاماكن الظليلة وفي التربة المعتدلة التركيب المتوسطة الاندماج || تتكاثر بالبذر والتفصيل . تبذر في مشاتل رملية التربة من نيسان الى ايار وتنقل الى مستغرها في الربيع المقبل اي بعد بذرها بعام واحد || اما الفسائل فتقتطع وتغرس في اوائل الربيع وقد يجوز اقتطاعها وغرسها في الخريف || اشهر انواعها الزراعية ما يلي :

٢٠٢٨ - أكيلاجيا اولبية °
Aq. olympica (S).
Ancolie de l'Olympe (F).

٢٠٢٩ - أكيلاجيا جبلية °
Aq. alpina (S).
Ancolie des Alpes (F).

٢٠٣٠ - أكيلاجيا ذهبية °
Aq. chrysantha (S).
Ancolie dorée (F).

٢٠٣١ - أكيلاجيا زرقاء °
Aq. caerulea (S).
Ancolie bleue (F).

٢٠٣٢ - أكيلاجيا سيبيرية °
Aq. siberica (S).
Ancolie de Sibérie (F).

٢٠٣٣ - أكيلاجيا عطرية °
Aq. fragrans (S).
Ancolie odorante (F).

٢٠٣٤ - أكيلاجيا عقابية °
Aq. vulgaris (S).
Ancolie des jardins, Colombine commune, Aiglantine, Gants de Notre Dame
ضروبها عديدة والوانها كذلك وسها مكسبة الزهر الموشع بالازرق والابيض .

٢٠٣٥ - أكيلاجيا كندية °
Aq. Canadensis (S).
Ancolie du Canada (F).
جميع انواعها تستعمل للتزيين اما العقابية فزينة وطبية وهي معروفة ومدرة البول ومضادة للحفر .

٢٠٣٦ - آل
Aal (F). Aal (E).
الآل شجرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الراتنجيات منبتها بعض الجزر الهندية || لجاء سوقها واغصانها من الافاوية تستعمل في تطيبب الخمر وبعض المأكول .

٢٠٣٧ - آل
يقال آل القرس اذا نصب اذنيه وحددهما . وآل الصقر اذا ابي ان يصيد .

٢٠٣٨ - آلات زراعية
Instruments agricoles (F).
Agricultural Implements (E).
الآلات الزراعية تشمل جميع الماكينات والمعدات الممكن استعمالها او استخدامها في الزراعة .

٢٠٣٩ - إلهة ، إلهة
Cytogénie (F).
Cytogeny (E).
هي تناسل او تكاثر الحبيرات الحيوانية او الخلايا النباتية .

أكيدنيا الماي

الشجرة متوسطة القد مظلية الشكل وافرة المحصول ثمارها تدرك في العقد الثاني من نيسان . الثمرة صغيرة كروية لونها الى البرتقالي الزاهي . لبها متوسط السمك كثير العصارة . نواها من ٣ الى ٥ .
وين الضروب العالمية نخص بالذكر اعرفها وهي :

أكيدنيا ادفنس
E. Advance
الثمره كبيرة الحجم اجاصية الشكل . لبها سميك سكري الطعم .

أكيدنيا آرونل
E. Arronel
الثمره متوسطة الحجم كروية الشكل . لبها رقيق البشرة سميك وردي اللون سكري الطعم عطري الرائحة غزير العصور .

أكيدنيا برونل
E. Brunel
الثمره كبيرة الحجم كروية الشكل . لبها سميك قوي البشرة اصفر اللون سكري الطعم عطري الرائحة . تتحمل الاسفار البعيدة .

أكيدنيا براون هول
E. Brouwing Holl
الثمره كبيرة الحجم بيضية الشكل تتحمل الاسفار البعيدة . لبها جامد سكري عطري .

أكيدنيا تاناكا
E. Tanaka
الثمره كبيرة كروية برتقالية اللون تتحمل الاسفار البعيدة وتتأخر في الادراك . لبها جامد اصفر اللون سكري الطعم .

أكيدنيا دون كارلوس
E. Don Carlos
الثمره كبيرة كروية تتحمل الاسفار . لبها جامد اصفر اللون سكري الطعم عطر .

أكيدنيا سكولا
E. Scola
الثمره متوسطة الحجم مستديرة تتحمل الاسفار . لبها اصفر اللون جامد . طعمها سكري لذيق الشكهة .

أكيدنيا كنكا دورو
E. Conca d'oro
الثمره متوسطة الحجم اجاصية الشكل ذهبية اللون تدرك باكراً وتتحمل الاسفار . لبها اصفر اللون ذكي الطعم السكري مستحب العرف .

أكيدنيا لوكات
E. Lequat
الثمره متوسطة كروية ذهبية اللون بطيئة الادراك . لبها اصفر اللون سميك غزير العصارة لذيق الطعم . تحمل نواة واحدة .

أكيدنيا ليموجلو
E. Limogello
الثمره كبيرة الحجم بيضية الشكل ناعمة البشرة صفراء اللون . لبها لذيق الطعم غزير العصارة اغبر اللون .

أكيدنيا نابون
E. Narbonne
الثمره كبيرة مستطيلة ناعمة البشرة برتقالية اللون . لبها اغبر اللون لذيق الطعم . نواها قليلة العدد صغيرة الحجم .

٢٠٢٦ - أكيسته فضية
Elachiste argentée (F).
هي قوبعة النجيليات ، اطلبها .

٢٠٢٧ - أكيلاجيا * ، أنكوليه ، كولمين
Aquilegia (S). Ancolie, Colombine (F). Columbine (E). Akelei (D). Aquilina, Amor nascosto (I).
سمها الامير مصطفى الشهابي « حوضية وزهرة الحوض »



أكيلاجيا

نصلها خلي البشرة ، مسن الحافة . أزهارها جميلة ، كبيرة ، يغلب فيها اللون الوردي . ثمارها مأكولة لذيدة الطعم اهليلجية الشكل لونها الى الصفار التني .

٢٠٥٠ - **آلامية زرقاء** * ، **زهرة الآلام الزرقاء** ، **زهرة الساعة**
Passiflora coerulea (S).

Passiflore bleue, *Grenadille bleue*, *Fleur de la Passion* (F). *Common blue passion flower* (E). *Blau-passionsblume* (D). *Passiflora*, *Fiore della passione* (I).
 جنبه تزيينية عارشة معمرة تطول نحو ١٥ م . ضرورها عديدة . أوراقها عروية خماسية التفصيص ، نصلها عابق الخضار ، عنقها رباعي الغدد محجن الاذينات . أزهارها محورية الارتكاز عطرية الرائحة قطرها يراوح من ٦ الى ٨ سم . اسديتها الخيطية ثلاثية اللون ، المحورية منها أرجوانية والوسطى بيضاء اللون ، اما الخنارية فالى الزرقة الجميلة || أزهارها يستمر في فصلي الصيف والخريف .

٢٠٥١ - **آلامية غارية الورق** *
Passiflora laurifolia (S). *Passiflore à feuilles de laurier*, *Pomme lane* (F).
 جنبه عارشة معمرة متوسطة النشط . أوراقها غارية الشكل . أزهارها كبيرة القد ، جميلة اللون الزاهية المتراكبة ثمارها بيضية صغيرة الحجم ، لونها الى الصفار الكبريتي جذورها طيبة تحوي بعض المواد الجحالية الفعالة .

٢٠٥٢ - **آلامية لسيينية** *
Passiflora ligularis (S). *Passiflore ligulée* (F). *Sweet granadilla* (E).
 جنبه عارشة معمرة شديدة النشط تلحف مساحات كبيرة . أوراقها لافسية ، قلبية النصل المدب الزام الاخير . اذينات عنقها لسيينية الشكل . أزهارها كبيرة القد ، فصلها ويتلأأ خضراء اللون . اسديتها الخيطية بيض الانتشاب ، أرجوانية الاطراف || ثمارها مأكولة لذيدة الطعم اهليلجية الشكل لونها الى البرتقالي العابق .

٢٠٥٣ - **آلامية مأكولة** * ، **شرخ الفللك**
Passiflora edulis (S). *Passiflore comestible*, *Grenadille* (F). *Granadilla*, *G. vine* (E). *Granadilla* (D). *Granadiglia* (I).
 جنبه عارشة معمرة شديدة النشط تزرع لثمارها المأكولة . أوراقها ثلاثية التفصيص نصلها مسن الحافة . أزهارها بيض اسديتها الخيطية بيضاء الجسم ، أرجوانية القاعدة . ثمارها بيضية الشكل قدرها قدر بيض البط لونها عند النضج أحمر أرجواني . || وهي من النباتات السبروتية التي تجود في جميع الأتربة غير أنها تخشى الصقيع .

٢٠٥٤ - **آلامية مضلعة** *
Passiflora quadrangularis (S). *Passiflore à tige carrée*, *Barbadine* (F).
 جنبه عارشة معمرة متوسطة النشط . ساقها رباعية الاصلع . أوراقها كاملة قلبية الشكل . أزهارها وردية البتلات أرجوانية الاسدية الخيطية || ثمارها مأكولة بيضية الشكل ، كبيرة القد ، لونها الى الصفار الاخضر || جذورها طيبة تحوي بعض المواد الفعالة النافعة .

٢٠٥٥ - **إلب**
 Union
 راجع اتحاد .

٢٠٥٦ - **إلب**
 الالب شجرة شائكة كأنها شجرة الأترج . نباتها ذرى الجبال وهي خبيثة يؤخذ خضبها واطراف افنانها فيدق رطباً ويقشبه به اللحم ويطرح للسباع (اللسان) .

٢٠٤٠ - **ألاريه** *
Alaria
 جنس نباتات مائية من فصيلة اللسناريات ورقبة الخث السفح . موطنها شواطئ الاقيانوس الاطلسي والبحر المتوسط . يكثر وجودها في الشواطئ البريطانية || منها نوع ضلوعه سكرية الطعم مأكولة .

٢٠٤١ - **ألاريه مأكولة** *
Alaria esculenta (S).
Alaria, *Alaire*, *Alarie* (F). *Bladder lock*, *Honeyware* (E). *Essbareer riementang* (D). *Alaria*, *Varecco* (I).
 نوع من الالاريه تتميز بمشربتها الضخمة المتباينة الارتكاز الغليظة الضلع الرئيسية الوسطى . وصلبها هذه سكرية الطعم مأكولة .

٢٠٤٢ - **إلاغة** *
Algologie (F). *Algology* (E).
 الإلاغة علم يبحث في ماهية الانغيات وتصنيفها وانتشارها .

٢٠٤٣ - **ألاف المروج**
Coulevre d'Esculape (F).
 هو الخث الحنطي ، اطلبه .

٢٠٤٤ - **ألاف مشرط**
Coulevre à échelons (F).
 هو الخث الاشقر ، اطلبه .

٢٠٤٥ - **إلالة** *
Automation (F). *Automation* (E).
 اسم يطلق على جميع الاساليب والاعمال الآلية .

٢٠٤٦ - **آلاميات** *
Passifloraceae (S). *Passifloracées* (F). *Passifloraceae* (E).
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقين العديدة القملات . أجناسها وأنواعها كثيرة العدد ، مهدا البلاد الامريكية منها البرية والتزيينية والطبية والمأكولة الثمار . جميعها عارشة معمرة جميلة الأزهار الكبيرة المستديرة المتعددة اللون .

٢٠٤٧ - **آلامية** * ، **زهرة الآلام**
Passiflora (S). *Passiflore* (F). *Passion flower* (E).
 جنس نباتات ليفية عارشة معمرة من فصيلة الآلاميات . أنواعها ١٨٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني أو مأكول الثمار . أوراقها كفية ورية التفصيص الثلاثي أو الخماسي أو السباعي . أزهارها كثيرة الفصل والبتلات التي يراوح عددها من ٥ الى ٨ . اسديتها الخيطية كثيفة التجميع نعم كامل سطح الزهرة . مآبرها المخصبة خماسية . سماتها ثلاثية التركيب مستطيلة . ثمارها بيضية الشكل . بزورها مختلفة الاشكال يكثر فيها الاسطواني || اشهر أنواعه المأكولة والتزيينية ما يتبع .

٢٠٤٨ - **آلامية أرجوانية** * ، **زهرة الآلام الحمراء**
Passiflora incarnata (S). *Passiflore incarnat* (F). *Wild passion flower*, *Maypop* (E). *Wilder passionsblume* (D). *Granadiglia incarnata* (I).

جنبه تزيينية عارشة معمرة تطول نحو ١٠ أمتار . أوراقها ثلاثية التفصيص ، نصلها مسن الحافة ، عنقها ثنائي الغدد . أزهارها الى البياض الوردي . اسديتها الخيطية أرجوانية يغلوها موج بنفسجي || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .


٢٠٤٩ - **آلامية تكسوس** * ، **تكسو**
Passiflora mollissima (S). *Passiflore molleuse*, *Tacso* (F).
 جنبه عارشة معمرة شديدة النشط . أوراقها ثلاثية التفصيص .



آلامية أرجوانية




آلامية زرقاء



آلامية غارية الورق



آلامية مأكولة



آلامية مضلعة

٢٠٥٧ - ألب

الب الزرع : اذا صار فيه حب ولب .

٢٠٥٨ - إلباد

السعي لتوفير شروط الاستمرار والنمو في بيئة معينة .

٢٠٥٩ - ألبكا *

Lama pacas, Auchenia pacas (S). Alpaca, Lama alpaca (F).
ضرب من الالة وهو حيوان داجن مجتر من فصيلة الجمال . مهده جبال امريكه الوسطى . يشبه الجمال الصغير العديم السنام . موصوف بدقة وبره الناعم وجلالة صوفه اللدن الذي يبلغ طوله نحو ١٤ سم . || ثوبه يأتي على ثلاثة اشكال : الابيض الصوف والاسود الصوف والمرقش . يعيش قطعان كبيرة العدد . يربي من اجل وبره الذي يجز مرة في العام || الانثى اصغر قدراً وانحل جسماً من الذكر . وهي رباعية الاخلاف ، محبلها يدوم نحو ٣٠٠ يوم ، نتاجها اعزل .

٢٠٦٠ - ألبوب

Amande (F). Almond (E).
هو الصلصام المأكول الذي يوجد في داخل نواة النبتة واللوزة الحلوة والمشمشة اللوزية الخ .

٢٠٦١ - ألبومين

Albumine (F). Albumin, Albumen (E).
هو الآح والزلال .

٢٠٦٢ - ألبيزية

Albizia (S). Albizzia (F).
جنس نباتات سنفية من فصيلة القرنيات . انواعه ثلاثة قريبة الشبه من الاقاقيا والسنت . منبتها الاقاليم الحارة والمعتدلة . جميعها جنبات تزيينية فرعاء الهيكل ، فناء ، زباء ، قليلة الشوك . اوراقها ريشية ، معلاقية ، مستطيلة الوريقات || ازهارها عنقودي النجم . ازهارها جميلة الشكل كأسها جرسية او انبوية مسننة ، تويجها قمى ، بتلاتها نصفية الاتحاد . ثمارها قرنية . سنفتها مستطيلة مستقيمة مفلطحة ذات مصراعين طليقين || انواعه الثلاثة هي :

٢٠٦٣ - ألبيزية أبوسن *

Albizia anthelminthica (S). Albizzia anthelminthique, Acacie à musenna (F). Albizzia, Anthelminthica (E). Musennarinde (D). Albizzia (I).

نوع من الالبيزية وهي جنبه برية طبية وزراعية تزيينية . سنف ثمارها ولحاء سوقها وفروعها طاردة للديدان وتستعمل في بعض العلاجات المعوية .

٢٠٦٤ - ألبيزية الحرير *

شجرة الحرير ، سنط

استنبول Albizzia julibrissin (S). Albizzia julibrissin, Arbre de soie, Acacia de Constantinople (F). Silk tree, Bastard tamarind (E). Orientalische akazie (D). Albero della seta, Gaggia aborea (I).

نوع من الالبيزية البرية والزراعية التزيينية . تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الاربة .

٢٠٦٥ - ألبيزية اللبسخ *

Albizia lebbek (S). Albizzia lebbek, Lebbek, Lébec-kie, Bois noir (F). Lebbek tree, Siris tree (E). Siris acacia, Lebek baum (D). Lebbek (I).

نوع من الالبيزية البرية والزراعية التزيينية . جميلة الشكل والازهار . تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الاربة .

٢٠٦٦ - ألبيني ، غلطي

Albien, Gault
ساف من الطبقة الطباشيرية مركزه فوق الأبناسي وتحت الساني .

٢٠٦٧ - آلة

Machine
كل اداة او جهاز صنعه الانسان ليقوم بعمل من الاعمال بحيث تخفض القوة اللازمة للقيام به حتى تصبح في حدود طاقة الانسان || لذلك يمكن القول هذه صناعة آلية اذا صنعت بالآلة وهذه صناعة يدوية اذا صنعها الانسان بيده .

٢٠٦٨ - إلتحاق ، إنضمام

Affiliation
هو الدخول في شركة او الانساب الى جمعية زراعية وما اشبه .

٢٠٦٩ - إلتحام

Coalescence (F). Coalescing (E).
انضمام والتحام اجزاء متجانسة .

٢٠٧٠ - إلتحام الأصابع

Palmature (F). Web-footed (E).
هو التكفف اي التهام الاصابع بغشاء بينها .

٢٠٧١ - ألترفارية

Alternaria
جنس فطور مجهرية من عمارة الزخيات وفصيلة اللطحيات يعرف بالردينة (اطلب ردينة) .

٢٠٧٢ - إلتزام

Obligation
اصطلاح قانوني يقصد به ارتباط بين شخصين او اكثر . والنرض منه حصول منفعة لاحدهم بالزام . الطرف الآخر القيام او عدم القيام بأمر معين . وتقسّم الالتزامات الى انواع كالمقود وغيرها .

٢٠٧٣ - إلتصاق

Adhérence (F). Adherence (F).
صفة خاصة تتصف بها بعض الاتربة التي تلتصق ان قليلاً او كثيراً بالآلات الحرث في اثناء عملها .

٢٠٧٤ - إلتصاق

Accession
راجع إتباع .

٢٠٧٥ - إلتصاق طبيعي

Accession naturelle (S). Natural accession (E).
هو ما يحدث بغير فعل الانسان .

٢٠٧٦ - إلتصاق صناعي

Accession industrielle (F). Industrial accession (E).
هو ما يحدث بفعل الانسان كتشيد بناء .

٢٠٧٧ - إلتصاق مفتعل

Accession artificielle (F). Artificial accession (E).
الالتصاق المفتعل كالصناعي هو ما يحدث بفعل الانسان كنرس غراس او اقامة ابنة .

٢٠٧٨ - إلتقاء

Convergence
الايلولة او المال الى مركز واحد .

٢٠٧٩ - إلتقام ، قلس

Mercisme, Regurgitation (F). Regurgitation (E).
عملية ارتشاف الطعام من الغير بعد انتقاله من البطن الى الفم .

٢٠٨٠ - إلتهاب


Inflammation
عارض يصيب نسيج الاعضاء فيؤذيها اسبابه مختلفة وعواقبه ايضاً .

٢٠٨١ - إلتهاب الأذن

Otite (F). Otitis (E).
مرض يكثر في الكلاب سببه القمل والفراد .



ألبكا



ألبيزية ابوسن




ألبيزية الحرير



ألبيزية اللبسخ

- ٢٠٩٦ - إلتهاب الغُدَد اللَنفِيَّة
Phlegmasia glandulosa (S). Adénite (F). Adenitis (E).
علة عديدة الاسباب تحل بالغدد اللنفية فتضخمها وتقرحها وتقيحها .
- ٢٠٩٧ - إلتهاب الغشاء الزلالي
Synovite (F).
Synovitis (E).
مرض يصيب الاعضاء في اغشيتها الزلالية فيسبب الورم والحرارة والوجع والمرض .
- ٢٠٩٨ - إلتهاب الفم ، حُنَّاك
Stomatite (F).
Stomatitis (E).
هو التهاب غشاء الفم .
- ٢٠٩٩ - إلتهاب الفؤت
Fourchet (F). Foot-rot (E).
التهاب ما بين اصابع البقر وغيرها من الحيوانات ذوات الظلف . وهذا الالتهاب الذي يعقبه التورم يؤدي الى المرج وقد يمتد الورم الى الركبة والعقوب .
- ٢١٠٠ - إلتهاب القرنية
Kératite (F). Keratitis (E).
إلتهاب قرنية العين .
- ٢١٠١ - إلتهاب الكلية
Néphrite (F). Nephritis (E).
يصيب الحيوانات الاهلية من ذوات الحافر والظلف . اسبابه عديدة اخصها اكل بعض الاعشاب ومنها السامة كما والبرد ...
- ٢١٠٢ - إلتهاب اللسان
Glossite (F). Glossitis (E).
يحصل عادة من العلف الشائك القاسي . يصيب بنوع خاص البقر .
- ٢١٠٣ - إلتهاب المثانة
Cystite (F). Cystitis (E).
ويعرف أيضاً بالتهاب المثن .
- ٢١٠٤ - إلتهاب المخ الشوكي في الخنزير
Encéphalomyélite infectieuse du porc (F). Encephalo-myelitis of swine (E).
مرض جرثومي وبائي يصيب الخنازير .
- ٢١٠٥ - إلتهاب المخ الشوكي في الخيل
Encéphalomyélite infectieuse du cheval (F). Encephalo-myelitis of horse (E).
مرض جرثومي وبائي يصيب الخيل .
- ٢١٠٦ - إلتهاب المشييمة
Choroidite (F).
Choroiditis (E).
التهاب يعترى مشيمة العين اي الطبقة الوعائية الثانية للعين .
- ٢١٠٧ - إلتهاب المعدة
Gastrite (F). Gastritis (E).
التهاب يحصل في غشاء المعدة المخاطي .
- ٢١٠٨ - إلتهاب الملتحمة
Conjonctivite (F).
Conjunctivitis (E).
التهاب ملتحمة العين .
- ٢١٠٩ - إلتهاب المهبل
Vaginite (F). Vaginitis (E).
مرض يصيب الحيوانات الداجنة في مهبلها وقد يكون معدياً .
- ٢١١٠ - إلتهاب الهُرب
Péritonite (F).
Peritonitis (E).
مرض يصيب الخيل . اسبابه عديدة منها الجراح والخصاء والوضع والبرد وأبتلاع الماء البارد . || عوارضه : ارتفاع في الحرارة ، ضعف في النبض ، نفخة في البطن ، لث في التنفس وتقويض في الظهر .
- ٢٠٨٢ - إلتهاب الأظرفة
Crapaudine, Peigne, Mal d'âne (F). Toadstone (E).
التهاب وتشقق في اظرفة حافر الفرس والبغل والحمار فيسيل منها مائع صديدي .
- ٢٠٨٣ - إلتهاب الإمعاء
Entérite (F). Enteritis (E).
التهاب الغشاء المخاطي في الامعاء . يصيب جميع الحيوانات الاهلية . سببه البرد أو الغذاء السيء أو الصفر .
- ٢٠٨٤ - إلتهاب الثرب
Epiplote (F). Epiplottis (E).
علة تصيب الثرب في مختلف اجزائه فتضيقه .
- ٢٠٨٥ - إلتهاب الجفن ، سَلَّاق
Blépharite, Palpébrite (F). Blepharitis, Palpebritis (E).
علة تصيب جفن العين فتؤدي وقد تسبب سقوط اهدابه .
- ٢٠٨٦ - إلتهاب الجلد
Dermatite (F).
Dermatitis (E).
علة في الجلد سببها الحلم وغيره من القراد تحث الجملون على الحكاك فيلتهب جلده .
- ٢٠٨٧ - إلتهاب الحنجرة
Laryngite (F).
Laryngitis (E).
التهاب يحصل في غشاء الحنجرة ويمتد غالباً الى البلعوم وقد يكون حاداً او مزمناً .
- ٢٠٨٨ - إلتهاب الرجل
Crapaud (F). Greasy heel (E).
التهاب الفسج الحية في رجل الدابة . يبدأ في النسر ويمم الصحن وله رائحة كريهة .
- ٢٠٨٩ - إلتهاب الرئة
Périlpneumonie (F).
Peripneumonia (E).
مرض سار يصيب البقر فيميتها . وقد نص القانون الفرنسي بوجوب ذبح الحيوان المصاب فور تشخيص المرض وتحديد من قبل الطبيب البيطري .
- ٢٠٩٠ - إلتهاب السحايا
Méningite (F).
Meningitis (E).
مرض شديد العدوى يصيب الدواجن في سحايا الدماغ .
- ٢٠٩١ - إلتهاب الشعب
Bronchite (F).
Bronchitis (E).
مرض يصيب بعض الحيوانات الداجنة اخصها الخيل والاعنام .
- ٢٠٩٢ - إلتهاب الشغاف
Péricardite (F).
Pericarditis (E).
ويعرف أيضاً بالتهاب التأمور . مرض يصيب البقر وقد يأتي عن بلع جسم صلب كسلك حديدي وما اشبه .
- ٢٠٩٣ - إلتهاب الصحن
Aggravée (F).
التهاب يحصل في الصحن وفي اظرفة الحافر عند الخيل وقد يصيب أرجل البقر والكلاب من فرط التعب .
- ٢٠٩٤ - إلتهاب الضرع
Mammite (F).
Mammitis, Mastitis (E).
مرض يحل بضرع اناث الدواجن اخصها الابقار الحلوبة فيعطب اخلاصها الواحد تلو الآخر اذا لم يتدارك المرض عند ظهوره .
- ٢٠٩٥ - إلتهاب العضل
Myosite (F). Myositis (E).
داء يصيب خيل السباق وغيرها وقد يكون حاداً او مزمناً .


تركب اوراق الكتان فتقضي عليها . اجيالها الحولية ثنائية .
يرقاتها مؤذية تركب الجذور وتسرد نجها .



ألتيز البقول

٢١٢٣ - ألتيز الكرمة* ، دُقْسَة الكرمة ، قد أن الكرمة
Haltica ampelophaga, H. lythri, Graptoderma ampe-
lophaga (S). Altise de la vigne (F). Mediterranean
grape leaf beetle (E). Welnerdfloh (D).


خنافس من الألتيز طولها نحو ٤ مم ثوبها زبرجدي شديد
اللمعان . قوائمها الخلفية قوية تمكها من القفز . اجيالها
الحولية ثنائية . تمتح مكها على قشور واوراق الكرمة
فينتف عن يرقات تبغية اللون لا تلبث ان تسمر بعد بضعة
ايام . يرقاتها نهضة تقضم اوراق الكرمة وقد تقضي عليها
تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة اخصها
المرتكرة على انزنيخات .



ألتيز التبغ

٢١٢٤ - ألتيز الملفوف* ، دُقْسَة الملفوف ، قد أن الملفوف
Haltica brassicae (S). Altise du chou (F).


خنافس من الألتيز صغيرة القد . طولها نحو ٢ مم . ثوبها
الى السمرة العابقة يعلو كل من نحتها خطان مستطيلان
لونها الى الصفرة . يرقاتها سمراء اللون تكتنفها خطوط
مستعرضة . طولها نحو ٥ مم تلهم اوراق الملفوف فتعيها
وتؤذيها .



ألتيز الزروع

٢١٢٥ - ألتيز زرقاء* ، دُقْسَة زرقاء

Psylliodes dulcamarae (S). Altise bleue (F).
خنافس من الألتيز طولها نحو ٤ مم . ثوبها الى الزرق
البنفسجية الشديدة اللعان . تركب جميع نباتات الفصيلة
الباذنجانية اخصها البطاطا حيث تنغني من اوراقها .
يرقاتها تتعدى على السوق وتنخرها .




ألتيز الكتان

٢١٢٦ - ألتيز المطر : دام اياماً لا يقلع .

٢١٢٧ - ألتيز ، لشي ، إستصمغ
Extraire la gomme (F). To extract gum (E).

استخرج صمغ الاشجار .



ألتيز الكرمة


٢١٢٨ - ألتيز
Brider (F). To bridle (E).
الجم الفرس : ألتيز اللجام وجعله في فيها ولا يقال لجمها .

٢١٢٩ - ألتيز
Algine (F). Algin (E).

مادة مخاطية تستخرج من بعض الخشيات البحرية تستعمل
كوسيط في بعض صناعات النسيج وفي تليين الزيت المعد
لتغليط الطرق .

٢١٣٠ - ألتيز
Alginate (F). Algin (E).

مادة ليفية تستخرج من بعض الخشيات تنضج مع بعض
الايان النباتية اللينة فينج عن اتحادها مادة صناعية
قابلة الاستعمال والخيكة .




ألتيز الملفوف

٢١٣١ - إلتاق
Annexion (F). Annexation (E).

هو ضم الشيء الى غيره .

٢١٣٢ - إلتام
Brassure (F). Brewing (E).

الصاق الشيء بالشيء بواسطة النار .



ألتيز زرقاء

٢١٣٣ - ألدركس
Aidrex

حاشور زراعي يرتكز على مادة الالورين . منه انواع
عديدة تختلف باختلاف نسبة المادة الفعالة . يستعمل
تفكيراً على التربة للقضاء على السالول والندرة البيضاء .

٢١١١ - إلتهاب الوريد Phlébite (F). Phlebitis (E).
مرض سي' العواقب يستلزم وجود الطبيب البيطري منذ
اللحظة الاولى || عوارضه الظاهرة قليلة لا يمكن الركون اليها .

٢١١٢ - إلتهاب الوعاء اللفاوي Lymphangite (F).
التهاب يحصل في اسفل قوائم الخيل . Lymphangitis (E).

٢١١٣ - إلتهاب بطنانة القلب Endocardite (F).
Endocarditis (E).

مرض يصيب الحيوانات المستة في المشاء المبطن للقلب .

٢١١٤ - إلتهاب رئوي بلوري في الابقار ، ذات الرئة
المحيطة Périlpneumonie contagieuse des
bovidés (F). Paripneumonia contagious of bovid (E).
مرض سار عضال يوجب الحذر والحماية .

٢١١٥ - إلتهاب رئوي بلوري في الماعز ، ذات الرئة

السارية ، قصبة Pleuropneumonie
contagieuse des chèvres (F). Pleuropneumonia
contagious of goat (E).
مرض سار يضيق الماعز اذا نفشى .

٢١١٦ - إلتواء ، إلتعاطف ، إلتواء Flexuosité (F).
الاعوجاج المتتالي في اتجمات متضادة . Flexuosity (E).

٢١١٧ - ألتيز ، دُقْسَة ، قد أن

Haltica (S). Altise, Tiquet, Puce de terre, Pucerotte
(F). Haltica, Flea-beetle (E).

جنس حشرات من فصيلة النضاريات ورتبة مغذات
الاجنحة . انواعه كثيرة العدد جميعها قافزة ، وثابة ،
صغيرة القد ، زاهية الالوان . يرقاتها اسطوانية الشكل ،
ملونة ، سداسية القوائم تعيش على مختلف اوراق البقول
والاعشاب والنبات . وبعضها يركب السوق والجذور
فيلغها ويؤذيها || اشهر انواعه ما يشبع .

٢١١٨ - ألتيز البقول* ، دُقْسَة البقول ، قد أن البقول

Haltica oleracea (S). Altise potagère (F).
خنافس من الألتيز صغيرة القد بيضوية الشكل طولها نحو
٤ مم . وعرضها ٢ مم . ثوبها الى الخضار الازرق اللامع .
يرقاتها سوداء ، هلبية الجلد ، تطول نحو ٦ مم . || الحشرة
واليرقة تركبان اوراق الملفوف واللفت والشوندر .

٢١١٩ - ألتيز التبغ* ، دُقْسَة التبغ ، قد أن التبغ

Haltica sinuata (S). Altise du tabac (F).
خنافس من الألتيز طولها نحو ٢ مم . ثوبها الى السواد
العابق . يرقاتها حنطية الجسم ، سوداء الرأس || الحشرة
واليرقة تركبان بواذر التبغ في المشائل .

٢١٢٠ - ألتيز الزروع* ، دُقْسَة الزروع ، قد أن الزروع

Chaetocnema aridula (S). Altise des céréales (F).
Cereal flea beetle (E). Halmerdfloh (D).

خنافس صغيرة من الألتيز طولها نحو ٢ مم . ثوبها اسفع
قائم . تركب الزروع على اختلافها وتغذي من الاوراق .
يرقاتها عابقة الخضار صغيرة القد تركب العصف لكنها
قليلة الاذى .

٢١٢١ - ألتيز الصليبيات اطلب خدوش .

٢١٢٢ - ألتيز الكتان* ، دُقْسَة الكتان ، قد أن الكتان

Aphthona virescens (S). Altise du lin (F).
خنافس من الألتيز طولها نحو ٢ مم . ثوب اخضر قائم

٢١٣٤ - أندروفندا حويصية *

Aldrovenda vesiculosa (S).

Aldrovenda vésiculeuse (F).

نبات مائي معقود التعريف على اسم العلامة الايطالي «الدروفندي» وهو نبات وحيد الجنس والنوع من فصيلة النيدماقيات. موطنه يمتد من اوروبا الجنوبية والوسطى الى اطراف الهند. يعيش مغموراً في المناطق والاهوار والجاري القليلة الانحدار حتى زمن الازهار حيث يطوف على سطح الماء بواسطة جهاز من الحويصلات المنفوخة بالهواء تمكنه من العوم الوقت اللازم للازهار والاختصاص والعقد.



أندروفندا حويصية

٢١٣٥ - ألدريمول

Aldremol

حاشور زراعي يرتكز على مادة الالدرين. يستعمل تعفيراً على التربة للقضاء على السالول والدودة البيضاء وأشباهها.

٢١٣٦ - ألدهيد


Aldéhyde (F). Aldehyd (E).

سائل عديم اللون يحصل من تأكسد الكحول.

٢١٣٧ - ألدور

Aldur (F). Aldur (E).

مادة مطيعة ركيبتها الفورمول والبول. تستعمل في صناعة الزجاج اللاصيف، غير قابل الانكسار، وقد تحل محل المرو في بعض استخداماته لأنها شفافة لاشعة ما وراء البنفسجي.



الدورة ممسكة

٢١٣٨ - إلدونة

Eledona (S).

Elédone (F). Eledona (E).


جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الالدونيات || أنواعها المعروفة ثلاثة اعطائها البحر الابيض المتوسط || جميعها صغيرة القد تحمل أربعة أزواج من الجرامز المستطيلة، المحظبة القواعد، المتتابعة المحاجم التي تمكنها من الالتصاق بفرائسها || أشهر أنواعها الالدونة الممسكة.

٢١٣٩ - إلدونة ممسكة *

Eledona moschata (S).

Eledone musquée, Poulpe musqué (F).

نوع من الالدونة يكثر وجودها في البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير القد. حطائها يكتنف كابل الزام الاول من الجرامز. يفوح منها غارج الماء عرف عطري اخاذ لا يختلف عن عرف المسك || لحمها مأكول رغم رائحة المسك القوية ويقال انه يقوي الاعصاب وينشط الباه.



ألدونية

٢١٤٠ - إلدونيات

Eledonidae (S).

Eledonidés (F). Eledonidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات رأسيات الارجل. اجناسها المعاصرة المعروفة اثنان الالدونة والبليطة || تتميز حيوانات هذه الفصيلة بخلوها من الزعانف وباستطالة جرابيها المحجمة على صف واحد.

٢١٤١ - إلداب

Acclimatation (F).

Acclimatization (E).


لذب بالمكان اقام به. واللداب هو اخضاع الحيوان او النبات الى محيط اقليمي يختلف عن محيطه الاصلي.

٢١٤٢ - ألزق، ألصق

Agglutiner (F).

To agglutinate (E).

لزق او لصق الشيء بغيره.



ألغ

٢١٤٣ - ألساريس

Alsarex

حاشور زراعي يرتكز على مادة الروتينون وهو على نوعين. يستعمل تعفيراً على النبات بمعدل يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غ. للدين الواحد في مكافحة الحشرات التي تتركب البقول وسائر النباتات الخضرية.

٢١٤٤ - أليستونيات

Alstoniées (F). Alstoniae (E).

سبط من فصيلة الدفليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها اشجار وجنبات حرجية منبتها المناطق الاستوائية. يستخرج من بعضها عصارة مرة يقسال انها تقوم مقام الكينا.

٢١٤٥ - أليستونية *

Alstonia (S). Alstonie,

Dita, Echite (F). Dita bark, Devil's tree, Alstonia (E). Schulholzbaum (D). Alstonia (I).

شجرة حرجية دائمة من الالستونيات وفصيلة الدفليات. منبتها المناطق الاستوائية الاسيوية وجزر اوقيانية || تحوي عصارة مرة قريبة من الكينا تستعمل في بعض المستحضرات الطبية وهي طاردة للديدان المعوية.

٢١٤٦ - ألسين

Alsine (F).

نبات عشبي معمر يعرف بالقلقلة، اطلبها.

٢١٤٧ - إلتين

Elatine (F). Elatin (E).

أطلب شجيرة.

٢١٤٨ - إلتينيات

Elatinaceae (S).

Elatinacées (F). Elatinaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات. أنواعها عديدة تنتمي الى جنسين. نباتاتها اعشاب وجنبات مدادة منقمية. أوراقها متقابلة. ازهارها رباعية او خماسية التركيب. ثمارها جراء سباعية الاخبية. بزورها صغيرة دهنية لا تخلو من الخواص الطبية.

٢١٤٩ - ألغ، ألغيات، غيغ، غيغيات

Algues (F). Algae (E).

رتبة من المشريات عديدة الفصائل والاجناس والانواع. سماها مجمع مصر الطحالب في حين ان كلمة طحالب تعبر عن (Mousses) وقد سماها الامير مصطفى الشهابي أشنة بينما الاشنة هي (Usnée) كما ذكرها الامير نفسه. لذلك نعتمد كلمة ألغ وغيغ || والالغيات من النباتات المستورات الزهر التي لا تتميز فيها الجذور والسوق والاوراق تعيش بمعظمها في المياه العذبة والبحرية. ولما كان لون خضتها متعدداً فقد قسمت الى اربع مراتب وهي:

Algues rouges, Floridées,

Rhodophycées (F). Rhodophyceae (E).

ألغيات خضرة

Algues vertes, Chlorophycées (F).

Chlorophyceae (E).

ألغيات زرق

Algues bleues, Cyanophycées (F).

Cyanophyceae (E).

ألغيات سفعة

Algues brunes, Phéophycées (F).

Phaeophyceae (E).

٢١٥٠ - إلهاء، قنسخ

Résiliation (F).

Cancelling, Annulement (E).

هو ابطال عقد بعد الشروع في تنفيذه.


٢١٥١ - إلهاء

Abrogation


هو ابطال قانون او مرسوم فلا يعود تطبيقه مقدوراً. ولا



إلقى البساتين



إلقى الرمال



إلقى المتوسط



إلقى النحل



إلقى



ألكة

بطنها الى الصفار المزركش بالاسود || تقتنص النمل فتخدره وتحجره وترى عليه يرقاتها .

٢١٦١ - **إلقاح ، تطعيم** Vaccination
حقن الحيوان باللقاح الخاص انتقاء ميكروب ذلك اللقاح .

٢١٦٢ - **إلقاح ، تلقح** Inoculation
ادخال ميكروب مرضي في الجسم لاغراض طبية وقائية .

٢١٦٣ - **إلقة ، قيردة ، دحية** Guenon,
انثى القرد . Monine (F). Monkey, Ape (E).

٢١٦٤ - **إلقس *** Alocasia (S). Alocasie (F).
Tara plant (E). Tropenwurz (D). Alocasia (I).
جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الفلقاسيات .
مهددا البلاد الهندية . انواعها عديدة . اوراقها قرصية
طويلة الزناد . كبيرة النصل الاخضر الموشح والمخرج
والمنسج بمختلف الالوان المتجانسة .

٢١٦٥ - **إلقيات ٥** Sphegidae (S).
Sphégidés (F). Sphegidae (E).
فصيلة حشرات قانصة واثجة من رتبة غشائيات الاجنحة
المحصورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها متوسطة
القد او كبيرة ، مستطيلة الجسم ، انبوبية الخصر ،
يغلب فيها اللون الاسود || اناثها بناءة تشيد وكرها بالطين
فتلصقه في المكان الذي يناسب من الحائط او تحت السقف
او تجعله في الارض المذحاة على عمق بضع سنتيمترات
وتقسمه الى عدة خلايا تقيم بينها الحواجز || تقتنص
العناكب والحشرات واخصها الديدان فتخدرها وتنقلها الى
وكرها حيث تمتح فيها مكها وتسد الحاجز فينقف المكن
ويتغذى بها .

٢١٦٦ - **ألكة *** Alces (S). Elan (F). Elk, Moose (E).
حيوان مجتر كبير الجثة وحيد النوع من فصيلة الايليات .
موطنه البلاد الشرقية الشمالية الباردة لذلك فهو لا يخشى
الصقيع ودميك الثلج || وهو كبير الجثة طوله من ٢٧٠
الى ٢٩٠ سم . بما فيه ذيله البالغ ١٠ سم . ارتفاعه يراوح
من ٢٠٠ الى ٢١٥ سم . ووزنه من ٤٠٠ الى ١٠٠٠
كيلو . الانثى اصغر قدماً من الذكر . رأسه مستطيل يشبه
رأس البغل ينتهي بحفلة غليظة شارقة مكتظة بالشعر .
عنقه غليظ وقصير يحمل بين لحبيه وزوره كتة كثيفة من
الشعر الطويل . صدره واسع عرم . ازلامه رفيعة وقوية .
ظلفه مشقوق الى فلقين تجمعها غشاة غضروفية مطاطة
تساعده عند السير على الدميكة وفي المناقع الموحلة
يعيش جاعات . اجله من ٧ الى ٣٠ || قوته الاعشاب
العالية وحاء الاشجار واناها واوراقها . يألف غابات
الصفصاف والبتولا والخور والتنوب والصنوبر .

٢١٦٧ - **إلكترونيك** Electronique (F). Electronic (E).

٢١٦٨ - **ألفيل ٥** Schmidélie (F).
هي الشميلة ، اطلبها .

٢١٦٩ - **أليغاتور** Alligator
هو التمساح الامريكي ، اطلب .

٢١٧٠ - **ألم** Orme
اطلب بوقيسا .

يلغى نص الأ بنص مستو معسه او مرتفع عنه في الدرجة
مثلاً على ذلك : لا يلغى مرسوم الا بقانون .

٢١٥٢ - **ألم** Amalgamer (F). To amalgamate (E).
مزج الزئبق بمعدن آخر .

٢١٥٣ - **إلف الكلس** Calcicole
اطلب جصي .

٢١٥٤ - **إلف الماء ، رزيغيات ٥** Hydrophilidae (S).
Hydrophilidés (F). Water scavenger beetles (E).
Kolbenwasserkäfer (D).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة عديدة الاجناس
والانواع . معظمها يألف الماء والمناقع وبعضها يعيش على
خشي الابقار || جميعها من الحشرات القليلة الاذى ،
صغيرة القد مستطيلة الشكل ، متعددة الالوان الزاهية ،
قصيرة الزباني النحيلة ، مقدافية الارماغ || اناثها تحيك
صلصات مردنية الشكل تضع فيها مكها الذي يراوح عدده
من ٢٠ الى ٥٠ ثم تربطها ببعض الاعشاب فتطفو الصلصة
على صفحة الماء الى ان يتم النقف فتتفلق وتغوص .

٢١٥٥ - **ألفاسوفر** Alphasoufre
فاطور زراعي يرتكز على الكبريت الميكروني القابل
البلل يستعمل سائلاً محلولاً ٢ ٪ في مكافحة الارمداد على
الاشجار المثمرة والكرمة .

٢١٥٦ - **ألفا قنطورس** Alpha du Centaure (F).
نجم ثير من كوكبة قنطورس مركزه على البطن والعرب
تسميه « بطن » . يعتبر من نجوم المرتبة الاولى . يبعد عن
الارض نحو ٤٣ الف مليار كيلومتر .

٢١٥٧ - **إلقى البساتين ٥** Scolia flavifrons (S).
Scolie des jardins (F).
حشرة نافعة من الالقيات طول ذكورها من ٢٠ الى
٢٦ سم . واناها من ٣٠ الى ٤٠ لونها الى السواد تملوه
اربع بقع صفر . يقتنص ويتطفل على يرقات غديات
الاجنحة .

٢١٥٨ - **إلقى الرمال ٥** Ammophila sabulosa (S).
Ammophile des sables (F).
حشرة نافعة من الالقيات . طول ذكورها من ١٣ الى
٢٢ سم . واناها من ٢٠ الى ٢٨ سم . لونها الى السمرة .
تقتنص مختلف ديدان الفسقيات .

٢١٥٩ - **إلقى المتوسط ٥** Spheg
حشرة نافعة من الالقيات طولها نحو ٣٠ سم . ثوبها اسود ،
بطنها احمر . اجنتها صفر . يكثر وجودها من نيسان الى
ايلول . تقتنص مختلف انواع الحشرات والديدان فتخدرها
وتنقلها وتحجر عليها في وكرها الارضي بعد ان تمتح فيها
المكن اللازم .

٢١٦٠ - **إلقى النحل ٥** Philanthus apivorus, Ph. triangulum (S). Philanthe
apivore (F).
حشرة من الالقيات القانصة الضارة . مستطيلة الشكل
يراوح طول ذكورها من ١٠ الى ١٢ سم . واناها من ١٤
الى ١٧ سم . رأسها وجوشنها وارجلها سود . ظهرها مرقش ،

٢١٧٩ - **الهُوب ، مِلْهَاب ٥** Lance flammes (F).
Flame thrower (E).

٢١٨٠ - **أَلْوَة * ، سَوَلَع مَخْزِي ، صَبَر ، صَبَّارَة ، مَقَر**
Aloe vera (S). Aloès officinal (F). Aloes (E). Aloe.
Achte aloe (D). Aloe epatica (I).

نوع من السولج وهو نبات معمر تابع لفصيلة الزنبقية .
أوراقه لحمية ليفية النصل المستطيل المسن الحافة والمديب
العقصة || يستخرج من أوراقه ، عدا الألياف الصناعية ،
عصارة طبية مرة الطعم تستعمل في بعض المستحضرات
المموية || يتكاثر بالفسائل . يعيش في جميع الأتربة ،
لكنه يخشى البرد .

٢١٨١ - **أَلُوْدور** Aludor

حاشور زراعي يرتكز على زرنبيخات الألومينيوم يستعمل
سائلاً مخلوئاً بالماء بمعدل ٨ ٪ في مكافحة أكثر الحشرات
واخصها خنفساء البطاطا (دوريفور) .

٢١٨٢ - **أَلُورُون ، أَلِيرُون** Aleurone
مادة ازوتية تنشأ في البذور والحبوب عند إلبائها فادراكها .
اشهرها غلوتين (Gluten) حبة القمح .

٢١٨٣ - **أَلُوريت** Aleurite (F).
اطلب أرطس ، شجرة من الفريونيوات .

٢١٨٤ - **أَلُورِيَة ٥** Aleuria vesiculosus
جنس فطور من الكعديات يعيش على المواد العضوية
الدبالية النباتية . اطلب كمدة جرابية .

٢١٨٥ - **أَلُوزِيَا ٥ *** Elosia (S).
Elosie (F). Elosia (E).
جنس ضفادع قازبة من فصيلة الكداميات . أنواعه المعروفة
قليلة العدد مهدا بعض مناطق البرازيل || أجسامها صغيرة
القد تقوون من ٤ الى ٦ سم . عند الذكور ومن ٥ الى ٧ سم .
عند الاناث . رؤوسها مسطحة الصفحة العليا التي تتقدم
السفلى عند طرف الحظم من ٦ الى ٨ سم . فكوكها السفلى
عامة الاسنان || جلودها لماعة مبعثرة الشعول . انوابها
مختلفة الألوان يكثر فيها الاخضر الاغيس || تعيش من
١٠ الى ١٢ سنة . تسرح في الليل وتبيت في النهار . قوتها
الحشرات والديدان || اناثها تسراً من ٤٠٠ الى ٦٠٠ دعبلة
في جراب تحمله الانثى على ظهرها حتى التقف .

٢١٨٦ - **أَلُوسِن** Alyssum
اطلب أليس .

٢١٨٧ - **أَلُوسِينِيَّات** Alyssinées
سبط من فصيلة الصليبيات نباتاته عديدة الاجناس والانواع
اشهرها الالوسن والذحيان والجرباع والابريسيه .

٢١٨٨ - **أَلُوسِيَّت** Alucite des céréales
هو عنجول الحبوب .

٢١٨٩ - **أَلُومِين** Alumine (F). Alumina (E).
هو اكسيد الألومينيوم . جسم اساسي مركب من الاكسجين
والألومينيوم . يشمل بعض الحجارة الكريمة المختلفة الاسم
واللون نظراً لاختلاف الأكسيد المعدني . منها الياقوت الاحمر
واللازورد والقرند والسبازج الخ... || اما البوكسيت
وهو الألومين الهيدراتي فيستخرج من الطبيعة ويذبل في
صناعة تلك العديم الانحلال .

٢١٧١ - **إِلْمَاص** Véralson (F).
راجع إرقاق .

٢١٧٢ - **أَلْمَسْدَة *** Allamanda (S).
Allamande, Orélie (F). Alamanda (E).
Alamandbaum (D). Allamanda (I).

جنس نباتات من فصيلة الدفليات منبها أمريكة الاستوائية
انواعها قليلة وهي جنبيات وجنبيات مدادة عارشة معمرة ،
سوقها اسطوانية ملساء ، أوراقها معنقة متقابلة رباعية
المحور سنانية النصل . ازهارها تشبه زهر الياسمين لكنها
ذهبية اللون ، كبيرة القدر لا عرف لها . تستعمل
في التزيين . تتكاثر بالبذر والعقل . تعيش في جميع
الأتربة القليلة والموسطة الاندماج . تخشى الرطوبة المستحكمة
وترغب في المواقع الجنوبية الكثيرة الحرارة والاشعاع الشمسي .

٢١٧٣ - **النَجُوج ، أَلْنَجُج ، يَلَنْجُوج ، يَلَنْجُج**
عرد الطيب Aquilaria malaccensis (S).

Aquilair (F).
شجرة حرجية وتزيينية من فصيلة المازريونيوات . منبها
البلاد الحارة . خشبها صلب فاخر يدعى عشب العقاب
وهو من الاخشاب الرائجة الفواحة العرف العطري
المستحب .

٢١٧٤ - **أَلْنَجِيَّات** Alangiaceae (S).

Alangiacees, Alangiées (F). Alangiaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبطاً
من الفصيلة الاهليلجية وهي بالحققيقة تشبه الاهليلجيات
وتشبه ايضاً الشمويات ولكنها مستقلة عنها || منبها
احراج الهند الجنوبية الغربية حتى جبال حلايا || اجناسها
وانواعها قليلة لكنها مختلفة القدر الشاسع البون . منها
الشجرة الدائحة الباسقة ومنها العشبة النجيلية . اشهرها شجرة
الالنجية || اخشاب اشجار هذه الفصيلة جامدة الرقعة
الناعمة ، شديدة الصلابة ، بيضاء او تبينة اللون . فاخرة
الصنف تستعمل في الصناعات الخشبية الدقيقة .

٢١٧٥ - **أَلْنَجِيَة *** Alangium (S). Alangier (F).
Alangium (E). Alangolambaum (D). Alangio (I).

شجرة حرجية من فصيلة الالنجيات منبها الاحراج الهندية
حتى سفوح جبال حلايا . ساقها ملساء رماء اللون . أوراقها
متعاقبة معنقة اهليلجية . ازهارها خنثوية فردية او ثلاثية
التجميع ، محورية الارتكاز ، بتلاتها خيطية . اسديتها
كثيرة العدد طويلة . ثمرتها عنبية لحمية عافسة وجامضة
الطعم تحوي برة واحدة . جذورها عطرية مرة يستخرج
منها عطرها وجوهرها المر . خشبها فاخر الصنف ابيض
اللون شديد الصلابة .

٢١٧٦ - **أَلَنْصِيَّة** Alonzoa
اطلب ألوزوا .

٢١٧٧ - **أَلَنْكُوس ٥ *** Elenchus (S).
Elenchus (F). Elenchus (E).
حشرة من الحشيبات تمتع مكانها في بطون هدييات الاذنان
فينقف عن يرقات تعيش طفيلية الى ان تتم انسلخاتها
وتتحول الى حشرات كاملة .


٢١٧٨ - **إِلْهَاب ، تَشْوِيْط** Flambage (F).
Singeing (E).
معالجة سوق الاشجار وفروعها باللهب لقتل الحشرات
والطفيليات الفطرية الممشرة في شقوق لحائها .



أَلْدَة




أَلْنَجِيَة



أَلَنْكُوس



أَلْوَة



أَلُوزِيَا



ألوزوا



آلت



ألبيسم بحري



ألبيسم جردى



ألبيسم حقيقي



ألبيسم ذعبي



ألبيموس

متعاقبة . أزهارها عنقودي النجمية تاجي الارتكاز .
أزهارها صغيرة جميلة فواحة العرف متعددة الألوان || أشهر
أنواعه ما يتبع .

٢١٩٨ - ألبيسم بحري * ، خيرون الإبرة

Alyssum maritimum (S). Alysse argentée, Corbeille d'argent, Alysse maritime (F). Sweet alison, Allison (E). Straudsteinkraut, Immergrüne alysse (D). Paniera d'argenteo, Filigrano (I).

نوع من الأليسم البري ينبت في المواقع الصخرية من لبنان إلى جبل اللكام . أوراقه زهاء طحلاء اللون . أزهاره إلى الارتفاع الفضي .

٢١٩٩ - ألبيسم جردى *

Alyssum Alpestre (S). Alysson (F). Gold basket, Alpine mad-wort (E). Goldkörbehen, Steinkraut (D). Alisso (I).

نوع من الأليسم البري الطبي ينبت في قمم لبنان والجبل الشرقي . زهره أصفر اللون .

٢٢٠٠ - ألبيسم حقيقي * ، حشيشة اللجأة

Alyssum genuinum (S). Alysse blanche (F). Hoary mad-wort (E). Welsse grankresse (D). Alisso della montagna (I).

نوع من الأليسم الطبي البري يعيش في الجبال العالية يوجد منه في جبل الارز . يقال ان منافع الطبية عديدة أوراقه صغيرة مستطيلة زباء . أزهاره إلى البياض .

٢٢٠١ - ألبيسم ذهبي * ، حشيشة السلحفاة ، فهرة الكلب

Alyssum saxatile (S). Alysse jaune, Corbeille d'or, Alysse des jardins (F). Golden tuft, Gold dust, Rock alysson (E). Gebirgssteinkraut, Goldkörbchen (D). Alisso giallo, Paniera d'oro, Alisso dorato (I).

نوع من الأليسم البري الطبي والزراعي التريبي وهو عشبة نجمية فرعاء جميلة الأزهار الصفراء اللون || تتكاثر بالبذر وتعيش في جميع الأتربة . ومن أنواعه اللبنانية السورية :

٢٢٠٢ - ألبيسم أقرعي

Alyssum cassium (S).

٢٢٠٣ - ألبيسم شامي

Alyssum damascenum (S).

٢٢٠٤ - ألبيسم صوفي الورق

Alyssum eriophyllum (S).

٢٢٠٥ - ألبيسم صيواني

Alyssum umbellatum (S).

٢٢٠٦ - ألبيسم عفائي

Alyssum dasycarpum (S).

٢٢٠٧ - ألبيسم كوكبي

Alyssum constellatum (S).

٢٢٠٨ - ألبيسم مندمج

Alyssum condensatum (S).

٢٢٠٩ - أليفسوس *

Elymus (S). Elyme (F). Elymus (E).

جنس نباتات برية جذمورية معمرة من فصيلة النجيليات . أنواعه نحو ٢٠ متفرقة في جميع الاصقاع . أشهرها شعير الكتبان الذي يعيش في الرمال ويشبهها .

٢٢١٠ - آم

Enfumer (F). To smoke (E).

دخن على النحل ليشتر المسل .

٢٢١١ - أم اربع واربعين * ، حريش

Scolopendra (S). Scolopendre, Mille-pattes (F). Scolopendra (E).

جنس درويات زاحفة من الدخداخيات الشفويات الارجل .

٢١٩٠ - ألومنيوم Aluminium

معدن ابيض يتميز بوضائه الفضي وخفته اللسبية اذ يبلغ ثقله النوعي ٢,٥٦ يذوب تحت ٦٥٠° سغ وهو من اخف المعادن وزناً . يقبل الطرق والصقل فتصنع منه الواح واسلاك في غاية الدقة . رمزه (لو) ، وزنه الانومي ٢٦,٩٧ || يستخدم خالصاً او مركباً في صناعات مختلفة من صناعة الادوات المنزلية والطبية والكهربائية الى صناعة السيارات والطائرات || أكثر البلاد إنتاجاً لهذا المعدن هي امريكا وفرنسا والمانيا وسويسرا وايطاليا .

٢١٩١ - ألونزوا * ، النصبية Alonzoa

جنس نباتات عشبية زهرية من السيسميات التابعة لفصيلة الخنازيرية . منبتها جبال البيرو والشيلي وقد كثرت زراعتها التزيينية نظراً لجمال شكلها ويختلف ألوان زهرها من البرتقالي الى الاحمر الحقيقي || تتكاثر بالبذر . تعيش في معظم الأتربة . أزهارها يدوم نحو اربعة شهور .

٢١٩٢ - أليباريه Alliaire officinale

اطلب حشيشة الثوم .

٢١٩٣ - أليان Mouton à queue grasse

كل كبش او نعجة تحمل ألية . تعرف بضأن أليان .

٢١٩٤ - ألييت * Alytes obstetricans

Crapaud accoucheur (F).

Midwife-toad, Obstetric-frog (E).

ضفدعة من فصيلة الضفاديات . مهدا بعض الاصقاع الارربية الممتدة من البلقان الى فرنسا || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم . جلدها كثير الشعول ينضج مادة زيتية قوية الرائحة القريبية الشبه براحة الثوم . رأسها قليل الاستطالة . عيناها مستديرتان ، نابشتان . حدقة عيناها عمودية الارتكاز . لسانها مستدير الشكل ، قليل الحركة . اصابع قوائمها الخلفية نصفية الخطاب || ثوبها الى السمرة الحنطية . يعبق في الظهر ويهت في البطن || تعيش في المناطق ومجاري الماء . مسرحها دجوي . قوتها الحشرات والديدان || تسافدها وهو فريد في نوعه يتم على الشكل التالي :

يعلو الذكر ظهر الانثى متمسكاً بقائمته الامامية داعكاً بقائمته الخلفية خاصرتها الى ان ينبجس الدليل تباعاً في سبحتين يرويها بشلخه المنصب ثم يلفها على فخذه ومؤخر ظهره حتى زمن النقف الذي لا يطول اكثر من ثلاثة اسابيع . عند ذلك يشمرغ في الوحل المغور بالماء فتخرج البلاعيط من اغشيتها ويتخلص من حله .

٢١٩٥ - أليث Alioth (F). Alioth (E).

الألية نجم من كوكبة الدب الاكبر ويدعى ايضاً حور . اطلبه .

٢١٩٦ - ألية Queue grasse (F). Obese-tail (E).

الألية والية ما ركب العجز وتدل من الشحم .

٢١٩٧ - ألبيسم ، أليفسون Alyssum (S). Alysse (F).

جنس اعشاب برية وطنية وتريينية من فصيلة الصليبيات . منبتها حوض البحر المتوسط وآسية الجنوبية . كان اطباء اليونان ومن عاصره وجاء بعدهم يعتقدون ان بعض انواع هذه الاعشاب يشفي من الكلب || معظمها اعشاب نجمية فرعاء السوق الخشوشة الدقيقة . أوراقها لاطقة لسة

٢٢٣١ - أُمّ سَكَمَكَع ، أُمّ عَجَلَان

اطلب ذعرة بلقاء .

٢٢٣٢ - أُمّ شَبَقُونَة * Pique-boeuf (F). Beef-eater (E).

طائر يكون مع الحمر والنعم يلتقط النعر والقراد والذباب .
اطلب نغاف .

٢٢٣٣ - أُمّ صُفَيْدَة Lavandière jaune (F).

طائر من الذعر القواطع يدعى ذعرة رمدا ، اطلبها .

٢٢٣٤ - أُمّ عِزَّة هي القلبية وعزة ابنتها .

٢٢٣٥ - أُمّ عَوَيْف * ، أُمّ قَيْس Fourmi-lion (F).

Ant-lion (E).
اطلب ليث عفرين . حشرة ضخمة الرأس مستطيلة الجسم لها أربعة أجنحة إذا رأت الانسان قامت على ذنبها ونشرت أجنحتها . ويقال لها ناشرة برديها .

٢٢٣٦ - أُمّ غَيْلَان Acacia gommier (F).

اطلب سنط صمغي . وهي شجرة من عضاء البادية كثيرة الشوك . قال ابن سينا أصله يسى ينك إذا بخر به طيب رائحة البدن وقطع رائحة الثوم .

٢٢٣٧ - أُمّ قِرْقَرَة * Manis (S). Pangolin (F).

جنس حيوانات لبونة من القرشيات وذئبة الدرد . انواعه سبعة ، اقليسها البلاذ الاستوائية الاسيوية والافريقية جلدها كجلد السمك تكسوه الحراشف الغضروفية الصلبة المرصوفة المرصوفة من الأنف الى آخر الذيل طولها من ١٠٠ الى ١٧٠ سم . رأسها مردئي الشكل صغير . لسانها طويل لزج . جرابها قصيرة ، اظفارها حادة مستطيلة || تحفر جحرها بين الصخور وفي الاراضي الصلبة تأوى اليه في النهار وتخرج طلباً للقوت في الليل قوتها النمل والارض والحشرات والحبوب والنار وهي سريعة العدو وبعضها يتسلق الاشجار .

٢٢٣٨ - أُمّ كَلْب

« شجرة شاذة تنبت في غلظ الارض وجبالها ، صفراء الورق ، خشناء ، فاذا حركت ، سقطت بأتين رائحة واخبثها ، سميت بذلك لانها تنبت كالكلب اذا اصابه المطر . » (اللسان)

٢٢٣٩ - أُمّ مَكَب

شجرة شاذة تنبت في غلظ الارض وجبالها ، صفراء الورق خشناء فاذا حركت سقطت بأتين رائحة (اللسان) .

٢٢٤٠ - أُمّ نَضَارَة

طائر من الدخيل - اطلب دخلة نصارة .

٢٢٤١ - أُمّ نُوح اطلب هازجة السعد .

٢٢٤٢ - أُمّ هَنُوس Lophomys d'Imhaus (F).

حيوان لبون قاضم يدعى لقبوم ، اطلبه .

٢٢٤٣ - إِمَاء Miaulement (F). Mewing (E).

الاماء : صياح السنور (القاموس) وهو المؤاء .

انواعه عديدة جميعها من دويبات المناطق الحارة . طولها يراوح من ٨ الى ٣٠ سم . || تسرح في الليل . عضتها سامة مؤلمة وقد تكون مميتة في بعض الانواع .

٢٢١٢ - أُمّ التَّلَافِيْف Feuillet-livret (F).

Third stomach of ruminants (E).
احد الاقسام الاربعة التي يتركب منها كرش المجترات وقد تتصل بالقنسوة وبالانفخة .

٢٢١٣ - أُمّ الحَيَات * ، رَضَاعَة البَقَر Eumeces

جنس عطاء من فصيلة السقنقوريات ورتبة العظائيات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها من عطاء البلاد الحارة . ضخمة الشكل طولها لا يفوق ١٨ سم . لونها الغالب الى الصفرة وبعضها ارقش . وغيرها مؤزرة بالاسود ، حراشفها ملساء .

٢٢١٤ - أُمّ الخُلُول * ، قُلُك Arca (S). Arche (F).

Arca, Arc, Ark shell (E).
جنس محار مأكولة صغيرة القد ، شبه بيضي الصدف ، تكثر في البحر المتوسط .

٢٢١٥ - أُمّ الزَرْد Pleuronecte zèbre (F).

هي السجاس المؤذر ، اطلبه .

٢٢١٦ - أُمّ السَهر ، أُمّ قُوَيْق Chevêche (F).

Little owl (E).
هي الصدى ، اطلبها .

٢٢١٧ - أُمّ الشَّعُور Saule pleureur (F).

Weeping willow (E).
اطلب صفصاف ستح .

٢٢١٨ - أُمّ الصَّخْر هي البهفة ، اطلبها .

٢٢١٩ - أُمّ جِعران اطلب جعل مقدس .

٢٢٢٠ - أُمّ حُبَيْن اطلب حردون .

٢٢٢١ - أُمّ حِسَان

يقول الجاحظ هي دويبة على قدر كف الانسان .

٢٢٢٢ - أُمّ حَسْرَد Aspe

اطلب مقلقة سمكة من الشبوطيات .

٢٢٢٣ - أُمّ حُسَيْن

يقول الديري هي دويبة سوداء من دواب الماء لها ارجل كثيرة .

٢٢٢٤ - أُمّ حِفْصَة هي الدجاجة الاهلية .

٢٢٢٥ - أُمّ حَمَارِس هي الفزالة عن ابن الاثير .

٢٢٢٦ - أُمّ حَنُور هي الضبع .

٢٢٢٧ - أُمّ دِنْفِيس هي الزريقه .

٢٢٢٨ - أُمّ رُمَيْل هي الذفرة العربية .

٢٢٢٩ - أُمّ رِيَّاح

طائر اغبر احمر الجناحين والظهر يأكل العنب . هذا ما جاء عنه في المريع عن الديري .

٢٢٣٠ - أُمّ زُبَيْبَة هو خروف البحر .




أُمّ أربع وأربعين



أُمّ الحيات



أُمّ الخلول



أُمّ شبقونة



أُمّ عويف



أُمّ قرفة



أمارنطون




أماريلس أحمر



أماريلس زنبق يعقوب



امازونة



أمانيت أحمر



أمانيه

الى اربع بيضات تحضنها نحو ١٩ يوماً بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

٢٢٥٦ - إماعة ، إنباع Liquéfaction (F).
Liquefaction (E).

٢٢٥٧ - إمام Etalon de mesure (F).
Standard of measures (E).
الانموذج المثالي الذي حدده القانون في مختلف المقاييس .

٢٢٥٨ - أمانيات الأخاديد Protéroglyphes (F).
Proteroglyphs (E).
رتبة من الحيات تشمل الزواحف الخشبية من ذوات الأنياب الجوفاء الانبوية السامة كالصل والناشر والرحة والافعى النخ.

٢٢٥٩ - أمانيات الخيشوم Prosobranches
صف من الرخويات المعديات الارجل وهي حيوانات برية وبحرية أرجلها في بطونها || فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها مائي بحري.

٢٢٦٠ - أممان Planteur (F). Planter (E).
الأممان هو الزراع (القاموس والتاج) .

٢٢٦١ - أمانيات Amanite (F). Amanita (E).
جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات أنواعه عديدة بعضها مأكول فأخر الصنف وبعضها سام مبيت || أشهر أنواعه المأكولة الامانيت الابيض والاحمر.

٢٢٦٢ - أمانيات أبيض Agaricus alba (S).
Amanite blanc (F). Agaricus abius (E).
فطر من الامانيت وفصيلة الفاريقونيات . لونه الى البياض الاغبر الاطحل الموج . يكثر في المواقع الظليلة . يعيش على المواد النباتية المنحلة . وهو من الفطور المأكولة الجيدة الصنف المستحبة الطعم .

٢٢٦٣ - أمانيات أحمر * Agaricus aurantiacus (S).
Amanite orangé, Oronge (F). Agaricus orange-colour (E).
فطر من الامانيت وفصيلة الفاريقونيات . لونه الى الحمرة الوردية الطحلاء الموج || يعتبر من الفطور المأكولة الجيدة الصنف .

٢٢٦٤ - أمانيتين Amanitine
مادة قلوية طيارة تستخرج من الامانيت تذوب في الماء كريهة الرائحة شديدة السم || تستعمل في بعض المستحضرات الطبية من ١ الى ١٠ في معالجة الجحاف ورشح العرق .

٢٢٦٥ - أمانيه * Ammania (S). Ammanie (F).
Tooth-cup (E). Ammanistplantze (D). Ammannia (I).
جنس نباتات عشبية حولية من الفصيلة الحنائية . أنواعه قليلة . أوراقها متقابلة ، أزهارها نورية التجميع ، ابطية الارتكاز ، وردية اللون توجد في الاماكن الجبلية . أوراقها عارقة قالبة ، تستعمل في بعض العلاجات الجلدية . ومنها نوع منقهي يتعمل بذات الصفات .

٢٢٦٦ - إماهة Hydrolyse
هي ازدواج ذرة بعض المركبات العضوية عند تماس الماء .

٢٢٦٧ - أمبرَبَاريس اطلب برباريس .

٢٢٦٨ - أمارة ، أنديس ، ميدلال Indice (F).
Index, Sign, Token (E).

هي علامة التبيان الظاهرة او المحتملة .

٢٢٦٩ - أمارنطون * ، بزاز العذراء ، خالدة الجوز Helichrysum stoechas (S). Hélichryse stoechade, Immortelle stéchéade, Gnaphale citrine (F). Golden tufts, Cassidony, Gold flower (E). Sonnenstrohblume, Goldblume (D). Steca citrina, Immortale giallo, Trespini (I).

نوع من الخالدة وهو نبات عشبي تزييني معمر من فصيلة المركبات . يكثر في بعض جزر البحر المتوسط . يعلو نحو ٥٠ سم . أوراقه متعاقبة لسنة زغبية ضيقة النصل الاطحل الصفحة العليا الابيض السفلى || أزهاره تاجية ، عذقية ، عديدة البتلات الحرفية الصفراء اللون || يزرع للتزيين . يتكاثر بالبذور والعقل . يرغب في التربة الجصية الخفيفة ، يخشى الرطوبة .

٢٢٦٦ - أماريليس ، شبيك Amaryllis
جنس نباتات بصلية زهرية من فصيلة النرجسيات جميعها زراعية تزيينية . أزهارها كبيرة مختلفة الالوان جميلة المنظر ، عذبة العرف . لكنها من النباتات التي تخشى البرد وهو ما يحذر من انتشار زراعتها . أشهر أنواعها :

٢٢٦٧ - أماريليس ابيض Am. candida (S).
A. blanche (F).

٢٢٦٨ - أماريليس أحمر * Am. belladonna (S).
A. Belladone (F).

٢٢٦٩ - أماريليس أرجواني Am. purpurea (S).
A. pourpre (F).

٢٢٧٠ - أماريليس جوزفين Am. Josephinae (S).
A. Joséphine (F).

٢٢٧١ - أماريليس زنبق يعقوب * Am. formosissima (S). A. St. Jacob (F).

٢٢٧٢ - أماريليس مائج Am. undulata (S).
A. ondulée (F).

٢٢٧٣ - أماريليس موشح Am. vittata (S).
A. bandée (F).

٢٢٧٤ - أمارين ٥ Amarine (F).
مادة قلويدية تشتق من عطر اللوز المر .

٢٢٧٥ - أمازونة * ، كوريك ، بيبغاء خضر Chrysotis (S). Amazone, Courique,
Perroquet vert (F). Amazona (E).

كوريك هو الاسم البرازيلي . جنس طير من المتسلقات وفصيلة الببغاوات . أنواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها أمريكية . أعطانها تمتد من البرازيل الى المكسيك . تألف الغابات وضياف مجاري الماء اخصها ضفاف الامازون . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها كثيرة العدد . قوتها النار والحبوب والبزور والخشرات . تألف القفص لكنها تقتبس الكلام بحسنة وتردده في أي ظرف كان || اجسامها تراوح بين الاعتدال والكبر . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية يكثر فيها الاخضر والاصفر الازرق الموج جميعها موشحة بالاحمر او بالاصفر . مناقيدها وارساغها واصابعها سود || الانثى ترصع عشها في تجويف شجرة نخرة وتضع من بيضتين

٢٢٨٠ - أمبروسيا ، مزاولة العمل

Vacations هو الوقت الذي يقضيه بعض الموظفين أو بعض الأشخاص المنوط بهم عمل معين في دراسة هذا العمل أو القيام بأعباء الوظيفة كنزاولة الخبير مهمة العمل المنوط به أو اجراء وكيل الافلاس جرد موجودات المفلس .

٢٢٨١ - أمدرينان* ، دمع أيوب ، بدرانج

Coix, Lachryma-Jobi (S). Coix-larmes, Larmes de Job, Larmille (F). Job's tears, Coix millet, Gromwell reed (E). Hlobstränen gras (D). Lacrima di Giobbe, Erba da corone (I).

عشبة برية طيبة معمرة من فصيلة النجيليات . حبوبها مستطيل صغير بني اللون يستعمل في صناعة السباحات والعقود .

٢٢٨٢ - أمندود ، طلاله ، كسم

Habitus رسم هيئة النبات الخارجية . مثالنا على ذلك قولك في وصف الاجاصة مردنية الشكل وفي التفاحة مظلية الشكل . فالشكل المردني أو المظلي هو الامدود .

٢٢٨٣ - أمراض النبات

Maladies des plantes, Pathologie végétale (F). Pathology vegetable (E). هو العلم الذي يبحث في جميع الامراض النباتية مهما كان مصدرها || كانوا يعتقدون في الماضي ان سبب الامراض النباتية يعود اما الى تغيرات كيميائية لا تلائم النبات كقلة الغذاء او رداءته ، واما الى عوامل داخلية تحول دون انتظام عملية التغذية || الى ان جاء العالم « ده باري de Bary » واثبت ان الامراض النباتية متأتية عن طفيليات او فطريات طفيلية تعيش حياتها الخاصة ولا تتولد من النبات . ثم جاء الكثيرون بعده فرفعوا شأن هذا العلم وأوضحوا دقائق نواحيه نظراً لأهميته الاقتصادية العالية وما قد تسببه الامراض من خسائر فادحة في المحاصيل النباتية || فهذا العلم يشتمل اذاً الامراض الطفيلية واللافطيلية والجراثومية والميكروبية .

٢٢٨٤ - أمراض جرثومية

Maladies à virus (F). Malady of virus, Diseases of virus (E). هي الامراض التي يسببها كائن جرثومي حي يدعى فيروس « Virus » وينتقل من نبات مريض الى آخر سليم .

٢٢٨٥ - أمراض دودية

Maladies vermineuses (F). Vermineous malady, V. diseases (E). جميع الامراض الصادرة عن دود الامعاء كالصفر وغيرها .

٢٢٨٦ - أمراض طفيلية ، أمراض ضيفائية

Maladies parasitaires (F). Parasitic diseases (E). هي الامراض الناشئة عن كائنات حية تعيش متطفلة على عوائل حية وتمتص منها غذاءها وتسبب مرضها .

٢٢٨٧ - أمراض لا طفيلية

Maladies non parasitaires (F). No parasitic diseases (E). هي الامراض المتأتية عن عوامل وظروف خاصة لا تلائم النبات في المحيط الذي يعيش فيه .

٢٢٨٨ - أمراض ميكروبية

Maladies microbiennes (F). Microbian diseases (E). هي الامراض التي يسببها كائن ميكروبي حي .

٢٢٨٩ - إمراع ، خصب

Fertilité (F). Fertility (E). قابلية التربة لانتاج الكثير من النلة .

٢٢٦٨ - أمبروسيا* ، دمسيس

Ambrosia maritima (S). Ambrosie, Absinthe bâtarde (F). Sea ambrosia, Oak of Cappadocia (E). Traubenkraut (D). Ambrosia maritima (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات وهو من نباتات المناطق والارض الرطبة . اوراقه مركبة طويلة الزناد اللامطي* الانتشاب ، عطرية الرائحة تحافظ عليها في جفافها يقال انه من النباتات المنبهة ، المقوية والمضادة للحيات .

٢٢٦٩ - أمبير

Ampère (F). Ampere (E). الوحدة العملية لوغرة المجرى أو التيار الكهربائي .

٢٢٧٠ - إمبيق* ، إلبيق ، كرككة

Alambic (F). Alembic (E). جهاز تقطير يستعمل لاستخراج السوائل الطيارة كالكحول وغيرها .

٢٢٧١ - أمت

Accident de terrain (F). Undulation in the ground (E). الأمت ج . إمت وأموت هو التصدع الحضيضي الطبيعي مع ما يرافقه من ارتفاع وانخفاض .

٢٢٧٢ - إمتهق

Desséché (F). Dry (E). امتهق النبات : هاج ويبس من شدة الحر .

٢٢٧٣ - إمتراج

Fusion (F). Fusion, Melting (E). هو ادماج ومزج اشياء مختلفة بعضها ببعض .

٢٢٧٤ - امتصاص

Absorption هو مرور المواد الغذائية المائلة من خلال بعض الاجسام التي توصلها للاستعمال . والامتصاص يكون حيواني أو نباتي || الامتصاص الحيواني قوامه دخول المواد الغذائية المهضومة المعروفة بالكيموس في اوعية دوران الدم اي اعضاء الامتصاص وهي بمثابة جذور النبات . وهذا الامتصاص يحصل عن طريقين طريق الاوعية الدموية وطريق الاوعية اللبنية . فالوعية الدموية تمتص المسواد الزلالية والهيدروكربونية . والوعية اللبنية تمتص المواد الشحمية || واما الامتصاص النباتي فيقوم على تمثيل الماء ثم الاملاح التي يحتاج اليها كل نبات ويتمكن منها .

٢٢٧٥ - إمزالاخ

Effort (F). Strain (E). تمدد والتهاب في اوتار او عضل الفرس سببه اجهاد العضو المصاب .

٢٢٧٦ - امتناع

Abstention هو ان يعطل المرء حقاً له او مهمة منوطة به وقد يكون الامتناع مباحاً او واجباً او محظوراً .

٢٢٧٧ - إمتيار ، إلتزام

Concession هو تصرف اداري تحول الادارة بمقتضاء بعض الافراد حقوقاً وفوائد خاصة على الاملاك العامة او على الجمهور مقابل تنفيذ التزامات تفرضها عليهم .

٢٢٧٨ - إمجاج


Montée de la sève (F). Rising of the sap (E). من أمج العود : جرى فيه الطل ودخل في زمن الابلال .

٢٢٧٩ - أمخ

أمخ حب الزرع : جرى فيه الدقيق .



أمبروسيا




إمبيق




أمدرينان



أمروس أرقش




أمروس أغبر




أمروس الزهاري



أمريد بلسمي



أمسة سمراء



أمسة فستقيّة

الاصناف وافخرها || يدخل في عدة تركيب ومستحضرات طبية وصناعية .

٢٣٠١ - أمريديّات Amyridaceae (S). Amyridacées, Amyridées (F). Amyridae (E).

سبط من الفصيلة السذابية يشمل بعض الاجناس والانواع. جميعها شجيرات راتنجية حرجية وزراعية تزيينية .

٢٣٠٢ - إمساك ، قَبْض Constipation

مرض طارئ او مقدور الوقوع سببه اختلال في الجهاز الهضمي يظهره الخارجي صلابة في البراز تفوق الصلابة الطبيعية .

٢٣٠٣ - أمّسة سَمْرَاء * ، أمّسة الحُور

Amathes albula, Orthosia albula (S).

Amathe brune, Orthosie brune (F).

Amathes albula (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جواله قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة تميش في اول عهدها على اوراق الحور والصفصاف ثم على الاعشاب البرية والمرعوية || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطها تراوح من ٣٤ الى ٣٦ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الطول . جوشنها وبطنها الى الخططي الاسمر الموج . روشنها الاماميان الى الكهبة السمراء يعلوها نقطة سوداء واخرى كستنية وخط معترض عنابي وخط حثاري يستبق الوشم الاسود الذي يزين الاطار الخارجي . روشنها الخلفيان الى الطحلة تعلوها مشحة حنطية تنتهي بمستوى الخط المعترض في الروشن الامامي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢١ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مائل القشار ، اكهب اللون ، اسمر الموج ، يعلو من الرأس الى الشرج تنقيط اسود . رأسها الى الجؤوة . مدها ورواجها الى السمرة القائمة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغمن السرفة على عمق ٣ او ٤ سم .

٢٣٠٤ - أمّسة فُستُقِيّة * ، أمّسة الخُور

Amathes pistacina, Orthosia pistacina (S).

Amathe pistache, Orthosie pistache (F).

Amathes pistacina (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشها جواله تميش على رحيق الازهار . سرقها خاضعة تميش على اوراق الورديات والنباتات المرعوية باستثناء النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ مم . رأسها كبير الجرم . عيناها كبيرتان فاشرتان . زباناها خيطيان . جوشنها حنطى اللون اشقق الموج . بطنها الى الطحلة . روشنها الاماميان الى الخططي الاشقق يعلوه تمشيع اسمر وتنقيط وتبضع اخضر وبنفسجي . روشنها الخلفيان الى الطحلة يعلوها موج اصهب وطوق حثاري اسمر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في آب وتبقى حتى تشرين الاول . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بستة اسابيع . تمتح المكن لطعاً تفلحها مادة غروية تشبها على نصال الالوارق ||

٢٢٩٠ - أمّرج

امرج الدابة : تركها تذهب وترعى حيث تشاء . ويقال مرجت الناقة وهي مرج اذا القت ماء الفحل بعد ان يكون غرساً ودماً .

٢٢٩١ - أمّرد Glabre (F). Glabrous, Smooth (E).

خال من كل خل وزغب .

٢٢٩٢ - أمّرد ، سَرَح Inerme, Mutique (F).

خال من الزغب واللب . Thornless (E).

٢٢٩٣ - أمّرع Fertiliser (F).

راجع اخصب . To fertilize, To manure (E).

٢٢٩٤ - إمروس ، كُرُونِيْلَا Coronilla (S).

Coronille (F). Coronilla (E).

جنس نباتات عشبية نجمية حولية من فصيلة القرنيات . انواعه نحو ٢٠ معظمها بري ترعاه الماشية وبعضها زراعي تزييني . منبتها حوض البحر المتوسط وبعض المناطق الاروبية . اشهرها ما يلي .

٢٢٩٥ - إمروس أرقش * ، كُرُونِيْلَا مرقشة

Coronilla varia (S). Coronille bigarrée (F). Crown-vetch (E). Bunte kronwicke (D). Coronilla variata (I).

نوع من الامروس البري الزراعي والتزييني ، ازهاره موشحة ومرتقة بمختلف الالوان || يتكاثر بالبذر ويعيش في جميع الاثربة .

٢٢٩٦ - إمروس أغبر * ، كُرُونِيْلَا غبراء

Coronilla glauca (S). Coronille glauque (F). Seven-headed crown-vetch (E). Weisse kronwicke (D). Coronilla glauca, C. bianca (I).

نوع من الامروس الزراعي التزييني . اوراقه بحرية اللون ازهاره الى البياض الاغبر || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاثربة .

٢٢٩٧ - إمروس الزهّارين * ، كُرُونِيْلَا الزهّارين

Coronilla emerus (S). Coronille des jardins, Emère, Séné bâtard (F). Scorpion senna (E). Skorpions senna, Strauchkronwicke (D). Corienella, Emero (I).

نوع من الامروس الزراعي التزييني وهو عشبة نجمية صديرة القد كثيرة الازهار الجميلة || يتكاثر بالبذر ويجود في جميع الاثربة لكنه يخشى الرطوبة .

٢٢٩٨ - أمريد ، لامي Amyris (S). Amyride (F).

جنس شجيرات راتنجية حرجية وتزيينية من الامريديات وفصيلة السذابيات . مهدها البلاد الحساسة الامريكية اشهر انواعه ما يلي .

٢٢٩٩ - أمريد المكسيك ، لامي المكسيك

Amyris elemifera (S). Amyride élémifère (F). Amyris, Mexican elemi tree (E). Elemibalsam (D). Elemi falso (I).

نوع من الامريد يكثر في بعض الاحراج المكسيكية . يستخرج منه مادة راتنجية ذكية العرف صناعية .

٢٣٠٠ - أمريد بلّسمي * ، لامي البَلّسم

Amyris plumieri (S). Amyride gommière, Arbreaumastic (F). Gum-elemi tree (E). Gemeiner balsambaum (D). Albero del balsamo (I).

نوع من الامريد العزيز الصنع الراتنجي الذي يعتبر من اجود

٢٣١٣ - إمّع
Epiphyte
كل نبات يرتكز ويعيش على غيره من النبات دون أن ينشأ فيه أو يتطفل عليه .

٢٣١٤ - أمّعر
Rupestre, Rupicole (F).
Rupestral, Rupicolous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش وينمو على الصخور .

٢٣١٥ - أمّعر ، حَجِر ، حَصِيّ
Pierreux (F).
Stony, Flinty, Gravelly, Calculous (E).
كثير الحجارة . يقال أرض معزاة أو محجرة أو حصية .

٢٣١٦ - إمّغاد ، إمّلاج
Allaitement (F).
Nursing, Suckling (E).
ارضاع النجاس من الحيل والبقر ونحوها . وملج وأمتلج : رضع .

٢٣١٧ - إمّغال
Prolifération, Proligération (F).
Proliferation (E).
هو كثرة النتاج وتعداده في الحيوان وكثرة الانتاج في النبات .

٢٣١٨ - أمّغر
Alezan cuivré (F).
Coppery chestnut (E).
من اثواب الخيل وهو الذي تملو شقرته مغرة .

٢٣١٩ - أمّقلود ، حشيشة السرة
Omphalodes (F).
جنس نباتات عشبية برية وتربينية من فصيلة الحمحنيات . أنواعه عديدة منها الحولية والحولة والمعمرة جميعها صغيرة القد . اوراقها معنقة متعاقبة سنانية النصل . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها صغيرة عديدة الالوان || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢٣٢٠ - أمّقلود ربيعي * ، حشيشة السرة الربيعية
Omphalodes verna (S). Omphalodes printanier, Cynoglosse printanière, Petite bourrache (F). Navelwort (E). Gedenkemein (D). Erba a ombellico (I).
عشبة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . سوقها شبه مرطاه . اوراقها قلبية الشكل مستطيلة الزام الاخير المدبب . نصلها جميل الخضار الزاهي . عنقودها الزهري متوسط القد . ازهارها سماوية اللون . ازهارها يستمر من نيسان الى آخر ايار || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية الا انها مبهمة .

٢٣٢١ - أمّقلود ساطع *
Omphalodes nitida (S).
Omphalodes luisant (F).
عشبة معمرة تملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . سوقها منتصبه فرعاء . اوراقها مستطيلة بحيلة الخضار الزاهي . نصلها أملس الصفحة العليا ، ازغب السفلى . عنقودها الزهري كبير القد . ازهارها الى الزرقة اللامعة . ازهارها يستمر شهراً واحداً .

٢٣٢٢ - أمّقلود كبدوس
Omphalodes Cappadocica (S). Omphalodes de Cappadoce, Cappadoce (F).
عشبة معمرة تملو نحو ٣٠ سم . جذورها مدادة . سوقها زباء . اوراقها قلبية الشكل بحيلة الخضار . ازهارها الى الزرقة السانجوية || ازهارها بربيعي .

٢٣٢٣ - أمّقلود كئاني الورق
Omphalodes linifolia (S). Omphalodes à feuilles de lin, Argentine, Corbeille d'argent, Cynoglosse à feuilles de lin (F).
السرفه عند بلوغها الادراك الثام تطول نحو ٢٧ سم . جسمها اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، زيتي المواج ، يملو من الرأس الى الشرج تنقيط اسود واصفر واخضر يطوق كامل السكم . رأسها اسود مدبها الى الغبرة السمره . رواجها الى السمرة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي في التربة حيث تنغم السرفه على عمق ٣ او ٤ سم .

٢٣٠٥ - أمسوخ * ، كئبات الحقل ، ذئب الخيل ، شباله
Equisetum arvense (S). Equisette, Prêle des champs, Queue de cheval (F). False horse-tail, Horse-pipe, Bottle brush (E). Ackerschachtelhalm (D). Raspetrella, Equiseto del boschi, Coda equina (I).
نبات عشبي جذموري معمر من فصيلة الامسوخيات يوجد في جميع الاصقاع ويكثر في المواقع الرطبة الظليلة يقال انه يمنع الربو والسعال ويقطع النزف ويحمر الالوان . يصفيها ويفتت الحصى .

٢٣٠٦ - أمسوخ شتوي * ، كئبات الشتاء ، حشيشة الطوخ ، ذئب الفرس
Equisetum hyemale (S). Prêle d'hiver, P. des tourneurs (F). Shave-grass, Dutch-rush, Rough horse-tail (E). Winterschachtelhalm (D). Equiseto invernale, Asprella, Palparello (I).
نوع آخر من الامسوخ يظهر في اواخر الشتاء ويبقى حتى اواخر الربيع . يكثر في المواقع الرطبة وعلى جوانب الاقنية وضفاف الأنهر .

٢٣٠٧ - أمسوخيات ، كئباتيات
Equisetaceae (S). Equisétacées (F). Equisetaceae (E).
فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائيات . أشهر اجناسها وأنواعها الامسوخ اي الكئبات .

٢٣٠٨ - أمّسول
Amsol
عاشوب زراعي يحوي (٢,٤٠ د . امين 2,4 D. Amine) وهو سائل شديد الفاعلية يستعمل رشاً بواسطة المنضخات للفضاء على الاعشاب الضارة في مختلف الزروع واخصها الحنطة .

٢٣٠٩ - أمّسونية
Amsonia (S). Amsonia (F).
جنية تربينية سبروتية معمرة من فصيلة الدفليات . ساقها فناء تملو نحو ٨٠ سم . عصارها لبنية . اوراقها لاطقة ، متعاقبة ، كاملة . نصلها سناني الشكل يطول نحو ١٢ سم . ويعرض ٣ ، صفحته السفلى خلية البشرة . ازهارها قمية الشكل ، زرقاء اللون ، سبلية التجميع هامية الارتكاز . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٣١٠ - أمطار
Précipitations (F). Rain (E).
هي مجموع ما اغدقت به السحب ، في وقت معين ، من مطر وبرد وثلج .

٢٣١١ - أمطي
Iclquier (F).
اطلب لبابة .

٢٣١٢ - أمّظ
أمّظ العود : ذهب نضارته وندوته وقد يكون ذلك عند دخوله في دور الاستراحة الحولية الذي يدوم من الشهر الى الثلاثة اشهر .



أمسوخ



أمسوخ شتوي



أمقلود ربيعي



أمقلود ساطع

وبعض جزر المحيط الهادي . انواعه قليلة العدد . يعملو نحو ٢٠٠ سم . ثوبه الى السمرة الباهتة . رأسه رثيج ظهره وعنقه الى السمرة العابقة . عيناه عسليتان . منقاره حنطي . رشفه صغيبي ، رجليه ثلاثية الاصابع . اطافره حادة قوية . يألف المروج والمراعي . قوته الاعشاب والحبوب انشاء تبيض من ٢٠ الى ٣٠ بيضة ، غسلها اخضر اللون وزن الواحدة منها من ٧٠٠ الى ٨٠٠ غرام . قيمتها الغذائية توازي نحو ١٨ بيضة دجاج .

Blens (F).

Property, Asset, Wealth, Goods (E).

هي الاشياء المادية او الاعيان التي يصح امتلاكها .

Biens accessoires (F).

٢٣٣٩ - **أَمْوَالُ تَابِعَةٍ** هي التي لا تكون مستقلة كالبذر على الشجر .

Biens domaniaux,

Domaine public (F).

٢٣٤٠ - **أَمْوَالُ الدَّوْلَةِ** هي الاملاك والاموال التي تمتلكها الدولة وتعتبرها ضرورية للمنفعة العامة . تخضع لنظام قضائي خاص وهي غير مقدورة التملك والحجز .

Biens Immeubles (F).

٢٣٤١ - **أَمْوَالُ ثَابِتَةٍ** هي كل مال ، من عقار وعين ثابتة وغير ذلك ، لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته او بتخصيصه .٢٣٤٢ - **أَمْوَالُ سَائِبَةٍ ، أَمْوَالُ مُرْسَلَةٍ**

Biens sans maître, Biens vacants (F).

هي التي يصح امتلاكها بطبيعتها الخاصة سواء اكانت مسبوقة الملكية كالاشياء المتروكة ام لا كالصيد البري والبحري .

Biens indivis (F).

٢٣٤٣ - **أَمْوَالُ شَالَعَةٍ** هي الاموال المملوكة لعدد من الناس بلا تعيين ولا تمييز لنصيب كل منهم .

Biens libres (F).

٢٣٤٤ - **أَمْوَالُ مُبَاحَةٍ** هي التي لا مالك لها بينما هي بطبيعتها مقدورة التملك كالحوانات الابدنة والمنقولات المتروكة .

Biens de main-morte (F).

٢٣٤٥ - **أَمْوَالُ مَرَصُودَةٍ** هي اموال تمتلكها بعض الشخصيات ولا تنتقل بالارث وذلك لتخليد شخصية اصحابها .٢٣٤٦ - **أَمْوَالُ مَقْدُورَةِ الاسْتِهْلَاكِ**

Biens consommables (F).

هي التي لا يمكن استعمالها الا باستهلاكها كالاشرية والاطعمة ، او بتمليكها للغير كالنقود .

٢٣٤٧ - **أَمْوَالُ مَقْدُورَةِ الانْقِسَامِ**

Biens divisibles (F).

هي التي تقبل التجزئة كالاراضي وغيرها .

Biens meubles (F).

٢٣٤٨ - **أَمْوَالُ مَنْقُولَةٍ** هي كل عين جاز نقلها . وقد تكون منقولة بطبيعتها كالحيطان والاثاث او منقولة بتعيين القانون كالتاجر والديون واسهم الشركات .

Biens nuls (F).

٢٣٤٩ - **أَمْوَالُ مُهْمَلَّة** وتدعى المهملات .

عشبة حولية تعلق من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها مستطيلة . نصلها بحري اللون مهدب الحافة . عنقودها الزهري رهل . ازهارها بيض او ليلكية . ازهارها يستمر من اذار الى حزيران .

Omphalodes Lucillae (S).

Omphalodes de Lucile (E).

عشبة محولة تعلق من ٥ الى ١٥ سم . سوقها مذادة فرعاء . اوراقها اهليلجية مدببة ، نصلها بحري اللون الداكن . ازهارها تبدو زرق ثم تنحرف نحو الليلكي || ازهارها صيني .

Seis (F). Salt (E).

٢٣٢٥ - **أَمْلاح** اسم شامل يطلق على عدة مركبات تشبه الملح . والاملاح ككأويأ : مركبات ناتجة عن ابدال معدل ما بالهيدروجين في محيط حامضي .

Domaine (F). Domain (E).

٢٣٢٦ - **أَمْلاك** اراض زراعية فسيحة يملكها شخص معين .

Biens domaniaux (F).

٢٣٢٧ - **أَمْلاك الدولة** Domanial estate (E).

Emblique officinale (F).

٢٣٢٨ - **أَمْلُج** هو فيلنتور السنابر ، اطلبه .
٢٣٢٩ - **أَمْلُج** راجع أعل .

Glabrifolié (F).

٢٣٣٠ - **أَمْلُط** أملط م . ملطاء . نعت تعريف يطلق على كل نبات نصال اوراقه عادمة الزغب .

Glabrifoliate (E).

٢٣٣١ - **أَمْلُوج** هو الرئد الذي يفرخ وينمو تحت التراب طبيعياً كان او صناعياً . ج اماليج .

Pousse souterraine (F).

٢٣٣٢ - **أَمْلُول** قال ابن سيده : هي دابة تكون في الرمل تشبه العظاءة .

Subterranean sprout (E).

٢٣٣٣ - **أَمْلِيلِس ، أَمْلِيلِس** هو زفرين الجرد ، اطلبه .

Alaterne (F).

٢٣٣٤ - **أَمْنَح** أمنت الناقة والبقرة والشاة اذا دنا نتاجها . وهي منوح .

Amansia (S).

٢٣٣٥ - **أَمْنَصِيَّة * ٥** Amansia (F). Amansia (E).

نبات بحري من مستورات الزهر ينتمي الى رتبة المشريات ومرتبة الخثيات الحمر . يتميز بمرجمته الجامدة كأنها غضروفية وبضلعوه البارزة وبكثافة عروقها الدقيقة المتعزضة || اعطاه مجادح البحر الاحمر والمحيط الهندي . ينمو على الصخور المغمورة ويتشبه بها بمقاطع مستديرة الاطراف .

Blanc mat (F).


٢٣٣٦ - **أَمْهَق ، أَرْشَق** هو الابيض الداكن .

White mat (E).

Dromaeus (S). Dromé, Emou,

٢٣٣٧ - **أَمْو * ٥** Emeu, Casoar d'Australie (F). Emu (E). جنس طير من الموادي وفصيلة النعاميات . موطنه أستراليا

أَمْنَصِيَّة



أَمْو

٢٣٥٠ - أُمُودَرُومٌ بَحْرِيٌّ *

Ammodromus maritimus (S).

Ammodrome maritime (F).

طائر من فصيلة الشرشوريات. موطنه بعض مناطق المكسيك. يألف الشواطئ البحرية وضفاف مجاري الماء. يتسلق قصب الأبناء بحفة الهواجز || جسمه صغير القد يطول من ١٧ إلى ١٨ سم. رأسه وظهره وذنبه إلى السمرة الزرقية الموج. عنقه وبطنه إلى البياض العاجي. صدره إلى الزبداء. جناحاه إلى الصفار الكبريتي تفرصهما جدة سمراء. ويعملوه في رأسه من الجهة إلى القفن جدة ربداء. حاجباه إلى الصفار الزاهي. حدقه عينه بنية اللون. متقاده اسمر. زفده اريد. رسفاه إلى السمرة القاتمة || قوته الحشرات والقشريات والرخويات || يدثن عشه في افحوص يحتفزه في التربة بين الاعشاب الكثيفة. الاثنى تضع من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً.




أُمُودَرُومٌ بَحْرِيٌّ .

٢٣٥١ - أُمُومَةُ

Matriarcat (F).

Matriarchata, Matriarchy (E).

الأمومة أو نظام الأمومة ، ملجن اجتماعي ، يسود عند بعض الشعوب ، يخول المرأة السلطة المنزلية واعطاء اسمها لاولادها .



أُمُومَةُ

٢٣٥٢ - أُمُومِيْن

اطلب هال حماما .

٢٣٥٣ - أُمُومِيَاك ، نَشَادَر ، نُوَشَادَر Ammoniac غاز تركيبه الكيماوي ذرية من الأزوت وثلاث ذريات من الهيدروجن || يحصل طبيعياً في المراحيض والاصطبلات ويستخرج من ملح الأمونياك .

٢٣٥٤ - أُمُومِيَات *

Amiidae (S).

Amiids (F). Amiidae (E).

فصيلة اسماك من اللامعات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الحقبة الطباشيرية واولئل الاباج الثاني . اما المعاصرة منها فاعطانها انهر وبحيرات امريكة الشمالية || اعرف اجناسها واشهرها الآمِيَّة .



أُمُومِيَّة

٢٣٥٥ - أُمُومِيَّة *

Amibe (F).

Ameba, Amoeba (E).

حيوان مجهرى من الاوالي الجذريات وهو ادنى وابسط حيوان مخلوق . جسمه كتلة من الجبلة ، مجهرية ، شبه مائعة كاهلام || يتكون من خلية واحدة وخليته مركبة من طبقتين من البلازما في وسطها نواة وفجوة لحفظ الغذاء اللازم لها . والأميب يتنفس ويتغذى ويتكاثر كغيره من الكائنات الحية ويكون تكاثره بالانقسام الى خليتين بعد استطالة النواة وانقسامها ثم اختناق جسم الخلية من الوسط حتى يتم الانفصال .

٢٣٥٦ - أُمُومِيَّة *

Amia (S).

Amie (F). Amia (E).

جنس اسماك نهريّة من اللامعات وفصيلة الآمِيَات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم انهر وبحيرات امريكة الشمالية || اجسامها كبيرة شبه وشعية الشكل تطول من ٤٥ الى ٦٥ سم. زعانفها الظهرية فردية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة الطرف . اسنانها صغيرة حادة عديدة الصفوف . سفها كبير القد ، مقوس الشكل || لحوها مأكولة وتستعمل استعمال الطون .



أَنَاسِيْكُلُوسٌ

٢٣٥٧ - أُمُومِيَات

Amides

مواد ازوتية عضوية متوسطة بين الاملاح الامونياكية والمواد الآحية . وهي من حيث القيمة الغذائية قريبة من الهيدروكربون .

٢٣٥٨ - أُمُومِيَّة

Carisse (F).

هو العرم نبات طبي بري من الدفليات .

٢٣٥٩ - أُمُومِيَّة ، جِيْبَانِي

Fiscal

٢٣٦٠ - أُمُومِيَّة

Amylase (F).

اطلب شعيراز .

٢٣٦١ - أُمُومِيَات

Amines

تراكيب ازوتية عضوية لها خواص القواعد توجد في الطبيعة اما طليقة او متحدة مع غيرها من العناصر بشكل املاح والامينات قد تكون احادية او ثنائية او ثلاثية وذلك بالنسبة الى ذرات الامونياك التي تدخل في تركيبها .

٢٣٦٢ - أُمُومِيَّة

Aminé (F). Amino (E).

هو ما كانت صفاته وخواصه صفات وخواص الامينات .

٢٣٦٣ - أُمُومِيَّات

Amminées (F).

سبط من الفصيلة الصيوانية عديد الاجناس والانواع معظمها بري .

٢٣٦٤ - أُمُومِيَّة

Clavelée (F). Sheep-pox (E).

هي النسخ اي جذري الغنم ، اطلبه .

٢٣٦٥ - أُمُومِيَّة ، سَعْرَان ، نَشْمَةُ

Anabasis articulata (S). Anabase (F). Berry bearing glasswort (E). Kalikraut, Beerige salzpflanze (D). Anabaside (I).

جنس جنبات والنجم برية معمرة من فصيلة السرمقيات . مهدها البلاد المعتدلة . انواعه قليلة منها طيبة تستعمل في بعض العلاجات المحلية ومنها صناعية كاناباز العجم الذي يستعمل في تنظيف الغسيل وتبييضه .

٢٣٦٦ - أُمُومِيَّة شَعْرِيَّة

Vaisseaux capillaires (F).

Capillary-tubes (E).

هي الانابيب الدقيقة المستمرة النمو القائمة على جذور النبات والتي ترشف المياه وما حوته من عناصر واملاح .

٢٣٦٧ - أُمُومِيَّة مَلِيْنِيَّة

Tubes de Malpighi (F).

Malpighian tubes (E).

هي شبكة القنوات الدقيقة التي ترد المبهولة وتصدر عنها .

٢٣٦٨ - أُمُومِيَّة ، أُنْجَبَار

Polygonum bistorta (S). Bistorte, Serpentaire (F). Bistort, Adder-wort, Snake-weed (E). Matterknöterich (D). Bistorta, Poligono ritorta (I).

نبات عشبي جذموري بري طبي من فصيلة البطباطيات . اوراقه قرصية التجميع معنقة طويلة المعاليق ، سنانية النصل . ازهاره سنبل التجميع يرتكز على زناد منتصب طويل تحضنه بعض الوريقات . ازهاره صغيرة مرصوفة الصفوف المتتابة || يعد من القوابض ويستعمل في التطبيب .

٢٣٦٩ - أُنَاسِيْكُلُوسٌ ، قُنَيْطَسَةُ

Anacyclus (S). Anacycle (F). Long-wort (E). Ringkorbchen (D). Anacielo (I).

٢٣٨٢ - أنبار ، شونة ، قداء ، هري

Grenier (F). Loft (E).

هو المكان المعد لحفظ الغلة وغزنها . الجمع أنبار وشوان وأفدية وأهراء .



أناسكلوس



أناسكة



أنباس منسلق



أنبة

٢٣٨٣ - أنباس

Anabas (S).

Anabas (F). Anabas (E).

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف وفئة البلعوميات التيهية . انواعه المعروفة قليلة موطنها نهر الهند والهند الصينية والصين . جميعها تخرج من الماء وتسرح من ساعتين الى ست ساعات دون او تتأذى || اعرف انواعه واشهرها الانباس المتسلق .

٢٣٨٤ - أنباس متسلق

Anabas scandens (S). * Anabas grimpeur, Anabas sennal (F).

نوع من الانباس يكثر وجوده في نهر الهندوس . جسمه شبه اهليلجي الشكل ، معتدل التخطيط ، يطول نحو ١٧ سم . رأسه صغير القد ، قصير الخطم ، معتدل الشدق . عيناه صغيرتان ، ناشرقان . زعنفته الظهرية مستطيلة ، كثيرة المناخس الخادة . زعنفته الشرجية كثيرة المناخس ايضاً مما يؤهلها على تسلق النبات والانتقال من مكان الى مكان . ثوبه الى الخضار البحري القضي الموج || لحمه جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٣٨٥ - أنبة ، بادنجالة

Aubergine (F).

Mad-apple (E).

الأنتب والأنتب : الباذنجان ، واحده ابة عن ابي حنيفة .

٢٣٨٦ - أنسج ، منغا ، منجاء ، منغو ، منجو

عنباً

Mangifera indica (S).

Manguier, Mango (F). Mango, Mango tree (E).

Mangobaum (D). Mango, Mangifera comune (I).

جنس اشجار مثمرة من سبط الراتنجيات وفصيلة البطليات . انواعه قليلة يقال انها ثلاثة او اربعة . اما ضرويه فعديدة لا تقل عن ٤٠٠ ، وهي على ازدياد مستمر . اشهرها الضروب الهندية المؤصلة والامريكية المستنخة والافريقية المهجنة . الشجرة كبيرة دائمة طناية الامدد يراوح ارتفاعها من ١٠ الى ٢٥ م . الساق منتصبة متوسطة الغلط . القشور ملساء الجراة في دوري النشوء والنمو السريعين ؛ ثم صلف اللحاء من دور البلوغ حتى القحامة || الفروع والاغصان كبيرة ، الافناد والافناد متشابكة . الاوراق كثيفة متقابلة معنقة سنانية النصل الاخضر القاتم || الازهار عنقودي التجميع ، محوري وطرفي الارتكاز . الازهار صغيرة القد حمر . الثمار نووية ، كلوية الشكل ، كبيرة الحجم يراوح وزن الواحدة منها من ٩٠ الى ١٠٠٠ غرام . قشورها جلدية سميكة لونها الى الخضار الاحمر والخضار الاصفر . لها لبني التركيب لاصق بالعجوة ، اصفر اللون ، غزير المادة والعصارة . وهو لذيق الطعم . يؤكل ويربب ويمصر شرباً الى آخره ، يحوى بعض الفيتامينات واخصها فيتامين « آ » وفيتامين « ث » || يستخرج من جذوع الانسج صمغ يستعمل في معالجة الامراض التناسلية واخصها السفلس . لباب عجمته طارد للديدان المعوية . ويستخلص من بولي الحيوان الذي يعتلف اوراقه صباغ اصفر يعد من اثبت الصباغات وازهارها لوناً || يتكاثر بالبذر والتدريج غير ان البزور لا تصدق دائماً في نقل الصفات والميزات الخاصة لذلك يجب الاعتماد على التطعيم || وهو من الاشجار العمرة

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه قليلة بعضها حولي والآخر معمر . ومنها الزباء والمرطاء . موطنها اوروبية الجنوبية وبعض مناطق حوض البحر المتوسط .

٢٣٧٠ - أناس

حل التخل المدرك . أناس التخل : أينع .

٢٣٧١ - أناغورس

اطلب ينبت .

٢٣٧٢ - أناغورس طبي

اطلب ينبت ثن .

٢٣٧٣ - أنافج

Withania (S).

Withanie (F). Withania (E).

جنس نباتات جنبية ، طبية ، معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية || جميعها جنبات متباينة الحجم . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، أبدية ، نصائح سنانية الشكل ، جامدة اللون ، جميلة الخضار الالفس . ازهارها محورية غثنوية صفراء اللون . ثمارها نووية . بذورها صلبة مستديرة سمراء اللون || اشهر انواعها الثلاثة التالية .

٢٣٧٤ - أنافج كندن

Withania frutescens (S).

Withanie frutescente (F).

نوع من الانافج . منها بعض مناطق افريقية الشمالية . تكثر في جنوب المغرب || جنبها داسة فرعاء . مسحوق بذورها يستعمل استعمال المسوة في تجبين الحليب . نقيع اوراقها يدر البول .

٢٣٧٥ - أنافج مسوي

Withania coagulans (S).

Withanie coagulante (F).

نوع من الانافج . منها يمتد من الافغان الى الهند الشرقية || جنبها كبيرة فرعاء تعلو نحو اربعة امتار . اوراقها مدرة للبول . مسحوق بذورها يستعمل استعمال المسوة .

٢٣٧٦ - أنافج مسوم

Withania somnifera (S).

Withanie somnifère (F).

نوع من الانافج . مهدا الهند والشرق الاوسط وامريكية الجنوبية || جنبها معتدلة الارتفاع ، كثيرة الفروع والاوراق . اوراقها وبزورها تخدر الاعصاب وتنوم . نقيع اوراقها يدر البول . مسحوق بذورها يحجن الحليب كالمسوة .

٢٣٧٧ - أنا كندة* (الكونة)

Eunectes murinus (S).

Anaconda, Eunecta murin (F). Anaconda (E).

اصلة عظيمة مبتلعة غير سامة رقشاء الثوب ، طولها نحو العشرة امتار . مهدا امريكة . تقتنص طريدها في البر والبحر وقد تقتحم البيوت المنفردة حيث لا تنف عن شيء حتى الاولاد .

٢٣٧٨ - أناس

اطلب أناس .

٢٣٧٩ - أنب

هو الباذنجان ، اطلبه .

Germination

٢٣٨٠ - إنبات

اطلب انتاش .

Centrifugation (F).

Centrifugalization (E).

٢٣٨١ - إنباد ، نبذ

تفريق الاجسام بواسطة القوة النابذة .

٢٣٩٨ - أنبجور مَعْصَب *o

Alphitophagus bifasciatus (S).

Alphitophage double bande (F).

Alphitophagus bifasciatus (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمذات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم القديم والجديد . يرقاتها مؤذية تعيش تحت لحاء الاشجار وفي مخازن الخنطة والاهراء على الحبوب المكسورة || جسمها صغير القدر بطول من ٢ الى ٣ مم . رأسها مربع الشكل ، اسمر اللون . عيناها صغيرتان . زباناها خيطيان ، اشعثان . ظهرانها الى السمرة الخنطية العابقة تعلوها جدة وسطى مستعرضة سوداء ، وجدة ثانية قليلة العرض ، قريبة من الطرف ، اقل اسوداداً من الاولى || لها جيلان في الحول . تسرح في الليل وتبيت في النهار || تظهر خنفساء الجيل الاول في اوائل نيسان ويدوم هذا الجيل نحو ١٦ اسبوعاً || وتظهر خنفساء الجيل الثاني في اوائل شهر آب ويدوم هذا الجيل نحو ثمانية اشهر || طور الاكمال ، في الجيل الاول ، يستمر نحو ١٢ يوماً ، ويستمر في الجيل الثاني نحو عشرة اسابيع .

٢٣٩٩ - أنبوش ، أنبوشة Arrachis (F).

Plant rooted up, Rooting-up of young trees (E).

هي الاغراس او الاشجار المقلوعة من التربة .

٢٤٠٠ - أنبجق راجع إنبجق .

٢٤٠١ - إنتاج ، إغلال Productivité du sol (F).

Productiveness of soil (E).

صفة التربة ومقدورها الانتاجي من مختلف المحاصيل .

٢٤٠٢ - إنباش ، إنبات Germination

الانبات هو ظهور نثيط البزرة بعد تطور حياتها من الحالة الكامنة الى حالة النشوء . ولا يتم الانبات الا بظروف خاصة ملخصها : ان تكون البزرة حية وان تتوفر لها حاجتها من الماء والاكسيجن في وسط يلزم بالحرارة الضرورية || راجع قابلية الانبات وقوة الانبات .

٢٤٠٣ - إنباشي ، إنباشي ، إنباشي ، إنباشي Germinatif (F). Germinal (E).

كل ما له علاقة بالانبات ومقدوره الحيوي الكامن .

٢٤٠٤ - إنبجج Forjet (F). Jatting out (E).

ننوء يخرج عن التوازن العمودي .

٢٤٠٥ - إنبجج Transhumance (F).

The custom of moving the flocks (E).

ذهاب الماشية لطلب الكلأ وارتباده في مواضعه .

٢٤٠٦ - إنبجج Dirigisme (F).

Dirigism (E).

مذهب سياسي يدين بالاقتصاد الموجه تدير شؤونه السلطة الحاكمة .

٢٤٠٧ - إنبجج Sélection (F). Selection (E).

الانتخاب هو تجري وانتقاء اجود السلالات . وعندما يقصد به احدى طرائق الاسفاد يكون قوامه اسفاد ذكر وانثى من نوع واحد وسلالة واحدة كإزاء جواد عربي صقلاوي على حبر عربية صقلاوية .

التي تعيش اكثر من ١٢٠ سنة والتي يمكن تقسيم ادوارها الحياتية على الشكل التالي :

دور النشوء البطي الذي يدوم نحو ١٠ سنوات .
دور النمو السريع الذي يدوم نحو ٢٠ سنة .
دور البلوغ والاستقرار الذي يدوم نحو ٥٠ سنة .
دور الانحطاط الذي يدوم نحو ٣٠ سنة .
دور القحامة الذي يدوم نحو ١٠ سنوات .

افضل تربة تصلح لزراعته التربة الخوارة او الرسوبية الخفيفة المتوسطة الاندماج وقد يعيش في التربة الرملية ولا يخشى سوى التربة المندمجة الشديدة التماسك || زراعته في لبنان تعود الى اربعة عقود ولا تزال محصورة في بعض المواقع الساحلية ، قرب الشواطئ . لانه من الاشجار التي تخشى الصقيع والرياح الباردة .

٢٣٨٧ - أنبج Brun terne (F).

هو اللون الاسمر الاكدر . تراب انبج (اللسان) .

٢٣٨٨ - أنبج Centrifuger (F). To centrifugalise (E).

فرق ، بعضها عن بعض ، الاجسام المختلفة الكثافة والوزن النسبي بالقوة المسماة القوة النابذة .

٢٣٨٩ - أنبجباريس اطلب برباريس .

٢٣٩٠ - أنبجس مالبينا Tamier commun (F).

هو الفاشرشين المبدول ، اطلبه . اما اسم انبلس مالبينا فن وضع ابن البيطار .

٢٣٩١ - أنبجوب ، وعاء Vaisseau (F). Tube, Duct (E).

قناة دقيقة توجد في نسيج جميع النباتات الوعائية ، وظيفتها نقل النسج والطل والمصاراة ...

٢٣٩٢ - أنبجوب التنفس Trachée (F). Trachea (E).

عضو من اعضاء جسم الحشرات .

٢٣٩٣ - أنبجوب شعري Tube capillaire (F).

ج . انابيب شعرية ، اطلبها . Capillary tube (E).

٢٣٩٤ - أنبجوب Tubulaire, Tubuleux (F).

ما كان شكله كالانبوب . Tubuliform, Tubulate (E).

٢٣٩٥ - أنبجوبات الاحاديد Solénoglyphes (F).

Solenoglyphes (E).

رتبة من الحيوانات الزاحفة تضم اليها اخبث الحيات التي تنتمي الى فصائل الافاعي الخنثية والجلجليات وغيرها .

٢٣٩٦ - أنبجوبة الزهر Tubuliflores (F).


سبط من فصيلة المركبات التي تعد ثلاثة اسباط . اجناسه وافواحه كثيرة العمد تتميز بازهارها الانبوية الشكل اشهر انواعه القنطريون والابسنت والحشرف .

٢٣٩٧ - أنبجور *o Alphitophagus

جنس خنافس من فصيلة الغبشيات جميعها صغيرة القدر بطول من ٢ الى ٥ مم . ثوبها حنطي يملوه بقع او خطوط عرضية شديدة السمرة || يرقاتها صغيرة مؤذية تعيش تحت لحاء الاشجار وفي مخازن الخنطة وعسل الحبوب المكسورة تكافح باستعمال بعض الحواشير المعدة للحبوب المخزونة المأكولة .



أنبور



أنبور مَعْصَب

٢٤٢٣ - **إِنْتِقَال** Mutation (F). Transfer (E).
انتقال الملكية أو التصرف بالوراثة أو بالبيع أو بالمبادلة أو بالهبة .

٢٤٢٤ - **إِنْتِقَال** Locomotion

٢٤٢٥ - **إِنْتِقَال** Translation (F).
Translation (E).
ومنها السرعة الانتقالية والدورة الانتقالية .

٢٤٢٦ - **إِنْتِقَالِيَّة** Locomotilité (F). Locomotility (E).

٢٤٢٧ - **إِنْتِقَائِيَّة** Selectionnisme (F).
Selectionnism (E).
نظرية عليّة تستصوب وجود الانتقاء الطوعي أي الطبيعي في البيولوجية .

٢٤٢٨ - **أَنْثَلَة** اطلب أكونيت .

٢٤٢٩ - **أَنْثَلَة سَوْدَاء * ، جَدَوَارْ أُنْدُكْسِي ، طَوَارَه**
Aconitum anthora (S). Aconit anthora, Anthore, Maclou (F). Yellow helmet flower, Wholesome aconite (E). Fahler sturmhut, Anthorenwurz (D). Aconito salutifero (I).
نوع من البيش ، الأكونيت ، ينتمي إلى فصيلة الجوزانيات وهو نبات عشبي معمر ، يزرع للزينة . || يتكاثر بالبذور والفسائل . يرغب في الأتربة الخوارة القليلة الاندماج || يبذر في أوائل الربيع ويشتل في أواخر حزيران فيزهر بعد عام وازهاره يدوم طوال الصيف .

٢٤٣٠ - **أَنْتُمْسُورِيوم** Entomosporium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات يعرف بالغضاء ، اطلب غضاء .

٢٤٣١ - **أَنْتُمْوْلُوجِيَة** Entomologie (F).
Entomology (E).
هي علم الحشرات يبحث في تركيب وأطوار وطبائع وتصنيف الحشرات وأضرارها ومكائنها .

٢٤٣٢ - **إِنْتِهَاب** اطلب إيذاء .

٢٤٣٣ - **إِنْتِهَازِيَّة** Opportunisme (F).
Opportunism (E).
سلوك الأشخاص الذين يتجهزون كل فرصة ملائمة غير مباليين بالمبادئ .

٢٤٣٤ - **إِنْتِهَازِيَّة** Violabilité (F).
Violability (E).
حال الانتهاك وصفت .

٢٤٣٥ - **أَنْتُورِيْزَة * ، شِنْزِيْزَة** Entorhiza, Schinzia
جنس فطور مجهرية من فصيلة التخريات تتميز بذوائجها النامية في نسج الجلود حيث تبدو كأنها بثور قرعية قطر البثرة نحو السني || بوغها غليظ الغلاف اللاتياسي تكثر فيه الاشكال الريمية المحيطية || انواعه عديدة تتطفل على الاسليات والسعديات .

٢٤٣٦ - **أَنْثُوفِيْت** Entophyte
اطلب طفيلي باطني .

٢٤٠٨ - **أَنْثْرَآئِين** Anthracénine (F).
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في مكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من أي نوع كانت وضد بعض الامراض الفطرية .

٢٤٠٩ - **أَنْثْرَآسِيْت** Anthracite
نوع من الفحم الحجري قصير اللهبه بطيء الاشتعال ، لا رائحة له ولا دخان .

٢٤١٠ - **أَنْثْرِيْل** Anthryl
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٧ ٪ في مكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من أي نوع كانت وضد بعض الامراض الفطرية .

٢٤١١ - **إِنْثْشَار** Diffusion (F).
Diffusion, Diffusiveness (E).
خاصة في بعض الاجسام وهي أن تنتشر في كتلة مائنة وان تحترق أغشية النافذ .

٢٤١٢ - **إِنْثْطَام الْاَوْرَاق** Phyllotaxie (F).
Phyllotaxis (E).
هو نظام ترتيب الاوراق على الفصيص .

٢٤١٣ - **إِنْثْطَام الْعُرُوق** Nervation (F).
Nervation, Nervature (E).
هو ترتيب وشكل عروق النصل في الورقة .

٢٤١٤ - **إِنْثْطَاح** Gonflement (F). Swelling (E).
اطلب ارتفاع .

٢٤١٥ - **إِنْثْطَاح** Hygroma
عارض يصيب اطراف الدابة فيسبب الانتفاخ المصلي او الليحي .

٢٤١٦ - **إِنْثْطَاح الْعُرُقُوب** Capelet (F).
Capped hock (E).
انتفاخ رخو يحصل في رأس العرقوب عند الخيل .

٢٤١٧ - **إِنْثْطَاش** Foisonnement (F). Expansion (E).

٢٤١٨ - **إِنْثْطَاح ، إِسْتِمْتَاع** Jouissance (F).
Enjoyment, Use (E).
هو الانتفاع من دخل المال في مختلف وجوه استخدامه .

٢٤١٩ - **إِنْثْطَاح وَقْئِي** Recréance (F).
Recredence (E).
هو الاستمتاع الوقئ بأرباح ايراد متنازع فيه .

٢٤٢٠ - **إِنْثِقَادِي** Criticiste (F).
Critical philosopher, Kantian (E).
من كان يدين بمذهب الانتقادية .

٢٤٢١ - **إِنْثِقَادِيَّة** Criticisme (F).
Critical philosophy (E).
مذهب فلسفي يشتر به العلامة « كانت » قوامه ان محور الابحاث الفلسفية هو انتقاد مطالبها .

٢٤٢٢ - **إِنْثِقَاص** Réduction (F). Reduction (E).
اطلب تخفيض .



أنثلة سوداء



أنتوريزه

من البراز والمواد النباتية ينفلق عند انطلاق الحشرة. تسرح نحو سبعة أيام ثم تتوارى عن الانظار وتستكن في كل مكان يؤمن لها الحماية حتى مطلع شهر نيسان حيث تعود الى نشاطها فتتابع ادوارها الحياتية المرسومة.

٢٤٤٢ - أنثونوم الزعرور *

Anthonomus rectirostris (S). Anthonomie de l'au-bépine (F).

حشرة من فصيلة السوسيات ، طولها نحو ٤ مم. تعيش على ازهار اللوز والكرز والمشمش والزعرور. تمتح مكثاً على الزهرة العاقدة بعد سقوط التويجات فينقف عن يرقات تدخل النار وتعيش فيها || يكافح باستعمال احد الحواشير عند سقوط التويجات الزهرية.

٢٤٤٣ - أنثونوم الشيلك *

Anthonomus rubi (S). Anthonomie du fraisier (F). Strawberry blossom weevil (E). Himbeerblütens techer (D).

حشرة من السوسيات صغيرة القد ، طولها نحو ٣ مم. لونها الى السواد الدكن يعلوها رقشة الى الصهبة وزغب خفيف اطحل. تعيش على الشيلك والكشمش والعليق والورد والنسرير || تمتح الانثى مكثاً داخل الازهار وفي كل زهرة مكثاً تنقف عن يرقة تسبب الملاحها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد المساحيق الفعالة تمفيراً على الازهار.

٢٤٤٤ - أنثونوم اللوز *

Anthonomus ornatus (S). Anthonomie de l'amandier (F). Almond Weevil (E).

حشرة خاضعة من فصيلة السوسيات ورقبة مغمدات الاجنحة. موطنها الضفة الشرقية من حوض البحر الابيض المتوسط. تألف الملاز من السواحل الى اعالي الوسط. خنافسها تعيش على نصال الاوراق وضلعوها. يرقاتها تعيش داخل البراعم الورقية والزهرية || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٤ مم. ثوبها الى السمرة العابقة. رأسها صغير الجرم ناقى الارتكاز. عيناها صغيرتان. زباناها مرفقيان ، صولجانيا الاطراف. غمداها منتظمتا التحريز || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اذار. تسرح في النهار وتطير من شجرة الى شجرة ، قوتها نصال الاوراق وضلعوها، نحو ٥ يوماً ثم تتوارى عن الانظار وتستكن في كل مكان يؤمن لها الاختباء الى ان ينقضي زمن البيات فتعود الى الظهور في تشرين الثاني. تعاظم بعد ظهورها باسبوع واحد ثم تبشر الانثى رز المكن في البراعم فتثقب البرعمة وتأكل ما تقضمه ثم توجه اشرتها نحو الثقب وترز فيه الملكة || اليرقة عند تمام ادراكها تطول نحو ٦ مم. وهي مرقالة ، مقوسة ، مستغلظة البطن ، عاجية اللون ، سمراء الرأس والشرج ، قوية التأشير ، تعيش على ما تلهمه من محتويات البرعمة ثم تتحول في المكان نفسه الى حورية ومنها الى حشرة جلانة تظهر في اذار.

٢٤٤٥ - أنثونوم قبرص *

Anthonome de Chypre (F).

حشرة من السوسيات تدعى انثونوم الدراق ، اطلبها.

٢٤٤٦ - أنثياريس *

Antiaris (S). *Antiaris* (F).

جنس نباتات شجرية برية من فصيلة الانجريات. انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض المناطق الحارة من الهند

٢٤٣٧ - أنثوكريس الصليبيات

Anthocharis des crucifères (F).

فراشة تدعى غرة بحيلة ، اطلبها.

٢٤٣٨ - أنثوكسانت * ، تجيل عطر

Anthoxanthum odoratum (S). Anthoxanthe, Flouve odorante (F). Spring grass, Sweet vernal grass (E). Echtes ruchtgras, Wilder lavendel (D). Antossano, Paleino odoroso (I).

عشبة برية مرعوية معمرة من فصيلة النجيليات تكثر في المراعي الطبيعية وتوجد في الاراضي البور. ترغب فيها الماشية ولا سيما الاغنام || ازهارها فستقية اللون ، عرفها فواح منمش. يستخرج منها جوهر الانثوكسانتين «Anthoxanthine» وهو خضاب النبات الاصفر نستري الشكل يشبه الراتنج لا يذوب في الماء بل في الايتر والكحول.

٢٤٣٩ - أنثونوم الإجاص *

Anthonomus piri (S). Anthonomie du poirier (F). Apple bud weevil (E). Birnknochenstecher (D).

حشرة من فصيلة السوسيات ورقبة غمديات الاجنحة. طولها نحو ٤ مم. لونها امغر عابث. يرقاتها تعيش داخل البرعمة الزهرية فتقضي عليها || تكافح باستعمال احد الحواشير واخصها الد.د.ت. وذلك في خلال شهر ايلول عندما تجتمع الحشرات للكوم وقبل متح مكثاً.

٢٤٤٠ - أنثونوم التفاح *

Anthonomus pomorum (S). Anthonomie du pommier (F). Apple blossom weevil (E). Apfelblütenstecher (D).

حشرة من فصيلة السوسيات ورقبة غمديات الاجنحة. طولها نحو ٤ مم. لونها الى السمرة يعلوها بقع بيض وزغب اطحل تمتح الانثى مكثاً في البراعم الزهرية عند اكتمالها فينقف عن يرقات صغيرة تدخل النورة وتعيش فيها فتقضي على الزهرة || يكافح باستعمال احد الحواشير عند الاكاح وذلك للقضاء عليه قبل ان يتمكن من متح مكثاً.

٢٤٤١ - أنثونوم الدراق * ، أنثونوم قبرص *

Anthonomus cyprus (S). Anthonomie du pêcher, An. de Chypre (F). Peach weevil (E).

حشرة من فصيلة السوسيات. يبدو ان موطنها الاصلي كان جزيرة قبرص وقد انتقلت الى تركيا واليونان وسورية ولبنان || جسمها صغير القد ، اهليلجي الشكل ، يطول من ٤ الى ٦ مم. ثوبها الى الكستني الاشقق الموج. رأسها مخروطي القاعدة ينتهي بخطم مستقيم مستطيل. زباناها مرفقيا الشكل ، عشاريا الفصل ، حقيقا الاطراف || الانثى اميز قدماً من الذكر اطول خطماً منه واهت ثوباً. لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة ابتداء من شهر نيسان وتبقى حتى اواخر ايار. تسرح في النهار وتبيت في الليل. قوتها الخلايا النباتية والمواد الخاضعة || تسافد بعد ظهورها بمدة قصيرة وتبشر متح المكن في البراعم الخشبية والزهرية منذ اليوم التالي للكوم ولكنها لا ترز في اليوم الواحد والثقب الواحد اكثر من مكثاً. زمن التمكث يستمر نحو ثلاثة اسابيع || ينقف المكن بعد رزه بنحو ٧ ايام عن يرقات دقيقة نحيلة تتطور بسرعة وتبلغ الادراك بعمر ٢٤ او ٢٦ يوماً. فيصبح طولها نحو ١٠ مم. وهي مرقالة سكرية اللون ، شبه اسطوانية الشكل ، مستدقة الرأس الجؤوري ، مقطوعة الطرف الاسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٨ ايام وينقضي ضمن غشاء



أنثوكسانت



أنثونوم الإجاص




أنثونوم التفاح




أنثونوم الدراق



أنثونوم الزعرور



أنثونوم الشيلك



أنثونوم اللوز



أنثياريس

تبدو طحلاء ثم بيضاء ثم وردية وتستقر على السرة الحنطية المايقة الاطار || وهو من الاوصام الكثيرة الشيوع القليلة الاضرار التي لا تستوجب المكافحة الجذرية .

٢٤٥٥ - أنثيلوم الخشخاش * Entyloma fuscum

فطر مجهري يصيب اوراق الخشخاش . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها يراوح من ٣ الى ٦ مم . تبدو بيضاء اللون ثم حنطية فسمراء تكتنفها اطواق مضر || طيالس الفطر حنطية تغلفها غشاوة دقيقة شفافة البشرة الخارجية ملونة الداخلية . يوشها ملمس سريع الجفاف والانتشار .

٢٤٥٦ - أنثيلوم الدهلية * Entyloma dahliae (S).

فطر مجهري يصيب الدهلية (الاصالية) على اختلاف انواعها || مظهره الخارجي يقع صغيرة تعلو نصل الاوراق السفلى فتبدو مبعثرة على صفحة النصل ثم تنتشر وتلتحم بدون قياس كالسرنج المختلف الالوان من الاطحل الى الفستقي فالحنطي فالاسمر الرصاصي الموج || يكافح اولاً بقطع الاوراق المصابة حين ظهور الوصم . ثانياً بنضج الشتول المصابة اما بسائل يورده المحلول ١٪ او بكميات النحاس المحلول ٠.٣٪ || ومن الضروري اجتناب زرع الدهلية في المواقع القليلة الرطبة .

٢٤٥٧ - أنثيمس * Entimus (S). Entime (F).

جنس حشرات من غديات الاجنحة وفصيلة السوسيات . انواعه المعروفة ستة . اعطائها المناطق الحارة من العالم الجديد . خيمها خاضعة تركيب الكثير من النباتات الحرجية || اجسامها كبيرة القد تطول من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها صغيرة قرونها الاستشعارية مرفقة . كوائها مفرقة . اعماها محمية محدودة المؤخر يعاها تخديد قاطب وتخزين معترض . اوائها تراوح من الاخضر المذهب الى النحاسي والذهبي .

٢٤٥٨ - أنثيموان * هو الاثم ، اظله .

٢٤٥٩ - أنثين Intine

هو غلاف الجذرة الداخلي الذي يطن الاكسين والذي توجد في جوفه خليا التناسل والزاد ضمن السيئوبلازمه .

٢٤٦٠ - أنثيناريه * اطلب رجل القط .

٢٤٦١ - أنثليس * Anthyllis cretica.

Ebenus cretica (S). Anthyllis, Ebenier de Crète, Polyporon (F). Cretan silver bush (E). Cretisch wolblume (D). Ebano di Crète, Ebano di Candia (I).

جنية برية حرجية شائكة من فصيلة القرنيات . يكثر وجودها في مرتفعات حوض البحر المتوسط || اوراقها مركبة طويلة المالحق . ازهارها الى الحمرة . ثمارها قرون مستدقة رقيقة تغلف بذور صغيرة مفلطحة حادة الرائحة ازهارها منثرية تجرسها النحل . بذورها قابضة كانت تستعمل في التهابات الرحم مزوجة بدهن الرد .

٢٤٦٢ - إنشناء ، إنشناء Flexion (F).

Bending (E). حالة الشيء المنعطف ، المنثي .

٢٤٦٣ - أنشوروم * Anthurium (S).

Anthurium, Anthurium (F). Tall flower, Flamingo plant (E). Schwanzblume, Blütenchwanz (D). Anthura (I). جنس نباتات عشوية معمرة برية وزينية من فصيلة

وجاوا واسترالية || سوقها منتصبه ، جالسة . اوراقها مدنقة ، متعاقبة ، اهليلجية النصال . ازهارها محورية وحيدة المسكن . ثمارها قروية وحيدة البزرة || اشهر انواعه الانثياريس الجحالي .

٢٤٤٧ - أنثياريس جحالي * Antiaris toxicaria (S).

Antiaris toxique (F).

نوع من الانثياريس . شجرته منتصبه ، رفيعة ، تعلو نحو ٢٥ م . منبها جاوا . فروعها متباعدة ، صغيرة . اوراقها مدنقة ، متعاقبة ، سنانية النصال . ازهارها محورية الارزكاز ، وحيدة المسكن ، صفراء اللون || يستخرج من لحائها بالحز عصارة لبنة صفراء اللون جحالية المادة تدعى « أنثيار » كانوا يستعملونها في طلاء الحراب والنبال .

٢٤٤٨ - أنثياس * Anthias sacer (S).

Barbier lutjan, Anthias, Barbier de la Méditerranée (F). Anthias sacer (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الصرانيات ورثة شائكات الزعانف . اعطائها تشمل معظم خلجان واصواج البحر الابيض المتوسط وتعتبر من اجل اسماكها || جسمها اهليلجي الشكل يطول نحو ١٥ سم . ثوبها الى الوردي الزاهي يعلو سواج ذهبي باستثناء البطن الفضي الموج . قمة رأسها ومحارها وظهراها مبقجة بالحنطي الازرق التوشيح . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، شائكة النصف الاول . الحوضية تنتهي بسنان ذرب مستطيل . الذيلية هلالية الشكل ، دقيقة الطرفين اللامتساويين || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٢٤٤٩ - أنثيروش Antibruche

حاشور زراعي يرتكز على مادة تتراكلورير الكربون . يستعمل لوقاية الحبوب المعدة للحفظ والاكل من حيث الحشرات بمعدل ٣٠٠ سم ٣ لكل مائة كيلو من الحب .

٢٤٥٠ - أنثيجين * Antigène (F). Antigen (E).

نعت تعريفي يطلق على كل مادة تتحلل بطاقة الاحداث عند ادخالها في الكائن الحي .

٢٤٥١ - أنثيريئسم

هو السيم جنس نباتات برية وزراعية تريشية عديد الانواع والضروب ، اطلب سيم .

٢٤٥٢ - أنثيكور * Anticorps (F). Antibody (E).


مادة نوعية خاصة تظهر في مصل الكائن الحي عندما تحاطه مادة غريبة .

٢٤٥٣ - أنثيلوم * Entyloma

جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يركب نباتات فصائل المركبات والخشخاشيات والحدائيات والنجليات البرية وبعض الخيميات || يصيب النسيج النباتية في الميزوفيل حيث ينمو ويتكاثر فيسبب انفجار بشرة النسيج وظهور بوضه الفسحي الهبابي || انواعه عديدة ، اشهرها الثلاثة التالية :

٢٤٥٤ - أنثيلوم الاقحوان * Entyloma calendulae (S).

فطر مجهري يصيب جميع انواع الاقحوان . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٧ مم . تعلو نصل الاوراق .



أنثياس



أنثيلوم الاقحوان



أنثيلوم الخشخاش



أنثيلوم الدهلية




أنثيمس



أنثليس



أنثوريوم



أنجذان



أنجذان المعجم



أنجذان رومي



أنجدر هندي



أنجونة الخوخ



أنجلونية

جنبه زينة معمرة من فصيلة الخبازيات. أوراقها متعاقبة حاضنة بيضيه النصل منشارية الحافة || أزهارها ابلي أو تاجي الارتكاز. أزهارها كبيرة حيلة الشكل خفاسية البتلات تبدو عند انبلاجها برتقالية اللون ثم تتحول الى ارجوانية.

٢٤٧٥ - أنجلونية الخوخ *

Angerona prunaria (S). Angerone du prunier (F). Angerona prunaria (E).

حشرة من الارليات ورتبة حرشفيات الاجنعة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والاقاليم الداخلية المتاخمة. فراشها جارة قوتها رحيق الازهار. سرفتها خاضعة قوتها اوراق الخوخ البري وسائر الورديات || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٧ سم. بسطتها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ سم. رأسها معتدل الحجم، برتقالي اللون. عينها كبيرتان ناشزتان. زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر، خيطيان عند الانثى. جوشنها وبطنها الى البرتقالي عند الذكر، والى المغرة الصفراء الموج عند الانثى || روشنها الاماميان الى البرتقالي المشيط بالاكلف عند الذكر والى المغرة الصفراء الموج عند الانثى. روشنها الخلفيان كالامامين. اهدابها الى الشقعة || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تسافد بعد ظهورها بنحو سنة اسابيع. تمتع المكن لطخاً تغلفها مادة غروية تثبتها في مكانها || السرقة. عند الادراك التام تطول نحو ٣٤ سم. جسمها اسطواني الشكل تعلوه ثلاثة ازواج من الشمول المتعاقبة. ثوبها يماثل الموقع وهو غالباً بلون الاغصان. رأسها وثوبها الى السمرة القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتضي ضمن صلتجة تحبكها السرقة بين ورقتين او عدة اوراق تجمعها الى بعضها.

٢٤٧٦ - أنجربيات، غارغاجيات (S). Ulmaceae

Ulmacées (F). Ulmaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة الفعالات تشمل سبط البوقيصيات وسبط الميسيات. انواعها عديدة جميعها عسيمة اللحاء (خالية من العصارة). معظمها اشجار حرجية وبعضها صناعي وزيني.

٢٤٧٧ - أنجلينه

Ferreira spectabilis (S).

Angéline (F).

شجرة راتنجية حرجية من الصفيراء وفصيلة القرنيات الفراشية. يكثر وجودها في الاحراج البرازيلية. يستخرج منها بالخر صمغ راتنجي تجاري لا بأس به.

٢٤٧٨ - إنجهداد، إنستصراد

Congélation, Cryoscopie (F). Congelation (E).

يتجمد الماء الصافي عند بلوغ حرارته درجة الصفر تحت ضغط جوي معلوم مقداره ٧٦٠ مليمتراً. اما اذا اضيف الى الماء بعض الملح فتتخفص نقطة الانجهداد الى ما دون الصفر. لذلك فتعين نقطة الانجهداد يرتكز على هذا الاساس.

٢٤٧٩ - أنجلونية *

Angelonia (S). Angélonie (F).

Angelonia (E). Angelsblume (D). Angelonia (I).

جنس نباتات عشبية ليفية معمرة من فصيلة الخبازيات مهدا امريكى الوسطى || انواعه وضروبه عديدة جميعها من النباتات الزينية. اوراقها متعاقبة، أزهارها سنبلية او عنقودية التجميع، حيلة الشكل، مختلفة الالوان الزاهية.

الفلقاسيات. مهدا الاقاليم الاستوائية. الامريكسية انواعه عديدة بعضها يصلح للتزيين. اوراقها كبيرة قليلة النصل الملون الجميل، معلاقية الارتكاز. أزهارها عنقودية التجميع يقوم على زناد اسطواني طويل لونه الى الحوة || أزهارها متعددة الالوان الزاهية الجميلة الانسجام.

٢٤٦٤ - إنبثرة

Anthéridie, Cystide (F).

Antheridia (E).

العضو الذكري في بعض الفطور يقوم بوظيفة المبر.

٢٤٦٥ - إنجاء

أطلب إنفا.

٢٤٦٦ - إنجاء، إنستنجاء، قصف، جعف، قعر

Dérachement, Extirpation (F).

Rooting up, Extirpation (E).

هو قطع الاشجار واستخراجها مع اصولها.

٢٤٦٧ - إنجاص

راجع إجاص.

٢٤٦٨ - أنجبا

هو الشنجبار.

٢٤٦٩ - إنجبار

Bistorte (F).

Bistort, Snake-weed (E).

الانجبار: « نبات نفاع يتخذ منه شراب مفيد » (التاج) راجع أنارف.

٢٤٧٠ - أنجذان، شجرة الحلتيت، حلتيت، حلتيت

Ferula assa-foetida (S).

Férule assafétide (F). Assafoetida plant (E). Asan-disteckenkraut (D). Assa foetida, Ferula del sagapeno, Merda del diavolo (I).

نبات عشبي طبي بري من فصيلة الخبييات. اوراقه مركبة عريضة. أزهاره صغيرة القد صفر || يستخرج من ساقه صمغ يدعى الحلتيت كان ولا يزال كثير الاستعمال في مختلف المستحضرات الطبية وأخصها الطبابة البيطرية.

٢٤٧١ - أنجذان العجم، سكيننج، حلتيت

Ferula scowitziana (S).

Férule de Perse (F). Persian giant fennel (E).

Persische steckenkraut (D). Ferula di Persia (I).

ضرب من الانجذان مهد بلاد المعجم. تستخرج منه اجود اصناف الحلتيت. يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم.

ساقه غليظة قليلة الفروع. اوراقه ملتفة الاطراف. فصلها خالي الصفحة السفلى. أزهاره الى الصفرة.

٢٤٧٢ - أنجذان رومي، كاشن، كاشم، كاشم رومي

Levisticum officinale (S).

Livèche, Ache de montagne (F). Lovage, Mountain hemlock (E). Echter liebstöckel (D). Ligustico, Levistico, Sesell comune (I).

نبات عشبي بري معمّر من فصيلة الخبييات. اوراقه مركبة ثلاثية التفريض لاطقة العنق || أزهاره عذقي التجميع هامي الارتكاز. أزهاره الى الصفار الجميل بزوره صغيرة مستدقة سوداء اللون تعتبر من المقويات النافعة. اوراقه مأكولة طازجة ومطبوخة.

٢٤٧٣ - أنجرة

هو القراص.

٢٤٧٤ - أنجرة هندي، ورد الصين

Hibiscus Rosa-Sinensis (S). Rose de Chine (F). Shoe flower, China rose, Blacking plant (E). Chinesische rose (D). Rosa della China (I).

٢٤٩٣ - إنخضاب ° ، لشن °

Homochromie (F). Procrispis (E).

خاصة تتميز بها بعض الكائنات الحية من حيوان ونبات تمكنها من الاختضاب بلون الاشياء التي تحيط بها .

٢٤٩٤ - إنخضاد

Meurtrissure (F). Bruise (E).

انخضدت الثمار الرطبة . اذا خلت من موضع الى موضع فتشذخت . « تأتيم ثمارهم لم تخفد » اي لم يصعبها ذبول ولا انمصار ولا تشديخ .

٢٤٩٥ - إنخفاض

Dépression (F). Depression (E).

هو الهبوط الطبيعي او الصناعي .

٢٤٩٦ - إنخلاع المفصل

Luxation

هو خروج عظم المفصل من برجته .

٢٤٩٧ - أنخونيوم

Anchonium

هو أبو زيدان من نباتات جرود لبنان الطرية .

٢٤٩٨ - أندترّة °

Fiber (S). Ondatra (F).

Ondatra, Musk-rat (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة ومفترسة من فصيلة الفأريات .
انواعه المعروفة ثلاثة موطنها امريكا الشمالية . تألف
المروج وصفات الانهر والبحيرات . مسرحها دجوي تسمى
على الارض بخفة وتقوم وتغوص في الماء . ملجئها الحياتي
زوجي اما مستمراتها فوفرة العدد . قوتها الجذور والنباتات
المائية والاسماك والرخويات . تخلد اجعارها على الضفاف
بمستوى الماء حيث تكون مداخلها ومخارجها تحت سطح
الماء || اجسامها ربعة تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . بما فيه
الذنب الذي يراوح طوله من ٢٠ الى ٢٥ سم . شكلها شكل
الجرذ الا انها قصيرة القوائم . عيونها صغيرة . شفاهها
مفلوكة . سبالها مستطيلة . اذناها حشفية الاغشية ، قليلة
النشوز . اذناها مستطيلة ، مبططة ، حشفية القشار
يعلوها في حدودها العليا والسفلى بعض صفوف من الهلب
الجامد . قوائمها الخلفية محظبة الاصابع بما يساعدها على
السباحة . اوبارها جشيلة ، ناعمة ، لامعة . وتحمل بين
افخاذها عدة تفرز مادة زيتية بيضاء اللون رائحتها رائحة
الزباد || انثاها تحمل من ٣ الى ٤ مرات في الحول وتضع
في كل مرة من ٥ الى ٩ ادراص طامسة عريضة تبصر
وتكتسي بعمر عشرة ايام || تصاد لفرانها لانها جيدة
الصنف ، مرغوب فيها || اما انواعها الثلاثة فهي التالية .

٢٤٩٩ - أندترّة فيرجينية °

Fiber macrodon (S).

Ondatra de Virginie (F).

موطنها بلاد فيرجينية . جسمها يطول نحو ٥٥ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ نحو ٢٢ سم . ثوبها الى الرمكة يحاطها
وبر اسود ويعلوها موج فضي . بطنها الى الشبهة الغبراء .
ذنبها اسود .

٢٥٠٠ - أندترّة قاتمة °

Fiber obscurus (S).

Ondatra obscur (F).

موطنها كندا . جسمها يطول نحو ٥٠ سم . بما فيه الذنب
الذي يبلغ ٢٠ سم . ثوبها الى الكهبة السمرء يعلوها موج
رصاصي . بطنها الى الشبهة . ذنبها اسود .

٢٤٨٠ - أنجين ، خناق ، ذُبْحَة

Angine (F).

Angina (E).

التهاب يحصل في غشاء حلق وحنجرة الدواجن .

٢٤٨١ - إنحجّات ، حَتّ

Affouillement (F).

Undermining, Washing away (E).

هو العطب الذي تحدثه المياه الجارفة في كل ما يعترض
سيرها وهو كذلك ما تحدثه الرياح القالعة من عطب .

٢٤٨٢ - إنحدار

Déclivité (F). Declivity (E).

٢٤٨٣ - إنحراف

Diffraction

هو انحراف اشعة الضياء عند ملامسة سطح ما .

٢٤٨٤ - إنحراف ، إنعطاف

Inflexion

٢٤٨٥ - إنحراف ، زِيْعَان

Déviation (F).

Deviation (E).

٢٤٨٦ - إنحراف مغنطيسي

Déclinaison magnétique (F). Declination (E).

٢٤٨٧ - إنحرافيّة °

Photonastie (F).

Photonasty (E).

الانحرافية حركة محورية نظامية تقوم بها اوراق بعض
النباتات او ازهارها من تأثير الضوء .

٢٤٨٨ - إنحسرت

إنحسرت الطير : خرجت من الريش العتيق الى الحديث .

٢٤٨٩ - إنحطاط ، تعس

Abâtardissement (F).

Dégénérescence (F). Degeneracy (E).

هو فقدان بعض المزايا الاصلية الفارقة ان في النبات او
في الحيوان .

٢٤٩٠ - إنحلل

Décomposition, Dissolution (F).

Decomposition, Dissolution (E).

هو تفكك وانتاق العناصر او الاجزاء التي تتركب منها
المادة .

٢٤٩١ - إنحلل إسفنجي *

Echaudure sponglause,

Liège, Bouchon (F). Soggy breakdown (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المخزونة في البراد . سببه حفظ
الثمار في بيئة تدنت حرارتها عن المعدل الانسب || مظهره
الخارجي انحراف اللباب من الصلابة الى اللين حيث يبدو
طرياً منخوراً كالاسفنج لونه الى الحنطي العابق || يمكن
اجتنابه : (١) بجني الثمار عند ادراكها وليس عند ايناعها .
(٢) بعدم تأخير نقل الثمار المقطوفة الى البراد وبعدم
تعريضها للشمس . (٣) بحفظ الثمار ضمن قنوس الحرارة
التي تلائمها .

٢٤٩٢ - إنحلل داخلي *

Brunissure interne (F).

Mealy breakdown (E).

عارض يصيب ثمار التفاح عند حفظها في البراد مدة من
الزمن تفوق طاقة احتياها || مظهره الخارجي انصداع
البشرة وانحراف لون اللباب الى البني . يبتدئ الانحلل في
داخل الثمرة ويمتد الى الخارج فيعطب اللباب ويخضب
ويقضي على العصير || يمكن اجتنابه : (١) بجني الثمار
عند ادراكها . (٢) بنخب وحفظ الثمار الكبيرة القد وحدها .
(٣) بعدم تجاوز مدة الحزن الفصل .



إنحلل إسفنجي



إنحلل داخلي



أندترّة

صغيرة فرعاء السوق . كثيفة الاوراق الدائمة المتعاقبة السنانية
النصل الامرد الاخضر . ازهارها عثكولي التجميع تاجي
الارتكاز . ازهارها مختلفة الالوان يغلب فيها الالبيص .
تشكأر بالبذر . تبذر مشاتلها في اوائل الربيع وتغرس
شتولها في حزيران فتزهر من تشرين الى اذار || تجود في
جميع الاتربة وجميع المعارض || اشهر انواعها الزراعية
ما يتبع .

٢٥١٥ - أندلسية بيضاء * ، حُرْفَة مُرَّة

Iberis amara (S). Ibérade amère, Thlaspi blanc (F).

٢٥١٦ - أندلسية خضراء (S). Iberis sempervirens (S).
Ibérade à feuilles étroites, Thlaspi toujours vert (F).

٢٥١٧ - أندلسية صغيرة (S). Iberis pectinata (S).
Ibérade naine, Thlaspi nain (F).

٢٥١٨ - أندلسية عجمية

Iberis semperflorens (S). Ibérade de tous les mois,
Thlaspi de Perse (F).

٢٥١٩ - أندلسية عطرية * (S). Iberis pinnata (S).
Ibérade odorante, Thlaspi odorant (F).

٢٥٢٠ - أندلسية لذيذة (S). Iberis odorata (S).
Ibérade suave (F).

٢٥٢١ - أندلسية مُرَّة (S). Thlaspi arvense (S).
Thlaspi (F). اطلب شجرة مرة .

٢٥٢٢ - أندودرم (F). Endoderme (F). Endoderm (E).
اطلب بشرة داخلية .

٢٥٢٣ - أندوسية * ٥

Endothia
جنس فطور مجهرية من الروغيات وفصيلة الحشاريات
يشير بوليمته التي تنمو في نسيج النبات المنحار . اعسائه
غليظة بيضية شفافة ، تكائه ونكاته متشابهة . بوغه وثوري
الاقسام المعرضة || له نوع واحد مؤذ يصيب الكستنة .

٢٥٢٤ - أندوسية الكستنة * ٥ ، قرحة الكستنة

Endothia parasitica, Diaporthe parasitica, Valsone-
nectria parasitica (S). Maladie chancreuse du châ-
tagnier (F).

فطر مجهري يصيب الكستنة في سوقها واغصانها فيعطها
ويميتها || مظهره الخارجي بقع قرصية لونها الى الصفار
فالاحمر تركب لحاء الاغصان والسوق ثم تمتد الى ان
تطوق العنق المصاب فتقرحه وتعطب اوعيته وشكيره فيذوي
 ويموت || يكافح بالاقنلاع والحرق او بالقطع والحرق
والتهجير .

٢٥٢٥ - أندوكرب (F). Endocarpe (E).

هو الجزء الداخلي من غلاف الشرة يلحفه السوذك ويلحف
البذرة او البثور .

٢٥٢٦ - أنديرا ٥

Andira (S). Andira, Andire, Arbre à chou (F). Cabbage tree (E). Unechter
kohibaum (D). Andira (I).

جنس جنات حرجية وزراعية شائكة من فصيلة القرنيات
الفراشية . منبها امريكة الجنوبية . ثمارها ولحاء سوقها
طبية تستعمل لطرد الديدان المعوية || له ضربان تزيينيان
معروفان :

٢٥٠١ - أندثرَة مُمَسَّكَة ٥ (S). Fiber gibethicus (S).
Ondatra musqué (F).

موطنها امريكة الشمالية من المحيط الاطلسي الى المحيط
الهادي . جسمها يطول نحو ٦٠ سم . بما فيه الذنب الذي
يبلغ ٢٥ سم . ثوبها الى الرينة السمراء يعلوها موج فضي .
يطنها الى الشبهة الصنابية الموج . ذنبها اسود .

٢٥٠٢ - أندَر اطلب بيدر .

٢٥٠٣ - أندروواس * ، أندروواسيس ، زهرة التيرس ،
كُسلُح (S). Androsaces (S). Androsace,

Androselle (F). Androsace, Sea navel wort (E).
Androsace, Mannsschild (D). Androsace (I).

من اسمائه ملاح ومليح وكشليخ وهذا الاخير عبري الاصل
ومنه تصحف كسلح || جنس نباتات عشبية برية وزراعية
من فصيلة الربيعيات . منه انواع طبية يستخرج من عصارة
بصلها مواد عشائية مختلفة ومنه ما هو مدر للبول || اشهر
انواعه الزراعية المستعملة للتزيين :

٢٥٠٤ - اندروواس ابيض (S). A. lactea (S).

A. blanche (F).

٢٥٠٥ - اندروواس صوفي (S). A. lanuginosa (S).

A. laineuse (F).

٢٥٠٦ - اندروواس مُعرَّش (S). A. sarmentosa (S).

A. sarmentouse (F).

٢٥٠٧ - اندروواس ويثري (F). A. villosa (S). A. velue (F).

٢٥٠٨ - أندروسامن (S). Androsème

اطلب هيوفاريقون غزفي .

٢٥٠٩ - أندروواساقس اطلب اندروواس .

٢٥١٠ - أندروميده * (S). Andromeda (S).

Andromède (F). Marsh andromeda, Wild rose-
mary (E). Poleigränke (D). Andromeda confoglie
riplegate (I).

جنس جنات معمرة من فصيلة الخلنجيات ، اوراقها متعاقبة
جامدة طحلاء اللون . ازهارها مختلفة الوضع نسبة الى نوع
الجنبة ، منها الابطية الفردية ومنها العثكولية ومنها التاجية
الى آخرة ... ثمارها عنبيية نورية تمتاز بمحافظتها على
التويج كغلاف للثمرة . تستعمل للتزيين وهي من النباتات
الجميلة الشكل لكنها منومة وسامة .

٢٥١١ - إندرين (S). Endrin

حاشور زراعي يتخوى نحو ٩٠ ٪ من المركبات الكيماوية
الفعالة وهو سائل يحل بالماء ويستعمل في مكافحة الحرقص
والتريس والبق وديدان جوز القطن والشوذر والتبع .

٢٥١٢ - إندغهام (F). Adhésivité (F). Adhesivité (E).

الخاصة الطبيعية التي تمكن الشيء من الالتصاق او الالتحام
بشيء آخر .

٢٥١٣ - إندفاق (S). Ejaculation

هو خروج المني عقب الانتشار والانماط .

٢٥١٤ - أندلسية ، تلسفي ، حُرْفَة

Iberis (S). Ibérade, Thlaspi, Teraspie (F). Candytuff
(E). Schleifenblume (D). Iberide, Tlaspi (I).

جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة الصليبيات ، مهدا
اسية الصغرى وأروبة . انواعها المعروفة ٢٠ جميعها جنات



أندروواس



أندروميده



أندلسية بيضاء



أندلسية عطرية



أندوسية




أندوسية الكستنة

Enzyme (F). Enzym (E). أنزيم ٢٥٣٧
نوع من الخماثر الكيماوية التي تذوب في الماء وتفرزها الخلايا .

Changement de poils (F). أنسَال ، نُسُول ٢٥٣٨
هو سقوط شعر الداة أو صوفها أو وبرها وقد يكون ذلك في ازمان معينة .

Pupille de l'oeil (F). إنسان العين ٢٥٣٩
Pupil (E).
راجع بؤبؤ العين وحندر .

Sirène (F). Siren (E). إنسان الماء ٢٥٤٠
انسان الماء وبنت البحر والحيلان حيوانات بحرية لبونة من رتبة الحيلانيات ، تشبه الإنسان لها اذنان مزعقة الاطراف بدلاً من الارجل وزعانف حوضية بدلاً من الايدي . وقد انقرضت جميعها ولم يبق من رتبة هذه الحيوانات سوى الاطوم وخروف البحر .



انرتة القمام

Usure (F). Abrasion (E). إنسِحاج ٢٥٤١
هو الانحطات الذي يحل بحجارة البناء والاعدة والتأثيل من جراء تقادمها والتآكل الذي تسببه الرياح والامطار .

Mue (F). Moulting (E). إنسلاخ ٢٥٤٢
هي التبدلات الفيزيولوجية التي تحصل كلما غرت الحشرات اغشيتها وتطورت من حالة الى اخرى || والانسلاخ في الرواحف يكون عندما تلحم اغشيتها وقد يحصل ذلك مرة في العام .

Encelade (F). أنسلاد ٢٥٤٣
Enceladus (E).
احد اقار زحل ، اكتشفه العلامة الانكليزي هرشكول عام ١٧٨٩ . دورته حول زحل تستمر ٣٢ ساعة و٥٣ دقيقة و٧ ثوان .

Schizogénèse (F). إنسِلَاع ٢٥٤٤
Schizogenesis (E).
الانسلاع ، في البيولوجية ، طريقة تكاثر بالانقسام تمارسها الخلقيات الكثرات الهلب .

Anisopus (S). أنسوب ٢٥٤٥
Anisopus (F). Anisopus (E).
جنس حشرات من فصيلة الانسوبيات ورتبة ذوات الجناحين . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف الجراج والادغال والحدائق والمساكن الريفية || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ٦ الى ٩ مم . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، متقاربة عند الذكور ، متباعدة عند الاناث . قرونها الاستشعارية خيطية . ملاسها طويلة . اعظامها قصيرة . كواسلها شبه بيضية . بطونها اسطوانية . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة . اثوابها ملونة . اناثها اكبر قدراً من ذكورها واهت ثوباً منها || الجملاء منها تعيش على المواد العضوية المنحلة اما الاساريح فثائلة ودائمة .

A. racemosa (S). انديرا عقودية ٢٥٢٧
A. à grappe (F).

A. inermis (S). A. inerme (F). انديرا ملساء ٢٥٢٨

٢٥٢٩ - أنديس الانتظام الورقي ، مدلال الانتظام الورقي
Indice phyllotaxique (F).
Phyllotaxic index (E).
هو مدرج الانتظام الورقي الخاص بكل نبات .

٢٥٣٠ - أنديس الإنكساره ، مدلال الإنكساره
Indice de réfraction (F). Index of refraction (E).
هو حاصل الإنكسار الثابت .

٢٥٣١ - إنذار ، تنبيه
Avertissement, Somation (F). Information, Summons (E).
الانذار هو ان يوجه نظر ذوي الشأن ان شفهي أو كتابي الى امر او حق او التزام لهم . واما التنبيه فهو الانذار الشفهي دون سواء .

٢٥٣٢ - أنرتة القمام *
Anarta myrtille (S).
Anarte des myrtilles, Noctuelle des aïrelles (F).
Anarta myrtille (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها تهام حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها تعيش على اوراق الخللجيات واخصها القمام || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم . بسطتها تراوح من ٢٤ الى ٢٥ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان . زباناها خيطيان . مرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها حنطي اللون ، صناعي المواج . بطنها الى الحنطي الاصفر يملوه تمشيج اسمر || روشناها الاماميان الى الصفار الباهت يعلوه تجلج وركشة وزركشة فيها الاحمر والامر والاسمر . روشناها الخلفيان الى الصفار الاشجع تعلوه بقجة قاعدية وجدة طرفية لونها الى المرة الصنابية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تصرخ في الليل . تعاغل بعد ظهورها بستة اسابيع . تمتح الممكن لطخاً صغيرة مستطيلة || السرفة عند الادراك تطول نحو ٢٤ مم . جسمها اسطواني الشكل مشدود القشار . ثوبها الى الخضار الالفس تعلوه ثلاثة خطوط جهورية يكتنفها الاصفر . رأسها احمر . مذنها الى الضحلة . رواجهها الى السواد الفحمي || طور الاكمال يستمر نحو ١٨ يوماً وينقضي ضمن جلاباب من الطين لتلحفه السرفة بعد ان تنغمس في التربة على عمق ٥ سم .

٢٥٣٣ - أنرسيا اطلب قوبعة الدراق الصغيرة .

٢٥٣٤ - أنرسية خيطية
Petite mineuse du pêcher (F).
هي قوبعة الدراق الصغيرة ، اطلبها .

٢٥٣٥ - إنزاء ، إسفاد
Accouplement (F).
Coupling (E).
جاء الذكر انشاء في الحيوانات الداجنة .

٢٥٣٦ - إنزياج
Aberration
ظاهرة طبيعية تؤثر في النظر فتجعله يشاهد الاجرام السماوية في غير مواقعها الحقيقية .

bâtarde (F). Sea bugloss, Italian alkanet (E). Italienische ochsenzunge, Ochsenzunge (D). Buglossa vulgare, Lingua buona (I).

نبات بري وزراعي تزييني معمر ، يتكاثر بالبذر .
يحبس في جميع المواقع لكنه يرغب في الاتربة ذات الطابع
الكلسي || أزهاره جميلة لونها الى الزرق .

٢٥٥٦ - أنشوزة القطب
Anchusa capensis (S).
Buglosse du Cap (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه حولية صغيرة القد ترتفع
نحو ٣٠ سم . اوراقها لسنة متمعجة زباء النصل . أزهارها
الى الزرقه || أزهارها يدوم من ايار الى حزيران .

٢٥٥٧ - أنشوزة خضراء
Anchusa sempervirens (S).
Buglosse toujours verte (S).

نوع من الانشوزة وهي جنبه معمرة ترتفع من ٧٠ الى
١٠٠ سم . اوراقها لسنة منشارية الحافة زباء النصل .
أزهارها صغيرة الحجم زرقاء اللون . أزهارها يدوم من
نيسان الى تموز .

٢٥٥٨ - أنشوزة سماجونية
Anchusa Italica (S).
Buglosse d'Italie (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه معمرة ترتفع عن التربة نحو
٨٠ سم . اوراقها لسنة ضيقة النصل . أزهارها زرق سماجونية .
يعملو جميع اعضائها من الساق الى الازهار حلب مستطيل
دقيق || أزهارها يدوم من ايار الى تموز .

٢٥٥٩ - أنشوزة صباغية

هي الشنجار الصباغي ، اطلبه .

٢٥٦٠ - أنشوزة صفراء
Anchusa ochroleuca (S).
Buglosse jaunâtre (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه محولة ترتفع نحو ٧٠ سم .
اوراقها لسنة خشنة زباء النصل . أزهارها صغيرة لونها الى
الصفار الباهت || أزهارها يدوم من تموز الى آب .

٢٥٦١ - أنشوزة طويلة القلم
Anchusa stylosa (S).
Buglosse à long style (F).

نوع من الانشوزة وهي جنبه حولية صغيرة القد ترتفع
نحو ٣٠ سم . اوراقها لسنة متمعجة زباء النصل . أزهارها
الى الزرقه الجميلة || أزهارها يدوم من حزيران الى تموز .

٢٥٦٢ - أنشوزة مخزنية * ، بُوغْلُصُنْ مخزني ،
دَبُونْ ، لسان الثور المخزني

Anchusa officinalis (S). Buglosse officinale, Langue
de bœuf (F). Bugloss, Common alkanet (E). Echte
ochsenzunge (D). Buglossa, Lingua di bue, Coda di
volpe (I).

نوع من الانشوزة وهو نبات طبي بري معمر ، مبدول
في لبنان ويوجد في معظم مناطق حوض البحر المتوسط .
يرتفع نحو ٤٠ سم . اوراقه لسنة قليلة التسنين زباء النصل .
أزهاره زرقاء او بنفسجية اللون في اول عهدها ثم يبيض
عند اقترابها من الذبول || منافعه الطبية عديدة ، يقال
انه يقوي جميع الحواس وينفع من البرسام . والماليخونيا
واوجاع الحلق والصدر والرئة والسعال . رماده ينفع من
القلاع وامراض اللثة . عصيره مع عصير التفاح يمنع
مفرح .

٢٥٦٣ - أنشوزيات ، بُوغْلُصُونِيَّات (F).
Anchusées (F). سبط نباتات عشبية من فصيلة الحمحميات . اجناسه وانواعه

٢٥٤٦ - أنشوبيات
Anisopodidae (S).
Anisopodidés (F). Anisopodidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة || اجسامها تطول من ٦ الى ١٢ مم .
رؤوسها شبه مكورة . عيونها متقاربة او متلاصقة عند
الذكور ، متباعدة عند الاناث . جميعها ثلاثية الزنم .
قرونها الاستشعارية قصيرة ، متساوية عند الشقين ،
مركبة من ١٦ فصلة . ملامسها مستطيلة . كواسلها شبه
بيضية الشكل . رواشها ملونة . قوائمها مستطيلة . ظنايبها
مجهزة بمناعس حادة || يرقاتها سلكية ، دودية الانتقال ،
تعيش على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها الانسوب .

٢٥٤٧ - إنسي
Côté gauche (F). Left side (E).
انسي الانسان والداية وكل شيء : جانبه الايسر .

٢٥٤٨ - إنسيابي الشكل
Aérodynamique (F).
Aerodynamic (E).
نعت توصف به الاشكال التي تتعرض الى اقل مقاومة ممكنة .

٢٥٤٩ - إنسيب *
Inocybe (S). Inocybe (F).
فطر من فصيلة الفاريقونيات . يوجد في المراعي الرطبة وعلى
ضفاف مجاري الماء . ساقه دقيقة ، رفيعة ، طحلاء اللون .
ارسوسته شبه مخروطية الشكل ، صغيرة القد ، قطرها نحو
٢ سم . لونها الى الطحلة يعلوها موج تني . اطراسه دقيقة
فضية اللون || يعتبر من الفطور الجحالية المؤذية .

٢٥٥٠ - إنسيينة *
Ensina (S). Ensihe (F).
جنس حشرات من ذوات الجناحين قصيرات القرون وفصيلة
الحرشيات . انواعها المعروفة ١٢ منتشرة في معظم اقاليم
البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة طحلاء اللون .
رؤوسها مستعرضة . عيونها ناشزة كبيرة . كواسلها كثيفة
الحمل المستطيل . اجنتحتها منمشة بالابيض . بطونها الى
الطحلة السمر . قيود حيدها الى البياض الاغبر || تعيش
على جميع انواع الاقحوان والقوتحان والنعنع . يرقاتها تقضم
الازهار والبزور .

٢٥٥١ - إنشقاق ، إنشيطار
Clivage (F).
Cleavage (E).

٢٥٥٢ - أنشوا
Anchois (F). Anchovy (E).
اطلب بلم .

٢٥٥٣ - أنشوا المتوسط
Anchois de la Méditerranée (F).
هي بلمة المتوسط ، سمكة بحرية .

٢٥٥٤ - أنشوزة
Anchusa (S).
Buglosse (F). Bugloss (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من الانشوزيات جميعها
اعشاب معمرة ترغب في الاراضي المنحجرة والمواقع الرطبة
اوراقها مستطيلة لسنة زباء النصل . أزهارها متعددة
الالوان يغلب فيها الازرق || اشهرها ما يتبع .

٢٥٥٥ - أنشوزة الزهر * ، بُوغْلُصُنْ أزرق
Anchusa azurea (S). Buglosse, Bourrache



إنسيب



انسيبة



أنشوزة الزهر



أنشوزة مخزنية

٢٥٧٨ - إنطباع ، سلاسة

Plasticité (F). Plasticity (E).

سهولة الانقياد واللين . وكلمة سلاسة من وضع الدكتور نقولا فياض .

٢٥٧٩ - أنطومة ، أنطومة

Oothèque, Coque ovigère (F). Ootheca (E).

مجموعة البيض التي تلقىها الجرادة وأمثالها عندما تفرز . وكذلك في مبيض الأسماك ولكل سمكة إنطمان أو أنطومتان .

٢٥٨٠ - إنطماظ

Erection (F). Erection (E).

هو الفرج أي الانتشار الناتج عن التهييج الجنسي المصحوب بالاحتقان والانتفاخ .

٢٥٨١ - إنطعال ، بيطورة ، حذو

Ferrure, Ferrage (F). Shoeling, Fixing iron on (E).

هو تركيب وتسيير نعل الدابة في حافرها .

٢٥٨٢ - إنطعاق الطعم

Affranchissement (F).

Enfranchissement (E).

هو استقلال الطعم من المعلم ويكون ذلك عندما يطعم الطعم بالتراب وتنمو له عند قاعدة ارتكازه جذور مستقلة تعتقه .

٢٥٨٣ - إنطعام الأزهار ، شرج

Agamie (F).

Agamous (E).

هو خلو ازهار بعض النباتات من السداة والمدقة كما في الفطور .

٢٥٨٤ - إنطعاف

Diffraction

هو الانحراف .

٢٥٨٥ - إنطقاد ، عتقد

Nouaison, Nouure (F).

Setting (E).

هو عقد الثمرة أي تكوين البزرة وقد يكون ذلك بعد الاخصاب واتصال جذرة الطلع الذكورية الحية الفاعلة بالبيضة الانثوية المنفصلة . (راجع ابرام) .

٢٥٨٦ - إنطعاف

Torsion (F).

Twist, Torsion (E).

حالة الشيء المنعطف أو المنقول عكس وجهته الطبيعية .

٢٥٨٧ - إنطعاس

Réflexion (F). Réflexion (E).

الانعكاس هو تغير اتجاه الضوء أو الجسم المرئي عندما يسقط على سطح مصقول عاكس . وقد ينشأ عن هذا الانعكاس صورة الجسم المرئي إذ وفي دراسة الانعكاس يستخدمون اصطلاحات خاصة كالشعاع الساقط والمنعكس ونقطة السقوط وزاويتي السقوط والانعكاس المنتظم أي الواقع على سطح مصقول كالمراة .

٢٥٨٨ - إنطعاسية

Reflexibilité (F). Reflexibility (E).

Inga (S). Inga (F).

Inga, Coco-weed (E). Inga (D). Inga (I).

جنس اشجار وجنبات حرجية من فصيلة القرنيات السنطية . بعد ما لا يقل عن ١٠٠ نوع جميعها من نباتات المناطق الحارة الاسيوية والامريكية والافريقية || منه انواع مأكولة الثمار اشهرها الأنغا الحلوة ومنه انواع حاملة تسهل المعدة .

عديدة بعضها بري طبي ومنه زراعي تزييني . وهي من النباتات المبدولة . منبتها جميع الاصناف العالمية || اشهرها النوع الطبي المعروف بالديون أو لسان الثور الحزني والنوع الصناعي الصياغي المعروف بالشنجار والانواع التزيينية المعروفة بالانشوزة .

٢٥٦٤ - أنشوزة

Noeud (F). Knot (E).

٢٥٦٥ - إنصباب

Déversement (F).

Inclination, Overflow (E).

٢٥٦٦ - إنصداع

Roulure (F).

تفكك الاجزاء الخشبية في الشجر من البرد والصقيع .

٢٥٦٧ - إنصداع الجدار *

Seime (vét.) (F).

Wire-heel (E).

هو شق يحصل في جدار الحافر وقد يكون على ثلاثة انواع :

Seime en mamelle (F).

انصداع الحامي

Seime en talon (F).

انصداع الدابة

Seime en pince (F).

انصداع السنبك

اسبابه عديدة اخصها جفاف جدار الحافر . يعالج باستعمال ملاقط الحديد ثم المراه الملية للجدار .

٢٥٦٨ - أنصيرين

Ansérine (F). Melting (E).

راجع أثينه .

٢٥٦٩ - أنصيرين بيضاء

راجع أثينه بيضاء .

٢٥٧٠ - إنصهار

Fusion

هو تحول المادة من حالة الصلابة الى حالة السيولة بتأثير الحرارة فيها .

٢٥٧١ - أنصيل *

Ancylos (S).

Ancyle (F). Ancylos (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللبنيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناقع البلاد المعتدلة الحرارة . قوتها النبوت المائية || اصداقها صغيرة القد ، دقيقة الصفحة الشفافة ، قمية الشوزن ، رفيعة القن الخلية الشكل . اجسامها صغيرة ملحوفة . رؤوسها مقطوعة . لواصها قصيرة . ارجلها وحيدة اهليلجية الشكل ، قليلة العرض .

٢٥٧٢ - أنصرج

انفرج الشجر : انشقت عيون ورقه وبدت اطرافه .
وانفرج الزهر : انشقت اكمام زهوره .

٢٥٧٣ - إنضغاط

Compressibilité (F).

Compressibility (E).

٢٥٧٤ - إنطباق ، تطابق

Coincidence (F).

Coincidence (E).

٢٥٧٥ - أنطومة الطير

Anthomyte pluviale (F).

هي ذبابة الطير .

٢٥٧٦ - أنطومة الملفوف

Anthomyte du chou (F).

هي ذبابة الملفوف .


٢٥٧٧ - أنطومة غبراء

Anthomyte blanchâtre (F).

اطلب ذبابة غبراء .



انصداع الجدار



أنصيل

٢٦٠٢ - **إنشلاق** Fission (F). Fission (E).

الانفلاق في الفيزياء النووية انقسام الذرة الى اثنتين تحت تأثير التفجير الجسيمي .

٢٦٠٣ - **أنفلوانزا ، وافدة ، نزلة وشحمة**

Influenza, Grippe
مرض معد يصيب الحيوان ولاسيما الخيل .

٢٦٠٤ - **إنقباض** Plasmolyse (F). Plasmolysis (E).

هو التقلص الذي يحل بالبروتوبلازمه عند انفكاكها وانقطاعها عن النشاء الخلوي .

٢٦٠٥ - **إنقباض ، إنكمش** Rétraction (F). Retraction (E).

٢٦٠٦ - **إنقباضية ، إنكماشية** Rétractilité (F). Retractility (E).
قابلية الانقباض .

٢٦٠٧ - **أنقذ** Hérisson (F). Hedgehog (E).

هو القنفذ ، اطلبه . وفي الامثال يقال بات فلان بليل انقذ لانه لا ينام الليل كله .

٢٦٠٨ - **إنقذان** Tortue (F).

الانقذان السلحفاة ، اطلبها .

٢٦٠٩ - **أنقرديه** Anacardier (F).

اطلب بلاذر .

٢٦١٠ - **أنقره** Angora

نعت لبعض الدراجين ذوات الشعر الحريري كبيض النوع الارنب والسنور والماعز .

٢٦١١ - **إنقسام إختزالي** Cytocinèse (F).

Cytocinesis (E).
هو الانقسام الذي يهيم على الخلايا التناسلية في الجذرة والبويضة فيختزل فيها عدد نشب جبلي الخليتين الناتجتين الى نصف عدد نشب جيلة الخلية الاصلية . لذلك فجيلة كل من الخلايا التناسلية تحوي نصف عدد النشب الموجودة في الخلايا الاخرى من جسم النبات || وعندما تتحد جيلة الخلية الذكرية بجيلة الخلية الانثوية في عملية التاثير فالأخصاب ، تتكون منها جيلة واحدة عدد نشبها يساوي العدد الاصيل لجيلة الخلية العادية .

٢٦١٢ - **إنقسام خلويوي** ، **إنقسام حُجرووي**

Division cellulaire (F). Cellular division (E).
هو الانقسام الذي تتكاثر بواسطته الخلية التي تبتدى فيها حياة النبات . فن واحدة الى اثنتين فأربع وهلم جرأ الى ان تتكون من هذه الخلية ، وما نتج عن تكاثرها من ملايين الخلايا ، اعضاء النبات المختلفة || وهذا الانقسام قد يكون مباشراً او غير مباشر او إختزالي .

٢٦١٣ - **إنقسام غير مباشر** Caryocinèse.

Mitose (F). Caryocinesis, Karyokinesis, Mitosis (E).
هو انقسام الجيلة في خلية النباتات الراقية . وهذا الانقسام يتم على الشكل التالي : انفصال النشب التي تتكون منها المهية وانشطارها طولياً الى شطرين متساويين ثم انجذاب كل شطر الى قطبه حيث تتحد النشب وتكون في كل قطب من قطبيها مجموعة جديدة لها مهيتها ثم يتكون بينهما جدار في السيتوبلازمه يفصل الجبلتين الجديدتين المتساويتين تماماً .

٢٥٩٠ - **إنفا حُلوه** * Inga dulcis.

Pithecolobium dulce (S). Inga doux (F).

نوع من الأنفا ، مهدها امريكة الاستوائية وقد عمت زراعتها جميع البلاد الحارة . وهي شجيرة فرعاء شائكة يكثر استعمالها في السياجات الحية || ثمارها قرون مرلوبة طولها نحو ١٥ سم وعرضها ٢ . لبها حلو الطعم للذيد الذككة مأكول من جميع شعوب تلك البلاد || وهي تعرف بالمكسيك باسم غموشيل « Guamuchil » .

٢٥٩١ - **إنغال ، تبغيل ، تنغيل** Hybridation.

Métissage (F). Hybridization, Cross-breeding (E).
من طرائق الاسفاد قوامسه ان يكون الاب والام من نوعين حيوانيين مختلفين كاتزاا الحمار على الفرس . وما البغل سوى نتيجة هذا الانغال او التبغيل .

٢٥٩٢ - **إنغلاق** Indéhiscence (F). Indehiscence (E).

هي صفة الثمار التي تحافظ على انغلاقتها .

٢٥٩٣ - **آنف**

يقال اوض أنيفة النبات اي سريته . وهي من آنف الاربة اي اسرعها نباتاً .

٢٥٩٤ - **أنف** Nez (F). Nose (E).

عضو في مقدم رأس الحيوانات الثديية ، اشكاله عديدة متباينة ، له وظيفتان اساسيتان : الاولى توصيل الهواء الى داخل الجسم بعد تنقيته وتلطيف حرارته ، والثانية نقل التأثيرات الشمسية الى المخ || وللأنف فتحتان يعرف عنهما بطاقي الأنف ، تنهيات بتجويفين منفصلين في البلعوم . أما سطح الأنف الداخلي فبطن بغشاء مخاطي متشابك الاعصاب الدقيقة الخاصة بحاسة الشم الذي هو مركزها الاوحد .

٢٥٩٥ - **أنف الثور ، أنف العجل** اطلب تم السمكة .

٢٥٩٦ - **أنف القمر** Enif (F).

نجم من كوكبة الفرس الاعظم مركزه على الجحفة .

٢٥٩٧ - **إنفتات ، خفتا** Friabilité (F).

Friability (E).

٢٥٩٨ - **إنفحة** Caillette, Franchemule (F).

Rennet (E).

هي جزء من المعدة او بالاحرى هي المعدة الحقيقية حيث يحصل هضم الطعام . ومن المنافع ما يستخرج من بطن الجدي قبل ان يطعم غير اللبن . وهو المعروف بالهجنة .

٢٥٩٩ - **أنفرا**

نبات طبي . قال الانطاكي : « هو شجر دون الرمان ورقه كورق اللوز وزهره احمر يشبه الجلتار لا يختص بزمان وكثيراً ما يوجد بالجيل وهو معتدل ملطف » .

٢٦٠٠ - **إنفصال** Ségrégation (F). Segregation (E).

هو فصل جزء عن غيره من الاجزاء المركبة او فصلها جميعها عن بعضها بعض .

٢٦٠١ - **إنقسام ، تشعيت** Désintégration (F).


Disintegration (E).
تحليل تركيب الاجزاء .



إنفا حُلوه



إنقسام إختزالي



إنقسام خلويوي



إنقسام غير مباشر

مسحوق فاطوري يرتكز على مادة النحاس يستعمل تعقيراً في مكافحة التسنّة .

٢٦٢٣ - انكسار Réfraction (F), Refraction (E).

ظاهرة طبيعية من أبحاث علم الضوء وهي أن الضوء إذا سار في وسط شفاف متجانس سار في خط مستقيم فإذا دخل وسطاً شفافاً آخر انحرف عن طريقه بزاوية خاصة تعرف بزاوية الانكسار. وتسمى النقطة التي يحدث فيها الانكسار عند السطح الفاصل بنقطة السقوط .

٢٦٢٤ - انكساري Réfrangible (F).

Refrangible (E).

الانكساري ما هو قابل لانكسار الاشعة . الاشعة الضوئية الأكثر انكسارية من غيرها اشعة ما وراء البنفسجي .

٢٦٢٥ - انكسارية Réfrangibilité (F).

Refrangibility (E).

٢٦٢٦ - انكلاس Décalfication (F).

Decalcification (E).

فقدان الكلس .

٢٦٢٧ - انكليس راجع أنقليس .

٢٦٢٨ - أنكوليه اطلب أكيلاجيه .

٢٦٢٩ - أنكوميرّة Oncomera (S).

Oncomère (F), Oncomera (E).

جنس حشرات واسعة دامة من فصيلة الاديريات ورتبة مفدمات الاجنحة . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعرف انواعها واشهرها الانكوميره الصفراء .

٢٦٣٠ - أنكوميرّة صفراء Oncomera flava (S).

Oncomère jaune (F), Oncomera flava (E).

حشرة واسعة دامة من فصيلة الاديريات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الادغال والاحراج . خنافسها تعيش على ازهار النبات . يرقاتها تعيش حيث تنقف على اللحاء وعلى الاخشاب اليابسة الصائرة نحو الانحلال || جسمها متوسط القد يطول من ١٦ الى ٢٠ مم . ثوبها الى الصفرة العابقة وعلوها موج اسمر . رأسها مستعرض الجرم ، بارز الحطم ، ضليح الفكين . زباناها غيظيان . عيناها بارزتان . ظهرها ذلق الطرف المديب . غداها رباعيتا الخطوط القاطبة || الانثى اكبر قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الصيف وتبقى حتى اواخر الخريف . تسرح في الليل . تساند في ثشرين الثاني .

تمتج المكن ميحادياً بين قشور ولحاء الاشجار اليابسة القائمة والمقطوعة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٣٠ مم . جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليح التأشير الفكية ، حنطي اللون ، اسود الرأس ، اسمر الرواجب والشرح || طور الكعال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً يتقضي في آخر سرداب كانت فيه البرقة .

٢٦٣١ - انلياط Exfoliation

هو الانتشار اي سقوط لحاء الشجر شيئاً فشيئاً في الخريف .

٢٦١٤ - انقسام مباشر Amitose (F), Amitosis (E).

هو انقسام الخلية الواحدة الى خليتين متشابهتين . فعند انقسام الخلية تنقسم الجيلة ايضاً الى قسمين يفصل بينهما عن بعض ويتكون بينهما جدار في السيتوبلازمه ينشأ عنه خليتان متشابهتان || وهذا الانقسام يحصل في النباتات الالوال البسيطة .

٢٦١٥ - انقسامية Partibilité (F).

Partibility (E).

الانقسامية هي الشقاصة اي قابلية الانقسام ، امكانية الانقسام الشقائي الى عدة اجزاء .

٢٦١٦ - انقشار ، انلياط Exfoliation

انحسار وسقوط لحاء الشجر في الخريف .

٢٦١٧ - انقضاء الأجل Expiration du terme (F).

Expiration of terme (E).

هو زوال التوقيت القانوني او التعاقد الذي يحدده الالتزام .

٢٦١٨ - انقلاب الشمس Solstice

انقلاب الشمس او ميلها الاعظم يحصل في فصلي الصيف والشتاء وذلك عندما يكون خط الاستواء قد بلغ اقصى درجات البعد عن الشمس .

٢٦١٩ - أنقليس * ، إنكليس ، حنكليس ،

جريت ، صلينباح ، قيريث ، مارماهي ،

مارماهيج ، مرمريج ، نون ، شكك

Anguilla vulgaris (S), Anguille commune (F), Common eel (E).

سمكة مأكولة مستطيلة من الانقليسيات تعيش في المياه المالحة والعذبة تكثر في العاصي ودجلة والفرات || طولها عند كمال بلوغها يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم . ووزنها نحو كيلو . رأسها مستطيل . لها فكان متساويان مجهزان بالاسنان . ثوبها الى الخضار الاسفع . تحمل زعنفتين صدريتين مركزتين عند مؤخر الرأس . لها زعنفة ظهرية واحدة ضيقة تبتدئ عند زامها الثاني وتنتهي مع الزعنفة البطنية الوحيدة ايضاً التي تبتدئ عند الزام الثالث . كانوا يعتقدون في الماضي ان الانقليس لا يتكاثر الا في البحر وقد ثبت الآن انه يبيض ويتكاثر في المياه المالحة والعذبة على حد سواء . وانه يحب البحر ويدخل الانهار حيث يستطيع الى ذلك سبيلاً . وان الانثى تبيض نحو خمسة ملايين سراً . اما مصل الانقليس فلا يختلف عن مصل الحيات ويحمل مثله بعض الخواص السامة . وقد توصلوا اخيراً الى استخراجه وحفظه واستعماله تلقيحاً اما للوقاية واما كعلاج .

٢٦٢٠ - أنقليسيات ، حنكليسيات


Anguillés (F), Anguillidae, Eels (E).

جنس اسماك مستطيلة الشكل شديدة الالتواء من فصيلة الشبقيات ورتبة مفتوحات المثانة . انواعه عديدة بعضها بحري وبعضها نهري واكثرها بحرية - نهريّة تعيش في المياه المالحة والعذبة على السواء || اعرفها واشهرها الانقليس .

٢٦٢١ - أنقود ، نقير Hile (F), Hilum (E).

هو نقطة اتصال البزرة باغشية الثمرة وهي عبارة عن نقرة صغيرة في البزرة .

٢٦٢٢ - أنكر Ancre




انقسام مباشر



أنقليس



أنقود



أنكوميرّة صفراء

١٣,٤ %	هيدرات الكربون
٠,٤ %	رماد
٠,٤ %	الياف
١٠٠,٠	

٢٦٣٨ - أنناس بري Bromelia sylvestris (S).

Ananas sauvage (F). Wild pine-apple (E). Wilder ananas (D). Ananasso salvatico (I).

نبات بري ، متعاقب ، مشر ، من فصيلة الانناسيات ، ثماره لا تؤكل .

٢٦٣٩ - أنناسيات Bromeliaceae (S).

Broméliacées (F). Bromeliaceae (E).

هي الفصيلة الأنناسية من وحيدات الفلقة . أنواعها نحو ٣٥٠ تنتمي الى ٢٧ جنساً . جميعها من نباتات المناطق الحارة الاستوائية || جذورها سطحية هوائية تعيش في التربة وعلى الصخور والأشجار : أوراقها قرصية التجميع طويلة لحمية شائكة الحافة مدببة العنقصة الأبرية || ثمارها اكواز مختلفة الاشكال والاحجام . نبتها يشمر مرة واحدة وكوزاً واحداً يرتكز على شراخ طويل منتصب يقوم مقام الساق .

٢٦٤٠ - أنهار ، تجاري الماء Cours d'eau (F).

Stream, Water course (E).

٢٦٤١ - إنهداف Allergie (F). Allergy (E).

الانهداف انفعال الجهاز العضوي ازاء بعض المواد المختلفة المصادر .

٢٦٤٢ - أنهران

الانهران من منازل القمر العواء والسيك . سميا بذلك لكثرة ماؤها .

٢٦٤٣ - إنهزامي Défaitiste (F). Defeatist (E).

نعت تعريفي يطلق على من يقر بالانهزامية .

٢٦٤٤ - إنهزامية Défaïtisme (F).

Defeatism (E).

حالة نفسية تملك بمن يفقد الثقة بالنجاح .

٢٦٤٥ - إنهضام Peptisation (F). Peptization (E).

هو رجوع بعض المواد المتخثرة الى اصلها . وقد يتم ذلك بتأثير بعض العوامل الكيماوية .

٢٦٤٦ - إنهضام Concoction, Digestion

هو الهضم الذي يحصل في المعدة .

٢٦٤٧ - إنهبال Eboulement (F).

Landslip, Failing in (E).

٢٦٤٨ - أنودة Anoda (S). Anode, Ocypus (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الخبازيات . أنواعه قليلة مهدا المكسيك تزرع للتزيين . سوقها تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها السفلى مثلثة الزوايا اما الوسطى والعليا فيضية القاعدة الى الزام الثاني ثم سنانية . ازهارها فردية ابطية الارتكاز عديمة العنق . الوانها براوح من الليلي الى الازرق العابق || ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

٢٦٣٢ - أنماط زراعية Façons aratoires (F).

Dressings of husbandry (E).

مختلف اشكال انجاز الاعمال الزراعية .

٢٦٣٣ - إنمغاط ، تمغط Elasticité (F).

Elasticity (E).

قدرة الشيء على التمدد بالين .

٢٦٣٤ - أنموذج ، نمودج Echotillon (F).

Sample, Specimen (E).

هر عينة او عينة الشيء .

٢٦٣٥ - إنموس الزيزفون Ennomos tilianaria (S).

Ennomos du tilleul (F).

Ennomos tilianaria (E).

حشرة من فصيلة الارفيات ورقية حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحارة من البلاد الاسيوية والاروبية . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفها تعيش على اوراق الزيزفون والحور والصفصاف || جسمها متوسط القد ، يطول نحو ١٦ مم . بسطها نحو ٤٢ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان ، مستطيلان عند الانثى . جوشها وبطنها الى الطحلة || روشاها الاماميان سداسيا الفروض والاسنان ، متراكبا الالوان والتبقيج والزركشة . روشاها الخلفيان خماسيا الفروض والاسنان . اهداها الى الصفار التبي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتح الممكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند ادراكها الكمال تقطول من ٣٠ الى ٣٦ مم . جسمها نحيل الجرم يبدو كأنه قطعة من قضيب تملوه اربعة ثعول متقابلة ، ثوبها الى النبي الاشهب . رأسها الى السمرة القائمة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوماً وينقضي ضمن صلجة تحببها السرفة بين الاوراق .

٢٦٣٦ - أنن

هو طائر يضرب الى السواد وله طوق كطوق الدبسي احمر الرجلين والمنقار مثل الحمامة الا انه اسود (الدميري) .

٢٦٣٧ - أنناس * ، أنناس Bromelia ananas, Ananas sativus (S).


Ananas, Bromélie (F). Pine-apple (E). Ananas, Fichtenapfel (D). Ananasso, Pomo apple (I).

نبات زراعي متعاقب مشر من فصيلة الانناسيات . مهد بعض المناطق الاستوائية من امريكا الجنوبية والانتيل . وقد كثرت زراعته الآن في جميع البلاد الاستوائية اوراقه قرصية التجميع محورية الارتكاز ليفية لحمية طويلة شائكة الحافة مدببة العنقصة الحادة الهدب || ثمرته وحيدة كبيرة الحجم شكلها شكل كوز الصنوبر تملوها ضمة من الاوراق الصغيرة ، محورية الارتكاز القرصي . يزرع لثماره الفخمة اللذيذة الشينة . وثماره هذه غزيرة العصارة السكرية غنية بالفيتامينات «آ» و «ث» . يتكاثر بالفسائل التي تنبت عند قرص الساق وبضمة الاوراق التي تملو الثمرة حيث تقطع مع شيء يسير من الكوز يؤمن لها الغذاء حتى انتاش الجذور .


متوسط تركيبها :	ماء
بروتين	٨٥,٠ %
دهن	٠,٥ %
	٠,٣ %



انموس الزيزفون



أنناس



أنودة

زوجي هنداً يعني أمه ، فقال أنها تعدت عن الولد فلا حاجة لها إلى الزواج ؛ قال فولتي ناعية كذا فأشدد معاوية رضي الله عنه :

« طلب الأبلق المقوق فلما

اعجزته أراد بيض الانوق »

انشاء تبيض من الرفنتسين إلى الثلاث ، كبيرة الحجم شبه مستديرة . تحضنها منوبة مع الذكر نحو خمسة أسابيع . قوتها الجيف على اختلافها ويقال أنهم لا تمتد على الحيوان الحي ولو عضها الجوع || انواعه المعروفة اثنان .

٢٦٥٨ - أنوق الشرق *Otogyps calvus* (S).

ثوبه اسم ابقع يملوه موج حنطي . *Oricou d'Orient* (F).

٢٦٥٩ - أنوق النوبة * *Otogyps auricularis* (S).

ثوبه اسم اغبر داكن يملوه موج متجانس يخفف من زهاء الريش . *Oricou d'Afrique, Vautour de Nuble* (F).

٢٦٦٠ - أنومال الكرم *Anomale de la vigne* (F).

٢٦٥٤ - أنور الفرقدين *Pherkad* (F). *Pherkad* (E).

أنور الفرقدين نجم نير من كوكبة الدب الأصغر . وهما فرقان الأنور والأخفى .

٢٦٥٥ - أنور المنطقة *Mintaka* (F). *Mintaka* (E).

أنور المنطقة نجم نير من كوكبة الجوزاء مركزه في منطقة الجوزاء . راجع الجبار أو الجوزاء .

٢٦٥٦ - أنورين ، ثيامين *Aneurine, Thiamine* (F).

الأنورين والثيامين هما الاسمان العلميان للثيامين ب ١ .

٢٦٥٧ - أنوق *Otogyps* (S). *Oricou* (F).

جنس طير من الكواسر تنتمي إلى فصيلة النسريات . جثتها كبيرة ضخمة طولها نحو ١٥٠ سم وبسطة سقطيها ٣٢٠ سم . رأسها اصلع ارمي . محاسرها بنفسجية . منسرها مستطيل ، اصفر البدن ، اسود الهرة الشديدة الانعقاد . عنقها ارمي المقدم اغفر المؤخر ، زغبه رمادي اللون . سقطيها كبير منفرج . ذنبها قصير مستدير || تعيش جماعات ، تعيش في صدوع الصخور . ومن طبعها أنها لا ترضى من الجبال إلا الموحش والشاهق منها . يقال ان في اخلاقتها أربع خصال تحضن بيضها وتحمي فرخها وتأنف ولدها وانائها لا تمكن من نفسها تغير أزواجها . وفي المثل اعز من بيض الانوق وامنع من بيض الانوق فلا يكاد يظفر به لان اوكانها في رؤوس الجبال الساحقة وهي تحقق مع ذلك . قال الشاعر :

فوق عليها لا ينال ذراها

يلعب النسر دونها والانوق

وقال غيره :

ذات إسمين والالوان شتى

وتحقق وهي كيسه الحويل

وقال غيره ايضاً :

وكننت اذا استودعت سرأ كتمته

كبيض انوق لا ينال لها وكر


وقال الدميري في كتاب حياة الحيوان : « يقال رجل لمعاوية



أنوق النوبة



أنومال دويبا



أنومال مذهب

٢٦٦٢ - أنومال مذهب * *Anomala aurata* (S).

Anomale doré (F). *Anomala aurata* (E).

خنفساء خاضعة من فصيلة الجمليات ورثة مغمدات الاجنحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . تألف نباتات الاتربة القليلة الاندماج والرملية ولا تمت عن الكرم والورد والموسج والاشجار المثمرة || جسمها صغير القد يطول من ١٢ إلى ١٤ مم . ويعرض من ٦ إلى ٧ مم . ثوبها العلوي إلى الاخضر الذهبي الموج . رأسها مستدير . خطمها قصير . زباناها صغيران ، صغيفها الاطراف . عينها صغيرتان . ظهرها مقطوم الطرف الذي لا يلحف الشرج . ارساغها خاسية العقل والخلفية منها ثنائية الخالب || الاثنى اميز قدماً من الذكر وافتح ثوباً منه واقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل ايار وتبقى نحو سبعة أسابيع . مسرحها ضوئي ينشط مع وهج الشمس || البرقة بطيئة النمو يبلغ طولها عند الادراك التام نحو ٢١ مم . جسمها مقوس الشكل ، مستغلف البطن ، عاجي اللون ، اسود الرأس ، سداسي الرواجب ، ضليع التأشير الحادة . الطور البرقي يستمر من ٢٨ إلى ٤٠ اسبوعاً والبرقة تعيش على جذور النباتات المختلفة اعصها العشبية من حولية ومحولة || طور الاكمال يستمر نحو ستة أسابيع .

٢٦٦٣ - إنيام ، إنييا *Inia* (F).

حيوان نهري لبون يدعى بوئو الامازون ، اطلبه .

٢٦٦٤ - إنيام *Dioscorea* (S). *Igname* (F). *Yam* (E).

جنس نباتات عشقولية عارضة معصرة من فصيلة الديوسقوريات . انواعها عديدة منها البري والزراعي . مهدا الاقاليم الحارة

الشكل عديدة المنافع من فصيلة المغنوليات . مهدا الصين وما جاورها . ثمارها مركبة لوزية دهنية ، لبها أبيض اللون حلو الطعم عطري الرائحة يستعمل في عسدة صناعات شرابية وكحولية فضلاً عن استعماله الطبي . ويستعملون أوراقها لتعطير الشاي ومنهم من يمسحها .

٢٦٧٠ - أنيليس

قال الانطاكي : « يوناني معناه دواء الرحم وهو تمشي يشبه ورقه ورق العدس وزهره احمر يخلف حباً في غلف رقيقة حاد الرائحة ومنه صغير لا يرتفع » . وهو نبات طبي قد يكون الانثليس .

٢٦٧١ - أنيلين
Aniline
قل عضوي صناعي يستعمل كأساس في ألوان الصباغة .

٢٦٧٢ - أنيسون
هو الشقار ، اطلبه .

٢٦٧٣ - إهاب
Peau non tannée (F).
Skin no tanned (E).
الاهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش ما لم يدينغ .

٢٦٧٤ - إهان
Pédicelle, Pédoncule (F).
Pedicel, Peduncle (E).
هو عرجون الثمرة أي عنقها أو معلقها . ويقال له رهناء ج . آهن .

٢٦٧٥ - إهتدب
Cueillir le fruit (F).
To gather fruits (E).
إهتدب وهتدب الثمرة : جناها .

٢٦٧٦ - إهتصار
الاهتصار : سقوط الغصن على الارض واصله في الشجرة .

٢٦٧٧ - أهرة
Matériel agricole (F).
Implements of husbandry (E).
الادوات الزراعية الشائعة الاستعمال ، ج . أهر وأهرات .

٢٦٧٨ - أهل العمد
Scénite (F).
لقب يطلق على الشعوب أو القبائل التي تعيش في المضارب .

٢٦٧٩ - إهلال قسطا * ، حشيشة الملكة

Tanacetum balsamita (S). Tanaisie balsamite, Baume coq (F). Tansy, Cost, Costmary (E). Rainfarn, Wurm-kraut (D). Tanaceto (I).
نبات عشبي بري وتزييني من فصيلة المركبات الشعاعية الزهر . يكثر في الاماكن الرطبة الكثيرة الحصى . أوراقه كبيرة القد مأكولة لا تخلو من المنافع الصحية . ازهاره هامة تزيينية جميلة الصفار .

٢٦٨٠ - أهلب
Polysète (F). Polysetous (E).
نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على من كانت فروته كثيرة الشعر الجامد المستطيل كالأهلب .

٢٦٨١ - أهلية
Capacité (F). Capacity (E).
هي حالة المرء في علاقته بالحقوق وهي على انواع : أهلية الاداء وأهلية الوجوب وأهلية الالتزام وأهلية التصرف .

٢٦٨٢ - إهليلج
Badamier (F). Terminalia (E).
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة الاهليلجيات . منبتها الهند وجاوا والانتيل وسرنديب والسفال || سوقها

الاسيوية والامريكية . أشهرها انيام الانتيل والهند واليابان والصين || جميعها عشقوية عارشة عطلة ملتفة . أوراقها متقابلة معنقة قلبية . ازهارها صغيرة ثنائية المسكن ، عنقودية التجميع ، ابطة الارتكاز . عسقلها نبوتية مدبسة الشكل ، نشوية حلوة تؤكل بعد الشوي أو بعد السلق لأنها تحوى بعض العناصر المرة السامة التي تبخرها الحرارة || أشهر اقواعها الزراعية والبرية هي ما يتبع .

٢٦٦٥ - إنيام برّي *

Dioscorea villosa (S).
Ilgname sauvage (F). Wild yam, Colic root (E). Zottige yamwurz (D). Dioscorea salivatica (I).

نوع من الانيام البري كان ولا يزال يستعمل في بعض المستحضرات والعقاقير الوطنية الهندية - الصينية || وهو نبات مداد معمر . أوراقه علفية غزيرة المادة الغذائية . ترعاها الماشية ويحود عليها الحليب .

٢٦٦٦ - إنيام زراعي * ، ديسقوريا ، بطاطا صينية

Dioscorea batatas, D. bulbifera (S). Dioscorée, Ilgname, I. bulbifère, I. de chine (F). Chinese yam, Japanese yam (E). Bulbillentrage, Yamwurz (D). Dioscorea, Ilgname (I).

جنس نباتات زراعية من الانيام تزرع لعسقلها المأكولة . زراعتها تستمر ثلاث سنوات || انواعه قليلة أشهرها انيام الانتيل الابيض وانيام الهند الاحمر وانيام الصين وانيام اليابان .

٢٦٦٧ - أنيس

« طائر حاد البصر مأواه قرب الانهار والاماكن الكثيرة المياه الملتفة الاشجار وله لون حسن وتدير في معاشه . قال ارسطو انه يتولد من الشقراق والغراب وذلك بين في لونه . وهو طائر يحب الانس ويقبل الادب والتربية . غذاؤه الفاكهة واللحم » (الدميري) .

٢٦٦٨ - أنيسون * ، أنيسون ، يانسون ، كسون حلو ،

حبه حلوه ، يسون أنيسي

Pimpinella anisum (S). Anis, Anis vert (F). Anise, Sweet cumin, Aniseed plant (E). Anis, Anisbiber-nelle, Grüner anis (D). Anice, Anacio (I).

نبات عشبي زراعي حولي من الافاويه وفصيلة الخيميات ساقه فرعاء دقيقة زياء تعلو نحو ٥٠ سم . أوراقه مركبة السفلى منها ثلاثية الوريقات القلبية المحزوزة أما العليا فجزأة ريشية . ازهاره صيوانية التجميع ابطة وتاجية الارتكاز بيضاء اللون . ثماره بزور صغيرة فقيرة مستطيلة لونها الى الخضار الاشهب ، فواحة العرف المستحب يستخرج منها عطر الانيسون وتدخل في عدة صناعات وشرابات كحولية اخصها العرق || الغرام منها يعد نحو ٣٠٠ برة والبزرة تحتفظ بقوة انتاشها ثلاث سنوات || زراعتها محصورة في بعض المناطق لانه من النباتات التي تحشى البرد وترغب في الاثربة الخوارة القليلة الاندماج الممكن ريبها كلما دعت الحاجة || بزوره تنشط الهضم وتزيل الانتفاخ وتسكن المغص وتدر البول وتنفع الصدر .

٢٦٦٩ - أنيسون نجمي * ، بديان نجمي

Illicium anisatum, I. parviflorum, I. religiosum, I. verum (S). Anis étoilé, Badlane, Badianier (F). Star anis tree (E). Sternanisbaum, Badianenbaum (D). Anacio stellato, Anice della China, Badiana (I).
نوع من البديان وهي شجيرة فرعاء متوسطة الحجم جميلة



إنيام برّي



إنيام زراعي



أنيسون



أنيسون نجمي



إهلال قسطا

٢٦٩٠ - أهوكاتية* ، أبوكاتية ، أبوكادو ، أبوكة

Laurus persea, *Persea gratissima*, *P. americana* (S).
Avocatier, Persée (F). Avocado pear, Alligator
pear (E). Avocatobaum (D). Pero avocado (I).

جنس اشجار مشمرة من فصيلة اللغاريات . انواعها المعروفة قليلة . اما ضرورها واصرامها الزراعية فكثيرة العدد اسمها العربي والفرنسي والانكليزي والاماني والايطالي تحريف لاسمها المكسيكي او بالاحرى الازتيكي (Ahuaca, Ahuacate) شجرتها جميلة الشكل ، شبه هريمه القالب . شايخة القنة والافنان تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . جذعها متوسط الغلاظة . ساقها سرحة غضة اللحاء طحلاء اللون . اوراقها ايده متعاقبة معنقة ، تصلها اهليلجي الشكل ، مدبب العقصه ، جامد الصفحة ، العن الحضار ، لامع الموج . ازهارها عتقودية التجميع ، لاقياسية الارتكاز منها المحورية والطرفية . اكمامها سداسية التركيب ، اسديتها ١٢ ، مآبرها رباعية المصاريع تنفتح للتفطيج عند ايناع الوليع . ثمارها مختلفة الاشكال والاحجام يكثر فيها الاجاصي . وزنها يراوح من ١٠٠ الى ٥٠٠ غ . قشورها مألسة معتدلة السماكة لونها الى الاخضر العابق تعلوه ماجة بنفسجية او جؤوية . سودقتها لباني التركيب ، جامد المكسر ، اغبر اللون ، غزير المادة الدهنية ، بلدي الطعم والمذاق ، حيود النكهة ، خافت العرف . عجمتها كبيرة القد ثنائية الزبارة ، لبوها لبنة العصارة السريعة التأكد والاحمرار ، كثيرة المسادة المنية الصالحة لعلف المواشي . الشجرة تدعى أبوكاة واهواكة واويكاة . لبائها يحوي :

ماء	٧٠,١٠
بروتايين	٢,١٥
مواد دهنية	٢٠,٠٠
مواد هيدروكر بونية	٧,٦٠
رماد	٠,١٥

لذلك تعتبر من الاغذية الشبه الكاملة التي تتوافر فيها الفيتامينات «آ» و «ب» . وهي تؤكل مع السكر او مع الملح والفلفل او مع عصير الليمون او النبيذ وقد تهرس وتعطّر بالونيل وتستهمل استعمال الزبدة . وهي بالتالي من اشهر الثمار الامريكية واعمها استعمالاً ذلك لان موسم ضرورها المختلفة يستمر طوال السنة ولان متوسط المنة خفام من لبائها المأكول يقدر بمائتي سعة حرارية مما يجعلها بمرتبة الحبوب الغذائية . اما اوراقها فتستعمل مقوية للمعدة وطامنة وطاردة للريح ودافعة للحميات . وتستهملها العامة لتحليل الرمل الكلوي وتفتيت بعض انواع الحصى وتذويب الاملاح وادرار البول .

مهدا وزراعتها :

يقال انها من ثبوت المكسيك وقد عمت زراعتها معظم البلاد الامريكية وبعض المناطق الافريقية والاسيوية . وقد شاهدنا منها عشرات الاشجار على الساحل الليباني الممتد من الحنية (قضاء صور) الى جبيل || ضرورها كثيرة العدد متفاوتة الصفات الجسورية والخصائص التريية والمناخية التي تجعل بعضها يتحمل الصقيع حتى الست درجات تحت الصفر بينما البعض الآخر لا يقوى على احتمال درجة الصفر ولا يحتمل غيره الثمان درجات . تتكاثر بالذر والتطعيم . شجرتها تنمر بعمر العشر سنوات اذا ما بقيت على حالها دون تطعيم . واذا صار تطعيمها بعمر ثلاث او اربع سنوات تنمر بعد ذلك بسنتين . اصلح تطعيم يوافقها الرقي المزورز القاعدة كما في اللينون .



إهليلج كابي



إهليلج لوزي



إهليلج هندي شعيري



أهوكاتية

منتصبه ، اغصانها فرعاء ، قشورها ملساء ، اوراقها ملحقة الشكل معنقة ضمية التركيب لونها الى الخضار القاتم . ازهارها سنبلية التجميع ابطية الارتكاز . ثمارها لوزية لبنة صعبة || يستخرج من لحائها صمغ قابض عفص يستعمل في الطلاء الصيني وهو من اجود انواعه || لباب ثمار بعضها يدخل في عدة علاجات طبية . اما دهنها فشائع الاستعمال يقوم مقام زيت الزيتون || اشهر انواعه ما يتبع .

Terminalia citrina (S).

٢٦٨٣ - إهليلج أصفر

Myrobalan citrin, *Terminalier citrin* (F). Hara nut tree (E). Gelbe myrobalanen (D). Mirobalano citrine (I).

شجرة من الاهليلج فاخرة الصنع الذي يعتبر من اجود انواع الطلاء .

٢٦٨٤ - إهليلج بليته ، بليته

Terminalia bellerica (S). *Myrobalan belleric*, *Badamier-vernis* (F). *Belleric myrobalan*, *Bedda nut tree* (E). *Myrobalanenbaum* (D). *Mirobalano citrine* (I).

هو النوع الجؤوي الذي يستخرج منه ، مثل النوع الاصفر ، اجود الطلاء الصيني .

Terminalia chebula (S).

٢٦٨٥ - إهليلج كابي*

Myrobalan chébule, *Chébule* (F). *Back myrobalan*, *Chebule myrobalan* (E). *Raspiger myrobalanenbaum* (D). *Mirobalano nero* (I).

يستعمل في بعض العلاجات الطبية المحلية ويستخرج من لباب لوزه الصنير زيت يؤكل .

٢٦٨٦ - إهليلج لوزي* ، لوز هندي

Terminalia catappa (S). *Amandier des Indes*, *Badamier* (F). *Country almond*, *Indian almond tree* (E). *Catappenbaum* (D). *Mandorlo d'India* (I).

يستخرج من لباب لوزه زيت معروف يدعى : الزيت الهندي .

٢٦٨٧ - إهليلج مجنح ، عنص

Terminalia alata (S). *Myrobalan ailé* (F).

نوع من الاهليلج الطبي . شجرتة متوسطة الارتفاع والحجم ، كثيرة الفروع : فتاء . عجبات ثماره لوزية الشكل لبائها غزير المادة الدهنية . لحاء السوق والاغصان تستعمل كقابضة وكداخمة للحميات .

٢٦٨٨ - إهليلج هندي شعيري*

Terminalia horrida (S). *Myrobalan d'Inde* (F). *Indian myrobalan tree* (E). *Indischer myrobalanenbaum* (D). *Mirobalano d'India* (I).


هو النوع المشهور بثأره المعروفة باسم (هندي شعيري) وثماره مسهلة لا بأس بها ولا سيما للاطفال لانها لا تسبب نغصاً . ومن قائل انها تستعمل في منع الحمل وقد يكون صحيحاً ولكن في حالات خاصة . والثمرة كثيرة المنافع الطبية الصحية .

Combretaceae (S).


٢٦٨٩ - إهليلجيات

Combretacées (F). *Combretaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مهدا البلاد الحارة والاستوائية . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات وبجالات . قشورها راتنجية طبية وصناعية تدخل في الصباغ والداغة . بزورها دهنية ، زيوتها ناعمة .



أهوكة



أوكاري



أوال



أودو

٢٦٩٨ - **أَوْجَه** (F). Unproductive (E).
أوجهت الاشجار : لم تثمر .

٢٦٩٩ - **أَوْدَح**

أودح الكباش اذا توقف ولم ينز .

٢٧٠٠ - **أَوْدَع**

الاولدع : هو اليربوع (عن الجوهرى) .

٢٧٠١ - **أودُتوسيريات** (S).
Odontoceridae (F). Odontoceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة القد ، سمراء اللون . بسيطة اجنحتها تراوح من ٢٠ الى ٣٦ مم . قرونها الاستشعارية مسننة عفاة الفصل . اجنحتها الامامية الى الطحلة الفضية المواجه || اساريها طليقة تعيش في المياه الراكدة ضمن شبك رجة تحببها بين الاعشاب المائية .

٢٧٠٢ - **أودُوو** (F).
Aralia cordata (S). Oudo (F).

نوع من الاراليه وفصيلة الاراليات . مهدد اليابان . ضروبه ثلاثة او اربعة . وهو نبات عشبي معمر . سوقه ليفية ترتفع منتصبه نحو المتر . اوراقه مركبة . جذوره كبيرة لحمية مأكولة وأمانج كذلك || يتكاثر بالبذر والتدريج .

٢٧٠٣ - **أودِما ، وذمة** (F).
Cedema, Edema (E).
استسقاء موضي .

٢٧٠٤ - **أوراسيا** (F). Eurasia (E).

كلمة تعني اوروبا وآسيا . اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية ، في هذا العصر ، على المجموعة القارية التي كانت ، قبل تجزئتها ، تتألف من آسيا واروپة بما فيها روسيا .

٢٧٠٥ - **أورَان**

هو البعامة الشائعة ، اطلبها .

٢٧٠٦ - **أورانوس** (F). Uranus (E).

كوكب سيار يتبع النظام الشمسي ، اكتشفه العلامة «هرسكل» عام ١٧٨١ || حجمه يفوق حجم الارض نحو ٧٥ مرة . دورته حول الشمس تستمر نحو ٨٤ سنة ويبعد عنها نحو ٢٨٨٠ مليون كيلومتر . سرعة انطلاقه في الفضاء نحو ٢٥٢٠٠ كيلومتر بالساعة || يدور في فلكه خمسة اقمار : ميراندا واريال وامبريال وتيتانيا وأوبرون .

٢٧٠٧ - **أورانيا** (F).
Urania (E).
اطلب رعاية .

٢٧٠٨ - **أورانيوم** (F). Uranium (E).

معدن يميل الى البياض ، يذوب تحت درجة عالية جداً (١٨٥٠ سغ) ، وزنه النسبي ١٨٠٦ رمزه (U) وقد يعتبر أيضاً أثقل المعادن من حيث الوزن الذري وهو يستخدم في صناعة القنبلة الذرية || وهذا المعدن يستخرج من الاوران (Uran) المعروفة باسم اكسيد الاورانيوم (Oxyde d'uranium) .

ترغب في الاثربة الخوارة المتوسطة الاندماج ونخشي كثرة الرطوبة || تغرس على ابعاد تراوح من ٧ الى ٨ امتار . تبلغ ذروة انتاجها بعمر ١٨ او ٢٠ سنة ويستمر ذلك نحو عقدين اذ تغل سنوياً من ١٠٠٠ الى ١٤٠٠ ثمرة براوح متوسط وزنها من ٢٠٠ الى ٤٠٠ كيلو . ضروبها واصرامها الحالية المعروفة تفوق الالف ، اشهرها ضروب الانثيل وغواتيالا والمكسيك .

ضروب الانثيل :

تجود في البلاد الحارة والاثربة المتوسطة الرطوبة . جميعها سريعة النمو ، نشيطة ، غاذقة ، حولية الحمل . ثمارها كبيرة القد تنضج من تموز الى تشرين الثاني ، لبابها جامد المكسر مستحب العرف الخافت لكنه قليل المسادة الدهنية التي لا يفوق متوسط نسبتها ١٧ ٪ .

ضروب غواتيالا :

تجود في البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة وتحمل درجة الصفر دون ان تتأذى . معظمها من الضروب السنبة المتناوبة الحمل . ثمارها كبيرة القد تنضج في فصلي الربيع والخريف . لبابها جامد المكسر ، مستحب العرف ، غزير المسادة الدهنية التي يراوح متوسطها من ١٨ الى ٢٠ ٪ .

ضروب المكسيك :

تجود في البلاد المعتدلة الحرارة وتحمل دون ان تتأذى الست درجات تحت الصفر . معظمها نشيط ، مريع ، حولي الحمل . ثمارها متوسطة القد متباينة الاشكال تنضج في الخريف والشتاء والربيع لكنها لا تتحمل السفر البعيد نظراً لرقه قشورها . لبابها مستحب العرف تعلوه زائحة تشبه الانيسون وهو جامد المكسر غزير المسادة الدهنية التي يراوح متوسطها من ٢٠ الى ٢٢ ٪ .

٢٦٩١ - **أهوكة** * ، **أبوكاة** (F).
Avocat (F).
ثمرة الاهوكاتية .

٢٦٩٢ - **أوابد** (F). Sedentary (E).
Sédentaires (F).
الطيور المقيمة بأرض شتائها وصيفها . والاوابد ضد القواطع .

٢٦٩٣ - **أواكاري** * ، **بركبورس** (S).
Brachyure, Ouakari (F).

جنس قروود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ٣ موطنها غابات ضفة الأمازون اليسرى . اجسامها ربة ، رؤوسها قليلة الشعر . اذنانها قصيرة كاسية . اثوابها الى السرة . شعارها ناعمة ووثيرة || تألف الغابات مرتعها الاشجار . قوتها الثمار والبراعم والاوراق والخضرات ويبض الطير والعسل .

٢٦٩٤ - **أوال** * ، **أوالى** ، **أوليات** ، **ابتدائيات**

Protozoaires (F). Protozoa (E).
هي الحيوانات الاوليات ذوات الخلية الواحدة . منها البوغيات والنقيعيات والجذريات الارجل ...

٢٦٩٥ - **أوان البذر** (F). Sowing-time (E).
Semailon (F).
هو الوقت الانسب لرمي البذار .

٢٦٩٦ - **أوب** (F). Bee (E).
Abelles (F).
الأوب : النحل وهو اسم جمع .

٢٦٩٧ - **أوبه** (F). Member (E).
Membre (F).
الأوبه قائمة الدابة ، ج . أوبات .

٢٧١٧ - **أورز عراقي**
Cygne (F). Swan (E).
اطلب تم .

٢٧١٨ - **أورز مُسَلَّح**
Olés à éperons (F).
هو الحرثام ، اطلبه . رمته :

٢٧١٩ - **أورز مصرية**
Ole d'Egypte (F).
اطلب شقة النيل .

٢٧٢٠ - **إوزول**
Eosol
ماكون زراعي سائل يرتكز على زيت النفط . يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٣٪ في مكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من أي نوع كانت وضد الامراض الفطرية وضد قمرزيات الاشجار المثمرة .

٢٧٢١ - **أوزون**
Ozone
ضرب من الاوكسيجن وهو غاز مشكال ازرق اللون قوي الرائحة الاخاذة شديد النشاط الاكسيدي . يستعمل في تطهير مياه الشفة وفي تعقيم الكحول .

٢٧٢٢ - **أوزونيوم**
Ozonium
فطر مجهري من الوسيات يكثر في زراعات القطن حيث يركب الجذور السطحية او يسرح في المواد العضوية الموجودة على سطح التربة || هيفه غيطي الشكل اغبر اللون كثيف التجميع المشطي ، يمتد كالشع المتراكب النواص || قيل انه يسبب مرض التكساس او الديمة الشائعة .

٢٧٢٣ - **أوزيريس**
٢٧٢٤ - **أوس**
٢٧٢٥ - **أوسب**
٢٧٢٦ - **أوسط**
٢٧٢٧ - **أوشع**
٢٧٢٨ - **أوشم**
٢٧٢٩ - **أوفاريقون**
٢٧٣٠ - **أوفاريه**

٢٧٢٤ - **أوربية**
٢٧٢٥ - **أوربيات**
٢٧٢٦ - **أوربيات**
٢٧٢٧ - **أوربيات**
٢٧٢٨ - **أوربيات**
٢٧٢٩ - **أوربيات**
٢٧٣٠ - **أوربيات**

٢٧٢٣ - **أوزيريس**
٢٧٢٤ - **أوس**
٢٧٢٥ - **أوسب**
٢٧٢٦ - **أوسط**
٢٧٢٧ - **أوشع**
٢٧٢٨ - **أوشم**
٢٧٢٩ - **أوفاريقون**
٢٧٣٠ - **أوفاريه**

٢٧٢٣ - **أوزيريس**
٢٧٢٤ - **أوس**
٢٧٢٥ - **أوسب**
٢٧٢٦ - **أوسط**
٢٧٢٧ - **أوشع**
٢٧٢٨ - **أوشم**
٢٧٢٩ - **أوفاريقون**
٢٧٣٠ - **أوفاريه**

٢٧٢٣ - **أوزيريس**
٢٧٢٤ - **أوس**
٢٧٢٥ - **أوسب**
٢٧٢٦ - **أوسط**
٢٧٢٧ - **أوشع**
٢٧٢٨ - **أوشم**
٢٧٢٩ - **أوفاريقون**
٢٧٣٠ - **أوفاريه**

٢٧٢٣ - **أوزيريس**
٢٧٢٤ - **أوس**
٢٧٢٥ - **أوسب**
٢٧٢٦ - **أوسط**
٢٧٢٧ - **أوشع**
٢٧٢٨ - **أوشم**
٢٧٢٩ - **أوفاريقون**
٢٧٣٠ - **أوفاريه**

٢٧٢٣ - **أوزيريس**
٢٧٢٤ - **أوس**
٢٧٢٥ - **أوسب**
٢٧٢٦ - **أوسط**
٢٧٢٧ - **أوشع**
٢٧٢٨ - **أوشم**
٢٧٢٩ - **أوفاريقون**
٢٧٣٠ - **أوفاريه**

٢٧٠٩ - **أورس**
Débourrer (F).
اورس الشجر : اوراق ، راجع اجدر .

٢٧١٠ - **أورق**
Podoces (S).
Podoce (F). Podoces (E).
جنس طير من الغربان . انواعه المعروفة قليلة العدد : تتميز بضعف طيرانها وقصر شوطها وسرعة عدوها على الارض || اجسامها متوسطة القد . مناقبها معتدلة الجرم ، مخاطمها العليا تلحف السفلى . اجنحتها ذلقة ، صغيرة ، قليلة الانفراج . ارساغها قوية ، اصابعها مستطيلة مسلحة بمخالب حادة قليلة الانعكاف || اعرف انواعه واشهرها اوراق بندر .

٢٧١١ - **أورق بندر**
Podoces panderi (S).
Podoce de Pander (F). Pander Podoces (E).
طائر من الاورق . موطنه صحاري الشرق والشرق الاوسط . يألف الحياة الجلمية . سربه يعد بعض المئات || جسمه ربعة يطول نحو ٢٦ سم . ثوبه الى الخضار البحري الزاهي يمتد في الظهر والجوشن . محسراه الى السمرة الفحمية . عيناه مطوشتان بإطار من الريش الدقيق الابيض . جناحه ابيض اللون ، اسود القاعدة والطرف || قوته الجراد والحشرات المختلفة والديدان والبدور . يتميز بقله طيرانه . وبقصر شوطه وبكثرة اقامته على الحضيض || يدفن عشه في السنت او في ابواب الصخور . انثاه تحضن وحدها من ٣ الى ٤ بيضات بيضا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٢٧١٢ - **أوريا ، بولة ، يوريا**
Urée (F).
Urea (E).
نوع من الاسمدة الازوتية العضوية المركبة . مظهره الخارجي ملح ابيض بلوري الشكل سريع الذوبان بالماء يحوي ٤٦٪ من الازوت || وهو من الاسمدة البطيئة الانحلال ، التدريجية المفعول ، الطويلة الخدمة ، الواجب استعمالها قبل الغرس والحاجة بنحو ٤٠ يوماً وذلك لتمكين الازوت البولي من الاستحالة الى ازوت امونياكي ثم نيتراكي قابل التربة .

٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**

٢٧١٢ - **أوريا ، بولة ، يوريا**
Urée (F).
Urea (E).
نوع من الاسمدة الازوتية العضوية المركبة . مظهره الخارجي ملح ابيض بلوري الشكل سريع الذوبان بالماء يحوي ٤٦٪ من الازوت || وهو من الاسمدة البطيئة الانحلال ، التدريجية المفعول ، الطويلة الخدمة ، الواجب استعمالها قبل الغرس والحاجة بنحو ٤٠ يوماً وذلك لتمكين الازوت البولي من الاستحالة الى ازوت امونياكي ثم نيتراكي قابل التربة .

٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**

٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**


٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**

٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**


٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**

٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**

٢٧١٣ - **أوريال**
٢٧١٤ - **أوربية**
٢٧١٥ - **أوربيات**
٢٧١٦ - **أوز**
٢٧١٧ - **أوز**
٢٧١٨ - **أوز**
٢٧١٩ - **أوز**
٢٧٢٠ - **أوز**
٢٧٢١ - **أوز**
٢٧٢٢ - **أوز**
٢٧٢٣ - **أوز**
٢٧٢٤ - **أوز**
٢٧٢٥ - **أوز**
٢٧٢٦ - **أوز**
٢٧٢٧ - **أوز**
٢٧٢٨ - **أوز**
٢٧٢٩ - **أوز**
٢٧٣٠ - **أوز**



أوربية



أوزونيوم



أوفاريه

٢٧٤٢ - **أوكريديه** (S). Eucharidie (F).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الاخدريات. انواعها قليلة، اعطانها البلاد الامريكية. سوقها فرعاء. اوراقها معتقة، كاملة، لا قياسية الترتيب منها المتقابلة والمتعاقبة. ازهارها محورية الارتكاز، مستطيلة الاذن، رباعية البتلات والاسدية || اعرف انواعها واشهرها ما يلي.

٢٧٤٣ - **أوكريديه قصيرة** (S). Eucharidie de Brewer (F).

نوع من الاوكريديه التزيينية. ساقها وفروعها مثدونة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها ضيقة متقابلة، نصلها سميك الصفحة. ازهارها متوسطة القد، بتلاتها ثلاثية التفليق مستطيلة الفص الاوسط. لونها الى الوردي يتوسطه الابيض || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٢٧٤٤ - **أوكريديه كبيرة الزهر** *

Eucharidium grandiflorum (S). Eucharidie à grandes fleurs (F).

نوع من الاوكريديه التزيينية. ساقها فرعاء فناء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها صغيرة القد سنانية النصل تقطو نحو ٤ سم. ازهارها كبيرة فارشة عتيقة اللون. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٧٤٥ - **أوكريديه لطيفة** (S). Eucharidie mignonne (F).

نوع من الاوكريديه التزيينية ساقها تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقها سنانية ذرية تقطو نحو ٣ سم. وتعرض نحو ١ بتلات ازهارها ثلاثية التفصيص وديسة اللون بيض المروق. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٢٧٤٦ - **اوكسيدور** Oxydor
فاطور زراعي يستعمل سائلاً محلولاً ١٪ في مكافحة امراض البطاطا الفطرية.

٢٧٤٧ - **اوكسيكلوريو النحاس**

Oxychlorure de cuivre (F).
فاطور زراعي يرتكز على النحاس وهو شديد الفاعلية النسبية، يستعمل في مكافحة عدة امراض فطرية الحصى التسنه.

٢٧٤٨ - **أولستيوم** * ، أولستيومون ، غبرة

Holosteum umbellatum (S). Holoste ombellée (F).
Chickweed, Holosteum (E). Doldenspur, Nelken-grass (D). Morgellina ombrellata (I).


نبات عشبي زغبى بري وزراعي معمر من فصيلة القرنفليات اوراقه متقابلة تشبه اوراق القرنفل. ازهاره عطرية جميلة. ازهاره صيواني التجميع. يزرع لجمال ازهاره.

٢٧٤٩ - **اوليات** راجع اوال.

٢٧٥٠ - **أولياريه** (S). Oléaria, Oléaire (F).
جنس نباتات استرالية المنبت معقودة التعريف على اسم العلامة البوتاني اولياريوس. وهي من فصيلة المركبات. انواعها عديدة جميعها شجيرات وجنات دائمة الخضار، اوراقها كاملة بسيطة صغيرة القد. ازهارها رئيسية بيضاء اللون ومنها عطرية عرفها كالمسك || تزرع للتزيين.

النصل. ازهارها محورية فردية قصيرة الاذن، ثمارها صغيرة لا تكبر الجوزة، قشدية، سكرية. كثيرة البذور السود.

٢٧٣١ - **أوفريس** * ، حاجبيته (S). Ophrys (S). Ophrys (E). Kerfblume (D). Ofrio (I).
جنس نباتات عشوية درنية معمرة من السحليات. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي. ولكل من انواعها زهرة موصوفة بشكلها الخاص، كالنحلة والزنبور والدبر والذبابه والعنكبوت الى آخره || تزرع للتزيين لكنها من النباتات السريعة العطب التي تخشى البرد والرطوبة وأشعة الشمس اللاذعة وامتداد الظل.




أوفريس

٢٧٣٢ - **أوكاليتوس** * ، كاليبتوس

Eucalyptus (S). Eucalyptus (F). Eucalyptus (E). Schönmütze (D). Eucalipto (I).

جنس اشجار حرجية وزراعية طيبة صحية من فصيلة الآسيات مهدا بلاد استراليا حيث يبلغ ارتفاع بعض انواعها نحو ١٤٥ م. اوراقها معتقة، متدلية، متعاقبة، سنانية النصل الجلدي الخشوب، مدبة العقصة، بحرية اللون. ازهارها فردية او ثلاثية التجميع، ابطية الارتكاز. زهرتها ترمش مستورة النورة وتبقى كذلك حتى نضج جدران الطلع عند ذلك تقع قلسوة حق الكأس او زر السطار وتبدو اسديتها الزغبية التي لا عد لها || انواعها المعروفة حتى الآن لا تقل عن ١٨٠، اشهرها على الاطلاق النوع المعروف بشجرة الحمى او شجرة الصمغ الازرق او الاوكاليتوس العريض الورق || منافعها الطيبة عديدة ولذا تعتبر من الاشجار الصحية الضرورية في الاقاليم الحارة الرطبة لانها تخفف رطوبة التربة وتطهر المناخ. يستخرج من اوراقها ولحاءها وصمغها دهن عطري يدعى اوكاليتول (Eucalyptol) يستعمل لدفع الحميات وللتطهير الجذري || اخشابها صلبة راتنجية برغم سرعة نموها وقد تصلح للبناء. اشهر انواعها واعرفها استعمالاً طبياً وصناعياً وتزيينياً.



أوكاليتوس

٢٧٣٣ - **أوكاليتوس ابيض**

E. leucoxydon (S).
E. blanc (F).

٢٧٣٤ - **أوكاليتوس طويل الورق**

E. longifolia (S).
E. à longues feuilles (F).

٢٧٣٥ - **أوكاليتوس عريض الورق، شجرة الحمى، شجرة الصمغ الازرق**

E. globulus (S).
E. gommier bleu (F).

٢٧٣٦ - **أوكاليتوس عسلي العرف**

E. melliodora (S).
E. à odeur de miel (F).

٢٧٣٧ - **أوكاليتوس عمودي الورق**

E. cosmophylla (S).
E. à feuilles verticales (F).

٢٧٣٨ - **أوكاليتوس عنقودي**

E. botryoides (S).
E. en grappes (F).

٢٧٣٩ - **أوكاليتوس قلبي الورق**

E. cordata (S).
E. à feuilles cordées (F).

٢٧٤٠ - **أوكاليتوس كبير الورق**


E. amplifolia (S).
E. à feuilles amples (F).

٢٧٤١ - **أوكيب**

اوكيب الطائر اذا نهض ونهيا للطيران.



أوكريديه كبيرة الزهر



أولستيوم

٢٧٦١ - أيا بانة *
Eupatorium aya-pana (S).
Aya-pana (F). Ayapana (E). Ayapana (D). Eupatorio del Brasile (I).
ضرب من النبات الطبي العشبي المعمر من فصيلة المركبات. مهدد أمريكة الاستوائية. سوقه أسطوانية جوفاء ترتفع نحو المتر. أوراقه مركبة ثلاثية سنانية معنقة متقابلة. أزهاره عذقية التجميع، ابطية وهاميسة الارتكاز. يستعمل في الكثير من المستحضرات الطبية كقو ودافع للحميات وضد فساد الدم.




أوليدة

٢٧٦٢ - إياة
Halo
الاية هي دائرة الشمس وتدعى الحالة والنداء والطفارة. اما دائرة القمر فتدعى الساهور والحالة.

٢٧٦٣ - إيااد
الاياد: التراب يجعل حول الخوض أو الشجرة يقوى به ويمنع الماء عن الجذع.

٢٧٦٤ - أيار
Mai (F). May (E).
يعرف أيضاً بـ مايو. الشهر الخامس من السنة الشمسية وهو من شهور الربيع. مدته واحد وثلاثون يوماً. في العقد الثاني منه تهبج الصبا وفي العقد الثالث تبدو السهائم وتهب الشمال ثم الدبور.



أولمة

تقويمه الزراعي: أعماله الزراعية عديدة ومختلفة منها: في الزراعات العامة الموسمية: متابعة الاعتناء بزراعة القطن والانتباه الى تعتيق بجلاته في الوقت المناسب، متابعة وانهاء زراعة التبغ قبل حلول شهر حزيران حيث تشتد الحرارة وتنخفض رطوبة التربة. متابعة العناية بجميع الزراعات الموسمية الصيفية ومكافحة الحشرات والافصام. المباشرة بالحصاد والتكديس.

في الاشجار المثمرة: المباشرة بعزق البساتين أو خربها. ازالة جميع النواصي النباتية تحت المطامير. تفريغ الثمار الكثيرة العدد. سقاية الاشجار الكثيرة الحمل وخصها التفاح متابعة حرث أو عزق الكرمة ومتابعة مكافحة الافصام والحشرات وخصها دود الثمر والمن القطني والارمداد.

في الحمضيات: متابعة تقطيع نصوب الليمون وسقاية البساتين باتزان ودراية لان كثرة الماء تؤذي.

في البقول: تعمد جميع الزراعات البقلية بالعزق والسقاية والتعشيب ومكافحة الحشرات والامراض.

في الزهور: متابعة السهر النافع والاعتناء مع التسميد اللازوتي والعزق والسقاية ومكافحة الافصام والحشرات عند ظهورها وخصها العناكب.



أيا بانة

٢٧٦٥ - أيا بيل
Cervinés (F). Cervinae (E).
قسم من فصيلة الايليات. اجناسه عديدة جميعها من ذوات الظلف. المذكورها قرون مصمتة متشعبة حولية اي انها تنسلخ وتتجدد كل عام، وامسا انها نجم على الغالب. اشهر اجناسه الايل والاريل والاروس والوننة واليامور.

٢٧٦٦ - أيبند
Airopsis
نبات بري من فصيلة النجيليات قريب الشبه من الزوان ترعاه الماشية فيسمونها.

٢٧٦٧ - إيفر فيل
Ibervil
ماكون زراعي سائل التركيب يرتكز على زيت القطران

٢٧٥١ - أوليدة *
Eolis (S). Eolide (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الحياشيم وفصيلة الاوليدات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. جميعها زحافة تعيش على النبوت البحرية || اجسامها عريضة هلامية بزاقية الشكل. رؤوسها رباعية اللوامس. خياشيمها حلقات دقيقة متساوية الترتيب تكتنف كامل الظهر لونها أزرق وابيض ومنها الازرق والاصفر.

٢٧٥٢ - أوليديات
Eolididae (S).
Eolidids (F). Eolididae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الحياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها معظم بحار العالم. جميعها زحافة تعيش على النبوت البحرية والفوقس || اجسامها هلامية بزاقية، عادمة الصدف، مستدقة المؤخر. رؤوسها رباعية او سداسية اللوامس. خياشيمها حلقات ملونة تكتنف كامل الظهر. ارجلها فردية مستطيلة ومستدقة || اعرف اجناسها واشهرها الاوليدة.

٢٧٥٣ - أوليما الزرع
Cricère des céréales (F).
اطلب كريبوسر الزرع.

٢٧٥٤ - أوليمسة *
Eulima (S).
Eulima (F). Eulima (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الاوليمات. انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها مردنية الشكل، محزنة، مألسة السطح، لماعة، بحيلة الانوان العابقة.

٢٧٥٥ - أوليميئات
Eulimidae (S).
Eulimids (F). Eulimidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الحياشيم المنطية. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة جميعها بحرية منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || بعضها لجئي يتطفل على الكرعانيات وقناتيات البحر، والبعض الآخر يعيش قرب الشطوط || اصداقها مألسة لماعة مردنية الشكل أو يرمية مقلوبة || اعرف اجناسها واشهرها الاوليمية والهيريس والحيسفة.

٢٧٥٦ - أوم
أوم الكلا: عطشه ليسمن.

٢٧٥٧ - أوم
Ohm
وحدة المقاومة الكهربائية.

٢٧٥٨ - أومتر
Ohmmètre (F). Ohmmeter (E).
مقياس الاوميات اي المقاومة الكهربائية بوحدات اوم.

٢٧٥٩ - أونكو
Ungko
هو الجيون الرشيق، اطلبه.

٢٧٦٠ - أونوما
Onosma
راجع اذن الحمار.



إيتة



إيدرانجية



إيدوصارون



إيدوصارون إسباني



إيديا



إيرة

يستعمل محلولاً بالماء بمعدل ٦ ٪ في مكافحة الشتوية ضد مكن الحشرات من أي نوع كانت وضد بعض الأمراض الفطرية .

٢٧٦٨ - إيثوغه ، سترينكوس الغابون Iboga

نبات عشبي بري طبي ينتمي إلى جنس السترينكوس وفصيلة اللوغانيات . مهد البلاد الأفريقية الاستوائية كالغابون والكرون || يقال أنه من النباتات الموقية المنعشة التي تذهب بالاعياء وتنشط الجسم والاعصاب . وهو من النباتات المهيجة الشديدة الوقع على الباء والانعاظ .

٢٧٦٩ - إيثير Ether

هو أكسيد الأثيل سائل شديد التبخير .

٢٧٧٠ - إيتة * ، صفصافية Itea (S).

Ité, Itée, Itea (F). Itea (E). Dorlstrauch (D). Itea (I). جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة القليبات . أنواعه ٦ ، مهدا الشرق الأقصى وأمريكا الشمالية . جميعها شجيرات وجنات فناء . أوراقها عابلة متعاقبة . أزهارها عنقودي التجميع . أزهارها صغيرة القند ، خماسية البتلات . أشهر أنواعه ما يلي :

٢٧٧١ - إيتة بهشية الورق Itea ilicifolia (S).

Ité à feuilles de houx (F). جنبة سبروتية معمرة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . مهدا الصين . أوراقها جامدة النصل لمشارية الحافة ، شاذكة الاسنان . عنقودها الزهري هامى الارتكاز متدلي الاطراف . أزهارها صغيرة القند ، خضراء اللون . أزهارها يستمر طوال شهر آب .

٢٧٧٢ - إيتة فيرجينية Itea Virginica (S).

Ité de Virginie (F). Itea Virginian willow (E). Virginscher dorlstrauch (D). Itea virginica (I). جنبة سبروتية تملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقها اهليلجية تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٤ . نصلها لامع البشرة مسنن الحافة . عنقودها الزهري منتصب القوام ، هامى الارتكاز يطول نحو ١٥ سم . أزهارها صغيرة القند بيضاء اللون || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٧٧٣ - إيثار Icerya

اطلب قمرية استرالية . ويعرف بالبق الدقيقي المفلطح .

٢٧٧٤ - إيجار Loyer (F). Rent (E).

هو المبلغ المحدد في عقد الاجاره والواجب دفعه على المستأجر .

٢٧٧٥ - إيداع Consignation (F).

Consignation, Deposit (E).

٢٧٧٦ - إيدام ، إندعاص Putrescence

التعفن في المجال العضوي .

٢٧٧٧ - إيدرانجية * ، كويية Hydrangea (S).

Hydrangelle, Hydrangée (F). Hydrangea (E). جنس شجيرات وجنات وجنات معمرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة القليبات ، مهدا الشرق الأقصى والبلاد الامريكية . أنواعها عديدة . سوقها فرعاء ، أوراقها متقابلة معتقة شبه بيضية النضر الجميل الخضار . أزهارها عشكولي التجميع تاجي الارتكاز . أزهارها جميلة صغيرة مختلفة الالوان . أشهرها الأرطسيا .

٢٧٧٨ - إيدروجين ، إيدروجين ، هيدروجين Hydrogène (F). Hydrogen (E).

غاز شفاف لا لون له ولا رائحة وهو اخف الغازات ، غير سام ولا يندوب في الماء الا قليلاً ولكن الماء يحوى نحو بلل منه . وهو سريع الاحتراق اذا قرب من النار اما اذا وضعت شمعة في اناء فيه ايدروجين فانها تنطفئ* . رمزه (يد) وزنه الاتومي ١,٠٠٨ || اما القنبلة الايدروجينية التي كثر التحدث عنها في هذا الزمن فانها ترتكز على تحطيم ذرة الايدروجين .

٢٧٧٩ - أيدع

« شجر له حب احمر يصيغ به . خشبه ثمين يحصل في السفن » عن أبي حنيفة .

٢٧٨٠ - إيدوصارون* ، فداس ، عداس مر Hedysarum (S).

Hédysaron, Esparcette, Sainfoin sauvage (F). Hedysarum, Bush clover (E). Süssklee, Zweischürige (D). Sanofiano, Lupinella (I).

نبات عشبي علني من القطانيات الفراشية ينبت في الاراضي الجور ويزرع في المراعي . ترغب فيه الماشية وتسن عليه .

٢٧٨١ - إيدوصارون إسباني* ، سلة Hedysarum coronarium (S).

Sainfoin d'Espagne, S. à bouquets, Sulla (F). French honeysuckle, Soola clover (E). Kronsussklee, Spanischer klee (D). Guadarubio, Sanofiano di Spagna, Sulla (I).

نوع من الايدوصارون وهو نبات عشبي علني معمّر ترغب فيه الماشية لاسيما الاغنام . أزهاره مغرية تجرسها النحل .

٢٧٨٢ - إيديا* Idia (S). Idie (F).

جنس حشرات مفيدة من فصيلة الذبابيات . تشرح مع الجنادب والجراد وتمتص مكنها على سرهما فينقف من يرقات تقضي على دبابها .

٢٧٨٣ - إيداء ، إنتهاب Déprédation (F).

Depredation, Plundering (E). هو مبلغ الاذى الذي لحق بملك الغير .

٢٧٨٤ - إيثراق ، نظام وري Follation

هو النظام التريبي الذي يتبعه ورق النبات في ارتكازه على القصيب .

٢٧٨٥ - إيراقلية Epialre droite (F).

اطلب سطاقس سنبل .

٢٧٨٦ - إيثراق Foliacé (F). Foliaceous (E).

كل ما له علاقة بشكل الاوراق وشوئتها .

٢٧٨٧ - إيرة* Puma eyra (S).

Eyra (F). Eyra (E). حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من فصيلة السنوريات . اعطائه معظم مناطق أمريكا الجنوبية اخصها البرازيل || جسمه اهيف رشيق القوام يطول نحو ١٠٠ سم . رأسه شبه مستدير الشكل . ذنبه مستطيل . ثوبه الى الطلسة السوية المتماوجة يعبق مع اقترابه من الظهر ويبيض ويشقر عند البطن || يعيش ذكراً وانثى . يألف الغابات والحدائق القريبة من المساكن . يتسلق الاشجار بخفة . قوته ما استطاع اقتارسه من الحيوان والطيور . وهو شديد الاذى ، ان دخل مدجحة قضى على ما فيها من طير .

٢٧٨٨ - إيزرئيل ^٥ ، زهر الهواء Aeranthus (S).
Aéranthe (F). Air flower (E). Erante (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من السجليات . مهدا البلاد
الحارة . انواعه قليلة جميعها تزيينية تزرع لجمال ازهارها
المجبية .

٢٧٨٩ - أيزرو براند Aero Brand HCN
حاشور غازي زراعي يرتكز على حامض السياندريك ،
يستعمل تحت طناب ضابط خاص في مكافحة جميع انواع
القرمز والكرمس بمعدل ٤ غ . لكل متر مكعب .

٢٧٩٠ - أيزروبي Aéroblque (F). Aerobic (E).
نعت تعريفية يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا
تستطيع الحياة والتكاثر بعيداً عن الهواء .

٢٧٩١ - أيزروبية ، سحابة ، هوائية
Aérole (F). Aerobe (E).
صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع العيش
منقطعة عن الهواء .

٢٧٩٢ - إيزروس Eros (F).
هو الزامي كوكب سيار من النظام الشمسي ، اطلبه .

٢٧٩٣ - أيزروسكوب Aéroscop, Pullscope (F).
Aeroscope (E).
هلايروسكوب جهاز يستعمل في التقاط الفبار الموجود في
الهواء لفحصه مجهرياً .

٢٧٩٤ - إيزروميس الفستق ^٥ ، بلورة الفستق ^٥ ،
صدكبة الفستق ^٥ Pileolaria terebinthi.
Uromyces terebinthi (S). Rouille du pistachier (F).
فطر مجهرى من فصيلة السحاميات ورتبة الدعاميات يصيب
اوراق الفستق فيعطها ويؤذي الاشجار ويحصولها . مظهره
الخارجي بشور قرحية حنطية اللون او بنفسجية مستديرة
الشكل تركب فصل الاوراق فتسبب يباس النسيج المنحار
ما يؤدي الى عرقلة او شلل العمل النسجي . يكافح باستعمال
سائل بوردو المحلول ١/٥ .

٢٧٩٥ - إيزارية Isaria
جنس فطور مجهرية من عمارة الخفيات وفصيلة الكحيبيات
انواعه عديدة معظمها من الفطور التي تعيش على الحشرات
ويرقاتها . والازارية هي التي تسبب مرض الموسكردين
(الشلل) في دود القز . ومنه نوع يصيب ثمار البندورة
عند ادراكها ، يعيش في المناطق الباردة الرطبة . ونوع
آخر يصيب ثمار الاجاص المحفوظة اذا كانت قشورها
مخدوشة واذا ارتفعت حرارة المكان الى ما فوق الخمس
درجات .

٢٧٩٦ - إيزاريوبيس Isariopsis
جنس فطور مجهرية من عمارة الهودانيات وفصيلة الكحيبيات .
كثيراته لا قياسية الشكل والصفات . كنيذاته مؤثرة
أسطوانية او ديسية . انواعه عديدة . اعرفها زراعياً
واقتصادياً ما يتبع :

٢٧٩٧ - إيزاريوبيس الاكيدنيا Isariopsis mespili
فطر قليل الانتشار شوهد في القوقاز . يركب اوراق
الاكيدنيا فيؤذيها . كنيذاته شفعية ، ثنائية او رباعية
الاخية .

٢٧٩٨ - إيزاريوبيس اللوباء Isariopsis griseola ^٥
فطر يركب اوراق اللوباء فيقعها بقماً لا قياسية الشكل
والحجم لونها الى الجوة . مشيجه يكون في المنطقة السية
وليمة ترتكز عليها الكريجات . كنيذاته اسطوانية .
يكافح عند ظهوره باستعمال احسد الفواير غير المرتكزة
على النحاس .

٢٧٩٩ - إيزوبتر Isoptères (F). Isoptera (E).
اطلب عقفانيات .

٢٨٠٠ - إيزوتوم Isotherme (F).
Isotherm (E).
خط الحرارة الاقليمية او العالمية المتساوي التوزيع .

٢٨٠١ - إيساني Eocène (F). Eocene (E).
اقدام عصور الحقبة الثالثة .


٢٨٠٢ - إيست مولين East Malling
مجموعة من الاصول التفاحية الاروية ، المعدة للتطعيم ،
صار اختصارها جودرسها وتاصيلها وترتيبها وتصنيفها في معهد
ايت مولين في انكلترا . وقد صنفت هذه المجموعة المؤلفة
في بادئ امرها من عدة انواع الى ستة عشر عرقاً مرقومة من
١ الى ١٦ . ولما كانت فوارقها الجنسية الحلية وصفاتها
الميزة المختلفة لا تنسجم مع الترقيم التسلسلي لذلك صار
تقسيمها الى اربع فئات معتمدين فيها على قوة نشوء الشجرة
وحجمها ومقدورها الحيوي . الفئة الاولى التي تشمل
الرقم ٨ والعرق رقم ٩ تقصّر وتضعف بدون استثناء
حجم جميع الانواع المقلعة عليها . لذلك ففوائدها محدودة
لا تتعدى الاشكال التزيينية وقد نجود في الاقاليم الحارة
والاقاليم القليلة المطر . والفئة الثانية التي تشمل العروق
ذات الارقام ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ١٠ تقصّر وتضعف
حجم بعض الانواع في حين انها تكبر غيرها . لذلك فهي
غير شاملة واستقرار صفاتها منوط بنوع معين دون سواء .
وقد شد عنها عرق واحد وهو العرق رقم ٢ الذي يعتبر من
اجود العروق وثبتها وهو متوسط الحجم شديد الحيوية
لا يتطلب اقاليم خاصة ولا تقسيم الزراعة العادية . والفئة
الثالثة التي تشمل الارقام ١ و ١١ لا تزال عروقها تتأثر
بالفوارق النوعية التي تكيف شكلها وحجمها وهي لهذا
السبب لا تتحل بالشمول المفروض والمرغوب فيه . اما
الفئة الرابعة التي تشمل العروق ذات الارقام ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ فانها تكبر الحجم وتنشط الحيوية
وتعززها وتطول العمر باقسانه التضاعدية والمستقرة التابعة
الى ادوار النشوء والنمو السريع والبلوغ والاستقرار ،
وتقصّر بقسمة الهابط التابع الى دوري القحانة والانحطاط .
اشهر عروق هذه الفئة رقم ١٣ الذي لا يخشى اندماج
الترية ويطوبتها ثم العرق رقم ١٢ . والعرق رقم ١٦ اللذان
يجودان في البلاد الباردة والجبال الرقيقة ولكنها يرغبان في
الآترية القليلة الى المتوسطة الاندماج ويتطلبان الري .
وقد ذكرنا في الجدول اللاحق موجز اهم خصائص كل عرق
مع اسمه الاصيل او النوع المتحدر منه .



إيزاريوبيس الفستق




إيزاريوبيس اللوباء



جدول عروق الايست مولين مع اهم صفاتها وخصائصها المميزة

رقم العرق	اسمه الاصلي او النور المتحد من	صفاته وخصائصه المميزة
I ١	Paradis anglais à larges feuilles	متوسط النشاط ، يجود في الارربة الفقيرة الضعيفة الرطبة .
II ٢	Doucine de Fontenay	نشط ، متوسط الحجم ، غائر الجذور ، مدق الانتاج .
III ٣	لا اسم له ولا يتحد من نوع محقق	يقال ان عيوبه تفوق صفاته وهو سريع الاوراق والاعبال .
IV ٤	Doucine de Holstein, D. jaune	نشط ، متوسط الحجم ، يتحمل صقيع الشتاء ولكنه يخشى الجفاف .
V ٥	Doucine amélioré	نشط ، متوسط الحجم ، متعطش الى البوتاس ، لا يقاوم المن القطني .
VI ٦	Paradis sans pareil de Rivers	متوسط النشاط والحجم ، يخشى البرد .
VII ٧	لا اسم له ولا يتحد من نوع محقق	نشط لا بأس به وحجمه ايضا ، ثماره زاهية ، استعماله محدود .
VIII ٨	Paradis français	قليل النشاط ، يخشى البرد ، عديم المناعة ضد الآكلة والتبقع .
IX ٩	Paradis jaune de Metz	ضعيف النشاط ، مبكر ، قصير الحياة ، يرغب في الارربة الغنية الخوارة .
X ١٠	لا اسم له ولا يتحد من نوع محقق	متخار وعبوه تفوق صفاته .
XI ١١	Doucine vert	متوسط النشاط والحجم ، كثير الاستعمال في بلجيكا وهولندا .
XII ١٢	لا اسم له	شديد النشاط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، يرغب في الاقاليم الباردة .
XIII ١٣	لا اسم له	نشط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، يرغب في الارض الرطبة ولا يخشى الكثوم .
XIV ١٤	لا اسم له	شديد النشاط ، كبير الحجم وطويل العمر .
XV ١٥	لا اسم له	نشط ، كبير الحجم وطويل العمر ، متخار وقليل الجذور السطحية .
XVI ١٦	Ketziner idéal	شديد النشاط ، كبير الحجم ، طويل العمر ، لا يخشى البرد ، يتطلب الري المنتظم .



إيكاكيا

المتفاوتة القدر والتي يراوح عددها الوتري من ٣ الى ٧ وذلك نسبة للنوع || اثوابها الى السمرة الخنطية المواج .

٢٨١١ - إيقاف الاختيار ، توقيف الاختيار

Mutage (F). To stop the fermentation of must (E).
هو توقيف عصارة العنب عن الاختيار مدة من الوقت لبض
الاسباب التقنية او الصناعية وقد يتم ذلك بواسطة بعض
المواد المضادة للاختيار .

٢٨٠٣ - إيستولوجية Histologie (F). Histology (E).
علم يبحث في النسيج العضوية وفي بنىة الاحياء المجهرية .

٢٨٠٤ - إيصالية ، ناقلية Conductibilité (F).
Conductibility (E).
هي قابلية النقل .

٢٨٠٥ - أبصر Herbe sèche (F).
الابصر هو المشب اليابس ، ج . أباصر .

٢٨٠٦ - أيض Métabolisme (F). Metabolism (E).
مجموع المعادلات التي تجري وتم في الجسم .

٢٨٠٧ - أبطل Flanc, Hypocondre (F).
Hypocondrium (E).
الايطل : الحاصرة ج . ايطل . قال امرؤ القيس :
« ها ايطلا ظبي وساقا نعام » .

٢٨٠٨ - إيفار Ebouillantage (F). Scalding (E).
المعالجة بالماء الغالي .

٢٨٠٩ - إيفوديه Evodia (S). Evodie (F). Evodia (E).
Evodie (D). Evodia (I).
شجرة حرجية طيبة من السذابيات ، مهدا المناطق الحارة
الاسيرية ، اوراقها متقابلة معنقة اهليلجية . ازهارها
عنقودية النسيج تاجية الارتكاز . ثمارها نووية طيبة
يستعملوها للتريق وقد تكون من المليينات المحسودة .

٢٨١٠ - إيفيس Iphis (S).
Iphis (F). Iphis (E).
جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل
قصار الذيل وفصيلة اللقوسيات . انواعه المعروفة قليلة
العدد اعطانها بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي ||
اجسامها صغيرة . دروعها مبنية الشكل . ارجلها قصيرة
وهزيلة . ملاقلها مستطيلة نشيطة . تتميز بمناسخها القوية

٢٨١٢ - أيلك Bois, Forêt d'arbres touffus (F).
Wood of lofty trees
الايك : الشجر الكثير الملتف . والغيسة تثبت السدر
والاراك ونحوها من ناعم الشجر (اقرب الموارد) .

٢٨١٣ - إيكاكيا * ، إيكاكرو

Chrysobalanus icaco (S). Chrysobalane, Icaquier (F).
Coco-plum (E). Cocosplume, Ikakopflume (D).
Ghianda d'oro, Pruno icaco (I).
شجرة زراعية من فصيلة الورديات . مهدا البلاد الاستوائية
الامريكية والافريقية . تكثر زراعتها في المناطق البحرية .
وهي شجرة دائمة يلمسغ ارتفاعها نحو ١٠ امتار . اوراقها
متعاقبة معنقة بيضية النصل الجامد الجميل الخضار . ازهارها
عذقية محورية وطرفية صغيرة القد بيضاء اللون || ثمارها
خوخية الشكل والحجم قشرتها الى الحسرة القرمزية . لها
ابيض اللون لاصق بالمعجة مأكول . ويستخرج من لباب
المعجة دهن نافع شائع الاستعمال .

٢٨١٤ - إيكاكيات Chrysobalanées (F).
Chrysobalanæ (E).
سبط من الورديات .

٢٨١٥ - إيكير Acore, Roseau odorant (F).
اطلب عود الراج .




إيفيس



إيكل



أيل آخر



أيل أرقط



أيل البطائح



أيل إله



أيل الشرق

جالس الظهر والكفل ، طويل العنق والرأس ، كبير القرون قوي الجرامز دقيقها ، قصير الذنب || طوله نحو ٢٣٠ سم. وارتفاعه ١٣٠ وزنه من ١٥٠ الى ٢٠٠ كيلسو. يوجد في اربعة وآسية الصغرى حتى العجم وفي افريقية الشمالية .

٢٨٢١ - أيل أرقط *

Cervus axis (S).

Cerf axis, Chital (F). Axis deer, Chital (E).

أيل موطنه سرنديب والبنغال وحلايا حتى علو ١٤٠٠ م. جميل الخلقة ، مبقج الثوب الموشع ، متوسط القد يراوح علوه من ٩٠ الى ٩٥ سم || أجله قليل العدد من ٨ الى ١٢ . يألف ضفاف الأنهار والغابات الكثيفة .

٢٨٢٢ - أيل أسنمر *

Cervus dama dama (S). Daim, (F). Fallow deer (E). Damwild (D).

أيل متوسط القد ، جميل الخلقة ، رشيق القوام ، طوله نحو ١٥٠ سم. وعلوه ٩٥ . ثوبه اصهب اسمر تعلوه رقشة بيضاء || موطنه آسية الصغرى والجزائر وتونس واسبانيا والبرتغال .

٢٨٢٣ - أيل البطائح *

Rucervus Duvanceli (S).

Cerf de Duvancel, Rucerve Barasingha (F). Barasingha (E).

أيل كبير الجثة ، طوله نحو ١٩٠ سم. وعلوه من ١٢٠ الى ١٢٥ . ثوبه الى الجؤوة القائمة . موطنه الهند . يألف البطائح وضفاف الأنهار || أجله يعد من ٣٠ الى ٦٠ وأكثر .

٢٨٢٤ - أيل التبت *

Cervus affinis (S).

Cerf du Tibet (F). Deer of Tibet (E).

أيل موطنه التبت وجوارها ، متوسط القد غليظ الجثة ، اصهب الثوب الاغبر ، ابيض البطن || يألف الجبال العالية . يعيش جماعات قليلة العدد أجلها من ٦ الى ١٢ .

٢٨٢٥ - أيل إله *

Cervus Eldi (S).

Cerf d'Elde, Thameng (F). Thameng (E).

أيل موطنه البنغال وسيام والكمبودج . كبير الجثة مستطيل الشكل ، يبلغ طوله ٢٠٠ سم. وعلوه ١١٥ . ثوبه الى السرة ، ينبر في الصيف ويعبث في الشتاء || يألف المناطق وضفاف الأنهر ، أجله في الصيف يعد من ٨ الى ١٢ ويعد في الشتاء من ٥٠ الى ٦٠ .

٢٨٢٦ - أيل الشرق *

Cervus maral (S).

Cerf maral (F). Maral (E).

أيل كبير الجثة مستطيل الجرامز يبلغ علوه نحو ١٥٠ سم . له قرنان كبيران لا يقل طول الواحد عن ١١٠ سم. ثوبه اصهب احمر تعلوه مشحة من الصفار || موطنه الشرق من بلاد القرم الى شرقي القفقاز . يألف الغابات والاحراج والفضاب . أجله كثير العدد ان في الصيف او في الشتاء .

٢٨٢٧ - أيل الصين *

Cervus mandarinus (S).

Sica mandarin (F). Cervus mandarinus (E).

أيل متوسط القد ، اصهب الثوب السوي ، منسوب القوام . موطنه الصين الشمالية || يألف المناطق والسهول واطراف الغابات . أجله كثير العدد يراوح من ٤٠ الى ١٠٠ .

٢٨٢٨ - أيل العراق *

Dama mesopotamicus (S).

Daim de la Mésopotamie (F). Mesopotamian deer (E).

أيل موطنه العراق والبلاد المجاورة . صغير الجثة رشيق القوام ، سريع الحركة ، طوله نحو ١٥٠ سم. وعلوه من

٢٨١٦ - إيكل * ، بئل ، قشاة الهند

Aegle marmelos, Cratoeva valanga (S). Aegle, Bel

indien (F). Bael tree, Bengal quince, Marmelos (E).

Bhelbaum, Schleimappelbaum (D). Bella indiana (I).

نوع من الفصيلة النارجية مهد التبت وبلاد الهند . اشجاره

زراعية متوسطة الارتفاع والحجم كثيرة الافناد والافنان .

ثمارة لحمية لينة بحجم البرتقال . لها زكي الرائحة يربب .

عصيرها حامض مز . قشر ثمارها قابض يستخرج منه مادة

صبغية صفراء اللون . والهند يستعملون عصير الايكل

ضد الهوا الاصفر (الكوليرا) || اما الانهار والاوراق

فلها منافع طبية معروفة من الصينيين والهند .

٢٨١٧ - ايكي دنيا

Bibacier (F).

راجع اكيدنيا .

٢٨١٨ - أبكينيت

Aikinite (F).

مركب معدني يدعى اقنيت ، اطلبه .

٢٨١٩ - أيل

Cervus (S). Cerf (F). Deer (E).

جنس حيوانات برية عاشبة لبونة مجترة من الايائل وفصيلة

الايليات . انواعه عديدة اسيوية واروية وامريكية وافريقية

المهد جميعها مصنة القرون المتشعبة الحولية الانسلاخ .

تميش جماعات أجلها يراوح من ٨ الى ٥٠ وأكثر ، تأوى

الغابات والاحراج والمقارز والفضاب والسهول || قال

الديري في وصف الايل ما حرفته : « وهو اذا خاف

من الصياد يرمي نفسه من رأس الجبل ولا يتضرر بذلك واذا

لسعته الحية أكل السرطان ويصادق السمك فهو يمشي الى

الساحل ليرى السمك والسمك يقرب من البر ليراء الصيادون

يمرون هذا فيلبسون جلده ليقتصدوا السمك فيصيدوا منه .

وهو مولع بأكل الحيات يطلبها حيث وجدها وربما لسعته

فتسيل دمومه الى فقرتين تحت محاجر عينه يدخل الاصبع

فيهما فتجد تلك الدموع وتصير كالشمع فيتخذ درياقا

لسم الحيات وهو البادزهر الحيواني واجوده الاصفر || قال

الزجاجي مثل ابن دريد عن معنى قول الشاعر :

هزرتك لا قلى مني ولكن رأيت بقاء ودك في الصدود

كهجر الحائمات الورد لما رأت ان المني في الورد

تفيض نفوسها ظمأ وتخشى حاماً فهي تنظر من بعيد

تصد بوجه ذي البغضاء عنه وترمقه . بالمحاط الودود

فقال الحائم الذي يدور حول الماء ولا يصل اليه ومعنى

الشعر ان الايائل تأكل الافاعي في الصيف فتحس وتذهب

لحرارتها فتطلب الماء فاذا رآته امتنعت من شربه وحامت

عليه تتنسمه لأنها لو شربته في تلك الحالة فصادف الماء

السم الذي في اجوافها هلكت فلا تزال تمتنع عن شرب الماء

حتى يطول بها الزمان فيذهب ثوران السم ثم تشربه فلا

يضرها . فيقول هذا الشاعر : انه في تركي وصالك مع شدة

حاجتي اليه بمشابة الحائمات التي تدع شرب الماء مع شدة

حاجتها اليه ابقاء على حياتها || والزجاجي هو الذي صنف

كتاب العمل ومن كلامه ما سرم الله شيئاً إلا وأحل

بأزائه خيراً منه حرم الميتة وأباح المذكي وحرم الخمر وأباح

النبيذ وحرم السفاح وأباح النكاح وحرم الربا وأباح

البيع || انواع الايل عديدة أشهرها ما يلي .

٢٨٢٠ - أيل أحمر * ، أيل أروبي

Cervus elaphus (S). Cerf élaphe, C. rouge, C. d'Eu-

rope (F). Red deer (E). Rotwild (D).

أيل كبير القد مستطيل الجسم المنسوب ، عريض الصدر ،



أيل المسك




أيل الهند



أيل كشمير



أيل كندا



أيل نباح



إيلنطس

٩٥ الى ٩٠ . ثوبه الى الصهبة الاربداء يميل الى السمرة في الشتاء || يألف الهضاب والبوادي ومجاري الماء . أجله كثير العدد .

٢٨٢٩ - أيل المسك * ، كستورَة

Moschus moschiferus (S). Porte-musc, Chevrotain porte-musc (F). Musk deer (E).

حيوان بري لبون يجتر من المسكيات وفصيلة الايليات يشبه الفلبي الا انه ربع الجثة يبلغ علوه نحو ٥٠ سم . وكفله يعلو غاربه بنحو ٥ سم . وهو اجم الرأس كبير الاذن قصير الصوف . والذيل . للذكر منه جراب بقدر الحفنة الصنيرة يقع في اسفل بطنه بالقرب من دبره يمتلئ مسكاً وله نبيان ظاهران || موطنه شاسع الاطراف يمتد من الهند الى سيبيريا ومن الافغان الى الصين ، يكثر في التبت ، يرفض في البلاد الباردة ويخشى الحر .

٢٨٣٠ - أيل الهند * ، أيل ملهقة

Cervus unicolor, C. aristotels (S). Cerf unicolore, Sambar (F). Malay sambar (E).

نوع من الايل موطنه الهند والبنجاب وحاليا يوجد ايضا في سرنديب . وهو حسن الخلقة المنسجمة ، رشيق القوام ، كبير الجثة طوله نحو ٢١٠ سم . وعلوه من ١٢٠ الى ١٣٠ ثوبه الى الصهبة السمراء يعلوها موج امغر || يعيش في الاحراج والغابات والادغال وقرب مجاري الماء وقد شوهد في مرتفعات حملايا على علو ٣٠٠٠ م . || يسرح في الليل من الغروب الى الشروق ويبيت في النهار . أجله قليل العدد من ٦ الى ١٢ .

٢٨٣١ - أيل جتاوا

Cervus hippelaphus (S).

Cerf hippélaphé, Sambar de Java (F). Java sambar (E). ايل موطنه جاوا قريب الشبه من سلفه لكنه اصغر جثة وفتح ثوباً || يعيش جماعات عديدة ، أجله لا يقل عن ٤٠ ، يألف الادغال الكثيرة العشب .

٢٨٣٢ - أيل خراسان

Cervus sika, Cervus bactrianus (S). Sica (F). Sica (E). ايل صغير القد ، ربع القامة ، ثوبه الشتوي الى الصهبة الغبراء السوية . اما الصيف فيبجح || موطنه خراسان وجوارها أجله يعد من ٢٠ الى ٣٠ .

٢٨٣٣ - أيل كشمير * ، هُنْغُول

Cervus Cashmirensis (S). Cerf de Cachemire (F). Hanghul (E).

ايل كبير الجثة يشبه ايل اروبه . علوه نحو ١٤٠ سم . موطنه احراج بلاد كشمير . يعيش جماعات كبيرة أجلها لا يقل عن ٤٠ .

٢٨٣٤ - أيل كندا

Cervus canadensis (S).

Cerf du Canada (F). Wapiti (E).

موطنه كندا وبعض مناطق امريكا الشمالية وشمال شرق اسية . كبير الجثة طوله نحو ٢٩٠ سم وارتفاعه ١٣٠ أما وزنه فن ٢٥٠ الى ٥٠٠ كيلو . له قرنان كبيران متشعبان طول الواحد ١٦٠ سم . ثوبه الى السمرة الغبراء يزداد سمرة مع اقترابه من ثيج الظهر والعنق والرأس .

٢٨٣٥ - أيل نباح *

Cervulus muntiacus (S).

Cerf aboyeur, Cervule muntjac (F). Barking deer (E).

موطنه الهندوستان والهند الصينية وماليزيا . صغير الجثة ثوبه الى السمرة الصهباء يزداد اسمراراً مع اقترابه من العنق

وثيج الظهر . بطنه اغبر اللون جرامزه الى السمرة الداكنة . طوله نحو ٩٠ سم . وعلوه من ٥٠ الى ٥٥ .

٢٨٢٦ - إيلادة

Cytogénie (F). Cytogeny (E).

الايلادة تكاثر الحجيرات الحيوانية او الخلايا النباتية .

٢٨٣٧ - إيلادي

Cytogène (F). Cytogen (E).

ما يعود الى تكاثر الحجيرات او الخلايا .

٢٨٣٨ - إيلوسن

اطلب بندق بري .

٢٨٣٩ - أيلنس

قال القزويني : « انه نوع من السمك عظيم جداً وحيوانات البحر كلها تصاد سواء . ومن خواصه انه اذا شوي واكل منه شخصان معاً بينهما عداوة وخصومة تبدلت الفة » .

٢٨٤٠ - إيلند

Antilope-élan (F).

راجع أروس .

٢٨٤١ - إيلنطس * ، شجرة السماء ، شجرة الله

Allanthus altissima, Ailanthus glandulosa (S). Ailante glanduleux, Arbre du ciel, Frêne puant (F). Tree of heaven, Tree of the Gods Chinese ash (E). Echter götterbaum (D). Alanto, Albero del paradiso (I).

شجرة حرجية كبيرة من فصيلة الساروبيات ، مهدا بلاد الهند الصينية . ساقها غليظة مرتفعة . اغصانها دائمة . اوراقها متعاقبة مركبة تساعية الأزواج . ازهارها تاجية الارتكاز عشكولية متفرعة كثيرة القشعب . الزهرة صغيرة سفلية التركيب خماسية البتلات الرحيمة الشكل الافقية الانتشاب . اسديتها عديدة معقوفة . ميسمها وحيد مفطرش القطنسوة || تستعمل للتزيين في الممرات والجادات ، اوراقها اذا لمست تفرز زيوتاً طيارة كريهة الرائحة .

٢٨٤٢ - أيلول

Septembre (F). September (E).

يعرف ايضاً بسبتمبر . الشهر التاسع من السنة الشمسية وهو من شهور الصيف . مدته ثلاثون يوماً . في الحادي والعشرين منه يعتدل الليل والنهار وهو اول فصل الخريف . تقويمه الزراعي : اعماله الزراعية عديدة اخصها :

في الزراعات العامة الموسمية : متابعة العناية بالقطن وبجني المحصول . متابعة قطف وتجفيف اوراق التبغ والتفاح وادخال الناشف منها وتعليقه في المخازن . حرث الحواكير المعدة لزراعة التبغ فور الانتهاء من القطف ومن اقتلاع الشتول . حرث الارض المعدة لزراعة الحبوب كالخطة وغيرها .

في الاشجار المثمرة : التوقف عن متابعة رش الثمار قبل القطف بثلاثة اسابيع . ابتداء موسم قطف التفاح لحزنه في البراد وعلى طالب الحزن ان يجني الثمار عند ادراكها وقبل اكتمال نضجها وان يوضبها ويصنفها نسبة لحجمها ودرجة ادراكها وسلامتها من الشوائب . السهر على ثمار الاجاص والسفرجل . تطعيم الاغراس والاشجار التي بحاجة الى ذلك بالطعم الرقعي . اعداد الحفر اللازمة لغرس النصبوب في الاماكن التي سبق تحضيرها .

في الحمضيات : افتتاح موسم تصدير الليمون الحامض . متابعة مكافحة النمشة . تعشيب وعزق وري البساتين . تطعيم الاغراس الفتية . تحضير تربة البساتين المستحدثة وتعيين مواقع الغرس واستفاد الحفر .

في الاشجار المختلفة : ابتداء تحبيب الزيتون الاخضر .

اسم اللون . رسغاه الى الجذوة || يمضي معظم وقته على الارض حيث يكشط التربة في طلب القوت . قوته اخشرات والديدان والبزور والاعشاب || يدثن عشه على ضفاف مجاري الماء في الاشجار القليلة الارتفاع . الاثني تحضن من ٥ الى ٧ بيضات نحو ١٣ يوماً اما الذكر فيؤمن لها الغذاء .

٢٨٤٧ - إيناع Maturité complète (F).

Complete maturity (E).

الايناع والينع هو بلوغ الثمرة كلها وقد يأتي هذا الدور من حياتها بعد الادراك وقبل النضج التام .

٢٨٤٨ - إينانثة Oenanthé (F).

اطلب رازيانه .

٢٨٤٩ - إينانثة منقعية Phellandre (F).

اطلب رازيانه مائية .

٢٨٥٠ - إينولاز Inulase

خيرة تجمل الراسين في نسيج النباتات قابلة للهضم .

٢٨٥١ - إينولين Inuline (F). Inulin (E).

غلوكوزيد يكثر في خلايا بعض نباتات فصيلة المركبات كالهندباء والراسن .

٢٨٥٢ - إيهان Roquette (F). Rocket (E).

هو الجرجير ، اطلبه .

٢٨٥٣ - إيهقان * Roquette sauvage (F).

Wild rocket (E).

هو الجرجير البري ، وأحدثه أيهقالة . قال لبيد :
فعلت فروع الأيهقان واطفلت بالجلهتين فلباؤها ونعامها

٢٨٥٤ - أيون ، شارد Ion

الايون هو أثوم او مجموعة من الاتم يحمل او تحمل شحنة كهربائية || اذا اذيت مادة في الماء وكان محلها موصل للتيار الكهربائي فان بعض جزيئاتها ينقسم كل منه الى شقين او اكثر يحمل بعضها شحنة كهربائية ايجابية والآخر شحنة سلبية ويدعى الشق الاول ايون ايجابي Ion positif والشق الثاني ايون سلبى Ion négatif .

متابعة العناية بالموز والانتباه الى السقاية . المباشرة بقطاف العنب المعد لصناعة الخمر والكحول . متابعة تجفيف التين . في البقول والزهور : السهر والاعتناء بجميع البقول وتسميد ما لم يسد منها حتى الآن بالاسمدة الكيماوية . الاعتناء بجميع النباتات التزيينية المعمرة والحولية القائمة ومكافحة الحشرات التي تركبها والامراض التي تعثرها . اعداد مشاتل النباتات البصلية كالزنبق والزرعس وما اشبه .

٢٨٤٣ - أيسلولة Réversibilité (F). Reversibility (E).

هي صفة لحن انتفاع ما كعاش التتقاعد والراتب العمري فحواها ان يرجع الانتفاع الى المستحقين الاحياء او اذا مات المستحق الى شخص آخر دون نقص في قيمته .

٢٨٤٤ - أيسليات Cervidae (S). Cervidés (F).

Cervidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة مجترمة مصتة القرون المشعبة ، مزدوجة الاصابع . اجناسها عديدة مقسومة الى تسين الايايل والمسكيات . فالأيايل تشمل عدة اجناس اما المسكيات فجنس واحد .

٢٨٤٥ - أيم ، أين Zamenis

راجع ارقم .

٢٨٤٦ - أيمّة ذهبية الطوق




Vidua paradiscea, Steganura paradisea (S).

Veuve à collier d'or, Stéganure de paradis (F).

الايمة طائر من فصيلة التنوطيات . انواعه المعروفة خمسة أشهرها الذهبية الطوق . موطنه معظم مناطق افريقية الوسطى . يألف الغابات والحراج الموشحة وضفاف مجاري الماء . ملجئه الحياتي جماعي . سره متوسط العدد || جسمه معتدل القد ، يطول نحو ٣٥ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ١٥ سم . في الزمن العادي . اما في زمن التطريق ، ويكون ذلك بعد التحشير ، فرفال ذنبه تطول نحو ٤٥ سم . رأسه وظهره وذنبه الى السواد الاحم الاسفع . جناحاه الى السواد الموشح بالاحمر . قذاله وعنقه وصدره وبطنه الى الاحمر الناري الموج يعلوه بين العنق والصدر طوق ذهبي الخضاب . متقاده مخروطي الشكل ، مستغلظ القاعدة ، مستدق الملقط ،



أيهقان



الاثربة الكلسية . توجد في الاحراج المبعثرة الاشجار || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٢٨٥٥ - بَابَة Statistique (F). Statistics (E). جدول الاحصاء والتعداد .

٢٨٥٩ - بابُوجِيَّة المَلِكَة *
Cypripedium reginae (S).
Cypripède de la reine (F).

نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم .
اوراقها خلية النصال المهدبة ، عددها يراوح من ٥ الى ٧ .
اهدابها لاهبة تشري الجلد . ازهارها كبيرة القد ، قطرها
نحو ٨ سم . شفيفتها وردية اللون . بتلاتها وفصلها تبنية ||
تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

٢٨٥٦ - بابُوج *
Crepidula (S).
Crépide (F). Crepidula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وحيدات الاجهزة وفصيلة القَبُوصِيَّات . انواعها المعاصرة
المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة . تعيش لاصقة بصخور المحاذج والشواطئ ||
اصداقها اهليلجية الشوزن ، مستدقة المقدم ، قريبة الشبه
بالبابوج . اجسامها بيضية . رؤوسها مفلوقة ثنائية اللوامس
المحروطية . عيونها تحتل قواعد اللوامس . خياشيمها ضعية ،
يمنية الارتكاز . ارجلها وحيدة مبططة . ارضيتها رقيقة .

٢٨٦٠ - بابُوجِيَّة صَغِيرَة الزَهْر *
Cypripedium parviflorum (S).
Cypripède à petites fleurs (F).

نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم .
اوراقها خلية النصال . ازهارها صغيرة القد عطرية العرف .
شفيفتها الى الصفار الذهبي الموج . بتلاتها وفصلها سمراء
اللون || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٢٨٥٧ - بابُوجِيَّة *
Cypripedium (S).
Cypripède, Sabot de Venus, Pantoufle de dame (F).
Lady's slipper, Noah's ark (E).


جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السحلييات . اروماتها
جذمورية مدادة متشعبة . سوقها مورقة . اوراقها متباعدة
الاشكال ، متوازية المروق . ازهارها قليلة العدد او فردية ،
كبيرة القد مقعرة الشيفات التي تبدو كالبابوج || انواعها
المعروفة عديدة ، معظمها بري وبعضها تزييني ، اشهرها
التالية :

٢٨٦١ - بابُوجِيَّة مُبَقَّجَة *
Cypripedium guttatum (S).
Cypripède tacheté (F).

نوع من البابوجية ، يكثر وجودها في المناقع . ساقها
قصيرة تعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . لها ورقتان لا غير .
نصالها خلية البشرة على الصفحتين . زهرتها وحيدة بيضاء
اللون مرقوشة بالارجواني . فصلها وبتلاتها عاجية . قطر
الزهرة نحو ٥ سم . || تنويرها يستمر نحو ستة اسابيع بين
نيسان وايار .

٢٨٥٨ - بابُوجِيَّة الزُهْرَة *
Cypripedium calceolus (S). Sabot de Venus (F).

نوع من البابوجية . ساقها تعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم .
اوراقها جرداء النصال . زهرتها كبيرة قطرها نحو ١٠ سم .
بتلاتها وفصلها كستنية اللون ، شفيفتها صفراء مشيرة
بالارجواني || منبتها بعض اقاليم البحر المتوسط . ترغب في




بابوج



بابُوجِيَّة الزَهْرَة



بابُوجِيَّة المَلِكَة



بابونج ابيض



بابونج عطر



بابونج كاذب



بابونج تن



بابونج



بابيروسة

٢٨٧١ - بابونج *، تفتح الارض Matricaria (S).

Matricaire, Camomille inodora (F). Wild chamomile, Dog's chamomile (E). Echte kamille (D). Matricaria (I).

جنس نباتات عشبية طبية برية حولية من فصيلة المركبات. انواعها ثلاثة تختلف بلون ازهارها من ابيض واصفر وذهبي || تملو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها متعاقبة مفروضة جالسة النصل الامرط. ازهارها يدوم من حزيران الى ايلول. جميعها طبية، تستعمل في شتى العلاجات، اخصها الوضع.

٢٨٧٢ - بابيروسة* Porcus babirusa,

Babirusa alifura (S). Babiroussa (F). Babiroussa, Malaisian swine (E).

حيوان بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الخنزيريات ورتبة الجسليات المزدوجات الاظلاف. حجمه قدر الحمار الصغير، له نابان كبيران مقوسان يتغذان من فطيلسته ولذا نوابان زائدان || موطنه جزر الزايج وجوارها.

٢٨٧٣ - باتور، باري، باريك، باريك، بوريه Paillason, Natta de jonc (F). Straw-mat, Door-mat (E).

هو الحصير المنسوج من القصب او من سوق الاسل والسلت وغيرها. يستعمل لستر البقول من الصقيع ومن اشعة الشمس اللاذعة.

٢٨٧٤ - باتون، باطون Béton (F). Beton (E).

خليط متفاوت النسب من الاسمنت والرمل والقضض. يضاف اليه الماء اللازم لروبه. وهو عادي او مسلح.

٢٨٧٥ - بات بات

بات التراب، استخراج من الارض.

٢٨٧٦ - باثر

البثر، هو الماء الجاري من غير حفر.

٢٨٧٧ - باجد Inféodé (F). Inféodat (E).

نعت تعريفي يطلق في علم الحيوان على كل حشرة تشابه غيرها او تعيش مع غيرها وتأثرها من اي فصيلة كانت. ج بواجد.

٢٨٧٨ - باجول Arbuscle (F).

هو كل مادة او دواء يقضي على النباتات الليفية والخشوشية من البجلة الى الجنية.

٢٨٧٩ - باحيرة Plante épineuse (F).

Spiky plant (E). الباحرة النبتة الشائكة وتدعى سفا.

٢٨٨٠ - باحور

الباهور والباوير سبعة ايام متوالية، يزعم البعض انه يستدل بكل يوم منها على حالة شهر من اشهر الحريف والشتاء. والباوير المعروفة ثلاثة: الباحور العربية والباحور الغربية والباحور الشرقية || فالباحور العربية تبتدى في اليوم الثامن عشر من شهر تموز وتنتهي في اليوم الرابع والعشرين || والباحور الغربية تبتدى في اليوم الخامس عشر من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الحادي والعشرين || والباحور الشرقية تبتدى في اليوم السابع

٢٨١٢ - بابونج مزرية * Cypripedium hirsutum (S).

Cypripède hérissé (F).

نوع من البابونج. نبات طبي وذعاني. ساقها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها خلية النصال مزرية عمل الصفحتين العليا والسفلى. ازهارها تملو من ٣ الى ٥ سم. قطرها يراوح من ١٤ الى ١٦ سم. شفيقها صفراء اللون. بتلاتها وفصلها كستنية يملوها موج اصفر || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

٢٨١٣ - بابوس رضيع الحيوان من اي نوع كان.

٢٨١٤ - بابونج Anthémis noble (F). Camamel (E).

راجع اقحوان شريف.

٢٨١٥ - بابونج ابيض *، اقحوان المروج

Leucanthemum (S). Leucanthème, Marguerite des prés, Canesson (F). Ox-eye daisy (E). Wucherblume (D). Crisantemo del prati (I).

نبات عشبي بري وزراعي، محول وممر من فصيلة المركبات. ضرابه عديدة، تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه مستطيلة، مسننة، اذينية. ازهاره كبيرة. ازهاره يدوم من ايار الى تشرين الثاني.

٢٨١٦ - بابونج اصفر Camomille destinturiers (F).

Yellow chamomile (E). راجع اقحوان المبالغين.

٢٨١٧ - بابونج الطيور Seneson commun (F).

Common groundsel (E). راجع شرونة شائعة.

٢٨١٨ - بابونج عطر *، كيركيش

Chamaemelum (S). Chrysanthème gazonnant, Camomille odorante (F). Chamomile (E). Edle hunds-kamille (D). Camomilla odorosa (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة المركبات. منته الشرق الاوسط. يملو من ٥ الى ١٥ سم. اوراقه خيطية التفريغ زياء. ازهاره صفراء اللون عطرية. ازهاره يدوم من ايار الى تموز.

٢٨١٩ - بابونج كاذب *، بلتونه، بلطونه

Boltonia (S). Boltonia (F). False camomile (E). Boltonie (D). Boltonia (I).

نبات عشبي بري وزراعي زينة معمر من فصيلة المركبات. انواعه المعروفة ثلاثة. سوقها فرعاء مستقيمة، تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ضيقة النصل، متعاقبة حاضنة || ازهارها بحيلة الشكل ثنائية اللون تشبه النجوم. ازهارها يدوم من آب الى ايلول.

٢٨٧٠ - بابونج نين *، مخمر الكلب، ماروته

Maruta (S). Maroute, Camomille puante (F). May-weed, Dog-fennel (E). Stinkhunds-kamille (D). Maruta (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات. ساقه فرعاء دقيقة. اوراقه متعاقبة، جرداء، مفروضة. ازهاره عذقية التجميع، صفر المرافف بيض البتلات || يكثر في الزروع وعلى جوانب الطرقات. رائحته كريهة تنضوع من اللس.

٢٨٩٣ - **بادِر، زَرَّاع** Semeur (F). Sower (E).
من تعاطى ذر البذار.

٢٨٩٤ - **بادِرُوج**
البادروج : ثبت طيب الريح (اللسان).

٢٨٩٥ - **بادِيق** Eau-de-vie (F). Brandy (E).
راجع قنديد.

٢٨٩٦ - **بادِنْجَان، أَنْب، حَدَق، حَيْصَل، ثَلْثَان، رِبْرَق، مَعْد، وَغْد**

Morelle, Mélongène (F). Egg-plant (E).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات ،
أنواعه عديدة مختلفة الأشكال والأحجام والثمار . منها
الحولية والمعمرة والسرحة والشائكة والعارشة || أقسامه أربعة
البادنجان والحديق والحصيل والثلاثان .

٢٨٩٧ - **بادِنْجَان أُسْتَرَالِي***، **بادِنْجَان مُقَرَّض**
Solanum aviculare, S. laciniatum (S). Morelle
lacinée (F).

نوع من الباذنجان مهدد استرالية . وهو جنبة فرعاء
متوسطة القد . أوراقها كبيرة ، عميقة التفريش . ثمارها
بحجم الخوخة وشكلها . ضروبها ثلاثة تختلف بلون
ثمارها . منها الأصفر والبرتقالي والبني.

٢٨٩٨ - **بادِنْجَان أَفْرِيقِي** Solanum macrocarpon
جنبة فرعاء متوسطة القد معمرة . مأكولة الثمار . ثمارها
مستديرة طحلاء اللون ، ومنهم من أكل أوراقها مطبوخة .

٢٨٩٩ - **بادِنْجَان البَيْض*** Solanum ovigerum (S).
Melongène à oeufs, Plante aux oeufs, Pondeuse (F).
جنبة متوسطة القد ، تعلو من ٥٠ إلى ٨٠ سم . ساقها
وفروعها زياء البشرة . أوراقها بيضبة مستطيلة الزام الاخير
ازهارها زرقاء اللون . ثمارها مأكولة ، حجمها قدر
البيضة ، لونها يختلف باختلاف الضرب . منها الابيض
والاصفر والاحمر والازرق والبني والأسود .

٢٩٠٠ - **بادِنْجَان بَطْرِسِي***، **بادِنْجَان الغَابُون**
Solanum Pierreanum (S). Morelle du Gabon,
Olombé (F).

جنبة فرعاء كبيرة القد تعلو نحو ١٥٠ سم . أوراقها كبيرة
سنانية طحلاء اللون زياء النصل || أزهارها ليلكية ، ثمارها
مأكولة قليلة المادة الغذائية مستديرة الشكل مخددة ، لونها
الى القرمزي تعلو موج حطبي || مهددا بلاد الغابون في
افريقية .

٢٩٠١ - **بادِنْجَان تُوِي*** Solanum muricatum (S).
Guayavos (F).

جنبة فرعاء متوسطة القد معمرة تعلو نحو المتر . أوراقها
كاملة مستطيلة عابقة الخضار || أزهارها عديدة زرقاء
اللون . ثمارها مأكولة لذيدة الطعم . بيضبة الشكل يراوح
طولها من ٩ إلى ٨ سم . لونها الى الصفار التبي || مهددا
امريكة الجنوبية من بوليفيا الى المكسيك .

٢٩٠٢ - **بادِنْجَان كِيْتو، نَارَنْجِيْنَا**

Solanum quitoense (S). Morelle de Quito (F).
جنبة معمرة فرعاء كبيرة القد تعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠
سم . مهددا بلاد البيرو . أوراقها كبيرة ، قلبية الشكل ، زياء

والعشرين من شهر ايلول وتنتهي في اليوم الثالث من شهر
تشرين الاول || فاليوم الاول من الباحور العربية مثلاً
يدل على مجمل حالة الطقس في شهر آب واليوم الثاني عن
ايلول والثالث عن تشرين الاول والرابع عن تشرين الثاني
والخامس عن كانون الاول والسادس عن كانون الثاني
والسابع عن شباط || اما اليوم الاول من البواخير الغربية
والشرقية فيدل على مجمل حالة الطقس في شهر تشرين الاول
ثم تشرين الثاني فكانون الاول والثاني ثم شباط واذار ونيسان .

٢٨٨١ - **بادِجَان** Cnidium (S). Cnidion (F).
Cnidium (E).

جنس نباتات عشبية برية مرعوية معمرة من الشجاريات
وفصيلة الخيميات . اقليمها المناطق الجبلية . أوراقها
مركبة ريشية . ازهارها صيواني كثيف الاشعة . ازهارها
صغيرة القد بيضاء اللون . بزورها اسطوانية مجنحة .
يقال انها طيبة نقيعها ينفع الصدر .

٢٨٨٢ - **بادِرَّة، قَصْرَة** Gemmule (F).
هي برعمة الملقوحة في البزرة . تكون في رأس السويق
وتنمو باتجاه النور وبمعكس اتجاه الجذر .

٢٨٨٣ - **بادِرُنْجَبُويَة** Mélisse-Citronelle (F).
Lemon-balm (E).
اطلب ترنجبان .

٢٨٨٤ - **بادِرُوج** Basilic commun (F).
Common basil (E).
هو الحبق المعروف ، راجعه .

٢٨٨٥ - **بادِرْزَهْر، بَاكْزَهْر** Bézoard (F). Bezoar (E).
قال الانطاكى : حجر معدني يكون باقى الفرس .
وحيواني ينشأ في قلوب بعض الحيوانات || اجوده المشطب
الزيتوني الشكل الحيواني الضارب الى الصفرة || وهو
كالترياق مضاد للسموم .

٢٨٨٦ - **بادِسْتَر، بِيْدَسْتَر** Castor (F).
هو الحارود ، اطلبه . Castor, Beaver (E).

٢٨٨٧ - **بادِن** Créophage (F).
بادن ج . بواذن ، هي الدويبات والحشرات التي تتغذي
من اللحوم .

٢٨٨٨ - **بادِيَّات الاسدية** Phanéranthères (F).
Phaneranthous (E).
هي الازهار الظاهرة الاسدية .

٢٨٨٩ - **بادِيَّات الزَهْر** Phanérogames (F).
Phanerogamous (E).

اضف النباتات ذات الاعضاء التناسلية الظاهرة . يشمل
جميع النباتات التامة التجهيز الحاوية الاعضاء الرئيسية
الاربعة وهي الجذر والساق والورقة والثمرة .

٢٨٩٠ - **بادِيَّات اللَوَاح** Phanéranthes (F).
Phaneranthous (E).
هي الازهار الظاهرة الاعضاء التناسلية .

٢٨٩١ - **بادِيَّة، صَحْرَاء، قَفَر** Désert (F).
Desert, Waste, Wilderness (E).

هي كل بقعة من الارض ، مهما اتسعت مساحتها ،
لا تكفي امطارها لنمو النبات .

٢٨٩٢ - **بادَاوَرْد** Marrube (F). Morehound (E).
هو الفراسيون ، اطلبه .



بادنجان استرالي



بادنجان البیض



بادنجان بطرسى



بادنجان توكى

٢٩١٤ - **بَارُوسْمَه** *
Barosma (S).

Barosme, Barome (F). Barosma (E).

سمها الأمير مصطفى الشهابي «ثقيلة الرائحة» || جنس جنبات معمرة برية وزينية من العطريات وفصيلة السذابيات. مهدا أفريقية الجنوبية. وهي من النباتات الطبية الشائعة الاستعمال. أوراقها مقوية مهيجة هضامة. أشهر أنواعها الزراعية خمسة وهي:

٢٩١٥ - **باروسمه أنيقة** *
B. pulchella (S).

B. élégant (F).

٢٩١٦ - **باروسمه أهليلجية** *
B. ovata (S).

B. à feuilles ovales (F).

٢٩١٧ - **باروسمه عريضة الورق** *
B. latifolia (S).

B. à feuilles larges (F).

٢٩١٨ - **باروسمه مسننة** *
B. serratifolia (S).

B. à feuilles dentelées (F).

٢٩١٩ - **باروسمه مكسية** *
B. scoparia (S).

B. à balais (F).

٢٩٢٠ - **بَارُومِتْر** *
Baromètre (F). Barometer (E).

هو المرواز، اطلبه.

٢٩٢١ - **بَارُوسْمَة** *
Sporodesmium

جنس فطور مجهرية من عمارة الزحاميات وفصيلة اللطحيات. كائناته اسطوانية الشكل. شعبة الانقسام، قياسها ٢٠×٥٥ ميكرون || انواعه قليلة تنطفل على اوراق الدبج وعلى بعض القرعيات منها الخيار. فتوشم الاوراق ببقع مستديرة حنطية او غبراء اللون، قرمزية الختار. تسبب عطب وذبول النسيج المنحارة.

٢٩٢٢ - **بَارُيُوم** *
Baryum (F). Barium (E).

معدن ابيض فضي محدود الاستعمال الصناعي. وزنه (با) ثقله النوعي ٣,٨ وزنه الاتومي ١٣٧,٣٦ ينصهر في ٧١٠° سغ.

٢٩٢٣ - **بَارُز، بَارُزِي** *
Autour, Accipitre (F).

Goshawk (E).

جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات. انواعه عديدة منتشرة في أكثر اقطار العالم. معظمها كبير القد. طول اجسامها يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم. وبسطة سقطيها من ١١٥ الى ١٢٥ سم. جشها ربعة القوام. رؤسها مدورة، عيونها مفر، مناسرها حادة منعقة. سواقطها مستطيلة. اذنانها مستديرة. أرجلها طويلة. مخالبها حادة وقوية || والبازي حاد المزاج، خفيف الجناح، سريع الطيران. شديد الوثب مقدم || كنيته ابو الاشعث وايقو الهلول وابو لاجق وهو من أشد الطير تكبرا واضيقها خلقا. وفرخ البازي يدعى غطريفا. وقد يضرب المثل بالبازي. وقد قيل فيه اشعار كثيرة منها:

«اذا ما اعتر ذو علم بعلم فلم الفقه اولى باعتزاز
وكم طيب يفوح ولا كسك وكم طير يطير ولا كبناز»
وهو من الطير الضارة التي لا تهدف عن داجن او غير داجن تستطيع اليه سبيلا || انشاء تبيض اربع رفقات تحضنها وخذها نحو اربعة اسابيع || أشهر انواعه البازي والبازي الاشهب والاصهب والسحنون.

النصل، طحلاء اللون. ازهارها بنفسجية، ثمارها مأكولة لذينة الطعم سكرية المذاق، حجمها قدر البرتقالة.

٢٩٠٣ - **بَاذْ نَجَّان معروف** * ، **أُتْب، مَعْد**

Solanum melongena (S). Aubergine, Melongène (F). Aubergine, Egg-plant (E). Eierfruchtnachtschat ten, Eierfrucht (D). Petronciano, Petonciano, Melanzana (I).

نبات زراعي عديد الضروب التي تختلف بشكل ثمارها المأكولة. وهو جنبة ليفية السوق والعروق تعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. أوراقها كبيرة فارشة معتقة. ازهارها ابطية الارتكاز ثمارها مستطيلة او شبه كروية || تتكاثر بالبذر في مشاتل خاصة ثم تنقل الى مستقرها حيث تغرس على ابعاد متساوية في ربة متوسطة الاندماج غنية بالدبال وبالعناصر الغذائية.

٢٩٠٤ - **بَاذْ نَجَّالِيَّة** *
Solanaceae (S).

Solanacées (F). Solanaceae (E).

هي الفصيلة الباذنجانية من ذوات الفلقتين وحيدة القعالة انواعها كثيرة العدد يجمعها ٧٥ جنسا. منها برية سامة ومنها زراعية صالحة للاكل. معظمها نباتات عشبية حولية او محولة او معمرة. وبعضها جنبات وشجيرات || أشهرها الباذنجان والبندورة والبطاطا والفليفلة والتبغ... || أوراقها متناقية. ازهارها خشوية خماسية الفصل والبسات والاسدية احادية المياسم، ثنائية المبيض.

٢٩٠٥ - **بَارَاثِيُون** *
Parathion

حشور زراعي جزيل النفع يرتكز على مادة فعالة شديدة الوتق تقضي على الكثير من الحشرات الضارة || وهو من السوائل السريعة الانمياح بالماء محلوله يختلف باختلاف قوة الحشرات المقصودة.

٢٩٠٦ - **بَارَاة** *
Focométrie (F).

Focometry (E).

البارة قياس المسافات البؤرية المدة الى المرايا والعدسات الانسطة او محدبة او مقعرة او مفرقة او لامة.

٢٩٠٧ - **بَارُزِي** *
Emergent

٢٩٠٨ - **بَارُز الحَوْشَب** *
Bouleté (F).

Upright on fetlock-joint (E).

عيب في الخيل سببه بروز الحوشب.

٢٩٠٩ - **بَارُزْد** *
Galbanum

اطلب قة.

٢٩١٠ - **بَارُسْطَارِيُون** *
Verveine (F).

Vervain, Verbena (E).

اطلب رعي الحمام.

٢٩١١ - **بَارُض** *
البارض هو اول ما تخرج الارض من نبت. يقال اطلعت الارض بارضها.

٢٩١٢ - **بَارُوتْج** *
Cocotier (F). Coco-tree (E).

راجع نارجيل.

٢٩١٣ - **بَارُود ابيض** *
Nitro (F).


اطلب ملح البارود.



بَاذْ نَجَّان معروف



بَارُوسْمَه



بَارُومِتْر مسجل

٢٩٣٤ - **باسقة** Stratus
الباسقة السحابة البيضاء الصافية اللون (التاج).

٢٩٣٥ - **باسنة** Charrue, Soc (F).
هي سكة الحراثة. Plough, Ploughshare (E).

٢٩٣٦ - **باسية** Bassia (S). Bassie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الطلحيات. منبتها الهند الشرقية وافريقية الاستوائية || انواعه قليلة جميعها لبنية العصارة. اوراقها ضمية، تاجية، كبيرة، معتقة، جلدية، ملطاء. ازهارها هامية الارتكاز، فردية التجميع، طويلة الزناد، متدلّية، صفراء اللون أو حراء || أما العصارة اللبّنية التي تستخرج من اللحاء فيقال انها تشي من الامراض العصبية || اشهر انواعها ثلاثة وهي :

٢٩٣٧ - **باسية السمن***، شجرة الزبدة Bassia butyracea (S). Bassie beurrière, Arbre à beurre (F).
نوع من الباسية يكثر وجودها في بلاد النوبال، يستخرج من بزورها زبدة تدعى زبدة غلام (beurre de galam) للذيذة الطعم قبل ان تجف. وعند جفافها يتغير مذاقها ويتخذ طعم الشحم.

٢٩٣٨ - **باسية طويلة الورق** Bassia longifolia (S). Bassie à longues feuilles (F).
نوع من الباسية تزرع في البنغال ويستخرج من بزورها دهن مأكول وقد يستعمل في الانارة عند قدمه.

٢٩٣٩ - **باسية عريضة الورق** Bassia latifolia (S). Bassie à larges feuilles (F).
نوع من الباسية المرعوية تزرع بكثرة في البنغال. تستعمل كعلف للمواشي.

٢٩٤٠ - **باش** Améliorer (F). To ameliorate (E).
باش النبات حسنه وأصله. وأباشه: جعله يتحسن وجعله ينبت ويتأصل ليحود.

٢٩٤١ - **باشق** Accipiter (S). Epervier (F). Hawk (E).
جنس طير من عمارة البزاة وفصيلة الصقريات. انواعه عديدة لا تقل عن ٤٠ جميعها معتدلة القد رشيق القوام طوطا من ٣٥ الى ٤٠ سنتي. ثوبها الى السرة الرصاصية، صدورها غبراء اللون نمره وموشة، اذناها موشة بخطوط ممتزجة. عيونها صفراء وارجلها كذلك || والباشق حاد المزاج يغلب عليه القلق والزعزعة وهو قوي النفس خفيف الحمل ظريف الشئائل يصيد افخر ما يصيده البازي وهو الدراج والورشان || انشاء تعشش بين شجائيف وشجائب الاشجار، تبيض من اربع الى ست رفئات تحضنها ثلاثة اسابيع || اشهر انواعه الباشق المعروف والبيدق.

٢٩٤٢ - **باشق معروف***، طوط Accipiter nisus (S). Epervier commun, Emouchet, Tiercelet (F). Sparrow hawk (E).
طائر من الباشق طوله نحو ٣٥ سم. جسمه رشيق القوام ثوبه جلبي التوشم. صدره انمر الرقشة الغبراء. عيناه ووجلاه الى الصفار الزاهي || موطنه الشرق الادنى واروبة الغربية. قوته العصافير والقواغم والعظام والحشرات. وهو مسن الكواسر الضارة لانه شديد الاذى يفتك بالعصافير والطيور الداجنة.

٢٩٢٤ - **بازدار** Fauconnier (F). Falconer (E).
بازدار ج. بزادة. من تعاطى تدريب الطيور الكواسر على القنص.

٢٩٢٥ - **بازر، حبيب** Granivore (F). Granivorous (E).
البازر والحبيب واحد وهو الذي يعيش على الحبوب ج. بوازر وحوبيب.

٢٩٢٦ - **بازل** Dromadaire (F). Dromedary (E).
البازل هو البعير الذي فطر ثابه اي انشق وذلك يكون في السنة الثامنة من عمره. ج بزل.

٢٩٢٧ - **بازن** Pasang
راجع بزل.

٢٩٢٨ - **بازي، صقر باز، شاه باز، لويحق** Astur palumbarius (S). Autour commun, Autour des palombes (F). Common goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة طوله نحو ٦٠ سم. وبسطته ١٢٠ وهو مستدير الرأس الاسفع، اخر العينين، اصفر الرجلين، اديس الظهر والمنكبين والسقطين والذنب، ابيض الصدر الانمر الموشم. يعتبر من اعنف الكواسر واضيفها خلقاً. يألف الاحراج الكثيفة النائية. وهو شره هم لا يعف عن شيء. يدن في اعالي الاشجار الباسقة. انشاء تحضن وحدها من رفنتين الى ٣ رفئات.

٢٩٢٩ - **بازي اشهب*** Astur albidus (S). Autour blanc (F). White goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة، اشهب الثوب، انمر الصدر. موطنه استرالية.

٢٩٣٠ - **بازي اصهب*** Astur badius (S). Autour brun (F). Black goshawk (E).
طائر من البزاة كبير الجثة، اصهب الثوب، انمر الصدر، كثيف التوشم، موطنه البلاد الاسيوية.

٢٩٣١ - **بازيلة*** Basella (S). Baselle (F).
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة البازيليات وهي معظمها بقلية عارشة. اوراقها متعاقبة، معتقة، بيضية. ازهارها ابطية سنبلية. ثمارها عنبية سوداء اللون، قرمزية العصارة المستعملة في بعض العلاجات الطبية اخصها الجلدية. اوراقها مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ || اشهر انواعها البازيلة البيضاء ثم الحمراء التي تزرع في الصيف.

٢٩٣٢ - **بازيلة بيضاء، إسبانخ أبيض، ملابار** Basella alba (S). Baselle, Epinard de Malabar (F). Malabar nightshade, East Indian spinach (E). Malabar spinat, Weisse burblume (D). Basella, Basella bianca, Spinacio della China (I).
نوع من البازيلة الزراعية البقلية، تزرع لاوراقها الصالحة للأكل. تستعمل استعمال الاسبانخ.

٢٩٣٣ - **بازيليات** Basellaceae (S). Basellacées (F). Basellaceae (E)
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين القديمة القصابات. اجناسها وانواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة وهي غريبة الشبه بالفلقيانيات والرجليات والبطباطيات.



بازي اشهب



بازي اصهب



بازيلة



باسية السن



باشق معروف

حلزونية الشكل . قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . قوائمها مدببة الاطراف الحادة . ملاقطها خليعة . قوائمها وملاقطها شاذخة . اعضاء الجانب الانسي اكبر قدراً من اعضاء الجانب الوحشي || لحومها مأكولة مستحبة الصنف .

٢٩٥٦ - باغوريات ٥ Paguridae (S).


Paguridés (F). Paguridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل المحرمان . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم باستثناء القطبية || اجسامها متفاوتة الحجم . جميعها شبه بيضية الشوزن ، ضليعة الملاقط الكبيرة || اشهر اجناسها الباغور .

٢٩٥٧ - باغيتات ٥ Actaeonidae (S).

Actéonidés (F). Actaeonidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل غلظيات الحياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة وانبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصداقها متباينة الاشكال والاحجام ، يكثر فيها الاهليلجي ، جميعها مألوسة ، بعضها محلزون الاعقاب . ألوانها زاهية متباينة تراوح من الاشقر الى الجؤوي || اعرف اجناسها واشهرها الباغيا والظفوف والهنيك .



باغا

٢٩٥٨ - باقية، كاماة Baphia (S).

Baphier, Bois de Cam (F). Cam-wood, Bar-wood (E). Glänzender färberbaum (D). Bafia (I).

جنس اشجار برية من فصيلة القرنيات القراشية . مهدبا البلاد الحارة اخصها افريقية . انواعه خمسة . خشبها اقل من الماء شديد الصلابة . رائحته فواحة تشبه البنفسج ويستخرج منه مواد صيفية حمراء اللون .

٢٩٥٩ - باقى Débet (F). Debit,

Balance of an account (E).

الباقى هو ما يلزم دفعه بعد المحاسبة .

٢٩٦٠ - باقة Bouquet de fleurs (F).

Bunch of flowers (E). ضمة من الزهر .

٢٩٦١ - باقعة Oiseau des marais (F).

Moor-fowl (E). كل طائر يرد المستنقعات دون المشارع .

٢٩٦٢ - باقيل ٥ Léguminivore (F).

Leguminivore (E).

الباقيل من كان قوته البقول .

٢٩٦٣ - باقيل Anabase (F).

Berry bearing glosswort (E). هو السران ، راجع انا باز .

٢٩٦٤ - باقلاء، باقلى Féve (F). Broad bean (E).

هو الفول ، اطلبه .

٢٩٦٥ - باقلى قبطي Néloambo (F).

Sacred bean (E).

اطلب نيلوفر قبطي .

٢٩٦٦ - باقورة Bouverie, Vacherie (F).

Cattle-shed, Cow-house, Byre (E).

هو المزرع الخاص بالبقر .

٢٩٤٣ - بَاضٌ، سَرَأٌ، مَتَح Pondre (F).

باض للطير يسراً للسك ومتح للحشرات . To lay (E).

٢٩٤٤ - بَاطِس Ronce (F). Bramble,

هو العليق ، اطلبه . Black berry-bush (E).

٢٩٤٥ - باطيني Endogé, Hypogé (F).

Endogéal, Hypogéal (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو موجود في باطن الارض او التربة .

٢٩٤٦ - باطيني الخياشيم Endobranche (F).

Endobranchial (E).

نعت تعريفي يطلق على كل من كانت خياشيمه داخلية الارثكاز .

٢٩٤٧ - باطون Béton (F). Beton (E).

مزيج من الاسمنت والرمل والقضة والماء ، يستعمل في البناء .

٢٩٤٨ - باطون رَضْمِي Béton cyclopéen (F).

Kind of concrete (E).

هو الباطون العادي زيد عليه الرضام .

٢٩٤٩ - باطون مُسَلَّح Béton armé (F).

Reinforced concrete (E).

هو الباطون تتخلله قضبان من حديد لزيادة متانته .

٢٩٥٠ - باطية Dame-jeanne (F).

Demijohn, Carboy (E). هي الدجاجة .

٢٩٥١ - باطية Cratère (F). Crater (E).

الباطية كوكبة نجوم جنوبية الموضع شكلها كالكوب العظيم || عدد نجومها تسعة جميعها من المرتبة الرابعة وما دونها . والعرب تسمي هذه الكواكب « المتلف » .

٢٩٥٢ - باع Brasse (F). Fathom (E).

مقياس للطول يوازي ١٦٢ سم . ج ابواع وباعات .

٢٩٥٣ - باعِث، حافِيز، دَافِيع Mobile, Motif (F).

Mobile, Movable, Moving (E).

هو الغاية الخاصة التي يفسر بها عمل جائز او غير جائز .

٢٩٥٤ - باغنا * Actaeonella (S).

Actéonelle (F). Actaeonella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة البافيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداقها اهليلجية الشكل ، مألوسة ، شقراء اللون او بنية ومنها انواع مبقجة بالابيض وغيرها بالجؤوي .

٢٩٥٥ - باغور * Pagurus (S).


Pagura, Bernard l'ermite (F).

Hermit-crab, Pagurian (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات وفصيلة الباغوريات انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الشطوط وتعيش ضمن اصداق البوق الفارغة فتجرها وراءها اينما سعت وكيفما تحركت وقد تبدلتها باكبر منها بعد كل انسلاخ || اجسامها متباينة الحجم التي تختلف مع الانواع || بطونها عادمة الدروع ،



باغور



باقوع الاكيدنيا




باقوع العرفج



باقية



باكاس



باكوليت



بال



بالوعة

رباعيات الخياشيم وفصيلة العمونيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من متحجرات الازمنة الغابرة يكثر وجودها في الطبقة الطباشيرية || جميعها مستقيمة الخط ، وشعيرة الشكل . اطولها تراوح من ٣ الى ١٥ سم .

٢٩٧٥ - **بَال** * Balaena (S). Baleine (F). Whale (E).
جنس حيوانات لبونة مائية من فصيلة الباليات ورتبة الحيتان . انواعه ٦ جميعها كبيرة الجثة ضخمة الرأس ، عادمة الاسنان وانزعاف الظهرية . حلاقيها ضيقة لذلك فانها لا تقتات الا بالاسماك الصغيرة والقشريات || تعيش جماعات ، وتتمر كثيراً . انثاها تضع من جرو الى جروين || تصاد من اجل دهنها المعروف بزيت السمك وعظامها (البالين) الشائعة الاستعمال الصناعي || انواعه : بال الجنوب وبال الشمال وبال المحيط ، والبتان والبال .

٢٩٧٦ - **بَال الجنوب** Balaena australis (S).
Baleine australe (F). Austral whale (E).
موطنه القطب الجنوبي وبحار الجنوب . وهو كبير الجثة غليظها ، طوله يراوح من ٢٠ الى ٢٤ م . يتميز برأسه القصير العريض .

٢٩٧٧ - **بَال الشمال** Balaena mysticetus (S).
Baleine franche, B. boréale (F). Northern whale (E).
موطنه القطب الشمالي وشمال المحيط الاطلسي وهو اعظم انواع البال واضخمها جثة كما انه اكبر حيوان معروف . طوله يراوح من ٢٥ الى ٣٠ م . وزنه من ١٥٠ الى ٢٠٠ طن .

٢٩٧٨ - **بَال المحيط** Balaena biscayensis (S).
Baleine de Biscaye, Sarde (F). Biscay whale (E).
موطنه المحيط الاطلسي وقد شوهد مراراً في البحر الابيض المتوسط . وهو كبير الجثة ذلق الطرف ، طوله يراوح من ١٦ الى ٢٠ م .

٢٩٧٩ - **بالاخرى ، بالاولى** A fortiori
ويقال بالبحري وبقوى حجة .

٢٩٨٠ - **بالح** Terre stérile (F). Sterile land (E).
البالح : الارض التي لا تنبت شيئاً (اللسان) .

٢٩٨١ - **بالغ ، مذك** Adulte (F). Adult (E).
هو من الخيل الفرس الذي تم نموه واكتملت اسنانه .

٢٩٨٢ - **بالميمون** Tamier commun (F).
هو الفاشرشين المبذول ، اطلبه . Black bryony (E).

٢٩٨٣ - **بالوعة** * Delphinapterus leucas (S).
Delphinaptère blanc, Bélouga, Béluga (F).
White whale (E).

حيوان بحري ولود لبون من فصيلة القوقيات ورتبة الحيتان . اعطائه بحار الشمال والقطب . ملجئه الحياتي جماعي . قوته الرخويات واخصها الحبار || جسمه شبه اهليلجي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٦٠٠ سم . ثوبه الى البياض الاغبر . مسكه عادم الثعول . رأسه مستغلق الشكل ، مقطوم الخطم المستدير الطرف . اسنانه كبيرة متائلة في الفكين . عيناه صغيرتان ماحتان . نيسه نفرة تتوسط الجبهة . ظهره عادم الزعانف . زعنفته الصدرية صغيرة القد مجدافية

٢٩٦٧ - **باقوع** * ، **تبقيع** ، **تبقيع** Fusicladium
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات . جريه الكنيديه اسطوانية ، قصيرة ، منتصبة . تعلوها كنانة بيضيه او اجاصيه الشكل ، سمراء او زيتونية اللون ، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه عديدة تركب مختلف اعضاء النبات فتسبب الوصم المعروف بالتبقيع .

٢٩٦٨ - **باقوع الاكيدنيا** *
Fusicladium eriobotryae (S). Tavelure du néflier du Japon (F).
فطر مجهرى يركب اوراق الاكيدنيا فيعطبها . مظهره الخارجي يقع مستطيلة سمراء اللون ، سوداء الخنار تركب النصل على صفحته العليا فتعطب النسيج وتقودها الى اليباس . وقد يصيب الثمار فيذوبها قبل ادراكها || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الفعالة المجربة كالسوائل السلفوكسية وغيرها .

٢٩٦٩ - **باقوع العرفج** *
Fusicladium pyracanthae (S). Tavelure du coto-neaster (F).
فطر مجهرى يركب العرفج في اوراقه وافنانه وثماره . مظهره الخارجي بثور سمر تركب فصل الاوراق وقروح نافضة تعلو لحاء الافنان ويقع تبدو رمادية ثم فحمية تصيب الثمار فتعطبها وتقودها الى الانفلاق واليباس || يكافح باستعمال احد الفواطير المركزة على النحاس .

٢٩٧٠ - **باقية** * ، **بيقة** ، **بيقية** Vicia sativa (S).
Vesce, Pasquier, Barbotte, Bisaille (F). Common vetch, Lints, Tare (E). Futterwicke (D). Veccla coltivata, Veccla comune (I).

نبات عشبي حولي من فصيلة القرنيات القرشية . ضروبه عديدة ، جميعها قطانية تعلقها الماشية بشبهة . وهي من النباتات المصلحة التي تخصب التربة اذا طمرت فيها .

٢٩٧١ - **بالك** Couvrir, Saillir (F).
To cover, To serve (E).
يقال بالك الحمار الاتان اذا نزا عليها .

٢٩٧٢ - **باكاس** * ، **كلوجنيس** Cœlogenys (S). Pacas

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الشرديات . انواعه المعروفة قليلة تميز باجسامها الضخمة الثقيلة . طولها نحو ٦٠ سم . وارتفاعها ٣٣ . رؤوسها غليظة . عيونها كبيرة . اذانها صغيرة . اذانها جداع . قوائمها قصيرة . اصابعها خاسية . اطرافها قوية حادة || موطنها يمتد من المكسيك الى البراغواي . تسرح في الليل . قوتها الاعشاب والجنود والشمام والبطيخ وقصب السكر ... اجحرتها رداء فسيحة الارحاء تحفرها على عمق ١٥٠ سم . مدخلها ومخرجها نفق واحد طوله من ٥ الى ٦ امتار || انثاها تضع جرواً واحداً في السنة ترضعه وتربيته نحو اربعة اشهر .

٢٩٧٣ - **باكورة ، معجالة ، بكيرة** Primeur (F). Early vegetables (E).

هي البقول والفواكه وازهار التزيين التي تدرك قبل الاوان المعتاد .

٢٩٧٤ - **باكوليت** * ، **بكوليت** Baculites (S). Baculite (F). Baculites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل



بامية



بان



باهرة الملكة فيكتوريا



باهرة هندية

٢٩٩٠ - باهرة Agave

جنس نباتات برية وزراعية ، معمرة ، من فصيلة النرجسيات . انواعه زهاء ٢٧٥ . جذورها ليفية التركيب . سوقها شمراخية . اوراقها لحمية ، حزمية ، مستطيلة ، مدببة العقصية . ازهارها مختلفة الالوان ، محمولة على شماريخ بسيطة او متشعبة || اشهر انواعها ما يلي :

٢٩٩١ - باهرة الملكة فيكتوريا *

Agave Victorlae-Reginae (S). Agave de la reine Victoria (F).

نوع من الباهرة . شمراخها يعلو نحو ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . نصلها سميك النسيج الجامد الصلب ، لونه الى الخضار الكمد يعلو تبقيج ابيض ، حثاره اغبر اللون ، شذام عقصته اسود || عنقودها الزهري هرمي الشكل يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم .

٢٩٩٢ - باهرة امريكية ، صبارة

Agave americana (S). Agave d'Amérique (F). American Aloe (E).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو من ٥ الى ٨ امتار ، اوراقها تطول من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . نصلها الى الخضار الازرق . حثاره محدب الحافة البيضاء او الصفراء اللون . شوكة اعقف لاقط . عقصته تنتهي بشوكة غليظة تطول نحو ٣ سم . || عنقودها الزهري هرمي الشكل ، كبير القد . تزرع لاليافها . وتستخدم كسياجات حية .

٢٩٩٣ - باهرة فيرجينية Agave Virginica (S).

Agave de Virginie (F).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها حولية تعد من ٨ الى ١٥ ، نصلها يطول نحو ٤٥ سم . ويعرض نحو ٥ سم . وهو محدب الصفحة . عابق الخضار يعلو تخطيط احمر || سبلته الزهرية متقاربة الفواصل كثيفة التجميع تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .

٢٩٩٤ - باهرة ليفية Sisal

راجع سيزال .

٢٩٩٥ - باهرة مزدوجة الزهر Agave geminiflora (S).

Agave biflora (F).

نوع من الباهرة العادمة الساق . اوراقها اسلية الشكل تطول من ٤٠ الى ٩٠ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ مم . نصلها ملس البشرة ، عابق الخضار ، لين الختار ، ينتهي بهبة سمراء اللون تغلظ نحو ٥ مم . || شمراخها الزهري دقيق ونحيل تعلو سيلة رهلة ، ازهارها مزدوجة التجميع .

٢٩٩٦ - باهرة ملطخة Agave maculosa (S).

Agave tacheté (F).

نوع من الباهرة ، شمراخها يعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها تعد من ٢٠ الى ٢٥ . نصلها يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . ويعرض نحو ٢ سم . وهو مخدد الصفحة بحري اللون يعلو تلطيخ اسمر . سبلته الزهرية تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم .

٢٩٩٧ - باهرة هندية * Gloriosa superba (S).

Méhonique du Malabar, Superbe de Malabar (F). Climbing lily, Superb lily, Malabar glory lily (E). Malabarische methonika (D). Narciso superbo, Superba del Malabar (I).

نوع من الباهرات وهو نبات بصلي معمر عارض . اوراقه متعاقبة ، رحيمة النصل تنتهي بحوالق دقيقة مستطيلة .

الشكل وهما اثنتان يمين ويسرى . زعنفته الليلية فارقة ، مستندقة الاطراف || يصاد لمسكه وزيته . لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه .

٢٩٨٤ - باليات Baleinidés (F).

Balaenidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية لبونة من مرتبة ريشيات الاحناك ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة خمسة : بال الجنوب وبال الشمال وبال المحيط وبال اليابان المعروف بالوال وبال الصغير المعروف بالبتان .

٢٩٨٥ - بامية * Hibiscus esculentus,

Abelmoschus esculentus (S). Bamia, Gombaud, Gombo, Ketmie comestible (F). Gombo, Gobbo, Okra (E). Bamia, Gombo, Ocker, Ocher (D). Bamla, Gombo, Corna di Grecl (I).

جنبة صغيرة حولية زراعية من فصيلة الحيازيات ، مهدا امريكة الجنوبية . ساقها منتصب ، ليفية ، زباء ، ترتفع نحو المتر . اوراقها كبيرة ، متعاقبة ، متعاقبة : متعاقبة ، كفية النصل الازغب ، عابقة اللون الاخضر . ازهارها كبيرة القد ، ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، قصيرة الزناد ، خماسية البتلات الارجوانية الرباط والصفراء الطرف . ثمارها قرنية . بزورها صغيرة مستديرة || تزرع في البلاد الشرقية والاروية لثمارها المأكولة طبخاً . وتزرع في امريكة لثمارها ولاليافها التي يستخرج منها نوع من الورق المعروف باسم غومبو (Gombo) .

٢٩٨٦ - بان * ، يسر ، يسار ، شوع ، سيماع

Moringa aptera (S). Moringe aptère, Ben, Ben aptère (F). Ben-oil tree, Horse radish tree (E). Behanbaum (D). Ben, Noce di behen (I).

شجرة حرجية من فصيلة الباليات . اعطائها المناطق الاستوائية والاسيوية والافريقية . اوراقها مركبة بيضية الشكل صغيرة القد . ازهارها زنادية التركيب ، عكولية التجميع ، ابطية الارتكاز . فواحة العرف العطري ، ثمارها قرون اسطوانية مستطيلة ليفية النسيج تغلف من ١٢ الى ١٥ حبة . حبا كالحمص شكلاً وقدأ وهو اغبر اللون طيب الرائحة يستخرج من لبه مادة زيتية مستحبة الطعم والعرف تعرف بدهن البان . وهي غير قابلة للتأكسد والحموضة ، ومن خواصها المشهورة قوة قابليتها على اكتساب الروائح العطرية مما يجعلها تدخل في ثني التراكيب العطرية الصناعية || قال ابن سينا : ان لب البان ينفع من البرص والكلف والبهق وآثار القروح والتآليل || ضروبه عديدة اشهرها البان الدهني (M. pterygo perma) .

٢٩٨٧ - بانسيه Pensée (F). Pansy (E).

راجع بنفسج الثالوث .

٢٩٨٨ - باليات Moringaceae (S).

Moringacées (F). Moringaceae (E).

فصيلة شجر البان قريبة الشبه من الكبريات والقرنيات . انواعها عديدة جميعها اشجار وشجيرات خشوية الازهار .

٢٩٨٩ - باهرات Methonicées (F).

سيط نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . اجناسه لا لا تجاوز الاربعة جميعها من نباتات البلاد الاستوائية الاسيوية والافريقية . اشهر انواعها الزينية الباهرة الهندية الرائعة الجمال .

Melonbaum (D). Papaio, Fico del iole, Papaia (I). ضرب من البياض مهدد البلاد الاستوائية وقد عمت زراعته جميع البلاد الحارة وهو يعيش ويشمر على الساحل اللبناني في بعض المواقع الدافئة. ساقه اسطوانية منتصبة سرحة عريضة تملو نحو ١٠ امتار تحمل في قمتها بعض الاوراق الكبيرة. اوراقه نعتقة غليظة الزناد المستطيل. نصلها كفي الشكل، كبير القد، سباعي التفصيص، كثير التفريض، اطحل اللون، بحري المواج. ازهاره خماسية البتلات فستقية اللون. الذكورية منها عشكولية التجميع بحيلة القدر اما الانثوية فعذقية التجميع غليظة القدر. جميعها ابوية الارتكاز || ازهاره يستمر من ٨ الى ٩ اشهر. ثماره اجاصية الشكل قدرها قدر الشام الكبير وزنها يراوح من ١٠٠٠ الى ١٠٠٠٠ غ. قشورها عند نضجها تبدو فستقية اللون خراء المواج. لبها اصفر اللون، جامد المكسر، غزير العصارة، سكري الطعم، مستحب المذاق. خافت العرف الخاص. بزوره بيضية الشكل، ليفية القشرة المنعجة السوداء اللون وهي حريفة الطعم كباوية || يستعمل كالثام ومنهم من استعمله كالبطاطا وهو ينفع المعدة وينشط الهضم || يستخرج من ساقه واوراقه وقشور ثماره عصارة لينة بيضاء اللون تدعى صمغ البياض او البياضين او الكاريسين (Papain ou Caricine) تستعمل استعمال البيسين.

٣٠٠٧ - بَبَاطِيَّات، بَبَايَوِيَّات (S). Caricaceae (S). Caricacées, Papayacées (F). Caricaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبط من فصيلة الالاميات. اشجارها عديمة الاغصان، جذعية الساق الجرداء كالنخل. اوراقها منعقة كفية. ثمارها بطيخية، خماسية او سباعية الاضلع. بزورها بيضية الشكل منعجة القشرة السوداء.

٣٠٠٨ - بَبَتُون، هَبَتُون (S). Peptone هي المواد الاحية المهضومة او التي حولتها خيرة الهضم.

٣٠٠٩ - بَبَر، بَبِير (S). Tigre (F). Tiger (E). جنس حيوانات مفترسة من فصيلة السنوريات ورتبة اللواسم. موطنها الشرق. انواعها ثلاثة جميعها كبيرة الجثة، يراوح طولها من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم. وارتفاعها من ٨٠ الى ١٠٥. اما وزنها فن ١٢٠ الى ٢٠٠ كيلو. اثنائها مجزعة بخطوط سود. بطونها بيض اياطها صناعية. ظهورها الى الصهبة تعبق مع اقترابها من الشيخ.

٣٠١٠ - بَبَر الْجَزُر (S). Tigre Sondaicus (S). Tigre de la Sonde (F). نوع من البير، موطنه جزر الزايج والارخبيل وهو اصغر جثة من البير الهندي لكنه اشرس خلقاً وأحد مزاجاً.

٣٠١١ - بَبَر الْمُنْغُول (S). Tigris Mongolicus, T. Amurensis (S). Tigre de l'Amour (F). نوع من البير، موطنه بلاد المنغول وسيبيرية وهو متوسط القد لا يختلف عن الهندي الا باعتدال الاستطالة والعلر وبشوبه الاكثر بياضاً وصهبة.

٣٠١٢ - بَبَر الهند، بَبَر سُلْطَانِي، شير (S). Tigris regalis (S). Tigre royal, T. Impérial (F). نوع من البير وهو اكبرها جثة واحسنها خلقاً وأكلها انسجماً. يعادل الاسد الشرقي في عظم الجثة والقوة والبطش.

ازهاره كبيرة القد محورية الارتكاز محمولة على معاليق متدلية || اوراقه مرة المذاق تستعمل كملاخ قابض. يصلته كرهية الرائحة، سامة || يعتبر من اجل النباتات التزيينية المركنية لكنه يخشى المواقع الباردة. كما وانه يرغب في الاتربة الدبالية الحارة.

٢٩٩٨ - بَاهِرَة يُوْكِيَّة الْوَرَق *

Agave yuccifolia (S). Agave à feuilles de Yucca (F). نوع من الباهرة، اشجارها يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها تطلو من ٤٥ الى ٧٥ سم. نصلها يزاوي الصفحة، عابت الخضار تملو نمشة شمراء، حثارة مسن الحافسة، اسنانه دقيقة شائكة || سبلتها الزهرية كبيرة القد مستطيلة.

٢٩٩٩ - بَاوَبَاب (S). Baobab راجع بوباب.

٣٠٠٠ - بَاوُلُونِيَا، بَاوُلُونِيَا، بُولُونِيَا

Paulownia Impérial (F). شجرة تزيينية من فصيلة الخنازيريات معقودة التعريف على اسم الاميرة انا باولونيا ابنة القيصر الروسي بولص الاول. مهدها اليابان حيث تعرف باسم «كيري» وهي بحيلة الشكل، متوسطة الحجم، سريعة النمو. اوراقها متقابلة، منعقة، قلبية النصل تطلو نحو ٣٠ سم. ازهارها عشكولية التجميع، زرقاء اللون، بنفسجية المواج تظهر وتضع قبل البلاج الاوراق.

٣٠٠١ - بَاكِير (F). Inculte (F). Uncultivated (E). هو لما بار من الارض فلم يعمر بالفرس والزرع. ج بور. يقال بارت الارض: لم تزرع.

٣٠٠٢ - بَالِرَة (F). Friche (F). Waste or fallow land (E). الارض البائرة والبور هي التي تركت بلا زرع لسبب ما.

٣٠٠٣ - بَالِق (F). Sans-prix (F). Without price (E). البائع هو ما لا ثمن له.


٣٠٠٤ - بَبَاج *٥

Achirus (S). Achire (F). Achirus (E). الواحدة بباجة. جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة جانبيات العم. انواعه المعروفة ثلاثة، اعطائها بخار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها مبططة، اهليعية الشكل تطلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. رؤوسها صغيرة، مستديرة الاطعام. تتميز بخلوها من الزعانف الصدرية اما الزعانف الخوضية فصغيرة. وزعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة قاطبة تتصل بالدليية || لحومها جيدة الصنف لذيلة الطعم.

٣٠٠٥ - بَبَاط، بَبَايَا (F). Papayer (F). Papaya (E). نوع من الكريكة من فصيلة البياضيات. مهده امريكة الاستوائية وقد انتشرت زراعته في جميع المناطق الحارة والاستوائية من العالمين القديم والجديد || ضروبه المعروفة كثيرة العدد اشهرها البياض الزراعي المأكول الثمار، اطلبه.

٣٠٠٦ - بَبَاط زِرَاعِي، كَرِيكَة بَبَايَا، دَبَاء الهند، عَجَزُور اَفْرِيقِي، عَنَب هندي

Carica papaya (S). Papayer, Arbre de melon (F). Papaya, Papaw apple, Melon tree (E). Papayabaum.



بَاهِرَة يُوْكِيَّة الْوَرَق



بَاوُلُونِيَا



بَبَاج



بَبَاط زِرَاعِي



بَبَر الْجَزُر



بَبَر الْمُنْغُول



بَبَر الهند

٣٠١٩ - ببغاء السنغال * ، ببغاء شهباء الرأس
Paeocephalus senegalus (S).

Perroquet du Sénégal, Perroquet à tête grise (F).

طائر من الببغاء موطنه بعض مناطق افريقية الاستوائية
أخصها السنغال . يألف الغابات والمواقع الرطبة . ملجئه
الحياقي جماعي . فوجه يراوح من ٣ الى ٥ أزواج . قوته
النار والحبوب || ثوبه جميل الالوان الزاهية . رأسه وعنقه
الى الشبهة العابقة الزرقاء الموج . ظهره وجناحه وصدره
الى الخضار الاليس الجميل . بطنه وافنيه الى الصفار
الكبريتي ويعلوه في وسط بطنه موج احمر . متفاده ورسناه
واصابه الى الرعدة السمره || يألف القفص لكنه يقتبس
الكلام بصعوبة .



بيري الاجاص



بيري

٣٠٢٠ - ببغاء خضراء
Perroquet vert (F).

طائر من الببغاء مشهور باسم اماروكة ، اطلبه .

٣٠٢١ - ببغاء رمادية
Perroquet cendré (F).

طائر من الببغاء مشهور باسم جاكو ، اطلبه .

٣٠٢٢ - ببغائية
Psittacosis (S).

Psittacose (F). Psittacosis (E).

مرض معد يصيب الببغاء وقد ينتقل الى الانسان سببه
بسيلوس نوكار . عوارضه حتى تقود الى الانحطاط والوهن
مع التهاب الشعب .



ببغاء السنغال

٣٠٢٣ - ببغاة * ، ببغاء ، ببغاء
Psittacus (S).

Perroquet (F). Parrot (E).

جنس طير من فصيلة الببغاوات وفئة الببغاء الكبيرة الحجم .
انواعه عديدة جميعها متراكبة الالوان الجميلة الزاهية . منها
انواع شهيرة باقتباسها الكلام تسمه فتدده وتعيده . انهمها
وارقاها الانواع الافريقية .

٣٠٢٤ - ببغاوات
Psittacidae (S). Psittacidae (F).

Psittacula (E).

فصيلة طير الببغاء من رتبة الجوزيات . اجناسها وانواعها
كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها المناطق
الحارة . والببغاوات تقسم الى فئتين الببغاء والدرة . فالببغاء
تشمل الطيور الكبيرة الحجم ، اما الدرة فطيورها صغيرة
القدم .

٣٠٢٥ - ببليش
Peplis (S). Péplide (F). Peplis (E).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة الخنائيات .
انواعه قليلة العدد اكثرها من نباتات الاراضي الرطبة .
اعما انتشاراً ببليش الماء .



ببغاء

٣٠٢٦ - ببليش الماء *
Peplis portula (S).

Péplide, Peplion, Pourpier sauvage (F). Common
water purslane (E). Echte bachburgel (D).
Porcellanetta (I).

نبات عشبي حولي بري من الخنائيات . اوراقه كاملة
متماثلة . ازهاره ابطية الارتكاز ، فردية التجميع ، لاطئة ،
بيضاء اللون خضراء الموج . يكثر في المناطق والاراضي
الرطبة . طعمه قريب من طعم البقلة ويؤكل مثلها .



ببليش الماء

٣٠٢٧ - ببوان
Babouin (F). Baboon (E).

هو قردوح ببوان ، اطلبه .

ثوبه مجزع بخطوط سود . بطنه ابيض اللون اصفر الموج .
ايطلده الى الصهبة الشقراء . ظهره عنابي شديد اللمعة .
اعطانه الهند وجوارها .

٣٠١٣ - ببيري الاجاص * ، نمر الاجاص

Tingis pyri, Stephanitis pyri (S). Tigre du poirier (F).
Pear lace bug (E). Birnbaum-Netzwanze, Birn-
blattwanze (D).

حشرة مضرة تركب اشجار الاجاص وتوقع بها اشد الأذى .
وهي من فصيلة البيريات ورتبة نصفية الاجنحة . تكثر
في لبنان وسورية . تكالغ باستعمال بعض الحواشير النشيطة .

٣٠١٤ - ببيري السرمق ، عتاج السرمق

Plesma quadrata (S). Punaise des arroches (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البيريات ورتبة مختلفات الاجنحة .
جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم . ثوبها الى الحنطي
الاغبر . بطنها ومدتها الى الحمرة . رأسها مطوق بالاسمر
البني . خطمها معتدل الطول . عينها صغيرتان . زباناها
الى الحنطي الاغبر . كوسلها كثيف التثير الاسمر . حجفتها
صغيرة مزوانية . ظهرانها اغبر . قشرانها شفاف . قوائمها
حنطية || مرتعها السرمقيات اخصها السرمق والشوندر .

٣٠١٥ - ببيري ملطخ ، عتاج ملطخ

Galeatus maculatus (S). Galéate maculé (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البيريات . جسمها مبطل ، يطول
نحو ٥ مم . رأسها صغير الحجم ، حنطي اللون ، اسود
الطوق . معتدل الطول . زباناها كثيفا الملب القصير .
عينها صغيرتان . كوسلها وحجفتها الى السمر السوداء
يعلوهما خطم نفسي ابيض يقطب الكوسل والحجفة . بطنها
ومدتها الى السمر . قوائمها حنطية || لها جيلان في الحول .
مرتعها اوراق فصيلة المركبات .

٣٠١٦ - ببريات
Tingidae (S). Tingidés (F).

Lace bugs (E). Gitterwanzen (D).

فصيلة حشرات من رتبة نصفية الاجنحة . اجناسها وانواعها
عديدة جميعها صغيرة القد وازفة الجناح . وهي خاضعة
خائبة تعيش على اوراق النبات وافنائه وجذوعه . معظمها
من الحشرات الضارة . اعرفها واكثرها شيوعاً بيري الاجاص .

٣٠١٧ - ببريئة * ، عين الطاووس ، زنبق النمر

Tigrida (S). Tigridie, Œil de paon, Lis de tigre (F).
Tiger flower, Shell-flower (E). Tigerlilie, Echte
tigerblume (D). Tigridia, Fior di tigre, Occhio di
pavone (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . سوقها ليفية
التركيب ، لحمية السيق ، مخروطية الشكل . اوراقها
متعاقبة مستطيلة ، محجنة . تصلها جامد الصفحة ، مزغب
الاطراف . ازهارها جميلة الشكل ثلاثية البتلات والبتلات
بتلاتها كبيرة القد متدحمة الانتشاب . الوانها متداخلة
تكثر فيها الحمرة القاتية حتى مستوى الكأس ثم الابيض
المجزع والمرقط بالاحمر والاصفر والبفسجي || انواعها
المعروفة سبعة جميعها تزيينية .

٣٠١٨ - ببسون ، هضمين
Pepsine (F). Pepsin (E).

هي خيرة المضم في عصارة المعدة وينموها تتحول المواد
الاحية الى ببتون او هضمون .

٣٠٣٦ - بَتُّرول (F). Petroleum (E).
هو النفط ، أطلبه .

٣٠٣٧ - بَشْرِيَتيس (F). Botrytis
هو الطَّلْمَة ، جنس فطور مجهرية من الطلّسيات وفصيلة الوطحيات .

٣٠٣٨ - بَتَشُولِي* (S). Pogostemon patchouly
Patchouly (F). Patchouly oil plant (E). Patchouly-
pflanze (D). Pacciuli, Patchouli (I).

نبات عشبي من فصيلة الشفويات مهدد البلاد الاستوائية
الاسيوية . أوراقه بيضيه ، مسننة ، معنقة ، متقابلة .
ازهاره عككولية التجميع ، ابطية وقاجية الارتكاز ، خماسية
البتلات والاسدية || يستخرج من زهره وزقه وسوقه
بالتقطير دهن سائل يفصل بعد الاستقرار الى مادة جامدة
تدعى عثبر بتشولي والى مادة سائلة تدعى عطر بتشولي .

٣٠٣٩ - بَتَّع (F). Hydromel
البتع ، هو نبيذ العسل .

٣٠٤٠ - بَتَّع (F). Wine (E).
البتع هو الخمر والبشاع هو الخمار وبتع الخمر خمرها .

٣٠٤١ - بَتَّل (F). Discernement
Distiguishing (E).
البتل قوة التمييز ، تمييز الشيء عن غيره .

٣٠٤٢ - بَتَّلَة ، قُطْعَالَة ، نُؤْيُجِيَّة ، نُؤْرِيَّة (F). Pétale (E).
كل قطعة ورقية من تويج الزهرة .

٣٠٤٣ - بَتَّلِي (F). Pétaloïde (E).
ما كان كالبتلة شكلاً وخضاباً .

٣٠٤٤ - بَتُّول ، بَتِّل ، بَتِّلَة (F). Rejet de dattier
Sprout of date tree (E).
هي الفسيلة من النخل المنقطعة عن أمها .

٣٠٤٥ - بَتُّولا* ، سَنَدَر (S). Betula

Bouleau (F). Birch (E). Birke (D). Betula, Bedula (I).
جنس أشجار وحيثيات تحرجية من فصيلة السومليات .
انواعها عديدة . اعطائها البلاد الباردة تعيش بين خطي
العرض ٤٧ و ٧٢ . أوراقها الجافة تستعمل استعمال الشاي
في معظم البلاد السكندنافية . نسجها غزير المادة سكري
المذاق يستعمل في تحضير بعض المشروبات الكحولية .
قشور سوقها تستعمل في الدباغة ويستخرج منها بالتقطير
مادة قاذية صناعية . الخشاب بعض انواعه تستعمل في
صناعة الورق . اشهر انواعه المعروفة ما يلي :

٣٠٤٦ - بَتُّولا بَيْضَاء (S). Betula alba
Bouleau blanc (F).

٣٠٤٧ - بَتُّولا نُؤْرِيَّة (S). B. verrucosa
B. verruqueux (F).

٣٠٤٨ - بَتُّولا حَقِيرَة (F). B. humilis (S). B. chétif

٣٠٤٩ - بَتُّولا حَمْرَاء (F). B. rubra (S). B. rouge

٣٠٢٨ - بَبْيَانَة* (S). Babiana

Babiane (F). Babiana (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . منبتها
بعض مناطق افريقية المعتدلة الحرارة . سوقها مورقة تعلو
من ١٥ الى ٣٠ سم . أوراقها متباينة الاشكال ، خلية
النصال . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها ملونة ،
متعاقبة الافقام || تزرع للزيين ضمن البيوت وفي الحدائق .
انواعها المعروفة متوسطة العدد ، اشهرها التالية :

٣٠٢٩ - بَبْيَانَة مَشْدُوْقَة (S). Babiana ringens
Babiane béante (F).

نوع من الببيانة الزينية . ساقها مستقيمة ترتفع من
٢٠ الى ٣٠ سم . أوراقها اهليلجية مستطيلة . نصالها
خلية الصفحات السفلى . ازهارها كبيرة القد ، مشدوقة
الشكل ، نظراً للتفاوت الكبير بين البتلات اللامتناهية
الاحجام . انايبها خضراء اللون ، بتلاتها قرمزية ||
تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٠٣٠ - بَبْيَانَة مُنْتَصِبَة (S). Babiana stricta
Babiane dressée (F).

نوع من الببيانة الزينية . ساقها منتصبة تعلو من ٢٠
الى ٣٠ سم . أوراقها عصفية النصال الحولية الباهتة الخضار .
ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . لونها يختلف مع
الضروب منه الابيض والليلكي والاحمر || تنويرها يستمر
طوال شهر ايار .

٣٠٣١ - بَبْيِير (F). Papyrus
راجع بردي .

٣٠٣٢ - بَتَّان (S). Neobalaena marginata
Néobaleine marginée (F).

نوع من الببال ، مسرحه اواسط المحيط الهادي وبحر زيلنده
الجديدة . وهو من الحيتان الصغيرة القد التي يراوح طولها
من ٦ الى ٧ امتار . يعيش جماعات متوسطة العدد يراوح
مجموع افرادها من ٦ الى ١٥ .

٣٠٣٣ - بَتَّر (F). Amputation, Ablation
هو قطع احد اعضاء الجسم لضرورة صحية . راجع
استئصال .

٣٠٣٤ - بَشْر ، بَشْرَاوَات ، عَدِيمَات الدَّسَب (F). Anoures
Anourous (F).

رتبة حيوانات من صف الضفدعيات . انواعها المعروفة
نحو ١٢٠٠ تنظم الى ١٥٠ جنساً تنتمي الى ١١ فصيلة
ولتين ومرتبتين ، مرتبة البكانيات ومرتبة اللسليات .

٣٠٣٥ - بَشْرَاء* (S). Petrea volubilis
Pétrée grimpante (F).

جنية تزيينية معمرة من فصيلة رعي الحمام . ساقها عارشة
تطول نحو مئة امتار . افانداها مرغية . أوراقها متقابلة ،
معنقة ، اهليلجية النصل الجاند الوثل ، المدب الطرف ،
اللامع البشرة ، تطول نحو ١٠ سم . ازهارها عنقودي
التجميع ، يلرفي الارتكاز ، يطول نحو ١٥ سم . ازهارها
صغيرة القد ، بنفسجية اللون . كؤوسها ركيبتها الى
الزرقه || تنويرها يستمر من تموز الى آب .



ببيانة



ببيانة



بتشولي



بتولا



بتوليه



بج



بجعة

٣٠٦٢ - بَشْرَة الخيار . Nuile des cucurbitacées (F).
هو ذئار القرعيات فطر مجهرى يصيب نباتات الفصيلة القرعية ، اطلب ذئار .

٣٠٦٣ - بَشْرَة خبيثة . Pustule maligne (F).
Pustula maligna, Malignant pustule (E).
تحصل عادة في مرض الجمرة .

٣٠٦٤ - بَشَق ، رَصَع . Asphyxie (F). Asphyxia (E).
هو بطة التنفس أو امتناعه وقد يصيب الاشجار المشرفة فيميتها . اسبابه ثلاثة : نحر المياه للنبات مدة من الزمن . رطوبة التربة المستمرة . رص التراب على جذور الاغراس العميقة . النصب . راجع اختناق .

٣٠٦٥ - بُشِيَّة . Jusquame de l'Atlas (F).
هي بنج المغرب ، نبات عشبي بري سام .

٣٠٦٦ - بَج * ، قَطَّ نَمِر . Felis serval (S).
Serval (F). Serval, Tiger-cat (E).
جنس سنور وحشي مرقط الثوب ، رفيع القوائم ، مستطيل الرأس ، كبير الاذن الذلقة ، قصير الذنب . يعرف بالقط النمر . طوله نحو ١٠٠ سم . وارتفاعه من ٥٠ الى ٦٠ ، موطنه القارة الافريقية من المتوسط الى القطب ومن الاطلسي الى الهادي || انواعه ثلاثة لا تختلف عن بعضها الا بحجم الجثة وسمة الثوب .

٣٠٦٧ - بَج . Arbousier (F). Strawberry tree (E).
اطلب قطلب .

٣٠٦٨ - بَج .

البج هو فرخ الطير وقيل فرخ الحمام .

٣٠٦٩ - بُجْرَة . Hernie ombilicale (F).
Umbilical hernia (E).
فتاق أو فتق السرة .

٣٠٧٠ - بَجَع * ، حَرْصَل ، قُوْق ، سَقَاء ، جَمَل الماء ، كَي ، أْبُر شَلْبَة ، أْبُو جِرَاب ، أْبُو قَرْبَة . Pelecanus (S).
Pélican (F). Pelican, Pelecanus (E).

جنس طير مائية من شملات الكف وفصيلة البجيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة القد ، مشدودة الساق ، قصيرة الذنب . تتميز بكبر مناقبها الطويلة العريضة المفلطحة التي تحمل في مخاطمها السفلى حواصل عظيمة كالجراب تخزن فيها صيدها من السمك . وهي تعيش جماعات . اسرارها تعد من ٤٠ الى ١٠٠ يكثر وجودها عند مصبات الانهر وفي البحيرات || اشهر انواعه الابيض والاشقح والوردي .

٣٠٧١ - بَجَع أْبَيْض . Pelecanus onocrotalus (S).
Pélican blanc (F).

نوع من البجع كبير الجثة طوله نحو ١٧٠ سم . وبسطه ٣٠٠ ، ثوبه ابيض اللون يشوبه بعض الغبار عند الاطراف اعطانه فسيحة الاربعاء تشمل مصبات الانهر الافريقية والاروبية واغندية .

٣٠٧٢ - بَجَع أَشَقَّح . Pelecanus crispus (S).
Pélican frisé (F).

نوع من البجع وهو اكبرها جثة واعظمها قدراً ، طوله نحو ٢٠٠ سم . وبسطه ٣٣٠ ، ثوبه اشقح الريش

٣٠٥٠ - بَتُولَا زَغْبِيَّة . B. pubescens (S).

B. pubescent (F).

٣٠٥١ - بَتُولَا صَفْرَاء . B. lutea (S). B. jaune (F).

٣٠٥٢ - بَتُولَا غَرْبِيَّة . B. occidentalis (S).

B. d'Occident (F).

٣٠٥٣ - بَتُولَا منقعية ، قَنْبَب المناقع .

Betula tripartita (S). Chanvre aquatique, Cornuet (F). Bur-marigold, Water hemp (E). Sumpf-weizahn, Wasser haní (D). Canapa acquatica, Eupatoria acquatica (I).

نبات بري من البتوليات يكثر في مناقع البلاد الباردة . اللياف سوقه قوية تستعمل في صناعة الخبال .

٣٠٥٤ - بَتُولِيَّات . Bétulacées, Bétulinées (F).
Betulaceae (E).

سبط من فصيلة السومليات يشمل البتولا والمغث وغيرها .

٣٠٥٥ - بَتُولِيَّة * ، بَطُولِيَّة . Petunia (S).

Pétunie (F). Garden petunia (E). Petunie, Balkon-petunien (D). Petunia (I).

جنس نباتات عشبية برية ويزينية من الفصيلة الباذنجانية انواعها المعروفة ١٢ جميعها امريكية المنبت . اوراقها كاملة متقابلة . ازهارها فردية التجميع ، طرفية الارتكاز ، كبيرة القد ، مفرحة البتلات جميلة الالوان الزاهية .

٣٠٥٦ - بَتِيَّة . Boucaut (F). Barrel (E).

برميل كبير من الخشب تحفظ فيه المواد الجافة كالتبغ وغيره ...

٣٠٥٧ - بَتِيد بَحْرِي ٥ . Batis maritima (S).

Batide maritime (F).

جنية برية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة البتيديات . ساقها مخشوشة . اوراقها ثنائية التركيب . شرقية التجميع ، سنانية النصال الصغيرة . ازهارها ثنائية المسكن ، ابطية الارتكاز || يستخرج من جذورها وسوقها وفروعها الكثير من الصودا .

٣٠٥٨ - بَتِيدِيَّات ٥ . Batidaceae (S).

Batidacées (F). Batidaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القملات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . موطنها بعض اصقاع امريكا الاستوائية وجزر المحيط الهادي . جميعها جنات صغيرة معمرة منبها الشطوط البحرية والمناقع المالحة . جذورها وسوقها وافنادها تحوي الكثير من المواد القلوية || اشهر اجناسها البتيد .

٣٠٥٩ - بُشِيرَة . Anesse (F). She-ass (E).

البهيرة هي الاتان .

٣٠٦٠ - بَتِيل ، بَتِيلَة . Rejet de dattier (F).

Shout of date tree (E).

راجع بتول .

٣٠٦١ - بَثْرَة ، بِيْش . Trou, Cavité en terre (F).

Gap, Cavity (E).

البثرة هي الحفرة المصطنعة لاقتبال الفرس . والبيش كذلك حفرة توضع بها الفرس .

Etude physiologique (F). البحث الفيزيولوجي
Physiological study (E).
هو البحث الذي يختص أولاً بدراسة العلة كما تبدو عيانياً مع تأثيراتها في النسيج النباتية . ثانياً بدراسة المؤثرات المختلفة التي تزيد أو توقف قوة المرض .

Etude mycologique (F). البحث الميكولوجي
Mycological study (E).
هو البحث الخاص بدراسة النباتات الفطرية وما سببته من اوصام . يشمل معرفة جميع خصائص الفطر كتاريخ حياته وتناسله وانتشاره والاحوال الملائمة لنموه وفتايج اضراره .

٣٠٨٣ - بَحْثَر
بحثر اللبن : انقطع وتحبب فهو مبحثر . وقد يكون سببه علة طارئة على الضرع اخصها المميت .

٣٠٨٤ - بَحْذَف
البحذف هو زرع قطلونا ، اطلب بزر قطلونا .

٣٠٨٥ - بَحْر
Défoncer (F). To trench (E).
بحر الارض : شقها .

٣٠٨٦ - بَحْر
Mer (F). Sea (E).
قسم فسيح شاسع من الكرة الارضية تغمره المياه المالحة التي تعيش فيها الاسماك والحيوانات والنباتات البحرية المختلفة || مساحتها تبلغ نحو ١٠٠ ملايين كيلومتر مربع اقصى عمقه المعروف يبلغ ١٠٧٩٠ م . وذلك قرب جزيرة مينداناو || ماؤه يحوى عدة املاح اخصها :

كلوريد الصوديوم البالغة نسبته	٧٨,٣٢ %
كلوريد المغنيزيوم	٩,٤٤ %
سلفات المنيزا	٦,٤٠ %
سلفات الكلس	٣,٩٤ %
كلوريدوم البوتاسيوم	١,٦٩ %
املاح مختلفة	٠,٢١ %
	١٠٠,٠٠

٣٠٨٧ - بَحْرَام
Pélagoscope (F). Pelagoscope (E).
البحرام جهاز يستعمل في رصد لمج البحار واغوارها .

٣٠٨٨ - بَحْرَمَة
Pélagoscopie (F).
Pelagoscopia (E).
البحرمة علم يبحث في حياة الكائنات العضائية في الم خارجي أي في اعماق عرض البحر .

٣٠٨٩ - بَحْرَج
البحرج : ولد البقرة الوحشية . الانثى بحرجة (السان) .

٣٠٩٠ - بَحْشَلَة
Danse moderne (F).
Moderne dance (E).

البحشلة الرقص المصري اللجوج الملهاج ووسيقاه الصاخبة || قيل فيها مضى الموسيقى تدمت الاخلاق . فما عسانا نقول في موسيقى البحشلة التي عم انتشارها جميع اقطار المسكونة ؟

٣٠٩١ - بُخَانِي
Propus (F). Propus (E).
البخاني نجم نير من كوكبة برج الثورين مركزه امام قدم الثور المتقدم .

الاجعد الابيض الموج . اقلبه شاسع الاطراف يمتد من جنوبي اروبة الى اطراف الصين واليابان .

٣٠٧٣ - بَجَع وَرَدِي
Pelecanus roseus (S).
Pélican rose (F).
نوع من البجع وهو اصفر جثة من الابيض ، ثوبه وردي اللون ، ارجواني الموج . اعطانه تمتد من اروبة الشرقية الى الصين وماليزية .

٣٠٧٤ - بَجَعِيَّات
Pelecanidae (S). Pélicanidés (F).
Pelecanidae (E).
فصيلة البجع من شاملات الكف ورتبة كفيات القدم . اجناسها وانواعها عديدة جميعها طيور مائية قوتها الاسماك .

٣٠٧٥ - بَجَل ، دُورِين ، حَلَق
Dourine, Mal du coït (F). Trypanosoma (E).
البجل او الحلق مرض يصيب الخيل والحمار سببه دودة ثعبانية من النقيصات تعيش في الدم ، قوتها الكرويات الحمر .

٣٠٧٦ - بَجَلَة
Arbuste (F). Bush, Shrub (E).
البجلة هي الشجرة الصغيرة .

٣٠٧٧ - بَجْمَة
Tamarisque (F). Tamarisk (E).
البجمة ثمرة الاثل . ج . بجم .

٣٠٧٨ - بَجْن *
Cyprinodon (F). Cyprinodont (E).
جنس اسماك صغيرة من فصيلة البجنيات تعيش في الماء المسوس ، انواعها نحو ١٠٠ جميعها من الاسماك الولودة . زعانفها الظهرية متاخرة الى الوراء اما البطنية فلا اثر لها . يوجد منها في جميع بلاد حوض البحر المتوسط وفي كاليفورنيا والتكساس . اشهر انواعها البطريخ والبطحيش .


٣٠٧٩ - بَجْنِيَّات
Cyprinodontidae (S).
Cyprinodontidés (F). Cyprinidae (E).
فصيلة اسماك صغيرة القد من مفتوحات المثانة تعيش في الماء المسوس والعذب على حد سواء . اجناسها وانواعها عديدة بعضها ولود وغيرها عديم الزعانف البطنية .

٣٠٨٠ - بَجِيع
Conringia (S).
Conringie (F). Perfoliate cabbage (E). Weisser schöterich (D). Conringia (I).
جنس نباتات عشبية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الصليبيات . مهدها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية . انواعه قليلة جميعها لجمية فرعاء ، اوراقها لسنة مستطيلة بحرية الخضار . ازهارها عشكولية التجميع ، ابطية الارتكاز او تاجية .

٣٠٨١ - بَحْرَان
Semen-contraria
نبات طبي يدعى شيخ اليهودية ، اطلبه .

٣٠٨٢ - بَحْث
Etude (F). Study (E).
هو الدرس الخاص ببعض العلوم ومتفرعاتها واحوالها مثل :

البحث الشوذي
Etude morphologique (F).
Morphological study (E).
هو البحث الذي يدرس النتائج الجسمورية التي حصلت في العائل من جراء وجود الفطر ثم معرفة وتقدير مدى الملاقة القائمة بين العائل والطفيل مع تحديد مكان الاصابة .



بجن



بَخَّامَة عَاجِيَة



بَخْرَة



بَخَّور الَاكْرَاد



بَخَّور البَربر

مهددا البلاد الحارة الآسيوية والأفريقية . أنواعها المعروفة نحو ٨٠ معظمها بري وبعضها زُرِّي . كان ولا يزال كهان الهند يحرقون أخشاب بعض أنواعها عند إبتها لأهم في معابدهم || اعرفها واشهرها ما يلي .

٣٠٩٩ - بَخْتِيَة عَطِرَة Cl. fragrans (S).

Cl. odorant (F).

٣١٠٠ - بَخْتِيَة مِشْخَارَة Cl. serocinum (S).

Cl. tardif (F).

٣١٠١ - بَخْتِيَة نَسِيَة Cl. foetidum (S). Cl. fétide (F).

٣١٠٢ - بَخْرَة * ، بَخْرَاء ، كُشْتِي وَرْدِيَة

Orobis roseus (S). Orobe rose (F).

نوع من الكشتى وهو نبات عشبي بري معمر من فصيلة القرنيات . سوقه منتصبه يراوح ارتفاعها من ٤٠ الى ٦٠ سم . أزهاره وردية اللون مغرية يجرسها النحل .

٣١٠٣ - بَخْس Cl. Culture non irriguée (F).

راجع بعل . البخس : كل أرض تثبت بغير سقي . والبخس من الزرع ما لم يسق بمساء قلدر إنما سقاء ماء السماء . ج بخوس .

٣١٠٤ - بَخْص

البخص هو الضرع الذي لا يخرج لبنه إلا بشدة .

٣١٠٥ - بَخْم Acaule (F).

Acaulous, Stemless (E).

البخم ما لا ساق له من النبات ويدهى النجم .

٣١٠٦ - بَخْنُق Epicrâne (F). Epicranium (E).

هو درع الرأس يتألف عند معظم الحشرات من الجبهة والنافوخ والغفن والحاسر والافواد .

٣١٠٧ - بَخْو

البخو : الرخو الرديء . ثمرة بخوة : رخوة رديئة خاوية .

٣١٠٨ - بَخَّور الَاكْرَاد * ، شَجَر الَخَنَازِير ، بَرَبَاطُودَة

Peucedanum officinale, Salinum officinal (S). Peucedane, Fenouil de porc (F). Hog's fennel, Sulphur weed (E). Echter haarstrang (D). Peucedano, Finocchio porcino (I).

نبات بري طبي من فصيلة الخيميات . جذوره مدرة للبول ومقوية للمعدة . قال عنه الانطاكي في التذكرة : « ينفع البربر والسعال وأوجاع الصدر والصمم واليرقان . ويفتت الحصى ويسقط الاجنة ويدبر البول ويصلحه اللينوفر . وشرته نصف مثقال » .

٣١٠٩ - بَخَّور البَربر * ، بَخَّور السُودَان ، سَرَّخَنْد

د يَنْدَهَك Telephium imperati (S).

Téléphe, Téléfe (F). Orpine, Tree Orpine (E). Südliches zumpenkraut (D). Telefia (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الرجليات . اقليمه حوض البحر المتوسط . وهو نبات مداد . أوراقه كاملة ، لحمية ، صغيرة ، معتقة ، متعاقبة ، بحرية اللون . أزهاره عشكولية التجميع ، تاجية الارتكاز || يوجد في أكثر الاراضي البور ، ترعاه الماشية . قال عنه الانطاكي في التذكرة : « يسكن المغص والرياح ويفتح الشهية . يصلحه الصمغ وشرته الى درهم » .

٣١١٠ - بَخَّور مَرِّيم Cyclamen (F).

Cyclamen, Sow-bread (E).

٣٠٩٢ - بَخَّاخ Serpent cracheur (F).

البخاخ حية سرلودة سامة مشهورة باسم عطرث نفّاس . اطلبه .

٣٠٩٣ - بَخَّار Vapeur (F). Vapour (E).

جسم غازي يتصاعد من الاشياء الرطبة بتأثير الحرارة عليها .

٣٠٩٤ - بَخَّارِيد ، بَخَّارِيس ، كَحْرِيَة

Baccharis (S). Baccharide, Bacchante (F). Ploughman's spikenard (E). Kreuzstrauch (D). Baccaride (I).

جنس نباتات برية وزينية من سبط الاسطريات وفصيلة المركبات . انواعه زهاء ٣٠٠ معظمها جنات وفيها بعض الاعشاب . انواعه الزراعية التزينية قليلة لكنها جميلة الزهر الظريف .

٣٠٩٥ - بَخَّاق Loup (mâle) (F). Wolf (male) (E).

البخاق هو الذئب الذكر (الديري) .

٣٠٩٦ - بَخَّامَة عَاجِيَة *

Blastodacna albida (S). Mineuse des lambourdes du pommier (F). Blastodacna albida (E).

حشرة من القوبيات حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق الشرق الادنى . تألف جنات التفاح . سرقها لائمة قاضية تثقب الخوط وتعيش على محتويات البرعمة الزهرية كامل الطور البرقي والاكتالي || جسمها صغير قصيف يعطو من ٤ الى ٥ مم . بسطها تراوح من ١٢ الى ١٤ مم . رأسها معتدل الجرم والبروز ، اشهب اللون . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان مستطيلان . ملاسها الشفوية والفكية صغيرة . جوشنها حنطي اللون . بطنها تبني || روشناها الاماميان الى البياض العاجي . اهدابها الى الشبهة . روشناها الخلفيان الى التبني الاشقر الموج ، اهدابها مستطيلة تبني اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواخر ايار . تعيش نحو ثلاثة اسابيع . تسرح من الغروب الى فحة الليل || تماثل بعد ظهورها بثلاثة ايام وتباشر متع المكن بعد الكوم بيوم واحد وتستمر عليه نحو عشرة ايام وتلقيه ميعاديا ، تغلفه مادة غروية لاصقة ، على خطوط التفاح في اباطها || يتقف المكن بعد متعه بنحو سبعة ايام عن اسابيع تحيلة تثقب لحاء الخوط وتخلدها باتجاه الخشب وتقيم في داخلها قوتها الخلايا النباتية || السرفة عند بلوغها الادراك التام تقطو نحو ١٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، واضح التقسيم السكمي ، مستدق الطرف ، حنطي اللون ، اسمر الملاقي . رأسها ودوقتها الصدرية وشرجها الى السمرة القاتمة . مدتها ورواجها الى الحنطي || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي طليقا في نفق السرفة عند مدخله .

٣٠٩٧ - بَخْت ، بَخْتِي

Boghdi, Chameau de Khorassan (F). Boghdi, Camel of Khorassan (E).

سلالة من الابل الخراسانية من ذوات السنامين تحذرت من تهجين الجبل العربي مع الفالج فأتت دهانج قليلة الغلاظة معتدلة القد والقوام .

٣٠٩٨ - بَخْتِيَة ، شَجَرَة البَحْت ، رَاهِيِيَة ،

شَجَرَة الرَهْبَان Clérondendron (S).

Clérondendron, Clérondendron (F). Glory-bower, Glory-tree (E). Losbaum (D). Clérondendron (I).

جنس اشجار وجنات برية وزينية من فصيلة رعي الحمام

على الاشجار || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٣٠ سم. رؤوسها مستعرضة ، مفلطحة . عيونها كبيرة . سبالها مستطيلة سوداء اللون . مناقبها مخروطية الشكل ، واسعة الاشدق الرحبة . اعناقها قصيرة . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذناها مستديرة الاطراف . اثوابها الى الشقحة والصهبة تعالوها رقشة طحلاء وتجذيع اسود يمتد حتى اطراف الاجنحة || قوتها الجراد والحشرات المختلفة الفصائل والانواع || تدثن في الاشجار الرفيعة . اناثها تبيض من ٤ الى ٦ بيضات اهليلجية الشكل . الحضان يستمر نحو ١٧ يوماً تقوم به الانثى في النهار والذكر في الليل .

٣١٢٤ - بَدْرُ غُوسِيَّات *
Podargidae (S). Podargidés (F). Podargidae (E).

فصيلة طير من الجواثم مشقوقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق القارة الاسيوية واستراليا || طيورها متوسطة القد ، مستعرضة الرؤوس ، كبيرة العيون ، كثيفة السبال . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . قوتها الحشرات وبعض الثمار والبذور || اعرف اجناسها واشهرها البدرغوس والفوثل .

٣١٢٥ - بَدَسْتُمِيَّات *
Podostemaceae (S). Podostémacées, Podostémonées (F). Podostemaceae (E).

فصيلة نباتات مائية من ثنائيات الفلقة عديمات القملات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٢٠ جميعها عشبية مائية يكثر وجودها في انهر امريكا الجنوبية وجزيرة مدغسكر || تلتصق بالصخور المغورة فتنبش وتنوء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، مفرصة النصال . ازهارها خشوية او وحيدة الشق ، ضمنية التجميع او فردية .

٣١٢٦ - بَدَسْكَان
Parkinsonia (S). Parkinsonie (F). Parkinsonia (E).

جنس جنات وشجيرات برية من فصيلة القرنيات . ازهارها مغترية صفراء اللون فواحة العرف المستحب . انواعها المعروفة ثلاثة منها نوع مبذول في الاحراج اللبنانية يدعى البدسكان الشائك .

٣١٢٧ - بَدَسْكَان الشرق
Spartier genêt (F). Rush broom (E).

٣١٢٨ - بَدَسْكَان شائك *
Parkinsonia aculeata (S). Parkinsonier, Genêt épineux (F). Prickley broom, Jerusalem thorn (E). Stachlichter ginsterbaum (D). Ginestra spinosa, Spina di Gerusalemme (I).

نوع من البدسكان وهو بحلة شائكة تستعمل للسياج ويستخرج من اليافها نوع من الورق الجيد الصنف . ازهارها بحيلة الشكل صفراء اللون فواحة العرف يجرسها النحل ويحني وليعها .

٣١٢٩ - بَدْعَة *
Anguis fragilis (S). Orvet, Serpent de verre (F). Slow-worm (E).

زحافة من العظائيات وحيدة الجنس والنوع تنتمي الى فصيلة الحنجوفيات . جسمها اسطواني الشكل ، عادم القوائم ، سريع الانفصام والمطب . ثوبها الى الطحلة الغبرا الفضية المواجه . وهي تشبه الحية لكنها غير سامة وتفيد الزراعة . تعيش بين الحجارة وتحتها ، تخرج في الليل . قوتها الحشرات .

٣١١١ - بَحُورِيَّات
Burseraceae (S). Burséracées (F). Burseraceae (E).

هي الفصيلة البخورية ومنهم من قال انها سبط من الفصيلة البطمية . انواعها قليلة جميعها اشجار وجنات . مهدا الاصقاع الاستوائية الامريكية || اشهر انواعها البخورية ، اطلها .

٣١١٢ - بَحُورِيَّة
Bursère (F). Burser (E).

شجرة حرجية بحيلة القلب من البخوريات . منبتها امريكة الاستوائية . يستخرج منها بالحز عصارة صمغية رائحة سريفة الجفاف بخورية الرائحة عند الاحتراق .

٣١١٣ - بَحْخِيرَة *
Pachira (S). Pachira, Pachirier (F). Pachira (E).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة الحجازيات . انواعها المعروفة اربعة منبتها المناطق الاستوائية الامريكية . اشهر انواعها بخيرة الفويمان (Pachira aquatica) التي تزرع لثمارها المأكولة || شجرتها كبيرة القد دائمة . اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها اهليلجية ، كبيرة . ازهارها طاقية التجميع ، بحيلة . ثمارها جراء كبيرة الحجم تحوي بعض المعجات المأكولة الشبيهة بالكستنة .

٣١١٤ - بَدَاة
Truffe (F). Truffle (E).

البداة هي الكماة .

٣١١٥ - بَدَاد ، بُدَّة
Quantum (F). Quantum (E).

البداد والبدة النصب من الشي . ج بُدُد وبيدَد .

٣١١٦ - بَدَح ، فَيْكُوس
Ficus

جنس اشجار برية وتريينية من فصيلة الانجريات . انواعها عديدة جميعها فناء دائمة . اوراقه جلدية وافقة وشديدة الخضار . يستعمل للظل والزينة ولصد الرياح ، يفرس في شوارع المدن وعلى جوانب الطرقات والممرات . اشهر انواعه مايي .

٣١١٧ - بَدَح الدَبَاغِين
Ficus infectoria

٣١١٨ - بَدَح عَامِر
Ficus nitida

٣١١٩ - بَدَح عَصِيف
Ficus glumosa

٣١٢٠ - بُدْذُول *
Podzol (F). Podzol (E).

البذول تراب مغسول ملوئ بالرماد ناتج عن انخحات بعض الصخور . يكثر وجوده في بعض مناطق اربعة الشمالية .

٣١٢١ - بَدَر
Mûrir (F). To ripen, To mature (E).

يقال بدر الثمر متى اكتمل نموه وبلغ حجمه وهذا يكون قبل الادراك .

٣١٢٢ - بَدَرَانِج
Coix-larmes (F). Coix-millet (E).

راجع امديان .

٣١٢٣ - بَدَرُ غُوس *
Podargus (S). Podargue (F). Podargus (E).

جنس طير من فصيلة البدرغوسيات . انواعها المعروفة عديدة موطنها يمتد من آسية الجنوبية الى استراليا وتسمانية . تألف الاحراج المبعثرة الاشجار . تخرج في الليل وتبيت في النهار



بخيرة



بلح



بدرغوس



بدسكان شائك



بدغة

٣١٣٠ - بَدْفِيل * ، بَدْفِيلْم °

Podophyllum (S). Podophylle (F).
Podophyllum (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة البربريسيات .
انواعه المعروفة اثنان . جذاميرها افقية الانتشاب . سوقها
فردية تعلو نحو ١٥ سم . ثم تنسحب الى زنادين وكل زناد
يتسهي بورقة . الورقة كبيرة القد ، كفية الشكل خاسية
التفصيص او سباعيته ، مفترضة الحافة . ازهارها فردية
كبيرة القد تنسحب في زاوية الانتشاب . ثمارها عنبية
صفراء اللون ، حجمها حجم ليمونة الحامض ، لباب
سودقها مأكول مستحب الطعم . بزورها كثيرة العدد
كلوية الشكل .

٣١٣١ - بَدْفِيلْ إِمُودِي °

Podophyllum Emodi (S). Podophylle Emodi (F).

نوع من البدليل . مهد سفوح جبال حملايا . ساقه مع
زناد الورقة تعلو نحو ٢٥ سم . عرض ورقته لا يقل عن
١٢ سم . نصلها بالغ التفصيص والتفريش لونه الى
الخضار العابق . ثمرته صفراء اللون مأكولة اللباب ||
جذاميره واوراقه جحالية المادة الشديدة الوقع .

٣١٣٢ - بَدْفِيلْ دَرَقِي °

Podophyllum peltatum (S). Podophylle pelté (F).

نوع من البدليل . مهد كندا والمناطق الشمالية من الولايات
المتحدة الامريكية . ينبت في المواقع الرطبة الظليلة التي
يسود فيها عنصر الرمل . ثماره صفراء اللون مأكولة يطلق
عليها اسم تفاح ايار (Pomme de Mai) || جذاميره
طبية يستخرج منها مادة راتنجية تدعى بودوفيلين
(Podophylline) تستعمل كسهل لطيف .

٣١٣٣ - بَدْلَاوِيَّة ، بَدْلَاوِيَّة

Podalyria (S).

Podalyre (F).

جنس انجم وجنيات معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية .
انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اشيعها
واجملها الانواع البقية والحريرية والفضية الورق .

٣١٣٤ - بَدْلَاوِيَّات

Podalyriées (F).

Podalyreae (E).

سبط من فصيلة القرنيات الفراشية اجناسه نحو ٢٠ اما
انواعه فكثيرة العدد جميعها جنبية ونجنية . اوراقها صغيرة
القد متقابلة او متعاقبة . ازهارها عنقودية التجميع ،
محورية او تاجية الارتكاز . الوانها عديدة فيها الابيض
والاصفر والوردي والارجواني والياقوتي .

٣١٣٥ - بَدْلِيَّة

Buddlé (F). Orange ball tree (E).

راجع أطر وعثر .

٣١٣٦ - بَدَن * ، وَعَلْ عَرَبِي ، وَعَلْ الثَّوْبَة

Capra arabica, C. nubiana (S). Bouquetin de
l'Arabe (F). Arabian ibex (E).

نوع من الوعل موطنه الثوبة وجبال الجزيرة . ثوبه الى
الصهبة القائمة . طوله نحو ١٥٠ سم . علوه ١٠٠ ، اما
وزنه فيراوح من ٧٥ الى ١٠٠ كيلو . له قرنان ضليخان
غليظان منعطفان ، يألف الخضاب والجبال الوعرة .

٣١٣٧ - بَدَنِي ، جِسْمَانِي

Somatique (F).

Somatic (E).

كل ما يختص بالجسم .

٣١٣٨ - بَدُو

Erodium hérissé (F).

هو الجذاب العفائي ، اطلبه .

٣١٣٩ - بَدْوَة

Versant d'une vallée (F).

البدوة هي جانب الوادي وهما البدوتان .

٣١٤٠ - بَدُوْرَة

Podura (S).

Podure (F). Podura (E).

جنس حشرات قافزة قارضة من فصيلة البدوريات ورتبة
الكهديات . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم
مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه
اسطوانية الشكل ، تطول من ١ الى ٤ مم . اثوابها
قائمة ، سوية اللون ، يكثر فيها الاسود البنفسجي المواج .
رؤوسها ضخمة . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل .

بطونها سداسية السكم المهدبة . جهازها القفزي نشيط
مستطيل || اشهر انواعها البدورة المائية (Podura
aquatica) المبدولة في اكثر الاقاليم المعتدلة الحرارة والتي
يكثر وجودها على سطح المياه الآسنة وفي المواقع الرطبة .

٣١٤١ - بَدُوْرِيَّات °

Poduridae (S).

Poduridés (F). Poduridae (E).

فصيلة حشرات قافزة قارضة من رتبة الكهديات . اجناسها
وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم ||
اجسامها صغيرة شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها ضخمة .
منحرفة الى الاسفل . آفاكها وتأثيرها لاطئة . زناها
عديدة . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل .
صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها سداسية السكم . مجهزة
بجهاز قفزي نشيط وبحويصلات تفرز مادة لزجة تساعد
الحشرة على تسلق السطوح الناعمة . قوائمها قصيرة تنتهي
بظفر احجن حاد || اشهر اجناسها البدوره .

٣١٤٢ - بَدُوْك

Padouk (F). Padouk (E).

البدوك نوع من الخشب الاجنبي المرغوب فيه . مصدره
الرئيسي بلاد الغابون . يستعمل في الصناعات الساسية وفي
الموبيلية . وزنه النسبي يعادل الماء .

٣١٤٣ - بَدْيَان

Illium (S). Badianier, Badiane (F).

جنس اشجار وجنيات برية وزراعية من فصيلة المغنوليات .
انواعه ثمانية منتبها الصين واليابان والهند والمناطق الجنوبية
من الولايات المتحدة . ثمارها حقية والحق يحوى من ٦ الى
١٢ لوزة بيضية الشكل لامعة . البشرة الملساء . واللوزة
عطرية العرف ذهبية اللباب الابيض || اشهر انواعه
الزراعية البديان النجمي المعروف بالانيسون النجمي .

٣١٤٤ - بَدْيَانْ نَجْمِي

Badlane, Anis étoilé (F).

Star anise tree (E).

راجع الانيسون نجمي .

٣١٤٥ - بَدْيِيَّات

Protophytes (F).

هي النباتات الاوليات من ذوات الخلية الواحدة كالضريع
والفوقس والفطور . والبديثيات في المملكة النباتية يقابلها
الاولى في المملكة الحيوانية .

٣١٤٦ - بَدَار

Semences (F). Seeds (E).

هو الحب الممد للزرع .

٣١٤٧ - بَدَارَة

Semeuse (F). Sower (E).

آلة تستعمل لثر البذار .



٣١٦٣ - برارة * Briarcea (S). Briarée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم وفصيلة اليسوعيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. جميعها يمتية لا تقرب الشطوط. اسرارها وافرة العدد اجسامها عريضة ، شفافة ، مستطيلة ، غراء اللون باستثناء العيون واللوامس. عيونها صغيرة دهبية الشكل سوداء اللون. رؤوسها صغيرة ، مستعرضة ، رباعية اللوامس الجذوية. اذناها دقيقة ، خيطية. خياشيمها انابيب كثيرة متقابلة مفلوكة الاطراف.

٣١٦٤ - برارز Excrément (F). Excrement (E).

هو ما نتج عن الهضم وما برزه الجسم الحي من استه ، كالعائط والروث والخي والبر والسلح .

٣١٦٥ - برارون Borason (F). Borason (E).

مادة تركيبية صلبة تم تحقيقها عام ١٩٥٨ تعتبر اول مادة صناعية تفوق صلابتها صلابه الماس .

٣١٦٦ - برارزي Stercoral

نمت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالبراز وعلى الحشرات التي تعيش فيه .

٣١٦٧ - براريات Sterculiaceae (S).

Sterculiacées (F). Sterculiaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين قريبة الشبه من الجيازيات تشمل بعض الاشجار والجنات والنعترشات والاعشاب . جميع انواعها من نباتات البلاد الحارة بعضها كبريه الرائحة كالبراز (Stercus) ولذا سميت بالبرازية .

٣١٦٨ - برارزية * شجرة البرارز ، طرطور

Sterculia (S). Sterculier (F). Stinking bean trefoll (E). Stinkbaum (D). Sterculia (I).

شجرة برية وتريينية من فصيلة البرازيات ساقها منتصبه . اغصانها ميمرة . اوراقها معنقة ، منعاقبة ، اذنية النصل الكامل ، صفحته مزغبة زغبها نجمي الشكل . ازهارها فردية وحيدة المسكن عديمه الفعالات . اعطانها البلاد الحارة .

٣١٦٩ - براريلية * Bertholletia excelsa (S).

Brésil, Brésiliet (F).

شجرة حرجية من فصيلة القرليات العنديات . مهدا بعض المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد . اوراقها مركبة شمفية التجميع . ازهارها تاجي عنقودي . ازهارها خماسية البتلات مختلفة الالوان . ثمارها بطيخية الشكل ، متوسطة القد ، يستخرج منها نحو ٦٥ ٪ من الزيت الصانع للاستعمال المنزلي في اول عهده الى ان يصبح حريفاً فيستعمل في صناعة الصابون . اخشابها فاخرة الصنف ، ناعمة الرقة . جذوية اللون ، شديدة الصلابة || يقول المؤرخون ان البرتغاليين عندما اطلقوا اسم براريل عام ١٥٠٩ على البلاد الامريكية المعروفة الآن بهذا الاسم كان الداعي لذلك كثرة احراج شجر البرازيلية في تلك البلاد .

٣١٧٠ - براسة * Xyloculture (F).

Xyloculture (E). البراسة زراعة القطن .

٣١٤٨ - بذج Agneau (F). Lamb (E).

البذج هو الحمل ج بذجان . والبذج من اولاد الضأن بمنزلة العنود من اولاد المعز (اللسان) .

٣١٤٩ - بذج

شق . والبذج هو شق لسان الفصيل لثلا يرتضع (اللسان) .

٣١٥٠ - بذور Ensemencement, Semallie, Semis (F).

Sowing, Seeds, Seed-bed (E). هو القاء الحب او نثر البذار على التربة وقد يتم إما باليد او بواسطة المبادر .

٣١٥١ - بذوري ، زرعي ، بزري Séminal (F).

Seminal (E). كل ما كان له صلة بالبذار .

٣١٥٢ - بذع

Filtre (F). Filter (E). بذع الاناء : قطر الماء . والبذع ما قطره من الماء .

٣١٥٣ - بذلان Pouzzolane

ارض بركانية ضاربة الى الحمرة .

٣١٥٤ - بر Blé, Froment (F). Wheat (E).

راجع حنطة .

٣١٥٥ - براعة Hutte de chasseur (F). Hut (E).

البراعة هي ناموس الصياد ، ج براء .

٣١٥٦ - براعة الاختراع Brevet d'invention (F).

Patent (E). هي شهادة تمنحها الحكومة الى من يقرر انه احدث ابتكاراً في عالم الصناعة على ان يتبع الطرق القانونية في تسجيله . ويكون حق المصلحة من الابتكار مقصوراً عليه وحده الى امد معين .

٣١٥٧ - براعة الاضافة Brevet d'addition (F).

تعطى لدى التوسع في اختراع أعطيت عنه براعة سابقة . واما مدتها فدة البراعة السابقة التي تستند اليها .

٣١٥٨ - براعة الاستكمال

Brevet de perfectionnement (F).

هي براعة تقرر اكتمال اختراع صدرت عنه براعة سابقة .

٣١٥٩ - برابان

Brabant (charrue) (F).

Belgian plough, Brabant (E). نوع من المحارث الفرنجية التي تقلب التراب . وقد يكون عادي او مزدوج .

Brabant simple (F). Single brabant (E).

Brabant double (F).

Brabant مزدوج

Twofold brabant (E).

٣١٦٠ - برآح Garigue, Garrigue, Lande (F).

Waste land, Moor (E). ارض باثرة او حرجية فبتت او ثبتت فيها الاشجار والانجم التي توافق تربتها واقليمها .

٣١٦١ - برآد Frigidaire, Frigorifique (F).


Refrigerator, Frigorific (E).

بناء مستوفي شروط السبرد والرطوبة والتهوية خصص لاستجماب كيات كبيرة من الانتاج الزراعي والحيواني وذلك لحفظها من العطب مدة من الزمن .

٣١٦٢ - برآدة

Malaptérure du Nil (F).

Electric catfish (E). راجع فرة النيل .



برارة



برازية



برازيلية



براقة



براكيوسور



براكيوم



براكيوسور

بازهارها المندونة العلم وهو مسا يشير اليه اسمها العلمي اليوناني الاصل .

٣١٨٠ - براكيوم * ، كفاء
Brachycome (S).
Brachycome (F). Swan river daisy (E). Kurzschopf (D). Brachycome (I).
نبات عشبي حولي او معمر من فصيلة المركبات، يزرع للزينة ولزهوره الجميلة الشكل واللون .

٣١٨١ - براكيكيتش
Brachychiton (S).
Brachychiton, Sterculier à feuilles d'érable (F). Flame tree (E). Flammenbaum (D). Sterculia (I).
شجرة برية وتريينية من فصيلة البرازيات . مهدها امريكية واليابان . تزورع في الحدائق وعلى الطرقات . يوجد منها في لبنان . ساقها منتصبة ليفية . اغصانها متباعدة الارتكاز قصيرة الامتداد . اوراقها منعقة ، كفية ، عابلة .

٣١٨٢ - براكيوسور
Brachiosaure (F).
حيوان منقرض من جبابرة عظام الاباج اثاني . كان طوله المقدر نحو ٢٤ متراً وارتفاعه نحو ١٤ متراً .

٣١٨٣ - بوم
Tarsonemide
جنس حشرات نافعة من فصيلة البراميات . انواعه نحو ١٢ جميعها صغيرة القد تتطفل على ديدان حشرقيات الاجنحة .

٣١٨٤ - براصة *
Turritella (S). Turritelle (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة البراميات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اصداقها مخروطية الشكل المستطيل ، مدبسة الاعقاب تطول من ٦ الى ١٠ سم . حلزونها منسوبة اللولية ، تمتد نحو ٢١ دورة . فروجها القاعدية جانبية ، شبه مستديرة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها ثنائية الانواس الطويلة المعبونة ، قصيرة الاخطام الغليظة . اسفطها قرنية المادة .

٣١٨٥ - براصيات *
Turritellidae (S).
Turritellidés (F). Turritellidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الحياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اصداقها برجية ، مطولة ، مدببة الاعقاب ، بليغة التخديد الحلزوني ، بيضية الفوهة المحددة من الداخل || اشهر اجناسها البرامة والدولم .

٣١٨٦ - براصيات
Tarsonemidae (S).
Tarsonemidés (F). Tarsonemidae (E).
فصيلة حشرات وانحة من القراديات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة جميعها صغيرة القد . طول ذكورها لا يفوق نصف ملليمتر واناثها من ٢ الى ٣ ملليمترات . اثوابها الى الصفرة . وهي سريعة التكاثر تتطفل على مختلف ديدان حشرقيات الاجنحة .

٣١٨٧ - برايسيس
Brème (F). Breäm (E).
راجع ابراميس .

٣١٨٨ - براونيه ، بروفنيه
Brownea (S). Brownée (F).
جنس نباتات برية وزراعية تريينية من فصيلة القرنيات الفراشية . منبتها امريكية الاستوائية . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي ترييني جميل الازهار المختلفة الالوان .

٣١٧١ - براغيث اليم
Orchestilidae (S).
Orchestiidés (F). Orchestilidae (E).
فصيلة دويبات بحرية من القشريات تعرف بالدغاشيات . اطلبها .

٣١٧٢ - برفافين ، فيهاء
Paraffine (F). Paraffin (E).
نوع من الشمع الابيض يستخرج من النفط .

٣١٧٣ - برافة *
Fulgora (S).
Fulgore (F). Fulgora (E).

جنس حشرات من فصيلة البراقيات ورتبة متجانسات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة باكثريتها في معظم اصقاع البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها لاقياسية الحجم ، منها الصغيرة والكبيرة . رؤوسها مستغلفة ، حويصلية الجباه . رواشها كبيرة ، رجة ، جميلة الزخارف والالوان ، فيها السمرة والكلسة والصفرة والخضار || ذكورها واناثها تفرز مادة شمعية شفافة تبدو كجزر من الكبيب تترك وتتلون بلون المكان فتخفي الحشرة عن الانظار || طيرانها بطيء الحركة ، قصير الشوط || تألف الحراج اخصها التي تكثر فيها السدايات .

٣١٧٤ - براقيبات *
Fulgoridae (S).
Fulgoridés (F). Fulgoridae, Plant hoppers (E).
Lanternenträger (D).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || اجسامها مستغربة الاشكال ، متوسطة القد او كبيرة . مستغلفة الرؤوس . نائفة الجباه الحويصلية الشكل او القرنية . تتميز بصغر قرونها الاستشعارية الشبيهة بالمناخس الدقيقة . رواشها كبيرة ، جميلة الرسوم والالوان || بعض انواعها يفرز مادة شمعية شفافة تأخذ لون الموقع || اعرف اجناسها واشهرها البرافة والهوتين .

٣١٧٥ - براك
Orphie (F). Billfish (E).
راجع خرمان وهي سمكة من الاسقمريات .

٣١٧٦ - براك مبدول
Bar commun (F).
سمكة بحرية مشهورة باسم قاروس مبدول ، اطلبها .

٣١٧٧ - براكوليات
Braconidés (F). Braconidae (E).
راجع دحموريات .

٣١٧٨ - براكيثيل * ، اريثود *
Brachyteles (S).
Brachytèle, Eriode, Singe-araignée (F).
قرد امريكي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السبوسيات . موطنه احراج البرازيل الجنوبية || جسمه اهيف القوام رشيق . يطول نحو ١٣٠ سم . رأسه صغير القد ، عنقه متوسط القصر . قوائمه قوية مستطيلة . ذنبه شديد الطول اخاذ . ثوبه الى الصبهة الخنطية يعبق عند الظهر وينحرف ، مع العمر ، الى الجقوة || يعيش على الاشجار قوته البراعم والازهار والاوراق والثمار . اثناء تضع جرواً واحداً .

٣١٧٩ - براكيزيمة
Brachysema (S). Brachysème (F).
جنس نباتات برية وزراعية تريينية من فصيلة القرنيات الفراشية ، مهدها بلاد استرالية . انواعها قليلة العدد تتميز

وهي مأكولة وتربب . خورها من المرطبات المشهورة النافعة والمضادة للحميات .

٣١٩٨ - بربريسيات Berberidaceae (S).

Berberidacées (F). Berberidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين الكثيرة القعالات .
مهدا واسع الأرجاء ، نباتاتها عديدة الاجناس والانواع ،
معمرة عشبية او ليفية . ثمارها عنبية او جرائية تحوي
بذرة واحدة او عدة بذور . منها مأكولة تعتبر من المرطبات
النافعة وهي غنية بالحامض التفاسي .

٣١٩٩ - بربريس Irriguer (F). To irrigate (E).
بربريس الارض : ارسل فيها الماء لتجود (الليث) .

٣٢٠٠ - بربريس

ضرب من السمك يشبه الشبوط (السان) .

٣٢٠١ - بربريسان * Pogonornis (S).

Barbican (F). Barbican (E).
جنس طير من فصيلة الغنائيات . انواعه المعروفة نحو ١٥
جميعها افريقية المهد . معظمها من عصافير افريقية
الشرقية || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٢ الى ٣٠ سم .
تتميز بمنقيدها الكبيرة ، المستغلفة ، الضليعة ، المنشارية
الحفاف . رؤوسها معتدلة الجرم . سبالها كثيفة تمتد حتى
الزور . عيونها كبيرة مطوقة بالانحر . اثوابها ملونة يكثر
فيها الاسود والالمن والابيض والانحر . اجنحتها قصيرة ،
ذلقه . اذنانها مستطيلة ، مستديرة الاطراف . ارساغها
معتدلة الطول . اصابعها شديدة النشاط || قوتها الحشرات
المختلفة وبعض الثمار العنبية || تدثن افاحيصها في محاجر
تحتفرها في التربة . انثاها تبيض من ٣ الى ٤ بيضات
تخصنها بمناوبة الذكور نحو ١٣ يوما .

٣٢٠٢ - بربريس Clarias macrocanthus

سمكة نهريّة من فصيلة السلوريّات مستطيلة الشكل تشبه
الحنكليس . يكثر وجودها في بحيرات الحولة وطبرية .

٣٢٠٣ - بربريسة مأكولة *

Paropsia esculata (S). Paropsie comestible (F).
جنية معمّرة برية وزراعية من فصيلة الآلاميات . منها
بعض اصقاع مدغسكر والجزر المجاورة || ساقها فرعاء
متسلقة . اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها اهليلجية
الشكل ، مدببة الاطراف . ازهارها ضميّ التجميع ،
محوري الارتكاز . ازهارها صغيرة برتقالية اللون . ثمارها
كعابر رافعة ، حويصلية الشكل تحوي بذور مستطيلة
يغلفها جفت لحمي المادة ، عجي اللون ، شفاف ،
مستحب الطعم ، مأكول .

٣٢٠٤ - بربريس Rouget-barbet (F).

Mullus barbatus, Red mullet (E).
هو الطرستوج ، ويدعى سلطان ابراهيم .

٣٢٠٥ - بربريس صغير Petit Barbarin (F).

سمكة مشهورة تدعى طرستوج رملي . اطلها .

٣٢٠٦ - بربريس Borbonia (S). Borbonie (F).

جنس نباتات جنية تزيينية من القرنيات القراشية . مهدا
رأس الرجاء الصالح . انواعها تعد على الاصابع جميعها
جميلة الشكل والزهر لكنها تحشى الصقيع .

٣١٨٩ - بررايل Camall (F). Hackle (E).

عفر الطائر وهي ما استدار من الريش حول عنقه .

٣١٩٠ - بربرية Barbarée (F). Treacle mustard (E).

اطلب جرجير البر .

٣١٩١ - بربراط * Périgate (F).

جنس دويبات لافقارية ، رغابة التنفس من صف
الهندحيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من دويبات
البلاد الحارة تعيش في الاماكن المظلمة الرطبة || اجسامها
اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، قليلة الصلابة . رؤوسها
صغيرة . ثآشيرها قاضمة . عيونها زمنية التركيب . زيتها
مستطيلة . جرامها صغيرة ، دقيقة ، كثيرة العدد .
اثوابها عابقة يكثر فيها الاسود الجوي الموج .

٣١٩٢ - بربراطوذة Peucédane (F). Hog's fennel (E).

اطلب بخور الاكراد .

٣١٩٣ - بربرال Baribal

هو الدب الامريكي .

٣١٩٤ - بربراخ * Aqueduc (F). Aqueduct (E).

قناة لجر المياه عبر الوادي ترتكز على قناطر من حجر
او اقواس من باطن تمكنها من احتمال ثقل الماء وضغطه .

٣١٩٥ - بربراخ Epididyme (F). Epididymis (E).

جسم دقيق اهليلجي الشكل يستند على حنار الحصى
الخلي العلوي .

٣١٩٦ - بربراختي Caméléon (F). Chameleon (E).

راجع حرباء .

٣١٩٧ - بربريس * ، بربريس ، أنسبرباريس ،

إثرازة ، زرشك ، عود الريح

Berberis vulgaris (S). Berberis, Epine-vinette,
Vinettier (F). Barberry, Pipperidge, Barberry (E).
Berberize, Berberitze, Sauerdon (D). Berberis,
Birbero, Crespino, Spina acida (I).

جنس جنبات شائكة برية ويزينية من فصيلة البربريسيات
مهدا جميع البلاد المعتدلة الحرارة . انواعها كثيرة العدد
وقد يزرع منها للتزيين زهاء ٣٠ ، اوراقها متعاقبة او
ضمية . ازهارها عديدة الالوان عنقودية التجميع او
عشكولية . ثمارها عنبية صفراء اللون او حمراء يستخرج
منها صباغ وردي اللون يستعمل في صبغة الحرير والصوف
والقطن . ويستخرج من قشورها وجذورها واخشابها صباغ
اصفر ثابت اللون يعتبر من اجود الصباغات || اشهر
انواعه الزراعية ما يلي :

Berberis buxifolia (S). بربريس بقسي

Berberis à feuilles de buis (F). بربريس بهشي

Berberis ilicifolia (S). بربريس بهشي

Berberis à feuilles de houx (F). بربريس درويني

Berberis Darwinii (S). بربريس كندي

Berberis de Darwin (F). بربريس كندي

Berberis Canadensis (S). بربريس كندي

Berberis de Canada (F). بربريس كندي

Berberis acuminata (S). بربريس مؤنّف

Berberis à feuilles acuminées (F). بربريس مؤنّف

وثمار اكثر انواع البربريس لا تخلو من بعض الحموضة



بربراط



بربر



بربريس



بربريسان



بربريسة مأكولة

٣٢٠٧ - بُرْتَقَالِيَّةُ Iris des marais (F).
راجع سوسن المناقع . Yellow water flag (E).

٣٢٠٨ - بُرْبُيْنَس Barbeau (F). Barbus, Barbel (E).
هو البني ، جنس اسماك بحرية ونهرية .

٣٢٠٩ - بُورْت Serpe (F). Bill-hook, Hedge-bill (E).
البورت : أداة حادة التصل تستعمل في تشذيب الشجر .
والبورت هو السكر الابيض .

٣٢١٠ - بُورَة Anneau nasal (F). Nostril link (E).
حلقة تجعل في انف البعير تكون من حديد ونحوه .

٣٢١١ - بُورَة Caryopse (F). Caryopsis (E).
هي كل ثمرة جافة من ثمار النجيليات كالقمح والخرطال
والشيلم ، يلتصق غلافها الثمري بالبذرة .

٣٢١٢ - بُرْتَقَال ، بُرْتَقَان ، بُرْدُقَان ، جَنَه Citrus aurantium (S). Oranger (F). Common
orange tree (E). Orangenbaum (D). Arancio
dolce, Melarancio, Portogallo (I).

جنس اشجار مثمرة من الفصيلة البرتقالية . مهدد المقدر
بلاد الصين وقد سمي برتقالاً لان البرتغاليين هم الذين نقلوه
من الصين وعرفوه الى العالم الغربي || انواعه عديدة جميعها
مأكولة الثمار ، فرعاه اخيكل ، تعلو من ٦ الى ١٠ امتار .
قنبا مستديرة ، اوراقها مستطيلة مدببة العقصه ، معتقة ،
متعاقبة ، نصلها جميل الخضار ، لامع الصفحة العليا
المساء البشرة . ازهارها فردية او مشطية التجميع ، خماسية
البتلات المستطيلة ، البيضاء اللون ، فواحة العرق المستحب .
ثمارها كروية ، فوارقها النوعية كثيرة تعود الى الشكل
والحجم واللون والطعم .

اقليمه : يرغب في الاقاليم الحارة التي لا تهبط حرارتها
الدنيا عن ١٠ درجات ستيفراد . وهو يخشى جفاف الجو
ورطوبة الموقع والرياح الماصفة .

تربيته : يعيش في معظم الارربة لكنه يفضل المتناسية
التركيب الحكي المتوسطة الاندماج . ويجود في الارربة
الحوارة العميقة الغور بها كان هوها .

تكاثره : يتكاثر بالبذر والتعقل والتقيد والتطعيم .

زراعته : تنرس النصبوب في فصل الخريف ، بعد
تحضير التربة ، في صفوف متساوية ، متوازية الانباق
على ابعاد تراوح من ٥ الى ٨ امتار .

العناية : قوامها الري المعتدل الواجب وتنظيف التربة
من الاعشاب الضارة ومكافحة الحشرات والامراض ثم
التقليم والتشذيب || اشهر انواعه الوطنية والاجنبية ما يتبع .

٣٢١٣ - بُرْتَقَال أَبُورَة

شجرة كبيرة القد قوية النشط . اوراقها شديدة الخضار .
ثمارها كبيرة الحجم ، وزنها يراوح بين ١٨٠ الى ٢٥٠ غ
تتميز بجائتها الثملولي الذي يشبه السرة . قشرتها مبرغلة
الملمس ، سميكة اللب ، حصوصها جامدة جيدة العصارة
الحلوة المذاق . بزورها قليلة او لا وجود لها || تجود في
الارربة الخفيفة العميقة الغور . تتحمل الاسفار البعيدة .

٣٢١٤ - بُرْتَقَال بَلَدِي

شجرة فرعاه كبيرة القد ، متوسطة النشط والمناعة . اوراقها
متوسطة الحجم ، شديدة الخضار . تزهر عند اواخر اذار ،
ازهارها يدوم نحو الاسبوعين . نضج ثمارها يبتدئ في

اواخر تشرين الثاني ويستمر حتى اذار || ثمارها كروية
ملساء القشرة السميكة اللب ، حصوصها غزيرة العصارة
المستحبة الطعم . بزورها كثيرة يراوح عددها من ٩
الى ١٥ || تجود في الارربة الخفيفة القليلة الاندماج .
ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة .

٣٢١٥ - بُرْتَقَال بَلَدَنَسِيَّة ، بُرْتَقَال مُرْسِيَّة

Oranger de Valence, O. de Murcie
شجرة كبيرة القد هربية الشكل قوية النشط . اوراقها
كبيرة شديدة الخضار || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة
البعيدة ، وهي كروية الشكل ، قشرتها ثلثولية سميكة
اللبن . حصوصها جامدة جيدة العصارة اللذيذة الطعم
المطرية العرف || تجود في جميع الارربة الخفيفة ، العميقة
الغور .

٣٢١٦ - بُرْتَقَال بَلَدَنَسِيَّة المتخار ، بُرْتَقَال فلنسيا

Oranger tardif de Valence (F).
Valencia late (E).
شجرة كبيرة القد ، جميلة الشكل ، عديمة الشوك ، وافرة
الانتاج . تزهر في اوائل نيسان . ينضج ثمرها في آب
وايلول من السنة التالية || ثمارها متخارة تتحمل الاسفار
البعيدة وهي بيضوية الشكل . متوسطة الحجم ، قشرتها رقيقة
اللبن ، حصوصها جامدة جيدة العصارة الحلوة الطعم
المطرية العرف . بزورها كثيرة العدد ، من ٩ الى ١٢ .
تجود في جميع الارربة الخفيفة الحوارة الغنية بالعناصر
المعدنية .

٣٢١٧ - بُرْتَقَال بَلِيدَة Oranger de Blida

شجرة متوسطة القد قوية النشط وافرة الانتاج ، عديمة
الشوك || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة وهي مستديرة
الشكل ، سميكة اللب ثلثولية القشرة . حصوصها متوسطة
العصارة اللذيذة الطعم || تجود في الارربة القليلة الاندماج ،
العميقة الغور ، الغنية بالمواد العضوية والمعدنية .

٣٢١٨ - بُرْتَقَال بِيَّاس

شجرة كروية الشكل قوية النشط كثيرة الحمل . ثمارها
مستديرة ، متوسطة الحجم ، قشرتها رقيقة اللب . حصوصها
غزيرة العصارة السكرية المستحبة الطعم . بزورها عديدة
من ٩ الى ١٥ || تجود في الارربة الخفيفة القليلة الاندماج .

٣٢١٩ - بُرْتَقَال ثُومْبَسُون نافيل Thompson navel


شجرة متوسطة القد قوية النشط فارشة الاغصان ، الكثيرة
الشوك . اوراقها جميلة الخضار || ثمارها لا تتحمل الاسفار
البعيدة وهي كروية كبيرة القد مقلطحة القاعدة . قشرتها
مصقولة البشرة رقيقة اللب الحش . حصوصها غزيرة العصارة
الذيدة الطعم المطرية العرف || تجود في جميع الارربة
للقليلة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية .

٣٢٢٠ - بُرْتَقَال خُتْمَلِي

شجرة متوسطة النشط والمناعة . تزهر في اوائل نيسان . نضج
ثمارها يبتدئ في اواخر كانون الاول ويستمر حتى نيسان .
ثمارها كبيرة الحجم ، مستديرة الشكل ، نودلية الخاتم ،
قشرتها رقيقة اللب . حصوصها غزيرة العصارة الحلوة اللذيذة
الطعم والنكهة . بزورها من ٨ الى ١٠ || تجود في الارربة
الرملية العميقة الغور والغنية بالعناصر الغذائية .

٣٢٢١ - بُرْتَقَال شَمُوطِي ، بُرْتَقَال يَافَاوِي

شجرة متوسطة الحجم والنشط والمناعة . فروعها منبسطة ،



برتقال بلدي



برتقال بلنسية



برتقال بلنسية المشخار



برتقال ختملي



برتقال شموطي

لمة الحمضيات. اجناسها ثلاثة البرتقال والليمون والاترج. اما انواعها فعديدة. معظمها اشجار وشجيرات. مهددها المناطق الحارة الاسيوية والافريقية والامريكية والاسترالية.

٣٢٢٧ - بُرْتُوسُ أَشْقَح ٥ Berytus rufescens (S).
Béryte roux (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البرتوسيات. جسمها صغير. يطول من ٩ الى ١٠ مم. || ثوبها الى الحنطي الاشقي. رأسها مكور. خطمها معتدل الطول. زباناها شديدا الطول. عينها صغيرتان. كوسلها متوسط الجرم. ظهرها شبه شفاف، اشقي الاعصاب. بطنها حنطي اللون. قوائمها دقيقة مستطيلة || تألف المواقع الرطبة اخصها الاودية والحدائق. قوتها اوراق الاعشاب البرية.

٣٢٢٨ - بُرْتُوسُ شَالِكُ الزُبَانِي ٥ Berytus hirticornis (S).
Béryte à antennes hérissées (F).

حشرة خاضعة من فصيلة البرتوسيات. جسمها صغير. يطول نحو ٨ مم. ثوبها الى الحنطي. ظهرها شبه شفاف، تملوه مشحة وردية خفيفة. بطنها الى الحنطي الاسمر الموج || رأسها صغير مكور. خطمها مستدق. عينها صغيرتان ناشرتان. زباناها مستطيلان، كثيفا اطلب الشالك. كوسلها مخروطي. حنطها صغيرة. ظهرها ضيق مستطيل. بطنها صغير الجرم. قوائمها مستطيلة || تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء. قوتها اوراق الاعشاب البرية.

٣٢٢٩ - بُرْتُوسِيَّات ٥ Berytidae (S).
Bérytidés (F). Berytidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها عديدة، منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة. رؤوسها مكورة. اخطامها نحيلة رباعية الاجزاء. عيونها جانبية الارتكاز. قرونها الاستشعارية دقيقة، رباعية الفصل. قوائمها مستطيلة اخصها الزوج الخلفي || جميع اجناسها خاضعة ودائمة تعيش على اوراق النبات او في الجشالة.

٣٢٣٠ - بُرْتُ Terre meuble (F).
Mellow soil, Loose ground (E).

البرث هي اسهل الارض واحسنها. ج برات وابراث. ٣٢٣١ - بُرْتُ Griffé (F). Claw (E).
البرث من السباع بمنزلة الاظفار من الانسان والمخلب من الطائر.

٣٢٣٢ - بُرْتُ Fissipède (F). Fissiped (E).
نمت تمريني يطلق على كل حيوان من ذوات الاربع، اطراف قوائمه برئية التركيب.

٣٢٣٣ - بُرْج الأسد Le Lion (F). The Leo (E).
الكوكبة الخامسة من فلك الابراج. تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ تموز الى ٢٣ آب || صورته قريبة الشبه بالاسد. نجومه سبعة وعشرون. والعرب تسمي النجم الذي على وجهه من الخارج عن الصورة «سرطان الطرف». وتسمي الاربعة التي في العنق والقلب «الجهة». وتسمي التي على البطن وعلى الحرقفة «الزبرة». والذي على مؤخرة الذنب «الصرفة» لانصرف البرد عند سقوطه بالمغرب.

اوراقها كبيرة. تزهو عند اواخر اذار. ازهارها يدوم نحو عشرة ايام. نصج ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويدوم حتى شباط || ثمارها تتحمل الاسفار الطويلة وهي كبيرة القد بيضية الشكل، قشرتها خشنة الملمس سميكة اللب. حصوصها جامدة الخلايا، قليلة العصير اللذيذ الطعم والنكهة والعرف. بزورها قليلة يراوح عددها من ١ الى ٧ تجود في جميع الاثربة الحوارة القليلة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية.

٣٢٣٢ - بُرْتُقَال مَاورِدِي *
شجرة فرعاء كروية الشكل متوسطة النشاط والمناعة. تزهو في اواخر اذار. نصج ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويدوم حتى شباط || ثمارها لا تتحمل الاسفار البعيدة وهي بيضية الشكل صغيرة القد ملساء القشرة الرقيقة اللب. حصوصها حمراء اللون غزيرة العصارة المستحبة الطعم والعرف والنكهة. بزورها كثيرة يراوح عددها من ٦ الى ١٢. تجود في الاثربة الرملية الديابية العميقة الغور.

٣٢٣٣ - بُرْتُقَال مَغْرِبِي * ، بُرْتُقَال سُكْرِي ، بُرْتُقَال حَلْو


شجرة متوسطة القد شديدة النشاط. تزهو في اذار. نصج ثمارها يبتدئ في كانون الاول ويستمر حتى شباط. ثمارها تتحمل الاسفار وهي مستديرة الشكل، قشرتها سميكة اللب، حصوصها جامدة جيدة العصارة السكرية والطعم. بزورها كثيرة العدد من ٨ الى ٢٠ || تجود في جميع الاثربة الحوارة القليلة الاندماج.

٣٢٣٤ - بُرْتُقَال واشنطن نافيل * Washington navel
شجرة متوسطة القد فارشة الاغصان القليلة الشوك. اوراقها جميلة الخضار اللامع. ثمارها تتحمل الاسفار البعيدة وهي كروية الشكل. قشرتها مصقولة البشرة رقيقة اللب حصوصها جامدة غزيرة العصارة الحلوة || تجود في جميع الاثربة القليلة والمتوسطة الاندماج الغنية بالعناصر المعدنية.


٣٢٣٥ - بُرْتُقَالَة ، بُرْدُقَانَة Orange
هي ثمرة البرتقال، اشكالها والوانها واحجامها عديدة تختلف باختلاف النوع والاثربة والمناخ || عصارها غزيرة المادة الغنية بالفيتامينات وبمختلف العناصر الغذائية. فالمتة غرام من عصير البرتقال تحوي نحو ٩٠ مغ من الفيتامين «ث» والكثير من الفيتامين «آ» والقليل من الفيتامين «ب». وحداتها الحرارية تبلغ ٥٠ اما تركيبها الكيميائي فهو:

ماء	٨٧,٢ %
هيدرات الكربون	١١,٢ %
بروتين	٠,٩ %
ادهان	٠,٢ %
حامض ليموني ومختلف	٠,٥ %
اما العناصر المعدنية المتوفرة في العصير فهي:	
الكالسيوم	٢٤ %
الفسفور	١٨ %
الحديد	٤ %


٣٢٣٦ - بُرْتُقَالِيَّات Aurantiaceae.
Hesperidae (S). Aurantiacées, Hespéridées (F).
Aurantiaceae, Hesperideae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة القعالات من



برتقال ماوردي



برتقال مغربي



برتقال واشنطن نافيل

٣٢٣٤ - بُرْجُ التَّوأمين

Les Gémeaux (F).

Gemini, the Twins (E).

الكوكبة الثالثة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ ايار الى ٢١ او ٢٢ حزيران || تتألف من ٨٥ نجماً . وهي صورة انسانين راسيهما في الشمال والشرق وارجلهما في الجنوب والغرب وقد اختلطت نجوم احدهما بنجوم الآخر || والعرب تسمي النيرين الاثنين اللذين على راسيهما « الذراع المبسوطة » . واللذين على ثدي التوأم الثاني « الحقنة » . والذي على الركبة اليسرى من التوأم المقدم « المبسوطة » والذي على الركبة اليسرى من التوأم المؤخر « المقبوضة » والذي امام قدم التوأم المقدم « البخاتي » .

٣٢٣٥ - بُرْجُ الثَّوَر

Le Taureau (F).

The Bull, Taurus (E).

الكوكبة الثانية من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ نيسان الى ٢٢ ايار || وهي تتألف من ١٤١ نجماً . مقدم الثور الى المشرق ومؤخره الى المغرب وليس له كف ولا قائمتان خلفيتان . رأسه نشفت الى جنبه وقرناه الى ناحية المشرق . والنير الاحمر الذي على جبهته وهو مؤلف من خمسة نجوم يسمى « الدبران وعين الثور وتالي النجم وحادي النجم والفنيق » . والعرب تسمي النجوم التي على كاهل الثور وعنقه « الثريا » وهما نجمان يبران في خلاتها خمسة نجوم متقاربة كعنقود العنب .

٣٢٣٦ - بُرْجُ الجَدْي

Le Capricorne (F).

The Capricorn (E).

الكوكبة العاشرة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ كانون اول الى ٢٠ او ٢١ كانون ثان || عدد نجومها ٧٢ . صورتها قريبة الشبه بالجدى . والعرب تسمي النجمين اللذين على القرن الثاني « سعد الذابح » . سمي ذابحاً للصنوبر الملاصق له . وتسمي الاثنين النيرين اللذين على الذنب « الحجين » .

٣٢٣٧ - بُرْجُ الحَمَل

Le Bélier, Méduse (F).

The Ram, Aries (E).

الكوكبة الاولى من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ اذار الى ٢٠ او ٢١ نيسان . صورتها تشبه الحمل او الكبش || تتألف هذه الكوكبة من ٦٦ نجماً مقدمها الى جهة المغرب ومؤخرها الى المشرق . وجه الحمل منعطف على ظهره والنيران اللذان على القرن يسميان « الشرطين » . والنير الخارج عن الصورة يسمى « النطح » . واللذان على الالية مع الذي على الفخذ وهي على مثلث متساوي الاضلاع تسمى « البطين » || والعرب جعلت بطن الحمل منزلاً للقر كبطن السمكة وسمته « البطين » .

٣٢٣٨ - بُرْجُ الحَوَات

Les Poissons (F).

The Fishes, Pisces (E).

ويدعى برج السمكة . الكوكبة الثانية عشرة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ١٨ او ١٩ شباط الى ٢٠ او ٢١ اذار || عدد نجومها ١١٣ . وهما سمكتان الاولى متقدمة وهي التي على ظهر الفرس الاعظم في الجنوب والاخرى على جنوب كوكبة المرأة المسلسلة وبينهما شلة من النجوم متعرجة السطر الواصل بين السمكتين .

٣٢٣٩ - بُرْجُ الدَّلْو

Le Verseau (F).

The Water-bearer, Aquarius (E).

ويدعى برج ساكب الماء . الكوكبة الحادية عشرة من

فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٠ او ٢١ كانون ثان الى ١٨ او ١٩ شباط || عدد نجومها الواضحة بجلاء ٥١ . اما الصغيرة القليلة الوضوح فتقدر باكثر من مليون . والعرب تسمي النجمين اللذين على المنكب الايمن « سعد الملك » واللذين على المنكب الايسر مع الذي على ذنب الجدي « سعد السمود » . والثلاثة التي على اليد اليسرى « سعد بلع » فتشبهها بقم مفتوح ليلبع . وتسمي الذي على ساعده مع الثلاثة التي على يده اليمنى « سعد الاخوية » .

٣٢٤٠ - بُرْجُ الرَّاهِي

Le Sagittaire (F).

Sagittarius (E).

ويدعى برج القوس . الكوكبة التاسعة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٢ او ٢٣ تشرين ثان الى ٢٢ او ٢٣ كانون اول || عدد نجومها ٦٥ . والعرب تسمي النجم الذي على النصل والذي على مقبض القوس والذي على الطرف الجنوبي من القوس والذي على طرف اليد اليسرى من الياية « النعام الواردة » لأن الحجر شبت بنهر والنعام قد وردت النهر . وتسمي الذي على المنكب الايسر والذي فوق السهم والذي على الكتف الايسر والذي تحت الابطاء وهو بعيد عن الحجر الى ناحية المشرق ، « النعام الصادرة » . وتسمي اللذين على الجهة الشمالية من القوس « الظليين » . واللذين على الفخذ اليسرى والساق « الصردين » .

٣٢٤١ - بُرْجُ السَّرَطَان

Le Cancer, l'Ecrevisse (F).

The Crab, Cancer (E).

الكوكبة الرابعة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢١ او ٢٢ حزيران الى ٢٢ او ٢٣ تموز || صورتها قريبة الشبه بالسرطان . تتألف من ٨٣ نجماً . والعرب تسمي النجم النير منها « النثرة والملف او المزود » واسم النجمين التاليين للنثرة « الحمارين » . والنجم النير الذي على القائمة المؤخرة « الطرفة » || والنجمان المعروفان بالحمارين واحد منهما يدعى الحمار الجنوبي والآخر الحمار الشمالي .

٣٢٤٢ - بُرْجُ العَذْرَاء ، بُرْجُ السُّنْبُلَة

La Vierge, Epi de la Vierge, Parthénie (F).

The Virgo, Spica (E).

الكوكبة السادسة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ آب الى ٢٣ او ٢٤ ايلول || عدد نجومها ١١٠ . وهي صورة امرأة رأسها على الجنوب الصرفة . والعرب تسمي النجوم التي على منكبها الايمن « العواء » وهو المنزل الثالث عشر من منازل القمر . والنجم النير الذي بقرب يدها « السماك الاعزل » وبياضاته « السماك الرامح » لأن امامه كوكب صغير يقال له راية السماك ورجه . ونجوم القدم اليسرى تدعى « الففر » لنقصان الضوء .

٣٢٤٣ - بُرْجُ العَقْرَب

Le Scorpion (F).

The Scorpion, Scorpio (E).

الكوكبة الثامنة من فلك الابراج . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ او ٢٤ تشرين اول الى ٢٢ او ٢٣ تشرين ثان || عدد نجومها ٢٧ . صورتها كالعقرب . والعرب تسمي النجوم الثلاثة التي على الجهة « الاكليل » . وتسمي النير الاخر الذي على البدن « قلب العقرب » وتسمي الذي قدام القلب والذي خلفه « النياط » . وتسمي الذي في الحروات « الفقرات » . وتسمي الاثنين اللذين على طرف الذنب « الشولة » .

Bergénie purpurine (F).

نوع من البرجينة . منبتها بعض جبال الهند اخصها حملايا . شراخها خفي اللحم يرتفع من ٨ الى ١٥ سم . اوراقها اهليلجية ، مستديرة الاطراف . نصلها عادمة التسنين لونها الى الخضار البحري اللامع . ازهارها كبيرة القذ أرجوانية اللون العابق || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٣٢٥٦ - برجينة قلبية الورق ٥

Bergenia cordifolia (S).

Bergénie à feuilles cordiformes (F).

نوع من البرجينة . منبتها بعض الاقاليم الاسيوية اخصها جبال المنغول . شراخها اجرد يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها اهليلجية ، قلبية القواعد . نصلها ناشرة العروق ، متشارية الحفاف . ازهارها كبيرة القذ ، وردية اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٧ - برجينة لحمية الورق ٥

Bergenia crassifolia (S).

Bergénie à feuilles charnues (F).

نوع من البرجينة . منبتها جبال المنغول . شراخها يعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها اهليلجية ، مستدقة القواعد والاطراف . نصلها لحمية مسنة الختار . ازهارها صغيرة حمراء اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٨ - برجينة لسانية ٥

Bergenia ligulata (S). Bergénie ligulée (F).

نوع من البرجينة . مهدا جبال حملايا . شراخها خفي اللحم يرتفع نحو ٢٠ سم . اوراقها قلبية الشكل . نصلها خلية البشرة على الصفحتين . ازهارها قصيرة المعاليق بيضاء اللون || تنويرها يستمر من اذار الى ايار .

٣٢٥٩ - برجة Chamelle de valeur (F).

Goodly she-camel (E).

البرجة : الناقة من خيار الابل .

٣٢٦٠ - برد Grêle (F). Hail (E).

ماء جامد يسقط من الغيوم المتلبدة بشكل حبات كروية مختلفة الحجم .

٣٢٦١ - برد Aile d'insecte (F). Wing-shard (E).

يقال بردا الجراد والجندب : جناحاه .

٣٢٦٢ - برد صناعي Froid industriel (F).

Industrial-cold, Cold-storage (E).

هو البرد الحاصل من استعمال احدى طرق التبريد العديدة . وهو ضروري لحفظ الثمار واللحوم وغيرها من المحاصيل الزراعية السريعة العطب وذلك لان البرد يشل عمل الجراثيم ويقضي على بعضها .

٣٢٦٣ - برداء، ملاريا، أجمية Malaria

مرض خبيث يصيب الانسان والحيوان سببه بوع يعيش طفيلياً في الدم فيحله ويفقره . وبعض البعوض هو الذي ينقله الى الانسان والحيوان .

٣٢٦٤ - برداس Melandrium (S).

Melandre (F). Melandrium (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط السيلانيات وفصيلة القرنفلية . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بعض

La Balance (F).

٣٢٤٤ - بُرْج الميزان

The Scales, Libra (E).

الكوكبة السابعة من فلك الابراج ابتداء من برج الحمل . تجتازها المجموعة الشمسية من ٢٣ او ٢٤ ايلول الى ٢٣ او ٢٤ تشرين اول || عدد نجومها ٥١ . صورتها كالميزان ولا يوجد فيها نجوم ساطعة تستحق التسمية .

٣٢٤٥ - بُرْج حمام*، نمراد، ربيع

Fule, Colombier (F). Dove-cot, Pigeon-house (E).

بناء خاص لسكنى الحمام .

٣٢٤٦ - بُرْج جاد Métathorax (F). Metathorax (E).

هو في الحشرات الحلقة الصدرية الاخيرة اي الثالثة .

٣٢٤٧ - بُرْج جاس Point de mire (F).

Aim, Point aimed at (E).

٣٢٤٨ - بُرْج جد Mésothorax (F). Mesothorax (E).

هو في الحشرات الحلقة الصدرية الوسطى اي الثانية .

٣٢٤٩ - بُرْج جمعة Articulation des doigts (F).

٣٢٥٠ - بُرْج جوي Turriculé (F). Turriculate (E).

نعت تعريفي يطلق على كل صدفة وحيدة المصراع ، لولها منسوب الخلقة المتساوية المرتفعة كالبرج .

٣٢٥١ - بُرْج جية*، زنبق الأبراج، زنبق برونو

Paradisía Lilliastrum (S). Paradisic faux-lis, Lis de St. Bruno, Lis des Allobroges (F). St. Bruno's lily (E). Echte trichterlilie (D). Giglio di San Bruno (I).

نبات عشبي معبر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الزنبقيات . يرغب في الاتربة الكلسية القليلة الرطوبة . ساقه دقيقة نحيلة منتصبة تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقه مستطيلة ضيقة النصل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . ازهارها عطرية العرف ، بيضاء اللون ، تطول نحو ٥ سم . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٣٢٥٢ - بُرْج جية هائية ٥

Bergia aquatica (S). Bergie aquatique (F).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة الالطيقيات . منبته . مناقع حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه اسطوانية قليلة الفروع . اوراقه متعابلة ، رمحية النصل ، مسنة الختار . ازهاره ضمي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهاره صغيرة ثنية اللون .

٣٢٥٣ - بُرْج جيس Jupiter (F).

هو المشتري من كواكب مجموعة النظام الشمسي ، اطلبه .


٣٢٥٤ - بُرْج جينة* ٥

Bergenia (S). Bergénie (F). Bergenia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السفروسيات . اروماتها ضخمة . اوراقها بسيطة ، بعضها لحمي السيج . ازهارها عنقودية التجميع تتركز على شماريخ ضليعة ، قصيرة او متوسطة الارتفاع || تزرع للتزيين في الحدائق . انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

٣٢٥٥ - بُرْج جينة أرجوانية ٥

Bergenia purpurescens (S).



برج حمام




برجينة




برجينة



برده



بردي



بررجة شرسة



برزان



برساء أمريكي



برساء هندي

زبانها صولجانيان . جوشنها الى الكهبة السمره عند الذكر والى الطحلة عند الانثى . بطنها لبد الحمل ، اشجع اللون يعلوه موج امغر اربد || روشنها الاماميان الى الربدة تعلوها جدة وسطى مستعرضة عند الذكر ، مستضيقة عند الانثى . روشنها الخلفيان رباعيا الفلوس ، موشحان ومضلعان بالبي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار . تسرح في النهار . تعاقل بعد ظهورها بنحو تسعة اسابيع . تمتع الممكن لطخا على الصفحات السفلى من نصال العصف || السرفة عند بلوغها الكمال تقول من ٢٥ الى ٢٨ مم . جسمها اسطواني الشكل ، ملس القشار الناعم الحمل . ثوبها الى الصفار الاخضر تعلوه ثلاثة خطوط رصاصية . رأسها اسمر . شرجها مجهز بزائدة مقلوبة . مدتها ورواجها الى السمرة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينقضي في التربة تحت الجثالة ضمن غلاف عضوي المادة .

٣٢٧٢ - برزان * Eccremocarpus (S).

Eccramocarpe (F). Eccremocarpus (E).

جنس نباتات جنبيه معمرة برية وتزيينية من فصيلة البفونيات . انواعه المعروفة ستة مهدا بعض مناطق امريكة الجنوبية اخصها بلاد البيرو || ساقها وفروعها نحيلة متسلقة . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، ريشية ، تنتهي بحواقي دقيقة تمكها من التسلق . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها متوسطة القد ، مستطيلة الاعناق ، لونها الى الحمرة يعلوها موج اصفر او اخضر يختلف مع اختلاف الانواع || زراعتها التزيينية تستلزم المواقع الدافئة . تتكاثر بالبزور وبالعقل .

٣٢٧٣ - برس Cotonnier (F). Cotton plant (E).

البرس والبرس حو القطن ، اطلبه .

٣٢٧٤ - برس Ameublier (F). To make (soil) (E).

برس الارض : سهلها ولينها بالنبال والعمل .

٣٢٧٥ - برساء Mimusops (S).

Mimusope (F). Mimusops (E).

جنس اشجار حرجية وتزيينية من فصيلة السيوتيات . منبتها المناطق الاستوائية . انواعها المعروفة ٣٠ ، اشجارها متوسطة القد . اوراقها متعاقبة معنقة ، نصلها جامد الصفحة ، ملحق الشكل لامع البشرة . ازهارها فردية التجميع ابضية الارتكاز او محورية وهي بيضاء اللون او صفراء || اشهر انواعها الهندي والامريكي .

٣٢٧٦ - برساء امريكي Mimusops elata (S).

Mimusope élevé (F). Cow-tree of Para, Brazilian milk-tree (E). Kuhbaum von Para (D). Mimusopo (I).

نوع من البرساء . منبته المناطق الاستوائية الامريكية . شجرته غليظة اساق يستخرج منها بالحز عصارة صمغية مطاطة تستعمل في عدة صناعات .

٣٢٧٧ - برساء هندي * Mimusops elengi (S).

Cavequi, Elengi (F). Bukul tree (E). Elengibaum (D). Elengi (I).

نوع من البرساء ، مهد الهند ، اشجاره متوسطة القد . ثماره برنقالية الشكل سمره اللون مأكولة . يستخرج من ساقه بالحز عصارة صمغية مطاطة جيدة الصنف .

٣٢٧٨ - برسام Pleurésle (F). Pleurisy (E).

هو ذات الجنب ، مرض صدري يصيب الانسان وبعض

مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، منبتها الطوي الجرد والقم || سوقها مزغبة ، قليلة الفروع . اوراقها مستطيلة ، رحية النصال المدببة المتسامكة . ازهارها خماسية البتلات ، عشارية الاسدية ، بيضاء اللون . اشهر انواعها واعرفها :

برداس مخلي الكأس M. eriocalycinum (S).

M. à calice velouté (F).

M. pratense (S).

M. des prés (F).

برداس مرجي

٣٢٦٥ - بردة * رباك بردة ، أبو بصل

Chrysophrys berda (S). Daurade rose (F).

سمكة من الاسبوريات تنتمي الى جنس الرباك . طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم . لونها وردي مذهب الموج . تكثر في البحر المتوسط .

٣٢٦٦ - بردقان Oranger (F). Orange tree (E).

راجع برتقال .

٣٢٦٧ - بردقوش Marjolaine (F).

Annual marjoram (E).

هو المردقوش ، اطلبه .

٣٢٦٨ - بردقوش معقد Amaraque (F).

Amaracus (E).

هو المرو ، اطلبه .

٣٢٦٩ - بردي * بابير ، ببير ، بابيرس ، بابورس

Papyrus antiquorum, P. domesticus, Cyperus papyrus (S). Papyrus, Jonc du Nil, Souchet à papier (F). Papyrus, Nile papyrus, Paper-reed (E). Agyptisches zypergras, Papyrusgras (D). Papiro, P. egiziano, Giunco del Nilo (I).

نبات جذموري عشبي معمر من فصيلة السعديات . منبته مناطق البلاد الحارة . يكثر وجوده في بحيرات النيل الابيض والازرق . قيل فيه « رماده يجلو الاسنان ويقطع الدم حيث كان ويلحم الجراح واذا مضغ اذهب الحفر واوقف التآكل وهو يضر الاحشاء ويصلحه العسل » || وهو من النباتات اللادرق ها . ساقه مستقيمة عفية تعلو نحو ثلاثة امتار ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ سم . تكليل هامتها مجموعة من الازهار القرصية الشكل || وما اوراق البردي التي تسمى غريف وفيلكون وكولان وفافر والتي كانت تستعمل في العصور الغابرة سوى لحاء هذا النبات المائي المتراكب الاسقاط . اقدم اوراق البردي المحفوظة حتى الآن يعود تاريخها الى عهد السلالة الفرعونية الثامنة عشرة اي الى ١٨٠٠ سنة قبل الميلاد .

٣٢٧٠ - بردون Bardeau, Bardot (F).

Hinny, Pack-mule (E).

كل نفل ابو حصان وامه اتان . وعرفه العرب بداية الحمل الثقيلة البطيئة ج براذين .



٣٢٧١ - بررجة شرسة *

Pararge megaera, Laslommata megaera (S).

Pararge mégère, Mégère (F).

Pararge megaera (E).

حشرة من فصيلة المجانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . سوطها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . فراشتها جارية قوتها مغتر الازهار . سرفتها خاضعة تعيش على عصف النجيليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . بسطتها نحو ٤٠ مم . رأسها صغير الجرم . عينها كبيرتان .



٣٢٩٠ - برس - **برص**
يقال برص المطر الارض اذا اصابها قبل حرثها (القاموس).

٣٢٩١ - برسنة، برسنة Terre inapte à la culture
ارض لا تثبت شيئاً ج براص .

٣٢٩٢ - برسنسية*
Parsonsia (S). Parsonsie (F).

جنس نباتات عارضة ثنائية من فصيلة الدفليات. اوراقها
معنقة متقابلة رحيمة. ازهارها عنقودي التجميع، تاجي
الارتكاز. ازهارها مستطيلة زنادية جميلة الشكل، خاسية
البتلات، مستحبة العرف || انواعه المشهورة ثلاثة :

برسنسية جاوا Parsonsie de Java (F).

برسنسية كعبورية Parsonsie capsulaire (F).

برسنسية هائكة Parsonsie hétérophylle (F).

٣٢٩٣ - برطام - **برطام**
Lèvre épaisse (F). Lip thick (E).
الشفة الغليظة عند الحيوان. ج براطم .

٣٢٩٤ - برطم، أكالييف
Acalypha betulina, Acalypha fruticosa (S). Acalyphe (F). Cooper leaf (E).
Nesselschön, Zeckel (D). Acalifa (I).
جنية برية وتربينية من سبط البرطميات وفصيلة الفربيونيات.
مهدا البلاد الحارة. تزرع للتزيين وهي من النباتات
الطبية تفيد المعدة والامعاء.

٣٢٩٥ - برطم هندي
Acalypha indica (S).
Ricinelle (F). Acalypha tree, Three seedel mer-
cury (E). Exotisches bingelkraut (D). Ricinella (I).
جنية برية طيبة من البرطميات. منبها الهند يستخلص
من اوراقها وثمارها مواد دهنية تستعمل خارجياً في معالجة
السفلس وبعض الامراض الجلدية.

٣٢٩٦ - برطميات
Acaliphées (F). Acalyphe (E).
سبط من فصيلة الفربيونيات يشمل البرطم والخروج
والخلبوب.

٣٢٩٧ - برطوم
Poutrelle (F). Stop-plank (E).
البرطوم: خشبة غليظة يدعم بها البيت ويسقف.

٣٢٩٨ - برطيل
Ours âgé (F). Elderly bear (E).
البرطيل: الدب المسن.

٣٢٩٩ - برطونيه
Burtonia (S). Burtonie (F).
جنس نباتات برية وتربينية من سبط البدلاريات وفصيلة
القرليات الفراشية. مهدا استرالية || انواعه عديدة
جميعها انجم وجنات بعضها تربيني يزرع لجمال شكله
وزهره وبعضها حريف سام قلوي المادة الفعالة.

٣٣٠٠ - برعان*
Leuciscus (S). Gardon (F).

جنس اسماك نهري وبحيرية من فصيلة الشبابت. انواعه
عديدة تعيش جماعات في المياه العذبة. طولها يراوح من
٢٠ الى ٣٠ سم. ظهورها خضراء اللون وردية المواج،
بطونها فضية، زعانفها الى الخضار الاصفر || اشهر
انواعه ثلاثة الابيض والاخضر والاشقر.

٣٣٠١ - برعان أبيض
Leuciscus lepidus (S).
Gardon gracieux (F).

الحيوان. وفي عرف الاقدمين الحصى اذا دامت مع الصداع
والثقل في الرأس والحمة في الوجه وكراهة الضوء.

٣٢٧٩ - برسكة*
Pereskia (S). Péreskie (F).

جنس نباتات جندبة معمرة من فصيلة الصباريات. انواعها
المعروفة عديدة جميعها من ثبوت المناطق الحارة في امريكا
الجنوبية || سوقها وافنادها ليفية اسطوانية الشكل. اوراقها
عابلة، معنقة، لانظامية الارتكاز، بيضية الشكل،
لحمية النصال المنبسطة، ازهارها فردي ار عنقودي
التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها كبيرة، جميلة،
عديدة الالوان التي تختلف باختلاف الانواع. ثمارها
عنبية، مأكولة للباب || اوراقها غزيرة العصير، لذينة
الطعم، تؤكل طازجة ومطبوخة.

٣٢٨٠ - برسوم
Canne à sucre (F). Sugar-cane (E).
اطلب قصب السكر.

٣٢٨١ - برسونة*
Persona (S). Persona (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وفصيلة اليسوعيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في
معظم بحار البلاد الحارة || اصداقها صغيرة شبه اهليلجية
الشكل، محزنة، مستدقة الاقواب، مستطيلة الفوهات ||
اجسامها مخروطية، كبيرة الاردية، لانظامية الافواه.

٣٢٨٢ - برسيم، قنصل اسكندراني
Trifolium alexandrinum (S). Trèfle d'Egypte,
Trèfle d'Alexandrie (F). Egyptian clover, Bersim
clover (E). Agyptischer klee, Barsimklee (D).
Trifoglio alessandrino, Moscino minore (I).

نوع من النفل من فصيلة القطنيات وهو نبات حولي
علني وافر الانتاج والفائدة. اوراقه مركبة ثلاثية مستطيلة
المعاليق. ازهاره سنبلية التجميع هامة الارتكاز.

٣٢٨٣ - برسيم أحمر
Trèfle rouge (F).
Red clover (E).
اطلب فقل المروج.

٣٢٨٤ - برسيم الماء
Ménianthe (F). Buck-bean (E).
راجع إطريل.

٣٢٨٥ - برسيم حجازي
Luzerne cultivée (F).
Lucerne (E).
راجع نصة مزروعة.



٣٢٨٦ - برسيم ياباني
Lespedeza striata (S).
Trèfle du Japon (F). Japanese clover (E). Japani-
scher kleeber (D). Trifoglio del Giappone (I).

نبات علني من القطنيات وهو وافر الانتاج الحصري
حميد الخواص الغذائية. ساقه دقيقة فرعاء. اوراقه كثيفة
التجميع رريقاته بيضية صغيرة. ازهاره مفترية يحرسها
النحل.

٣٢٨٧ - برشاوشان
Adiante capillaire (F).
Maidenhair (E).
اطلب كزبرة البير.

٣٢٨٨ - برشك
برشك الجنود: فصلها وأبان بعضها من بعض.

٣٢٨٩ - برسوم
البرشوم: نوع من نخل البصرة وهو أبكر النخل ثمراً.



براعم مختلفة




برعم أنثائي



برعم خشبي



برعم زهري



برعم وري



برعموت

٣٣١٣ - بُرْعُم عَرَضِيّ Bourgeon adventif (F).
Adventitious bud (E).

هو الذي ينبت في أي مكان من الساق. والفند.

٣٣١٤ - بُرْعُم عَرِيَّان Bourgeon nu (F).

Naked bud (E).
هي العين أو الزمعة الصغيرة القائمة على ساق أو فرع
بعض الأعشاب لا يحضنها غلاف خاص يميز.

٣٣١٥ - بُرْعُم عَقِيم Agassin (F). Unproductive
lowest bud or shoot on a grape-vine (E).

هو كل برعم لا يشمر ينمو على ساق أو سرع الجفنة.

٣٣١٦ - بُرْعُم كَذِيب، بُرْعُم مَبْسُور Bourgeon anticipé, Faux-bourgeon (F). Untrue
bud, False bud (E).

هو كل برعم ينمو في غضون السنة على فند السنة الجديد.

٣٣١٧ - بُرْعُم مَحْوَرِيّ، بُرْعُم جَانِبِيّ، بُرْعُم إِبْطِي Bourgeon axillaire, Bourgeon latéral (F). Axillary
bud, Lateral bud (E).

هو ما ينبت عادة في إبط الأوراق.

٣٣١٨ - بُرْعُم نَهْم، بُرْعُم أَرْضِيّ Bourgeon souterrain (F). Underground bud (E).

هو الذي ينبت عند أسفل الجذع أو على الجذور.

٣٣١٩ - بُرْعُم وَرَقِيّ * Bourgeon à feuilles
Foliage leaf (E).

هي كل زمعة مستطيلة الشكل المخروطي ينجم عنها ورق.

٣٣٢٠ - بُرْعُمَة Ecussonnage (F). Budding (E).

هي التطعيم بالرقعة أو بالعين.

٣٣٢١ - بُرْعُون Ciste cotonneux (F).

هو اللادن الطوطي، اطلبه.

٣٣٢٢ - بَرْعُغ Salive des reptiles (F).

Saliva of the reptilia (E).

البرغ اللعاب وقد خصص بلعاب الزحافات.

٣٣٢٣ - بُرْعُغْز، بُرْعُغْز، بُرْعُغْز، بُرْعُغْز، بُرْعُغْز

ولد البقرة وقيل البقرة الوحشية (القاموس). الأنثى برغزة.

٣٣٢٤ - بُرْعُغْشَة Moustique domestique (F).

Mosquito (E). راجع بعوضة منزلية.

٣٣٢٥ - بَرْعُمُوت Bergamote (F). Bergamot (E).

عطر يستقطر من زهر وأوراق البرعموت.

٣٣٢٦ - بَرْعُمُوت *، لَيْمُون أَصْلَايا Citrus bergamia (S). Bergamotier (F). Bergamot
orange tree (E). Bergamottenzitrone (D). Berga-
motta (I).

شجرة من البرتقاليات، متوسطة القد، قوية النشاط،
قليلة الشوك. أوراقها أهليلجية معنقة جناحية. أزهارها
مشطية التجميع، كثيرة العدد، صغيرة القد، بيضاء
اللون، فواحة العرف. ثمارها ملساء القشرة، إيجاصية الشكل
سميكة اللب، حامزة العصارة. يستخرج من زهرها
عطر البرعموت. أما لبها فيروب.

نوع من البرعمان يغلب فيه البياض يكثر في دجلة والفرات
والعاصي.

٣٣٠٢ - بُرْعَمَان أَخْضَر Leuciscus prasinus (S).

Vaugeron (F).

نوع من البرعمان يغلب في لونه الخضار الاسمر. يكثر
في بحيرة ليان ونهر الدانوب.

٣٣٠٣ - بُرْعَمَان أَشْقَر Leuciscus rutilus (S).

Blanchet, Roche, Rousse (F).

نوع من البرعمان يغلب فيه اللون الأشقر الفضي الموج،
يكثر في المياه الفرنسية والألمانية.

٣٣٠٤ - بِرْعَس Chamelle bonne laitière (F).

She-camel a great deal of milk (E).

البرعس هي الناقة الغزيرة اللبن.

٣٣٠٥ - بُرْعَمَل Hyenon (F).

البرعل ولد الضبع. والفرعل أيضاً.

٣٣٠٦ - بُرْعُم *، بُرْعُمَة، بُرْعُم، بُرْعُمَة،

زَمْعَة Bourgeon (F). Bud (E).

هو الجسم الصغير الابتدائي الحالة المخروطي الشكل الذي
يتكون في أنثبات عند إبط الورقة ثم ينمو وينفتح عن
قضييب أو ورقة أو زهرة. وتختلف تسمية البراعم بالنسبة
إلى مواضعها وأوضاعها.

٣٣٠٧ - بُرْعُم إَحْتِطَاطِيّ Contre-bourgeon (F).

Reserve-bud (E).

هي العين أو الزمعة الصغيرة البطيئة النمو التي تتكون عند
قاعدة الفصن ومن الحيلة الإبقاء عليها لتجديد الفصن
فيما لو تلفته بعض الموارض.

٣٣٠٨ - بُرْعُم التَطْعِيم Ecusson (F).

Slip with bud for grafting (E).

هي العين أو البرعمة التي انتزعت مع ما يحيطها من لحاء
لتكون طعماً لنبتة أخرى (راجع تطعيم).

٣٣٠٩ - بُرْعُم إِنْتِهَائِي *، بُرْعُم طَرَفِيّ، بُرْعُم

هَامِي، غَرْنُوق إِنْتِهَائِي Bourgeon terminal (F). Terminal bud (E).

هو البرعم الذي يتكون عند نهاية الفصن أو القضييب. فهو
إذا برعم استمرار ومتابعة النمو لذلك يصح نعتة ببرعم
الامتداد.

٣٣١٠ - بُرْعُم حَرَشَقِيّ Bourgeon écailleux (F).

Squamous bud (E).

العين أو الزمعة الصغيرة القائمة على ساق أو فرع إحدى
النباتات الليلية أو العشبية المعمرة والتي تحضنها الحراشف
الورقية.

٣٣١١ - بُرْعُم خَشْبِيّ * Bourgeon à bois (F).

Wooden bud (E).

كل زمعة مستطيلة الشكل ينجم عنها قضييب أو أوراق،
وهو بخلاف البرعم الزهري أي الابنة التي تنجم عنها
الزهرة.

٣٣١٢ - بُرْعُم زَهْرِيّ * Bourgeon à fleurs (F).

Flower bud, Blossom bud (E).

اطلب ابنة.

٣٣٣٩ - برغموث البربوع (S). Mesopsylla eucta (S).
Puce de la gerboise (F).
يركب البربوع ومعظم الحيوانات القاضمة .

٣٣٤٠ - برغموث حاشف (S). Sarcopsylla penetrans (S).
Puce pénétrante, Chique (F). Jigger flea, Chigoe (E).
ويقال له البرغموث الحارق والنافذ والثاقب وهو ينخر
الجلد ويدب تحته ليتمتع ببيضه .

٣٣٤١ - برغموثيات (S). Pulicidae (S). Pulicidés (F).
Pulicidae (E).
فصيلة البراغيث من رتبة القذانيات وطبقة عديمات الجناح.
اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القد . اجسامها
حرفية مضغوطة الجانبين . قرونها الاستشعارية مشدونة
الطول ثلاثية الفواصل تقم في تجاويف خاصة مركزها
وراء العينات . اخطامها مستطيلة تنتهي بمشاك ثاقبة
ماسة . قوائمها كبيرة قوية معدة للقفز .

٣٣٤٢ - برغموث * (S). Perigona (S).
Périgone (F). Perligna (E).
جنس حشرات من فصيلة البرغموثيات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق
البلاد الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة ، معتدلة
التخطيط ، تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها
ناشرة . تأثيرها وفكوكها قياسية . ملامسها مهدبة الاطراف .
قرونها الاستشعارية قلادية الشكل . كواسلها واعمالها
مصدقة . بطونها مفلطحة . اغمارها لاحفة ، مهدبة الخثار .
قوائمها نشطية . اثوابها تراوح بين الكستني والجووي ||
الحشرة الجمالنة حابة ودائمة . البرقة دامتة .

٣٣٤٣ - برغموثيات * (S). Perigonidae (S).
Périgonidés (F). Perigonidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة
والاستوائية || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٥ مم .
رؤوسها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . عيونها كبيرة ،
ناشرة . تأثيرها وفكوكها قياسية . ملامسها هليية الاطراف .
قرونها الاستشعارية قلادية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة .
كواسلها واعمالها مصدقة . اغمارها مهدبة الخثار || جميع
انواعها دامتة وتعيش على الجذور والحبوب وسائر المواد
النباتية المطبوعة || اشهر اجناسها البرغموث

٣٣٤٤ - برغموث (S). Perfektan
حاشور زراعي يرتكز على مادة الليندان وهو جزيل
النفع ، شديد الوقع ، يقضي على معظم الحشرات الضارة .
له نوعان تجاريان السائل والمسحوق . فالسائل يحوي
٢٣ ٪ من الليندان الفعال ويستعمل نضجاً على النباتات
والمسحوق يحوي ٧٠ ٪ من الليندان الفعال ويستعمل
تغصيراً .

٣٣٤٥ - برغموث * (S). Brephos (S).
Bréphos (F). Brephos (E).
جنس حشرات فراشية من حشرغيات الاجنحة وفصيلة
النسقيات . انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من فراشات
الشرق الاوسط واروبة || يرقاتها خاضعة تعيش على مختلف
الاعضاء النباتية || اشهر انواعه واضرها برغموث البتولا
(Br. Notha) يرقته نومة تركب البتولا فتؤذيها وتعطب
الشجير والخشب .

٣٣٢٧ - برغموث بري (F). Bergamote sauvage (F).
Wild bergamot (E).
اطلب نبت الخيل .

٣٣٢٨ - برغموث
البرغن هو ولد البقرة الوحشية .

٣٣٢٩ - برغموث (S). Pulex (S). Puce (F). Flea (E).
جنس حشرات صغيرة وخازة مؤذية من فصيلة البرغموثيات
تمتص الدم من جسم الانسان والحيوان وتنقل اليه الامراض
الميكروبية ومنها الطاعون || كنيته ابو طافر ، ابو عدي ،
ابو الثواب ، طامر بن طامر || والبراغيث انواع منها ما يلي .

٣٣٣٠ - برغموث الإنسان * ، برغموث عذام
(S). Pulex irritans (S). Puce de l'homme (F). Irritating
flea (E).
هو البرغموث المعروف يعيش في الاماكن القذرة يقتحم
الانسان وينقل الامراض الخبيثة اخصها الطاعون .

٣٣٣١ - برغموث البحر * ، نفروب *
(S). Nephrops (S). Néphrops, Langoustine (F).
دوية من القشريات عشاريات الارجل طويلة الذيل .
موطنها يمتد من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي .
يكثر وجودها قرب شواطئ الجزائر || تتميز بنحالة
الجسم والقوائم ، باستطالة وضخامة الملاقط ، وبدقة
واستطالة القرون الاستشعارية . طولها يراوح من ٢٧ الى
٣٠ سم . ثوبها متراكب الجؤوي والاحمر والازرق والبرتقالي
والبنّي الاصفر الموج || تعتبر من الانواع الجيدة الصنف .

٣٣٣٢ - برغموث البساتين (F). Puce des jardins (F).
برغموث البساتين وبرغموث الخضر وبرغموث الملفوف ...
انواع من الدقة اي الاتيز ، راجع دقة .

٣٣٣٣ - برغموث السمك (F). Puce des poissons (F).
هو الارغول ، دوية من القشريات الدنيا . اطلبه .


٣٣٣٤ - برغموث السنور (S). Pulex felis (S).
Puce du chat (F). Cat flea (E).
يعيش على جميع السنوريات اخصها القط .

٣٣٣٥ - برغموث الطيور الداجنة (S). Pulex ovium (S).
Puce des oiseaux de basse-cour (F). Poultry flea (E).
يركب جميع الطيور الداجنة فيؤذيها .


٣٣٣٦ - برغموث الفأر (S). Xenopsylla cheopis (S).
Xenopsylla, Puce des souris (F). Xenopsylla, Mouse
flea (E).
يركب الفأر والجردان .

٣٣٣٧ - برغموث الكلب (S). Ctenocephalus canis (S).
Puce du chien (F). Dog flea (E).
يركب الكلب ويؤذي .


٣٣٣٨ - برغموث الماء * (S). Daphnia pulex (S).
Daphnie, Puce d'eau (F). Water beetle (E).
نوع من الدوبيات الصغيرة المائية ينتمي الى القشريات .
يعيش جماعات في المياه الحلوة الراكدة وهو احمر اللون
قريب الشبه من البرغموث ويقفز مثله ولذلك سمي برغموث
الماء .




برغموث



برغموث البحر



برغموث الماء



برغموث




برغموث



برقة



برقش مبدول




برقوق



برقوق البر



برقونية



بركة

انواعه عديدة جميعها شجيرات وجنات . اعطانها البلاد الحارة . اوراقها متعاقبة مركبة وثرية التجميع ، وريقاتها صغيرة بارزة العروق . ازهارها نورية خاسية التركيب . ثمارها مأكولة تشبه البرقوق شكلاً وحجماً || اشهر انواعه ما يلي .

٣٣٥٥ - برقوق البر الاحمر ، برقوق اسبانيا

Spondias purpurea, Spondias mombin (S). Spondias d'Espagne, Prunier d'Espagne (F). Spanish plum, Red mombin (E).

٣٣٥٦ - برقوق البر الحلو

Spondias dulcis (S). Spondias doux, Pomme cythère (F). Sweet mombin, Caja manga (E).

٣٣٥٧ - برقوق شائك ، خوخ شائك

Prunus spinosa (S). Prunier épineux, Prunellier, Epine noire (F). Sloe tree, Black thorn, Bullace (E). Schlehenpflaume (D). Prugnolo, Pruneillo, Spina florita (I).

شجرة برية فرعاء شائكة من الخوخيات وفصيلة الورديات . منبها شرقي حوض البحر المتوسط . تعلو من ٢ الى ٣ امتار . افنانها زياء اللحاء . اوراقها صغيرة . ازهارها فردية التجميع ، بيضاء اللون ، وردية التوشيح || ثمارها صغيرة القدر كروية الشكل طولها نحو ٢ سم .

٣٣٥٨ - برقوقية

Pariconia جنس فطور مجهرية من اللدخيات وفصيلة اللطحيات . مشيجه مداد قليل الكثافة والوضوح . جربه الكنيديية بسيطة التركيب تحمل في اطرافها شفيرات رافخة تعلوها كنانة كروية الشكل ، فردية التجميع ، عابقة الالوان . انواعه عديدة معظمها رمي يعيش على المواد النباتية المنحلة .

٣٣٥٩ - برقي ، ضيفن

Parasite (F). البرقي هو الطفيلي من الفطور والنبات . اطلب ضيفن .

٣٣٦٠ - بركار

Circé (F). Circinus (E). البركار كوكب سيار من الخنثس يحمل رقم ٣٤ .

٣٣٦١ - بركار

Compas (F). Compass (E).

٣٣٦٢ - بركان

Volcan (F). Volcano (E). البركان فجوة في جوف الارض تتصل بالقشرة الارضية بواسطة ثغرة ضيقة تنهي بفوهة تندفع منها عند الثوران غازات ومعادن مصهورة ملتهبة تعرف بالطفح .

٣٣٦٣ - بركاني

Volcanique (F). Volcanic (E). راجع ارض بركانية وحرّة .

٣٣٦٤ - بركة ، بط خضاري ، شريف خضري

Anas platyrhyncha, Anas boschas (S). Canard colvert (F). Mallard, Wild duck (E).

طائر بري من فصيلة البطيات . اصغر من البط الاهلي . ثوبه متراكب الالوان الجميلة يفتل فيها الاخضر والاطحل . موطنه فسيح الارحاء يشمل البلاد الاسيوية والافريقية والاوربية التي يحوب بعض اصقاعها كل عام . يألف المياه العذبة . يعيش جماعات كثيرة العدد . يدن في اعشاب المناطق والهور . الانثى تحضن وحدها نحو ٤ اسابيع من ١٢ الى ١٦ بيضة .

٣٣٤٦ - برقأ

Brebis pie noire (F). البرقاء هي الشاة التي يشق صوفها الابيض طاقات سود . الذكر ابرق .

٣٣٤٧ - برقانيات

Polynéoptères (F).

Polyneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المكنحات اصلاً تشمل ثلاث طبقات وتسع رتب والكثير من الفصائل وعدة الاف من الاجناس والانواع || طبقاتها الثلاث هي جلديات الجناح ومستقييات الجناح والوردانيات || اما رتبها فهي جلدية الاجنحة ومستقيية الاجنحة والجلفسيات والفصسيات والاشيانيات واللؤلؤيات والسرفيات والعفانيات والسردييات .

٣٣٤٨ - برقفة

Hydnum imbricatum (S). Hydne imbriqué (F). Barbes (E). Braca-Baca (D). Penchenilio, Poncherillo (I).

فطر من الابريات ورتبة الدعاميات . وهو من الفطور الصالحة للاكل || ساقه غليظة قصيرة تعلو الارض من ٥ الى ٨ سم . ارسوسه رمادية اللون مستديرة الشكل حشفية الصفحة العليا ، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٥ سم . حراشفيها حنطية || لبابه وافر السماكة جامد المقطع اسمر اللون مر الطعم قبل طبخه || يكثر وجوده في احراج الصنوبر . يظهر في آب ويبقى حتى تشرين الثاني .

٣٣٤٩ - برقش ، شرشور

Fringilla (S). Pinson (F). Finch (E).

جنس عصافير من الجواثم المحروطيات المناقير . انواعه عديدة تشبه الدوري لكنها اكبر قدماً . اثنائها متداخلة الالوان . جواثمها مستطيلة . اذنانها فارقة . ارساغها لحيمة . اناثها اصغر قدماً من ذكورها . وهي من القواطع تألف الغابات والحدائق والبراري قوتها البزور البرية وبعض الحشرات والهور . تدن في الاشجار الظليلة اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكور || اشهر انواعه ثلاثة وهي :

٣٣٥٠ - برقش الاحراج

Fringilla montifringilla (S). Pinson des ardenes (F). Brambling, Mountain finch (E).

٣٣٥١ - برقش الثلج

Fringilla nivalis (S). Pinson des neiges, P. niverolle (F). Alpin finch (E).

٣٣٥٢ - برقش مبدول

Fringilla coelebs (S). Pinson commun (F). Chaffinch (E).

٣٣٥٣ - برقوق ، خوخ بري

Prunus insitilla, Prunus salvaticus (S). Prunier sauvage (F). Wild prune tree (E). Wilder haus-pflaume (D). Prugno salvatico (I).

شجرة برية فرعاء شائكة من الخوخيات وفصيلة الورديات . منبها حوض البحر المتوسط . تعلو من ٣ الى ٧ امتار . افنانها وافندها زياء اللحاء . ازهارها ثنائية او ثلاثية التجميع ، بيضاء اللون . ثمارها شبه كروية طولها نحو ٣ سم . لونها بنفسجي .

٣٣٥٤ - برقوق البر ، اجاص البر

Spondias (S). Spondias, Mombin (F). Spondias, Mombin, Hog plum tree (E). Mombin, Monbinbaum (D). Spondio, Susinastro (I).

جنس نباتات حرجية وزارعية من فصيلة الراتنجيات .

Amphibie (F). **٣٣٧٨ - برمائي، قازب**

Amphibious, Amphibian (E).

البرمائي أو القازب، هو كل حيوان مسكنه الماء ولكنه يستطيع الخروج منه بعض الوقت كالقطة وفرس البحر والتساح.

Programmer (F). **٣٣٧٩ - برمج**

To program (E).

وضع البرامج.

Programmation (F). **٣٣٨٠ - برمجة**

Programming (E).

البرمجة التحديد المسبق لتنسيق العمل وكيفية تبسيطه ونشره.

Parmentiera (S). **٣٣٨١ - برمنتية***، **برمنتيرا**

جنس اشجار متوسطة القد من فصيلة البينوليات. مهدها المناطق المعتدلة الأمريكية. سوقها ملساء اللحاء. اغصانها متشعبة الافناد. اوراقها معنقة مركبة. ازهارها محورية الارتكاز. ترمع على الاغصان والافناد. انواعها قليلة اعرفها:

Parmentiera edulis (S). **٣٣٨٢ - برمنتية مأكولة**

ثمارها قرون لحمية اسطوانية مستطيلة مأكولة اللب.

Parmentiera cereifera (S). **٣٣٨٣ - برمنتية شمعية**

ثمارها قرنية يستخرج من بذورها مادة شمعية شائعة الاستعمال الصناعي.

٣٣٨٤ - برمنتغينات البوتاس

Permanganate de potasse (F). Potassium perman-ganate (E).

هو ملح الحامض البرمنغنكي مع البوتاس. وهو من المطهرات الزراعية الفعالة الشديدة الاثر.

Perminvar (F). Perminvar (E). **٣٣٨٥ - برمينفار**

مركب معدني يحوي ٣٠٪ من الحديد و ٤٥٪ من النيكل و ٢٥٪ من الكوبلت. رغبته المغنطيسية المرتفعة تجعله شائع الاستعمال في صناعة الكلل المغنطة.

Sisyrinchium (S). **٣٣٨٦ - برمودية***

Bermudienne (F). Eyed grass (E).

جنس نباتات جذمورية معمرة من فصيلة السوسنيات. انواعه زهاء ٥٠ معظمها امريكي المنشأ. جذورها ليفية. اوراقها مزدوجة التصفيف. ازهارها ضيقة التجميع. شرعائها ثنائي المصراع || ترغب في التربة الخصبة المتوسطة الاندماج والرطوبة. اعرفها ما يتبع.

٣٣٨٧ - برمودية البرمود

Sisyrinchium Bermudianum (S). Bermudienne des Bermudes (F). Blue eyed grass (E).

نوع من البرمودية، ساقها شراخية، مفلطحة، منتصبه. تملو نحو ٢٥ سم. اوراقها قرصية الانتشابه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ٦ مم. ازهارها هامية الارتكاز، متوسطة القد، لونها الى الزرقة الجميلة. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

٣٣٨٨ - برمودية كبيرة الزهر

Sisyrinchium grandiflorum (S). Bermudienne à grandes fleurs (F).

نوع من البرمودية، ساقها شراخية، اسطوانية، نحيلة

Mare (F). Pool, Pond (E). **٣٣٦٥ - برمكة**

وهذه طبيعية او اصنع اليد مكشوفة تجمع وتحصر فيها المياه للاستفادة منها. وقد تدعى حوضاً عندما تخصص لتربية الاسماك.

Barkeria (S). Barkérie (F). **٣٣٦٦ - برمكيرية***

نبات استحي وحيد الجنس والنوع من السحليات الجوليات. مهدها المكسيك || تعيش طفيلية. سوقها شراخية. اوراقها حاضنة عصفية النصال، حيلة الخضار المزتر بالجقوي. ازهارها معنقة، كبيرة، عاجية اللون يعاوها موج وردي.

٣٣٦٧ - برمكشت، سوار الهند

Helicteres Isora (S). Hélictere, Isore (F). Isora, Screw tree, Twisted horn (E). Isora helictere (D). Isora (I).

جنس اشجار وجنات برية وثرينية من فصيلة الخبازيات مهدها البلاد الأمريكية والهند. انواعها المعروفة نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني. اوراقها كاملة لا قياسية الارتكاز. ازهارها خنثوية ابطية الارتكاز نورية التجميع.

Perchlorate **٣٣٦٨ - بركلورات**

هو ملح الحامض ملظير كلوريكي. اشهر هذه الاملاح بركلورات البوتاسيوم.

Perchlorure (F). Perchloride (E). **٣٣٦٩ - بركلوريد**

هو الكلوريد الذي يحوي اكبر كمية ممكنة من الكلور.

Volcanologie (F). **٣٣٧٠ - برمكتة**

Volcanology (E).

البركتة علم يبحث في الظواهر البركانية ومسبباتها.

Parkia (S). Parkie d'Afrique (F). **٣٣٧١ - برمكية***

شجرة دائمة من فصيلة القرنيات السنطية. منبتها بعض الاقطار الافريقية. ساقها غليظة، اغصانها فارشة، ارتفاعها يبلغ نحو ١٥ م. اوراقها ريشية ثنائية المشط. ازهارها زنادية ٤ ناحية الارتكاز، حمراء اللون. ثمارها قرنية، قرونها مفلطحة، طويلة، تضم عدة حبوب صغيرة مستديرة تستعمل استعمال البن.

Xénopelte (F). **٣٣٧٢ - برمكيل**

البركيل حية بيوض عادمة السموم تدعى حذابة. اطلبها.

Ophisure serpent (F). **٣٣٧٣ - برمكيل البحر**

هو رستان البرق، من الاسماك البحرية، اطلبه.

Brachyure **٣٣٧٤ - برمكيورس**

هو الأوكاري، جنس قروود من فصيلة السبوسيات.

Berlandieri **٣٣٧٥ - برلندياري**

نوع من الاجفان البرية الاصل تستعمل كامهات لانها قوية النشاط والمناعة.

٣٣٧٦ - برم


البرم: ثمر الغضاء. الواحدة برمة. وقيل ثمر الطلح. والبرم: حب العنب اذا كان مثل رؤوس الذر.

Barrémien, Urgonien **٣٣٧٧ - برمائي، أرغوني**

ساف من الطبقة الطباشيرية مركزة تحت الأبناسي وفوق النكوبي.



بركية



بركية




برمنتية



برمودية




برموديس



برناسة



برناسة



برنثة



برنق



برنوف

مناطق جبال البلاد المعتدلة الحرارة والباردة || سوقها مقرة .
اوراقها قرصية الانتشاب ، مستطيلة الاعناق ، كلوية
النصال الصغيرة الجرداء البشرة . ازهارها فردية ، خاسية
البتلات ، تتركز على شوايخ محوفة مستطيلة . ألوانها
تختلف مع الانواع ، يسود فيها الاصفر || ثمارها جراء
عديدة البزور ، منفلة ، ثلاثية المصارع او رباعيتها .

٣٣٩٧ - برناسيات ٥
Parnassiaceae (S).
Parnassiaceae (E). Parnassiaceae (F).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة ، مستقلات الثعلالات .
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت
المناطق الباردة والمنحرفة نحو المعتدلة || اشهر اجناسها
البرناسة .

٣٣٩٨ - برناشة*
Camptolaimus (S).
Camptolaime (F).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة صفيريات المناقير .
انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها البلاد القطبية || اجسامها
متوسطة الحجم ، كبيرة الاجنحة ، قصيرة الاذناب .
مطوقة الاعناق . يغلب فيها اللون الابيض ومنها الشهباء ||
اشهر انواعها واعرفها برناشة لبرادور (C. Labradoricus).

٣٣٩٩ - برنقة*
Perna (S). Perne (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيريات الحياشيم
عادات المشايخ وفصيلة الاطيريات . انواعها المعروفة نحو
٥٠ منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة || اصداها متباينة
الاشكال والاحجام ، لانياسية المصارع . مفصلاتها
عامة الاسنان || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة الغور .

٣٤٠٠ - برنق
Ribellier (F). Embellia (E).

اطلب برنق .

٣٤٠١ - برنقجاسف
Armoise commune (F).
Mugwort (E).

راجع شويلاء .

٣٤٠٢ - برنشم ، وكن ٥
Parenchyme (F).
Parenchyma (E).

هي نسج الاغذاء والخضيب في نصل الورقة من كل نبات .

٣٤٠٣ - برنق* ، برنق
Embellia (S).
Embellie, Ribellier (F). Embellia (E). Ribellie (D).
Embellia (I).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة اجناحيات . اعطائها
البلاد الاسيوية الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٠
جميعها جنات ومعرشات . اوراقها متعاقبة ، كاملة ،
جلدية النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، محورية
الارتكاز او تاجية . ثمارها نووية وحيدة العجمة || اشهر
انواعها الزراعية البرنق الكابل . ثماره مأكولة وترب .

٣٤٠٤ - برنوف* ، شهابانج ، طباق البراغيث ،
راسن البراغيث

Inula conyzoides, Pulicaria odora (S). Aunée co-
nyze, Herbe aux puces (F). Flea-wort, Flea-bane,
Ladies' Gloves (E). Dürnwurz, Grosses flöhkraut (D).
Incensario, Erba della pulci (I).

نوع من الراسن وهو نبات عشبي بري طبي معمر من
فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ينبت في جميع مناطق
الشرق الاوسط . ساقه فرعاء فناء . اوراقه حاذئة ، متعاقبة ،

منتصبه تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها سنانية النصل
الصيق الصفحة . ازهارها كبيرة القد ، جرسية الشكل ،
متدلية . لونها الى الازجواني العابق || ازهارها يستمر من
ايار الى حزيران .

٣٣٨٩ - برمودية مخططة
Sisyrinchium striatum (S).
Bermudienne striée (F).

نوع من البرمودية ، ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبه .
اوراقها سنانية ، نصلها ضيق الصفحة المخططة . ازهارها
سنبلية التجميع ، كبيرة القد ، صفراء اللون ، موشحة
بالبنفسجي || ازهارها صيني وخريفي .

٣٣٩٠ - برمودية نخيلية

Sisyrinchium graminifolium (S). Bermudienne
graminoïde (F).

نوع من البرمودية . ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبه ،
تعلو من ٢٠ الى ٤٥ سم . اوراقها عصفية الشكل . ازهارها
صفراء اللون يعلوها تبقيج احمر || ازهارها يستمر من
نيسان الى حزيران .

٣٣٩١ - برمودية نخيلة الورق

Sisyrinchium palmifolium (S). Bermudienne à
feuilles de palmier (F).

نوع من البرمودية . ساقها شمراخية ، مفلطحة ، منتصبه ،
اوراقها قرصية الانتشاب نخيلة الشكل . ازهارها ضمية
التجميع ، هامة الارتكاز ، صفراء اللون موشحة بالحنطي .
ازهارها صيني .

٣٣٩٢ - برنوس* ، نضارية الكرمة ، خنفساء

Bromius obscurus villosulus, .
Eumolpus vitis, Adoxus obscurus (S). Eumolpe de
la vigne, Ecrivain, Gribouri, Diablotin, Bête à
forge, Bête à café (F). Western grape rootworm (E).
Weinstock-Falkkäfer (D).

خنفساء صغيرة من فصيلة النضاريات . طولها نحو ٥ مم .
محدودة الشكل ، لونها الى السواد الفحفي || يرقها صغيرة
دقيقة تركب اوراق الكرمة وعنها ولا تمف عن الجذور
فتسرد نخها وقد تقضي عليها || تكافح عند ظهورها باستعمال
احد الحواشير الفعالة نفساً على الكرمة .

٣٣٩٣ - برمني
Permien (F). Permian (E).

نعت تعريفية يطلق على الحقبة الخامسة والاخيرة من الاباج
القديم . فيقال العصر البرمي والاراضي البرمية . وكلمة
برمي منسوبة الى بلدة « برم » الروسية الواقعة على نهر
« كاما » الذي يصب في نهر « الفولغا » || تتميز هذه
الحقبة بانقراض الاسماك صفيريات الجلود ، وبكثرة
الرخويات اغصها عنقديات الارجل ، وبازدهار مستورات
الزهر الوعائية وعريانات البذور .

٣٣٩٤ - برميل
Baril, Barrique, Tonneau (F).
Small barrel, Cask, Tun (E).

وعاء من خشب او حديد يستعمل لحفظ السوائل ونقلها .

٣٣٩٥ - برميل الخمر ، دن
Fût (F). Barrel (E).

وعاء من خشب يستعمل ما لا يقل عن مائة لتر تحفظ
وتنقل فيه الخمر .

٣٣٩٦ - برناسة*
Parnassia (S). Parnassie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية وزراعية ثريبتية من
فصيلة البرناسيات . انواعها المعروفة نحو ١٥ . اعطائها

غدها متتابعتا التحزير القاطب . ارساغها خاسية العقل ||
الانثى اميز قدأ من الذكر وابته ثوباً منه واضخم بطناً ||
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط
الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتبيت
في النهار || البرقة التي تدرك الكمال الجسموري بعمر ستة
اشهر تطول نحو ١٥ سم . جسمها شبه اسطواناني الجرم ،
قليل التقويس ، سداسي الرواجب ، اطحل اللون ، صغير
الرأس المكور الاسمر || طور الأكمال الذي يستمر نحو
ثلاثة اسابيع ينفضي ضمن صلاتجة خاوية الغشاء السميك
المركب من مواد نباتية معجونة بالريال .

٢٤١٦ - برهوسيات ٥
Byrrhidae (S).
Byrrhidae (F). Byrrhidae (E).

فصيلة حشرات دامتة من رتبة غمديات الاجنحة || اجناسها
وانواعها قليلة العدد . مهدا معظم مناطق البلاد المعتدلة
الحارة . تألف الاراضي المذحاة والرملية على السواء .
تعيش مختبئة تحت الحجارة والطحالب والجشالة وقشور
الاشجار وعندما تشعر بخطر مداهم تدخل رؤوسها تحت
كواسلها وتقلص جوامزها في اخاديدها البطنية المعدة
لضمها || اجسامها صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مسترة
الرؤوس ، جتاحة الزباني المركبة من ١١ فصلة . كواسلها
محدودة . اغمادها مخددة لاحقة . جوامزها نشيطة . ارساغها
خاسية العقل || اشهر اجناسها البرهوس .

٢٤١٧ - بروار دومينيكي ٥
Paroaria dominicana (S).
Paroaria dominican (F).

طائر من البروار ينتمي الى فصيلة الشرشوريات . موطنه
المناطق الحارة من البرازيل . يألف الغابات والادغال
وضفاف مجاري الماء . نظامه الحياتي جماعي . فوجه يعد
من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو
١٨ سم . ثوبه العلوي الى الشبهة السبورية العابقة . ثوبه
السفلي الى البياض الاغبر . رأسه وقزله وعنقه الى الحمرة
الدموية . زفده اسود . منقاده شديد السمرة . رسغاه الى
السمرة القائمة || طيرانه خفيف الحركة ، سريعها ،
معتدل الشوط . قوته التار العنينة والبذور والحشرات . يألف
حياة الاسر ويعيش ويتكاثر في القفص || يدثن عشه
في الادغال . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها
بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٢٤١٨ - برواق، برواق، سريرش
Asphodelus (S).
Asphodèle, Baton royal (F). Asphodel, King's rod,
Silver rod (E). Kaiseraffodill, Kaiserscepter (D).
Asphodillo, Cibo regio, Asta regia (I).

جنس نباتات عشبية ترابية معمرة من فصيلة الزنبقيات .
سوقها شراخية تغلفها اوراق متتابعة ، لحية النسيج ،
دقيقة النصل ، مستطيلة . ازهارها عنقودي التجميع ، هامي
الارتكاز . ازهارها سداسية التركيب والتقسيم . رائحة
الجمال ، هية || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٢٤١٩ - برواق أبيض
Asphodelus albus (S).
Asphodèle blanc (F).

٢٤٢٠ - برواق أصفر
Asphodelus luteus (S).
Asphodèle jaune (F).

٢٤٢١ - برواق مدّاد
Asphodelus ramosus (S).
Asphodèle rameux (F).

رجحية الشكل . فصلها ازغب البشرة اللزجة . ازهاره صفراء
اللون ، مرة المذاق ، عطرية الرائحة .

٢٤٠٥ - برني
Cochelet (F). Cockerel (E).
البرني ج براني: الديكة الصغار حين تدرك .

٢٤٠٦ - برنيق
Hippopotame (F).
Hippopotamus (E).
هو فرس البحر . اطلبه .

٢٤٠٧ - برنيق
ضرب من الكأة . والبرنيق هوتقن النهر ورسابة الماء فيه .

٢٤٠٨ - برهان*
Porphyrio (S).
Porphyrio (F). Porphyrio, Gallinule (E).

جنس طير من فصيلة التفليقيات . انواعه المعروفة ١٧
معظمها من طيور حوض البحر المتوسط . جميعها كاسرة
قوتها الحيات والعطاء والجردان والفيضان والدويبات والحشرات
وبعض الاعشاب . ترغب في المناقع وتألف جوار الماء .
اثوابها جميلة الالوان الزاهية التي يغلب فيها الارجواني
والبنفسجي والازرق || اشهر انواعه ما يتبع .

٢٤٠٩ - برهان ثخنون
Porphyrio caeruleus (S).
Porphyrio des marais (F). Allen's gallinule (E).

٢٤١٠ - برهان سلطاني، قرحة سلطانية
Porphyrio porphyrius (S). Poule sultane (F).
Green-backed gallinule (E).

٢٤١١ - برهان قرقور، قرقور
Porphyrio chloropus, Gallinula chloropus (S).
Poule d'eau (F). Purple gallinule (E).

٢٤١٢ - برهامة ٥
Périthélie (F). Perihel (E).
اقرب محل لسيارة من الشمس .

٢٤١٣ - برهامة
Frondaison (F).
Foliation, Foliage (E).

جماع ما يعلو هيكل الشجرة من ورق ونور وثمر .

٢٤١٤ - برهنيدي*، كروان الجبل، كروان جبلي
Ædicnemus (S). Ædicnème, Burhinid (F). Stone-
curlew (E).

جنس طير من دجاجيات الارض القواطع . انواعها سبعة .
اثوابها دبسة . مناقيرها وسبقانها مستطيلة . عيونها جاحظة .
اجنحتها ذلقة . اذنانها قصيرة . تسرح في الليل ولها فيه
صوت مانوس || ترتاد المواقع المرتفعة القريبة من الماء .
قوتها الحشرات والديدان . تدثن في الاشجار . اناثها تبيض
وتحضن اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ يوماً .

٢٤١٥ - برهوس مستدير ٥
Byrrhus pilula (S).
Byrrhe ové (F). Byrrhus pilula (E).

حشرة دامتة من فصيلة البرهوسيات ورتبة مفيدات الاجنحة .
موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الادنى
واروبية . تألف الاراضي المذحاة والرملية على السواء .
خنافسها ويرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها
صغير القد ، بيضي الشكل ، يطول من ٨ الى ١٠ سم .
ثوبها الى السمرة الكستنية الصنابية الموج . رأسها مخروطي
ينور بكامله تحت الكوسل . عيناها صغيرتان ماحتان .
زباناها صرلجانيان جتاحتان . كواسلها قلنسوي الشكل .



برهان



برهنيدي



برهوس مستدير



بروار دومينيكي



برواق أبيض



برواق مدّاد

هو أدنى مستوى يهبط فيه ماء النهر ، وكل ماء نابع ، في السنة .

٣٤٣١ - بروفاليّة * Browallia (S).

Browallie (F). Browallia (E).
جنس نباتات تزيينية معمرة من فصيلة الخنازيريات ، منبها أمريكية الاستوائية . أنواعها الزراعية ثلاثة البيضاء والزرقاء والبنفسجية . أوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية ، نصلها جميل الخضار مدبب العقصة الذرية . أزهارها نوري التجميع طرفي الارتكاز . أزهارها صغيرة القد ، مستطيلة الأنبوب ، جميلة الشكل .

٣٤٣٢ - بروفتية Brownée (F).

راجع براونيه .

٣٤٣٣ - بروق Asphodèle (F). Asphodel (E).

راجع برواق .

٣٤٣٤ - بروقة Brunellia (S). Brunellie (F).

جنس نباتات حرجية من فصيلة البروقيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الحارة والاستوائية || جميعها اشجار فروع معتدلة الارتفاع . سوقها ملساء اللحاء . أوراقها متعاقبة ، قصيرة الاعتق ، اهليلجية النصال ، ناشرة للمروق والاعصاب . أزهارها عشكولي التجميع . أزهارها خنثوية ، خماسية البتلات . ثمارها جراء . أخشابها صناعية ، صلبة ، تبنية اللون .

٣٤٣٥ - بروقيّات Brunelliaceae (S).

Brunelliacées (F). Brunelliaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفعالات . اجناسها وأنواعها قليلة العدد . منبها الطوعي بعض الاصناف الحارة والاستوائية اخصها أمريكية الجنوبية || جميع أنواعها اشجار وشجيرات تعلو من ٤ الى ١٢ م . أوراقها متعاقبة . أزهارها خنثوية . ثمارها جراء عديدة الاخبية || أشهر اجناسها البروقة .

٣٤٣٦ - بروم Brome (F). Bromin, Bromine (E).

عنصر شبه معدني رمزه (بر) يوجد في الطبيعة متحداً ببعض المعادن . وزنه الانعيمي ٧٩,٩٢ || وهو سائل لزج ، احمر اللون ، نفاذ الرائحة المهيجة يغلي بحرارة ٥٨,٨° سغ . وهو يزيل الالوان || مركباته عديدة تستخدم في الطب كطهرات ومسكنات وتستخدم في التخفيف وفي التصوير الفوتوغرافي .

٣٤٣٧ - برونشيت Bronchite (F). Bronchitis (E).

هي الزلة الشعبية .

٣٤٣٨ - بروتيّة Asphodeline (S).

Asphodéline (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الزنبقيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منبها يمتد من الشرق الأدنى الى بعض مناطق اوروبا || شكلها قريب الشبه من البرواق . سوقها مورقة متتابعة الاوراق تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها ملسة النصال المحرمة المخزنية الشكل . أزهارها عنقودي التجميع ، طرفي الارتكاز . أزهارها صفراء اللون ، مستحبة العرف الفواح || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .



برودنيه ليتوره



بروفاليه

٣٤٢٢ - بروتايين ، بروتين. Protéine (F). Protein (E).
مادة آسية مركبة تتكون من عناصر مختلفة اهمها الكربون والأزوت . وهي احدى المواد الرئيسية الثلاث التي يتكون منها غذاء الانسان والحيوان فهي اذن ضرورية لنمو الجسم ولتكوين العضلات ولتعمييض الاحتراق الداخلي . توجد بكثرة في معظم الحبوب الجافة كالحنطة والعدس والبقول كما توجد في اللحوم والاجبان وبيض البيض .

٣٤٢٣ - بروتن Proton
ذرة كهرباء سلبية .

٣٤٢٤ - بروتوبلازمه ، ودقة Protoplasme (F).

Protoplasm (E).
هي المادة اللزجة الحية الموجودة داخل جدار الخلية النباتية وضمنها السيتوبلازمه التي تحوق بالجلية . وهذه البروتوبلازمه صفات وخصائص عديدة منها : القدرة على تأكسد الغذاء وتمثيله وعلى الحركة والنمو ثم القوة على التكاثر .

٣٤٢٥ - برودة أيار Maialisme

برودة في الطقس تحصل غالباً خلال شهر ايار وقد يعزونها خطأ الى التسر .

٣٤٢٦ - برودنيه ليتوره * Prodenia litura (S).

Chenille défoliante (F). Cotton worm, Tobacco caterpillar (E). Agyptische Baumwollraupe (D).

يرقها تدعى دودة ورق القطن ، اطلبها || فراشة من فصيلة انفسقيات موطنها البلاد الحارة . طولها يراوح من ١٤ الى ١٧ مم . وبسطها من ٣٠ الى ٣٦ سم . روشناه الاماميان مقطوبان بخطوط طويلة ومعترضة ومزركشة لونها الى الصفار الباهت . روشناها الخلفيان الى البياض الصدي ، عروقها سمر وحارها كذلك . زبانها خيطية مستطيلة . رأسها وصدرها الى البني العابق . بطنها اغبر ، ترجاته سمر || تسرح في الليل . اناتها تضع من ١٠٠٠ الى ١٥٠٠ مكنة تمتحها على اوراق النباتات العائلة ضمن اجربة وشعية الشكل يتسع الواحد منها الى نحو ٣٠٠ مكنة تنفق بعد متحها بثلاثة ايام في الصيف وبعد اسبوع في الربيع والخريف وبعد ثلاثة اسابيع في الشتاء || يرقاتها تنسلخ خمس مرات ثم تتحول الى عذارى داخل شرافق من الطين || اجيالها اخوية سبعة . عوائل يرقاتها عديدة اخصها القطن والبرسيم والذره والتبغ والبندوره والبطاطا ... كما انها لا تعف عن الكرمه والتين والتفاح والاجاص والخوخ والموز .

٣٤٢٧ - بروز Emergence (F). Emergence (E).

حالة ما هو بارز . اما نقطة البروز فهي النقطة التي يبرز منها الشعاع الضوئي عند خروجه من المحيط الذي يحجاز . وهي كذلك مركز اندفاق مياه الينبوع في الارض .

٣٤٢٨ - بروز الحوشب ، تقوس الحوشب Bouleture (F). Overshot fetlock (E).

عيب يصيب حوشب الخيل .

٣٤٢٩ - بروسين Brucine (F). Brucin (E).

مادة شبه قلووية سامة تستخرج من جوز القي .

٣٤٣٠ - بروض ، تحاريق ، شحاح Etiage (F).

Low-water mark (E).

الى ٤ سم. ثوبها اخضر اللون ، ازرق الموج . تركيب مع يرقاتها جميع اجناس وانواع الصليبيات فتؤذيها .

٣٤٥١ - برّيس الملفوف *
Baris laticollis (S).
Baridie du chou (F).

حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات . طولها نحو ٣ سم. ثوبها اسود اللون لامع . تركيب الملفوف وبعض الصليبيات تمتح مكنها على السوق فينقف عن يرقات نحيلة دقيقة تنخر عوائلها وتعيش في السرايب التي تحضرها داخل اللحم.

٣٤٥٢ - برّيسكة شعراء
Beris hirsuta (S).
Bériss velu (F).

حشرة من فصيلة الوطافيات . جسمها صغير القند خلي القشار ، مبعثر الحلب ، يطول من ٦ الى ٨ سم. رأسها معتدل الجرم ، مستدير القفن . عينها فارتقان . ملاسها صغيرة وقصيرة . زباناها منتصبان ، سداسيا الفصل . صدرها ازرق اللون ، اسفح الموج . حجبها رباعية المناخن الذرّة . بطنها سداسي السكم ، صناعي اللون ، اسمر الحيد . روشنها كبيران ، تعلوها مشعة صناعية خفيفة . قوائمها مستطيلة || تألف المواقع التي تكثر فيها الاعشاب والازهار . يرقاتها حنطية اللون ، سود الرؤوس ، تعيش على المواد النباتية والعضوية المنحلة .

٣٤٥٣ - برّيسكة

البريسكة دابة صغيرة دون الوزغة اذا عضت شيئاً لم يبرأ (اللسان) .

٣٤٥٤ - برّيللا
Perilla (S). Pérille (F).

بريللا هو الاسم الهندي . نبات عشبي حولي عطري من فصيلة الشفويات . مهدد بعض اصقاع الهند . يزرع للتزيين ولعرقه القواح || ساقه زبّاء تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. أوراقه متعاقبة معتقة سنالية النصال المستدقة القاعدة والظرف . ازهاره فردية ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة للمعاليق ، بيضاء اللون ، فوّاحة العرف || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٣٤٥٥ - برّيليوم، غلوسينيوم

Béryllium, Beryllium, Glucinium (F). Beryllium (E).
عنصر معدني يكثر وجوده في الزمرد . وهو على شكل بلورات معدنية الموج تحترق في الاكسجين وتشتعل في الفليور والكلور والبروم || رمزه (Be) ثقله النوعي ٩٠.٠٢ ووزنه الاتومي ٩.٠٢ || تراكيبه عديدة يذوب في الحوامض والحوارض . استخدامه الصناعي لا بأس به .

٣٤٥٦ - برّاق
Accipitres, Accipitridés,
Accipitriens, Autours (F). Accipitres (E).

عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل اربعة اجناس : الباز والباشق والزمج والمصرح . جميعها ريمة الجثة ، متوسطة القد ، معتدلة العنق ، صغيرة الرأس . سواقطها معتدلة الاستدارة والطول . زماكها وارساغها مستطيلة . مناسرها قصيرة ، مسنة الحافة ، منعقة البهرة الذرّة || اعطائها العالم تألف الاحراج والغابات . وهي شرسة الاخلاق حادة المزاج . قوتها القواضم والزحافات والعصافير وكل حيوان صغير تتمكن منه .

٣٤٥٧ - بزاز العذراء
Hélichryse stœchade (F).
Cassidony (E). راجع امارنطون : نبات عشبي ترابي .

٣٤٣٩ - برّي Sauvage (F). Savage, Wild (E).
هو في النبات خلاف البستاني او الزراعي وفي الحيوان خلاف الاهلي او الداجن .

٣٤٤٠ - برّي
Terrestre (F).
Terrestrial, Earthly (E).
هو خلاف البحري .

٣٤٤١ - برّيتون
Péritoine (F). Peritoneum (E).
غشاء الكرش .

٣٤٤٢ - برّيد
Tigre (F). Tiger (E).
هو البر ، اطلبه . وقد جاء في الدميري : « ويقال انه متولد من الزرقان واللبوة ومن طبعه ان الانثى منه تلقح من الريح ولهذا كان عدوه كالريح ولا يقدر احد على صيده وانما تسرق جرائه فتجعل في مثل القوارير من زجاج ويركض بها على الخيول السابقة فاذا أدركهم ابوها ألغوا اليه قارورة منها فيشتغل بالنظر اليها والخيلة في اخراج ولده منها فيفوته بقيتها » .

٣٤٤٣ - برّيسر
Salvadore (fruit) (F).
Salvadore (fruit) (E).
ثمر الاراك حلو مأكول . قال ابو حنيفة : « عنقوده يملأ الكف وله عجمة مدورة صلبة اكبر من الحصص قليلا . الواحدة بريرة » .

٣٤٤٤ - برّيزة، قصفة
Briza (S). Brize (F).
جنس نباتات عشبية برية من النجيليات . انواعه عديدة نحو ٣٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية المعتدلة الحرارة . اعرف واشهر انواعه الاربعة التالية .

٣٤٤٥ - برّيزة أنيقة*
Briza media (S).
Brize amourette, Amourette (F). Lady's hair, Pearl grass (E). Kleines zittergras (D). Erba brillantina, Tremolina (I).
عشبة معمرة تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. عصفها قرصي التجميع متوسط الطول . سبلتها نحيلة الساق ، هرمية الشكل ، عنقودية . ازهارها بحيلة زرقاء اللون .

٣٤٤٦ - برّيزة صغيرة
Briza minor (S).
Brize petite (F).
عشبة حولية تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. عصفها ضيق مستطيل . سبلتها عنقودية التجميع ، هرمية الشكل بنفسجية الازهار .

٣٤٤٧ - برّيزة كبيرة
Briza maxima (S).
Brize grande (F).
عشبة حولية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. عصفها ضيق النصل مستطيل . سبلتها عنقودية التجميع . ازهارها خضراء اللون .

٣٤٤٨ - برّيزة منتصبة
Briza erecta (S).
Brize dressée (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. عصفها طويل النصل المريض . ازهارها سنبل الشكل والتجميع .

٣٤٤٩ - برّيزيا
Cécidomyie des feuilles de poirier
راجع طيفار ورق الاجاص .

٣٤٥٠ - برّيس أزرق*
Baris oerulescens (S).
Baridie bleue (F).
حشرة صغيرة من فصيلة السوسيات . طولها يراوح من ٢



بريزة أنيقة



بريس أزرق



بريس الملفوف



بَزَاقَةُ البَسَاتِين



بَزَاقَةُ الْحَقْلِ



بَزَبُور



بَزَّة



بَزَّةُ أَرْجَوَانِيَّة

٣٤٦٥ - بَزَبُور *
Pezoporus (S).

Pézopore (F). Pezoporus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السدافيّات. موطنه تسمانية وأستراليا الجنوبية والغربية. ملجته الحياتي زوجي. يألف المناطق والمواقع الفاحلة. يعدو على الأرض بسرعة ولا يطير إلا نادراً. مسرحه دجوي يستمر من الغروب إلى الفجر. جسمه معتدل القد، مستطيل الذنب، قصير المنقار الأعقف. ثوبه إلى الخضار المتفاوت الماحجات يعلوه تسليج أصفر وأسود. جبهته أرجوانية اللون. يلدش أفعوصه بين الأعشاب المتكاثفة المستعصية. الأنثى تضع أربع بيضات تحضنها وحدها نحو ١٩ يوماً. بينما الذكر يؤمن لها الغذاء.

٣٤٦٦ - بَزَّة *
Zygaena (S).

Zygène (F). Zygaena (E).

جنس حشرات من فصيلة البزبات ورتبة حرشفيّات الاجنحة. أنواعها عديدة جميعها صغيرة القد، اجسامها غابقة الاثواب، زياء الكنف. اجنحتها الامامية إلى السمرة المشبعة بأحد الألوان تعلوها بقع حمراء والخلفية إلى السمرة السوية يحوقها اطار عابق. زبانها صقّية مستطيلة، ملامسها دقيقة، مراشفها طويلة. وهي من الحشرات الثنائية الجيل الحولي. يكوم الذكر انثاه في اوائل الربيع. وتمتص الأنثى مكها المستدير الاصفر اللون الذي يراوح عدده من ١٠٠ إلى ١٥٠ على صفحات الاوراق السفلى او بين شقوق اللحاء. فيثقف بعد عشرة ايام او اسبوعين عن يرقات صغيرة زياء البشرة طحلاء الظهر المخطط بالاسود، غبراء البطن سوداء الرأس. يدوم تطور اليرقة نحو ثلاثة اسابيع. تمر بخلها في ثلاثة السلاخات ثم تتحول إلى خادرة ضمن شرنقة مغزلية الشكل غبراء اللون تخرج منها بعد ثلاثة اسابيع حشرة كاملة (فراشة). تعيد سيرتها الاولى ولكنها لا تخرج من سباتها الخلدري إلا في اوائل الربيع. ضررها محصور بما تقوم به اليرقة من نشاط في ثقب والتهام البراعم والزبعات والاوراق. تكافح باستعمال اي حاشور كان من الحواشير الكثيرة العدد التي تترك امر انتقاء احدها إلى الميسور منها. اما اشهر انواع البزة واعرفها واضرها فهي التالية.

٣٤٦٧ - بَزَّةُ أَرْجَوَانِيَّة * ، بَزَّةُ الصَّعْتَر

Zygaena purpurais (S). Zygène pourpre.

Zygène du thym (F). Zygaena purpurais (E).

حشرة من فصيلة البزبات ورتبة حرشفيّات الاجنحة. موطنها بعض الاقاليم المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط إلى اوروبا. فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار. سرقتها خاضلة قوتها اوراق الصعتر وزبعاته. جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ مم. بسطتها نحو ٣٦ مم. رأسها معتدل الجرم. عينها صغيرتان فاشرتان. زبانها صقّيان مستطيلان، نجوشنها وبطنها إلى الكستني الاسفع الموج. روشتها الاماميان إلى الطحلة المشبعة بالاحمرار الأرجواني. حنارها مطوّق بالاسود. روشتها الخلفيان إلى الحمرة الارجوانية يحوقها اطار ضيق اسود. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في النهار. تعازل بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتص المكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق. السرفة عند بلوغها الادراك الثام تطول من ٢٨ إلى ٣٠ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل. ثوبها إلى الطحلة يعلوها موج اسمر

Cobra cracheur (F).

٣٤٥٨ - بَزَاق

البزاق حية سرلودة سامة مؤذية تدعى عطف نفثات. اطلبه.

٣٤٥٩ - بَزَاقِي
Limax (S). Limaces (F). Slugs (E).

جنس حيوانات من الرخويات وفصيلة البزاقيات. انواعه عديدة اعرفها:

Limax arion rufus (S).

البزاق الاغر

Limace rousse (F). Reddish slug (E).

البزاق الكبير

Limax maximus (S).

Limace grande (F). Great slug (E).

٣٤٦٠ - بَزَاقَةُ البَسَاتِين *

Limax arion hortensis (S).

Limace des jardins (F). Black field slug (E).

نوع من البزاق. دوية من الرخويات عادمات الفقار تنتمي إلى فصيلة البزاقيات. جسمها نابض، يطول نحو ٤ سم. محدب الصفحة العليا، منبسط المدب. قشورها مشبك الغشاء يعلوه قرب الرأس درع كلبي المسادة، غصروفي الغشاء، محدودب كالضهارة، مثقوب الجانب الايمن، يلحف التجويف الخيشومي. ثوبها إلى الشقحة السمر. رأسها وملامسها إلى السمرة السوداء. ملامسها العلويان كبيراً القد يشبهان بعينين مكورتين. ملامسها السفليان قصيران دقيقان. خطمها قاصم. تألف البساتين والمباقل. قوتها المواد النباتية المختلفة اخصها نواحي البقول واوراقها الفتية. وهي كالحلزون من الدويبات الخشوية التي تحمل الاعضاء التناسلية الذكورية والانثوية في آن واحد. تبيض في اوائل الربيع من ٧٠ إلى ٨٠ بيضة تنقف بعد اربعة اسابيع. وهي تفرز عند الشعور بالخطر مادة فوارة حامضية التركيب كريمة الرائحة تبعدها عنها الاعداء. وتفرز ايضاً عند زحفها على بعض الاثربة وعلى القش والاوراق مادة لعابية لزجة تمكها من الدب على السطوح المتحركة.

٣٤٦١ - بَزَاقَةُ الْحَقْلِ *
Agriolimax agrestis (S).

Limace des champs, L. agreste (F).

Grey field slug (E).

نوع من البزاق. دوية من الرخويات عادمات الفقار تنتمي إلى فصيلة البزاقيات. جسمها يطول نحو ٦ سم. وهو كبزاق البساتين محدودب الصفحة العليا يعلوه درع مثقوب يلحف التجويف الخيشومي. ثوبها إلى الكهبة تعلوها رقشة سمر. رأسها وملامسها أعقب ماجة من ظهرها. مدبها اغبر اللون. تألف المراعي والحقول. قوتها المواد النباتية. وهي خشوية كسائر انواع البزاق. تبيض في اوائل الربيع من ٨٠ إلى ١٠٠ بيضة تنقف بعد اربعة اسابيع.

٣٤٦٢ - بَزَاقِي
Limacien (F). Slugging (E).

نعت وصفي يطلق على ما كان شكله كالبزاق.

٣٤٦٣ - بَزَاقِيَّات
Limacidae (F). Limacidae (E).

فصيلة حيوانات صغيرة من الرخويات المدييات الرئوية.

٣٤٦٤ - بَزَال
Trocart (F). Trocar (E).

آلة جراحية للبز.

٣٤٨٣ - بَزَقَات القَمَر (S). Nostocaceae (S).
Nostocacées, Nostochinées (F). Nostocaceae (E).
فصيلة من الالغيات تنتمي الى الخثيات الزرق . اجناسها
وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها ارضي .
اشهر اجناسها الارضية بَزَّة القمر .

٣٤٨٤ - بَزَقَة القمر * ، نُسْطُوك

Nostoc, Crachat de la lune (F). Nostoc, Star-jelly, Witch's butter (E).

جنس ألغ من فصيلة بزقات القمر . انواعه عديدة جميعها
ارضية تعيش في المناقع والمواقع الرطبة الكثيرة النور .
وهي مجموعة من الالياف المستندقة المركبة من خلايا كروية
متتامة تغشاها مادة هلامية لاقياسية الشكل والحجم .

٣٤٨٥ - بُزْل * ، بَازِن ، وعل فارسي

Capra Aegagrus (S). Chèvre aegagre, Pasang (F).
Pasan, Pasang, Persian ibex (E).

نوع من الماعز او الوعول الشرقية . موطنه من القفقاس
الى السند ، يكثر في جبال بلاد فارس . جسمه مستطيل ،
ظهره ضبيب ، رأسه قصير ، جبهة عريضة ، دوارجه
دقيقة قوية ، ذيله قصير . الذكر له قرنان طويلان
محدوديان منعطفان الطرف || يستخرج من معدته مادة
طبية مضادة للسم تدعى بادزهر .

٣٤٨٦ - بَزْل ، بَطْل

Ponction (vet.) (F). Puncture (E).

هو ادخال بزال او مشرط في مكان معين من الجسم
لاخراج ما يجب ان لا يبقى من غاز او قيح وغيرها .

٣٤٨٧ - بَزْلُ إِسْتِقْصَائِي (F). Ponction exploratrice (F).

٣٤٨٨ - بَزْلُ الْخُرَاج (F). Ponction d'un abcès (F).

٣٤٨٩ - بَزْلُ الخمر (F). Décuvage (F). Tuning (E).

هو اسالة الخمر من الدن عقب الاختار وذلك لفصلها
عن الشجر .

٣٤٩٠ - بَزْلُ الكرش (F). Ponction du rumen (F).

٣٤٩١ - بَزْلَت ، نِسْفَة ، بَازِلَت (F). Basalte (F).

البزلت او النسفة هي حجارة الحرة السود . Basalt (E).

٣٤٩٢ - بَزْمَة (F). Ration (F).

البزمة والوزمة هي الاكلة الواحدة من اصل الشكد اليومي .

٣٤٩٣ - بَزْمُوت (F). Bismuth

معدن ابيض اللون اريد تملوه ماجة حمراء . سريع القصف .
سهل الانسحاق صفائح الوثل متبلور || رمزه (بت)
وزنه الانومي ٢٠٨٦٦ يتصهر تحت درجة ٢٦٨ سغ .
ثقله النوعي يراوح بين ٩٧٥ و ٩٨٠ || يعتبر مثال
المعادن اللاقابلة التمنظ كما ان الحديد يمثل المعادن
الاقابلة التمنظ .

٣٤٩٤ - بَزْنَعَة * (S). Brisinga (S).

Brisinga (F). Brisinga (E).

جنس كواكب بحرية من فصيلة البزنفيات . انواعها
المعروفة قليلة العدد اعطائها بلج بحار المناطق الباردة ||
اجسامها كبيرة مستطيلة الجرامز ، بحيلة الالوان الزاهية
يكثر فيها البرتقالي .

يخف تدريجياً مع الاقتراب من المدب . ويملوها ايضاً
ثلاثة عطوط سود قاطبة ورقشة جزوية يتخللها الاصفر تمتد
من الصدر الى الشرج . قشارها كاس قصير الحلب .
رأسها اسود . مدبها اغبر . رواجها شديدة السمرة || طور
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن
صليحة مردنية الشكل تحببها السرفة على فروع الصنبر
الممرات من الورق او على حشاف النجيليات .

٣٤٩٨ - بَزَّة الجَلْبَان (S). Zygaena scabiosae (S).

Zygène scabieuse (F).

٣٤٩٩ - بَزَّة الخَسْدَقُوق (S). Zygaena meliloti (S).

Zygène du melilot (F).

٣٤٧٠ - بَزَّة الخَزَامِي (S). Zygaena lavandulae (S).

Zygène de la lavande (F).

٣٤٧١ - بَزَّة السَفِيَّات (S). Zygaena rhamantus (S).

Zygène des papilionacées (F).

٣٤٧٢ - بَزَّة الشَدَاب (S). Zygaena erythrus (S).

Zygène de l'eryngium (F).

٣٤٧٣ - بَزَّة الصَعْتَر (S). Zygaena purpuralis (S).

Zygène du thym (F).

٣٤٧٤ - بَزَّة العَرَاوَة (S). Zygaena filipendulae (S).

Zygène de la spirée (F).

٣٤٧٥ - بَزَّة الكَرْمَة (F). Zygène de la Vigne (F).

راجع جندفة الكرمة .

٣٤٧٦ - بَزَّة اللَتِين (S). Zygaena hiliaris (S).

Zygène de l'ononis (F).

٣٤٧٧ - بَزَّة النَصَل (S). Zygaena trifolii (S).

Zygène du trèfle (F).

٣٤٧٨ - بَزْدَرَة (F). Fauconnerie (F). Falconry (E).

فن تدريب وترويض الطيور الكواسر المعدة للصيد .

٣٤٧٩ - بَزْر ، بَزَار ، زُرْعَة ، تَقَاوِي (F). Semences (F).

هو الحب المعد للزرع . Seeds, Seed-corn (E).

٣٤٨٠ - بَزْرَايَة

بزراية ج بزاري : كلمة عامية تدل على البهزرة ، اطلبها .

٣٤٨١ - بَزْرَة (F). Graine (F). Seed (E).

اطلب حبة .

٣٤٨٢ - بَزْرَقُطُونَا * ، عَشْبَة الْبَرَاغِيْث ، حَشْبَة الْبَرَاغِيْث

Plantago psyllium (S). Psyllion, Plantain psyllion,

Herbe aux puces (F). Flea-wort (E). Flohwe-

rich (D). Psilio minore, Pulicaria, Erba delle pulci (I).


نبات عشبي بري طبي وصناعي معمر . وهو نوع من

لسان الحمل وفصيلة الحمليات . اوراقه منعقة قرصية .

ازهاره شمراخية الارتكاز سنبلية التجميع || يستخرج من

اوراقه وثمارينه وبزونه مادة صمغية لزجة تنفع الرمد

والتهابات العين ، تفيد الشعر وتستعمل في تصفيف الاقشة .




بَزْر قَطُونَا



بَزَّة القمر



بَزْل ، بَازِن



بَزْنَعَة



بَزَيْغَة




بَزَيْلَة



بَزَيْلَة رِيَة



بَسَاد



بَسَارِي



بَسَاج

٣٥٠٢ - بَسَاد * (S). Psoa (F). Psoa (E).

جنس حشرات من فصيلة البَسَادِيَّات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض اقاليم الكرم من الشرق الاوسط الى اوروبا || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة الاحديدات ، تطول من ٨ الى ١٢ مم . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها ناشزة . تأشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دهوسية . كواسلها مربعة الشكل ، محدبة . بطونها مدببة المؤخر . اغدادها تلحف البطن باستثناء المؤخر المدبب . قوائمها شديدة النشاط . رؤوسها وكواسلها واغدادها وقوائمها مبعثرة الهلب الدقيق ، اثوابها ملونة || الحشرة الجمالنة خاضلة . اليرقة دائمة تعيش على الجفان والجرارزين اليابسة .

٣٥٠٣ - بَسَادِيَّات * (S). Psoidae (F). Psoidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق الكرم من العالمين القديم والجديد || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مزغبة القشور ، تطول من ٨ الى ١٢ مم . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . عيونها كبيرة ، ناشزة . تأشيرها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية الفصل ، دهوسية الاطراف . كواسلها محدبة . اغدادها مقطوعة الطرف الذي لا يلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة . ارساغها خماسية العقل . اثوابها ملونة || جميعها دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة . يرقاتها تعيش في قلب الجرارزين والجفان اليابسة || اشهر اجناسها البَسَاد .

٣٥٠٤ - بَسَارِي * (S). Bassaris (F). Bassaris (E).

جنس حيوانات من الراتونيات . انواعه ثلاثة ، موطنها البلاد الامريكية . وهي قريبة الشبه بالراتون لكنها هيفاء القد ، مستطيلة الرأس والذيل . شهرها :

بَسَارِي المكسيك (S). Bassaris rusé (F). Bassaris (E).

٣٥٠٥ - بَسْبَاج * (S). Hemionitis (F). Hemionitis mulewort (E). Gitterfarn (D). Emionitide (I).

جنس نباتات سرخسية من البَسْبَاجِيَّات . يعد عشرة انواع اسيوية وامريكية المنبت . تتميز بشكل انتشار مجاميعها الجرثومية على عروقها واعصاب اوراقها اذ تبدو كالشبكة المستقيمة الخطوط . تزرع للزينة .

٣٥٠٦ - بَسْبَاجِيَّات (S). Polypodiaceae (F). Polypodiaceae (E).

فصيلة من السراخس ، نباتاتها من مستورات الزهر الوعائية . تشمل نحو ٣٠٠٠ نوع منتشرة في جميع اقطار العالم .

٣٥٠٧ - بَسْبَاسَة (S). Myristica (F). Myristica (E).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البَسْبَاسِيَّات . انواعه نحو ٨٠ ، مهدا البلاد الاستوائية . أشهرها جوز الطيب .

٣٥٠٨ - بَسْبَاسَة الطيب (F). Muscadier (E).

شجرة من البَسْبَاسِيَّات تعرف بجوز الطيب .

٣٤٩٥ - بَزَيْغِيَّات * (S). Brisingidae (F). Brisingidae (E).

فصيلة من كواكب البحر الشوكيات النجوميات ، اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها لجية تعيش في الاعماق التي يراوح غورها بين ٣٠٠ و ٥٠٠ م . || اشهر اجناسها البَزَيْغَة .

٣٤٩٦ - بَزَيْغَات (S). Zygaenidae (F). Zygaenidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة لا تقل عن ٨٠٠ ، جميعها صغيرة ومتوسطة الحجم ، كثيفة الحراشف الزغبية ، ضعيفة الاجنحة الضيقة . ملامسها قصيرة دقيقة ، اخطامها مستطيلة ، قرونها الاستشعارية ضيقة الشكل مستطيلة . اثوابها مختلفة الالوان الزاهية يكثر فيها الاخضر والازرق والاحمر والاسمر . ذكورها اعقب لوناً واصفر قدماً من اناثها . تسرح في النهار ، قوتها رحيق الازهار ترشفه وتساق النحل عليه || اليرقة زباء البشرة غبراء اللون موشمة ومخططة او منقطعة بالاسود قوتها زباعت وورق بعض النباتات || الحادوة تلحف بشرنقة وشية الشكل غبراء اللون مصقولة النسيج تحيكمها غالباً على حشاف النجيليات .

٣٤٩٧ - بَزَيْر * (F). Blanc de mai (E). White mullein (E).

راجع بوصير لبد .

٣٤٩٨ - بَزَيْغَة * (S). Pasiphaea (F). Pasiphaea (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل وفصيلة القريدسيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها بحيلة الالوان الزاهية ، تطول من ١٠ الى ١٢ سم . الزوجان الاماميان من ارجلها مجهزة بملاقط نشيطة || اشهر انواعها بَزَيْغَة سيفادو (Pas. Sivado) يقال انها من اجود انواع القريدس .

٣٤٩٩ - بَزَيْلَة * ، بَزَيْلَة ، بَزَيْلَة ، بَسَلَة (S). Pisum sativum (F). Pois cultivé, Pois vert, Petit pois (E). Garden pea, Common pea (E). Saaterbse, Erbsen (D). Pisello, P. coltivato (I).

نبات عشبي حولي مأكول الحب من فصيلة القطانيات الفراشية . ضرابه عديدة جميعها متسلقة . فوارقها تعود الى ميعاد الزرع وحجم الحب وجودة مذاقه || ثماره قرون لينة تحضن حبوب كروية الشكل خضراء اللون غنية بالعناصر الغذائية اخصها البروتين والحديد . وهي مع ذلك تحوى ما لا يستهان به من الفينامينات «آ» و«ث» . يتكاثر بالبذر . يرغب في الاربة المتوسطة الاندماج الغنية بمنصري البوتاس والفسفور .

٣٥٠٠ - بَزَيْلَة بَرِيَّة * ، بَسَلَة بَرِيَّة (S). Pisum elatius (F). Wild pea (E). Wilder erbse (D).

نوع من البَزَيْلَة يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . قرونها صغيرة وحبه كذلك ، تغلفه الماشية بشية .

٣٥٠١ - بَس ، بَس ، بَسِين (F). Chat (E). Cat (E).


هو السنور . ويقال للأنثى بسة وبسينة .




بَسَاج




بَسْتَلُوزِيَه



بَسْتَلُوزِيَه الْحَرْجِيَّة



بَسْتَلُوزِيَه الْمَصَارِي



بَسْتَلُوزِيَه النَّخْلِ



بَسْتُون مُنْتَفِش

٣٥٢٢ - بَسْتَرَة
Pasteurisation (F).
Pasteurization (E).
البسرة هي منع نمو وتكاثر الجراثيم بالتسخين .

٣٥٢٣ - بَسْتَلُوزِيَه *
Pestalozzia (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرفيفيات . انواعه عديدة معظمها رمي يركب الاشجار البرية والحرجية .
ونيمته بوعية سمراء اللون تنشأ محصورة في الادمة ثم ترقى وتنتشر . كنيده مستطيلة ، مoothورة ، عابقة اللون . بويغاته متوجة بهالة من الحلب العادم اللون . اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٣٥٢٤ - بَسْتَلُوزِيَه الْحَرْجِيَّة *
Pestalozzia hartigii (S).
فطر مجهرى يركب مختلف النباتات الحرجية الفتية من الصنوبريات والملاووات || مظهره الخارجي لطخة عرضها من ٢ الى ٤ سم . تطوق بشرة ولحاء الساق على علو شبرين او ثلاثة من التربة ، تجف وتيبس بعد انبلاجها ببضعة ايام فتسبب يباس كل ما يعلوها من الاعضاء النباتية . يكافح باقتلاع الاغراس الموبوءة وينضخ السليمة بأحد القواطير الفعالة . كما يحسن تطهير التربة بالكلس .

٣٥٢٥ - بَسْتَلُوزِيَه الْمَصَارِي *
Pestalozzia guepini (S).
فطر مجهرى يتعدى على معظم النباتات التي تعيش في المصاري منها الازالية والكميلية والمغنولية الخ... || يركب الاوراق فيمنطقها ببقع لا قياسية الشكل والحجم . لونها الى السمرة تسبب جفاف الوثن وتقضي على التبادل النسفي || يكافح باستعمال احد الاملاح النحاسية المخففة .

٣٥٢٦ - بَسْتَلُوزِيَه النَّخْلِ *
Pestalozzia palmarum
فطر مجهرى يصيب اوراق النارجيل وغيره من النخل التريبي || مظهره الخارجي بقع صغيرة متراكبة غبراء اللون تركب النصل على صفحته العليا || اضاراه زهيدة لا تستوجب العناية . ومنهم من قطع الاوراق الموصومة .

٣٥٢٧ - بَسْتَنَّة ، غَيْطَنَّة
Horticulture,
Jardinage (F). Horticulture, Gardening (E).
هي زراعة البساتين تتناول زراعة البقول والازهار والاشجار المثمرة واشجار التزيين .

٣٥٢٨ - بَسْتَنِي ، غَيْطَنِي
Horticole (F).
Horticultural (E).

٣٥٢٩ - بَسْتُورِلُوز
Pasteurellose
امراض سارية سببها ميكروبات مختلفة الانواع ، منها ذات الرئة السارية في الخيل والاسهال في المعول والحمرة في الدجاج الخ .

٣٥٣٠ - بَسْتُون مُنْتَفِش *
Biston hirtarius, Lycia hirtaria (S).
Biston à ailes velues, Lycie hérissée, Phalène hérissée (F). Biston hirtarius, Lycia hirtaria (E).
حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوربة . تألف الاقاليم المعتدلة الحرارة . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة قوتها اوراق الاشجار الحرجية والمثمرة ||

٣٥٠٩ - بَسْبَسِيَّات
Myristicaceae (S).
Myristicacées (F). Myristicaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة القعالات . ويقال لها ايضاً فصيلة جوز الطيب .

٣٥١٠ - بَسْبَاج * ، أَصْرَاسِ الْكَلْب ، تَشْتِيَوَان ، عَرَقَسُوس
Polypodium vulgare (S).
Polypode commun, Filicule, Polypode de chêne (F).
Common polypody, Polypody wall fern, Golden locks (E). Echtes engelsüss, Engelsüss (D).
Polipodio, Polipodio quercino, Falce dolce (I).
نوع من البسباجيات السرخسيات وهو نبات بري وزيني معمر سريع النمو كبير الاوراق جميلها يرغب في الاحراج الظليلة اخصها احراج السنديان . وهو من النباتات الطبية نقيه منفث ويدبر البول ويلين المعدة .

٣٥١١ - بَسْبَسِيس
Cligué (F). Hemlock (E).
هو الشوكران ، نبات عشبي جحالي طلي مبدول ، اطلبه .

٣٥١٢ - بُسْتَان ، جَنَّة ، فِرْدَوْس ، حَائِط ، حَشَّ
Jardin (F). Garden (E).
هو كل ارض تزرع فيها النباتات البستانية كالا اشجار المثمرة والازهار والخضار ... للاستفادة من ريعها . وبوجه عام تستعمل كلمة بستان للتعبير عن التخصيص فيقال مثلاً بستان ليمون وبستان موز الى آخره .

٣٥١٣ - بُسْتَان بُرْتُقَال ، بِيَّارَة ، مَبْرَقَة
Orangerale (F). Orange-plantation (E).
هي الارض المغروسة اشجار برتقال .

٣٥١٤ - بُسْتَان خُضَر ، مَبْقَلَة ، سِبَاخ
Jardin potager (F). Kitchen-garden (E).
هو البستان الذي تزرع فيه البقول والخضار .

٣٥١٥ - بُسْتَان زَرَاعِي
Jardin d'utilité (F).
Profit-garden (E).
هو البستان الذي يتخذ للانتفاع من زراعته او تربته .

٣٥١٦ - بُسْتَان زَيْتُون ، زَوَاتِين
Oliveraie, Olivale (F). Olive-plantation (E).
هي الارض المغروسة زيتوناً .

٣٥١٧ - بُسْتَان قَوَاكِي ، مَثْمَرَة ، جُنَيْنَة
Verger, Jardin fruitier (F). Fruit-garden, Orchard (E).
هو بستان الاشجار المثمرة من اي نوع كانت . وقد يطلق عادة على البستان الذي حوى اكثر من نوع واحد من الاشجار .

٣٥١٨ - بُسْتَان مَوْز ، مَوْمَرَة
Bananerale (F).
Banana-plantation (E).
هي الارض المغروسة موزاً .

٣٥١٩ - بُسْتَنَانِي ، جَوَّار ، بَسْتَنَقَانِي
Jardinier (F).
Gardener (E).
هو من كانت مهنته العمل في البساتين والحداثق .

٣٥٢٠ - بَسْتَانِي ، غَيْطَانِي
Horticulteur (F).
Horticulturist (E).
من كان اختصاصه نباتات الزينة .

٣٥٢١ - بَسْتَنَج
Boswellie
هو اللبان من البخوريات ، اطلبه .

ملجته الحياتي بخافي . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والثمار والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم . يتميز بقزعة الناعمة الريش المنعطفة على القفص وبكبر رفال ذنبه المروحية الشكل . ثوبه الى الشقحة السمر السعفاء تسود في الرأس والصدر والجناح . جانباً زوره الى البياض الاغبر || صياحه يشبه فوطة سوط الخوذي مما دعا الى تلقيبه بالصنوبر الخوذي .

٣٥٣٩ - بَسَق

بَسَقَتْ وأبَسَقَتْ البهي، وقع في ضرعها اللبن قبل التناج فهي مبسقة ، ج مبسوق .

٣٥٤٠ - بَسَل

بسل الخل : طاك تركه فأخلف طعمه وتغير .

٣٥٤١ - بَسَلَف *٥

Pselaphus (S).

Pselaphe (F). Pselaphus (E).

جنس حشرات من فصيلة البسلافيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، تطول نحو ٢ مم . رؤوسها شبه مزوانية الشكل . عيونها صغيرة ، ماسحة . قرونها الاستشعارية صولجانية . قاشيرها صغيرة . ملاسها الفكية شديدة الطول . كواسلها صغيرة ، ضيقة . بطونها بيضبة الشكل . اغمادها قصيرة ، مخددة تلحف نصف البطن . قوائمها نشيطة . ظنايب القوائم الوسطى والخلفية شائكة . اثنائها كسثنية او بنية او سمر || تسرح في الليل . تألف ضفاف مجاري الماء . تعيش تحت الجويل وفي الجثالة قوتها المواد النباتية المنحلة .

٣٥٤٢ - بَسَلَفِيَّات ٥

Pselaphidae (S).

Pselaphidés (F). Pselaphidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها شديدة الصغر ، مستطيلة الشكل ، تطول من ١.٥ الى ٤ مم . رؤوسها مكورة ، صغيرة . عيونها بارزة او ماسحة . ملاسها الفكية كبيرة . قرونها الاستشعارية صولجانية الشكل ، مركبة من ١٠ او ١١ فصلة . كواسلها متباينة الشكل ، يغلب فيها التكوين . اغمادها قصيرة تلحف نصف البطن . اثنائها وحيدة اللون || جميعها مفترسة او دامة . تنصها المفضل القرايات ولا تعف عن الديدان التي يتكرر وجودها في الجثالة وفي الاخشاب النخرة || اشهر اجناسها البسلاف والشنيوم والريشباخ .

٣٥٤٣ - بَسَلَة

Pois cultivé (F). Garden pea (E).

راجع بريلا .

٣٥٤٤ - بَسَلَة بَرِيَّة

Pois sauvage (F).

Wild pea (E).

راجع بريلا برية .

٣٥٤٥ - بَسَلَة سَكْرِيَّة

Lotier cultivé (F).

Garden winged pea (E).

راجع اصابع العروس .

٣٥٤٦ - بَسَلَة هِنْدِيَّة ، فَرِيَسَاء ، لُوبِيَاء سُوْدَانِيَّة

Cajanus bicolor, C. flavus, C. Indicus (S). Cajan, Cajanus, Ambrevade (F). Pigeon pea, Congo pea, Cajan pea (E). Catjang, Angolische (D). Citiso dell'Indie, Pisello d'Angola (I).

بجلة زراعية متسلقة من جنس الفازوليات وفصيلة القرنيات

جسمها متوسط القد يطول نحو ١٧ مم . بسطنها تراوح من ٤٦ الى ٥٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها صغيرتان بارزتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها وبطنها الى الكهبة الحنطية المواجه وبطنها رتاجي الزغب المتفش ينتهي بضمة تطوق الشرج || روشنها الاماميان الى الكهبة الحنطية تعلوها سرنجة معترضة وزونقة وزركشة سمر قاتمة . روشنها الخلفيان الى الكهبة الحنطية تعلوها في نصفها الاخير ثلاثة خطوط متعرجة معترضة سمر اللون . اهدانها حنطية || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاقل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع . تمتع المكن لطخاً على الاغصان والافناد || السرفة عند الادراك التام تطول نحو ٣٤ مم . جسمها اسطواني الشكل ، مبعثر اطلب القصير ، رباعي الشعول المتقابلة . رأسها صغير الجرم . شرجها مجهز بزائدين لامساويين . ثوبها يمانن البيئة التي تعيش فيها لذلك فهو بلون الاوراق || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلتجة تحيكها السرفة بين الاوراق .

٣٥٣١ - بَسَكْد *

Corall (F). Coral (E).

هو المرجان ، اطلبه .

٣٥٣٢ - بَسَدَة ٥

Pisidium (S).

Pisidie (F). Pisidium (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم والارجل ومن فصيلة السيرينيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحيرات البلاد المعتدلة الحارة || اصداقها صغيرة شبه مخروطية الشكل ، مقمرة القن ، متساوية المصاريح . مثاعها ثنائية طليقة || تعيش منمونة في الاسمال .

٣٥٣٣ - بَسْر

البسر : الفص من كل شيء . والتسر قبل اطرابه وذلك اذا لون ولم ينضج .

٣٥٣٤ - بَسْر

Polliniser avant terme (F).

يقال بسر النخلة وابترها اذا ابرها قبل اوان الجب .

٣٥٣٥ - بَسْرَة

البسرة نعمت حال للنبات اذ يكون في اوله البارض وهو كما يبدو في الارض ثم الجسيم ثم البسرة ثم الصمء ثم الخشيش وقال ذو الرمة :

« رعت بارض البهي جيماً وبسرة

وصمء حتى آنفتها نصالها »

٣٥٣٦ - بَسَط

Numérateur (F). Numerator (E).

البسط وصورة الكسر واحد .

٣٥٣٧ - بَسَطُ الْوَقَائِع

Articulation (F).

Enumeration of facts (E).

هو سرد الحوادث كتابة مع اتباع ترتيبها الزمني على ان تمام البينة عليها امام المحكمة كما يجري ذلك في التحقيقات والاستجوابات .

٣٥٣٨ - بَسْفُود *٥

Psophodes (S).

Psophode, Oiseau-cocher (F).

طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكعيتيات اعطانه بعض مناطق استرالية . يألف الاحراج المبعثرة الاشجار .



بَسَد



بَسْفُود



بَسَلَف

دقيقة قصيرة لا متحركة سبحية الترتيب كثيفة التجميع. تطول من ٠.٧ إلى ٢ مي. وتعرض من ٠.٢ إلى ٠.٥ مي.

٣٥٥٦ - بَسِيلُوس الجَزَر (S). *Bacillus carotovorus*

يصيب الجزر فيذبل الجذور ويلينها ثم يموتها. شكله قضبان مهدبة متحركة لا قياسية التجميع والترتيب. طولها يراوح من ٢ إلى ٥ مي. وعرضها من ٠.٦ إلى ١ مي.

٣٥٥٧ - بَسِيلُوس الحَامِضُ اللَّبَنِي *

Bacillus acidi lactici (S).

يسبب الاختمار اللبني الحامضي. وهو يوجد في الهواء وفي اللبن الرائب || شكله قضبان صغيرة عديمة الحركة لا قياسية التجميع والترتيب.

٣٥٥٨ - بَسِيلُوس الخَل * *

Bacillus aceti, Bacillus aceticus (S).

يسبب الاختمار الخلي وهو يوجد في الهواء والخل. شكله قضبان اسطوانية قصيرة لا قياسية الحجم، مرصوفة التجميع. سبحية الترتيب.

٣٥٥٩ - بَسِيلُوس الذَّرَّةُ الصَّفْرَاءُ (S). *Bacillus zeae*

يصيب الذرة الصفراء فيمنع نموها ويذبلها || يعيش في جذور وسوق النباتات الفتية. وهو قضبان صغيرة متحركة طولها يراوح من ٠.٨ إلى ١.٦ مي. وعرضها نحو ٠.٦ مي. يقال انه يسبب للدواجن التي تتغلف الذرة المصابة به ما يدعونه بالانكليزي «Corn-stalk disease» نتائج تسمم الدم وغيرها.

٣٥٦٠ - بَسِيلُوس الزَبْدِي (S). *Bacillus butyricus*

Ferment butyrique (F).

يسبب الاختمار الزبدي وهو يوجد في اللبن والجبن وأنزباب والماء.

٣٥٦١ - بَسِيلُوس الشَّوْنَدَر (S). *Bacillus betae*

شكله قضبان قصيرة فردية أو سبحية التجميع. يتغري جذور الشوندر في الأتربة الرطبة الغنية بالمواد الأزوتية فيحول دون نموها ثم يذبلها ويموتها || وهو من الأمراض القليلة الانتشار نظراً لمتطلباته البيئية المحدودة.

٣٥٦٢ - بَسِيلُوس الصَّفْرَاءُ (S). *Bacillus tabificans*

يصيب الشوندر فيؤذيه. مظهره الخارجي يبتدئ ويتحول كما يلي: ارتخاء في الأوراق يمنعها عن الشقوق ثم تقيح في النصل يتحول من الخضار القائم إلى الخضار الباهت فالخضار الاصفر ثم الاصفرار الشامل فالذبول فاليباس. وهو قضبان بيضية الشكل سبحية التجميع والترتيب كثيرة الحركة طولها يراوح من ٤ إلى ٦ مي.

٣٥٦٣ - بَسِيلُوس العَفَنِ

Bacillus putrefaciens liquefaciens, B. caulivorius (S).

يصيب البطاطا والبندورة والتبغ وبعض نباتات الزينة. مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تظهر على السطح ثم تمتد صعداً إلى أن تعم الأوراق فتعطب الخلايا وتقضي عليها بعد أن تلونها بالسرة || شكله قضبان اسطوانية، قصيرة، سبحية التجميع والترتيب، تطول نحو ١.٥ مي. وهو يعيش ويتكاثر في التربة أينما لائمته ظروف البيئة.

٣٥٦٤ - بَسِيلُوس العنب (S). *Bacillus uvae*

يصيب العنب فيعطبه، وقد يقضي على الموسم إذا اعتري الكرمة عند الإزهار لانه يسبب يباس الأزهار || وهو

الفراشية. منبتها الاصفق الاستوائية الهندية والافريقية. ثمارها قرون مستطيلة تحوي عدة بزور اسطوانية الشكل. تزرع لبزورها المأكولة.

٣٥٤٧ - بَسْلُورَه *

Passalora

جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات. جربه الكندية خيطية الشكل مثووزة. كنانته بيضية. او اجاصية متناصفة الانقسام. بويغاته مخنوقة || انواعه عديدة تركب الاوراق على صفحاتها السفلى دون ان تغطها.

٣٥٤٨ - بَسُوق

البسوق هي انثى المجترات التي وقع اللبا في ضرعها قبل التاج.

٣٥٤٩ - بَسِيكُومِيَّات (S). *Psychomyidae*

Psychomyidés (F). *Psychomyidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، سمراء اللون او سوداء. بسطة اجنحتها تراوح من ١٠ إلى ١٨ مم. اجنحتها الامامية مغطاة بخل ناعم دقيق يختلف خضابه مع اختلاف الاجناس والانواع انما يكثر فيه الاسمر ثم الاصفر التبي المواج || اساريها طليقة تعيش في المياه الراكدة ضمن اروقة رجة متعرجة تشيدها بالرميل والريال اما بين الحجارة والصخور اما في القاع. اشهر اجناسها:

Psychomyia (S).

البسيكومية

Lype (S).

الليب

Tinodes (S).

التيود

٣٥٥٠ - بَسِيل

Bacille (F). *Bacillus* (E).

البسيل أو القصيمة هي كل بكتيرية تكون في شكل قضيب.

٣٥٥١ - بَسِيلَة

Lupin (F).

البسيلة: هي الترس (ابن سيده).

٣٥٥٢ - بَسِيلُوس *، بَاشِلُس، بَاشِيلُوم، بَسِيل، قَصِيمَة

Bacille (F).

Bacillus, Bacillum, Baculum (E).

جنس بكتيريات من فصيلة القضيبيات يشمل جميع اشكال البكتيريات المستطيلة. انواعه عديدة وهي صلبة أو لينه، متحركة أو غير متحركة. تتكاثر بالانقسام المباشر أو بالتبرغ || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

٣٥٥٣ - بَسِيلُوس البَاذَنْجَانِيَّات

Bacillus solanacearum (S).


يصيب نباتات الفصيلة الباذنجانية، اخصها البطاطا فيسبب فيها العفن الغتريفي.

٣٥٥٤ - بَسِيلُوس البَقُول (S). *Bacillus oleraceae*


يصيب عدة بقول اخصها القنبيط فيعطب الاعضاء المصابة ويقودها الى العفن والهريان || شكله قضبان مهدبة متحركة لا قياسية التجميع تطول من ١ إلى ٤ مي. وتعرض من ٠.٥ إلى ١ مي.

٣٥٥٥ - بَسِيلُوس التَّبَغ (S). *Bacillus tabacivorus*

يصيب شتول التبغ فيمنعها لكنه محدود الاضرار لانه يركب سنخ الشتول المهدوشة دون سواها || شكله قضبان




بسلوره



بسيلوس




بسيلوس الحامض اللبني




بسيلوس الخل



بسيللوس الكرمة



بسيللوس النشا



بسيللوس نيكوثيانا



بشام



بشته



بشته عقديّة

٣٥٧٤ - بَشْتَه عَقْدِيَّة *، قُرَام، فَلَاريس مُعَقَّد

Phalaris tuberosa (S). Phalaris noueux (F). Tuberos sword-grass, Peruvian grass (E). Gichtenglanz-grass (D). Folaridi, Bindello (I).

نبات عشبي حولي علني من النجيليات. انتاجه وافر المحصول الحفري لكنه اقل جودة وقيمة غذائية من البشته.

٣٥٧٥ - بَشْر - Raclage (F). Scraping (E).

٣٥٧٦ - بَشْرَقَة - Cuticule, Derme (F).

Cuticle, Derm (E).

هي الطبقة الواقية الناعمة الدقيقة التي تغلف الأدمة.

٣٥٧٧ - بَشْرَقَة خَارِجِيَّة، إَكْزُودِرْم

Exoderme (F). Exoderm, Ectoderm (E).

هي في النبات غلاف القشرة الخارجي.

٣٥٧٨ - بَشْرَقَة دَاخِلِيَّة، أُنْدُودِرْم

Endoderme (F). Endoderm (E).

هي في النبات غلاف القشرة الداخلي الذي يحيط بالثمرة او البزرة او الشكير.

٣٥٧٩ - بَشْرُوش - Flamant rose (F). Flamingo (E).

هو النحام، اطلبه.

٣٥٨٠ - بَشْرِي - Dermique (F). Dermic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالبشرة كالنسيج وغيرها.

٣٥٨١ - بَشْرَيْن، كُوتَيْن، كِيوتَيْن

Cutine (F). Cutin (E).

هي المادة الكهاوية التي تحصل من تحويل السيللوز في القسم الخارجي من ادمة النبات.

٣٥٨٢ - بَشْشَك - Camoufler (F). To disguise (E).

تستتر او تنكسر بغية الخديعة.

٣٥٨٣ - بَشْشَك - Camouflage (F).

Artificial concealment (E).

البشك التستتر والتنكر.

٣٥٨٤ - بَشْشَكِيَّة ه - Puschkinia (S).

Puschkinie (F).

نبات دوفسي برّي وزراعي تزييني من الزنبقيات. معقود التعريف على اسم العلامة الروسي «بوشكين». دوفسته صغيرة مبطة. أوراقه قرصية الانتشاب، قليلة العدد، من ٢ الى ٣. نصالها مستطيلة، ضيقة، حيلة الخضار العابق. ساقه شراخية، معتدلة الارتفاع، تنتهي ببعض الازهار الصغيرة القد الجميلة الشكل، لونها الى البياض المعاجي الموشع بالازرق.

٣٥٨٥ - بَشْم - Indigestion (F). Indigestion, Surfeit (E).

راجع تخم. يقال بشم الرضيع من الحليب: اتخم.

٣٥٨٦ - بَشْمَلَة - Amélanchier commun (F).

هي المكرة المبدولة، اطلها.

٣٥٨٧ - بَشْمُور - Flamant (F). Flamingo (E).

هو السرخاب، طائر من النحام احمر الريش.

قضبان اسطوانية متحركة تطول من ٣ الى ٤ مي. تجميعها سبجي الترتيب، تكاثرها بوغي.

٣٥٦٥ - بَسِيلْلُوس الكرمة * - Bacillus vitivorus (S).

يصيب الكرمة في اللحاء والخشب فيسبب نوعاً من الادماع الصمغي وقد يسمي الى نمو الجفنة ان لم يعطها في التربة الرطبة او الكتومة اهوم || وهو قضبان صغيرة منفصلة لا قياسية الشكل والتجميع، اما يكثر فيها الترتيب السبجي طولها يراوح من ١ الى ٢ مي. وعرضها نحو ٧٥، ٧٥ مي.

٣٥٦٦ - بَسِيلْلُوس النشا * - Bacillus amylobacter (S).

يصيب درن البطاطا فيعفن النشا ويحدث الحامض السني.

٣٥٦٧ - بَسِيلْلُوس مُنْطِخ - Bacillus maculicola (S).

يصيب اوراق التبغ فيلطفها. مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل صغيرة الحجم تعلو نصل الاوراق. تبدو باهتة الخضار ثم غبراء اللون ثم يبيض يحرقها اطار اسمر. شكله قضبان صغيرة متحركة لا قياسية التجميع يغلب فيها الترتيب الفردي تطول من ١,٥ الى ٢,٥ مي. وتعرض من ٧,٥ الى ١ مي.

٣٥٦٨ - بَسِيلْلُوس نيكوثيانا * - Bacillus nicotianae (S).

يصيب التبغ في جميع اجزائه الهوائية والتربية. مظهره الخارجي بقع سمر تعلو عروق الاوراق ثم تمتد الى سائر النصل وتعم الساق والسرخ والجدور فتعطبها وتذريها. شكله قضبان اسطوانية متحركة فردية او ثنائية التجميع تطول من ٢ الى ٣ مي. وتعرض من ١,٦ الى ١ مي.

٣٥٦٩ - بَسِيمَة ه - Pteranthus (S). Ptéranthe (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة القرنفليات. انواعه المعروفة لا تتجاوز الخمسة. منبها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصب قليلة الفروع. اوراقها متقابلة، لحمية النصال السنائية الشكل. ازهارها وتريه التجميع معظمها ثلاثي. الوانها تراوح بين الودي والليكني.

٣٥٧٠ - بَشَام * - Baumier (F).

Balsam of Mecca (E).

هو البلسان « شجر طيب الريح يشاك بقضبه واحده بشامة ويقال لخبه عند الصيادلة حب البلسان » (اقرب الموارد). وقد قال الشاعر:

« اتذكر يوم تصقل عارضيا

بفرع بشامة سقي البشام »

٣٥٧١ - بَشْبَش - Feuilles de coloquinte (F).

هو ورق الخنظل. Colocynth leaves (E).

٣٥٧٢ - بَشْت القُرْد - Cératophylle (F).

هو حاملو الماء، اطلبه. Horn wort (E).

٣٥٧٣ - بَشْتَه *، حَبّ العصافير، فَلَاريس

Phalaris canariensis (S). Phalaride, Phalaris, Alpieste, Blé d'oiseau (F). Canary grass (E). Kanarienglanz-grass (D). Canaria, Scagliola delle Canarie (I).

نبات عشبي حولي علني من النجيليات. يزرع في المراعي للعلف ويزرع لجني بزره المأكول من العصافير.

٣٥٩٨ - بَشْوَرَة اللَّيْلِ الْكَبِيرَة، أَبُو الْوَشِي اللَّيْلِي

Saturnia pyri (S). Grand paon de nuit (F).

فراشة من البشوريات كبيرة القد جميلة الثوب المنمش والمرقط. تسرح في الليل. يكثر وجودها من نيسان الى تموز. يرقاتها خاضعة نهمة تركب اوراق الاشجار المثمرة والحرجية اغصانها الاجاص والخوخ.

٣٥٩٩ - بَشْوَرَة النَّهَارِ*، أَبُو الْوَشِي النَّهَارِي

Vanessa io (S). Petit Paon du jour (F). Vanessa io (E). Tagpfauenauge (D).

فراشة من البشوريات متوسطة القد جميلة الثوب زاهية الالوان، يكثر وجودها من تموز الى ايلول. يرقاتها خاضعة تركب البقول فتعريها وتؤذيها.

٣٦٠٠ - بَشْوَرِيَّات Nymphalidae (S).

Nymphalidés (F). Nymphalidae (E).

فصيلة حشرات من حرشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الاثواب والالوان الجميلة. قوائمها الامامية عادمة الخالب. ارساغ ذكورها وحيدة العقلة وارساغ اناثها خماسية العقل || يرقاتها خاضعة نهمة زبا، الكنف مستطيلة الهلب. رباط خادراتها شرجي المسلك تتدلى به.

Polyptère Béchir (F).

Polypterus Bichir (E).

٣٦٠١ - بَشِير

راجع ابو بشير، نوع من الشم.

Potosie folle (F).

٣٦٠٢ - بَشِيْطُ أُخْبَل

حشرة من غمديات الاجنحة تدعى جمل اخبل، اطلبه.

Potosie métallique (F).

٣٦٠٣ - بَشِيْطُ زُمْرَدِي

حشرة من غمديات الاجنحة تدعى جمل زمردى، اطلبه.

Phosphorescent (F).

Phosphorescent (E).

٣٦٠٤ - بَصَّاص ٥

نمت تعريفى ووصفى يطلق على كل سمكة او حشرة تعلوها مواد فسفورية تشع في الظلام.

Photogenèse (F).

Photogeny (E).

٣٦٠٥ - بَصَّاصَة ٥

البصاصة انتاج الضوء الفيزيولوجي عند النباتات والحيوانات والحشرات البصاصة.

Photogène (F).

Photogenic (E).

٣٦٠٦ - بَصَّاصَة ٥

نمت تعريفى يطلق على الاجهزة والنسج التي تسبب الاشعاع عند بعض الحشرات وغيرها.

Bouçak (F).

٣٦٠٧ - بُصَاق

ضرب من النخيل وافر الانتاج، صغير البسر، اشجع النمر. يوجد في الاراضي القليلة الرطوبة.

Lampyre nocturne (F).

٣٦٠٨ - بَصْبُوص اللَّيْلِ

هو اليراعة الدجوية، اطلبها.

٣٦٠٩ - بَصْبُوص اللَّيْلِ الشَّرْقِي

Luciola orientai (F).

هو اليراعة الشرقية، اطلبها.

Eleusina coracana (S). كَنْب ٣٥٨٨ - بَشْنَة*

Eleusine (F). Raggee corn, African millet (E). Krummahrige eleusine (D). Eleusina, Panico Indiano (I).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. انواعه المعروفة سبعة، يزرع منها نوعان الهندي والافريقي لانها من النباتات العلفية الجيدة الانتاج والفوائد. وهناك شعوب هندية وافريقية تستعمل الحنط استعمل الحنطة او الذرة الصفراء.

Nénuphar blanc (F).

White water-lily (E).

٣٥٨٩ - بَشْنِين أَبْيَض

اطلب نيلوفر ابيض.

Nénuphar bleu (F).

Blue water-lily (E).

٣٥٩٠ - بَشْنِين أَزْرَق

اطلب نيلوفر ازرق.

Nénuphar jaune (F).

Yellow water-lily (E).

٣٥٩١ - بَشْنِين أَصْفَر

اطلب نيلوفر اصفر.

Lotier d'Egypte (F).

Egyptian lotus (E).

٣٥٩٢ - بَشْنِين عَرَبِي

اطلب نيلوفر العروس.

Vanessa cardui (S).

Vanesse du chardon, V. del'artichaut, Belledame (F).

فراشة من البشوريات يرقاتها تطول من ٣ الى ٤ سم. وهي سمراء اللون تحمل على كل جانب من جانبيها خط اصفر باهت، ويقطع ثبجها من مؤخر الرأس الى الشرج خط من الهلب الابرش. وهي تركب جميع اجناس وانواع الحرشف اغصانها الارضي شوكي.

Vanessa atalanta (S).

Vanesse atalante, Vulcain (F). Painted lady, Thistle butterfly (E). Distelfalter (D).

فراشة من البشوريات ثوبها مزركش النقش جميل الالوان العابقة. يكثر وجودها من تموز الى تشرين. يرقاتها خاضعة تعيش على اوراق نباتات الفصيلة القراصية.

٣٥٩٥ - بَشْوَرَة الْغُرُوب*، أَبُو الْوَشِي الْغَيْلَمِي

Vanessa polychloros, Aglais polychloros (S). Vanesse polychrome, V. grande tortue, Paon grande tortue (F).

فراشة من البشوريات ثوبها مزركب الالوان المتداخلة التي يغلب فيها البرتقالي. يكثر وجودها من تموز الى ايلول. يرقاتها خاضعة نهمة تركب اوراق التفاح والكرز والمخلص والدردار.

٣٥٩٦ - بَشْوَرَة الْقَرَّاص*، أَبُو الْوَشِي السَّلْحَفِي

Aglais urticae (S). Vanesse petite tortue, Paon petite tortue (F).

فراشة من البشوريات صغيرة القد جميلة الثوب مزركبة الالوان يكثر وجودها في الصيف من تموز الى آب. يرقاتها خاضعة نهمة تركب البقول وسائر نباتات الفصيلة القراصية.


٣٥٩٧ - بَشْوَرَة اللَّيْلِ، أَبُو الْوَشِي الصَّغِير

Saturnia pavonia, Eudia pavonia (S). Petit paon de nuit (F).

فراشة من البشوريات متوسطة القد جميلة الثوب المنمش والمزركش. تسرح في الليل. يكثر وجودها من اذار الى حزيران. يرقاتها خاضعة تركب اوراق الخوخ وبعض نباتات الزينة.



بَشْنَة



بَشْوَرَة الْحَرْشَف




بَشْوَرَة الْغُرُوب



بَشْوَرَة الْقَرَّاص



بَشْوَرَة النَّهَار



بصل




بصل الخشخاش



بصل المغريت



بط أهلي



بط المَنَاقِع

Wild-leek (E). Perllauch, Wilder lauch (D). Porro bastardo, Porro salvatico (I).

نبات بصلي بري من الزنبقيات ، يقال انه لا يخلو من الفوائد الطبية والمنافع الصحية ومنهم من أكله مسلوقاً .

Oignon marin (F).

Sea onion (E).

٣٦٢٠ - بَصَل الفَار

راجع إشنيل .

Muscari en grappe (F).

Starch hyacinth (E).

٣٦٢١ - بَصَل المِسْك

راجع حلحل جميل .

Bulbe, Oignon (F). Bulb, Onion (E).

٣٦٢٢ - بَصَلَة
ساق ارضية مستديرة مركبة من قرص واسقاط لحماية متراسة متراكبة تحضن برعمة رئيسية ترتكز على القرص .

Nivéole printanière (F).

Spring snow-flake (E).

٣٦٢٣ - بَصَلَة بَيْضَاء

راجع عهر ريبي .

Brebis de peu de lait (F).

٣٦٢٤ - بَصُوق
البصوق: أقل الغنم لبناً (القاموس) .

Truffe (F). Truffle (E).

٣٦٢٥ - بَضْبَاض
البضباض: الكدأة .

٣٦٢٦ - بَضَم

يقال بضم الحب اذا اشتد قليلاً . وبضم الزرع اذا غلظ حبه . والبُضَم هي السنبلة .

Ilot (F). Islet (E).

٣٦٢٧ - بَضِيع
البضيع: الجزيرة الصغيرة في البحر . ج بَضِيع .

Ponction (F). Puncture (E).

٣٦٢٨ - بَطّ
راجع بزل .

Anas (S). Canards (F). Ducks (E).

٣٦٢٩ - بَطّ
واحدة بطّة للذكر والانثى . جنس طيور وحشية وداجنة من فصيلة البطيات . انواعه عديدة منتشرة في جميع انقطار العالم . اشكالها واحجامها والوانها كثيرة . جميعها ترضع في المَنَاقِع والمياه الراكدة || اشهر انواعه واعرفها بط المَنَاقِع الذي تحدثت منه الضروب الداجنة .

Canard domestique (F).

Domestic duck (E).

٣٦٣٠ - بَطّ أهلي

نوع من البط ، يقال انه تحدث من النوحشي . ضروبه وسلالاته عديدة تختلف باشكالها واحجامها واثوابها . جميعها كبيرة المنقار الصفيحي ، قصيرة ريش الجناح والذنب ، ربعة الجسم الكائر ، قصيرة القوائم الغليظة . لا تطير . ضروبه وسلالاته كثيرة العدد جميعها سهلة التربية ، قليلة المتطلبات والنفقات انما يلزمها الكثير من الماء . الذكر الواحد يكتفي سبع اناث . الانثى تبيض في السنة الواحدة من ٦٠ الى ٢٠٠ بيضة . مدة حضانة البيض تراوح من ٢٨ الى ٣١ يوماً . || قوته دقيق الحبوب والنخالة والاعشاب والبقول .

٣٦٣١ - بَطّ المَنَاقِع * ، بَطّ وَحْشِي

Anas boschas (S). Canard sauvage (F). Wild duck (E). هو النوع الذي تحدثت منه الضروب الاهلية وسلالاتها الكثيرة العدد .

Arglie caillouteux (F).

Pebble clay (E).

٣٦١٠ - بَصْرَة ، بَصْر
البصرة والبصر: الطين العلك الجيد الذي فيه حصى .

٣٦١١ - بَصْرَة

البصرة: حجر براق . ج البصر .

Feuillaison (début) (F).

Foliation (lead) (E).

٣٦١٢ - بَمَصَص

إنشقاق وتفتح الزمعات للاوراق .

Hémoptysie (F). نَفَث الدَم ، بَصَق الدَم

Hemoptysis (E).

عارض نزف يحصل في الرئة اسبابه عديدة اخصها الاجهاد والاعياء .

Allium cepa, Porrum cepa (S).

Oignon, Ognon (F). Onion (E). Zwiebel (D). Cipolla (I).

٣٦١٤ - بَصَل *
نبات زراعي محول من فصيلة الزنبقيات . واحدته بصلة . والبصلة تتركب من ساق ارضية قرصية صغيرة متراكبة الاسقاط . تخرج من سطحها الاسفل جذور عرضية دقيقة كثيفة بيضاء اللون تنتش من زر طرفي كبير تحيط به الاسقاط المستوفى المتتابعة التي تتكون في اطرافها الاوراق الجوفاء || ازهاره نوري التجميع ، خيمي الارتكاز يحمله شراخ اجوف منبثق عن قرص الساق الارضية . الزهرة كاملة خنثوية سداسية البتلات والاسدية ، بيضاء او خضراء اللون || انواعه وضروبه كثيرة العدد . زراعته عالمية . فوائده الصحية عديدة اخصها مقاومته الحميات وادار البول . وهو من البقول الغنية بالمناصر الهيدروكربونية . تحليله يفيد على اشتهاله :

١,٦٨ ٪ من المواد الازوتية

٠,١٠ ٪ من المواد الدهنية

٢,٧٨ ٪ من السكر

٨,٠٤ ٪ من المواد الاستخلاصية غير الازوتية

٠,٧١ ٪ من السليولوز

٣٦١٥ - بَصَل الخَشَخَش * ، هِيْمَنْتَسْ أَتْمَر

Haemanthus coccineus (S). Haemanthe ponceau, Tulipe du Cap (F). African tulip, Blood flower (E). Afrikanische tulpe, Blutblume (D). Tulipano d'Africa, T. del Cape (I).

نوع من الهيمانتس له ورقتان كبيرتان نصلها مالمس البشرة ، يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . ويعرض من ١٥ الى ٢٠ . شراخه يعلو نحو ٢٥ سم . ترسه الزهري كثيف التجميع قطره نحو ٨ سم . زهرته حمراء اللون || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

Scille d'automne (F).

Autumnal squill (E).

٣٦١٦ - بَصَل الحَبَّة

راجع إشنيل الخريف .

Muscari chevelu (F).

Tassel hyacinth (E).

٣٦١٧ - بَصَل الذئب

راجع حلحل أزب .

Muscari botryoïde (F).

Grape hyacinth (E).

٣٦١٨ - بَصَل الزَّيْز

راجع حلحل جميل .

٣٦١٩ - بَصَل العَفْصَرِيَّة * ، كُرَّاث نَبْطِي

Allium ampeloprasum (S). Ail à cheval, Poireau sauvage, Faux poireau (F). Blue-leek, Vine-leek,

— الفئة الثالثة تشمل الضروب المشخّرة ذات الوريقات الصغيرة المتوسطة الكثافة والتمتعج وهي :

Moerker, Président von Junker, Gastold, jaune cimbal, Leo, Richter's Imperator, Louis Botha, Landjuwel, New seedling, Stollnick, Major Welssman, Lord Tennyson, Omega...

— الفئة الرابعة تشمل الضروب ذات العروق الملونة والوريقات المستعرضة المتعجج وهي :

Géante bleue, Géante blanche, Arabella, Victoria-Augusta, Zoulou, Bretonne...

هذا من الوجهة النباتية وقد لا يكون كذلك من الوجهة الصنفية التجارية التي تركز على جودة المذاق والطعم. لذلك وبالنسبة الى هذه المجموعة، تقسم الضروب الى اربعة اقسام :

١ - قسم الضروب الجيدة الصنف الممكن استعمالها في جميع المأكّل :

Belle de Fontenay, Marjolin hâtive, Marjolin têtard, Fleur de pêcher, Chave, Royale.

٢ - قسم الضروب الحسنة الصنف الممكن استعمالها في معظم المأكّل :

Hollande jaune, Hollande rouge, Violette longue, Quarantaine de la Halle, Caillou blanc, Séguin, Violette, etc...

٣ - قسم الضروب المتوسطة الصنف :

Pousse-debout, Victor, Rognon rose, Saucisse, Flocon de neige, Merveille d'Amérique, etc...

٤ - قسم الضروب العادية الصنف الوافرة الانتاج التي تستخدم في الصناعات الغذائية وفي غذاء الماشية :

Eléphant blanc, Champion, Reine des polders, Farineuse rouge, Géante bleue, Institut de Bauvais, Magnum bonum, Early rose, Négresse, Richter's Imperator, etc...

٣٦٣٨ - بطاطا أب-تو-ديت *
Up-to-déti (Fin de siècle)
ضرب متوسط الإكثار، حسن الصنف، قوي النمو، وافر الانتاج، يرغب في الأتربة القليلة أو المتوسطة الاندماج || درناته مستطيلة مفلطحة، عويناتها قليلة غائرة، بشرتها سمراء اللون، لبانها أبيض.

٣٦٣٩ - بطاطا إرستالين *
Eersteling
ضرب باكوري يوجد في الأتربة المتوسطة الاندماج. درناته كبيرة الحجم مستطيلة، عويناتها سطحية، بشرتها تبنية اللون، لبانها أصفر.

٣٦٤٠ - بطاطا إرلي روز *
Early rose
ضرب متوسط الإكثار، قوي النمو، وافر الانتاج. درناته كبيرة اسطوانية، عويناتها غائرة عميقة، بشرتها وردية اللون، لبانها أبيض غزير العصارة.

٣٦٤١ - بطاطا آرّن بنّر *
Arran Banner
ضرب باكوري نجحت زراعته في لبنان. درناته متوسطة الحجم، شبه مستديرة، عويناتها صغيرة غائرة، بشرتها ملساء ترابية اللون، لبانها أبيض.

٣٦٤٢ - بطاطا امبراطور *
Imperator, Richter's Imperator
ضرب مشخّر عظيم الانتاج، متوسط الصنف يستعمل في الصناعات الغذائية. درناته كبيرة الحجم شبه مستديرة عويناتها غائرة عميقة، لبانها أبيض جامد المكسر.

٣٦٣٢ - بطّ خضاري
Canard colvert (F).
Mallard (E).
راجع بركة.

٣٦٣٣ - بطّ قُطّي
Macreuse (F). Scoter (E).
هو الدمية، جنس طير من البطيات؛ اطلب دمية.

٣٦٣٤ - بطّء الإكتاخ، بطّء النقطين
Echamplure (F).
هو التأخير العارض على تفتح الزمعات وقد يكون سببه البرد وخلافه.

٣٦٣٥ - بطّارس
ضرب من السمك يعرف بالسرخس (محيط المحيط).

٣٦٣٦ - بطّاس
Patas (F).
هو الهجرس الاحمر، نوع من القروذ الذئالة، اطلبه.

٣٦٣٧ - بطاطا *، بطاطيس.
Solanum tuberosum (S).
Pomme de terre, Parmentière (F). Common potato (E). Potaten, Kartoffel (D). Patata, Pomo di terra (I).

جنس نباتات عشبية عسقلية حولية من فصيلة الباذنجانيات. انواعه وضروبه كثيرة العدد تتميز بأوراقها ودرناتها المختلفة الاشكال والاحجام || سوقها عشبية هشة. أوراقها مركبة وثرية. وريقاتها صغيرة براوح عددها من ٥ الى ٩. نصلها كثير العروق متمعج الملمس، ازغب البشرة. ازهارها عنكولي التجميع. تاجي الارتكاز. ازهارها خماسية التركيب عديدة الالوان يغطو عليها الليلي. ثمارها عنبية. بزورها صغيرة كلوية مفلطحة لونها الى البياض. عسقلها درنية غذائية عديدة الاشكال والالوان تحوى من النشا ما تراوح نسبته من ١٦ الى ٢٤ ٪ وهي متوسطة الغنى بالفيتامينات «آ» و «ث». اما متوسط تركيبها فهو ما يلي :

ماء	٧٩,٠٠ ٪
بروتين	١,٧٦ ٪
دهن	٠,٠٥ ٪
هيدروكربونات	١٧,٧٤ ٪
الياف	٠,٣٥ ٪
رماد	١,١٠ ٪

يمش البطاطا وينتج في معظم الاقاليم المعتدلة. مهدد المقدور بلاد الشيلي في امريكا الجنوبية حيث تكثر انواعه البرية. يوجد في جميع الأتربة القليلة أو المتوسطة الاندماج، الخواوة، الغنية بالمواد العضوية وبالعناصر الرئيسية. زراعته تستلزم العناية بالآتربة والري الغزير || تقسم انواعه وضروبه، بالنسبة الى خصائص أوراقها، الى اربع فئات :

— الفئة الاولى تشمل الضروب الباكورية ذات الاوراق الكثيفة المتعجج النصل وهي :

Segonzac, Chave, Pousse-debout, Reine des polders, Mayette, Kidney, Prince de Galles, Ronde hâtive, Ed. Lefort, Gelbe rose, Brandale, etc.

— الفئة الثانية تشمل الضروب المتوسطة الإكثار ذات الاوراق القليلة الكثافة، الدمية التمتعج وهي :

Salle de farine, Saas, Ella, Fleur de pêcher, Couronne impériale, Flocon de neige, Evergood, Hâtive de Richter, Hâtive de Zwicky, Kerfurter, Fruhe, Landmann, Géante de l'Ohio, etc.



بطاطا، ساق وأوراق وأزهار




بطاطا أب-تو-ديت



بطاطا إرستالين




بطاطا إرلي روز



بطاطا آرّن بنّر




بطاطا امبراطور



بطاطا بينتجه



بطاطا حلوه



بطاطا رويال



بطاطا مايت



بطاطا مرجولين



بطاطا

٣٦٥٠ - بطاطا صفراء هولندا (F). *Jaune de Hollande*. ضرب متوسط الابكار، قوي النمو، وافر الانتاج. درناته مستطيلة، عويناتها غائرة، لبها اصفر.

٣٦٥١ - بطاطا فيتلوت (F). *Vitelotte*. ضرب متوسط الابكار، وافر الانتاج. درناته اسطوانية مستطيلة، عويناتها غائرة عميقة، لبها ابيض جامد المكسر.

٣٦٥٢ - بطاطا مابيت (F). *Mayette*. ضرب باكوري، قوي النمو حسن الصنف. درناته بيضية مفلطحة، عويناتها سطحية، بشرتها غبراء ملساء، لبها اصفر.

٣٦٥٣ - بطاطا مرجولين*، بطاطا كيدني (F). *Marjolin, Marjolaine, Kidney*. ضرب باكوري، فاخر الصنف، متوسط الانتاج. درناته مستطيلة، بشرتها ملساء، عويناتها سطحية، لبها عابق الصفار.

٣٦٥٤ - بطاطا هنو (F). *Hénaut, Belle de Fontenay*. ضرب باكوري، فاخر الصنف، جيد الانتاج. درناته اسطوانية مستطيلة، بشرتها ملساء، عويناتها غائرة، لبها اصفر.

٣٦٥٥ - بطاطا صينية (F). *Igname bulbifère*. راجع إنيام صيني.

٣٦٥٦ - بطاطا يابانية (F). *Crosne du Japon*. نبات عشبي عسقولي معمر من السقاس وفصيلة الشفويات. يزرع لجلوده الدرنية المأكولة. عساقله مغزلية الشكل، بيضاء المكسر، قليلة الالياف، مستحبة الطعم.

٣٦٥٧ - بطباط*، جنجر، طرنه، شبط الفول (S). *Polygonum aviculare*. *Renouée des oiseaux, Centinode, Trainasse, Traniane, Herbe à cochon* (F). *Knot-grass, Centinode, Knot-weed, Armstrong* (E). *Vogelknöterich* (D). *Centinodia, Bistorte aviculare, Bistorte centinodio, Poligono, P. degli uccelli* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة البطباطيات كان ولا يزال من الاعشاب الطبية. ساقه فراء. اوراقه متعاقبة، نصلها اهليلجي الشكل، صغير القد، مدبب المقصبة الشائكة. ازهاره ابطية الارتكاز، ثماره بزور مخروطية الشكل تأكلها العصافير.

٣٦٥٨ - بطباط نيلي، شبطاط، نيلة صينية (S). *Polygonum tinctorium*. *Persicaire indigotier* (F). *Chinese indigo* (E). *Chinoisches indigo* (D). *Saraceno tintorio* (I).

نبات عشبي معمر من فصيلة البطباطيات. يستخرج منه صبغ نيلي شائع الاستعمال في بلاد الشرق الاقصى.

٣٦٥٩ - بطباطيات (S). *Polygonaceae*.

Polygonacées (F). *Polygonaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة القعالات. اجناسها وانواعها نحو ١٠٠ جميعها من نباتات المناطق الحساسة والمعتدلة. فيها الاعشاب والجنات والاشجار، معظمها بري. اوراقها فردية. ازهارها خشوية. ازهارها لاقياسي الارتكاز، عنقودي او صيواني او سنبل. التجميع.

٣٦٤٣ - بطاطا بلائشار (F). *Blanchard*. ضرب متوسط الابكار، حسن الصنف، وافر الانتاج. درناته مستديرة الشكل، عويناتها غائرة، لبها اصفر اللون.

٣٦٤٤ - بطاطا بينتجه* (F). *Bintje*. ضرب باكوري فاخر الصنف، وافر الانتاج. درناته بيضية مستطيلة، عويناتها سطحية. بشرتها ملساء تبقية اللون، لبها اصفر.

٣٦٤٥ - بطاطا حلوه*، قلئقاس هندي (S). *Ipomaea batatas, Convolvulus batatas, Batatas edulis* (S). *Patate, Batate, Patate douce* (F). *Sweet potato, Spanish potato* (E). *Batate, Batatep-runkwinde* (D). *Batata* (I).

نبات عسقولي عشبي مداد معمر من فصيلة المحموديات. ضروبه عديدة سوقها مدادة تطول من ٢ الى ٣ امتار. اوراقه مختلفة الاشكال تغلب فيها الاستطالة، جميعها منعقة متعاقبة. ازهاره قليلة التجميع، محورية الارتكاز يكثر فيها البنفسجي والابيض. عساقله عديدة الاشكال والاحجام والالوان التي تختلف مع الضروب من الابيض الى الاصفر والاحمر والبنفسجي. جميعها سكرية مذيبة مأكولة بعد شيها او سلقها || تركيبها الكيماوي التالي، وهو المعدل الوسطي، يدل على غناها بالمواد الغذائية :

ماء	٦٩,٣٢ %
هيدرات الكربون	٢٤,٧٣ %
مواد دهنية	٢,٦٣ %
مواد زلالية	١,٣٨ %
سليوز	٠,٨٦ %
رماد	١,٠٨ %

اما نشاها فأبيض اللون، سهل الاستخراج. ونسبة موادها السكرية تزداد في الضروب العابقة الالوان || يستخرج منها بالتخمير والتقطير نوع من الكحول اللطيفة الشائعة الاستعمال. المثة كيلو من المسائل الحمر تقطر ١٥ ليترًا من الكحول عيار ٩٥، والمثة كيلو من المسائل البيض تقطر ١٣ ليترًا من الكحول عيار ٩٥.

٣٦٤٦ - بطاطا رويال* (F). *Royale*. ضرب متوسط الابكار، فاخر الصنف، وافر الانتاج. درناته كلوية الشكل متوسطة الحجم، عويناتها بارزة، بشرتها سمراء اللون، لبها تبي.

٣٦٤٧ - بطاطا زنجية (F). *Nègresse*. ضرب مشغار متوسط الصنف والانتاج، درناته اسطوانية، عويناتها غائرة عميقة. لبها شديد السمرة جامد المكسر.

٣٦٤٨ - بطاطا سان مالو (F). *Saint Malo, Fluke géante*. ضرب متوسط الابكار، قوي النمو، وافر الانتاج. درناته مستطيلة كبيرة، بشرتها صفراء اللون ملساء، عويناتها سطحية، لبها ابيض اللون غزير العصارة.

٣٦٤٩ - بطاطا شاو (F). *Chaw, Shaw, jaune ronde*. ضرب باكوري، فاخر الصنف، وافر الانتاج. درناته متوسطة الحجم، عويناتها غائرة، لبها اصفر اللون قليل العصارة.

٣٦٦٠ - بَطْبَطَة

البطبطة هي صوت البط من فيه .



بطر وميس

٣٦٦١ - بَطْطَة

Canard (F). Duck (E).

٣٦٦٢ - بَطْطَة أنثى

Cane (F). Female duck (E).

٣٦٦٣ - بَطْطَحَاء

Lit d'un torrent (F).

Torrent bed (E).

البطحاء مسيل الطحمة والجدول .

٣٦٦٤ - بَطْرَة ٥

Batara (F).

طائر من الجوارثم وفصيلة الجيشتيات يدعى تمغويل اشهب ، اطلبه .




بطريش الاغصان

٣٦٦٥ - بَطْرَة هندية

Abre (F). Love pea (E).

راجع ابروس عطر .



بطريش الحبوب

٣٦٦٦ - بَطْرُوميس ٥


Pteromys (S).

Pteromys (F). Pteromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجائيات .
انواعه ١٢ موطنها الهند والصين واليابان والجزر || اجسامها
متوسطة القد مستطيلة . رؤوسها عريضة . ذلاليها
مقطومة . آذانها كبيرة . اذنانها طويلة . تتميز بزوائد
الجلدية الجناحية القائمة على خوصها من مفصل الساعد
الى راس الفخذ ومنه الى الزام الاول من الذنب . تطير
من شجرة الى اخرى ، شوطها يراوح من ٢٠ الى ٨٠ م .
تألف الغابات والاحراج الكثيفة ، تسرح في الليل .
تعيش على الاشجار قوتها البراعم والنوامي والثمار على اختلافها
والحشرات والديدان . اجعارها او كان ترتبها في صدوع
الاشجار . اناسها تضع من ٣ الى ٤ ادراص ، تبصر وتكتسي
بعد وضعها بعشرة ايام .



بطريش الراتنجيات



بطريش الزيتون



بطريش السنديان



بطريش النخيل



بطريش مخدّد

٣٦٧٠ - بَطْرِيش الزَيْتُون ٥

Sinoxylon sexdentatum (S). Sinoxylon, Apate de la vigne (F). Sinoxylon sexdentatum (E). Rebendraher (D).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد ، طولها نحو ٥ مم .
ثوبها حنطي اللون اسمر الموج . ظهراتها مسنن الختار .
تركب عادة جميع الاشجار اليابسة والضعيفة ولا تمف
عن الزيتون ، وقد تعمرى الكرمة ان لم تجد عائلا سواها .

٣٦٧١ - بَطْرِيش السنديان ٥

Bostrychus capucinus (S). Apate des chênes (F).

خنفساء من البطريشيات ، طولها نحو ٨ مم . رأسها وصدرها
سود ، نمداهها وبطنها حر . يرقاتها تركب الاشجار
الحرجية اخصها السنديان فتؤذيها .

٣٦٧٢ - بَطْرِيش الكرمة

Sinoxylon (F).

بطريش الكرمة وبطريش الزيتون واحد ، اطلبه .

٣٦٧٣ - بَطْرِيش النخيل ٥

Phonapathe frontalis (S).

Apate des dattiers (F).

خنفساء من البطريشيات كبيرة القد طولها نحو ١٥ مم .
ثوبها كستني اللون ، اسود الموج . مزغب الكنف . يرقاتها
تركب المراجين فتتخرها وتسبب يباس البسر قبل ادراكه
وقد تنخر الجريد فتكسره الرياح .

٣٦٧٤ - بَطْرِيش مُخَدَّد ٥

Bostrychus lineatus (S).

Bostriche strié (F).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد طولها نحو ٥ مم .
ثوبها الى السمرة العنابية . رأسها اسود اللون . نمداهها
مخدّدان . يرقاتها تركب الصنوبر فتؤذيها .

٣٦٧٥ - بَطْرِيشِيَّات ٥

Bostrychidae (S).

Bostrychids (F). Bostrychids (E). Kapuziner-
käfer, Holzkäfer (D).

فصيلة حشرات من نمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
عديدة . يكثر فيها الحجم الصغير والشكل الاسطواني .
رؤوسها محدبة . قرونها الاستشعارية قصيرة ، فواصلها
من ٩ الى ١١ والثلاث الاخيرة منها منشارية او ورقية
الشكل . ارساغها خماسية العقول . محالبها عادمة التسنين .
اثوابها مختلفة الالوان || اناسها تمتح مكنها في ثقب
اسطوانية تحفرها في الاخشاب اليابسة وفي لحاء الاشجار
فينتف عن يرقات مقرسة غليظة الرأس ومقدم الجسم تعيش
على المواد الخشبية في الانفاق التي تسردها وتمكث فيها
حتى رقادها العذري حيث تتحول الى حوريات فخنفساء
تجدد جيلها وتميد سيرتها .

٣٦٧٦ - بَطْرِيق * ، أَكْتَع

Alca (S).

Pingouin (F). Penguin (E).

جنس طير بحرية من فصيلة البطريقيات . انواعه المعروفة
نحو ١٧ موطنها جزر البحار الشمالية والقطبية ، تنزح
عنها الى المناطق الدافئة في زمن التسايف والترخيم ثم تعود
اليها مع فراخها . ملجئها الحياتي جماعي . اسرارها وافرة
العدد . قوتها الاسماك والفشريات || اجسامها عضلية ،
معتدلة الجرم ، ربعة الرؤوس ، مستطيلة المناقيد ، قصيرة
الاجنحة الدرية الاطراف ، صغيرة الاذنان والقوائم ،
ثلاثية الاصابع الكاملة الخطاب . اثوابها متائلة عند الشقين .
رؤوسها وارديتها وركامل صفحتها العليا الى السواد الفاحم

٣٦٦٧ - بَطْرِيش الاغصان ٥

Scobicia ceratonlae (S).

Cusson des branches (F).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد طولها نحو ٥ مم .
ثوبها الى البني العابق . تركب اسارع الكرمة وافنان المنور
وافناد التين فتثقبها وتمتج مكنها داخل اللحاء فينتف عن
يرقات تتابع حفر اللحاء والخشب حتى منطقة المكاك والمخ
فتقضي على الجزء الاعلى من العضو المنخور .

٣٦٦٨ - بَطْرِيش الحُبُوب ٥

Rhizopertha dominica (S). Cusson des grains.

Capucin des grains (F). Lesser grain borer (E).

Getreidekapuziner (D).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد اسطوانية الشكل ،
كستنية اللون ، طولها نحو ٣ مم . ظهراتها خشن الملمس .
تأشيرها قوية بارزة . تمتح مكنها على الحبوب المخزونة
فينتف عن يرقات دقيقة غبراء اللون تنخر الحبوب المكسورة
وغير المكسورة وتعيش عليها .

٣٦٦٩ - بَطْرِيش الراتنجِيَّات ٥

Bostrychus typographus (S). Bostriche typographe (F).

خنفساء من البطريشيات صغيرة القد ، مبططة ، سمراء اللون
تطول نحو ٦ مم . تركب سوق واغصان الراتنجيات . يرقاتها
مؤذية تنخر اللحاء وتسردب الشكير .



بطريق



بطفون جبار



بطم



بطم أخضر



بطماحة

فواحة العرف كثيرة الاستعمال || ثمرته تدعى الحبة الخضراء. قال ابن سينا انه يحلو الجرب والقوباء. وقال غيره انه منقث في النزلات الصدرية ومدر للبول. وقال الانطاكي: «اوراقها تسود الشعر ملاء. والحب يسخن الصدر والمعدة ويقطع البلغم ويزيد القوة الجنسية ويسهل عن تجربة. ودهنه يحلل اوجاع العصب وحصر البول شرباً ويصلحه العسل. وشربته الى عشرة».

٣٦٨٢ - **بُطْمُ أَخْضَرُ***، بُرْزُوق (S). Pistacia khinjuk (S). Lentisque de Bombay (F). East Indian mastiche (E). Ostindischer mastix (D). Lentisco di Bombay (I).

نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات. مهدد الهند وبعض مناطق الشرق الاوسط. شجرته فرعاء تعلو من ٤ الى ٧ امتار. اوراقها مركبة عابلة، وريقاتها وثرية يراوح عددها من ٩ الى ١٣. نصلها ملس السطح. ثمارها بقدر الحصة الصغيرة || يستخرج من لحاء سوقها مادة راتنجية صفية تعلك وتستخدم في شتى الصناعات العطرية.

٣٦٨٣ - **بُطْمُ شَرْقِي**، **بُطْمُ مَسْكِي**، **ضُرُو**، **مُصْطَكَاة** (S). Pistacia lentiscus (S).

Lentisque, Pistachier lentisque, Arbre au mastic (F). Lentisk, Mastic tree (E). Mastixpistazie (D). Lentisco, Pistacchio sondo, Manna del Libano, Pistacchio d'Oriente (I).

نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات. شجرته صغيرة القد فرعاء، تعلو من مترين الى ستة امتار. اوراقها مركبة دائمة، وريقاتها شفعية التجميع، مستطيلة يراوح عددها من ٦ الى ١٢. نصلها ملس البشرة، جميل الخضار اللامع، عنقها الى الجذوة. ثمارها بحجم رشكل الحمص الصغير، لونها الى الجذوة السمرء || يستخرج منها صمغ راتنجي مشهور يدعى المصطكاء والكمكام.

٣٦٨٤ - **بُطْمَاْحَة*** (S). Incarvillea (S). Incarvillee (F). Incarvillea (E).

جنس نباتات عشبية او مخشوشة من فصيلة البغنونيات. سوقها متباينة الاحجام. اوراقها متعاقبة. ازهارها كبيرة القد، عنقودية التجميع، طرفية الارتكاز || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق. ترغب في الانربة المتوسطة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية.

٣٦٨٥ - **بُطْمَاْحَة صَفْرَاء*** (S). Incarvillea lutea (S). Incarvillee jaune (F).

نوع من البطماحة. بجلة مسرة مخشوشة الساق والفروع تعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها الجذعية مسنة الختار. اوراقها العليا مفصصة. ازهارها متدليلة كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الكبريتي الجميل || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.

٣٦٨٦ - **بُطْمَاْحَة صِينِيَّة*** (S). Incarvillea sinensis (S).

Incarvillee de Chine (F). نوع من البطماحة. عشبة تزيينية محولة. ساقها تعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقها ريشية، خطية إلوريقات. ازهارها بيضاء اللون يعلوها تمشيخ احمر وهي عشارية الفصل، قريبة الشبه بزهرة الكشابين أي الديجيتال || تنويرها يستمر من تموز الى آب.

الاسفع الموج، صدورها وبطونها وكامل صفحتها السفلى الى البياض || اناسها تضع في موسمها الحولي بيضة واحدة، شبه اجاصية الشكل، صلبة القوبة، خضراء اللون، مرقوشة بالابيض. الترخيم يستمر نحو ٣٥ يوماً تقوم به الانثى بمنابرة الذكر.

٣٦٧٧ - **بُطْرِيْقِيَّات** (S). Alcidae (S).

Alcidés (F). Alcidae (E).

فصيلة طير من عادات الريش ورثة كفتيات القدم. انواعها المعروفة نحو ٢٥ تجمعها بعض الاجناس. جميعها تسبح وتغوص. تجيد العوم اكثر من الطيران. مارجها الحياتي جماعي. اسراها متباينة العدد، تغلب فيها الوفرة || اجسامها عضلية. رؤوسها متفاوتة الضخامة. اعناقها قصيرة. مناقيدها متباينة الاشكال. اجنتها قصيرة، ذلقة واذناها وقوائمها كذلك. اصابعها كاملة الخطاب. اثوابها متماثلة عند الشقين || موطنها مناطق الدائرة القطبية تنزع عنها مرة في العام، نحو خمسة اشهر، الى المناطق المعتدلة الحرارة، حيث تبيض وتحضن وتعمل ثم تعود مع فراخها || اشهر اجناسها البطريق والم ومارغول والمقار.

٣٦٧٨ - **بُطْس**

«نوع من السمك لها مرات يكتب بها الكتب فاذا جففت قرئت في الظلام كما تقرأ بالنهار» (صاحب المعطار) وذلك يعود الى ما فيها من فسفور يضيء في الظلام.

٣٦٧٩ - **بُطْمُونُ جَبَّار*** (S). Patagona gigas (S).

Patagone géante (F).

طائر من فصيلة الضريسيات. اعطانه بمض مناطق امريكية الجنوبية. يعتبر اكبر طائر من فصيلة الضريسيات || جسمه قريب الشبه بجسم السمكة، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه الى الطعلة السمرء يعلوها موج اخضر. صدره وبطنه الى الذرة الخضراء الموج. يتميز باستطالة منقاره وجناحيه || قوته اللدباب والحوام ورحيق الازهار || يدشن عشه في الاشجار الغشاء قرب مجاري الماء. انشاء تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في الحول. حضنتها من ٣ الى ٤ بيضات ترخها بمنابرة الذكر نحو ١٣ يوماً.

٣٦٨٠ - **بُطْلَان** (F). Nullité (F). Nullity (E).

هو انتقاص العقد القانوني بسبب فقدانه إحدى الشروط الجوهرية او الشكلية اللازمة لصحته. والبطلان قد يكون:

بطلان مطلق (F). Nullité absolue (F).

بطلان صريح (F). Nullité expresse (F).

بطلان نسبي (F). Nullité relative (F).

بطلان مضمر (F). Nullité virtuelle (F).

٣٦٨١ - **بُطْمُ***، **هَمْرَاوَة**

Pistacia terebinthus P. cabulica (S). Térébinthe, Pistachier térébinthe (F). Turpentine tree, Terebinth tree (E). Terepentinpistazie, Terepentinbaum (D). Terebinto, Pistacchio terebintino, Scotano campestre (I).

ومن اسمائه افيس، افططيس، تمالس، طرميس، قريشة. نوع من الفستقيات وفصيلة البطميات. وهو شجرة فرعاء فتاء تعلو من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها مركبة عابلة. وريقاتها وثرية يراوح عددها من ٧ الى ١٣، نصلها جلدي التركيب ملس السطح. ثمارها بلسنية القد، شبه كروية الشكل || يستخرج من لحاء سوقها مادة راتنجية

البطيخات . أنواعه المروفة عشرة اعطائها البلاد الحارة . تجوب بحيراتنا وانهارها واهوارها ومناقعها . اجسامها كبيرة القد تطول نحو ٥٠ سم . اثوابها الى الصلبة المنسجة بالاسود والاصفر || طيرانها بطي . الاندفاع ، متقطع الحركة ، قصير الشوط .

٣٦٩٨ - بطوس* Pothos (S). Pothos (F).

جنس نباتات مدادة معمرة من فصيلة القلقاسيات . انواعها المروفة عديدة جميعها من ثبوت المناطق الحارة الاسيوية والافريقية والامريكية || سوقها عارشة . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، اهليلجية النصال المتمنجة . ازهارها خنثوية ، ضبية التجميع ، تتركز على معاليق ابطية الانتشاب . ثمارها عنبية ، صغيرة القد ، مستديرة ، مبططة الرأس والعقب ، جامدة القشور ، جحالية المادة .

٣٦٩٩ - بطونيا Pétunie (F). Petunia (E). راجع بتونيا .

٣٧٠٠ - بطونيكا ، قسطنان Betonica (S).

Bétoine (F). Betony (E). جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الشفويات . اوراقها متعاقبة معنقة طويلة الزناد . ازهارها سنبلية التجميع تاجي الارتكاز . ازهارها بحيلة الشكل ، عطرية العرف ، سريعة الادبار . انواعها قليلة . اشهرها البطونيكا الطبية والبطونيكا التزيينية .

٣٧٠١ - بطونيكا طيبة* ، شاطره

Betonica officinalis, Stachys betonica (S). Bétoine, Betonica, Belle tête, Epialre bétoine (F). Betony, Wound-wort, Bishop's-wort (E). Betonien, Betonienzlest, Betonica (D). Betonica, Vettonica (I).

نوع من البطونيكا ، وهي عشبة برية معمرة منبتها جميع الاصقاع المعتدلة كانت ولا تزال من النباتات الطبية الشائعة الاستعمال تنفع من الطحال وضعف الكبد والهضم . وهي تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقها زباء . اوراقها بيضيه مسنة الحافة . ازهارها سنبلية التجميع وردية اللون او حمراء .

٣٧٠٢ - بطيات Anatidae (S).

Anatidés (F). Anatidae (E).

هي فصيلة البط من كفيات القدم صفيحيات المناقير . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اشهرها البط والم والارز والبلقشة والعفاس .

٣٧٠٣ - بطيخة Papillon femelle (F).

Female butterfly (E).

هي الفراشة الانثى من اي جنس او نوع كانت ، ج بطاح .

٣٧٠٤ - بطيخ* ، بطيخ احمر ، بطيخ هندي ، جبس ، رقي ، دلاع ، خربز

Citrullus vulgaris, Cucumis citrullus, Cucurbita citrullus (S). Pastèque, Melon d'eau (F). Watermelon (E). Wasserzitrusse, Wassermelone (D). Pasteca, Melone d'acqua, Anguria (I).

نبات عشبي حولي بري وزراعي من فصيلة القرعيات . يزرع للآراء المأكولة . ضروبه عديدة معظمها زراعي مأكول الثمار . فوارقها قائمة على الشكل والحجم ورتعة

٣٦٨٧ - بطماحة لبدة*

Incarvillea compacta (S).

Incarvillée compacte (F).

نوع من البطماحة . عشبة مخشوشة معمرة درنية الجذور . ساقها قصيرة تعلو نحو ٤٠ سم . اوراقها لحمية ، سكمية التفصيص . ازهارها لبد التجميع . ازهارها كبيرة القد ، تطول نحو ٦ سم . لونها الى الوردي اللامع || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

٣٦٨٨ - بطميات

Anacardiaceae,

Terebinthaceae (S). Anacardiaceae, Térébin-

thacées (F). Anacardiaceae, Terebinthaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القعالات تشمل خمسة وخمسين جنساً تنتمي الى خمسة اسباط . وهي المنقيات والفستقيات والدوبينيات والبلاذريات والسبنديات . جميعها اشجار وشجيرات وجنبات راتنجية .

٣٦٨٩ - بطن Abdomen

تجويف في الجسم الحيواني يضم مجموعة الاعضاء التي تكون الجهاز الهضمي والدوري والبولي || اهم اجزائه المري والمعدة والامعاء والكبد والكلى والطحال .

٣٦٩٠ - بطن Alpha du Centaure (F).

البطن نجم نير من كوكبة قنطورس . ويدعى ايضاً ألفا قنطورس ، اطلبه .

٣٦٩١ - بطن الأرض Tréfonds (F). Subsoil (E).

هو من الحضيض ما كان مركزه الحصيلي تحت الهوم اذ ان الترتيب من داخل الارض الى خارجها يبتدى بالنقطة الوسطى او المركزية يعلوها الجوف المانع ثم بطن الارض ثم الهوم ثم التربة السطحية .

٣٦٩٢ - بطن الحوت ، رشاء

بطن الحوت او الرشاء منزل من منازل القمر اليانية . وهو كواكب كثيرة صغار على صورة السمكة وفي سرتها نجم قمر ينزله القمر آخر ليلة من الشهر | رقيب بطن الحوت يدعى السماك .

٣٦٩٣ - بطناني* Tellurique (F). Telluric (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالارض كالحراة الارضية والزلازل ...

٣٦٩٤ - بطنانية Tellurisme (F). Tellurism (E).

البطنانية من الوجهة الحكمية ، عمل مناطيسية الارض . ومن الوجهة الجغرافية ، تأثير طبيعة الارض على الحيوان والنبات .

٣٦٩٥ - بطني ، جرجنبي Ventral

نعت وصفي يطلق على كل ما له صلة ببطن الحيوان .

٣٦٩٦ - بطنية السنفات Gastrolobe

راجع غاسترولوب .

٣٦٩٧ - بطورز* Dendrocygna (S).

Dendrocygne, Canard-oie (F). Dendrocygna (E).

جنس طير من كفيات القدم صفيحيات المناقير وفصيلة



بطورز



بطوس



بطونيكا طيبة



بطيخ

٣٧١٦ - بَعَاك ٥
Andromastie (F).
Andromasty (E).
البعاك صمور الغدد الثديية عند الإنسان والضرعية عند الحيوان .

٣٧١٧ - بُعَاق *
Nimbo-cumulus
سحاب ينهمر بشدة .

٣٧١٨ - بَعَامَة ، بَعِيمَة ، شِمَانْزِي

Anthropopithecus (S). Chimpanzé (F). Chimpanzee (E). Schimpanze (D).

البعامة ج بعام . جنس قروود كبيرة القند من فصيلة اشباه الانسان ومرتبعة القروديات . انواعه المعروفة خمسة . موطنها المناطق الافريقية الحارة والاستوائية . تألف الاحراج الكثيفة . قوتها الثمار والجلود وبعض الاعشاب . تعيش جماعات قليلة العدد || تعتبر من افهم القروود وأميزها موهبة وادراكاً . اعرف انواعه ما يلي .

٣٧١٩ - بَعَامَة شَائِعَة * ، أَوْرَان ، شِمَانْزِي شَائِع

Anthropopithecus troglodytes (S). Chimpanzé commun (F). Common chimpanzee (E).

نوع من البعام قامته تجاوز ١٥٠ سم . جسمه كثيف الشعر الاسود . موطنه البلاد الاستوائية الافريقية . يألف الاحراج الكثيفة . يتسلق الاشجار بخفة . قوته الثمار . له من القوة والعزم ما يخيف الفهد فيتحاشاه . يقبل التأديب لكنه سريع الغضب ولا يتحمل المضادة والاكرام .

٣٧٢٠ - بَعَامَة صِلْعَاء * ، شِمَانْزِي أَصْلَع

Anthropopithecus tschego (S). Chimpanzé tségo (F). Tschego chimpanzee (E).

نوع من البعام . قامته نحو ١٥٠ سم . رأسه أصلع . اذناه كبيرتان مبسوطتان . أنفه مفروطس ، شفاه غليظتان شارفتان || موطنه البلاد الاستوائية الافريقية . يألف الاحراج الكثيفة . قوته الثمار واللحوم || قوته تعادل قوة البعامة الشائعة . يقبل التأديب لكنه لا يتحمل المضادة .

٣٧٢١ - بَعَانِق

Harpies (F). Harpy (E).
جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات . انواعه قليلة جميعها كبيرة القند طولها نحو ١٠٠ سم . وهي قوية المنصر الاعقف البهرة المؤلفة الحادة . سواقطها قصيرة ، اذناها طويلة ومستديرة ، ارساغها غليظة ، مخالبها مستطيلة ، اظافرها كبيرة || اعرف انواعها واشهرها البعق .

٣٧٢٢ - بَعَث

Reviviscence (F).
Reviviscence (E).
البعث خاصة تتميز بها بعض الحيوانات الدنيا والنباتات التي يميتها ، ظاهرياً ، الجفاف . وتبعثها اي تحيها من جديد ، الرطوبة || الحيوانات الدنيا التي تتميز بهذه الخاصة كثيرة العدد اشهرها الثعبانيات اذ تستطيع البقاء في حالة الموت الظاهر نحو ١٤ سنة . ثم الدورات وغيرها وبعض النباتات .

٣٧٢٣ - بَعْر

Déjection (F). Dejection (E).
رجيع ذوات الخلف والظلف . الواحدة بعرة .
٣٧٢٤ - بَعْصُرَصَة

البعصوسة: دوية صغيرة بيضاء لها بريق (اللسان) .

المكسر ولونه ولون البزور وتوشيمها || والبطيخ من الثمار الغنية بالماء اذ تبلغ نسبته نحو ٩١ ٪ في حين انه يحوى ٨ ٪ فقط من المواد السكرية . وهو من الثمار المنعشة التي تروي الغليل وتدر البول وتفيد المصابين بالاسهال والبواسير .

٣٧٠٥ - بَطِيخ شَوْكِي

Méiocacte (F).
Melon-thistle (E).
اطلب مقلة القاضي .

٣٧٠٦ - بَطِيخِي ، قَرَعِي

Péponifère (F).
نمت يطلق على جميع النباتات التي تحمل ثماراً كثمار البطيخ .

٣١٤٠ - بَطِيخِيَّة

Pépon, Péponide (F). Pepo (E).
نعت تعريفي يطلق على الثمار القرعية الشكل من اي فصيلة كانت .

٣٧٠٨ - بَطِيْط

Crenidens
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة ٦ معظمها من اسماك البحر المتوسط والاحمر . جميعها مفلطحة الجسم طولها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم . وعرضها من ٨ الى ١٢ سم . || اشهر انواعه البطيط الفضي .

٣٧٠٩ - بَطِيْط فَضِّي * ، بُلَيْط

Crenidens Forskali (S). Crenidens argenté (F). Silvery crenidens (E).

سمكة صغيرة من البطيط طولها نحو ١٨ سم . وعرضها ١٠ تكثر في البحر الاحمر . ثوبها متداخل الالوان الزاهية . ظهرها الى الخضار الازرق . جانبها وبطنها الى الفضي المجزع بالاصفر . زعانفها متراكبة الالوان .

٣٧١٠ - بَطِيْن

Ventricule (F). Ventricle (E).

٣٧١١ - بَطِيْن

Botein
البطين منزل من منازل القمر الشامية . وهو بطن الحمل وصغير لان الحمل برج نجوم كثيرة . والبطين بطنه والثريا لميته . وهو يتألف من ثلاثة انجم صغار مستوية التثليث كانها اثاني . موقعه بين الشرطين والثريا || رقيب البطين يدعى الزبانا .

٣٧١٢ - بَطْنَاوَة

هنة ناتئة في اسفل طرف الحياء عند جميع المواشي .

٣٧١٣ - بَطْر ، كَيْسَنَة


Clitoris
هو لجام مدخل الزردان او حجابها وهو جزء من الفرج مركزه تحت الزرنية وداخلها .

٣٧١٤ - بَطْرِيَّة *

Clitoria (S).
Clitorie (F). Clitoria (E).
سميت كذلك لان زهرها يشبه البظر . جنس نباتات برية وتزيينية ، حولية ومعمرة من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعها نحو ٢٥ معظمها امريكي المنبت . منها العشبية والليفية والعرشة والمنتبسة . ازهارها كبيرة ، جميلة الشكل ، مختلفة الالوان فيها الابيض والازرق والارجواني والاحمر .

٣٧١٥ - بَطْرِيَّة تِرْنَات


Clitorie de Ternate (F). Blue-clitoria (E).
اطلب مازريون هندي .



بطيط فضي



بطرية



بداق



بعامة شائعة



بعامة صلعاء

نوع من البعوض كبيرة القد تحمل في صدرها بقتان كبيرتان قائمتان وعلى جناحيها بقع فاتحة زباء . وهي كثيرة الانتشار في البلاد الحارة اخصها مصر . لدغتها مؤلمة . تنقل الملاريا .

٣٧٢٣ - بَعُوضَة فِضِّيَّة * *Stegomyia fasciata* (S).

نوع من البعوض وهي صغيرة القد ، رمداء اللون مجزعة بالاصفر . حراشفها خلية فضية الموج . اعطائها البلاد الحارة يقال انها تنقل الحمى الصفراء .

٣٧٢٤ - بَعُوضَة مِصْرِيَّة * *Aedes aegypti* (S).

نوع من البعوض صغيرة الجسم سوداء اللون ، صدرها مجزع بالابيض . اعطائها البلاد الحارة يكثر وجودها في مصر . يقال انها تنقل بعض الحميات .

٣٧٢٥ - بَعُوضَة مُلَطَّخَة *Anopheles maculipennis* (S).

حشرة من فصيلة البعوضيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم . ثوبها الى السمرة الصفراء الموج . ووشاها ملطخان . زيان الذكر اصفر اللون . زيان الانثى اسمر . بطنها انبوبي الشكل . قوائمها دقيقة سمراء || تظهر الحشرة الجملاية من نيسان الى تشرين الثاني . تألف ضفاف المناقع ومجاري الماء والمسكن الريقية وزرائب الماشية || تلقي الانثى بكمها في المياه الضحلة وعلى الضفاف الرطبة . يرقاها دامة خاضلة .

٣٧٣٦ - بَعُوضَة مَنَزَلِيَّة * *Culex pipiens* (S).

نوع من البعوض صغيرة القد طولها من ٣ الى ٦ مم . جسمها وقوائمها الى السمرة . اجنحتها عديمة التبييض . الذكر منها يعيش نحو اربعة ايام . اما الانثى التي لا تعيش اكثر من شهر في الصيف فانها تقضي طوال مدة بياتها الشتوي ، من الحريف الى الربيع في الاماكن الرطبة المظلمة .

٣٧٣٧ - بَعُوضِيَّات *Culicidae* (S).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى عمارتين البعوض والدكسيد .

٣٧٣٨ - بَعِثْرَان *Santoline* (F).

راجع اخيليا منعشة .

٣٧٣٩ - بَعِير *Chameau adulte* (F).

البير : الجمل البازل او الجذع . ج ابيرة وبغزان .

٣٧٤٠ - بُغ *Chamelet, Chamelon* (F).

البغ هو الجمل الصغير والانثى بغة .

٣٧٤١ - بُغَاث *Catharte* (F).

جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريات . انواعه قليلة جميعها كبيرة الجثة ، صلعاء الرؤوس ، مستطيلة المناسر المنمقفة البهرة . ارساغها ومخالبها عارية . سواقطها كبيرة القد سمراء اللون || اشهر انواعه البناث الاسود والبغاث الرشيق .

٣٧٢٥ - بَعْفَة * ، هَامَة ، أُم الصَّخْر *Tyto alba, Scix flammea* (S).

Effraie commune. Ef. flambee (F). *Barn-owl, White-owl* (E).

طائر من البويات وعمار البعفيات . انواعه عديدة جميعها متوسطة القد طولها يراوح من ٢٢ الى ٣٨ سم . وبسطها من ٨٠ الى ٩٠ سم . اثوابها الى البياض الموشح والمنمش بالاسمر والاسود . مناسرها جالسة الانتشاب محجنة البرة . سواقطها مستطيلة ذرية . اذناها قصيرة وعريضة . ارساغها دقيقة كاسية . مخالبها قليلة الريش || اعطائها العالم وهي في شرقنا الاوسط من الطيور الآيدة تألف الحرايب والاطلال . تدن في الصدوع والاقواب . اناتها تضع نحو ٤ بيضات تحضنها بمنابرة الذكور نحو ٢٤ يوماً . وهي من الروامس تلتبس قوتها في الليل . تصيد الجرذ والفأر والفضال والزباب وجميع انواع الدويبات والحشرات .

٣٧٢٦ - بَعْفِيَّات *Strigens*

عمار من فصيلة البويات تشمل جنساً واحداً يدعى البعف .

٣٧٢٧ - بَعْل ، بَخْس ، عَذِي *Culture non irriguée* (F).

Dry farming (E).

الزراعات البعلية والعذية والبخسة هي التي لا تسقى غير المطر . والجمع يقال أعزاء وبخوس .

٣٧٢٨ - بَعْنَق * *Thrasaetus harpyia* (S).

Harpie féroce, Aigle destructeur (F). *Fierce Harpy* (E). طائر من البعائق شديد البأس والشكبة والنهم . ثوبه يشبه ثوب البوم . رأسه وعنقه الى الصهبة . صدره وزمكاه الى البياض . بطنه مستدير التوشيم . حدقة عينه الى الصفار الاحمر . منسره اسود اللون . ارساغه ومخالبه صفر . اظافره فحمية || يألف الاحراج والغابات القريبة من الماء . انشاء تدن في الاشجار الباسقة وترصع عشها بشئ الافنان والالياف وهي تضع من ٤ الى ٥ رفنات تحضنها وحدها || قوته جميع الحيوانات الفقيرة التي يستطيع اليها سبيلاً من السنجاب الى النرد والكلب والطائر الداجن .

٣٧٢٩ - بَعُوض ، بَرَعَش ، نَامُوس *Culicines* (F).

Culicinae (E).

عمار هوام من فصيلة البعوضيات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد . حشافية الجسم ، مستطيلة الخطم ، قوية المتك ، ريشية الزباني المركبة من ١٥ فاصلة عند الذكور و ١٤ فاصلة عند الاناث || ذكورها تعيش على رحيق الازهار والسوائل السكرية . اناتها تعيش من امتصاص الدم . وخزها مؤلم . وقد تنقل بعض انواع الحميات كالملاريا والحمى الصفراء وغيرها || اشهر انواعها البعوضة المنزلية .

٣٧٣٠ - بَعُوض مُؤَذَّر *Aedine*

جنس بعوض صغير القد طوله يراوح من ٦ الى ٨ مم . انواعه قليلة العدد اجسامها نحيلة . اثوابها مؤذرة ومجزعة . اشهر انواعها البعوضة الفضية .

٣٧٣١ - بَعُوضَة سَمْرَاء *Culex fatigans*

نوع من البعوض ، صغيرة القد سمراء اللون وحيدة الخط البطني الابيض او الاصفر . يقال انها تنقل مرض الضنك .

٣٧٣٢ - بَعُوضَة قَرَعُونِيَّة * *Anopheles Pharoensis* (S).


Anopheline des Pharaons (F).




بَعْفَة




بَعْل




بَعُوضَة فَرَعُونِيَّة



بَعُوضَة فَضِيَّة



بَعُوضَة مِصْرِيَّة



بَعُوضَة مَنَزَلِيَّة




بُغَاثُ أُسُود




بُغَاثُ رَشِيق



بُغَاثُ اَبْيَضُ الزُّور



بُغْل



بُغْنُوسُ بَاهِت



بُغْنُونِيَّةُ سَلَكِيَّة

٣٧٥٢ - بُغْنُونُوسُ بَاهِت *٥

Pogonus pallidipennis (S).

Pogone pâle (F). Pogonus pallidipennis (E).

حشرة قانصة من فصيلة الرئيطيات ورتبة غدييات الاجنحة . موطنها حوض البحر الابيض المتوسط . تألف الشطوط البحرية قوتها ما تيسر من الحشرات الدنيا والهوم والقشريات التي يلفظها البحر || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ٩ سم . رأسها اسود قصير الخطم . فكها ضليعان . زباناها دقيقان ، مستطيلان . عينها صغيرتان بارزتان . ظهرانها بني اللون ، نحاسي الموج ، مهتدير انطرف اللاحف . غمداها ثمانيتا التخديد القاطب . ارساغها خماسية العقول || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالنة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في النهار . تسافد في اواخر آب . تمتح الممكن على الرمل تحت ثغريات البحر وتحت الحجارة || البرقة عند باوغها الادراك التام تطول نحو ١٣ سم . جسمها اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الطحلة الكدرة السمره الموج . رأسها وشرجها الى السمره الكستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٠ يوماً ينقضي في نفق تحلده البرقة بين جذور النبات .

٣٧٥٣ - بُغْنُونِيَّات

Bignoniaceae (S).

Bignoniacées (F). Bignoniaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل البغنونية والجكرندة والتكوية والكتلية وغيرها . معظم نباتاتها اشجار وجنبات وبعض الاعشاب الليلية العارشة . اكثرها برية ومنها تزيينية جميلة الازهار الكبيرة القد الزاهية الالوان || اشهر انواعها التزيينية البغنونية السلكية .

٣٧٥٤ - بُغْنُونِيَّةُ سَلَكِيَّة *٥

Bignonia capreolata, B. crucigera (S). Bignone (F). Carolina trumpet-flower, Cross-vine (E). Kreuzranke, Kreuzwein, Trompetenblume (D). Bignonia aranciata, Tetrafilia (I).

جنبه معمرة من البغنونيات . مهدا المناطق الحارة الامريكية ساقها مالهة فرعاء . اوراقها متقابلة معنقة . نصلها اهليلجي الشكل ، جامد الصفحة بارز العروق . حوالقها دقيقة عصفية الشكل . ازهارها كبيرة القد ، طويلة الانبوب ، فارشة البتلات الخماسية التركيب || تزرع للتزيين . تتكاثر بالهندور والعقل .

٣٧٥٥ - بُغْنُونِيَّة

Bégonia (F). Begonia (E).

راجع بينونيه .

٣٧٥٦ - بُغْنُونِيَّات

Bégoniacées (F).

Begoniaceae (E).

راجع بينونيات .

٣٧٥٧ - بُغْيَبِيع

البغيبيع هو تيس الظباء السمين (الدميري) .

٣٧٥٨ - بِفَعْلُ الْقَانُون

Ipsa jure صيغة تستعمل للدلالة على حق يكتسب قانوناً بمجرد وقوع الحدث الذي انشاء .

٣٧٥٩ - بِفَعْلُ الْوَاقِع

Ipsa facto بمجرد الفعل . صيغة تستعمل للدلالة على تعديل يدخل حتماً لازماً على موقف قانوني بمجرد وقوع حدث معين دون ان يصدر حكم فيه .

٣٧٤٢ - بُغَاثُ أُسُود *٥

Catharista atrata (S).

Catharte noir, Urubu (F). Urubu atrata (E).

طائر من البغاث . طولهُ نحو ٦٥ سم . وبسطته ١٨٠ . ثوبه اسود اللون يعلوه موج اسفع . رأسه اصلع احمر . قلادة عنقه مرداء حراء . عينه زرقاء المقلّة ، قرمزية الحدقة . منسره مستطيل الشكل ، منعقف البهرة ، مرجاني اللون || موطنه الغابات والاحراج . يعيش قرب المدن البحرية . قوته الجيف الممتنة || يدثن عشه في الاشجار الباسقة وفي اوقاب الصخور وصدور الخرائب . انثاه تحضن رقتين نحو ٣٥ يوماً .

٣٧٤٣ - بُغَاثُ رَشِيق *٥

Catharista aura (S).

Catharte aura (F). Urubu aura (E).

طائر من البغاث طولهُ نحو ٦٠ سم . وبسطته ١٧٠ ، ثوبه الى السمره الخطية يعلوها موج ازرق . رأسه اصلع . قة رأسه بنفسجية اللون . جبهته ومحسره ومنسره حمر . عينه مستطيلة الجفن الاسود ، زرقاء المقلّة ، حمر الحدقة . رسفه ويخبله الى السمره الداكنة || موطنه العالم يكثر في البلاد الامريكية يألف الغابات والاحراج . يعيش قرب المدن والساكر . قوته الجيف الممتنة .

٣٧٤٤ - بُغَاثُ اَبْيَضُ الزُّور *٥

Pygarrhicus albogularis (S).

Pygarrhique à gorge blanche (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة العنثوليات . اعطانه البلاد الاستوائية . يألف الغابات والاحراج . قوته الحشرات ومكثها ويرقاتها || جسمه ربعة يطول نحو ١٥ سم . رأسه معتدل الجرم ، مستطيل المنقاد الخرزوي الشكل . عنقه شديد القصر . جناحاه قصيران . رفال ذنبه مدببة الاطراف الجامدة . ثوبه الى الشقحة . رأسه ومنكباه وقوادمه سود . زوره ابيض . بطنه منمش بالاسود . برائنه محجّنة قوية تمكته من تسلق امس الاشجار .

٣٧٤٥ - بُغَام

Averse (F). Downpour (E).

البهر هي الدفعة الشديدة من المطر .

٣٧٤٦ - بُغَر

Eaux souillées (F). Sluttish water (E).

البهر هو الماء المهيث تنفر عنه الماشية .

٣٧٤٨ - بُغْشَة

Ondée (F). Shower (E).

البغشة هي المطرة الضعيفة .

٣٧٤٩ - بُغْل *٥

Mulet (F). He-mule, Mule (E).

هو الهجين الناتج عن اتصال الخيل والحمير وهو غالباً ولد فرس زراً عليها حمار وقد يكون ولد اتان زراً عليها حصان || وكنية البغل : ابن ناهق ، ابو الاشجع ، ابو الحرون ، ابو الصقر ، ابو قضاة ، ابو قوص ، ابو كعب ، ابو مختار ، ابو ملعون .

٣٧٥٠ - بُغْل

Croiser (F). To cross (E).

قام بالتهجين او الاتصال .

٣٧٥١ - بُغْلَة

Mule (F). She-mule (E).

هي البغل الانثى ظاهراً .

٣٧٧١ - بقّة *Oréas, Taurotragus (F).*
Taurotragus oryx, Eland (E). راجع اروس .

٣٧٧٢ - بقّة *Boops (S). Bogue (F). Boöps (E).*
 الاسم العلمي من اليوناني بمعنى عين الثور . جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها متوسطة القد ، وحيدة الزعنفة الظهرية . عيونها كبيرة مستديرة || لحمها مأكولة ، جيدة الصنف او متوسطته || اشهر انواعها البقة المبدولة والبقة الفيدسية .

٣٧٧٣ - بقّة الزرع* ، سؤنه *Eurygaster integriceps (S).*
 حشرة مضرة من نصفيات الاجنحة وفصيلة الحماشيات . تسطو على سنابل الحنطة والشعير فتشقب الحب وتمتص عصارتها المائعة وتوقع به اشد الاذى . وهي بيضية الشكل ، مخروطية الرأس ، مفلطحة الجسم تطول من ٩ الى ١٢ مم . ثوبها اسمر اللون اصفر الموج يعلوه تمشيع عابق ونمشة بنية . حثار جسمها الظاهر مديج بالكستي .

٣٧٧٤ - بقّة الفراش* ، بنث الحصير *Acanthia lectularia, Cimex lectularius (S). Punaise du lit (F). Stinking bug (E).*
 حشرة من البقيات صغيرة القد ، بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم . تطول نحو ٥ مم . وتعرض نحو ٣ ، لونها اسمر احمر . تتركب الانسان في اثناء النوم وتمتص دمه || مهدها العالم . تكثر في الاماكن القذرة . تختبئ نهاراً وتخرج ليلاً ولها عند اللس رائحة كريهة مستهجنة مستقرة بعض الوقت .

٣٧٧٥ - بقّة اللبك* *Coccus lacca (S).*
 حشرة صغيرة القد سمر اللون من نصفيات الاجنحة . تتركب حبات البوتية فتوخزها وتحول عصارتها الصمغية المائعة الى لك غروي لزج يعتبر من اجود اصناف اللك .

٣٧٧٦ - بقّة المركب* *Naucoris (S). Naucore (F). Naucorid (E).*
 جنس حشرات مائية من نصفيات الاجنحة وفصيلة عقربيات الماء . اجسامها مبطولة ، صغيرة القد ، بيضية الشكل . قوتها الهوام .

٣٧٧٧ - بقّة النفل* ، سيرتيس *Syrts crassipes (S).*
 حشرة من البقيات صغيرة القد ، بيضية الشكل ، بنية اللون ، قصيرة الزباني ، سريعة الحركة || موطنها العالم . تتركب معظم انواع النفل وتؤذي .

٣٧٧٨ - بقّة غيدسية* ، صلبان *Boops salpa, Box salpa (S). Bogue-morue, Saupa, Salpa (F). Boöps salpa, Goldlin (E).*
 نوع من البقة . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق الاطلسي || جسمها اهليجي الشكل قريب الشبه بالفيدس ، يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . || ثوبها الى الطحلة الفضية يعلوها توشيع زيتي وتشيز ذهبي قاطب || لحمها مأكول ، متوسط الصنف في الربيع ، جيده في الخريف .

٣٧٦٠ - بق الحمام

Cimex columbarius, Acanthia columbaria (S). Punaise des pigeonniers (F). Bug of dove-cot (E).
 حشرة من البقيات بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم ، سمر اللون تطول نحو ٤ مم . وتعرض نحو ٢ يكثر وجودها في الابراج القذرة والماريد الخشبية . وهي تتركب الحمام وتمتص دمه .

٣٧٦١ - بقّ الخطمي *Phenacoccus hirsutus (S).*
 حشرة من رتبة نصفيات الاجنحة وفصيلة القرمزيات ، تتركب الخطمي وتوقع باوراقها بمض الاذى .

٣٧٦٢ - بقّ القصب الدقبي* *Pseudococcus sacchari (S).*
 حشرة من رتبة نصفيات الاجنحة وفصيلة القرمزيات ، تتركب قصب السكر فتوقع به بعض الاضرار .

٣٧٦٣ - بقّ الماء *Hydrocorises (S). Punaies d'eau (F).*
 حشرات مائية من مختلفات الاجنحة ، تكثر في المناطق المبيقة الغور وفي بعض البحيرات .

٣٧٦٤ - بقّار *Bouvier, Vacher (F). Cow-herd (E).*
 هو الذي يحرس البقر ويتمهدا . وهو ايضاً الراعي الذي يقودها الى المرعى ويحافظ عليها .

٣٧٦٥ - بقّار *le Bouvier (F).*
 البقّار كوكبة نجوم شمالية الموضع تدعى ايضاً عواء ، اطلبها .


٣٧٦٦ - بقّاط
 البقاط هو ثفل الهبيد اي الحنظل او حبه .

٣٧٦٧ - بقّاق* ، بقّانة *Bucco (S). Bucco, Barbus (F).*
 جنس طير متسلقة صياحة من فصيلة البقاقيات . موطنها احراج البلاد الاستوائية . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها واحجامها .

٣٧٦٨ - بقّاقيات *Bucconidae (S). Bucconidés (F). Bucconidae (E).*
 فصيلة طير من المتسلقات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها مثدونة الاجسام ، كبيرة الرؤوس والمناقير الجالسة ، مهدبة الشوارب ، زاهية الالوان الفاقمة المتباينة . اعطانها احراج البلاد الاستوائية . قوتها الحشرات .

٣٧٦٩ - بقّال *Marchand de légumes*
 هو يباع البقول .

٣٧٧٠ - بقّانة* *Pagamia (S). Pagamier, Pagamée (F).*
 شجيرة برية وزراعية تزيينية من فصيلة الفويات منبتها بعض المناطق الاستوائية الامريكية || ساقها فرعاء تملو نحو اربعة امتار . فروعها فرقة مألسة اللحاء لونها الى الدهسة . اوراقها اميدة متقابلة معتقة . نصالها اهليجية الشكل ، مدببة الاطراف . ازهارها سنبل التجميع ، محوري الاثكاز . ازهارها صغيرة رباعية البتلات السنائية المنبسطة ، صفراء اللون . ثمارها عتية نووية لونها الى الخضار الالمن .




بق الحمام بق القصب الدقبي




بقاق




بقّانة



بقّة الزرع بقّة الفراش




بقّة اللبك



بقّة المركب بقّة النفل



بقّة غيدسية



بُقَّة مَبْدُولَة



بَقْدُونَس



بَقْدُونَس بَرِي



بَقَر الحَرَاة



بَقَر القَصَابَة



بَقَرَة حَلُوب



بَقَس دَائِم الحَضْرَة



بَقْسَان

ضيقه الزعنفة الظهرية الجالسة ، فارقة الزعنفة الشرجية .
لحمها مأكول متوسط الصنف .

٣٧٨٩ - بَقَرَة بَنِي إِسْرَائِيل (F). Myrméléon (F).
هي لَبث عَفْرَيْن ، أَطْلَب . Myrmeleon, Ant lion (E).

٣٧٩٠ - بَقَرَة حَلُوب* ، بَقَرَة لَبُون

Vache laitière (F). Milking cow (E).
هي كَل بَقَرَة يَتَمَهَّدَا صَاحِبَهَا مِنْ أَجْلِ حَلَبِهَا . وَالْأَيْقَارُ
الْحَلُوبُ عَدِيدَةُ الشَّلَالَاتِ وَالْعُرُوقُ ، مَتَبَايِنَةُ الْمِيزَاتِ
وَالصِّفَاتِ وَالْأَشْكَالِ . وَقَانُونًا إِذَا بِيَعَتِ الْبَقَرَة الْحَلُوبُ
شَمِلَ الْبَيْعُ رَضِيعَهَا .

٣٧٩١ - بَقَرِيَّات (F). Bovid (E).
هي فَصِيلَةُ الْبَقَرِ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ اللَّبُونَةِ وَرَبَّةِ مَزْدُوجَاتِ
الْأَصَابِعِ الْمَخْتَرَاتِ . تُشْمَلُ الْبَقَرُ وَالْجَامُوسُ وَالدَّرْبَانِيَّةُ
وَالْبَيْسُونُ وَالْجَيْهَلُ . وَمِنْ الْعُلَمَاءِ مَنْ جَعَلَهَا تُشْمَلُ النَّمُ وَالظَّبْيَاءُ .

٣٧٩٢ - بَقَرِيَّة (F). Bovins
هي بِالْأَصْلِ كَلِمَةٌ مُرَادِفَةٌ لِبَقَرِيَّاتٍ وَلَكِنْهَا اسْتَعْمِلَتْ
لِلدَّلَاةِ عَلَى الْبَقَرِ وَالْجَامُوسِ دُونَ سَوَاهِمَا .

٣٧٩٣ - بَقْسُ ، تَشْمَشَاد (S). Buxus (S).
Buis (F). Box tree (E).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَعْمُورَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَقْسِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا عَدِيدَةٌ
مِنْهَا الْأَشْجَارُ وَالشَّجِيرَاتُ وَالْجَنْبَاتُ الْمَتَسَلِفَةُ . مَعْظَمُهَا بَرِي
وَبَعْضُهَا تَرْيِيئِي . أَوْرَاقُهَا صَغِيرَةٌ الْقَدِّ مُتَقَابِلَةٌ لَاطَلَّةٌ .
نَصَالُهَا أَهْلِيلَجِيَّةُ الشَّكْلِ قَصِيرَةُ الْأُذْيُنَاتِ الدَّقِيقَةِ . اخْشَابُهَا
شَدِيدَةُ الصَّلَابَةِ تَسْتَعْمَلُ فِي صِنَاعَةِ الْحَفَرِ وَالتَّنْزِيلِ || أَشْهُرُ
أَنْوَاعِ التَّرْيِيئِيَّةِ الْبَقْسِ الدَّائِمِ الْحَضْرَةِ .

٣٧٩٤ - بَقْسُ دَائِمِ الْحَضْرَةِ* ، تَشْمَشَادُ أَخْضَرِ ،
عَشَقْ ، تَشْمَشِير (S). Buxus sempervirens (S).
Buis toujours vert (F). Common box tree (E).
Echter buxbaum, Buchsbaum (D). Bosso, Auscio,
Martello, Bossolo (I).
هُوَ الْبَقْسُ التَّرْيِيئِي الشَّائِعُ الزَّرَاعَةُ حَتَّى يُمْكِنَ الْقَوْلُ أَنَّ
لَا حَدِيقَةً تَحْلُو مِنْهُ .

٣٧٩٥ - بَقْسَان* (S). Pachysandra (S).
Pachysandre (F). Pachysandra (E).
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ عَشْبِيَّةٍ مَعْمُورَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَقْسِيَّاتِ . سَوْقُهَا
نَحِيلَةٌ جَالِسَةٌ أَوْ مُسْتَلْقِيَّةٌ . أَوْرَاقُهَا أَبْيَدَةٌ ، مَعْنَقَةٌ . نَصَالُهَا
بَيْضِيَّةُ الشَّكْلِ . أَزْهَارُهَا سَنْبِلِي التَّجْمِيعِ . أَزْهَارُهَا وَحِيدَةٌ
الْمُسَكَّنُ ، الذَّكَرِيَّةُ رُبَاعِيَّةُ الْفَصْلِ وَالْأَسْدِيَّةُ ، الْأُنْثَوِيَّةُ ثَلَاثِيَّةُ
الْمِيَّاسِ الشَّخِينَةِ . كَمَا بَرَهَا ثَلَاثِيَّةُ الْأَعْبِيَةِ الْقَرْنِيَّةِ الشَّكْلِ ||
أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ قَلِيلَةٌ الْعَدَدُ ، أَشْهُرُهَا التَّالِيَةُ :

٣٧٩٦ - بَقْسَان طَرَفِي السَّابِل (S). Pachysandra terminalis (S).
Pachysandre à épis terminaux (F).
نَوْعٌ مِنَ الْبَقْسَانِ . سَاقُهُ مُنْتَصِبَةٌ تَعْلُو نَحْوَ ٣٠ سَم . أَوْرَاقُهُ
جُلْدِيَّةُ النَّصْلِ تَطُولُ نَحْوَ ٦ سَم . وَقَعْرُصُ نَحْوَ ٣ سَم .
أَزْهَارُهُ سَنْبِلِي التَّجْمِيعِ ، طَرَفِي الْأَرْتِكَازِ . أَزْهَارُهُ صَغِيرَةٌ
الْقَدِّ ، حُمْرَاءُ اللَّوْنِ ، خَافَتَةُ الْعُرْفِ || تَنْوِيرُهُ يَسْتَمِرُّ مِنْ
نَيْسَانَ إِلَى آيَارِ .

٣٧٧٩ - بُقَّة مَبْدُولَة*

Boops vulgaris, Box boops (S).
Bogue commun (F). Common Boöps (E).
نَوْعٌ مِنَ الْبُقَّةِ . سَمَكَةٌ بَحْرِيَّةٌ بَيَوضُ مَبْدُولَةٌ فِي الْبَحْرِ الْأَبْيَضِ
الْمَتَوَسِّطِ || جَسْمُهَا وَشَعْيُ الشَّكْلِ يَطُولُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٣٥ سَم .
ثَوْبُهَا مَتْرَاكِبُ الْأَطْحَلِ وَالزَّرِّي وَالْأَصْفَرُ . ظَهْرُهَا أَعْبَقُ
مِنْ جَانِبَيْهَا . سِجَانِبَاهَا مَشِيَّانُ بَعْشَرَةٍ خُطُوطُ قَاطِبَةٍ ذَهَبِيَّةِ
الْلَوْنِ . بَطْنُهَا قُضِي . زَعْنَفَتُهَا الظَّهْرِيَّةُ مُسْتَطِيلَةٌ أَمَّا الذَّيْلِيَّةُ
فَفَارِقَةٌ || لَحْمُهَا جَيِّدُ الصَّنْفِ ، مُرْغُوبٌ فِيهِ .

٣٧٨٠ - بَقْدُونَس* ، مَقْدُونَس ، كَرَفَس رُومِي
Petroselinum sativum, Carum petroselinum,
Apium petroselinum, A. vulgare (S). Persil, Persil
cultivé, Persil commun (F). Common garden
parsley (E). Gartenpetersilie, Petersille (D).
Petrosemolo, Prezemolo (I).

نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ بَقْلِيٌّ زُرَاعِيٌّ مِنْ فَصِيلَةِ الْخَيْمِيَّاتِ غَنِيٌّ جَدًّا
بِالْفَيْتَامِينَاتِ أَخْضَهَا الْفَيْتَامِينُ «ث» || يَتَكَثَّرُ بِالْبُزْرِ
يَنْمُو فِي جَمِيعِ الْأَتْرَابِ الزَّرَاعِيَّةِ أَمَّا يُفَضَّلُ الْحَوَارَةُ وَالْأَبَالِيَّةُ .

٣٧٨١ - بَقْدُونَس بَرِي* (S). Anthriscus sylvestris (S).
Anthriscue, Cerfeuil sauvage, C. des bois (F).
Wild chervil, Cow weed (E). Kalberkerbel,
Wildkerkerbel (D). Cerfoglio salvatico, Mirride
salvatica (I).

نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ بَرِيٌّ طَبِيٌّ يَنْتَسِي إِلَى الْفَصِيلَةِ الصَّبَوَانِيَّةِ .
أَوْرَاقُهُ وَأَزْهَارُهُ تَشَبُّهُ أَوْرَاقَ وَأَزْهَارَ الْبَقْدُونَسِ لَكِنْهَا أَصْفَرُ
قَدًّا . مَنَافِعُهُ الطَّيِّبَةُ بَهْمَةً . يُقَالُ أَنَّهُ يَفِيدُ الْمَعْدَةَ وَيَنْشِطُ
الْدَّمَ .

٣٧٨٢ - بَقْدُونَس جَبَلِي (F). Sélin (F). Milk parsley (E).
هو السَّالِينُومُ .

٣٧٨٣ - بَقْدُونَس كَاذِب (F). Aethuse, Ciguë des jardins (F). Fool's parsley (E).
هُوَ الشُّوْكَرَانُ الصَّغِيرُ ، أَطْلَبُ .

٣٧٨٤ - بَقَر (S). Bœufs (F). Beeves, Oxen (E).
هَمَارَةُ حَيَوَانَاتِ مَجْتَمِعَةٍ لَبُونَةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْبَقَرِيَّاتِ تُشْمَلُ
الْبَقَرُ الْإِهْلِي وَالْجَامُوسُ وَالْبَيْسُونُ وَالْجَيْهَلُ الْخ .

٣٧٨٥ - بَقَر الحَرَاة* ، عَوَامِل ، نَحَّة ، فُدُن
Bœufs de travail (F).
هِيَ الْبَقَرُ الْمُدَّةُ لِلْعَمَلِ . وَلَا يُقَالُ لِلوَاحِدِ فُدَانٌ لِأَنَّ الْفُدَانَ
هُمَا الثَّوْرَانِ اللَّذَانِ يَفْدَنُ عَلَيْهِمَا .

٣٧٨٦ - بَقَر القَصَابَة* ، بَقَر الدَّبْح (F). Bœufs de boucherie (F).
هِيَ الْبَقَرُ الْمَعْدَةُ لِلْمَسْلُخِ أَوْ بِالْآخَرِ لِلذَّبْحِ .

٣٧٨٧ - بَقَر أَهْلِي (S). Bos taurus (S).
Bœufs domestiques (F). Domestic oxen (E).
الْبَقَرُ الْإِهْلِي هُوَ جَنْسُ الْبَقَرِ الدَّاجِنِ الْمَعْرُوفِ . سَلَالَاتُهُ
وَعُرُوقُهُ كَثِيرَةٌ الْعَدَدُ لَا مِجَالَ لَذِكْرُهَا هُنَا . الذَّكَرُ يُدْعَى
ثَوْرًا وَالْأُنْثَى تُدْعَى بَقَرَةً .

٣٧٨٨ - بَقَرَة (S). Bagrus (F).
جَنْسُ أَسْمَاكَ نَهْرِيَّةٍ مِنَ السَّلُورِيَّاتِ تَعِيشُ فِي مِيَاهِ الْمَنَاطِقِ
الْحَارَةِ . أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ قَلِيلَةٌ ، أَشْهُرُهَا الْبِيَّاضُ وَالْبَقَاقُ .
جَمِيعُهَا مُتَوَسِّطَةُ الْقَدِّ ، وَشَعْيَةُ الشَّكْلِ ، رُبَاعِيَّةُ الْعَذَبَاتِ ،

من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وعرضها من ٤٥ الى ٦٠ سم. اما ارتفاعها فن ٣٠ الى ٣٥ سم. تدخل اليها من السطح الاسفل. وقد تبقى هذه الردهة نحو اربع سنوات اما العش فانها تجدد وتغير مكانه كل سنة. حضنتها من ٥ الى ٦ بيضات ترخها بمنابرة الذكر.

Cyclamen (F).

٣٨٠٧ - بَقْلَامُوس

اطلب سكه.

Motella (S).

٣٨٠٨ - بَقْلَة *

Motelle, Loche de mer (F). Rock-ling (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات. انواعه ستة اجسامها مستطيلة، حراشفها رقيقة ملسة، رؤوسها مقطوعة تتميز بمذباتها الفكية الارتكاز الثلاثية التجميع. تعيش في الاعماق الصخرية حيث يكثر الضريع. لحومها مأكولة مستحبة الطعم.

Légume (F). Végétale (E). ٣٨٠٩ - بَقْلَة، خُضْرَة

هي البقول والخضر والخضراوات وبكلمة اشمل جميع النباتات العشبية التي يغتذي الانسان بها او ببعض اجزائها.

Impératoire (F).

٣٨١٠ - بَقْلَة الامبراطور

Masterwort (E).

راجع بقلة الرئيس.

Agripaume (F).

٣٨١١ - بَقْلَة الأمهات

Common mother-wort (E).

راجع فراسيون القلب.

Chou (F). Cabbage (E).

٣٨١٢ - بَقْلَة الأنصار

هي الملفوف.

Collinsonia canadensis (S). ٣٨١٣ - بَقْلَة الأوجاع

Collinsonie, Collinsone de Canada (F). Rich-weed, Canadian horse-mint (E). Kanadische collinsonie (D). Collinsonia (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات، منبته كندا وبعض مناطق امريكا الشمالية، يقال ان صباد اوراقه يزيل الازجاع.

Grande chélidoine (F). ٣٨١٤ - بَقْلَة الخطاطيف

Greater celandine (E).

هي عروق الصباغين، اطلبها.

٣٨١٥ - بَقْلَة الرئيس *

Peucedanum ostruthium (S). Impératoire, Ostrute, Aneth fétide (F). Masterwort, Broad leaved hog's fennel (E). Echte melsterwurz (D). Imperatoria, Elafobosco vero, Erba rena (I).

نبات بري طبي من فصيلة الخيميات. جلوره مدرة للبول ومثارة طاردة للدود.

Varaire blanc (F).

٣٨١٦ - بَقْلَة الرواح

White heilabore (E).

نبات طبي جذموري يعرف بالحربوق الابيض، اطلبه.

Blechné spicant (F).

٣٨١٧ - بَقْلَة الطحال

Snake fern (E).

راجع بلكتوم.

Ptarmique (F).

٣٨١٨ - بَقْلَة العُطَّاس

Sneezewort (E).

راجع اخيليا.

٣٧٩٧ - بُقْسان مُسَطَّح

Pachysandra procumbens (S).

Pachysandre couché (F).

نوع من البقسان. ساقه مسطحة تطول نحو ٤٠ سم. اوراقه الى الخضار القائم. اعناقها تطول نحو ٥ سم. اما نصالها فتطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٦ سم. سابلها الزهرية مجورية الارتكاز. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون، عطرية العرف || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

Buxaceae (S). ٣٧٩٨ - بَقْسِيَّات، شَمَشَادِيَّات

Buxacées (F). Buxaceae (E).

هي الفصيلة البقسية او الشمشادية. اجناسها وانواعها عديدة معظمها اشجار وجنبات وبعضها بحلات واعشاب.

Emballage (F). Packing (E).

٣٧٩٩ - بَقْط

هو التعبئة، اطلبها.

٣٨٠٠ - بَقَع

مشروب كحولي يستخرج من التمر والمسل بعد تخميرها.

٣٨٠١ - بَقْعَة

المكان يستنقع فيه الماء. ج بقاع. والبقاع ضد المزارع.

Jonathan spot ٣٨٠٢ - بَقْعَة جُنْشَان

عارض يصيب ثمار تفاح جشنان رسائر التفاح الاحمر المتحلل من ذات الاصل او الذي يمت اليه بصلة || مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والقدر، تغلب فيها الاستدارة قطرها من ٢ الى ١٠ مم. تركب بشرة الثمار في اثناء تخزينها في البراد فتشوهها دون ان تعطب اللبالب || يقال انها عاهة وراثية يمكن اجتنابها بقطف الثمار عند بداية ادراكها وينقلها تولا الى البراد.

Crypsis schoenoides (S).

٣٨٠٣ - بَقَق *

Crypsis, Crypside (F). Crypsis grass (E). Dornen-grass (D). Crypside (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة النجيليات، منبته آسية الوسطى واروبة الشرقية. يكثر في الاراضي الرطبة ترعاه الماشية بشبهة.

٣٨٠٤ - بَقَل

عد النبات من البقل. قال ابن منظور: «واختلفوا في القفعاء فبعض يبقلها وبعض يحشها».

Tordyle officinal (F). ٣٨٠٥ - بَقَل الشَعَال

هو الشرعوب الخزني، اطلبه.

Picolaptus (S). Picolapte (F). ٣٨٠٦ - بَقْلَاط *

جنس طير من الجواثم سليات المناقير وفصيلة العشوليات. انواعه المعروفة قليلة المدد اعطائها بعض مناطق البلاد الاستوائية || تألف الغابات والحراج الكثيفة. ملجئها الحيائي زوجي. قوتها الحشرات ومكثها وديدانها || اجسامها رشقة، صغيرة القد. مناقبها مستطيلة، قليلة التعجين. اذنانها رتاجة الرفال المنهدلة الاطراف. ارساغها دقيقة مستطيلة. اناؤها كستنية اللون او الى الصخرة السمراء تعلوها قزاريق عمر وعطوط بيض || تدثن في الاشجار المتراكبة الفروع. عشها بحجم جوة الهند تقيمه في ردهة مؤلفة من سطحين من القصبان والالياف والاوراق طولها



بقق



بقلاط



بقلة



بقلة الرئيس



بقلة الغزال



بقلة حفاء



بقيم



بقنقومون



بقونية

- ٣٨٣٢ - بَقِيم Datura metel (F). Metel (E). هو جوز مائل ، اطلبه .
- ٣٨٣٣ - بَقِيم هندي Bois de sapan (F). راجع عندهم صَبَان . Sapan-wood tree (E).
- ٣٨٣٤ - بَقِيمَة البَقِيمَة طعم السمك يرمى لها في الماء الراكد فتسمن عليه .
- ٣٨٣٥ - بَقِنَقُومُون Succisa pratensis (S). Mors du diable (F). Devil's-bit scabious (E). Tenselsabbiss (D). Scabiosa (I). نبات عشبي بري معمر من فصيلة الدبسياسيات يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . يستخرج منه مواد طبية تستعمل في علاجات الامراض الجلدية منها السفلس .
- ٣٨٣٦ - بَقُوَّةُ الْقَانُون De plein droit (F). صيغة يراد بها ان الاثر القانوني لا يحدث بمقتضى فعل الارادة او القيام باجراء خاص بل بمجرد قوة القانون نفسه . كالارث مثلاً . فالتركة تقول الى الوارث بقوة القانون .
- ٣٨٣٧ - بَقُول Légumes (F). Vegetables (E). كلمة شاملة تعني جميع النباتات العشبية المأكولة وان قصد بها التعريف او بالاحرى التحديد فتستعمل كما يلي :
بقول بصلية : البصل والكراث والثوم .
بقول ثمرية : الخيار والقرع والارضي شوكة .
بقول جذرية : الجزر والملفت والشوندر .
بقول حببية : الفول والفاصوليا والحمص .
بقول ناشفة ، قيم : البابايا واشباهها .
بقول ورقية ، احرار البقول : الخس والهندباء والجرجير ...
- ٣٨٣٨ - بَقُولِيَّة Bocconia (S). Bocconie (F). Plume poppy (E). Federmohn (D). Bocconia (I). بحلة تزيينية من البقوليات . ساقها فرعاء منتصبه اوراقها متعاقبة كبيرة القذ مشرمة الاطراف . ازهارها طرفية عادية البتلات . نقيعها ماسط وطارد للدود .
- ٣٨٣٩ - بَقُولِيَّات Bocconlées (F). Bocconlae (E). سبط من فصيلة الحشخاشيات . ازهاره عديدة البتلات . انواعه عديدة منبتها البلاد الامريكية جميعها بحلات واعشاب ليفية فرعاء يستخرج منها مادة صمغية صفراء اللون او حمراء تحوي بعض الخواص الطبية الجليلة النفع .
- ٣٨٤٠ - بَقُولِيَّة Barge (F). راجع بوقيقة
- ٣٨٤١ - بَقِيلَات Acanthiadae, Cimicidae (S). Acanthiadés, Cimicidés (F). Acanthiadae, Cimicidae (E). فصيلة حشرات من نصفيات الجناح اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها صغيرة القذ ، بيضية الشكل ، مفلطحة الجسم ، اثرية الاجنحة ، عادمة الوينيات ، دقيقة الزباني الرباعية الفواصل . منها انواع تتركب النبات فتؤذي بعضها يتطفل على الحيوان والطير .
- ٣٨٤٢ - بَقِيل Rosage d'Orient (F). Pontic rhododendron (E). هو عصلة الشرق جنبه تزيينية ، اطلبها .

- ٣٨١٩ - بَقْلَةُ الْعَوْفِ Pouliot de Crète (F). راجع طوقريون اكريني . Cretan germander (E).
- ٣٨٢٠ - بَقْلَةُ الْغَزَال * ، ريحان الارض Origanum dictamnus (S). Dictame de Crète (F). Dittamy of Crete (E). Kretischer diptam, Diptam-dosten (D). Dittamo di Creta, Origano di Creta (I). نبات عطري طبي من فصيلة الشفويات . وهو عشبة حزمية معمرة . اوراقها زغبية النصل ، ازهارها صغيرة ارجوانية فواحة العرف المستحب ، مرة المذاق || يستعمل في بعض المستحضرات الطبية اخصها علاجات القلب .
- ٣٨٢١ - بَقْلَةُ اللَّبَن Gailliet (F). راجع غالليون حقيقي . Cheese rennet (E).
- ٣٨٢٢ - بَقْلَةُ الْمُلُوك Fumeterre officinale (F). راجع شاهترج مخزني . Fumitory (E).
- ٣٨٢٣ - بَقْلَةُ الْهَرَب Valériane officinale (F). اطلب ناردين مخزني . Cat's valerian (E).
- ٣٨٢٤ - بَقْلَةُ حَامِضَة Oxalide (F). راجع حماض العيد . Wood-sorrel (E).
- ٣٨٢٥ - بَقْلَةُ حَفَاء * ، بَقْلَةُ زَهْرَاء ، رِجْلَة ، قَرْفَحِين Portulaca oleracea (S). Pourpier, P. potager, P. cultivé (F). Purslane, Garden purslain (E). Gartenportulak (D). Portulaca, Poracchia, Peplo (I). بقلة عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة الرجليات . تنبت تلقائياً في اكثر الاراضي المروية . سوقها واوراقها لحمية النسيج ، غزيرة العصارة ، قليلة الحبوضة ، مستحبة الطعم . كثرتها تسهل المعدة . تتكاثر بالبذر .
- ٣٨٢٦ - بَقْلَةُ عَرَبِيَّة Amarante blette (F). راجع قطيفة يانعة . Wild amaranth (E).
- ٣٨٢٧ - بَقْلَةُ مَبَارَكَة Chicorée (F). هي الهندباء . Succory (E).
- ٣٨٢٨ - بَقْلَةُ يَهُودِيَّة Laiteron commun (F). راجع تغاف معروف . Milk thistle (E).
- ٣٨٢٩ - بَقْلِي Oléracé (F). Vegetable (E). نعت تعريف يطلق على كل نبات عشبي مأكول .
- ٣٨٣٠ - بَقْلِين Légumine (F). Legumin (E). مادة ازوتية تكون في بزور القطنيات .
- ٣٨٣١ - بَقِيم * ، بَقِيم أَسْوَد Haematoxylon campechianum (S). Campêche, Hematoxyle (F). Campeachy wood, Log wood (E). Campechebaum, Campecheholz (D). Campeggio, Legno di campeche (I). شجرة حرجية وصناعية من فصيلة القرنيات ، تملو نحو ١٢ م . منبتها البلاد الحارة . يستخرج من انابجها الوعائية الحشبية مادة صباغية بنية ذات شأن تدعى إمامتين او إمانكسين Hématéine ou Hématoxyline .

٣٨٥٢ - **بَكْتِيرِيُولُوجِيَا ، بَكْتِيرِيُولُوجِيَا ،**
Bactériologie (F). **بَكْتِيرِيُولُوجِيَا**
Bacteriology (E).
هو علم الميكروبات او علم الراجيات .

٣٨٥٣ - **بَكْتِيرِيَّة**
Bactérie (F). Bacterium (E).
كائنة مجهرية تكاد تكون غير منظورة ، اشكالها عديدة منها الكروي والهلالي والقضيبي ... توجد في الهواء والماء . تخشى الحرارة القوية التي تدمتها ولا يفسدها البرد والجليد . منها نافعة ذات قيمة حيوية واقتصادية ومنها ضارة مؤذية وميتة .

٣٨٥٤ - **بَكْتِيرِيَّة الْأَزُوت ، أَزُوتُوبَكْتِير**
Azotobacter
درينات في جذور معظم النباتات القرنية تثبت وتدخر ازوت الهواء . وهذا مما يجعلها من النباتات المصلحة والمفيدة فيا لو طمرت في التربة عند الادراك وقبل الهيج .

٣٨٥٥ - **بَكْتِيرِيَّة النَّتْرِجَّة ، نَيْتْرُوبَكْتِير**
Nitrobacterie (F). Nitrobacter, Nitrifying bacteria (E).
هي البكتيرية التي تسبب وتثير النتجة .
٣٨٥٦ - **بَكْتِيرِيُوم**
Bacterium
جنس بكتيريات من فصيلة القضيبيات . انواعه عديدة معظمها عديم الحركة ، دقيق الجسم ، اسطواني الشكل ، مالمس الصفحة او مخدد ، يطول من ٥.٠ الى ١٥.٠ مي . اشهر انواعه واضرها بكتيريوم البطاطا والتبغ والتبيل والدوسر .

٣٨٥٧ - **بَكْتِيرِيُوم الْبَطَاطَا**
Bac. solanacearum (S).
وصم يصيب النباتات الناشئة والبالغة فييلور السوق ويؤذيها ويوقف النمو بعد ان يعطب الاوراق . اما الدرنات فيعطونها بحلقة كستنية اللون تظهر عند القطع والتأكسد .

٣٨٥٨ - **بَكْتِيرِيُوم التَّبَغ**
Bac. tabacum (S).
وصم فتاك يصيب التبغ فيوشم اوراقه بنكات صغيرة سمراء اللون ثم غبراء نيفضاء تميت الخلايا وتقضي على النسيج .

٣٨٥٩ - **بَكْتِيرِيُوم الثَّيْل**
Bac. Rathayi (S).
وصم يصيب الثيل في قصبه وعصفه وازهاره .

٣٨٦٠ - **بَكْتِيرِيُوم الدُّوسِر**
Bac. monilliformans (S).
وصم يصيب جذور الدوسر فيؤذيها ويؤخر نمو النبات ان لم يشله .

٣٨٦١ - **بَكِين**
Pectine, Matière pectique (F).
Pectin, Material pectic (E).
مادة هلامية التركيب تشبه الصمغ الشفاف توجد في الثمار .

٣٨٦٢ - **بَكْر**
البكر شجر يشبه البشام لكنه اطول ورقاً واكبر حجاً يستاك باغصانه (اللسان) .

٣٨٦٣ - **بَكْرَة ***
Poulie (F). Pulley (E).
طارة صغيرة من خشب او حديد فارقة الاطار تحضن الحبل الذي يمر عليها عند رفع الاثقال .

٣٨٦٤ - **بَكْس**
Box
هي شقة الفرس اي مكانه المحتجز في الاصطبل .

٣٨٤٣ - **بَكَ**
Copulation des Insectes (F).
Insect copulation (E).
البك هو سفاد الحشرات . بك وباك : سفد .

٣٨٤٤ - **بَكَاة**
تَبَات كالجرجير (اللسان) ج بكاء وبكا .

٣٨٤٥ - **بَكَاة**
قال ابو حنيفة البكاة مثل البشامة لا فرق بينهما الا عند العالم بهما . وهما كثيراً ما يثبتان معاً واذا قطعت البكاة هريقت لبناً ابيض . ج بكى .

٣٨٤٦ - **بَكَاَرَة**
Forcerie (F). Fording-house (E).
هي دفيئة البواكير : بناء زجاجي او نصف زجاجي يشبه المصري ، تجوز تدفئته ، يستعمل لزراعة مختلف انواع البواكير الشمرية والبقلية والزهرية .

٣٨٤٧ - **بَكَّاسِين**
Bécassine (F). Snipe (E).
راجع شكب .

٣٨٤٨ - **بَكْبَاسَة الْعَرَعَر * ، بَخْفَة الْعَرَعَر**
Pachyposa lineosa (S). Pachypose linéaire, Bombyx des genévriers (F). Pachyposa lineosa (E).
حشرة من فصيلة البقفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المعتدلة الحرارة من حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها عجفة تعيش على مخزونها الامعالي . سرقها خاضلة قوتها اوراق العرعر والسرو || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٠ مم . بسطها تراوح من ٤٠ الى ٤٤ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها صغيرتان ماسحتان . زباناها مشطيان . جوشنها ويطنها الى الطحلة يعلوها . واج اكلف واسمر || رواشنها الى الطحلة يعلوها في الزوج الامامي تشيح اسمر يمتد من القاعدة الى الاطراف . ويعملوها في الزوج الخلفي مواج اكلف . حناها الخارجي منقط بالاسمر . اهدابها الى الشققة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في حزيران ، وتظهر فراشة الجيل الثاني في ايلول . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتمتدح المكن لطفاً على الصفحات السفلى من نصال اوراق العرعر او على افنان الثريين والسرو || السرقة عند الادراك التام تقطول نحو ٤٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الطحلة يعلوها اسمر وخط عريض من الهلب الاربد يمتد من الرأس الى الشرج وخطان جانبيان ازرقان . رأسها الى الزرقاء السوداء المواج . حيدها احمر . مدتها ورواجها سمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحببها السرقة بين الاوراق والافنان .


٣٨٤٩ - **بَكْتَاز**
Pectase
خبرة تحول البكتين الى حامض بكتيني .

٣٨٥٠ - **بَكْتِيرِيُولِيْت ***
Bactériolyte (F).
Bacteriolylt (E).
البكتريوليت عنصر يسبب ليز البكتريات اي انحلالها .

٣٨٥١ - **بَكْتِيرِيَّات**
Bactéries (F). Bacteria (E).
شعبة من المشرقيات تشمل اربع فصائل وهي الصمغيات والقضيبيات والكرويات والهيمنيات .



بكباسة العرعر



بكرة

٣٨٧٤ - بَكُورَة شَالِيعَة Pélamyde

سمكة بحرية تدعى بلميده شائعة ، اطلبها .

٣٨٧٥ - بَكِيرَة Génisse (F). Helfer (E).

الانثى من اولاد البفر قبل ان تسفد .

٣٨٧٦ - بَكِيم Aglossa (F).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان عادم اللسان خلقة .

٣٨٧٧ - بَلْ Bel indien (F). Bael tree (E).

راجع ايكل .

٣٨٧٨ - بِلَاتِيلُوبُوم ، عَرِيضَة السَّنْفَة

Platilobium (S). Platilobe (F).

جنس نباتات جنبية تزيينية من فصيلة القرنيات الفراشية اوراقها مركبة متقابلة . ازهارها ثنائية ار ثلاثية التجميع مستطيلة المعالين . ثمارها سنفية مستعرضة الصفحة . تتكاثر بالبزر لكنها تحشى البرد القارس .

٣٨٧٩ - بِلَاتِين ، ذَهَبْ أَيْضْ Platine (F).

Platinum (E).

معدن نفيس فضي اللون رمزه (بـ) ثقله النوعي ٢١,٤ وزنه الاتومي ١٩٥,٢٣ ينصهر في ١٧٥٥ درجة سخ . وهو شديد الصلابة ، جيد الدانة . لا يتأثر بالهواء ولا يتفاعل بالحوامض .

٣٨٨٠ - بِلَاتِن Eau stagnante (F).

Stagnant water (E). البلاتن هي المياه المستنقعة .

٣٨٨١ - بِلَادُفُوم Bladafum

حاشور زراعي شديد الفاعلية يرتكز على مادة « استر تيوسفوريك » . يستعمل في تدخين المصارى للقضاء على الارق والتترانيك والمناكب الحمر والتريس والصيدن . وهو يستعمل في المفاطر للقضاء على الذباب والكهدليات . العلبة العادية تحوي ١٠ غرامات من المادة الفعالة وتكفي لتدخين ما يراوح حجمه من ٢٥٠ الى ٣٠٠ م ٣ . اما الثمار والبقول المدخونة فيمكن استعمالها بعد مضي يومين .

٣٨٨٢ - بِلَادُون* ، سَيْت الْحُسْن

Atropa belladonna (S). Atrope, Belladone, Morelle furieuse, Bouton noir (F). Deadly nightshade, Dwale, Banewort (E). Echte tollkirsche, Wollskirche (D). Belladonna, Atropa, Solano maggiore (I).

جنبية طبية برية معمرة من فصيلة الباذنجانيات . منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . تكثر في الاماكن الرطبة الظليلة . تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . جذورها غليظة لحمية . ساقها قوية منتصبه ، فروعها زياء الحاء . اوراقها اهليلجية منعقة شمعجة النصل الشديد الخضار . ازهارها ابوية وتاجية الارتكاز ، خاسية التركيب ، كبيرة البتلات الوردية اللون الموشحة بالاصفر || ثمارها عنبية تبدو حمراء اللون ثم تنحرف نحو الاسود اللامع . لها خمرى ، حلو المذاق ، نافذ السم || اوراقها وازهارها وثمارها وجذورها سامة تؤذي الانسان والحيوان || يستخرج منها جوهر فعال يدعى الاتروبين وهو مادة قلوية سامة تستعمل في الطب .

٣٨٦٥ - بِكْسَا* ، بِيكْسَة ، شَجَرَة الصَبِغ الْاِنَانُو

Bixa orellana (S). Bixa, Bixe, Rocouyer des Indes (F). Annatto dye plant, Arnotta tree, Arnatto (E). Orleanbaum (D). Rucu, Orellana, Orleana (I).

جنبية برية من فصيلة البكاسيات . اوراقها متعاقبة ، منعقة طويلة الزناد ، قلبية النصل الفارش . ازهارها عنقودي التجميع ، هرمي الشكل ، هامي الارتكاز . ازهارها صفراء اللون ، خاسية البتلات ، عديدة الاسدية . ثمارها ثنوية زياء الغلاف يستخرج منها مادة صباغية حمراء اللون لها استعمالها الصناعي وقد توقي من لدغ البعوض وتلدغ الزحار .

٣٨٦٦ - بِيكْسَاسِيَّات Bixaceae (S).

Bixacées, Bixinées (F). Bixaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . انواعها نحو ٤٥٠ واجناسها ٤٠ جميعها اشجار وجنبات حرجية وتزيينية منبتها الاقاليم الحارة والمعتدلة .

٣٨٦٧ - بَكْف* ، نُوفَة ، حَبَّة الْقَلْب ،

قَوَالِيْس ، ظَرْوْ أَسْوَد

Cardiospermum halicacabum (S). Cardiosperme, Pois de merveille, Pois de cœur, Cœur des Indes (F). Balloon-vine, Heart-pea, Love In a puff (E). Blase nerbe, Echter herzame, Luftballonpflanze (D). Cuore dell'Indie, Domenican, Vescicaria del cuore (I).

نبات بري وتزييني من فصيلة الصابونيات . اعطانه البلاد الحارة . ساقه ليفية عارشة . اوراقه متعاقبة مركبة وريية التجميع . حوالقه تتقدم الازهار . ازهاره عنقودية ابوية ، مستطيلة المعالين ، بيضاء اللون . ثماره حويصلية الشكل تغلف البزور المستديرة المحسية الحجم . بزورها شديدة الصلابة ، سود القشرة ، بيض النقيير . تستعمل في صناعة القلائد ولها بعض الخواص الطبية .

٣٨٦٨ - بَكَلِيْت Bakélite (F). Bakelite (E).

مادة شائعة الاستعمال الصناعي ، معقودة التعريف على اسم الدكتور « بكلند » . وهي علوك تركيبي يحصل من تكثيف الالدهيد النمل مع الفينول .

٣٨٦٩ - بُكْهَانِيَّات Aglosses (F). Aglossas (E).

مرتبة من رتبة البثر تشمل فصيلة واحدة تدعى بيبانيات اجناسها وانواعها قليلة العدد تتميز باتعدام اللسان .

٣٨٧٠ - بَكْنُودَة Pachnode bandée (F).

راجع جبل الدرائن .

٣٨٧١ - بَكْنِيد Pycnide (F). Pycnidia (E).

راجع بوع مغلف .

٣٨٧٢ - بَكُور ، بَكِير ، مَبْكَار ، مَعْجَال

Précoce, Hâtif (F). Precocious, Early (E).

هي صفة النبات الذي يسرع في نموه وادراكه .

٣٨٧٣ - بَكُورَة ، بَكْمِينْدَة Palamys (S).

Pélamide, Pélamyde (F). Palamys, Palamida (E).

سمكة بحرية من فصيلة الاسقمريات قريبة الشبه من التون لكنها انشط حنكا واكبر سنا ثوبها الى الزرقة اللامعة يعقب مع اقترابه من ثيج الظهر حيث يعلوه تجزيع معترض اسمر .



بكسا



بكت



بلادون

٣٨٩٢ - **بلاكروت** Black-rot, Pourriture noire
اسم شامل لعدة اوصام فطرية مظهرها الخارجي عفن ندي
الوئل اسود اللون .

٣٨٩٣ - **بلاك** Poterium (S).
Pimprenelle (F). Poterium (E).
جنس نباتات عشبية ونجمية معمرة من البلانيات وفصيلة
الورديات . انواعه نحو ٢٠ تكثر في البور وفي الاراضي
المذحاة . جميعها علفية نافعة ومنها الصحية والطبية العديدة
الفوائد . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها وترية التجميع
منشاربة الحافة . ازهارها ضمية النورة طرفية الارتكاز .
اشهر انواعه البلان الثولوي (P. verrucosum) والشوكي
(P. spinosum) والحجام (P. sanguisorba) والخزني
(P. officinalis) والمندج (P. compactum) والوبري
(P. villosum) .

٣٨٩٤ - **بلاك افريقي** Pimprenelle d'Afrique (F).
Melianthus (E).
هو العسلية اطلبها .

٣٨٩٥ - **بلاك شوكي** Poterium spinosum (S).
Pimprenelle piquante (F).
نوع من البلان يكثر في البراري المذحاة وهو نجمة شائكة
قرصية الشكل مشتبكة الفروع ، متشعبة الشوك اوراقها
مركبة متعاقبة . وريقاتها وترية بيضية النصل المسنن
الحافة . ازهارها طرفية وردية اللون .

٣٨٩٦ - **بلاك محجام ، كزبرة الثعلب**
Poterium sanguisorba (S). Pimprenelle sanguisorbe,
P. petite (F). Burnet (E). Pimprenelle (D). Burnet,
Pimpinella sorbastrelia, P. minor (I).
نوع من البلان العشبي البري يكثر بين الزرع وفي البور .
اوراقه صحية نافعة مستحبة الطعم المر .

٣٨٩٧ - **بلاك مخزني** Poterium officinalis, Sanguisorba officinalis (S).
Pimprenelle grande, Sanguisorba officinale (F).
Great burnet (E). Grosser weissenknopf (D). Pim-
pinella comune, Meloncello (I).
نوع من البلان العشبي البري يألف المناطق والاراضي الرطبة .
اوراقه وازهاره وجذوره طيبة ، نافعة ، منشطة وتدر البول .
وهو من النباتات الصبغية الشائعة الاستعمال الصناعي
مزيجها مع املاح الحديد يعطي الصبغات السود ومزيجها
مع الشب يعطي الصباغ الاخضر .

٣٨٩٨ - **بلاقيات** Poteriales (F). Poteriales (E).
سبط من فصيلة الورديات اجناسه وانواعه عديدة جميعها
معمرة معظمها بري وبعضها تزييني . ثمارها فقيرة يابسة
وطليقة .

٣٨٩٩ - **بلانيير** Planera (S). Planère (F).
Planer tree (E). Wasserulme (D). Planera (I).
جنس اشجار وجنابات من البوقيصيات . اوراقها متعاقبة
بيضية النصل . ازهارها خنثوية . ثمارها جناحية جدعة
الجناح . اشهر انواعها ما يلي :

٣٩٠٠ - **بلانيير مفرضة**
Planère crénelée, Orme de Sibérie (F).
شجرة كبيرة القد تعلو نحو ٢٥ م . خشبها صناعي شائع
الاستعمال لا تقربه حشرات ولا ينخره سوس .

٣٨٨٣ - **بلاديوم** Palladium
معدن ابيض يستخرج عادة مع البلاتين او من بعض
مناجم الذهب . ثقله النوعي يراوح من ١١ الى ١٢
وزنه الاتومي ١٠٦ ينصهر في ١٥٠٠ درجة سخ . وهو
شديد الصلابة لا يتأثر بالهواء والماء ولا يتفاعل بالحوامض .
يتميز بقوة امتصاصه الهيدروجين وبامتزاجه مع بعض
المعادن التي يقويها ويمنع فسادها . يستعمل في صناعة
الادوات الدقيقة الثمينة .

٣٨٨٤ - **بلاذر ، أنقردية** Anacardium (S).
Anacardier, Anacarde (F). Anacardium (E).
جنس اشجار وجنابات من فصيلة البطليات . مهدا المناطق
الاستوائية الاسيوية والامريكية . اوراقها متعاقبة ، معنقة ،
كاملة ، بسيطة . ازهارها عنقودية التجميع تاجية الارتكاز .
ثمارها قلبية الشكل لحمية السودق مأكولة . يستخلص من
بذورها مادة قلوية تستأصل النحول والقوبة . ويستخرج
من سوقها عصارة صمغية تدعى صمغ البلاذر او صمغ
الأكاجو || اشهر انواعه الشرقي والغربي .

٣٨٨٥ - **بلاذر شرقي ، بلاذر شرقي**
Anacardium officinarum, Semecarpus anacardium
(S). Anacardier oriental, Noix de marais (F). Ana-
cardium, Marsh nut, Marking nut tree (E). Tinten-
baum (D). Semecarpo d'Oriente (I).
نوع من البلاذر الصناعي والتزييني . ثمرته متوسطة القد
ثمره مأكولة . يستخلص من بذور ثماره بعض المواد الطبية
الجلدية . اخشابها صناعية جيدة الصنف .

٣٨٨٦ - **بلاذر غربي ، أكاجو**
Anacardium occidentale (S). Anacardier occidental,
Acajou, Noyer d'acajou, Pomme d'acajou (F). Cas-
hew-nut tree, Bean of Malacca (E). Nierenbaum,
Acajoubaum (D). Anacardo, Acajou (I).
نوع من البلاذر شجرته كبيرة القد . ثماره مأكولة يستخلص
من عصارته بعد تحميرها وتقطيرها مشروب كحولي مستحب
الطعم . ويستخرج من لحاء سوقه مادة صمغية شائعة
الاستعمال . خشبه ناعم الرقة فاخر الصنف ثمين القيمة .

٣٨٨٧ - **بلاذريات ، بلاذريات** Sémecarpées (F).
Semecarpa (E).
سبط من الفصيلة البطمية اشهر اجناسه البلاذر .

٣٨٨٨ - **بلارج ، بلكرج** Cigogne blanche (F).
White stork (E).
طائر كبير الجثة طويل المنقار مستقيم يعرف بالقلق
الابيض ، اطلبه .

٣٨٨٩ - **بلاستودرمة** Blastoderme (F).
Blastoderm (E).
البلاستودرمة غشاء مركزة في البيضة تحت الندية . وهو
مؤلف من طريستين ، الاولى تتحول الى جلد والثانية الى
معي الملقوحة .

٣٨٩٠ - **بلاسمه** Plasma
هي الاثلة .

٣٨٩١ - **بلاسمه حيوانية** Zooplasma (F).
Zooplasma (E).
مادة هيولية تحضن نواة الحبيرة عند الحيوان .



بلاذر غربي



بلاذر شوكي



بلاذر مخزني

٣٩١٧ - بُلَّتْ Gypaète (F). Gypaetus (E).

هو البلح ، اطلبه .

٣٩١٨ - بُلَّة

البلة هي واحدة البيل وهو نور الغضاء . والبيل ايضاً هو الزغب الذي يكون بعد النور .

٣٩١٩ - بُلَّة البلة هي بقية الكلا .

٣٩٢٠ - بُلْتُون Pluton (F). Pluto (E).

كوكب سيار معروف ايضاً باسم أفلوطن . اطلبه .

٣٩٢١ - بُلْتُونِي Boltonie (F). False camomile (E).

راجع بابونج كاذب .

٣٩٢٢ - بُلْتَجَم Bander (F). To bind or tie up (E).

بلجم الدابة : عصب قوائمها من داء يصيبها .

٣٩٢٣ - بُلْتَج * ، بُلَّتْ ، كاسير العظم

Gypaetus barbatus (S). Gypaète, G. barbu (F). Gypaetus (E).

طائر من الكواسر وحيد الفصيلة والجنس والنوع . موطنه الجبال الشاخنة من الحبشة الى الهند فالشرق الاوسط فأوروبا . وهو كبير الجثة طوله نحو ١٤٥ سم . ويسطته نحو ٣٠٠ سم . رأسه مستطيل الشكل ابيض الجبهة . عينه صغيرة القد ، حمراء المقلة ، صفراء الحذقة ، يحوقها اطار اسود عريض الخط يقطب المحسر من الشدق الى قمة الرأس . منسره اسمر اللون احجن البهرة الشديدة الانعقاد . ارساغه كاسية قصيرة وغليلة . مخالبه قوية . وهو اسمر الظهر والسقطين والذنب ، اغبر الجؤجؤ والبطن اما رقشة ثوبه تختلف مع العمر || يلتبس قوته في رائحة النهار . يصيد الجداء والارانب وكل حيوان يدب ولا يعف عن الجيف وقد يحمل عظم الفخذ من الثور والبمير او كل عظم فيه مع حتى اذا كان في كبد السماء ارسله على صخرة فيتكسر فهبط فيأكل مخه || يدس عشه في قم الجبال النائية . قطر وكنه لا يقل عن ١٥٠ سم . وعرضه نحو ٦٠ سم . الذكر يكوم انشاء في الربيع فتبيض رفتهين تحضنها وحدها نحو ٤٠ يوماً || وهو من الكواسر التي تدجن بسهولة وتأنس البشر وتألف الطير .

٣٩٢٤ - بُلْتَج Dattes (F). Dates (E).

البلح من ثمر النخل قبل البسر لأن اول التمر طلع ثم خلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ثم ثمر . الواحدة بلحة .

٣٩٢٥ - بُلْتَج البعر Moule (F). Mussel (E).

اطلب ميديه .

٣٩٢٦ - بُلْتَج الصحراء Dattier du désert (F).

اطلب عالج . Thorn tree (E).

٣٩٢٧ - بُلْتَج طرايزون Kaki (F).

هو الكاكي ، اطلبه .

٣٩٢٨ - بُلْتَحِيَّات Gypaètes (F).

فصيلة من رتبة ألجوارح وكواسر النهار تشمل جنس البلح دون سواه .

٣٩٢٩ - بُلْتَخ ، بُلَاخ Chêne cocciné (F).

البليخ والبلاخ نوع من السنديان . راجع سنديان . Kermes oak (E).

٣٩٠١ - بلا نيره منفعية Planère aquatique (F).

شجرة صغيرة القد مهدا منافع لوزيانا . تزرع للتزيين وهي هرمية الشكل جميلة القالب . خشابها صناعية حنطية اللون .

٣٩٠٢ - بُلْبَال Loup (F). Wolf (E).

البلبال هو الذئب . اطلبه .

٣٩٠٣ - بُلْبُل * ، كُغَيْت ، نُغَر ، بُجَيْل

Pycnonotus (S). Pycnonota, Bulbul (F). Pycnonotus, Bulbul (E).

جنس عصافير من فصيلة الكميتيات . انواعه نحو ٥٠ اعطانها الاصقاع الحارة الاسيوية والافريقية . جميعها جميلة الشكل رشيقة القوام مختلفة الالوان المتداخلة يندب فيها الحنطي الاسمر المواج والرمادي الاسفع . تألف الاحرج والغابات والحداثق . معظمها غريد يحسن التوقيع . وهي تدن في الاشجار وتحضن من ٤ الى ٦ بيضات . اشهر انواعه ما يتبع .

٣٩٠٤ - بُلْبُل الشعير Ortolan (F).

راجع ارطلان .

٣٩٠٥ - بُلْبُل الغاب الأتمر

Locustelle tachetée (F).

هو الشندل الأتمر ، اطلبه .

٣٩٠٦ - بُلْبُل عراقي Pycnonotus leucotis

٣٩٠٧ - بُلْبُل فلسطيني Pycnonotus capensis vellum

٣٩٠٨ - بُلْبُل لبناني Pycnonotus xanthopyga

٣٩٠٩ - بُلْبُل مصري Pycnonotus barbatus arsinoe

٣٩١٠ - بُلْبُل مغربي Pycnonotus barbatus barbatus

٣٩١١ - بُلْبُلِيَّات Pycnonotidae (S).

Pycnonotidés (F).

فصيلة طير من الجواثم تدعى كميتيات . اطلبها .

٣٩١٢ - بُلْبُس Muscari (F).

هو الحبل ، اطلبه .

٣٩١٣ - بُلْبُس أزرق Muscari botryolde (F).

راجع حبل جميل . Grape hyacinth (E).

٣٩١٤ - بُلْبُس الكلب Muscari chevelu (F).

راجع حبل أزب . Tassel hyacinth (E).

٣٩١٥ - بُلْبُس مسكي Muscari odorant (F).

راجع حبل مسكي . Strach hyacinth (E).


٣٩١٦ - بُلْبُول * Dafila acuta (S).

Canard pilot, Pilet (F). Pintail (E).

طائر من البطيات القواطع كبير الجثة طوله نحو ٦٣ سم . رأسه حنطي اللون تشوبه حمرة وجؤرة . عنقه موشع بالابيض جؤجؤه وبطنه الى البياض الاغبر ، افنيكه اصفر ، ظهره انمر ، رقشته سمراء الاطار . الانثى اكثر رقشة واقل بياضاً من الذكر .



بلبل



بلبول



بلح

لان البلم الغليظ الكثير الشعر المستطيل لا يجب ان يكون في الخيول العتيقة المظلمة .

٣٩٤٢ - **بُلْدُون** *
Paludina (S).
Paludine (F). Paludina (E).

جنس حيوانات مائية سرلودة من الرخويات معديات الارجل وفصيلة البلدونيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة || اصداؤها صلبة القد ، محلونة ، رقيقة النشاء الكلسي ، جميلة الزخرفة والخطوط القاطبة .

٣٩٤٣ - **بُلْدُونِيَّات** *
Paludinidae (S).
Paludinidés (F). Paludinidae (E).

فصيلة حيوانات سرلودة مائية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المناطق وفي مجاري الماء || اصداؤها صغيرة ، محلونة ، رقيقة ، جميلة الالوان والزخرفة || اعرف اجناسها واشهرها البلدون والصومر والثمام .

٣٩٤٤ - **بَلْدِي**
Indigène (F). Indigenus (E).
من كان من مواليد عطنه ان في الحيوان ام في النبات .

٣٩٤٥ - **بِلْدِيرَة** *
Billardiera (S).
Billardièr (F).

جنس جنات سرعية معمرة من فصيلة الحبشيات . اوراقها متعاقبة سنانية النصال . ازهارها طرفية الارتكاز ، فردية او خسية التجميع || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٣٩٤٦ - **بِلْدِيرَة عَارِشَة** *
Billardiera scandens (S).
Billardièr grimpante (F).

نوع من البلديرة . مهدا استرالية . ساقها عارشة تطول نحو اربعة امتار . افنانها مزغبة اللحماء . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية الشكل ، صغيرة القد . ازهارها فردية ، مستطيلة المالحق ، متدلية . ثمارها عنية ، كروية الشكل ، زرقاء اللون .

٣٩٤٧ - **بِلْدِيرَة مُسْتَطِيلَة الزَهْر** *
Billardiera longiflora (S).
Billardièr à longues fleurs (F).

نوع من البلديرة . مهدا استرالية . ساقها عارشة تطول نحو ستة امتار . اوراقها متعاقبة ، كاملة ، سنانية النصل . ازهارها فردية ، فستقية اللون تطول نحو ٥ سم . ثمارها عنية حمراء اللون .

٣٩٤٨ - **بَلْدَرُفُون** *
Bellerphona (S).
Bellerphon (F). Bellerphona (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اللامتجانسة وفصيلة الاطلنطيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الطبقة الفسسية || اصداؤها صغيرة محدبة وحيدة المصاريح يعلوها في وسطها كظفر قاطب وتحزيز افقي . صفحتها الداخلية ملساء .

٣٩٤٩ - **بِلْز ، اِبْلِيْز**
Limon (F). Silt (E).
هو الطين الذي تعقبه مياه الانهر بعد فيضانها وعودتها الى مجاريها الطبيعية .

٣٩٣٠ - **بِلْخَنَة**

البلخنة نبات يتبسط ولا يعلو (اللسان) .

٣٩٣١ - **بَلْخَش**
Biebersteinia (S).
Biebersteinia (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الفرنوقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها جبال حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها مستضخمة بضخامة فروعها . اوراقها رحيمة . ثنائية التركيب الريشي او ثلاثية . ازهارها سنبلية التجميع او عنقودي . ازهارها خماسية التركيب ، صغيرة القد او متوسطة ، بيضاء اللون او تبنية . تنويرها ربيعي .

٣٩٣٢ - **بَلْخَيْشِيَّة** *
Periploca (L). Périplouque (F).
Silk vine (E). Echte hundsschlinge (D). Apocino serpeggiante, Erba del signore (I).

جنس جنات برية وزراعية من فصيلة الصفلاييات . انواعها قليلة بعضها عارض . اوراقها معتقة قليلة لسنة متعاقبة عابلة . ازهارها بحيلة عشكولية التجميع خماسية البتلات المنفرجة الخضراء ظاهراً والبنفسجية من الداخل . ثمارها اسطوانية الشكل ملساء . اشهرها الثلاثة التالية .

٣٩٣٣ - **بَلْخَيْشِيَّة سِرْدِيْب**
Périplouque de Ceylan (F).

نوع من البلخية تزرع لثمارها المأكولة .

٣٩٣٤ - **بَلْخَيْشِيَّة مِصْرِيَّة**
Périplouque scammonée (F).

نوع من البلخية تزرع للتزيين . ازهارها بيضاء اللون بحيلة الشكل ، فواحة العرف المستحب .

٣٩٣٥ - **بَلْخَيْشِيَّة يُونَانِيَّة**
Périplouque grecque (F).
نوع من البلخية التزيينية . زهرتها حمراء اللون ، عصارتها سامة .

٣٩٣٦ - **بَلْد ، وَطْن ، اَقْلَم**
Acclimater (F).
To acclimatize (E).
كيف النبات او الحيوان يشي الوسائل ليألف اقليماً جديداً لم يتعوده بعد .

٣٩٣٧ - **بَلْدَة**
Auge (F). Bucket (E).
هنة من رصاص مدرجة يقيس بها الملاح الماء .

٣٩٣٨ - **بَلْدَة**
البلدة منزل من منازل القمر البانية وهي رقعة من السماء لا كوكب بها بين النعام وسعد الدابح ينزلها القمر وربما عدل فنزل بالقلادة وهي ست كواكب مستديرة صفار خفية موقعها بين النعام وسعد الدابح ايضاً || رقيب البلدة يدعى الدراع .


٣٩٣٩ - **بَلْدَر**
Polder
اطلب كسبة .

٣٩٤٠ - **بَلْدُس**
Boldo (F). Boldo wood tree (E).
هي شجرة الكبد ، اطلبها .

٣٩٤١ - **بَلْدَم ، غَبْغَب**
Fanon (F). Fetlock (E).
من اعضاء قوائم الفرس وقد يدل على العلق وجودة الرسن



بلخية



بُلْدُون



بِلْدِيرَة مُسْتَطِيلَة الزَهْر



بَلْدَرُفُون



بلسم مكة



بلشون رأس



بلشون أرجواني



بلشون أرم

٣٩٦٣ - بَلْسَمِينِيَّات، مَجْزَاعِيَّات

Balsaminaceae (S). Balsaminacées, Balsaminées (F). Balsaminaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين ومنهم من جعلها سبط من الفرنوقيات. أجناسها قليلة، أنواعها عديدة معظمها نبات عشبي حولي جميل الزهر يستعمل للتزيين.

٣٩٦٤ - بَلْسُن

Lentilles (F). Lentils (E).

هو العدس المأكول. واحدته بلسنة.

٣٩٦٥ - بَلْشُون، مَالِك الْحَزِين

Ardea (S). Héron (F). Heron (E).

جنس طير من القواطع وفصيلة البلشونيات. أنواعه ١٠ منتشرة في معظم أقطار العالم. جميعها كبيرة الجثة مستطيلة الساق، طويلة العنق الدقيق والمقنطد الجالس الذلق. وهي تألف المناطق والضفاف حيث تصطاد الأسماك والضفادع.

٣٩٦٦ - بَلْشُون أَيْض

Herodias alba (S). Héron blanc (F). White heron (E).

هو ابن الماء الأبيض، أطلبه.

٣٩٦٧ - بَلْشُون أُرْأْس*، أَبُو الْعَنْقَاء

Ardea melanocephala (S). Héron à tête noire (F). Black-headed heron (E).

نوع من البلشون كبير الجثة أسود الرأس.

٣٩٦٨ - بَلْشُون أُرْجَوَانِي*، جَحْفَة، أُرْخِيَاوِي

Ardea purpurea (S). Héron pourpre (F). Purple heron (E).

نوع من البلشون، كبير الجثة، أرجواني الثوب، يألف أخوار الأنهر والهور.

٣٩٦٩ - بَلْشُون أُرْمَد*، بَلْشُون سِنْجَاوِي، دَنَكَلَة

Ardea cinerea (S). Héron cendré (F). Grey heron (E).

نوع من البلشون أرم الثوب بكثرة وجوده في الشرق العربي.

٣٩٧٠ - بَلْشُون بَحْرِي

Herodias bulbus (S). Reef heron (E).

هو ابن الماء العادي، أطلبه.

٣٩٧١ - بَلْشُون جَبَّار، سَبْطَر، مِرَّة، أَبُو عِيْزَار

Ardea Goliath (S).

Héron Goliath (F). Goliath or Giant heron (E).

أكبر أنواع البلشون وأضخمها جثة وأعظمها سرباً.

٣٩٧٢ - بَلْشُونِيَّات

Ardeidae (S). Ardeidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق أجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها من القواطع يحوب الأقاليم المختلفة ويألف المناطق والهور والأخوار.

٣٩٧٣ - بُلْصُوص، بِلْص

البلصوص طائر وإنشاء بلصى والجمع بلاصيص (الديرى).

٣٩٧٤ - بُلْصُوص جَاوَا

Eurylaimus javanus (S). Eurylaima de Java (F).

طائر من فصيلة البلصوصيات. موطنه جاوا وسومطرة والهند. جسمه يطول نحو ٢٥ سم. رذاؤه ومجسراه وبطنه وذنبه إلى السواد الفحشي القائم. زوره وصدره إلى الصفار الباهت، ويملوه في أواسط قوادمه وفي بعض ريش أفنيكه ترابع

٣٩٥٠ - بُلْس

Lentilles (F). Lentils (E).

البلس هو العدس المأكول. الواحدة بلسة (اللسان).

٣٩٥١ - بَلْس

Carique (F). Common fig tree (E).

راجع تين. الواحدة بلسة.

٣٩٥٢ - بَلْس، بِلْس

هو رماد القلى (فريتغ).

٣٩٥٣ - بَلْسَان

Etourneau (F). Starling (E).

البلسان: نوع من الطيور يقال لها الزواير (التاج).

٣٩٥٤ - بَلْسَان، بَشَام

Balsamier, Baumier (F). Balsam tree, Balm tree (E).

جنس اشجار وجنبات رائحة برية وتزيينية من فصيلة البخوريات مهدما الاصقاغ الحارة من الشرق الاوسط وأفريقية. أنواعها عديدة يستخرج من بعضها ادهان رائحة عطرية فاعرة. أشهرها بلسم مكة والمقل والمر والقطف والقفل. راجع هذه الاسماء.

٣٩٥٥ - بَلْسَان أَيْض

Boule de neige (F). Snow ball tree (E).

راجع أفلوس ثلجي.

٣٩٥٦ - بَلْسَان الْمَاء

Viorne lobé, Obier (F). Water elder (E).

راجع أفلوس أرم.

٣٩٥٧ - بَلْسِيد، بَوْصِيَة

Plaste, Plastide (F). Plastid, Plastidium (E).

مجموع مواد الخلية الحية باستثناء عناصر الدختر والافراز. وهي أيضاً وظيفة الخلية بالنسبة إلى قدرتها على التطور والنشوء.

٣٩٥٨ - بَلْسَك

Aparine (F). Catch-weed (E).

هو الغاليون الأبيض نبات بري طبي.

٣٩٥٩ - بَلْسَك

Hirondelle (F). Swallow (E).

البلسك هو الخطاف (فريتغ).

٣٩٦٠ - بَلْسَكَاء، بِلْسِكَاء

Bardane (F). Burdock (E).

نبت ينشأ في الثياب فلا يفارقها واسمه في المفردات «عمي خذني معك». راجع أرقطيون.

٣٩٦١ - بَلْسَم

Myroxylon (S). Myroxyle (F). Myroxylon (E).

جنس اشجار حرجية طيبة من فصيلة القرنيات الفرائية. أنواعه قليلة أعطانها الاصقاغ الحارة أينما كانت. يستخرج من سوقها وفروعها عصارة رائحة بلسمية تستعمل في بعض المستحضرات الطبية.

٣٩٦٢ - بَلْسَم مَكَّة*، بَلْسَم جَلْعَاد، أَبُو شَام

Balsamodendron gileadense, Commiphora opobalsamum, Amyris gileadense (S). Baumier, Balsamier de la Mecque, B. de Gilead, B. de Judée (F). Balm of Gilead, Balsam of Mecca (E). Mekka balsambaum, Opobalsambaum (D). Albero balsamico, Balsamo della Mecca, B. di Gilead (I).

نوع من البلسان من فصيلة البخوريات. أعطانه البلاد الحارة. يكثر في الشرق العربي. يستخرج منه دهن عطري فاعر الصنف وصمغ رائحة عزيزة تعتبر من أجود أنواع البخور.

٣٩٨٢ - بَلْطُوسِيَّات ٥ Platypodidae (S).

Platypodidés (F). Platypodidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، اسطوانية الشكل، تطول من ٥ الى ٨ مم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة القفن. عيونها ناشزة. تأشيرها وملامسها نظامية. قرونها الاستشعارية صغيرة، دبوسية الاطراف. كواسلها مستطيلة، محدبة. اغمارها لاحفة. قوائمها نشيطة. ارساغها رباعية العقول. اثوابها ملونة || جميعها خاشبة بعضها يعيش على الصنوبريات والبعض الآخر على البلوطيات || اشهر اجناسها البلطوس.

٣٩٨٣ - بَلْطُوش ٥ Scleropterus (S).

Polatouche (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجاييات. انواعه ٢٣ موطنها المناطق القريبة من الباردة في آسية واروبة وامريكا. جميعها صغيرة. القد. اجسامها مستطيلة. رؤوسها ذلقة عيونها جاحظة. اذانها صفيحية الشكل مبططة. تتميز بزوائدها الجلدية الجناحية القائمة على كامل خوصها من مفصل الساعد الى مفصل الفخذ. تطير من شجرة الى اخرى شوطها يراوح من ٢٠ الى ٢٥ م. || تألف الغابات والاحراج الكثيفة. تسرح في الليل. تعيش على الاشجار قوتها البراعم والنوامي والثمار والبزور واللوز والجوز... اجحرتها اوكن ترتبها في صدوع الاشجار. اناثها تضع من ٣ الى ٥ ادراص تبصر وتكتسي بعد وضعها بعشرة ايام.

٣٩٨٤ - بَلْطُونِيَّة Boltonia (F). False camomile (E).

راجع بابونج كاذب.

٣٩٨٥ - بَلْطِي *، مُشْط، خِرْشَقْلِي

Chromis (F). Chromis, Tilapia, Bolti (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة المشطيات انواعه المعروفة قليلة جميعها متوسطة القد او صغيرة. تتميز برؤوسها المخشفة وافواها المندفعة وزعانفها الظهرية المستطيلة الشائكة والشرجية الفارقة || اعرف انواعه يتبع.

٣٩٨٦ - بَلْطِي الْمُتَوَسِّط، بَلْطِي كَسْتَنِي

Chromis castanea (S). Chromis chatain, Castagnole, Queue fourchue (F).

نوع من البلطي يكثر في المتوسط طوله يراوح من ٣٠ الى ٦٠ سم. ثوبه كستني اللون اسفع الموج يبق عند الظهر. لحمه متوسط الصنف مأكول.

٣٩٨٧ - بَلْطِي النِيل Chromis niloticus (S).

Chromis du Nil (F).

نوع من البلطي يكثر في النيل وفي سائر الانهر الافريقية. طوله يراوح من ٣٠ الى ٥٠ سم. ثوبه الى الازرق السمر. يعلوها موج اسفع. لحمه متوسط الصنف مأكول.

٣٩٨٨ - بَلْطِي الْيَهُودِيَّة، بَلْطِي طَبَرِيَّة

Chromis paterfamilias (S). Chromis de Judée (F).

نوع من البلطي يوجد في بحيرة طبرية طوله يراوح من ٢٠ الى ٤٠ سم. ثوبه الى الازرق السمر يعلوها موج اسفل. من ميزات الخاصة ان الذكر يحفظ ويحضن في تجويف خطمه سرء الانثى حتى اكتمال نطفه.

بيضاء صغيرة. حدقة عينه ياقوتية اللون. منقاده ضخم، ضليع، شبه مخروطي الشكل، ذرب الطرف الاعقف، واسع الشدق الرحب. ساقه مستغلظة الجرم، لوئها الى السمرة السوداء || يألف الرياض وضفاف البحيرات ومجاري الماء. قوته الديدان والاساريع والحشرات وبعض الثمار البرية || يدشن عشه في الاشجار التي تشرف على الماء. الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمنوبة الذكر.

٣٩٧٥ - بَلْطُوسِيَّات ٥ Eurylaimidés (F).

Eurylaimidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سليات المناقير. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٢٠ جميعها من طيور الهند وماليزيا || اجسامها ربعة. مناقيدها ضخمة، مخروطية الشكل، قصيرة. اجنحتها قصيرة. اذانها مستعرضة، مستديرة الاطراف. اثوابها تختلف مع الانواع يكثر فيها التلوين || اعرف انواعها واشهرها بلصوص جاوا.

٣٩٧٦ - بَلْطَانِيَّة * Pultenaea (S). Pulténée (F).

جنس نباتات برية وتريينية من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعها عديدة مهدا بلاد استرالية. جميعها جنبات ومجالات فرعاء. اوراقها خيطية صغيرة القد متعاقبة متقاربة الترتيب. ازهارها نورية التجميع تاجية الارتكاز. انواعها التريينية المشهورة ثلاثة:

٣٩٧٧ - بَلْطَانِيَّة مُخَزَّزَة P. dentata (S).

P. dentelée (F).

٣٩٧٨ - بَلْطَانِيَّة مُتَصِبَة P. stricta (S).

P. dressée (F).

٣٩٧٩ - بَلْطَانِيَّة مُعْطَلَة P. flexilis (S).

P. flexible (F).

٣٩٨٠ - بَلْطَة، بَرَسَاء بَلْطَة

Mimusops balata (S). Balata (F).


Guiana milke tree (E). Balatabaum (D).

شجرة حرجية وصناعية منبها المناطق الاستوائية اخصها الفويان. وهي نوع من البرساء وفصيلة السبوتيات. ساقها متوسطة الارتفاع مستغلظة القطر. اوراقها متعاقبة ممتدة جامدة النصال. ازهارها ابطي الارتكاز. ازهارها فردية التجميع صفراء اللون || يستخرج منها بالحز عصارة صمغية مطاطة جيدة الصنف. اخشابها صناعية فاخرة تستعمل في الموبيليا.


٣٩٨١ - بَلْطُوش ٥ Platypus (S).

Platype (F). Platypus (E).

جنس حشرات خاشبة من فصيلة البلطوسيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة من العالمين القديم والجديد || اجسامها اسطوانية الشكل، تطول من ٥ الى ٨ مم. رؤوسها كبيرة، مستعرضة القفن. عيونها ناشزة. تأشيرها ضليمة. ملامسها صغيرة. قرونها الاستشعارية صغيرة، دبوسية الاطراف. كواسلها مستطيلة، محدبة. اغمارها لاحفة، مقطومة الطرف. قوائمها نشيطة. اثوابها سوية اللون الواحد باستثناء الرأس الذي غالباً ما يكون اسود || جميعها خاشبة تعيش على الصنوبريات والبلوطيات.




بلطاني



بلطوس



بلطوش



بلطي

مفلطحة ، اهليلجية الشكل ، تطول من ١٥ الى ٢٢ سم .
اثوابها الى السمرة او الشقحة تعلوها زخارف متباينة
الاشكال || جميعها خاضعة تعيش على الارواق الغنية التي
يكثُر وجودها على ضفاف مجاري الماء || اعرف اجناسها
البفون .

٣٩٩٧ - بِلَقَالِيَا ٥ Bellevalia (S). Bellevalie (F).

جنس نباتات دوفسية برية من فصيلة الزنبقيات ، معقودة
التعريف على اسم العلامة « بلقال » . انواعها المعروفة
قليلة ، منبها يمتد من الشرق الاقصى الى معظم اقطار اروبة
المعتدلة الحرارة || سوقها شمراخية ، عادمة الورق تعلو من
٢٠ الى ٥٠ سم . وتنهي باكليل من الزهر يراوح عددها
من ٢٠ الى ٣٠ زهرة . اوراقها قرصية الانتشاب عددها
من ٤ الى ٥ وطولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . اما عرضها
فن ١٠ الى ١٥ سم . ازهارها الى اليباض الاخضر الموج
ومنها بنفسجية القاعدة او جؤورية || تنويرها يستمر من
نيسان الى ايار .

٣٩٩٨ - بِلَفِيل ٥ Pelophilus (S).

Pérophile, Boa de Madagascar (F).

نوع من الثعابين الضخمة عادمة الاخاديد والسوم من
فصيلة الاصليات . اعطانها جزيرة مدغسكر . تألف
المستنقعات حيث يتوفر لها القوت من مختلف ما دب وعام ||
جسمها شبه اسطواني الشكل مستضخم الوسط ، مستدق
العنق والذنب ، يطول نحو ٢٢٠ سم . رأسها معتدل الجرم
مقطوم الخطم . ثوبها الى السمرة القائمة تعلوها رقشة سوداء
متباينة الاشكال تكثُر فيها الاطواق .

٣٩٩٩ - بِلَق ٥ Albâtre (F). Alabaster (E).

البلق حجارة نضية ما وراها كالزجاج اذا كانت نقية
وقليلة الشخانة .

٤٠٠٠ - بِلَقَاء ٥ Melaleuca (S).

Mélaleuque (F). Melaleuca (E).

جنس اشجار وجنيات برية وزراعية من فصيلة الآسيات .
انواع عديدة منبها جزر أفيانيز وبعض الاصقاع الصينية .
اوراقها كاملة ، رحيمة ، معنقة ، متعاقبة او متقابلة .
نصلها عابق الخضار الزاهي ، تتخلل مسامه غديرات
صغيرة ملوكة بالاذهان العطرية . ازهارها سنبلية التجميع
مختلفة الالوان منها الابيض والاصفر والارجواني . ثمارها
جراة || يستخرج من اوراقها وازهارها دهن الكلجيبوت
وهو دهن لزج اخضر اللون يستعمل دلكاً كعلاج لداء
المفاصل وداخلياً كعرق || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

٤٠٠١ - بِلَقَاء بِيضَاء Melaleuca leucodendron (S).

Mélaleuque blanc (F).

شجرة سمراء الساق ، بيضاء الاغصان والافناد . اوراقها
متعاقبة جلدية النصل المدبب العقصية . ازهارها بيض .
ازهارها يدوم من اوائل ايار الى اواخر حزيران .

٤٠٠٢ - بِلَقَاء حُرْشِفِيَّة Melaleuca squamea (S).

Mélaleuque écailleux (F).

شجرة صغيرة تعلو من ٤ الى ٦ أمتار . اوراقها متقابلة
معنقة بيضية الشكل . ازهارها حُرْشِفِيَّة ليلكية . ازهارها
يدوم من حزيران الى ايلول .

٣٩٨٩ - بَلَطِيمُور مَبْدُول ٥

Yphantès Baltimore (S).

Baltimore vulgaire (F). Common Baltimore (E).

طائر من فصيلة الكاروجيات . موطنه امريكا الشمالية
اخصها ولاية ماريلندا . يألف الغابات والحدائق ويقترّب
من الاماكن الآهلة حيث يلقي كل تشجيع لانه يقضي
على جميع الحشرات من الجراد الى الفراشة والحفساء ||
جسمه معتدل القد . يطول نحو ٣٢ سم . رأسه وقنزته
وعنقه وظهره وذنبه الى السواد الاسفع الموج . صدره وبطنه
الى الصفار الناري . جناحاه الى السواد الاسفع يعترضها
تجذيع اصفر . ذنبه مقطوم الطرف ، اصفر الزام الاخير .
عيناه كبيرتان مطوقتان بالبرقالي . حدقة عينه حمراء اللون
منقادة ورسفاه الى السمرة || يألف حياة الاسر ويعيش
في القفص شرط ان يكون فسيحاً || يدثّن عشه في
الاشجار الرفيعة بين مجموعة من افناد الاغصان . عشه
قدحي الشكل مشين الحيك . الانثى تضع من ٣ الى ٤
بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٧ يوماً .

٣٩٩٠ - بِلْعَع ٥

طائر مائي طويل العنق (القاموس) .

٣٩٩١ - بُلْعُم ، بُلْعُوم ، فَرِي ، مِسْرَط

Œsophage (F). Œsophagus (E).

مجرى الطعام في الخلق . جمع بلاع .

٣٩٩٢ - بُلْعُوط ٥ Alevin (F). Fry, Young fish (E).

بلعوط ج بلاعيط . السمك الحديث العهد قبل ان يتملص
من حواشيه وزوائده . انظر في الرسم البلعوط في
مختلف ادواره .

٣٩٩٣ - بُلْعُومِي ، حُلُقُومِي

Pharyngien (F). Pharyngeal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالحلقيم كقولك
شريان حلقيومي .

٣٩٩٤ - بُلْعُومِيَّات تَبْهِيَّة ٥

Pharyngiens labyrinthiques (F).

فئة من الاسماك كاملات العظام ، شائكات الزعانف تتميز
بشكل عظامها - الحلقومية التي تشبه انخاريب المتراكبة
كالخلايا والتي تمكنها من الاحتفاظ ببعض الماء فترة من
الزمن تكفيها لسنة حاجة خيائيمها عند الانتقال براً من
مكان الى مكان || اشهر اسماء هذه الفئة تدعى أنباس .

٣٩٩٥ - بِلْعُون ٥ Pelogonus (S).

Pélogone (F). Pelogonus (E).

جنس حشرات خاضعة من نصفيات الاجنحة المختلفة
وفصيلة البلغونيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم
اقطار العالم || اجسامها مفلطحة ، اهليلجية ، تطول
من ١٨ الى ٢٠ سم . رؤوسها صغيرة مستعرضة مدببة المقدم .
عينونها مكورة ناشرة . اثوابها الى السمرة السوداء الموج
تعلوها زخرفة خطية وشقراء . بطونها مبطنطة . قوائمها صغيرة
ونشيطة || تألف ضفاف مجاري الماء حيث الاعشاب الندية .


٣٩٩٦ - بِلْعُونِيَّات ٥ Pelogonidae (S).

Pélogonidés (F). Pelogonidae (E).

فصيلة حشرات من نصفيات الاجنحة المختلفة . اجناسها
وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها



بلطيمور مبدول



بلعوط



بلفيل



بلقاء

٤٠١٠ - بَلْقُطٌ Moineau soulcie (F).
البلقط والبلقوط هو دوري الغاب ، اطلبه .

٤٠١١ - بَلْقَعِي ، مَهْمَهِي Subdésertique (F).
Subdesert (E).
نعت تعريفي يطلق على المناطق شبه الصحراوية .

٤٠١٢ - بَلْقُوسٌ* Placusa
حشرة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . وهي صغيرة القد طولها نحو ٢ سم . ثوبها حنطي اللون تعيش تحت لحاء الاشجار الضعيفة والمريضة .

٤٠١٣ - بَلْكَنُومٌ* ، بَلْقَلَةُ الطحَالِ Blechnum spicant (S). Blechne spicant, Blechnum en épis (F). Rough spleenwort, Snakefern, Hardfern (E). Gemeiner rippenfarn (D). Polipodio amaro (I).
نوع من السراخس البساجية وهو نبات طبي اوراقه مستطيلة رحيمة الشكل مركبة من وريقات صغيرة لسنة وحيدة العصب . كان ولا يزال يستعمل في معالجة الطحال .

٤٠١٤ - بَلْكَلٌ Drosométrie (F).
Drosometry (E).
البلل قياس رواسب الماء الناجمة عن سقوط السدى والندى .

٤٠١٥ - بَلَمٌ* ، اُنْشُوا Engraulis (S).
Anchois (F). Anchovy (E).
جنس اسماك صغيرة من فصيلة الصابوغيث . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع البحار . وهي اسماك صغيرة القد مستطيلة الشكل طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم . تعيش جماعات وافواجا . تقترب من الشواطئ تصاد في نيسان وايار وحزيران جميعها من الاسماك المأكولة .

٤٠١٦ - بَلْمَاءٌ Nuit de la pleine lune (F).
البلماء هي ليلة البدر .

٤٠١٧ - بَلْمَةٌ Rut
البلمة : ورم الحياء من شدة الضبعة . يقال بها بلمة شديدة . وبلمت وأبلمت الفرس والناقة والبقرة : ورم حيائها من شدة الضبعة واشتت الفحل (القاموس) .

٤٠١٨ - بَلْمَةُ الْمُتَوَسِّطِ* ، اُنْشُوا الْمُتَوَسِّطِ Engraulis encrasicolus (S). Anchois de la Méditerranée (F). Mediterranean Anchovy (E).
نوع من البلم . سمكة بحرية بيوض . اعطانها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من الاسماك اليمية . مسرحها الاغواط والثغاف || جسمها وشقي الشكل يطول من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الرعدة الفضية الموج يعبق عند الظهر ويبيض عند البطن . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخطم . شدتها واسع الانفراج . فكها العلوي يتقدم السفلي . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متتابعة الصفوف . عيناها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها شفافة واللذلية فارقة || تصاد في الليل على ضوء الفانوس . لحمها متوسط الصنف .

٤٠١٩ - بَلْمُنُوسٌ* Palamnaeus (S).
Palamnaeus (F). Palamnaeus (E).
جنس عقارب خبيثة من فصيلة الشبدييات . انواعه المعروفة ثلاثة موطنها معظم المناطق الاستوائية من القارة الاسيوية ||

٤٠٠٢ - بَلْقَاءٌ خَلَنْجِيَّةٌ Melaleuca ericifolia (S).
Mélaleuque à feuilles de bruyère (F).
جنبه تعلو من ٢ الى ٣ امتار . اوراقها متعاقبة خلنجية الشكل مستطيلة ، نصلها عابق اللون يعلو خطان من الغديئات المستديرة . ازهارها ليلكية . ازهارها يدوم من حزيران الى آب .

٤٠٠٤ - بَلْقَاءٌ سَاطِعَةٌ Melaleuca fulgens (S).
Mélaleuque éclatant (F).
جنبه تعلو من ٢ الى ٣ امتار . اوراقها متعاقبة ضيقة النصل مدبة ، لونها الى الخضار البحري . ازهارها قرمزية . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٤٠٠٥ - بَلْقَاءٌ صَعْتَرِيَّةٌ Melaleuca thymifolia (S).
Mélaleuque à feuilles de thym (F).
بجلة تعلو من المتر الى المترين . اوراقها متعاقبة مستطيلة ، نصلها باهت الخضار عادم المروق ، ازهارها عابقة الاحرار . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٤٠٠٦ - بَلْقَاءٌ كَاجِيْبُوتٌ ، كَاجِيْبُوتٌ Melaleuca cajaputi (S). Mélaleuque naine, Cajepu-
tier (F). Cajeput oil tree, Punk tree (E). Kajepu-
baum (D). Cajaputi (I).
بجلة فرعاء تعلو من المتر الى المترين . اوراقها متعاقبة ، اهليلجية ، سنانية الزام الاخير ، مدبة المقصة . نصلها باهت الخضار تعلو غديئات مستديرة نظامية الارتكاز . ازهارها وردية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول || تكثر زراعتها في بعض مناطق الشرق الاقصى . يستخرج من اوراقها افخر ادهان الكاجيبوت التي تستعمل في الطب وفي علاج داء المفاصل .

٤٠٠٧ - بَلْقَاوِيَّاتٌ Méléaleucées (F).
سيط من فصيلة الآسيات . نباتات مختلفة الاحجام منها البجلة والشجيرة والشجرة ومنها البرية والزراعية والتزيينية . انواعه لا تقل عن المئة معظمها امريكي المنبت وبعضها اسيري . اشهرها البلقاء .

٤٠٠٨ - بَلْقُسٌ* Pelecus (S). Pelecus (F).
جنس اسماك نهريّة من مفتوحات المثانة وفصيلة الشبوطيات . انواعه المعروفة قليلة . جميعها من اسماك اروبة الشرقية والوسطى . يكثر وجودها قرب مصبات الانهر || اجسامها مستطيلة الشكل ، انفية الخط الاعلى الممتد من الخطم الى الظهر فالذيل . محدبة الخط الاسفل اي خط البطن . اطولها قراوح من ٢٥ الى ٤٥ سم . ظهورها معتدلة التبسيط . بطونها حادة الاطراف الذرية . تتميز بصغر زعانفها الظهرية وباستطالة الصدرية وبكبر الشرجية والذيلية الفارقة || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة .


٤٠٠٩ - بَلْقَشَةٌ Mergus (S).
Mergien, Harle (F). Merganser (E).
جنس طيور مائية من فصيلة البطيات . انواعها ٧ جميعها من القواطع الكبيرة القد . بعضها متوج الرأس . ثوبها ثوب البط الوحشي . طولها يراوح من ٧٠ الى ٨٥ سم . وبسطة جناحها زهاء المتر . يكثر وجودها في البلاد الباردة . تمضي فصل الشتاء في مياه البلاد الحارة والمعتدلة .



بَلْقُسٌ



بَلْقَشَةٌ



بَلْقُسٌ



بَلْكَنُومٌ



بَلْمٌ



بَلْمَةُ الْمُتَوَسِّطِ

٤٠٢٥ - بَلْمَنِيَاتُ الشَّيْفِ (F). Armoise commune (F).
Mugwort (E).
هو الشيلاء من النباتات الطبية . اطلبها .

٤٠٢٦ - بَلْمَنِيَاتُ وَمُسْ (S). Plenodomus (S).
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . يتميز ببيكنيدات السطحية الارتكاز ، اللاتقاسية الشكل ، العابقة اللون ، السمكة الجول والضيقة الملق الذي ينمق طولاً عند الأثمار . بريداته بسيطة ، مستطيلة ، شفافة || أنواعه قليلة محدودة الاضرار . أشهرها ما يتبع .

٤٠٢٧ - بَلْمَنِيَاتُ وَمُسْ البطاطا الخلو (S).
Plenodomus destruens (S). Foot rot (E).

فطر مجهرية يصيب النباتات الفتية في عروقها على بعد ١٥ سم من التربة ، فيذوبها بعد ان يجعد ويحجم قشورها . وهو على الدرنات عفن اسود يركب العيون دون سواها || اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة . وان كان لا بد منها فيظهر البذار بالزئبق المصعد المحلول ١ .٪ مدة خمس دقائق .

٤٠٢٨ - بَلْمَنِيَاتُ (F). Goudron (F). Tar (E).
هو القطران ، اطلبه .

٤٠٢٩ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Sphaeriidae (S).
Sphériidés (F). Sphaeriidae (E).
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، محدودة ، شبيهة بالقراد ، تطول من ٣ الى ٨ مم . رؤوسها صغيرة ، قليلة النشور . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها مستعرضة . اغمارها قصيرة لا تلحف كامل البطن || تعيش تحت الحجارة والطحالب في المواقع الرطبة || أشهر اجناسها البيلنة .

٤٠٣٠ - بَلْمَنِيَاتُ (F). بقلة (السان) .

٤٠٣١ - بَلْمَنِيَاتُ (F). Sittelle bleue (F).
طائر من الجواثم وفصيلة التيسيات مشهور باسم كاسر الجوز الأزرق ، اطلبه .

٤٠٣٢ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Balanops (S). Balanope (F).
جنس اشجار حرجية من فصيلة البلنوبيات . أنواعه المعروفة متوسطة العدد ، جميعها شجيرات منتصبه فرعاء . ثمارها غنية مأكولة . اخشابها متينة صناعية .

٤٠٣٣ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Balanopsidaceae (S).
Balanopsidacées (F). Balanopsidaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد ، منبها الطوعي بعض جزر المحيط الهادي ، اخصها جزيرة كليدونية الجديدة || جميع نباتاتها اشجار وشجيرات وجنبات . سوقها منتصبه فرعاء . أوراقها متعاقبة ، لاطنة ، شبه ضمية التجميع ، سنانية التصلال الجامدة الريشية العروق . ازهارها ثنائية المسكن . الذكورية منها سداسية الاسدية او تساعيتها ، اما الانثوية فلحيفة بقنابات مرصومة متراكبة ، خذروفية الشكل || أشهر اجناسها البلنوب .

اجسامها كبيرة القد تطول من ١٠ الى ١٢ سم . اثوابها تختلف مع النوع ، منها الاسود والاخضر والخططي الاسمر . ملاقطها كبيرة مزدوجة التسنين الداخلي . جميعها دجوية تسرح في الليل . ابرتها حادة الحمة . لدغتها شديدة الاذى وقد تكون مميتة .

٤٠٢٠ - بَلْمَنِيَاتُ (F). Bélemnite (F).
هي السهيمه ، جنس حيوانات بحرية من الرخويات ، اطلبها .

٤٠٢١ - بَلْمَنُونُ (S). Palaemon (S).
Palémon (F). Palaemon (E).

جنس دوبيات مائية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة القريدسيات . أنواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم وفي معظم بحيراته وانهاره || جميعها كبيرة القد ، قسطانية الالوان الجميلة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٤٠٢٢ - بَلْمَنِيَاتُ (S). Engraulidae (S).
Engraulidés (F). Engraulidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات مفتوحات المثانة . اجناسها وأنواعها المعروفة لا تتجاوز الستين || اعطائها معظم بحار العالم . سرحها الاغواط والنقاف والمجادح . اسرارها متباينة العدد الذي يراوح من الفين الى خمسين ألفاً وأكثر || اجسامها مستطيلة ، عادمة الضخامة ، تطول من ٨ الى ١٥ سم . اثوابها الى الريدة الفضية المتفاوتة الموج || تتميز بزوايا اشداقها المتأخرة الى ما وراء العين ، بفكوكها السفلى المتأخرة عن العليا ، وبعدم تسنين اكفارها البطنية || أشهر اجناسها البلم .


٤٠٢٣ - بَلْمَنِيَاتُ * (S). Pelamys (S).
Pélamide, Palamida (F).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الاسقمريات . أنواعها عديدة . اعطائها فسيحة الارحاء تمتد من المحيط الهندي الى الاطلسي عبر البحر الاحمر والمتوسط . جميعها كبيرة القد قريبة الشبه من التون رؤوسها مستطيلة . اسنانها حادة . اثوابها الى الزرقة اللامعة المخزعة بالخططي والاسمر والخرنوبي .

٤٠٢٤ - بَلْمَنِيَاتُ شَائِعَةٌ * ، بَلْمَنِيَاتُ شَائِعَةٌ ،

سَرْدَّة (S). Scomber sarda, Sarda sarda (S).
Pélamide, Pélamyda, Scombre sarda (F).
Scale breast (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من الاسماك اليمية . اسرارها وافرة العدد || جسمها وشبي الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبها الى الزرقة الفضية يعقب في الظهر ويغبر في البطن ويعلو من الحط الجانبي الى ثبج الظهر تجذيع صودي خطي اللون يعترضه تشيز افقي خرنوبي اللون . زعانفها الى الشبهة الصفراء الموج باستثناء الظهرية الاولى . فانها شديدة السرة . رأسها مستطيل الخطم الخروطي . شدقها واسع الانفراج . فكها متعادلان . اسنانها كبيرة ، حادة . عيناها كبيرتان ، فاشزان . زعنفتها الذيلية ملالية الشكل || لحمها ابيض وذلك مستحب الطعم ، مرغوب فيه .



بَلْمَنُونُ



بَلْمِيَّة




بَلْمِيَّة شَائِعَةٌ




بُلُونُوسْ أَرْمَد




بُلُونُومَة



بُلُونُونُ الْبَلُوط



بُلُونُونُ الْبَنْدَق



بُلُونُونُ الْكُسْتَنَاء



بُلُونَارِيَّة

٤٠٣٤ - بُلُونُوسْ أَرْمَد *، حَبَّة غَمَمِيَاء

Blanus cinereus (S). Blane cendré,
Blanus cendré (F). Cinereous Blanus (E).

حيوان زحّاف ، بيوض ، من العظام ينتمي إلى فصيلة القهقريانيات قابعات الاسنان ، مالبسات اللسان ، عادات القوائم . مهدد حوض البحر الأبيض المتوسط من سواحل الشرق الأدنى إلى إسبانيا والمغرب والجزائر . جسمه اسطواني الشكل مزور بجلقات حرشفية التركيب يمكنه من الاندفاع والانكماش . طوله نحو ٢١ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٦ سم . رأسه مخروطي الشكل . خطمه ينتهي بمادة قرنية صلبة . عيناه مغلفتان بغشاء طامس ، الداعي لنعته بالحية العمياء . أذناه مغلفتان الغشاء الصيواني . ثوبه إلى الجوزة السمر . الانثى افترج ثوباً من الذكر واغظت جرمها منه . يالغ الرمال والاراضي الزراعية والمروج . يخلد ملجأه ويقم سكناه تحت الحجارة . يسرح في الليل . دفعه مستقيم الخط . قوته الديدان والاساريع والعقارب والعناكب . يقال انه يعيش نحو ٢٤ سنة . يبلغ كامل نموه بعمر ثلاث سنوات ويسافد بعمر اربع سنوات .

٤٠٣٥ - بُلُونُومَة *، أَبُوشِعَاع Polynaemus (S).
Polynème (F). Polynaemus (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة البُلُونِيَّات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الاستوائية . اجسامها صغيرة شبه اهليلجية الشكل . اثوابها بحيلة الالوان الزاهية . عذباتها جامدة مستطيلة تكتنف قاعدة الفك الاسفل . زعانفها الذيلية فارقة هلالية التقويس . لخمها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

٤٠٣٦ - بُلُونُومِيَّات Polynaemidae (S).
Polynémidés (F).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار المناطق الاستوائية . اجسامها اهليلجية الشكل صغيرة القد . تتميز بعذباتها الجامدة الحارقة الطول وبزعانفها الذيلية الفارقة المقوسة . اشهر اجناسها البُلُونُومَة .

٤٠٣٧ - بُلُونُونُ Balaninus (S).
Balanin (F). Balanus, Nut-weevil (E).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة السوسيات . انواعه عديدة تتميز باخطامها الدقيقة المستطيلة . اشهر انواعه المؤذية الثلاثة التالية :

٤٠٣٨ - بُلُونُونُ الْبَلُوط * Balaninus glandium (S).
Balanin des glands (F). Acorn Weevil (E).
Eichelbohner, Eichelrüssler (D).

نوع من البُلُونُون طوله يراوح من ٣ إلى ٤ سم . لونه حنطي اغبر يعلوه توشيع ابيض واصفر . يعيش على السنديان . انثاه تمتح مكنها ، عند العقد ، على حافة القمع الداخلية فينقف عن يرقات تنخر البلوط .

٤٠٣٩ - بُلُونُونُ الْبَنْدَق * Balaninus nucum,
Curculio nucum (S). Balanin des noisettes, Charançon des noisettes (F). Hazel-nut weevil (E).
Haselnussbohner, Nussrüssler (D).

خنفساء من البُلُونُون طولها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم . ثوبها اغبر اللون اطحل الموج تعيش على اوراق وعقد البندق .

انثاه تمتح مكنها على الثمار فينقف عن يرقات تعيش داخل الثمرة فتلتهمها .

٤٠٤٠ - بُلُونُونُ الْكُسْتَنَاء Balaninus elephas (S).
Curculio elephas (S). Balanin des châtaignes, Charançon des châtaignes (F). Chestnut weevil (E).
Kastanienbohner (D).

خنفساء من البُلُونُون طولها يراوح من ٨ إلى ١٠ سم . ثوبها اصفر اللون يعلوه زغبة طحلاء . خطمها شاذ بطوله ودقته وتقويسه . تركيب الكستناء والبلوط وتمتج مكنها داخل الثمار فينقف عن يرقات قصيرة القد غليظة تلتهم لباب الثمر .

٤٠٤١ - بَلُوح Puits tari (F).
البئر الذاهبة الماء .

٤٠٤٢ - بَلُور الصخر Cristal de roche (F).
Rock-crystal (E). ضرب من الصوان او المرو المتحجر .

٤٠٤٣ - بَلُورَة الْفُسْتَق Rouille du pistachier
وصم فطري يعتري الفستق (اطلب ايروميس الفستق) .

٤٠٤٤ - بَلُوط Chêne (F). Oak (E).
راجع سنديان .

٤٠٤٥ - بَلُوط اخضر Chêne vert, Ballote,
Yeuse (F). Ilex (E).
راجع سنديان اخضر .

٤٠٤٦ - بَلُوط الارض Ballote fétide (F).
Foetid-horehound (E). هو الفراسيون الاسود . اطلبه .

٤٠٤٧ - بَلُوط الملك
الجوز وقيل هو الشاهبلوط (ابن سيده) .

٤٠٤٨ - بَلُوطَة Gland (F). Acorn (E).
هي ثمرة السنديان .

٤٠٤٩ - بَلُوطِيَّات، سِنْدِيَّانِيَّات
Cupuliferaceae (S). Cupuliféracées (F).
Cupuliferaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمات القملات . اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها السنديان والبندق .

٤٠٥٠ - بَلُوطِيَّة Cupuliforme (F). Cupuliferous (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالبلوط .

٤٠٥١ - بُلُونَارِيَّة *، ياسمين هندي Plumeria (S).
Plumérie, Frangipanier (F). Frangipani, Pagoda tree, Temple tree (E). Jasminsunge (D). Plumeria, Frangipana (I).

جنس اشجار وجنبات برية وزينية من فصيلة الدفليات . مهددا البلاد الحارة . انواعها المعروفة ٤ اشهرها البُلُونَارِيَّة العطرية . شجيرة حسنة الهيكل ، ساقها مخشوشب عديم الصلابة ، اوراقها متقاربة ، متعاقبة ، ممتعة ، ملمعية الشكل ، جميلة الخضار . ازهارها عشكولية التجميع ، هامة الارتكاز ، خشوية ، خاسية البلات ، جميلة الهيئة ، فواحة العرف المستحب ، يبيض اللون . يستخرج من سوقها عصارة سامة تستعمل لاستئصال الثآليل .

٤٠٥٩ - بليط Crenidens argenté (F).
راجع بليط فصي .

٤٠٦٠ - بليعة* ، غليستين ، وستارية

Glycina, Wistaria (S). Glycine, Wistaria (F). Glycine, Kidney-bean tree (E). Süßbohne, Wistaria (D). Glicinia (I).

جنس نباتات مدادة عارشة تزرع للزينة من فصيلة القرنيات الفراشية || انواعها عديدة ، اوراقها مركبة ، وريقاتها وريية العدد ، ازهارها عنقودية التجميع مختلفة الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

٤٠٦١ - بليعة خلية Wistaria venusta (S).
Glycine veloutée (F).

ساقها مدادة عارشة تطول نحو ١٠ امتار . وريقاتها زباء النصل على صفحتيه || ازهارها بيض . ازهارها عنقايد ملتكة طولها نحو ١٥ سم . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران .

٤٠٦٢ - بليعة صينية Wistaria sinensis (S).
Glycine de Chine (F).

ساقها مدادة عارشة تطول من ١٥ الى ٢٠ م . وريقاتها ملساء النصل الباهت الخضار || ازهارها عطرية الرائحة ، بنفسجية او بنفسجية موشة بالابيض || ازهارها عنقايد رهلة يراوح طولها من ٢٠ الى ٣٠ سم . تنويرها يستمر من نيسان الى حزيران || ثمارها قرون مستطيلة زباء البشرة . بزورها بيضية الشكل مقلطحة .

٤٠٦٣ - بليعة كثيرة الزهر

Wistaria floribonda (S). Glycine floribonda (F).
ساقها مدادة عارشة تطول نحو ١٥ م . وريقاتها ملساء النصل كثيرة العدد من ١٥ الى ١٩ || ازهارها مختلفة الالوان فيها الابيض والموشح والوردي والبنفسجي . ازهارها عنقايد متوسطة الكثافة ، كثيرة العدد ، طولها نحو ٢٠ سم . تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٤٠٦٤ - بليعة يابانية Wistaria japonica (S).
Glycine du Japon (F).
ساقها مدادة عارشة تطول نحو ٣ امتار . وريقاتها ملساء النصل مستدقة العقصة || ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون . ازهارها عنقايد رهلة يراوح طولها من ١٥ الى ٣٠ سم . تنويرها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

٤٠٦٥ - بليج Myrobalan belleric (F).
Belleric myrobalan (E).
راجع اهليج بليج .

٤٠٦٦ - بليو اثنولوجية Paléothnologie (F).
Paleoethnology (E).
علم يبحث في خصائص الشعوب من الاثار والتعجرات العائدة الى زمن ما قبل التاريخ .

٤٠٦٧ - بليوبسيولوجية Paléobiologie (F).
Paleobiology (E).

البليوبسيولوجية علم يبحث في منافع الحياة ابتداء من البقايا العضوية او الاحافير المحفوظة في بعض الطبقات الحصلية (الجيولوجية) .

٤٠٦٨ - بليوجغرافية Paléogéographie (F).
Palaeogeography (E).

البليوجغرافية ، اي جغرافية الاحقاب الجيولوجية ، تدرس

٤٠٥٢ - بلون Bellone (F).
البلون كوكب سيار من انحنس مركزه بين المريخ والمشتري .

٤٠٥٣ - بليحة* Onchidium (S).
Onchide, Onchidie (F). Onchidium (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات ، معديات الارجل ، رئوية ، وفصيلة البزاقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها هندية الهند تعيش في المياه العذبة || جسمها مرباطة عادمة الصدف ، بيضية الشوزن ، محدبة المصفاة العليا ، مسطحة السفلى المطوقة بحتار الرداء المجذع . رؤوسها مبطلة ثنائية اللواس المنذفة . التجوييف الرئوي خلقي الارتكاز يغلفه الرداء .

٤٠٥٤ - بليس* زهر اللؤلؤ ، شاش القاضي

Bellis (S). Pâquerette (F). Daisy (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها ضمية قرصية سمكة النصل . ازهارها رئوسية فردية تاجية يحملها زناد دقيق شمراخي الشكل || اشهر انواعها التزيينية ما يلي .

٤٠٥٥ - بليس مستدير الورق Bellis rotundifolia (S).
Pâquerette à feuilles rondes (F).

نوع من البليس يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . اوراقه معنقة ثلاثية او خماسية الاصلع . نصلها خلي البشرة مهدب . ازهاره محمولة على شمرايح مستطيلة ، طباهها اصفر اللون لسيناتها بيض ومنها ليلكية || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٤٠٥٦ - بليس معمور Bellis perennis (S).

Pâquerette vivace, Petite Marguerite, Fleur de Pâques, F. de paturage, Mère Gigogne (F).
Bruse-wort, Daisy (E). Gänseblume, Margarethenkraut, Wildes massliebchen (D). Bellide, Margaritha, Pratellina (I).


نوع من البليس يملو من ٤ الى ١٥ سم . اوراقه معنقة وحيدة الضلع ، زباء النصل ، عنقها مجنح القاعدة . ازهاره محمولة على شمرايح دقيقة طباهها اصفر اللون ، لسيناتها بيض او وردية || ضروره عديدة تختلف بالوان ازهارها . ازهاره يستمر من اذار الى تشرين الثاني .

٤٠٥٧ - بليسان Dichroa febrifuga (S).

Dichroa fébrifuge (F). Dichroa febrifuga (E).
شجرة طبية برية وزراعية من فصيلة السفسريات . منبتها يمتد من الهند الى ايران . ساقها فرعاء . هيكلها هيكل الارطنسيا . تملو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها ابيدة ، معنقة ، متقابلة ، اهليلجية ، ذلقة الاطراف ، منشارية الحفاف . ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها تبدو بنفسجية ثم تتحول الى الزرقة . ثمارها عنبية زرقاء اللون تستعمل كدافعة للحمى في الهند والافغان وايران .

٤٠٥٨ - بليساندر Palissandre, Palixandra (F).

Purple wood, Rose wood (E).
خشب فاخر الصنف يقطع من بعض انواع الساسم . تصدره البرازيل والهند الشرقية وبعض مناطق افريقية الغربية || وهو من الاخشاب الشديدة الصلابة المتاسكة الرقعة الناعمة . لونه الى البنفسجي العابق الاسمر . رائحته عطرية مستحبة .



بليحة



بليس



بليعة

الزعانف ، اجناسها وانواعها عديدة . اعطائها بحار البلاد الحارة والاستوائية . جميعها زاهية الالوان الجميلة . اسنانها مندرجة كأنها منقار الببغاء .

٤٠٨١ - بَنَات نَعَش الصُغرى

la Petite Ourse (F).

كوكبة من النجوم مشهورة باسم الدب الاصغر . اطلبه .

٤٠٨٢ - بَنَات نَعَش الكُبرى

la Grande Ourse (F).

كوكبة من النجوم مشهورة باسم الدب الاكبر . اطلبه .

٤٠٨٣ - بَنَات وَرْدَان

Blattidae (S).

Blattides, Blattiens (F). Blattidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة السرناقيات اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع البلاد المعمورة . اكثرها من الحشرات القارضة المؤذية . قوتها المواد العضوية والنباتية . معظمها يعيش على الارض يألف الاماكن الرطبة المظلمة وبعضها يعيش على سطح الماء .

٤٠٨٤ - بَنَات يَوْم

Ephemeridae (S).

Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).

هي الزخرفيات ، فصيلة حشرات من الهوام .

٤٠٨٥ - بَنَاتَة

Square, Jardin d'agrément (F).

Square, Enclosed garden (E).

هي الروضة العشب النضرة . وقد استعملها الامير مصطفى الشهابي للدلالة على هذا النوع الخاص من حدائق التزيين الذي يختلف بترقيته عن الحديقة العادية والروضة وغيرها .

٤٠٨٦ - بَنَاتَة

Ligne directe descendante (F).

جبل النسب المابط . Descending direct line (E).

٤٠٨٧ - بُنْبُك

Requin-marsouin (F).

Lamna, Mackerel shark (E).

٤٠٨٨ - بُنْبُك أَزْرَق *

Carcharhinus glaucus (S).

Requin bleu (F). Blue Shark (E).

سمكة بحرية سرلودة مفترسة من فصيلة البنبكيات . اعطائها جميع بحار العالم باستثناء القطبية || تعتبر من أسرع اسماك الفصيلة وأشرسها خلقاً وابطشها || مسرحها العادي يمي في الاغواط وتمخر سطح الماء وتواكب السفن في اسفارها وتقترب من المراقب || جسمها وشعي الشكل ، يطول نحو سبعة امتار . ثوبها الى الزرقة البحرية . ظهرها سبوري الموج . بطنها اغير ابيض . رأسها مخروطي الشكل . خطمها شارف . فها لاطم . مستعرض الشدق . اسنانها متراصة ، مزوانية الاطراف الحادة كالخناجر . زعنفتها الظهرية الامامية كبيرة القد ، مقعرة ، مغلوقة || الاثني معتدلة الشار تضع في كل مرة ، بين اواسط ايار واواخر حزيران نحو ٣٠ مجراً || لحمها معتدل الصلابة ، كاعن الصنف لا يؤكل . تصاد لمسكها وزيتها .

٤٠٨٩ - بُنْبُكِيَات

Carcharhinidae (S).

Carcharhinidés (F). Carcharhinidae (E).

فصيلة اسماك سرلودة مفترسة من رتبة الاشلاق السنفيات . اعطائها معظم بحار العالم واخصها بحار البلاد الحارة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو عشرين || اجسامها مستطيلة .

امتداد البحار والرواسب التي تركتها عبر الازمنة الحالية المتعاقبة من تاريخ الحصلية الارضية .

٤٠٦٩ - بَلْيُوسَانِي

Paleocène (F).

Palaeocen (E).

اسم يطلق على اقدم عصر ، اي الاول ، من عصور الحقبة الثالثة || يتميز برواسبه المتفاوتة الكثافة التي تركتها مياه البحار عند تقلصها وانسحابها .

٤٠٧٠ - بُمْبِيَكْس

Bombyx

راجع قزفة .

٤٠٧١ - بُنْ *

Coffea (S). Caféier, Cafier (F).

Coffee tree (E). Kaffeebaum (D). Caffé, Albero del caffè (I).

جنس شجيرات برية وزراعية من فصيلة الفويات . مهدا بلاد الحبشة ومنها انتقلت بواسطة العرب الى اليمن والهند وأمريكا || اقليمها الزراعي جميع المناطق الحارة والاستوائية التي لا تهبط حرارتها الدنيا دون العشر درجات || أوراقها دائمة الخضار الزاهي ، متقابلة ، معتقة ، بيضيه ، رحيمة الزام الاخير ، متعجبة النصل . ازهارها ابطية الارتكاز ، بيضاء اللون ، عطرية مستحبة العرف . ثمارها شبه نووية . عجائتها ثنائية الحبة . حبوبها منبسطة اخدودية من الداخل ، محدودة من الخارج لوئها الى الخضار البحري . وحة البن تفقد قوة الانبات بسرعة لذلك يجب بذرها قبل مرور ثلاثة اسابيع على جنبها . منهم من سماه «قهوة» في حين ان القهوة هي نقيع البن المحمص المسحوق المغلي في الماء || أشهر ضروبه الزراعية البن اليمني وبن موكا والبن الحبشي الحرري وبن البرازيل والكونغو وغينية وليبرية .



بن

٤٠٧٢ - بَنَات الرعد

Truffe d'hiver (F).

Winter truffle (E).

اطلب كم شتوي .

٤٠٧٣ - بَنَات أَخْدَر

Onagres (F). Onagers (E).

هي حمر الوحش .

٤٠٧٤ - بَنَات الشيوخ

Herniaire glabre (F).

Turk's herb (E).

اطلب نومان أمد .

٤٠٧٥ - بَنَات العيد

Coccinellidés (F).

Coccinella (E).

راجع دعسقيات .

٤٠٧٦ - بَنَات الماء

Sireniens (F). Sirenia (E).

راجع خيلانيات .

٤٠٧٧ - بَنَات اوبر

Truffe grise (F).

Grey truffle (E).

اطلب كم أمد .

٤٠٧٨ - بَنَات عِرْس

Mustélinés (F).

Mustelinae (E).

ردف او عشيرة من فصيلة السموريات تشمل ابن عرس والسمور والدلق والقاقوم .

٤٠٧٩ - بَنَات عروهن

Champignons (F).

Mushroom, Fungus (E).

هي الفطور .


٤٠٨٠ - بَنَات مِصْقَار

Scaridés (F). Scaridae (E).


فصيلة ابي مصقار من الاسماك العظمية الشائكات




بنك أزرق



بقت العيد



بنت طبق




بنت وردان



بشكرين



بُنتول أشهب



بنتويه

schabe, Hausschabe (D).

حشرة صغيرة الجثة طولها نحو ١٥ م. ثوبها الى البني الفاتح الزاهي || اجنحتها كبيرة مستطيلة تمتد على محيط جسمها .

٤٠٩٩ - **بَنَشْكُرِين** * Pentacrinus (S).

Pentacrine (F). Pentacrinus (E).

جنس حيوانات بحرية من زنايق البحر الشوكيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . جميعها لدية تعيش في الاعماق التي تراوح غورها من ٢٥٠ الى ٢٠٠٠ م. || جميع اعضائها خماسية التركيب المضاعف . مجموعاتها في القاع تبدو كروج خضراء مترامية الاطراف .

٤١٠٠ - **بَنَشَلَسَة** ° Panchalassa (F).

Panchalassa (E).

اسم يطلقه علماء الجيولوجية والجغرافية على ايم اي على مجموعة البحار التي تغمر الكرة الارضية .

٤١٠١ - **بَنَشُو** Bonto

حيوان نهري لبون يدعى ايضاً بوتو الامازون ، اطلبه .

٤١٠٢ - **بَنَشُول** ° Pennatula (S).

Pennatule (F). Pennatula (E).

جنس حويئات بحرية من المزهاريات وفصيلة البنتولييات . انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها شبه اسطوانية الشكل متباينة الالوان . اشهر انواعه البنتول الاشهب .

٤١٠٣ - **بَنَشُولُ أَشْهَب** ° Pennatula grisea (S).

Pennatula grise (F).

نوع من البنتول . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . مدبخته شبه اسطوانية الشكل منتصبة عمودياً تكسوها الازهار ابتداء من الثلث الاول . لونها الى الشبهة وتصبح فسفورية مضيئة في زمن التناسل وذلك يعود الى مجموعات الحبيرات المستدة من القوة والتي تحوي بعض المواد الدهنية المضيئة .

٤١٠٤ - **بَنَشُولِيَّات** ° Pennatulidae (S).

Pennatulidés (F). Pennatulidae (E).

فصيلة حويئات بحرية من المزهاريات الحلسونيات . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها البنتول .

٤١٠٥ - **بَنَشُومَة** * ، عَنَمَ أَرْوَيْ ، زَرْقُ الطَيْر ،

دَبَقُ مُقَدَّسٍ ، دَبَقُ البَلَطُوط ، دَبَقُ

السِنْدِيَّان ، لُورَنْتُس

Loranthus europaeus (S). Loranthe d'Europe, Gui

de chêne (F). Continental mistle toc, European

mistle toc (E). Eichenriemenblume, Mistel (D).

Vischio, Pania europea, Viscara (I).

نبات من الحضاليات الطفيلية التابعة الى فصيلة الغنميات . يركب الاجاص والتفاح والكستنا والسنديان ، يعيش على فروعها واغصانها فيؤذيها وقد يميتها .

٤١٠٦ - **بَنَج** Atavisme (F). Atavism (E).

البنج هو الرجوع الى الاصل . من بنج رجع الى اصله . والبنج هو الاصل والبنك ايضاً .

٤١٠٧ - **بَنَج** Hyoscyamus (S).

Jusquame (F). Hyoscyamus (E).

جنس نباتات عشبية برية جحالية من فصيلة الباذنجانيات.

وشعية الشكل ، ثنائية الزعانف الظهرية والبطنية ، كبيرة الزعانف الشرجية . اعطامها ذلقة شارفة . استناتها كالتناجر تمزق وتبقر كل شيء || تتميز بنياستها المجهزة باغشية سادنة وتتميز بسرعة الانتقال وبقساوة الاخلاق الشرسة وبالنهم والضراوة المفرطين . تتعدى على الانسان وتراقق المراكب والبواخر || اشهر اجناسها البنك والسينتل والجلاد .

٤٠٩٠ - **بَنَّة**

البنة هي رائحة العود عند احتراقه ورائحة كل نبات أو اوراق تحترق معها كان عرفها || والبنة هي رائحة مرايض الغنم والماعز والظباء والبقر .

٤٠٩١ - **بِنْتُ الْعِيد** * ، دُعْسُوقَة Coccinelle (F).

Coccinella (E).

جنس حشرات نافعة مقرنة من فصيلة الدعسوقيات انواعها عديدة جميعها صغيرة القد محدبة الشكل طولها يراوح من ٣ الى ٧ م. اثنائها مختلفة الالوان يكثر فيها الاحمر يعلوه تبقيع اسود او تنقيط ابيض .

٤٠٩٢ - **بِنْتُ الْقُنْصُل** Fille de Consul (F).

Easter flower (E).

اطلب عنجد جميل . نبات من الفريونييات .

٤٠٩٣ - **بِنْتُ النِّقَا** Chalcide (F). Chalcides (E).

هي الدساسة ، اطلبها .

٤٠٩٤ - **بِنْتُ طَبَق** * Emys palustris (S).

Emyde bourbeuse, Tortue émyde (F). Marsh-tortoise (E).

نوع من الحسة تعرف بحسة المناقع وهي سلحفاة صغيرة القد طولها نحو ٣٠ سم . تعيش في الهور وفي المناسقع المستقرة المياه . قوتها الاسماك والضفادع والبرقيات .

٤٠٩٥ - **بِنْتُ وَرْدَان** * ، صُرْصُور Blatte, Cafard, Cancrelat (F). Blatta, Cockroach (E).

جنس حشرات من بنات وردان انواعه ٦ اعرفها ٣ تتميز بقرونها الاستعمارية الطويلة وهي مدبولة في معظم مطابخ وافران وبيوت ومراحض البلاد حيث تأكل الخبز والسكر واللحم وجميع ما تقع عليه من مواد عضوية .

٤٠٩٦ - **بِنْتُ وَرْدَانِ المَطَايِخ** ، صُرْصُور شَرْقِي Blatta orientalis (S). Blatte orientale, Blatte des

cuisines (F). Common cockroach (E). Orientalische schabe, Küchenschabe (D).

حشرة طولها نحو ٢٥ م. ثوب ذكورها الى البني العايق اما الاناث فسود . اجنته الذكر كبيرة تغطي كامل الجسم اجنته الانثى صغيرة قصيرة .

٤٠٩٧ - **بِنْتُ وَرْدَانِ امْرِيكِيَّة** ، صُرْصُور امْرِيكي Periplaneta americana (S). Blatte américaine (F).

American Cockroach (E). Amerikanische Schabe, Karkerlak (D).

حشرة طولها نحو ٣٥ م. ثوبها الى البني المتاوج اثنائها اعيق لوناً من ذكورها || اجنته الذكر كبيرة مستطيلة تشرف على الجسم .

٤٠٩٨ - **بِنْتُ وَرْدَانِ جِرمَانِيَّة** ، صُرْصُور جِرمَانِي Blatella germanica (S). Blatte germanique (F).

German cockroach, Croton bug (E). Deutsche

٤١١٤ - **بنجر** Betterave (F). Beet-root (E).
هو الشندر، اطلبه .

٤١١٥ - **بنجكشت** Agneau-chaste (F).
هو الارثد جنبه طيبة معمرة .

٤١١٦ - **بنجوان** Linder (S).

Benjoin (F). Benzoin (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وتريينية من فصيلة الفاريات .
انواعه عديدة . اوراقه عابله ، متعاقبة . ازهاره ثنائية
المسكن ، سداسية الفصل المتساوية ، فستقية اللون .
اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٤١١٧ - **بنجوان مخزني** * Linder Benzoin (S).
Benjoin officinal (F).

نوع من البنجوان شجيرة سبروتية تعلو نحو ٤ امتار
اوراقه اهليلجية الشكل تطول من ٥ الى ١٥ سم . نصلها
مالس البشرة ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى .
ازهاره تسبق الاوراق وهي نورية التجميع ، محورية
الارتكاز . نورتها تعد من ٣ الى ٦ ازهار . ثماره لحمية .
بيضية الشكل ، حمضية القند ، قرمزية اللون .
اخشاها ولحاء اخشاها عطرية الرائحة يستخرج منها بعض
الادهان الطيبة ومادة صمغية تدخل في معظم تراكيب
القناديد لتثبيت عطورها .

٤١١٨ - **بنجوان مقصص** Linder obtusiloba (S).
Benjoin à lobes obtus (F).

نوع من البنجوان مهدد الصين واليابان . شجيرة صغيرة
القند تعلو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه لاقياسية الشكل
منها الكاملة ومنها الثلاثية التفصيص المقطوعة . نصلها
مالس البشرة ، اخضر الصفحة العليا ، بحري السفلى .
ازهاره نورية التجميع . نورته ابطية الارتكاز
تعد من ٨ الى ٨ ازهار || اخشاها صناعية جيدة
الصنف .

٤١١٩ - **بنجوان ناعم** Linder sericea (S).
Benjoin soyeux (F).

نوع من البنجوان مهدد اليابان . شجيرة تعلو من ٦ الى
١٠ امتار . اوراقه اهليلجية تطول نحو ١٠ سم . نصلها
خمي البشرة على صفحتيه . ازهاره نورية محورية .
نورته تعد من زهرتين الى اربع زهرات || اخشاها صناعية
جيدة الصنف قليلة الادهان والمواد الصمغية .

٤١٢٠ - **بنجيات** Panagaeidae (S).
Panagédés (F). Panagaeidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة ||
اجسامها صغيرة ، تطول من ٧ الى ١٥ مم . رؤوسها
صغيرة ، طليقة . عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية
خيطة مركبة من ١١ فصلة . تأثيرها وفكوكها قياسية .
ملاصها هليبة الفصل الطرفية . كواسلها مكورة محصورة .
اغماها ملونة ، تساعية الاخاديد النحيلة القاطبة . قوائمها
نحيلة معتدلة الطول || يجمعها مفترسة . يكثر وجودها تحت
الحجارة والجشالة في المواقع الرطبة . تلجأ في الشتاء الى
جلود الحور والصنصاف حيث تستتر بالحاء || اشهر
اجناسها البسجة .

سوقها منتصبه غليظة زباء . اوراقها رحيمة ، مفترسة ،
متعاقبة ، حاضنة ، كبيرة النصل ، زغبية البشرة .
ازهارها كبيرة القند ، ابطية وتاجية الارتكاز ، خشوية ،
خماسية البتلات المندمجة . ثمارها حقبة ، رباعية الغريقات
قصبولية الغطاء . بزورها مفلطحة مخروطية الغشاء .
انواعه المعروفة تقارب المشرة . جميعها من النباتات الحولية
الطبية التي يستخرج منها بعض المواد النافعة || اشهرها
البنج الأبيض والاسود والذهبي والمغربي .

٤١١٨ - **بنج أبيض** * ، سكران Hyoscyamus albus (S). Jusquiame blanche (F). White
henbane (E). Weisses bilsenkraut (D). Giusquiamo
bianco, Jusquiamo (I).

بجلة عشبية برية غليظة الساق ، قليلة الفروع تعلو نحو
٥٠ سم . ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون تعلو بياضها
مواج تبني . تكثر في المواقع الرطبة والارربة المتوسطة
الاندماج .

٤١١٩ - **بنج أسود** * ، سكران Hyoscyamus niger (S). Jusquiame noire, Poclée,
Potelée, Hannebane, Herbe aux poules (F). Hen-
bane, Hen-ball, Hyoscyamus (E). Schwarzes bilsen-
kraut (D). Giusquiamo nero, Favo porcino (I).

بجلة عشبية برية غليظة الساق فروعها تعلو من ٦٠ الى ٨٠
سم . اوراقها كبيرة كريمة الرائحة . ازهارها كبيرة تبني
مبضعة بالاحمر الأرجواني || يكثر وجودها في الارربة
الرطبة .

٤١١٠ - **بنج المغرب** ، بثنينة Hyoscyamus fateslez (S). Jusquiame de l'Atlas (F).
بجلة عشبية برية غليظة الساق المنتصبه . تعلو نحو ٥٠ سم .
فروعها كثيرة . اوراقها متوسطة القند ، زباء النصل .
ازهارها قصيرة الاذن ، فستقية اللون موشجة بالاحمر الأرجواني .
مهددا جبال الاطلس . تكثر في المواقع الرطبة .

٤١١١ - **بنج ذهبي** Hyoscyamus aureus (S).
Jusquiame dorée (F).
بجلة عشبية برية نحيلة الساق المنتصبه . تعلو نحو ٤٠
سم . فروعها قليلة . اوراقها صغيرة كثيفة الزغب .
ازهارها طويلة الاذن ، ذهبية اللون مبضعة بالاحمر .
تكثر في الاراضي الرطبة القليلة الاندماج .

٤١١٢ - **بنسجة** Pangaea (F). Pangaea (E).
البنسجة من بنج اي الاصل . اسم يطلقه علماء الجيولوجية
والجغرافية على الكرة الارضية عندما كانت لا تزال كتلة
كودلية واحدة ، أي منذ تكوينها حتى زمن تجزئها وانقسامها
الى قارات .

٤١١٣ - **بنسجة** * Panagaeus (S).
Panagée (F). Panagaeus (E).
جنس حشرات قانصة من فصيلة البنجيات ورقة غديات
الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة في
بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها
تطول من ٨ الى ١٢ مم . رؤوسها صغيرة ، طليقة . عيونها
صغيرة ، ناشزة . قرونها الاستشعارية خيطة ، مستطيلة .
تأثيرها وفكوكها قياسية . ملاصها مهدبة الفصل الطرفية .
كواسلها محدودة . اغماها لاحقة ، تساعية الاخاديد
النحيلة القاطبة . بطونها مفلطحة . قوائمها نشيطة . اثوابها
مبقعة ، يكثر فيها الاسود يملوه تبقيع احمر || الحشرة
الجملانة قانصة . البرقة والنجمة وقانصة .



بنج ابيض



بنج اسود



بنسجة



بنجوان مخزني



بندا

baum, Gemeiner schüsserbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

جنية برية من فصيلة القرنبيات. فروعها وافنانها قليلة. أوراقها مركبة. وريقتها صغيرة زلقة. أزهارها الى البيضاء الاخضر الموج. ثمارها حنابل ثخينة شائكة تغلف بعض البزور الكروية الشكل الآحية التركيب. وبزورها هذه تدعى الرمه وعين القط وهي من المقويات وتستخدم في الهند كدافئة للحميات وضد نهش الافاعي السامة.

Aveline, Noisette (F).

٤١٢٨ - بَنْدُقَة

Hazel-nut (E).

ثمرة البندق.

Corylacées, Corylées (F).

٤١٢٩ - بَنْدُقِيَّات

Corylaceae (E).

سبط من الفصيلة البتولية السوملية. اشهر اجناسه البندق.

Pandalus (S).

٤١٣٠ - بَنْدُكَل *٥

Pandale (F). Pandalus (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة القريدسيات. انواعه المعروفة عديدة معظمها يعيش في بحار البلاد الباردة وبعضها في بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || جميعها كبيرة القد. مستطيلة الاخطام والزياني، جميلة الالوان القسطانية ازاهرة || لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها.

Pandura (S).

٤١٣١ - بَنْدُور *٥

Pandora (F). Pandura (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة البندوريات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداقها صغيرة بابوجية الشكل، لا متساوية المصارع والاضلع. المصراع السفلي مسطح الصفحة يكتم اطراف العلوي، وهي بيضاء اللون لؤلؤية || اجسامها قصيرة المشاعب الطليقة المهذبة الاطراف. تعيش لاصقة بالصخور المغسورة بالماء.

٤١٣٢ - بَنْدُورَة، طَمَاطِم، قُوطَة

Solanum lycopersicum (S). Tomato, Pomme d'amour, Pomme d'or (F). Tomato, Love apple (E). Tomaten, Kirschentomaten, Goldapfel (D). Pomodoro, Tomatò, Pomo d'amore (I).

جنس نباتات عشبية بقلية زراعية من الفصيلة الباذنجانية. مهده امريكه الحارة ومنها تمت زراعته انعام || انواعه وضروبه كثيرة العدد، جميعها مأكولة الثمار تختلف باختلاف الشكل والحجم وسرعة النمو والادراك || اما قيمة الثمرة الغذائية فقليلة لكنها غنية بالفيتامينات والحوامض النافعة. يوجد فيها:

٧٦.٠٪ من المواد الازوتية.

٣٢.٠٪ من المواد الدهنية.

٨٩.٣٪ من المواد الهيدروكربونية.

اشهر انواعه الرئيسية تتبع.

٤١٣٣ - البندورة البَلَحِيَّة *

Lycopersicum microcarpum (S). Tomato olive (F).

ثمارها كثيرة صغيرة بلحية الشكل مدبة القيد والطرف.

Aelurus (S). Panda (F).

٤١٢١ - بَنْدَا *

حيوان من الراتونيات وحيد الجنس والنوع. جثته تطول نحو ٦٠ سم. وذيله ٤٣ اما ارتفاعه فتحو ٣٦ سم. وهو قريب الشبه من السنور رأسه مستدير الشكل، فروته مستطيلة الصوف الناعم. موطنه المقلب الجنوبي الشرقي من جبال هملايا. يألف الغابات. قوته الثمار والحبوب وبعض الحشرات. نيرج الذكر منه فواح الرائحة المسكية.

Macaque rhésus (F).

٤١٢٢ - بَنْدَار

هر الماكاك الرئيس، اطلبه.

Corylus (S). Noisetier (F).

٤١٢٣ - بَنْدُق، جِلْدُوز
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة البتوليات السومليات. انواعه قليلة. جميعها من نباتات المناطق المعتدلة. اشجارها فناء ترغب في الاراضي العميقة الغور. افنانها ملساء، غيداء. أوراقها عالية متعاقبة معتقة، قلبية، مسننة الحافة، زغبية السطح الاسفل من النصل. أزهارها وحيدة المسكن. الذكرية منها قدية، اسطوانية طويلة. الانثوية نورية عذقية وردية اللون. ثمارها صغيرة يختلف شكلها مع نوعها، جميعها خشبية الغلاف الاملس تحوي بذرة واحدة فلقية مأكولة، طيبة الطعم. يستخرج من بزورها دهن يقوم مقام دهن اللوز. اشهر انواعها الزراعية الثلاثة التالية.

٤١٢٤ - بَنْدُق بَرِّي، جِلْدُوز بَرِّي، إِيْلَاوسن

Corylus sylvestris (S). Noisetier franc, Coudrier sauvage (F). Wild filbert (E). Wilder hazel (D). Avellano salvatico, Nocciuolo salvatico (I).

شجرة دائمة فناء عديدة الضروب. تملو من ٦ الى ١٠ امتار. مهدها آسيا الصغرى والبلقان. ساقها ملساء، فروعها وافنانها كثيفة، أوراقها جوئية اللون زياء الصفحة السفلى. ثمارها صغيرة خلية القشرة مستطيلة الشكل || تعيش في جميع الاثربة المتوسطة الاندماج.

٤١٢٥ - بَنْدُق تَرْكِي، جِلْدُوز تَرْكِي، قَيْطَاقِيَا

Corylus colurna (S). Noisetier de Turquie, Coudrier de Byzance (F). Filbert, Hazel, Constantinople hazel (E). Türkische hazel, Baumhazel (D). Avolano di Costantinopoli, Nocciuolo di Costantinopoli (I).

شجرة كبيرة هرمية الشكل تملو من ١٥ الى ٢٠ م. ساقها غليظة طحلاء اللون صلفاء اللحم الملساء. فروعها وافنانها متوسطة الكثافة. أوراقها لامعة النصل، كبيرة الحجم ثمارها قلبية الشكل || ترغب في الاثربة المتوسطة الاندماج العميقة الغور.

٤١٢٦ - بَنْدُق مَعْرُوف، جِلْدُوز عَادِي

Corylus Avellana (S). Noisetier commun, Avelinier, Coudrier (F). Filbert, Hazel-nut tree (E). Haselstrauch, Hasel, Nussbaum, Haselnuss (D). Avellano, Nocciuolo, Bacuccola (I).

شجرة متوسطة القد تملو من ٤ الى ٧ امتار. ساقها ملساء، فروعها كثيفة متدية الاطراف. أوراقها قلبية مسننة الحافة، ثمارها صغيرة قلبية الشكل مدبة الخاتم. تعيش في جميع الاثربة، ترغب في الاراضي العميقة الغور المتوسطة الاندماج.

٤١٢٧ - بَنْدُق هِنْدِي، قَارِح، جَوْز لَرَقَة


Caesalpinia bonduc (S). Bonduc, Chiquier, Chicote (F). Bonduc, Bonducella, Nicker tree (E). Nicker-



بندق معروف



بندق هندي



بندل



بندور



بندورة بلحية



بندورة سبحية



بندورة شائعة



بندورة عنقودية



بندورة كرزية



بنسمون



بنغار



بنغاز

٤١٣٤ - البندورة السبحية *

Lycopersicum rosarigerum (S). *Tomate en chapelet* (F).

ثمارها سبحية التجميع اجاصية الشكل منخفضة القيد والخاص سمكة اللب قليلة العصارة .

٤١٣٥ - البندورة الشائعة *

Lycopersicum esculentum (S). *Tomate mangeable* (F).

ضروبها عديدة وثمارها مختلفة الاشكال والاحجام تغلب فيها الامتدانة والتبطين مع كبر القد .

٤١٣٦ - البندورة العنقودية *

Lycopersicum racemigerum (S). *Tomate en grappes* (F).

ثمارها عنقودية التجميع ، صغيرة القد قلبية الشكل .

٤١٣٧ - البندورة الكرزية *

Lycopersicum cerasiforme (S). *Tomate cerise* (F).

ثمارها كرزية الشكل متوسطة الحجم ، سمكة اللب ، قليلة العصارة والبزور .

٤١٣٨ - بندوريات *

Pandoridés (F).

Pandoridæ (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها متباينة الاشكال لانتساوية المصارع والاضلع . اجسامها صغيرة . مشاعها قصيرة ، طليقة ، مهدبة الاطراف || اعرف اجناسها واشهرها البندور والميقم .

٤١٣٩ - بنترهير *

Limon d'Egypte (F).

Egyptian small lim -ر .

اطلب ليمون مالح .

٤١٤٠ - بنسمون* ، خماسية الاسدية

Pentstemon (S). *Pentstemon* (F). *Pentstemon* (E). *Bartfäden, Funffäden* (D). *Pentstemon* (I).

جنس نباتات بحلية معمرة من فصيلة الخنازيريات مهدا امريكة الشمالية . انواعها قليلة منها الجنبيات والبعجلات والاعشاب . اوراقها متقابلة لسنة . ازهارها عنكولي التجميع . ازهارها خماسية الاسدية بحيلة الالوان الزاهية المختلفة . اشهر انواعه التزيينية :

٤١٤١ - بنسمون أحمر *

P. punicens (S).

P. rouge (F).

٤١٤٢ - بنسمون أبيض *

P. glaber (S).

P. glabre (F).

٤١٤٣ - بنسمون اهليلجي *

P. ovatus (S).

P. à feuilles ovales (F).

٤١٤٤ - بنسمون جرسى *

P. campanulatus (S).

P. campanulé (F).

٤١٤٥ - بنسمون رشيق *

P. speciosus (S).

P. élégant (F).

٤١٤٦ - بنسمون هاتك *

P. heterophyllus (S).

P. hétérophylle (F).

٤١٤٧ - بنصر *

Annulaire (F).

Ring finger, Third finger (E).

البنصر الاصبع بين الوسطى والخنصر . ج بناصر .

٤١٤٨ - بنصيريات *

Annulariae (S).

Annulariées (F). *Annulariae* (E).

فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائية . اجناسها وانواعها عديدة . جميعها من النباتات المنقرضة العائدة الى العصور السحيقة الغابرة .

٤١٤٩ - بنطافيلن *

Potentille (F). *Potentilla* (E).

اطلب بوتنتيلا .

٤١٥٠ - بنغار *

Bungarus (S).

Bungare (F). *Bungarus* (E).

بنغار هو الاسم الهندي المائلي لهذه الافاعي . جنس حيات خبيثة سامة من اماميات الاتحاديد وفصيلة الرحيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها تمتد من الافغان الى الهند وماليزية || اجسامها شبه اسطوانية قضيفة دقيقة الاذنان تطول من ١٦٠ الى ٢١٠ سم . اثنائها صفراء اللون او زرقاء يعلوها تجذيع معترض منتظم الترتيب اسود اللون او احمر .

٤١٥١ - بنغاز *

Pangases (S). *Pangase* (F).

جنس اسماء نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها معظم انهر الصين وفياتنام وماليزية || اجسامها وشعية مستطيلة . تتميز بكشافة عذباتها الدقيقة المستطيلة التي تبدو كالسبال . زعانفها الظهرية الامامية مجهزة بمناخس حادة . الذيلية فارقة || لحمها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٤١٥٢ - بنغالي ، نرطور *

Estrelida (S).

Bengali, Astrild (F). *Astrild* (E).

جنس عصافير من فصيلة الثنوطيات . انواعه المعروفة متوسطة العدد موطنها يمتد من الجزيرة العربية الى الهند ومن افريقية الشرقية الى الوسطى والجنوبية . نظامها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٠ الى ٨٠ زوجاً || اجسامها صغيرة القد ، رشقة ، قريبة الشبه بالدوري . مناقيرها صغيرة ، رقيقة ، اجنحتها واذناتها معتدلة الطول || تألف الغابات وضيقات مجاري الماء والواحات . طيرانها خفيف الحركة سريعها . قوتها البزور البرية والحشرات ومكثها وكزودها واساريمها || اكثر انواعه يألف حياة الاسر ويعيش في القفص . اشهر انواعه الازرق الطوق والاشهب الازرق والاكعب والصغير ، والاخضر والقرقوش

٤١٥٣ - بنغالي أزرق الطوق* ، نرطور أزرق

Estrelida phoenicotis (S).

Bengali cordon-bleu (F).


عصفور من البنغالي . موطنه يمتد من افريقية الوسطى الى الشرقية والجزيرة العربية . فوجه لاقياسي العدد اذ يراوح من ١٠ الى ٦٠ زوجاً || جسمه صغير القد يطول نحو ١٠ سم . ثوبه العلوي والسفلي مع جناحيه الى الشبه الصفراء المواجه يطوقها حثار أزرق في المحصرين والعنق والصدر والاطليل حتى الزمكي . ويتميز الذكر ببقعة صغيرة قرمزية اللون تتوسط كل من المحصرين . حدقة عينه شديدة الصفار || طيرانه خفيف الحركة سريعها . قوته البزور البرية ومكث الحشرات ويبط النمل || يدثن عشه في الادغال القريبة من سطح التربة . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوماً || يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص .



١. بنغالي أزرق الطوق
٢. بنغالي أشهب أزرق
٣. بنغالي اكهب



بنفسج عطر



بنفسج الثالوث الشرقي



بنفسج الثالوث النحيل

V. Hederacea (S). البنفسج العشقي الورق
Violette à feuilles de lierre (F).
اوراقها كلوية الشكل ، مسننة الحافة ، أزهارها بنفسجية
أو بيضاء اللون .

V. Odorata (S). Violette odorante (F). البنفسج العطر*
Sweet violet (E).
اوراقها قلبية مسننة الحافة ، رواكبها كثيرة وطويلة ، أزهارها
فواحة العرف .

V. papilionacea (S). البنفسج الفراشي الورق
Violette papilionacée (F).
اوراقها قلبية فراشية . أزهارها عديدة العرف بنفسجية أو
بيضاء أو صفراء اللون .

V. rotundifolia (S). البنفسج المستدير الورق
Violette à feuilles rondes (F).
اوراقها مستديرة ، أزهارها كبيرة صفراء اللون .

V. lanceolata (S). البنفسج المستطيل الورق
Violette lancéolée (F).
اوراقها مستطيلة ، رواكبها كثيرة ، أزهارها بيضاء اللون
مبضعة بالاحمر .

V. pubescens (S). البنفسج الأزغب
Violette pubescente (F).
رواكبها سطحية زباء . أوراقها كلوية . أزهارها صفراء اللون .

V. pedunculata (S). البنفسج الطويل المعلاق
Violette à longs pédoncules (F).
رواكبها سطحية . أوراقها بيضية طويلة المعاليق . أزهارها
كبيرة القند صفراء اللون .

V. canadensis (S). البنفسج الكندي
Violette du Canada (F).
رواكبها سطحية قصيرة . أوراقها قلبية . أزهارها كبيرة
القند خلية البتلات .

من الفئة الثالثة العديمة السوق ، الثلاثية الألوان ، المعروفة
باسم :

بنفسج الثالوث ، زهرة الفالوث
Viola tricolor (S).
Pensée (F). Pansy, Heart's ease, Herb trinity (E).
Stiefmutterchen (D). Pensiero (I).

نخص بالذكر أعرفها وأشهرها :

V. lutea (S). بنفسج الفالوث الأصفر
Pensée jaune (F).
أوراقها مستديرة ، أزهارها عطرية ثلاثية الألوان ، يطفي
عليها الأصفر .

V. acutis (S). بنفسج الفالوث الشرقي*
Pensée d'Orient (F).
أوراقها مستديرة شديدة التجميع . أزهارها كبيرة البتلات
ثلاثية الألوان فيها الأبيض والأصفر والأزرق .

V. calcarata (S). بنفسج الفالوث المهازي
Pensée éperonnée (F).
أوراقها مستديرة . أزهارها طويلة المهاز المدب الطرف .
قصيرة الزناد ، يطفي عليها الأبيض والأصفر .

V. gracilis (S). بنفسج الفالوث النحيل*
Pensée grêle (F).
أوراقها مستديرة . أزهارها صغيرة ثلاثية الألوان فيها
الأبيض والأصفر والليلكي .

٤١٥٨ - بنفسجيات
Violaceae (S).
Violacées, Violariacées (F). Violaceae (E).
في الفصيلة البنفسجية من ذوات الفلقتين عديدة القملات .
أنواعها زهاء ١٠٠ معظمها أعشاب صغيرة القند . أوراقها

٤١٥٤ - بنغالي أشهب أزرق* ، ترنور أشهب
أزرق

Estrela incana (S).
Bengali gris bleu (F).

عصفور من البنغالي . موطنه بعض مناطق افريقية الوسطى
والجنوبية . فوجه بعد من ٥٠ إلى ٧٠ زوجاً || جسمه
صغير القند يطول نحو ١٢ سم . ثوبه العلوي الى الشبهة
الزرقاء المواج . ثوبه السفلي الى الشبهة الفضية . رأسه
وجناحاه اعقب خضاباً من رداءه . حدقة عينه عسليه اللون ||
طيرانه خفيف الحركة سريعة . قوته الحشرات ومكئها
ويبظ النمل والبزور البرية || يدثن عشه في الادغال .
الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمنابرة الذكر
نحو ١٢ يوماً || يألف حياة الاسر ويتكاثر في القفص .

٤١٥٥ - بنغالي اكهب* ، ترنور اكهب

Estrela cinerea (S).
Bengali gris, Astrild gris (F).

نوع من البنغالي . موطنه يمتد من الجزيرة العربية الى
افريقية الشرقية والوسطى . سربه بعد من ١٥٠ الى ٥٠٠
زوج || جسمه صغير القند يطول نحو ١١ سم . ثوبه الى
الكهبة يسمر في الرأس والجناحين والذنب ويدنر في البطن .
عيناه مطوقتان باطار احمر . حدقة عينه عسليه اللون .
منقاره مرجاني اللون . رسفاه الى الكهبة || قوته الحشرات
ومكئها والبزور البرية . يدثن عشه في الادغال على ارتفاع
ثلاثة اقدام عن سطح التربة . الانثى تضع من ٤ الى ٥
بيضات تحضنها بمنابرة الذكر نحو ١٢ يوماً || يألف
حياة الاسر ويتكاثر في القفص .

٤١٥٦ - بنغاردية
Bongardia (S). Bongardie (F).

Golden rod (E). Bongardibaum (D). Bongardia (I).
جنبه تزيينية من فصيلة البرباريسيات مهدا المناطق
الشرقية الحارة . سوقها صفراء اللون . أوراقها متعاقبة
مستطيلة ، نصلها مالمس البشرة فسني اللون يعلوه مواج
وردي . أزهارها كبيرة جميلة مختلفة الألوان .

٤١٥٧ - بنفسج
Viola (S).

Violatte (F). Viola, Violet (E).

جنس اعشاب صغيرة برية وتزيينية معمرة من فصيلة
البنفسجيات . أوراقها قرصية معتقة طويلة الزناد اذنية .
أزهارها خنثوية ، محورية ، فردية ، خاسية الفصل
غير المتساوية ، مهازية الفصيلة القاعدية ، خاسية
البتلات ، مهازية البتلة السفلى . ألوانها عديدة يئلب
فيها البنفسجي والابيض || يستخرج من زهرها مادة
قلوية تدعى فيولين ويستخرج ايضاً بالتقطير عطر شيق
مستحب العرف كثير الاستعمال في الصناعات العطرية .
تجميع الأزهار صحي طبي اما الجذور فقيئة وتستعمل هذه
الغاية || أنواعه الزراعية عديدة تقسم الى ثلاث فئات .

١ - فئة الانواع العديمة السوق الوحيدة اللون .

٢ - فئة الانواع القصيرة السوق الوحيدة اللون .

٣ - فئة الانواع العديمة السوق الثلاثية اللون .

اما تعريف الفئة الاولى والثانية فهو الآتي :

Viola (S). Violette (F). Violet (E). Veilchen (D).
Violetta (I).

من فئة الانواع الاولى العديمة السوق الوحيدة اللون نخص
بالذكر :

V. Sagittata (S). البنفسج السهمي الورق

Violette sagittée (F).

أوراقها سهمية ، رواكبها قليلة ، أزهارها زرقاء اللون .

عديدة بعضها كبير الحجم بطول نحو ١٠٠ سم. ويزن من ٥ الى ٦ كيلو. والبني يتميز بحجمه المستطيل وحراشفه الدقيقة وزعانفه الكبيرة. وهو من الاسماك المأكولة العادية الصنف || أشهر أنواعه :

٤١٧١ - بُنِّي أَحْمَر Barbus grypus

٤١٧٢ - بُنِّي أروبة، برييس شائع Barbus vulgaris

٤١٧٣ - بُنِّي النيل Barbus bynni

٤١٧٤ - بُنِّي دجلة، قَهْدَة ، بِرْمِيْسِه Barbus perince

٤١٧٥ - بُنِّي طويل الرأس Barbus longisepe

٤١٧٦ - بُنِّي كبير Barbus kersin

٤١٧٧ - بُنِّي نهري Barbus fluviatilis

٤١٧٨ - بُنْيَات Coffeaceae (S), Coffeacées (F), Coffeaceae (E).

فصيلة نباتية اجناسها ١٤٠ وأنواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة. أشهرها البن.

٤١٧٩ - بُنْيَاس الشَّطْ Buniade cakile (F). نبات بري من الصليبيات يعرف بفجيلة الشط، اطلبها.

٤١٨٠ - بُنْيَة ، وَتَل Structure (F). شكل تركيب الاعضاء التي تؤلف الجسم او الاجزاء التي تؤلف الشيء.

٤١٨١ - بُنْيَة Talle (F), Sucker (E). هي الشط.

٤١٨٢ - بنيسيليوم* Penicillium (S) جنس فطور مجهرية من عمارة الهبويات وفصيلة الوقسيات. يتميز بحراب زرق مستطيل الشكل مفصلي الاطراف، تكاثره سحبة الارتكاز المنتصب، شعبة التجميع. أنواعه عديدة بعضها صحي طبي مثل بنيسيليوم نوتاتوم (Penicillium notatum) الذي يعطي البنيسيلين المشهور، وبعضها صناعي مثل بنيسيليوم كنديدوم (Penicillium candidum) الذي يستعمل في صناعة الاجبان. ومنها مؤذية ضارة تعطب الثمار وتنكس الاقتصاد الزراعي. أشهرها : بنيسيليوم ايتاليكم، بنيسيليوم اكسبسم، بنيسيليوم ديجيتاتم، بنيسيليوم كرستاسم.

٤١٨٣ - بنيسيليوم اكسبسم Penicillium expansum (S).

فطر مجهرية من الهبويات يركب ثمار التفاح المحفوظة المخدوشة البشرة من اي سبب كان فيعطها || مظهره الخارجي بقعة سمراء مستديرة تبدو صغيرة ثم تنتشر وتكبر بسرعة، يعلوها عفن اغبر ثم اطحل وينتهي باللون السبوري.

٤١٨٤ - بنيسيليوم ايتاليكم، عَفْن أَزْرَق Penicillium italicum (S), Moisissure bleue (F).

فطر مجهرية من الهبويات يركب ثمار الحمضيات فيعطها. يبدو انه لا يصيب الا الثمار المدركة المخدوشة. مظهره الخارجي بقعة صغيرة مستديرة كامدة اللون تعلو

معنقة طويلة الزناد، مستديرة النصل متعاقبة التركيب. ازهارها محورية الارتكاز، لاقياسية التجميع، خاسية الفصل والبثلاث والاسدية. اسديتها مندغمة في قرص المبيض. ألوانها باغليتها بنفسجية زاهية. اعطانها الطبيعية جميع المناطق المعتدلة.

٤١٥٩ - بنفسجية Ionopsidion

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الصليبيات. ازهارها تشبه البنفسج قالباً ولوناً. تزرع للزيين.

٤١٦٠ - بَنَفَش Améthyste (F), Amethyst (E). البنفش حجر كريم يعرف بالجمست (فريتغ).

٤١٦١ - بَنَقْم نبات يشبه الكماء (اقرب الموارد).

٤١٦٢ - بَنَقُوسِي Capitá (F), Capitate (E).

نعت تعريفي يطلق، في علم النبات، على ما كمال طرفه مكور الشكل او بيضي. ويطلق في علم الحيوان على القشريات اللامندغمة الرؤوس.

٤١٦٣ - بَنَقُوسِيَا Banksia (S).

Banksie (F), Banksia (E). جنس اشجار وجنبات برية وتزيينية من فصيلة الفصيات أنواعها عديدة مهددا استرالية. اوراقها ضخمة ثلاثية الترتيب نصلها جامد الصفحة منشاري الحافة. ازهارها خشوية قدية التجميع. ثمارها مجموعة من البزور المرسوفة على شكل اكواز الصنوبر. أشهر أنواعها التزيينية ما يتبع :

٤١٦٤ - بَنَقُوسِيَا بَهِيَّة * Banksia speciosa (S).

Banksie magnifique, B. superbe (F). جنة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها مسوية الشكل، نصلها مفروض الصفحة بارز العروق. ازهارها مستطيل السيلة اصفر اللون.

٤١٦٥ - بَنَقُوسِيَا كَبِيرَة Banksia grandis (S).

Banksie robuste (F). شجرة جميلة الشكل متوسطة الحجم تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقها كبيرة مستطيلة مثلثة الزوايا متمعة النصل ازهارها مستطيل الهريه اصفر اللون.

٤١٦٦ - بَنَقُوسِيَا مُسَنَّنة Banksia serrata (S).

Banksie à feuilles dentelées (F). شجرة جميلة القالب تعلو من ٨ الى ١٠ امتار. اغصانها زباء اللحماء. اوراقها مسوية الشكل نصلها جامد الصفحة مسنن الحافة، بارز العروق المتوازية الترتيب. ازهارها خلية حمراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

٤١٦٧ - بَنَكْرِيَّاس Pancréas (F), Pancreas (E).

راجع حلوة.

٤١٦٨ - بَنِّ هِيمُون Tamier commun (F).

هو الفاشرشين المبدول، اطلبه. Mandrake (E).

٤١٦٩ - بَنِّن Engraisser (F), To fatten (E).

بنن الشاة اربطها ليسمها.


٤١٧٠ - بُنِّي*، بِرْمِيْس Barbus (S).

Barbeau, Barbot (F), Barbel, Barbus (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة الشبوطيات. انواعها



بنفوسيا هية



بي



بنيسيليوم

القشرة ثم تتحول بسرعة الى عفن ازرق اللون يعم البقعة ويمطب القشرة والخصوص والبذور.

٤١٨٥ - بنيسيليوم ديجيتاتام، عَفْنُ أَخْضَر

Penicillium digitatum (S). Moisissure verte (F).
فطر مجهري من الهبويات يركب ثمار الحمضيات ولا يعف عن غيرها. ولكنه لا يصيب إلا الثمار المدركة الملوخوذة او المخفوشة || مظهره الخارجي بقعة او بقع مستديرة متناخسة متراصة تبدو سمراء اللون حتى ينفثها نواس العفن فتستقر على اللون الاخضر. يستعملون الآن لوقاية الثمار من هذا الفطر انفساك محلول البورق المركّز من ٦ الى ٨٪ فيغسلون الثمار ويقتونها في المحلول نحو اربع دقائق. ومن الواجب الا تقتل حرارة الماء عن ٤٦ درجة سخ ولا ترتفع اكثر من ٥٠ درجة سخ.

٤١٨٦ - بنيسيليوم كروستاسم

Penicillium crustaceum, P. glaucum (S).
فطر مجهري من الهبويات يركب معظم الثمار المحفوظة واطحصها الاجاص والعنب. كما يصيب الحبوب عند انتاشها وتحويل موادها السكرية، هذا اذا مكنته رطوبة البيئة من ذلك لانه من فئة الفطور التي لا تعيش وتتكاثر الا في المحيط المبلع الرطبة.

٤١٨٧ - بنيسيلون
Pénicillion (F). Penicillion (E).
هو عفن العسل من الفطور الخيطية النافعة.

٤١٨٨ - بنيسيقية
Ramule (F). Branchlet (E).
هي الزمرة النامية الجديدة التي تبدو كأنها قريبة من الاكاخ فيستمر نموها دون ان تورق. ج بنائق.

٤١٨٩ - بنين
Larves d'abeille (F).
راجع دجبة.

٤١٩٠ - بُسْنين ، كَافين
Caféine (F). Caffeln (E).
مادة شبه قلووية طبية مقوية ومنبهة، مرة الطعم، صلبة الذوبان في الماء البارد. تستخرج من ثمار وأوراق البن والشاي والكولا وبهشية البراغواي والكاكاهو. الخ.

٤١٩١ - بُنْيُول
Baniule (F).
هي الحبشة راجعها.

٤١٩٢ - بُنْيُول أَرْقَط
Baniule moucheté (F).
هي الحبشقة الرطماء راجعها.

٤١٩٣ - بُنْيُونِيَّة
Bignone (F). Cross-vine (E).
راجع بنونوية.

٤١٩٤ - بُهّا*، عَصِيفِيرَة ، مَجْرَاعَة

Impatiens balsamina, Balsamina hortensis (S). Balsamine des jardins (F). Garden balsam (E). Gartenspringkraut, Springkraut (D). Impazienté, Balsamina (I).
نبات عشبي حولي من البلسينيات ضروبه عديدة جميعها تزيينية جميلة الازهار المختلفة الالوان. ثمارها قرون مضلعة مدببة الزام الاخير تنفلق عن بزور كروية صغيرة القد كستنية اللون || والها يعيش ويوجد في جميع الارربة والمواقع انما يرغب في وفرة الاسمدة المعدنية.

٤١٩٥ - بُهّار* ، شُقّار
Diacope bohar (S).
سمكة كبيرة القد من الشطف وفصيلة البهاريات طولها نحو ١٠٠ سم. ثوبها ابيض اللون اشقر الموج يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر. لحمها مستحب الطعم مرغوب فيه. اعطانها البحر الاحمر والخليج الفارسي وشواطئ الهند.

٤١٩٦ - بُهّار
Anthemis
البهار ويقال له المرار وعين البقر نبات طيب الريح جعد له فقاحة صفراء تثبت ايام الربيع يقال لها العرارة. راجع اقحوان.

٤١٩٧ - بُهّار الصبّاغين

Camomille des teinturiers (F). Dyer's anthesis (E).
هو اقحوان الصباغين، اطلبه.

٤١٩٨ - بُهّار حقلي
Camomille des champs (F).
هو الاقحوان الاصفر، اطلبه.

٤١٩٩ - بُهّار قَبِيل
Anthémis noble (F).
هو الاقحوان الشريف، اطلبه.

٤٢٠٠ - بُهّار
Bohor
هو عفر الحبشة، اطلبه.

٤٢٠١ - بُهّارِيَّات
Sclaenidae (S). Scénidés (F).
فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الشطف واللوت والحرور.

٤٢٠٢ - بُهّت
البهت: حساب من حساب النجوم وهو مسيرها المستوي في يوم (السان).

٤٢٠٣ - بُهّت
Soufflage (F). Panting (E).
البهت هو عرض الانثى على الفحل الهيت للتاكيد من وداقها.

٤٢٠٤ - بُهْثَة
هي البقرة الوحشية.

٤٢٠٥ - بُهْدُل
Hyenon (F). Young hyena (E).
البهدل هو جرو الضبع.

٤٢٠٦ - بُهْدُل* ، عَسْدَلِيْب اليابان

Leiothrix lutea (S).
Leiothrix, Rossignol du japon (F).
طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القرقفيات. اعطاه تمتد من اليابان الى الهند. يألّف الاحراج والغابات. قوته الحشرات والديدان وبعض الثمار والبزور البرية. ملجئه الحياتي جماعي، افواجه قليلة العدد || جسمه صغير القد. رأسه الى السمرة العابقة. جهته ومحسراه وعنقه الى الصفرة. جوشنه الى الحمرة البرتقالية. بطنه الى البياض الاغبر. ظهره الى السمرة الزيتية. جناحه اسمر القاعدة، برتقالي الصفحة، اصفر الخثار. ذنبه فارق الطرف، اسود اللون، ابيض النمشة. منقاره احمر. رسناه واصابعه الى الجؤرة || يدثن عشه في الادغال والشجار القليلة الارتفاع. انشاء قنص اربع بيضات تحفنها بمناربة الذكر نحو ١٣ يوما.



بها



بهار



بُهْدُل

٤ الى ٦ بيضات . التزجيم يستمر نحو اسبوعين || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

٤٢١٧ - بَهْرَمَان بَاهِر °

Pericrocotus speciosus (S).

Pélicrocote splendide, Minivet splendide (F).

٤٢١٨ - بَهْرَمَان لَارِي °

Pericrocotus flammeus (S).

Pélicrocote flambé, Oiseau vermillon (F).

٤٢١٩ - بَهْرَمَان وَرْدِي °

Pericrocotus roseus (S).

Pélicrocote rose, Minivet migrateur (F).

٤٢٢٠ - بَهْرَمَة

Floraison (F). Efflorescence (E). البهرة : زهر النور ورونقه .

٤٢٢١ - بُهْرَة ° بَزْرَايَة

Porte-graine (F).

Seed-bearer (E).

ما يزرع من البقول والنباتات الصناعية وغيرها للحصول على بزورها وبشابة انسالها المنتجة . ج بهازر وبزاري .

٤٢٢٢ - بُهْرَة °

Culture de porte-graines (F).

Cultivation of seed-bearer (E).

البهرة وقدعى ايضاً زراعة البزاري ، كل زراعة تهدف الى انتاج البذار .

٤٢٢٣ - بُهَش

البهش : المقل ما دام رطباً واذا يبس فخشل .

٤٢٢٤ - بُهَش

Chêne liège, Surler (F).

Cork-oak (E). هو سديان شور .

٤٢٢٥ - بُهْشِي

Subéreux (F). Suberous (E). البهشي والفلبيني تمت وصني وتعريفي يطلق على ما كان تركيبيه كالبهش .

٤٢٢٦ - بُهْشِيَّات

Aquifoliaceae, Illicaceae (S).

Aquifoliacées, Illicacées (F).

Aquifoliaceae, Illicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها عديدة جميعها اشجار وجنبات معمرة . اوراقها متعاقبة لاطقة . ازهارها نورية التجميع ابطية الارتكاز .

٤٢٢٧ - بُهْشِيَّة

Ylex (S). Houx (F). Holly tree (E).

جنس اشجار وجنبات حرجية من فصيلة البهشيات . انواعها المعروفة ١٧٥ معظمها امريكي المنيبت . اوراقها عروية ، متعاقبة ، محزوزة النصل ، مسنة الحافة . ازهارها ابطية الارتكاز ، نورية التجميع . نورتها رباعية الازهار والبتلات والاسدية . اخشابها صناعية مرغوب فيها . لحاؤها تستعمل في صناعة الدبق . اوراقها طيبة . اشهر انواعها ما يلي :

٤٢٢٨ - بُهْشِيَّة الدَّبِق ° ، طِيم ، عُوْد الخير

Ilex aquifolium (S). Houx commun, Agrifon (F). Holly, Holm, Christmas (E). Stechhulst, Christdorn, Stechpalme (D). Lauro spinoso, Aquifoglio, Strillazzo, Agrifoglio, Azzilastro (I).

شجرة متوسطة القد ، ضرورها ثلاثة الحمرء والصفرء

٤٢٠٧ - بُهْدَلَة

البهدلة اصل اللدي . ج بهادل .

٤٢٠٨ - بُهْرَام ، بُهْرَامَج

Mars (F).

هو المريخ كوكب من الخلتس ، اطلبه .

٤٢٠٩ - بُهْرَامَج

« البهرامج من اشجار الجبال وهو ضربان ضرب منه مشرب لون شعره الحمرة ومنه اخضر هياذب النور . وكلا النوعين طيب الرائحة » (اللسان) .

٤٢١٠ - بُهْرَانَة *

Furcraea (S). Fourcrée (F).

جنس نباتات برية وزراعية معمرة من فصيلة الارجسيات . انواعه عديدة قريبة الشبه من الباهرة . اوراقها قرصية الانتشاج ، خمية النصل ، شاذكة الختار . ازهارها عنقودي الشكل . ازهارها دولابية التجميع تتميز باسديتها الغليظة المتك والحويط || اشهر انواعها ما يلي .

٤٢١١ - بُهْرَانَة مَارِدَة

Furcraea gigantea (S).

Fourcrée gigantesque, Chanvre mexicain (F).

هو النوع الزراعي المشهور بمجودة وبثانة الياف الصناعية . اوراقه تطول نحو ٢٥٠ سم . وتعرض ٢٠ سم . نصلها جميل الخضار الزاهي اللامع || عنقوده الزهري كبير القد . ازهاره عاجية اللون .

٤٢١٢ - بُهْرَانَة مُتَوَاجِعَة

Furcraea undulata (S).

Fourcrée ondulée (F).

نوع من البهرانة شمراخها يعلو نحو ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم . نصلها جامد النسيج ، بحري اللون ، متاوج الختار ، مسنن الحافة ، شوكة اسمر اللون ، اعقف الجسم . لاقط || عنقودها الزهري كبير التشبيب الجالس الانتشاج . ازهارها تبينة اللون يعلوها موج اخضر .

٤٢١٣ - بُهْرَة

Pointe crochue du bec (F).

البهرة طرف المنسر الاحجن رهرة الوادي سراته وخيره وبهرة كل شيء وسطه . ج بهر وأبهار .

٤٢١٤ - بُهْرَم ، بُهْرَمَان

Carthame (F).

Safflower (E).

٤٢١٥ - بُهْرَمَان ، ياقوت بحري

Escarboucle (F).

Carbuncle (E).

حجر كريم احمر اللون ساطع الونق والنضاء . والبهرمان ايضاً ضرب من العصفور عن الدبيري .


٤٢١٦ - بُهْرَمَان °

Pericrocotus (S).

Pélicrocote, Minivet (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المذابيات . انواعه المعروفة عشرة . اعطائها تمتد من الافغان الى الهند والصين واليابان وماليزية . تألف الغابات والمواقع الرطبة حيث تكثر الحشرات . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد . قوتها الذباب والحوام والحشرات المجتعة والذابة . اجسامها رشيقة تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . انواها جميلة

الالوان الزاهية المتراكمة والمتداخلة ، اعماها الاخر على اختلاف خضاباته والازرق والاسود والاخضر الاليس والوردي والاصفر والاشفق والاشهب || تدشن اعشاشها في الاشجار الرقيقة . انائها تحضن بمنابرة الذكور من



بهرانة



بهرمان



بهشية الدبق

٤٢٣٦ - بَهْشِيَّةُ الْحَجَر Lichen

نبات يملو الصخور يعرف بالحزاز وكشة العجوز .

٤٢٣٧ - بَهْشِيَّةُ ٥* Acrobates (S).

Acrobate, Voltigeur (F).

جنس حيوانات لبونة من الجراييات وفصيلة الفلنجريات .
أنواعه المعروفة ثلاثة . موطنها احراج استرالية وغينيا
الجديدة . قوتها اوراق النبات والازهار والثمار والعسل
والحشرات || تتسلق الاشجار وتنتقل من الواحدة الى
ال اخرى تحليقاً في الفضاء لأنها تتميز بغشاء جناحي الشكل
يمتد من الزور الى اسفل البطن || اجسامها متباينة
الاحجام ، منها الصغيرة التي لا يتجاوز طولها ١٥ سم .
بجانبه الذنب . ومنها الوسطى التي يبلغ طولها نحو ٣٥ سم .
بجانبه الذنب الذي لا يقل طوله عن طول الجسم . رؤوسها
مخروطية الشكل . قوائمها خماسية الاصابع ، حادة الاظافر .
اصوافها ناعمة لبدة اذناها مستطيلة ، مزدوجة التصفيف
الوبري || سرعها دجوي . اناثها رباعية الاخلاف .



بَهْشِيَّةُ الشاي



بَهْشِيَّةُ الشاي



بَهْشِيَّةُ الشاي



بَهْشِيَّةُ الشاي

٤٢٣٨ - بَهْشِيَّةُ ٥* Betail (F). Cattle, Livestock (E).

اطلب ماشية .

٤٢٣٩ - بَهْشِيَّةُ ٥*

البهية هو الصغير من اولاد الغنم والماعز والبقر وغيرها .
الذكر والانثى فيها سواء . والجمع بهم وبهام وبهامات .
قال الازهري اما اسنان الغنم فساعة قصصها امها من
الضأن والماعز ذكراً كان او انثى سمخلة وجمعها سمخال .
ثم هي بهية فاذا بلغت اربعة اشهر وفصلت عن امها فا
كان من اولاد الماعز فهو جفار واحدها جفر فاذا رعى
وقوى فهو عريض وعنود وجمعها عرضان وعنودان . وهو
في كل ذلك جدي والانثى عناق ما لم يأت عليها الحول .
وجمعها عنق . والذكر تيس اذا اتي عليه الحول والانثى
عنز . ثم تجلع في السنة الثانية فالذكر جذع والانثى جذعة .

٤٢٤٠ - بَهْشِيَّةُ أبيض Béhen blanc (F).

راجع قنطريون بهمن . White behen (E).

٤٢٤١ - بَهْشِيَّةُ ٥* Mammoth (F). Mammoth (E).

هو الماموث ، اطلبه .

٤٢٤٢ - بَهْشِيَّةُ ٥* Boute-en-train (F).

Merry-making (E).

الفحل الذي تمرض عليه الاناث ولا يحمل عليها .

٤٢٤٣ - بَهْشِيَّةُ ٥* Cataseta (S). Cataseta (F).

جنس نباتات امسية او مربابية من السحليات . انواعها
المعروفة قليلة العدد جميعها برية وتزيينية مهددا بعض
مناطق امريكة الاستوائية || اوراقها قرصية الانتشاب ،
كبيرة النصال ، غبراء الخضار . ازهارها كبيرة ، بخيلة ،
خلافة || تزرع في المراكن لكنها تحشى البرد .

٤٢٤٤ - بَهْشِيَّةُ ٥* Callidium (S). Callidia (F).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . انواعه عديدة تتميز
بطول قرونها الاستشعارية ، بالوانها الزاهية وبقلة اذناها .
اعرفها واعها انتشاراً ما يلي .

٤٢٤٥ - بَهْشِيَّةُ بَنَفْسَجِيَّة* Callidium violaceum (S).

Callidia violette (F).

خنافس طولها من ١٠ الى ١٥ مم . لونها الى البنفسجي

والبيضاء الشعر . علوها يراوح من ٥ الى ١٥ م اوراقها
كبيرة ، معتقة ، جلدية النصل الباهت الخضار ، ثلاثية
التقرين ، قرونها شائكة || ازهارها متوسطة القد معتقة .
ثمارها عنبية يستخرج منها مادة دبقية رائحة الاستعمال .
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٤٢٤٦ - بَهْشِيَّةُ الشاي* ، شاي براغواي ، ماتى

Ilex Paraguensis (S). Houx du Paraguay, Thé du Paraguay, Maté (F). Paraguay tea, Mate (E). Paraguaytee, Mate strauch (D). Agrifoglio emetico, A. Paragua, Falso tè, Tè del Gesuiti (I).

شجرة كبيرة القد تملو من ١٥ الى ٢٠ م . مهددا البلاد
الامريكية تعيش في المواقع الرطبة الممرضة للشمس .
اوراقها معتقة ، متعاقبة ، مستعرضة الزام الاخير ،
نصلها امرط البشرة ، خفيف التسنين اخضر الصفحة
العليا ، غابق السفلى || ازهارها رباعية التركيب
والجميع . ثمارها حمر || اوراقها صميصة صناعية
تستعمل استعمال الشاي .

٤٢٤٧ - بَهْشِيَّةُ جفلة Ilex opaca (S).

Houx touffu (F).

شجرة كبيرة القد تملو نحو ١٢ م . اوراقها سندية
الشكل ، شائكة ، لونها الى الخضار الزاهي || ازهارها
نورية ابوية . ثمارها حمر او صفر . ازهارها يستمر
من نيسان الى حزيران .

٤٢٤٨ - بَهْشِيَّةُ حلقية الورق Ilex verticillata (S). Houx verticillé (F).

شجرة صغيرة متوسطة ارتفاعها نحو ستة امتار . اوراقها
احليلجية ، حلقية الارتكاز ، نصلها لاقياسي التسنين ،
ازغب الصفحة السفلى || ازهارها نورية التجميع .
ثمارها حمر او صفر . ازهارها يدوم من حزيران الى تموز .

٤٢٤٩ - بَهْشِيَّةُ عابلة Ilex decidua (S).

Houx à feuilles caduques (F).

شجرة متوسطة القد تملو نحو ثمانية امتار . اوراقها عابلة
ضيقة القاعدة ، مدببة القمة ، قليلة التسنين . نصلها
ازغب الصفحة السفلى || ازهارها نورية التجميع . ثمارها
برتقالية اللون . ازهارها في ايار .

٤٢٥٠ - بَهْشِيَّةُ مرطاة Ilex glabra (S).

Houx glabre (F).

جنبه صغيرة القد تملو نحو المتر . اوراقها صغيرة رباعية
الاسنان الشائكة ، جلدية النصل الامرط ، لونها الى
الخضار الاسقع || ازهارها ابوية ، فردية ، صغيرة .
ثمارها سود . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .


٤٢٥١ - بَهْشِيَّةُ مكساة Ilex levigata (S).

Houx lisse (F).


شجيرة تملو نحو ثلاثة امتار . اوراقها مستطيلة ، طولها
بوازي ثلاثة اصناف عرضها ، نصلها امس البشرة ،
عريض التسنين ، باهت الخضار || ازهارها فردية
التجميع . ثمارها برتقالية اللون ، ازهارها يستمر من
ايار الى حزيران .

٤٢٥٢ - بَهْشِيَّةُ ٥* Ladre (F). Measle (E).


هو في الخيل بياض الجلد حول المنافذ الطبيعية كالانف
والقن والشفة والجنب .



بَهِيَّةٌ ثَنَائِيَّةُ اللَّوْن



بَهِيَّةٌ دُمُورِيَّةُ



بَهِيَّةٌ مَلَوَانَةٌ



بَوَّاب



بَوَّاب

الاسفع يعلوه موج احمر. تعيش على اخشاب الصنوبر المقطوعة اليابسة. يرقاتها دقيقة مستطيلة سمراء اللون تعيش تحت اللحاء.

٤٢٤٦ - بَهِيَّةٌ زُرْنَال (S). Cataseta ternala (S). Catasète de Ternal (F).

نوع من البهية الزراعية التزينية. مهدا بلاد البيرو وقد انتشرت زراعتها الواسية في جميع اقطار البلاد الباردة والمعتدة الحرارة || اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة، مضلعة. ازهارها زنادية الارتكاز، خلاية الشكل، جميلة الالوان الزاهية || تزرع في المراكب البيتية.

٤٢٤٧ - بَهِيَّةٌ ثَنَائِيَّةُ اللَّوْن*

Callidium bicolor (S). Callidie bicolore (F). Callidium bicolor (E).

حشرة خاضعة خاشبة مؤذية من فصيلة القرنييات ورتبة مغذات الاجنحة. تألف احراج الشربين والسرو والسنوب. خنافسها تعيش على اوراق النباتات المختلفة. يرقاتها تركيب جذوع الاشجار اليابسة فتسردب اللحاء والشكبر || جسمها متوسط القد يطول من ١٠ الى ١٥ مم. ثوبها ثنائي اللون ازرق الرأس والكوسل والجرامز، جزوي البطن والظهران والزبان || لها جيل واحد في الحول. تسرح في النهار وتبيت في الليل || يرقها خاشبة تطول من ١٧ الى ٢٥ مم. جسمها محدوب الظهر مبسط المدب، قصير الرواجب. ثوبها الى السمرة الخنطية يعلوها موج اصفر وتنقيط اسمر يمتد من الحلقة الصدرية الثالثة الى سكة الشرج. رأسها شديد السمرة || طور الاكمال الذي يستمر من ٣٠ الى ٣٥ يوماً ينقضي ضمن صلتجة خاوية مركبة من فتات المواد النباتية المعجونة بالريال.

٤٢٤٨ - بَهِيَّةٌ دُمُورِيَّةُ* Callidium sanguineum, Pyrrhidium sanguineum (S). Callidie sanguine (F).

خنفساء طولها من ٩ الى ١٢ مم. زباء الاغداد، ثوبها الى الجؤوة الزاهية تعيش على اخشاب الصنوبر. يرقها مستطيلة حنطية اللون، سمراء الرأس تعيش تحت اللحاء وفي الشكبر.

٤٢٤٩ - بَهِيَّةٌ مِلَوَانَةٌ* Callidium variabile (S). Callidie variable (F). Callidium variabile (E).

حشرة خاشبة مؤذية من فصيلة القرنييات ورتبة مغذات الاجنحة || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٢ مم. رأسها اسود اللون. تأثيرها وجرامزها الى الصلبة. كوسلها يرتقالي تتوسطه نقطة سوداء. غمداها منمشان بالازرق العايق. بطنها اسود الوسط، اشهب الاطراف || يرقها خاشبة، غبراء اللون، قوية التأثير القاضية. تعيش على الاخشاب المقطوعة اليابسة فتسردبها وتمطبها.

٤٢٥٠ - بَهِيَّةٌ مَسَمَةٌ، حيوان، دابة، زاهلة

Bête (F). Beast (E).

٤٢٥١ - بَهِيَّةٌ مُمُوتٌ Hippopotame (F). Hippopotamus (E).

هي فرس البحر.

٤٢٥٢ - بَوَّاءٌ*

جنس ثعابين عظيمة من فصيلة الاصليات. انواعه المعروفة خمسة جميعها امريكية. المهذ تتميز باستطالة جسدها التي تبلغ ستة امتار. وهي من الحيات غير السامة التي تبتلع فريستها.

٤٢٥٣ - بَوَّائِيَّاتٌ Boidae (S).

Boidés (F). Boidae (E).

فصيلة حيات من عديمات الاغاديد والسموم. بعضها يبيض والبعض الآخر سرلود. اجناسها وانواعها عديدة تجسمها حسب التصنيف الحديث عمارتان: عمارة المزعاميات وعمارة الاصليات || جميع انواعها تعيش في المناطق الحارة او الاستوائية. اجسامها ضخمة، كبيرة، وبعضها عظيم القد يطول من ٦ الى ١٠ امتار || معظمها دجوي المسرح وبعضها يسرح في النهار. قوتها الحيوان والطيور والاسماك. تبتلع فرائسها بعد سحقها.

٤٢٥٤ - بَوَّاب Pylore (F). Pylorus (E).

البواب هو فم المعدة اي الفوهة التي يندفع منها الثل. مركزه بين المعدة والمفج.

٤٢٥٥ - بَوَّارِز Phanères (F). Phanerous (E).

البوارز او بوارز الجلد هي الاعضاء التي تبرز من الجلد كالشعر والريش والاظافر والاسنان الخ.

٤٢٥٦ - بَوَّاع Sporophore (F). Sporophore (E).

البواع اسم يطلق على كل عضو يحمل البوغ ان في الفطور ام في السراخس وغيرها.

٤٢٥٧ - بَوَّاءِ كِير، طلائع Prémices (F).

First-fruits, Firstlings (E).

هي اول غلات الارض وهي ايضاً اول نتاج الحيوانات.

٤٢٥٨ - بَوَّال Polyurie (F). Polyuria (E).

هو كثرة ادرار البول. ويحصل هذا العارض للفرس في زمن الودقان.

٤٢٥٩ - بَوَّالِح Terrains délaissés (F).

Abandoned ground (E).

البوالح: الارض التي قد عطلت فلا تزرع ولا تعمّر (اللسان).

٤٢٦٠ - بَوَّابٌ*، بَوَّابٌ، حَبَّابٌ، عَمَّارَةٌ،

تَبَلْدِي، حَمِيرَاءٌ، شَجَرَةٌ خَبِزِ الْقُرُودِ،

أَدَنْسُون، أَدَنْسُونِي Adansonia (S).

Baobab, Adansonie, Pain de singe (F). Baobab, Monkey bread, Sour gourd (E). Baobab, Adansonie affenbaum (D). Baobab, Albero di mille anni, Noce d'Egitto (I).

كلمة «بوياب» تعني الف سنة. وهو جنس من الاشجار الحرجية الوحداية العظيمة الدوحة من فصيلة الجبازيات الرغيات || انواعه عديدة اشهرها ثلاثة:

البوياب الافريقي او الاصبعي Adansonia digitata (S).

البوياب الاسترالي Adansonia grandidieri (S).

البوياب المدهسكري Adansonia madagascariensis (S).

جميعها من اشجار البلاد الحارة تملو نحو ١٠ امتار وتفرش نحو ٥٠ م. ساقها ضخمة جداً يبلغ قطرها نحو ثمانية امتار.

اما قطر دوحته فلا يقل عن ٥٠ م. اغصانها عظيمة، افقية الامتداد يراوح طولها من ٢٠ الى ٢٥ م. جذورها

غلظتها جداً، عرضية الارتكاز، طولها يبلغ ضعف طول

الاغصان. اوراقها راحية، اصبعية، خماسية الفلق.

ازهارها كبيرة القد. كورسها خضراء اللون من الداخل، بتلاتها خماسية غبراء اللون، اسديتها عديدة لونها الى

ربعة . مناقبها صفيرة . اثوابها متباينة الالوان الزاهية الساطعة || اعرف اجناسها واشهرها المنكان .

٤٢٦٧ - بوتاس Hanneton japonals (F).
Japanese may-bug (E). راجع جعل ياباني .

٤٢٦٨ - بوتاس Prunelle (F). Eyeball (E).

٤٢٦٩ - بوتاس Pupille de l'oeil (F).
Pupil, Apple of the eye (E).



بوتاس

٤٢٧٠ - بوتاس Rhinortha (S). Rhinortha (F).
بوتاس هو الاسم المشهور في الهند وجزر الزايج . جنس طير من فصيلة القيقوبيات . انواعه المعروفة قليلة اعطائها تمتد من الهند الى ماليزية وصومترا . تألف الغابات وصفاف بحاري الماء . قوتها الحشرات واساريها ويرقاتها وبعض الثمار || اجسامها تقطع من ٢٧ الى ٣٥ سم . تتميز بكبر واستطالة اذنانها المستديرة الاطراف . رؤوسها معتدلة الجرم مناقبها مخززية مدببة . اجنحتها ذلقة الاطراف . اثوابها متراكبة الالوان الجميلة || اشهر انواعه واكثرها انتشاراً البوير الاصفر (Rhinortha chlorophœna) رأسه وعنقه وصدره الى الصفار الكبريتي . رداؤه وجناحاه وبطنه وذنبه الى الخضار الزاهي يعلوه في ذنبه اربع جدات معترضة سوداء اللون يتاخمها ثقبين اصفر نصف دائري الشكل || الانثى اقصر ذنباً وابنت ثوباً من الذكر .



بوتاس الطيور

٤٢٧١ - بوتاس Aubépine noire (F). Black thorn (E).
قال ابو حنيفة البوت من شجر الجبال ونباته نبات الزعرور وكذلك ثمرته الا انها اذا اُبنمت اسودت سوداً شديداً وحلت حلوة شديدة ولها عجة صغيرة مدورة . وهي تسود فم آكلها ويد مجتنها وثمرتها عنقيد كعنقيد الكباش والناس يأكلونها . واحداثها بوتة .

٤٢٧٢ - بوتاس Potasan «ج»
حاشور زراعي مائع شديد الفاعلية والنشط يستعمل في مكافحة الدوريفور (خنفساء البطاطا) || مادته الفعالة مركبة ترتكز على استر حامض الكومارين الفسفوري مع الليندان || يستعمل بمعدل ٣٠٠ سم ٣ في ٦٠٠ لتر ماء الهكتار الواحد وهو من الحواشير السامة التي تستوجب العناية والحذر .

٤٢٧٣ - بوتازوت Potazote
سماد بوتاسي مركب من عنصري البوتاس والازوت يحوي ٢٤٪ كلوريد البوتاس و ١٢٪ ازوت امولياكي .

٤٢٧٤ - بوتاس Potasse (F).
Potash (E).
هو اكسيد البوتاسيوم . يعتبر من النجوة الزراعية عنصر الغذاء الثالث ، بعد الازوت والحامض الفسفوري . يدخل في تكوين جميع الزلايات في جميع النباتات من الحفيرة الى العظيمة || ميزاته الجنسية عديدة اهمها قوة الادخار في الثمار والحبوب . تحسين الصنف والادلاء عن كامل صفاته الباطنية والخارجية . حث الشعور الماصة والجذيرات والوعية التنسية على نقل الماء من التربة تخفيفاً لوطة النتوح . صد شوائب القيقض المضني لانه يمكن الخلايا من احماله بقوة . اشتراكه المجدي مع الحامض الفسفوري في الحد من شذوذ الازوت . تنشيطه المناعة



بوتاس

الحمرة || ثمارها بيضوية الشكل برتقالية اللحم . لها حامض مز ، يزورها دهنية || اوراقها وبوادرها وازهارها ولب ثمارها وعجمها شائعة الاستعمال المنزلي والصناعي والطبي .

٤٢٦١ - بوتاس * ، سلتعون الصخر

Cancer pagurus (S).
Crabe dormeur, Houvet, Poupert, Tourteau (F).
نوع من السرطان . حيوان بحري من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل المحرسمات . اعطانه معظم شطوط بحار العالم يعيش على الخشاف والصخور المطروقة غير المنصورة || جسمه شبه مربع الشكل ، طوله نحو ١٦ سم . وعرضه نحو ٢٠ سم . درعه قليل الاحديداد . يتميز بخطمه المحرسم وبمقلطيه الصليعين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

٤٢٦٢ - بوتاس Muscicape (F).
Muscicapa, Fly catcher (E).
هي خفاف او خاطف الذباب ، اطلبه .

٤٢٦٣ - بوتاس الطيور * Muscicapa striata (S).
Gobe-mouches gris (F). Spotted fly-catcher (E).
عصفور حاشر من فصيلة المذبذبات . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الغربية . يألف السواحل في الشتاء ويحبب الوسط والجروود في الربيع والصيف || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . بسطته نحو ١٧ سم . ثوبه الى الكهبة السراء . رأسه موشم بالاسود . زوره وصدره وايطلاه الى البياض الاغبر تعلوه رقشة سمره . بطنه اغبر اللون عادم الرقشة . حدة عينه ومنقاره وقائمته الى السمرة السوداء || يألف الحراج والحدائق والبساتين ويتردد باستمرار على المواقع التي يكثر فيها الطيور لالتهام ما يحوم بقرها من ذباب || قوته الحشرات اخصها الذباب والبعوض والهوم || يعيش ذكراً وانثى لا يفترقان حتى الموت . يدفن عشه في الاشجار الدغلة . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٤ يوماً || يعتبر من المصافير الكثيرة النفع الواجب حمايتها .

٤٢٦٤ - بوتاس

نبات يستعمل اصله وصنغه في معالجة الجراح والقروح (اقرب الموارد) .

٤٢٦٥ - بوتاس Bobartia (S).
Bobartie (F). Bobartia (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة السوسنيات . انواعها المعروفة اثنان مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . اوراقها اسلية الشكل . ثماريها شبه اسطوانية تحمل في قمها ضمات من الزهر الاصفر تكتنفها قنابات كبرى وصغرى . بتلاتها صفيرة سريعة الذبول . اما تتابع الازهار فيستمر نحو ثمانية اسابيع || تزرع للتزيين في المراكن والحدائق . ترغب في الاتربة الخفيفة الوافرة المواد الغذائية || تنويرها سيقي .

٤٢٦٦ - بوتاس ، بتاسيات

Pipridae (S). Pipridés (F). Pipridae (E).
فصيلة طير من الجواثم سنابات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى . تألف الغابات الرطبة والحياة الجماعية || اجسامها

عفصية حراء اللون تستعمل في تطيب الجهاز الهضمي .
وان اعتراها بقعة الملك حولت عصارتها الصفية المائعة الى
لك غروي لزج يعتبر من اجود اصناف الملك .

٤٢٨٣ - بوث **Déblai (F). Clearing (E).**
البوث : ما استخرج من الارض كالتراب والحجارة .

٤٢٨٤ - بُور **Bore (F). Boron (E).**
جسم بسيط شبه معدني رمزه (B) وزنه الذري ١٠,٨٢
ثقله النوعي ٢,٤٥ مسحوق اسمر اللون عديم
التبلور والانصهار || يمتزج مع اشباه المعادن والمعادن .
مقدوره التحليلي انشط من الكربون .

٤٢٨٥ - بُور، بالرة **Friche (F).**
Waste or fallow land (E).
الارض البور والبالرة هي التي تركت بلا زرع لسبب ما .

٤٢٨٦ - بُورق **Borax**
ملح معدني طبيعي مركب مع الصوديوم يكثر وجوده في
التبت وايران وكليفورنيه . ثقله النوعي ١,٧ صلابته من
٢ الى ٢,٥ وهو قلوي المذاق تقببه الحرارة . فوائده
الاقتصادية كثيرة يستعمل في عدة صناعات .

٤٢٨٧ - بُورق ارمي **Salpêtre (F).**
Saltpetre (E).
الطلب ملح البارود .

٤٢٨٨ - بُورُونِيَّات **Boroniées (F). Boronleae (E).**
سبط من فصيلة السذابيات اجناسه وانواعه قليلة العدد
منبها استراليه وتسمانيه معظمها جنبات وجنبيات معمرة
بحيلة الازهار تستعمل للتزيين .

٤٢٨٩ - بُورُونِيَّة * **Boronia (S). Boronie (F).**
جنس نباتات تزيينية من الفصيلة السذابية . جميعها يحمل
وجنبيات صغيرة دقيقة السوق المنتصبة المستطيلة . اوراقها
متقابلة مركبة ريشية . وريقاتها شعبة الانتظام .
ازهارها خنثوية ، فردية ، ابطية ، زنادية ، رباعية
البتلات والاسدية . جميعها عطرية ساطعة العرف عديدة
الالوان .

٤٢٩٠ - بُوري **Focal**
هو ما كان مختصاً بالبؤرة اي مركز اجتماع الاشعة .

٤٢٩١ - بُوري * ، بِيَّاح **Mugil (S).**
Muge, Mulet, Mullet (F). Mugil, Grey mullet (E).
جنس سمك مأكول من فصيلة البوريات . انواعه عديدة
نحو ٧٠ منها الفضي والمذهب والغليظ والنشاط . جميعها
اسطوانية الشكل مستطيلة . طولها يراوح من ٣٠ الى ٧٠ سم .
حراشفها كبيرة مستديرة . زعانفها سبع . الذيلية فرقاء .
يكثر وجود بعض انواعها على الشواطئ اللبنانية السورية
من الناقورة الى اللاذقية .

٤٢٩٢ - بُوري عريض الرأس * ، بِيَّاح فيضي **Mugil cephalus (S). Muge céphale, M. à grosse tête, Mulet cabot (F). Striped Mullet (E).**

سمكة بحرية بيوض من فصيلة البوريات شائكات الزعانف .
اعطانها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . تعتبر من
اسماك الشبوط والحداد والرزان المفترسة . ملجئها الحياتي

الجبليّة الذاتية التي تمكن النبات من مقاومة الامراض
الجرثومية والافصام الفطرية || اما الاسمدة البوتاسية
فتقسم الى قسمين : الاسمدة المعدنية والاسمدة العضوية .
فئة الاسمدة المعدنية تشمل كلوريد البوتاس ، سلفات
البوتاس ، نترات البوتاس ، السيلفيت ، النيتروپوتاس
والبوتازوت || اما فئة الاسمدة العضوية فتشمل رماد الخشب .
رماد الفحم الحجري ، رماد التراب ورماد الفوقس .

٤٢٧٥ - بُوتَاسِيُوم ، بُوتَاسِيُوم **Potassium**
معدن قلوي رمزه الاتومي ١٩ ، رمزه (K) ثقله
النوعي ٠,٨٧ وزنه الذري ٣٩,١ وهو ثين كالشمع
بجراحة ١٥ درجة وما فوق ، صلب وسريع القصف بجمرة
دون ١٢ درجة . ينصهر بجمرة ٦٣ درجة ، ينلي ويتبخر
بجمرة ٧٠٠ درجة . مكسره لامع كالفضة . يكمد عند
هدرجته بالهواء . يتأكسد ويمتزج بالكلور والكبريت
وغيرهما فينتج عن ذلك تراكيب بوتاسية مختلفة التركيز
ودرجات النقاوة تستعمل في الزراعة لتغذية النبات بعنصر
البوتاس .

٤٢٧٦ - بوتاني **Botaniste (F). Botanist (E).**
هو من اختص بعلم النبات اي البوتانيك .

٤٢٧٧ - بوتانيك **Botanique (F).**
Botany, Botanical (E).
هو علم النبات .

٤٢٧٨ - بُوتَقَّة ، بُودَقَّة **Coupelle (F). Cupel (E).**

٤٢٧٩ - بُوتَنِيَّة * **Potentille (F). Potentilla (E).**
جنس نباتات عشبية من الشيليكيات وفصيلة الورديات
انواعه عديدة منها برية طيبة ومنها زراعية تزيينية . اوراقها
مركبة ريشية او نغلية او اصعية الشكل . ازهارها بحيلة
مختلفة الالوان فيها الابيض والاصفر والاحمر . كؤوسها
فارشة ، مزدوجة الفصل ، خماسية البتلات . اسديتها
عديدة . مياسمها جانبية الارتكاز قصيرة . راجع عشبة القوى .

٤٢٨٠ - بُوتُو الأمازون * ، إِنِيَا **Inia geoffroyensis (S).**
Inia, Boutou de l'Amazon (F). Inia (E).

حيوان مائي ولود ليون من فصيلة الجبعليات ورتبة الحوتيات .
اعطانه نهر الامازون في امريكا الجنوبية . قوته الاسماك ||
جسمه شبه اهليلجي الشكل ، مستغلف البطن . يطول نحو
٢٠٠ سم . الشطر الاعلى من جسمه الى الزرقة القائمة .
الشطر الاسفل والبطن الى الوردي . رأسه معتدل الجرم ،
واضح المعالم والحدود . شغلته جالس مستطيل يملوه بعض
الطلب الجامد . اسنانه كثيرة ، ذرية . عيناه صغيرتان ،
ماصتان . نيسه نفرة تتوسط الجبهة . زعنفته الظهرية
صغيرة ، متأخرة . زعنفته الصدرية ستانيتا الشكل .
اما الذيلية فكبيرة ، فارقة ومتساوية الفلق || لحمه متوسط
الصنف ، مأكول .

٤٢٨١ - بُوتِيَّة **Butea (S). Butée (F). Butea (E).**
جنس اشجار وجنبيات عارشة من فصيلة القرنيات الفراشية
منبها البلاد الاسيوية الاستوائية . اشهر انواعها بوتية الملك .

٤٢٨٢ - بُوتِيَّة الملك * **Butea frondosa (S).**
Butée, Arbre à laque (F). Palas tree, Bastard
teak (E). Kinobaum, Lackbaum (D). Butea (I).
نوع من البوتية يستخرج من ساقها بالحز عصارة صمغية




بوتنيتلا




بوتو الامازون



بوتية الملك



بورونية



بوري



بوري عريض الرأس

٤٣٠١ - بَوْصُ - Robe (F). Coat (E).

البوص هو لون الثوب في الدواب والاعنام .

٤٣٠٢ - بَوْص - Roseau commun (F).

هو القصب . Common reed (E).

٤٣٠٣ - بَوْص فارسي - Canne de Perse (F).

هو القصب الفارسي . Persian cane (E).

٤٣٠٤ - بَوْصِيَّة - Plastide (F). Plastid, Plastidium (E).

هي البلاستيد مجموعة معظم مواد الخلية الحية . وهي أيضاً وظيفة الخلية بالنسبة الى قدرتها على التطور والنشوء .

٤٣٠٥ - بَوْصِيَّة عادية اللون - Leucoplaste (F).

مواد الخلية العادية اللون . Leucoplast (E).

٤٣٠٦ - بَوْصِير*، بَوْصِيرَا، آذان الدب، مُسْكِر - Verbascum (S).

الحوت

Molène, Bouillon blanc (F). Mullein, Cow's lungwort (E). Wollkraut, Königskerze (D). Verbasco, Tassobarbasso (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة من البوصيريات وفصيلة الخنازيريات . انواعه عديدة نحو ١٠٠ جميعها اعشاب برية بعضها طربي يكثر وجوده على جوانب الطرقات وفي السياجات || سوقها ليفية زباء منتصبه . اوراقها زغبية ، متعاقبة ، حاضنة ، بيضيه ، سنانية الزام الاخير . ازهارها عنقودي ار سنبل التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها زغبية صغيرة مريضة الزوال خاسية البتلات والاسدية ، صفراء او صهباء اللون . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٤٣٠٧ - بَوْصِير أبيض، مكنسة الأندَر - Verbascum Thapsus (S). Molène blanche, Bouillon-blanc (F).

عشبة محولة منتصبه الساق تعلو من متر الى مترين . ساقها وفروعها خلية كثيفة الزغب الابيض والاصفر . ازهارها صفراء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٤٣٠٨ - بَوْصِير أسود، لَسِيدَة سَوْداء - Verbascum nigrum (S). Molène noire, Bouillon-noir (F).

عشبة محولة منتصبه الساق ، قصيرة الفروع ، تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقها وفروعها واوراقها وازهارها زغبية البشرة . ازهارها بنفسجية البتلات صفراء الكؤوس . ازهارها يدوم من ايار الى آب .

٤٣٠٩ - بَوْصِير لَيد، لَسِيدَة، بُزَيْر - Verbascum alatum (S). Molène allée, Blanc de Mai, Cierge de Notre Dame (F). Called also (E).

عشبة محولة منتصبه الساق تعلو نحو ٢٠٠ سم . ساقها زباء ، فروعها كثيفة خلية اللحم . اوراقها شديدة الخضار ازهارها الى الصفار الزاهي يعلو موج وردي . ازهارها يدوم من ايار الى ايلول .

٤٣١٠ - بَوْصِير مُسْكِر - Verbascum sinuatum (S).

Molène sinueuse, Herbe de St. Fiacre (F). Moth-mullein (E).

عشبة محولة منتصبه الساق تعلو نحو ١٥٠ سم . ساقها وفروعها زباء اللحم . اوراقها شديدة الخضار . ازهارها بنفسجية . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول . ثمارها طيبة ، يقال انها مسكرة .

جامعي || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٥٠ الى ٧٠ سم . ثوبها الى الرعدة الفضية . ظهرها الى السمرة ويعلوها في جانبيها بعض الخطوط الضيقة القاطبة الشديدة السمرة . زعانفها بحرية اللون زرقاء الموج . رأسها مخروطي الشكل . شدتها ضيق الانفراج . عينها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها متباينة الاشكال ، الظهرية اثنتان ؛ الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٢٩٢ - بوري مذهب*، بَسَّاح مذهب - Mugil auratus (S). Muge doré, Mulet doré, Daurin (F). Common grey Mullet (E).

نوع من البوري . سمكة بحرية بيوض . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعتبر من اسماك اغواط النفاذ . ملجئها الحياتي شرمي || جسمها اهليلجي الثوزن يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . ثوبها الى الرعدة الفضية الزرقاء الموج يصفر عند الظهر ويغبر عند البطن . خطها الجانبي حنطي اللون ، اصفر الموج . رأسها مخروطي الشكل ، ضيق الخطم القصير . شدتها قليل الانفراج . اسنانها صغيرة ، ثلاثية الصفوف في الفكين . عينها كبيرتان ، جاحظتان . زعانفها الظهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية هلالية التقعير || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٢٩٤ - بوريَّات - Mugilidae (S).

Mugilids (F). Mugilidae (E).

فصيلة اسماك من العظميات الشائكات الزعاقف اجناسها وانواعها عديدة اشهرها البوري .

٤٢٩٥ - بوريَّطش - Pyrite (F). Pyrites (E).

راجع بيريت .

٤٢٩٦ - بوزيدان - Orchis

هو السحلب نبات تزييني جميل الزهر .

٤٢٩٧ - بوسنغلطيط - Boussingaultite (F).

هو المزيج الطبيعي المزدوج من سلفات الامونيكا والمنيزا .

٤٢٩٨ - بوسنغلطية - Boussingaultia (S).

Boussingaultie (F). Madeira vine, Mignonette vine (E). Knollige beerblume (D). Boussingaultia (I).

جنية عارشة معمرة عشقوية الجذور من فصيلة البازيليات . مهدا امريكه الجنوبيه . اوراقها متعاقبة ، قلبية ، سمكة النصل . ازهارها سنبل التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهارها غشوية صغيرة القد ، بيضاء اللون ، فواحة العرف . تزرع للزينة .

٤٢٩٩ - بوسيدان - Peucedanum (S).

Peucedan (F). Peucedanum (E).

جنس نباتات معمرة من فصيلة الصيونيات . انواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وفيها بعض الجنبات . اوراقها مختلفة الاشكال والانتظام . ازهارها خيمية بيضاء او صفراء اللون || انواعه العشبية مرعوية تمتلئها الماشية ومنها طيبة .

٤٣٠٠ - بوسيدانيات - Peucedanéés (F).

Peucedaneae (E).

سبط من الفصيلة الصيونية انواعه عديدة اكثرها نباتات عشبية برية وطيبة منتشرة في جميع الاساقع المعتدلة الحرارة .



بوري مذهب



بوصير

٤٣٢٣ - بَوْخَاء Arôme, Odeur (F).
Aroma, Odour (E).
البوغم هي الرائحة . يقال ارتفعت بوغاء الطيب .

٤٣٢٤ - بَوْغَاد Boghead (F). Boghead (E).
البوغاد وقيد معدني يعود الى جيوب من الخثيات المتراكمة
المتحجرة . وهو يعطي من ٥٥ الى ٦٠ ٪ مواد متبخرة ،
ويعتبر أجود أنواع فحم الغاز المعروف حتى الآن .

٤٣٢٥ - بَوْغَاة Buglosse officinal,
Langue de bœuf (F). Common alkanet (E).
هو الانشوزة المخزنية ، اطلبها .

٤٣٢٦ - بَوْغُلُصْنُ أَزْرَق Buglosse, Bourrache
bâtarde (F). Sea bugloss (E). اطلبها .
هو الانشوزة ، اطلبها .

٤٣٢٧ - بَوْغُلُصْنُ الصَّبَاغِين Orcanette-vipérine (F).
Dyer's bugloss (E). هو الشنجار الصباغي : اطلبه .

٤٣٢٨ - بَوْغُلُصْنُ مَخْزُونِي Buglosse officinal,
Langue de bœuf (F). Common alkanet (E).
هو الانشوزة المخزنية ، اطلبها .

٤٣٢٩ - بَوْغُلُصُونِيَّات Anchusées (F).
راجع انشوزيات .

٤٣٣٠ - بَوْغُلُصِيلِيَّة *، جَهَنَمِيَّة Bougainvillaea (S).
Bougainvillée, Bougainvillier (F). Bougainvilla (E).
Drillingsblume (D). Bougainvilla (I).
جنية معمرة شائكة معترشة تزيينية من فصيلة الشيات
مهدا أمريكة الاستوائية . اوراقها بيضية معنقة متعاقبة .
ازهارها محورية ثلاثية التركيب يجمعها زناد قصير لوها
انعادي الى الحمرة البنفسجية المواج ومنها ضروب وردية
اللون وصفراء وحمراء .

٤٣٣١ - بَوْغِيَّ، كَنْبِيدِي Conidien (F).
Conidian (E).
نمت تعريفي يطلق على ما هو بوغي التركيب او الشكل .

٤٣٣٢ - بَوْغِيَّات ، غُبَيْرِيَّات Sporozoaires (F).
Sporozoa (E). شعبة من الحيوانات الدنيا الاوالي .

٤٣٣٣ - بَوْغِيَّات دَمَوِيَّة Hémosporidies (F).
Hemosporidia (E).
رتبة من البوغيات الاوالي تشمل البوغيات الطفيلية التي
تعيش في كريات الدم .

٤٣٣٤ - بَوْغِيَّات مُخَطَّاطِيَّة Myxosporidies (F).
Myxosporidia (E).
هي البوغيات التي تعيش بوجه عام كطفيليات على الاسماك .

٤٣٣٥ - بَوْفُورْدِيَا * Bouvardia (S). Bouvardie,
Egnetier (F). Bouvardia (E). Bouvardia (I).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الفويات مهدا
بلاد المكسيك انواعها قليلة جميعها اشباب وجنيات ليفية
حزمية منها الجرداء اللحاء ومنها الزغبية ازهارها جميلة الشكل
فيها الابيض والاصفر والاحمر . وهي تخشى الصقيع وترغب
في المعاملة الحسنة .

٤٣٣٦ - بَوْفُورْسِيَا * Beaufortia
جنس جنات برية وتزيينية من فصيلة الاسيات . انواعها
المعروفة قليلة مهدا استرالية ومنها انتقلت الى معظم

٤٣١١ - بُوصِيرِيَّة Verbascées (F). Verbasceae (E).
سبط من الفصيلة الخنازيرية . نباتاته عشبية محولة زغبية
اللحاء . اوراقها شاذفة متموجة النصل . ازهارها عنقودي
او سنبلية التجميع ، محوري او تاجي الارتكاز . ازهارها
صغيرة القد ، زياء الاجزاء .

٤٣١٢ - بُوط *، بُوط رَفِيع ، حَقَا Typha angustata (S). Typhace, Massette, M. des
étangs, Quenouille, Tontaque (F). Reed-mace, Small
bulrush (E). Schmalen, Rohrkolben (D).

نبات جذموري مائي من البوطيات . اوراقه ضيقة مستطيلة
شائعة الاستعمال الصناعي .

٤٣١٣ - بُوط عَرِيض *، دَاَدِي Typha latifolia (S). Masse d'eau, Massette à larges
feuilles, Canne de jonc (F). Cat's-tail, Great reed-
mace, Marsh-pestle (E). Breiter rohrkolben (D).
Stiancia d'acqua, Mazza d'acqua, Tipha, Candela (I).

نوع من البوطيات وهو نبات جذموري مائي منبته المناطق
الحارة والمعتدلة . اوراقه صناعية شائعة الاستعمال .

٤٣١٤ - بُوطَاس Potasse (F). Potash (E).
هو البوتاس راجعه .

٤٣١٥ - بُوطُس Bothe (F).
هو الحرموس ، جنس اسماك بحرية ، اطلبه .

٤٣١٦ - بُوطُس الْمُتَوَسِّط Bothe de la Méditerranée (F).

هي حرموسة المتوسط ، اطلبها .

٤٣١٧ - بُوطِيَّات Typhaceae (S).
Typhacées (F). Typhaceae (E).

هي الفصيلة التي سماها الامير مصطفى الشهابي «بركيات»
وكان جورج بوس قد اطلق عليها اسم «ذنب الهر» . وهي
من وحيدات الفلقة تشمل عشرة انواع جميعها نباتات
جذمورية مائية سوقها اسطوانية منتصبة . اوراقها حاذئة
متعاقبة عصفية الشكل مستطيلة . ازهارها وحيدة المسكن
هامية الارتكاز . ثمارها كذنب الهر المستقيم . اشهر
انواعها البوط .

٤٣١٨ - بَوْع Ascospore (F). Ascospores (E).
هو جسم داخل الفلقة او نتوء صغير جداً يوجد في
مستورات الزهر وظيفته حاية بوغيات التناسل اللاشي .

٤٣١٩ - بَوْع حيواني Zoospore (F).
Zoospore, Swarm-spore (E).

٤٣٢٠ - بَوْع خَارْجِي ، كَنْبِيدَة Conidie (F).
Conidium (E). هو البوغ الفطري الذي يكثر في الزقيات .

٤٣٢١ - بَوْع خَمِي ، سَرْكُوسُورِيدِيَا Sarcosporidies (F). Sarcosporidia (E).
بدور كيسية توجد في لحم المواشي والخنازير .

٤٣٢٢ - بَوْع مُغْلَف ، يَكْنِيد Pycnide (F).
Pycnid, Pycnidium (E).
هو جيب او غريفة جوفاء تحمل عضو التناسل في بعض
الفطور الطفيلية . وهو احد اشكال الاخصاب والتناسل
في النباتات الدنيا .



بوط



بوط عريض



بوغنيلية



بوفورديا




بوفورسيا



بوفونيا



برق



بوق النحل



بوق النسر



بوق



بوق



بوقير

٤٣٤٦ - بوقيصة*، عيشبة الابواق، عيشبة الأباريق
Sarracenia (S). Sarracénie (F).

جنس نباتات منقعية ثنائية من فصيلة البوقيات مهددا
مناخ أمريكا الشمالية || أنواعه قليلة ، جميعها جلمورية
معمرة قرصية الاوراق التي لا ترتفع عن الارض . اوراقها
اكواب منتصبة على شكل الابواق ، جميلة الهندام
مزخرفة الانوار . زهرتها وحيدة شمراخية ، خشوية ،
مستديرة الكأس ، عديدة البتلات السفلية الانسجام
البنيضية الشكل ، صغيرة الاسدية ، مظلية الميسم .
يستخلص من اوراقها وجذاميرها مادة شبه قلووية تدعى
سراسنين «Sarracénine» || انواعها الثنائية اربعة وهي :

Sar. pourpre (F).

بوقية أرجوانية

Sar. perroquet (F).

بوقية ببغالية

Sar. variolaire (F).

بوقية جدريه

Sar. de Drummond (F).

بوقية درومن

٤٣٤٧ - بوقيصة قيصريّة
Fritillaire impériale (F). Crown Imperial fritillary (E).

تعرف باكليل الملك ، اطلها .

٤٣٤٨ - بوقيسر*، أبو قرين، كلو.
Buceros (S). Calao (F). Buceros, Hornbill (E).

جنس طير من الجواثم. الملتصقات الاصابع . انواعه قليلة
اعطانها المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . جميعها
كبيرة القد ، غليظة المناقيد المستطيلة المسلحة بقرون
غضروفية التركيب تمتد من قمة الرأس الى منتصف المنقاد.
اثوابها متراكبة الالوان اللامعة . تألف الغابات الكثيفة .
قوتها الثار والمواد النباتية وبعض الحشرات والدويبات .
تدس في تجاويف الاشجار . اناثها تضع من ٤ الى ٥
بيضات تحضنها وحدها محجور عليها في عشها وذلك لان
الذكر يوصد مدخل العش بالطين تاركاً ما يلزم من فجوة
لمنقاد الانثى تستلبي به القوت طوال مدة الترخيم .

٤٣٤٩ - بوقيصا، دردار، شجرة البقي، ألم
Ulmus (S). Orme, Arbre de Moucheron (F). Elm
tree (E). Ulme, Ulmbaum (D). Olmo, Ulmo (I).

جنس اشجار حرجية من البوقيصيات تتميز باوراقها
اللاقياسية الشكل ، المشعة ، الثنائية التسنين . ازهارها
خشوية ، ثمارها مجنحة يابسة || انواعه عديدة اشهرها يلي .

٤٣٥٠ - بوقيصا جبليّة، دردار جبلي، غرغار
Ulmus montana, U. scabra (S).

Orme montagnard, O. blanc (F). Wych elm,
Scotch elm, Mountain elm (E). Bergulme (D). Olmo
montana, O. rugoso (I).

شجرة كبيرة القد تعلو من ٢٥ الى ٤٠ م. اوراقها بيضيه
جامدة النصل . ثمرها عديدة منها الهرمية والصيوانية
والمندلية الاطراف .

٤٣٥١ - بوقيصا حمرأ*، بوقيصا حقلية، دردار
حقل، غرغار، غرغاج، غرغاشقي
Ulmus campestris, U. glabra (S). Orme champêtre,
Ormeau, Yvee (F). English elm (E). Feldulme, Rüster
(D). Olmo comune, Olmo gentile (I).

شجرة كبيرة القد تعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اوراقها جامدة
صلبة لاقياسية الشكل والحجم || منافعها الطبية حميدة :

الاقطار . ازهارها جميلة الشكل عطرة بعضها ارجواني اللون
وبعضها ابيض أو اصفر .

٤٣٣٧ - بوفونيا*، حشيشة الصفادع
Buffonia (S). Buffonie, Buffone, Bufone, Herbe à crapaud (F).
Buffonia (E). Buffonie (D). Buffonia (I).

جنس نباتات برية من فصيلة القرنفلية . انواعها عديدة
منها الاعشاب الحولية ومنها البجل اللبية المعمرة . جميعها
جبلية منبها الشرق الادنى واروبه الجنوبية والغربية .

٤٣٣٨ - بوق
Buccinum (S).

Buccin (F).
حلزون بحري من الرخويات المعديات كبير الحجم
مستطيل الخرطوم يقتنص كل ما وصل اليه . وهو كثير
الوجود في المياه اللبنانية .

٤٣٣٩ - بوق النحل
Clerus apiarius (S). Clairon des abeilles (F).

حشرة من غمديات الاجنحة تطول من ١٠ الى ١٥ م.
ثوبها الى الزرقه يحلوها تجزيع معترض احمر . تعيش على
رحيق ووليع الازهار اخصها ازهار الفصيلة الخيمية .
يرقاتها مؤذية تغزو خلايا النحل وتفتك بالبنين داخل
النخاريب .

٤٣٤٠ - بوق النسر
Graterellus cornucopioides (S). Cratérille, Trom-
pette des morts (F). Graterellus (E).

فطر اجوف القلنسوة المقمرة من فصيلة الغاريقونيات وهو
من الفطور المأكولة اللذيذة الطعم .

٤٣٤١ - بوقال
Bocal (F). Glass jar (E).
كوز بلا عروة . وهو غالباً وعاء من زجاج متوسط الحجم
يستعمل لحفظ البزورات والسكاكر والمربيات . ج بواقيل .

٤٣٤٢ - بوقية*، حنشات
Albuca (S). Albuca, Albuque (F). Bastard star of Bethlehem (E).
Stiftblume, Weisszwiebel (D). Albuca (I).

البوقية جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات انواعها المعروفة
خسة اعطانها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . ازهارها
بيضاء اللون جميلة الشكل . يستخرج من بصلها عصارة
لزجة يصنع منها بعد تخميرها شراب مسكر .

٤٣٤٣ - بوقي
Convoluté (F). Convoluted (E).
نعت تعريفي توصف به الاشياء البوقية الشكل اخصها
الاعضاء النباتية .

٤٣٤٤ - بوقيات
Buccinidae (S). Buccinidés (F). Buccinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها عديدة بعضها
من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالية والبعض الآخر
معاصر منتشر في معظم بحار العالم . جميعها بفترة ||
اصداقها متفاوتة الاحجام يغلب فيها الكبر ودقة الاعقاب
المدببة . اجسامها محزنة . رؤوسها صغيرة ، مبططة ،
ثنائية اللوامس المعبونة . السننات مجهزة بمساحل تعلوها
كلاليب حادة || اعرف اجناسها واشهرها البوق والفرفور .

٤٣٤٥ - بوقيات
Sarraceniaceae (S). Sarracéniacées (F). Sarraceniaceae (E).

فصيلة النباتات البوقية من ذوات الفلقتين اشهر اجناسها
البوقية الى حيث تنتمي .

٤٣٦١ - بُولَامُونِيَّات Polémoniacées (F).
Polemoniaceae (E).
فصيلة نباتية تعرف بالقبسيات ، اطلبها .

٤٣٦٢ - بُولِبُور Bulpur
عاشوب زراعي يستعمل للقضاء على النباتات الضارة المستعرضة الاوراق اخضها الاعشاب التي تكثر في زراعة البصل || وهو يرتكز على مادة سيانات البوقاسيوم ويحوي منها ما يراوح قدره من ٩٧ الى ٩٩٪ يرتكز محلوله من ١ الى ١,٥٪ وفقاً لحالة النبات وتنضخ به الاعشاب بمعدل ١٠ ليتر لكل ١٠٠ م^٢.

٤٣٦٣ - بُولَّة Urée (F). Urea (E).
هو نتيجة ما يحصل من احتراق المواد الازوتية في الجسم ويخرج مع البول .

٤٣٦٤ - بُولَّة Johnius (F).
سمكة نهريّة من البهاريات تدعى جنيوس ، اطلبها .

٤٣٦٥ - بُولْدُوزِر Bulldozer
هو المنساح ويدعى الشوف ، اطلبه .

٤٣٦٦ - بُولُوغَالِين، بُولِيغَالَا، حَشِيْشَةُ اللَّبْنِ، مُسْتَدِرَّة Polygala (S).
Polygale, Herbe à lait (F). Milk-wort, Milk weed (E).
Weissen kreuzblume (D). Polygala, Erba da latte (I).
جنس نباتات بحولية من فصيلة اللبنيات . انواعه عديدة جميعها حزمية السوق الدقيقة . اوراقها صغيرة القد ، رحيمة النصل ، متعاقبة . ازهارها هامية الارتكاز ، سنبلية التجميع او عنقودية ، حمراء اللون او زرقاء او بيضاء . اشهر انواعه ما يتبع .

٤٣٦٧ - بُولُوغَالِين آمِي الورق Polygala myrtifolia (S).
Polygale à feuilles de myrte (F).
بجلة فناء تملو من متر الى مترين . فروعها كثيفة زهاء اللحماء ، اوراقها مستطيلة . ازهارها بنفسجية . ازهارها عنقودي التجميع يستمر من ايار الى آب .

٤٣٦٨ - بُولُوغَالِين بَقْسِي Polygala chamaebuxus (S). Polygale faux-buis (F).
عشبة تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها متعاقبة . ازهارها الى الصفار الموشح بالاحمر . بتلاتها كبيرة . ازهارها يدوم من نيسان الى ايلول .

٤٣٦٩ - بُولُوغَالِين رَشِيْق Polygala speciosa (S).
Polygale élégant (F).
بجلة بحيلة الشكل تملو من متر الى مترين . فروعها دقيقة مرطاه . اوراقها اهليلجية ملساء النصل . ازهارها بنفسجية او حمراء اللون . ازهارها عنقودي .

٤٣٧٠ - بُولُوغَالِين شَائِع Polygala vulgaris (S).
Polygale vulgaire, Latier (F).
عشبة معمرة حزمية تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها جامدة النصل . ازهارها هامية || ترغب فيها الماشية وتعتبر من الاعشاب المرعوية العلفية التي تستدر اللبن في البقر والضان والماعز .

قشورها قابضة وممرقة ، اوراقها غنية بحدد الطل الذي يستخرج منه ماء الدردار المستعمل في تنظيف وتطهير الجروح وفي غسيل العيون المصابة بالرمد || اخضها صلبة تستعمل في صناعة السفن .

٤٣٥٢ - بُولِيصَا صِينِيَّة Ulmus Chinensis, U.
parvitolla (S). Orme de Chine (F). Chinesé elm (E).
شجرة متوسطة الكبر تملو من ١٠ الى ١٤ م . افنادها وقوامها زهاء اللحماء . اوراقها عروية نصلها مائل لامع . ثمارها مستديرة مجنحة || يكثر وجودها في الصين واليابان والتبت .

٤٣٥٣ - بُولِيصَا قُزْمِيَّة Ulmus pumila (S).
Orme nain (F). Dwarf elm (E).
شجرة تملو من متر الى ثلاثة أمتار . مهدا البلاد الاسيوية الباردة . اوراقها صغيرة ، منسوبة ، نظامية ، نصلها جامد الحباك مائل البشرة . ثمارها مستديرة مجنحة .

٤٣٥٤ - بُولِيصِيَّات، دَرْدَارِيَّات Ulmées (F).
Ulmus (E).
سبط من فصيلة الانجريات يشمل بعض الانواع الشجرية الخرجية والصناعية .

٤٣٥٥ - بُولِيْقِيَّة * ، بُولِيْقِيَّة Limosa (S).
Barge, Bécasse de mer (F). Godult (E).
جنس طيور مائية من فصيلة دجاجيات الارض ورتبة طوال الساق . انواعها عديدة جميعها من القواطع التي تحب البلاد بخذاء الشواطىء البحرية || اشهرها البوقية السلطانية التي نشاهدها كل عام عند عودتها الى الهند .

٤٣٥٦ - بُولِيْقِيَّة سُلْطَانِيَّة * Limosa limosa (S).
Barge égocéphale, B. à queue noire (F). Bar-tailed godult (E).
نوع من البوقية كبيرة الجثة تطول نحو ٤٠ سم . وهي رفيعة الساق البقية ، مستطيلة المنقار ، بقاء الشوب يكثر فيها الاشهب والاسود والرمادي . ذنبها ابيض اللون اسود الاطوار .

٤٣٥٧ - بُولِيْقِيَّات Limosiers (F).
عمارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها وانواعها قليلة العدد تتميز باشكالها الرشيقة . مناقيرها محددة مستطيلة ، مبططة الملاقط . ارساعها حافية الجهة الامامية ، سرديّة الخلفية . اصابعها لاطئة الانتشاب || اعرف اجناسها واشهرها البوقية .


٤٣٥٨ - بُول urine
هو السائل الذي تفرزه الكلوتان ويخرج من المثانة الى الاحليل . ويتميز آخر هو البراز المائع في الحيوان .

٤٣٥٩ - بُول الدَّم Hématurie (F). Hématuria (E).
عارض يعترى الخيل عندما تصاب ببعض الامراض ولا سيما التهاب الكلي الحاد .


٤٣٦٠ - بُول يَحْمُورِي Hémoglobinurie (F).
Hemoglobinuria (E).
مرض يعرف بوجود يحمور ذائب في بول الدواب دونما كريات دموية .



بوقيصا حراء




بوقية




بوقية سلطانية




بولوغالين شائع



بوليترنسيوم




بوليد



بوليسبوره الكتان



بوليس



بومة أذن



بومة صماء

٤٣٧٩ - بُولِيْطُس Bolet (F). Boletus (E).
هو الهرنوع جنس فطور من الفشائيات .

٤٣٨٠ - بُولِيْمُس * Bulimus (S).
Bulime (F). Bulimus (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات المعديات الرئوية وفصيلة الحارونيات . أنواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم البلاد الحارة وال معتدلة الحرارة . تعيش في المواقع الرطبة وعلى ضفاف مجاري الماء || اصداقها شبه مردنية الشكل ، محلزنة ، متباينة الحجم واللون . اجسامها لا تختلف عن اجسام الخلزون || اشهر انواعه المأكولة واكثرها قذا البوليس البرازيلي .

٤٣٨١ - بُوْم Hiboux (F). Owls (E).
جنس طير من البوميات وحمارة البوميات . انواعه ثلاثة : البومة الاذناء والبومة الصماء واللول اي بومة الاطلاق . جميعها ربعة الجسم ، متوسطة الحجم ، مرقطة الثوب . منسرها احجن اعقف منشقة واسع انفجوة ، محسرها فسيح الصفحة . سقطها مستطيل القد يجاري الذنب ويتعدها . ارساغها كاسية ومخالبها كذلك .

٤٣٨٢ - بوهاء Puma concolor (F).
اطلب كوجر .

٤٣٨٢ - بُوْمَة أَذْنَاء * Asio otus, Otus vulgaris (S).
Hibou commun, H. vulgaire, Moyen-duc (F). Long-eared owl (E).
نوع من البوم ربعة الجثة ، متوسطة الحجم . طولها نحو ٣٥ سم . موطنها فسيح الارحاء . يشمل معظم اقطار العالم وهي من اوايد الاحراج البنانية . نظامها الحياتي جماعي ، سرها يد من ٦ الى ١٠ . تدن في تجاويف الاشجار وصندوق الصخور او في وكن الزاغ والقيق والورشان . انثاها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو ثلاثة اسابيع . تلتس قوتها من الغروب الى الفجر . تصيد جميع انواع الحشرات والدويبات والجرد والفار والضفادع .

٤٣٨٤ - بُوْمَة صَمْعَاء * Asio flammeus, Otus brachyotus (S). Hibou brachyote, H. à huppes courtes (F). Short-eared owl (E).

نوع من البوم مثدونة القنارح ولذا سميت بالصمعاء . جثتها ربعة متوسطة القد تطول نحو ٣٥ سم . وهي من القواطع التي تجوب معظم مناطق العالم ما عدا استرالية . تألف الخيس والمقاصب والمناقع . تدن في المقاصب . تلتس قوتها في الليل ابتداء من الفسق . تصيد الضفادع والجرد والفار والدويبات والحشرات .

٤٣٨٥ - بُوْمَة الْأَطْلَال Hibou ascalaphe (F).
هي اللول ، اطلبه .

٤٣٨٦ - بُوْمَرَسُول Pomarsol
فاطور زراعي يرتكز على مركبات « ثيورام » يستعمل في مكافحة تبقع ورقشة الثار . استعماله لا يؤدي النحل . تركيز محلوله يراوح عادة من ٥٠٠ الى ٧٥٠٪ اي من ٥٠٠ الى ٧٥٠ غرام بومرسول لكل ١٠٠ لتر ماء || تجري المكافحة عند الازهار وبعد الانقصاد وفي اوائل الصيف .

٤٣٧١ - بُولُوغَالِين فِيرَجِينِيَّة Polygaia senega (S).
Polygale de Virginie (F).
بجلة صغيرة تنمو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . فروعها فناء ، زباء . اوراقها مستطيلة . ازهارها قرمزية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول || وهي من النباتات الطبية تسهل المعدة وتدر البول .

٤٣٧٢ - بُولُوغَالِينِيَّات ، مُسْتَدْرَات Polygalées (F). Polygaleae (E).

سبط من فصيلة اللبنيات . انواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وبجلية منبتها الاقاليم المعتدلة اكثرها بري وبعضها طبي وزراعي .

٤٣٧٣ - بُولُوغَرَفِيَّة * Polographie (F).
Polography (E).
البولوجرافية الوصف الفلكي للسماء .

٤٣٧٤ - بُولِيْتَرْنِسِيُوم * Polythrinium
جنس فطور مجهرية من الزناخيات وفصيلة اللطحيات . جريه الكنيديية قصيرة ، كردومة ، منتصب . كئاده مخروطية الشكل ثنائية الخلية || له نوع واحد يركب اوراق النفل البري فيوشها بنقط مستديرة زيتية اللون تملو النصل على صفحته العليا .

٤٣٧٥ - بُولِيْد * Polyides (S).
Polyide (F). Polyides (E).
نبات بحري من الخشيات الحمر . يكثر وجوده في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاليه صغيرة . ساقه اسطوانية ، فرقة ، كثيرة الانشعاب ، غصرونية المادة . حمر اللون سمراء الموج .

٤٣٧٦ - بُولِيْسْبُورَة * Polyspora
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرغنيات . وحيد النوع يتميز بمشيج الخيطي التركيب الذي ينشأ تحت الطبقة الادمية ثم يرق متبعا جدران الحباك الادمي او شعاب المسام . كئاده مستطيلة ، ضمية التجميع || نوعه المعروف بوليسبوره الكتان .

٤٣٧٧ - بُولِيْسْبُورَة الْكَتَان * Polyspora lini (S).
Browning, Stem-break (E).
فطر مجهري يركب الكتان في المواقع الباردة الرطبة يؤذي في ساقه واوراقه وازهاره التي تبدو حنطية اللون صدئية الموج || يكافح بتطهير البذار .

٤٣٧٨ - بُولِيْسْتَرُوبِيَّات * Polycentropidae (S).
Polycentropidés (F). Polycentropidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جلونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ومتوسطة القد ، سمراء اللون . بسطة اجنحتها تراوح من ١٦ الى ٢٨ مم . اجنحتها الامامية مقشاة بخمل دقيق ذهبي اللون او فضي او اسمر او مزخرف بالاسمر والاصفر || اساريها مفترسة ، طليقة ، تعيش من قنصها في المياه الجارية . شباكها شبه قمية الشكل تحببها بين الاعشاب المائية . اشهر اجناسها :

البوليسنروب Polycentropus (S).
والسيرنوس Cynus (S).



بومورسيه

٤٣٨٧ - بُومَرَسُول أَكْثَف (F). Pomarsol forte (F).
فاطور زراعي شديد الفاعلية يرتكز على مركبات (TMTD) الذي يحوي منها ٨٠٪. يستعمل في مكافحة تبغ ورقشة التفاح والاجاص على الشكل التالي:
قبل الازهار بمعدل ٠,٢٠٠٪.
بعد الازهار بمعدل ٠,١٢٥٪.
وهو يستعمل أيضاً في مكافحة طلسة التوليب بمعدل ٠,٢٪. استعماله لا يؤذي النحل.

٤٣٨٨ - بُومُونْسِيَه *، بُومُونْسِيَا Beaumontia
جنس جنبات برية وتزيينية من فصيلة الدفليات مهددا
الشرقي الأقصى. أوراقها بيضيه متقابلة. أزهارها كبيرة
القد خماسية البتلات، عنكولية التجميع، ابضية الارتكاز
أو تاجية. أشهرها النوع المعترش الكبير الزهر. زهره
يضاء اللون موثقة بالاحمر.

٤٣٨٩ - بُومِيَّات Strigidae (S).
Strigidés (F), Strigidae (E).

فصيلة طير من الجوارح كواسر الليل تنتمي الى الجرجيات.
انواعها المعروفة ١٣٣ تنصم تحت لواء ثلاث عمارات البوهيات
والبمفيات والقداديات || موطنها يشمل جميع مناطق العالم
واخصها المناطق المعتدلة الحارة. أكثر انواعها من
الضارب. معظمها يأوى الحراج والغابات وبعضها الخرائب
والاطلال || قوتها المفصليات والرخويات والاسماك والقواذب
وبعض الزحافات واللبونات الصغيرة كالجرذ والفأر
والعكر ولا تعف عن المصافير || تتميز بعيونها النشيطة
التي تمكنها من رؤية الاشياء في الظلام، وبأذناها الشديدة
الاحساس السمعى. وتتميز أيضاً بنموه ريشها وبزريزها
قوامها المتناهية الدقة مما يجعل طيرانها خافت الصوت أو
عادمه || أجسامها متفاوتة القد، منها الصغيرة التي لا
يفوق حجمها حجم عصفور الدوري ومنها الكبيرة التي
يبلغ حجمها حجم الديك الكبير. جميعها كبيرة العيون
المستديرة، كاسية الارساع. أكثرها كثير الزقاء لا ينقطع
عنه طوال الليل وبعضها لا يزقو الا في زمن السفاد ||
الذكر اصفر قدماً من الانثى ويدعى الفباد والهام وكنيته
أبو الابرء وأبو الاصبع وأبو المنهال وأبو مالك وأبو يحيى.
والانثى أم الخراب وأم الصبيان وأم قشعم.

٤٣٩٠ - بُوْنِي بُونِي (F). Pony (E).
البوني، أو القرس الجذمة نعت يطلق على الحيل الصغيرة
القد الخفيفة الوزن.

٤٣٩١ - بُونِيَت *، بِنِيْلِيَت Pelamys (S). Bonite,
Bize, Pélamide (F). Bonito, Enthynnus pelamis (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات انواعها
المعروفة قليلة العدد جميعها كبيرة القد مستطيلة الرأس.
استانها قوية حادة. لونها الى الزرقة الزاهية يعلوها من
جهتي ظهرها تأذير عمودي يميل الى السمرة العابقة.

٤٣٩٢ - بُونِيَت مُشَيَّرَةُ الْبَطْن *، غَزَال Katsuwonus pelamis (S). Bonite à ventre rayé,
Scombre bonite (F). Thynnus pelamis (E).


نوع من البونيت. سمكة بحرية بيوض من الاسقمريات
شائكات الزعانف. أعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض
مناطق المحيط الاطلسي || تعتبر من الاسماك القواطع.
تجوب المتوسط اربع مرات في الحول || جسمها اهليجي



بونيت



بونيت مشيَّرة البطن



بوهة

الشكل يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ثوبها متداخل
الالوان. ظهرها وزعانفها الظهرية والصفحة العليا من
رأسها الى الزرقة السوداء الموج. الشطر الاعلى من جانبيها
الى الزرقة، الشطر الاسفل مع بطنها الى البياض الاخير
الفضي الموج ويعاوها في هذا الشطر تشيز رباعي الخطوط
السر الافقية الامتداد || رأسها مخروطي الشكل، ذلق
الخطم. فكها الاسفل يتقدم الاعلى. شدتها معتدل
الانفراج. عيناها كبيرتان، ذهبيتا اللون / زعانفها
الظهرية اثنتان كبيرتان يتبعها ثمان زعنفات صغيرة.
الشرجية تقابل الظهرية الثانية ويتبعها سبع زعنفات.
الذيلية شبه هلالية الشكل || لحمها دمك، أبيض اللون،
مستحب الطعم. مرغوب فيه.

٤٣٩٣ - بُونِيلِيَه Bonellia (S). Bonellie (F).
جنس دويبات بحرية من الجفريات المسلحة وفصيلة
الاخيوريات. انواعها المعروفة قليلة العدد أشهرها البونيليه
الخضراء (Bonellia viridis) التي يكثر وجودها في البحر
الابيض المتوسط || تتميز هذه الدويبات بالازدواج الشكلي
الفاضح بين الذكر والانثى. ذكورها صغيرة شكلها
كحرف الالف تعيش في مسالك اقنية افراز الاناث.
الانثى مستضخمة الجسم القريب الشبه من حبة الحنطة.
مستطيلة الزائدة الخرطومية الجزلة المحجمة الاطراف.

٤٣٩٤ - بُونِيُوم Bunium
راجع آ أكثر.

٤٣٩٥ - بُوه Ducs (F). Horneds owls (E).
جنس طير من البوميات وعمارة البوهيات. انواعه عديدة
منتشرة في جميع اقطار العالم وهي اكبر انواع كواسر الليل
قدماً تتميز بمناسرها الصلبة القوية ومناشقها المستديرة
الفسحة وسواقطها الضعيفة واذناها القصيرة وارساغها
ومخالبها القوية العارية. أشهرها البوهة وبوهة فيرجينية.

٤٣٩٦ - بُوهَة * Bubo maximus (S).
Grand duc (F). Eagle-owl, Great horned owl (E).
نوع من البوه وفصيلة البوميات كبير القد طوله نحو ٦٥ سم.
والانثى اكبر جثة من الذكر || موطنه البلاد المعتدلة
الحارة. يألف الغابات والاحراج والاطلال على السواء
غير انه لا يقرب الاماكن الآهلة برغم كونه من الطيور
الآتدة. يدن عشه في تجاويف وصدوع الاشجار
الصوفاة. انشاء تضع ثلاث بيضات مستديرة خشنة
غبراء اللون تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع || وهو يلتصق
قوته في الليل. يصيد جميع انواع الحشرات والقواضم من
الفأرة الى السنجاب كما يبطش بالبط والاوز والغربان
والزبان والارانب.

٤٣٩٧ - بُوهَة فِيرْجِينِيَه Bubo virginianus (S).
Duc de Virginie (F). Virginian horned owl (E).
نوع من البوه كبير القد طوله نحو ٧٠ سم. موطنه امريكة
الشالية والجنوبية. يألف الغابات والاحراج الظليلة.
يلتصق قوته في الليل. يصيد كل ما وقع نظره عليه من
حيوان يتمكن منه بما في ذلك الافاعي والاسماك.

٤٣٩٨ - بُوهِيَّات Astoriens, Buboniens
عمارة من فصيلة البوميات تشمل اربعة اجناس وهي البوم
والبوه والشبح والهاوزن جميعها من الكواسر الروامس.



بوهينية

على مستوى تفجيرها أو يعلو حتى سطح الأرض أو فوقه بالنسبة إلى ما يكتشفه من ضغط . وتفجير هذه البئر أو حفرها يتم عادة بواسطة المرجاس .

٤٤١٢ - **بِشْر الصَّرْف** (F). Boit-tout (F). Wine-glass (E).
هي الآبار التي تنتهي إليها مختلف المياه اخصها مياه المناقع فتغيب في جوف الأرض دون الاستفادة منها .

٤٤١٣ - **بِشْر المِرْحَاض** (F). Fosse d'aisances (F). Cesspool (E).
هي الحفرة التي تستلقي غائط الإنسان وبوله ومن الأفضل أن تبنى على يابس لتتجنبها من الترشيع .

٤٤١٤ - **بِشْر المَزْبَلَة** (F). Fosse à purin (F). Dung-water (E).
هي البئر الضابطة التي ينتهي إليها بول دواجن الأسطبلات والمزارب وقد تبنى عادة بقرب المزبلة لاستلقاء السوائل التي تتسرب من الزبل .

٤٤١٥ - **بِشَاءَة** (F). Mesologie (F). Mesology (E).
علم البيئات ومدى تأثيرها في الحياة .

٤٤١٦ - **بِتَات شَتَوِي** (F). Hibernation (F). Hivernation (E).
تتور الحياة بعض الوقت في النبات وفي بعض اجناس الحيوان والحشرات .

٤٤١٧ - **بِيَّاح ، بِيَّاح** (F). Muge (F). Mugil (E).
هو البوري ، اطلبه . والواحدة بيّاحة وبِيَّاحة . والبيّاحة هي ايضا شبكة الحوت (السان) .

٤٤١٨ - **بِيَّاح أَسْوَد** (F). Muge noir (F).
سمكة بحرية تدعى حمّاشة ، اطلبها .

٤٤١٩ - **بِيَّاح فِصِّي** (F). Muge céphale (F).
سمكة بحرية تدعى بوري عريض الرأس ، اطلبها .

٤٤٢٠ - **بِيَّاح مَدَهَب** (F). Muge doré (F).
سمكة بحرية تدعى بوري مذهب ، اطلبها .

٤٤٢١ - **بِيَّار** (F). Biarum (S). Biare (F).
جنس نباتات دوفصية عشبية من القلقاسيات . انواعه المعروفة قليلة اعطانها الشرق الاوسط واروية الجنوبية . جميعها صغيرة القد . اوراقها سنانية النصل او خطية . ازهارها خريفي || وهو من النباتات الطوعية في البقاع .

٤٤٢٢ - **بِيَّار** (F). Biar (F).
هو الاسقمري الكلياس ، اطلبه .

٤٤٢٣ - **بِيَّارَة** (F). Orangerie (F). Orangery (E).
راسع بستان يرتقال .

٤٤٢٤ - **بِيَّاس** (S). Bias (F).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المذهبانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها البلاد الافريقية . جميعها صغيرة القد ، قنبرية الرأس ، مقطوعة الذنب . اثوابها الى

٤٣٩٩ - **بُوهينية *** (F). Bauhinia (S).
جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة القرنيات . انواعه نحو ٦٠ مهدها المناطق الحارة والاستوائية . منها الشجيرات ومنها الجنبات العارشة . اوراقها معنقة مركبة ثلاثية الفصوص . ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي التجميع . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل خاصة البتلات مختلفة الالوان . ثمارها قرون مستطيلة . بزورها بيضيه مفلطحة . اشهر انواعه ما يتبع .

٤٤٠٠ - **بوهينية ارجوانية** (S). B. purpurea (S).
جنبه تزيينية جميلة الازهار الارجوانية . (F). B. pourpre (F).
٤٤٠١ - **بوهينية عارشة** (S). B. scandens (S).
جنبه عارشة جميلة الازهار الوردية اللون . (F). B. grimpante (F).

٤٤٠٢ - **بوهينية عذقية** (S). B. corymbosa (S).
جنبه عارشة غضة عذقية الازهار . ازهارها حر . (F). B. à corymbes (F).

٤٤٠٣ - **بوهينية قطبية** (S). B. tomentosa (S).
جنبه طيبة زباء اللحم . زهرها ابيض اللون يعلو موج اصفر . اوراقها وازهارها وجنورها ناعمة وطاردة للديدان . (F). B. cotonneuse (F).

٤٤٠٤ - **بُوهينية مؤنفة ، أُرْجَة القرون ، قَرَك** (S). Bauhinia acuminata (S). Bauhinie acuminée, Senné bâtard, Ebenier de montagne (F). Orchid tree, Mountain ebony (E). Bergebenholz, Unächte senna (D). Bauhinia, Ebano montano (I).
شجيرة تزيينية كثيرة الانتشار ، جميلة المندام . اوراقها مؤنفة الرووس . ازهارها ارجوانية .

٤٤٠٥ - **بُويضة** (F). Ovule (F).
مادة حيوية تتكون ضمن المبيض النباتي فتصير بعد اخصابها بذرة او حبة او عجنة تؤمن استمرار الحياة || ومنهم من استعمل بذيرة فهذا تسبيق لا يجوز لان البويضة لا تصير برة الا بعد التأبير والاخصاب وان لم يتم الاخصاب لا تتكون البيرة .

٤٤٠٦ - **بُريضية** (F). Ovarisme (F). Ovarism (E).
مذهب الذين يمزون اصل الحيوان وجميع الكائنات الحية الى بويضة || وعلى السؤال من اين اتت البويضة وكيف تكونت ؟ فهو سر الوجود .

٤٤٠٧ - **بُويغَة** (F). Spore (F).
هي بذرة النباتات خفيات التزاوج او عديمات الازهار .

٤٤٠٨ - **بُويغِيَة** (F). Sporidie (F). Sporidium (E).
هي البويغَة الصغيرة الذرية القد المركبة .

٤٤٠٩ - **بُويمة** (F). Huetta (F). Tawny owl (E).
بومة صغيرة .

٤٤١٠ - **بِشْر ، رَكِيَّة ، جُب ، جَفَر** (F). Puits (F). Well (E).
حفرة في الأرض عميقة لجمع الماء والاستقاء منها .

٤٤١١ - **بِشْر أَرْتَوَازِيَة** (F). Puits artésien (F). Artesian well (E).
هي البئر التي ينبجر ماؤها في الاعماق وقد يبقى الماء



بيّاس

٤٤٣٨ - **بَيَانُ حَالَةِ الْأَمْكِنَةِ** (F). Etat des lieux (F).
Inventory of fixtures (E).
هو تحديد عين ثابتة ووصف كل جزء منها في حالته الراهنة من حيث الحدة والقدم بمناسبة تسليمها الى مستأجرها .

٤٤٣٩ - **بَيْبٍ** (F). Conduit d'amenée (F).
الببيب هو مجرى الماء الى الخوض . Supply-pipe (E).

٤٤٤٠ - **بَيْبَاءٌ** * (S). Pipa (S).
Pipa (F). Pipa (E).

جنس ضفادع من فصيلة البيبائيات ورتبة البكائيات .
انواعها المعروفة قليلة العدد . مهدها بعض اصقاع امريكة الجنوبية . يكثر وجودها في مياه البرازيل والغويان ||
اجسامها كبيرة القد مستغلفة . اطولها تراوح من ١٧ الى ٢١ سم . رؤوسها مفلطحة محرمة . اعظامها تنتهي بزوائد ادمية معتدلة الصلابة . فكوكها عادمة الاسنان . اصابع قوائمها الامامية عادمة الخطاب ، مستطيلة ، دقيقة ، تنتهي بنجوم قرنية المادة شكلها كالمهاز . اصابع قوائمها الخلفية كاملة الخطاب || انثىها ، بعد الكوم ، تسرا نحو ١٠٠ دعبلة في جيوب مطاطة ترفمها فوق مؤخر ظهرها حيث تلتصق بالجلد الذي يرتفع حول كل دعبلة فيؤمن سلامتها حتى النطف .

٤٤٤١ - **بَيْبَائِيَّاتٌ** * (F). Pipidae (E).
فصيلة من مرتبة البكائيات ورتبة عديمات الذنب . اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها ضفادع عادمة اللسان قازبة ، تقضي معظم حياتها في المياه العذبة . اشهر اجناسها البيباء والقيطم .

٤٤٤٢ - **بَيْبَيْطٌ** البيبط : طائر (فريتغ) .

٤٤٤٣ - **بَيْبِيُونٌ** * (S). Bibio (S). Bibion (F). Bibio (E).
جنس حشرات من فصيلة البيبيونيات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٩ الى ١٤ سم . اجسامها مستطيلة رخوة تكثر في الربيع فوق الازهار والاعشاب . ترز مكنتها في التربة فينتفخ عن يرقات تلهم جذور مختلف النباتات من الزروع الى القطائيات والصلبيات والشوندر والبطاطا .

٤٤٤٤ - **بَيْبِيُونُ الْأَدْعَالِ** (S). Bibio femoratus (S).
Bibion des buissons (F).

حشرة من فصيلة البيبيونيات . جسمها يطول من ٩ الى ١٤ سم . رأسها مكور . عينها صغيرتان . زبانها شديداً القصير ، ولمسها كذلك . صدرها بيضي مقطوم . بطنها اسطواني ، سداسي الحيد ، كثيف الحلب || الذكر احمر اللون . الانثى الى السواد القاتم . روشنها كبيران ابيضان ، احرا المقدم عند الذكر ، اسمره عند الانثى . قوائمها الى السرة السوداء || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى اواخر حزيران . تألف الادغال والحداثق || تتوجه البرقة فور نفضها الى جذور النبات فتعيش عليها .

٤٤٤٥ - **بَيْبِيُونُ بُسْتَانِيٍّ** (S). Bibio hortulans (S).
Bibion horticole (F).

حشرة من فصيلة البيبيونيات . جسمها يطول من ٩ الى ١١ سم . رأسها مكور . عينها صغيرتان . زبانها قصيران . ولمسها نائتان . صدرها بيضي الشكل . بطنها اسطواني ، سداسي الحيد ، كثيف الحلب الدقيق || الذكر اسود اللون .

الطحلة السمره يملوها تمشيح اسود وتجذيع ابيض . بطونها بيضاء اللون او غبراء || قوتها الذباب والهوم والحشرات الصغيرة والديدان .

٤٤٤٥ - **بَيَّاضٌ ، بَيَّاضَةٌ** Bagrus bajad
سمكة نهريه من البقر وفصيلة السلوريات تكثر في النيل .

٤٤٤٦ - **بَيَّاضٌ دَقِيقِيٌّ** (F). Maladie du blanc (F).
البياض الدقيقى لفظة شاملة تدل على مظهر خارجي واحد قوامه غبار ذري الشكل ابيض اللون ينتشر على الأوراق وقد يعمها على صفحتها السفلى ثم الغليا سببه اوصام نباتية مختلفة بعضها فطري وبعضها ميكروبي .

٤٤٤٧ - **بَيَّاضِيٌّ** Herodias egretta
راجع ابن الماء البيوضي .

٤٤٤٨ - **بَيَّالٌ ، دِيَاغِرَامٌ** (F). Diagramme (F). Diagram (E).

٤٤٤٩ - **بَيَّانٌ** (F). Statement (E).

٤٤٥٠ - **بَيَّانٌ ، شَهَادَةُ الرَّبَّانِ** (F). Manifeste (F).
Manifest (E).
وثيقة ببيان البضائع التي في السفينة يحررها ويوقعها الربان ويقدمها الى مأموري الجمرك وتدعى شهادة البضائع الواردة ولا يباح للسفن أن تغادر المواني الا بشهادة الخروج او بيان الصدور .

٤٤٥١ - **بَيَّانُ الْأَسْبَابِ** (F). Exposé des motifs (F).
Explanatory statement (E).
هي الاعتبارات التي يمهدها في مشروع او اقتراح لمنطوقه .

٤٤٥٢ - **بَيَّانُ الْحَالَةِ** (F). Etat de situation (F).
State of affairs (E).
هو بيان موجز مبسوط في حالة ذمة المرء المالية بعنصرها السلمي والايجابي .


٤٤٥٣ - **بَيَّانُ الْقِيُودِ الْعَقَارِيَّةِ** (F). Etat des inscriptions (F).
هي شهادة يحررها امين السجل العقاري فيثبت فيها جميع القيود والامتيازات والاختصاصات والتكاليف المترتبة عن عين ثابتة مستخرجة من سجلاته .

٤٤٥٤ - **بَيَّانُ الْمَصَارِيفِ** (F). Etat des frais (F).
Expenses statement (E).
هو قائمة بحساب المنصرف والمطلوب لاسد الطرفين .


٤٤٥٥ - **بَيَّانُ تَصْفِيَةِ الْمَوْجُودَاتِ** (F). Etat liquidatif (F).
هو بيان تبني عليه قسمة موجودات يمتلكها شيوعاً اثنان فاكتر كالتراكات فتستجد الاموال التي تقرر لدفع الديون ثم تبين الباقية بعد ذلك بالتفصيل (حصة كل مشتاع ومقدار منها) .

٤٤٥٦ - **بَيَّانٌ تَقْصِيْلِيٌّ** (F). Devls (F). Estimate (E).
البيان التفصيلي او المقايسة هو بيان مفصل بالاعمال المقصودة مقروناً بشئ مكلفها .

٤٤٥٧ - **بَيَّانٌ تَقْدِيرِيٌّ** (F). Etat estimatif (F).
Estimative (E).
هو بيان يحرر عن الاعيان المنقولة فتبسط فيه هذه الاعيان موصوفة وصفاً مسهباً مبيناً الى جانبها مبلغ مقدار ثمنها لها .



بيضاء



بيبيون

البتلات اما الانثوية فرباعية البتلات ومركزها بين زهرتين ذكريتين || تنويره اصفر اللون يمتد من اواسط الربيع الى اواسط الصيف .

٤٤٥٥ - بيرا
 Bière (F). Beer (E).
 راجع جعة .

٤٤٥٦ - بيرال الكرمة
 Pyrale de la vigne (F).
 هي فائلة الكرمة ، اطلبها .

٤٤٥٧ - بيرغ ، شَعْع النارجيل
 Birgues (S).
 Birgue, Crabe des cocotiers (F). Birgues (E).

بيرغ هو الاسم الهندي . جنس حيوانات قازبة من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة الباغوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق الهند وجزر المحيط الهادي || جميعها قازبة تعيش على ضفاف الانهر والمناقع . مسرحها دجوي . تخرج من انفاقها بعد غروب الشمس وتعود اليها قرب الفجر . تتسلق اشجار النارجيل فتقضم معاليق الثمار الفتية ثم تعود فتلتهمها على الارض .

٤٤٥٨ - بيرنغنه
 Pyranga (S).
 Pyranga (F). Pyranga (E).

جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها يشمل جميع القارة الامريكية . تألف الرياض والغابات . نظامها الحياتي جماعي . اسراها متفاوتة العدد || اجسامها صغيرة القد . مناقبها مخروطية ، صغيرة ، مسننة الافاك العليا . اجنحتها معتدلة الحجم . اذناها متوسطة القد ، مقطوعة الاطراف . ارساخها دقيقة . اصابعها نشيطة . اناها جميلة ساطعة الالوان الزاهية يكثر فيها الاحمر وشبهاته . تعتبر اجمل عصافير الفصيلة || جميع انواعها تعيش على البذور والحشرات الصغيرة || تدفن اعشاشها في الاشجار الرفيعة على ارتفاع بضعة امتار عن سطح الارض . اناها تضع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٣ الى ١٥ يوماً .

٤٤٥٩ - بيرنجهة
 Pygocentrus piraya (S).
 Piranha (F).

بيرنجهة هو الاسم العامي الشائع في البرازيل . سمكة نهريّة مفترسة لاحمة من السلمونيات . اعطانها انهر امريكية الاستوائية || جسمها مضغوط ، شبه بيضي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز باسنائها الفارقة الحادة التي تعملو الفكين وتندمج عند تطبيقها || تعتبر من الاسماك الرهيبة لانها لا تعف عن سمكة او حيوان وقد تقضي على الجاموس ، ان كان في الماء ، بطرف بضعة دقائق ذلك لان اصغر سرب من اسراها يعد بضعة الاف .

٤٤٦٠ - بيروكسيد ، بروكسيد
 Peroxyde (F).
 Peroxide (E).
 هو ثاني اوكسيد او فوق اوكسيد .

٤٤٦١ - بَيُونَةُ مِلَوَانَة * ، فائِلَة الجَسَائِن
 Peronea variegana, Acalla variegana (S).
 Tordeuse des vergers (F). Peronea variegana (E).

حشرة صغيرة من فصيلة الفاتلات حرشفيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة الجنوبية والوسطى . فراشتها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها وثن نصال الاوراق . تتركب الاجاص والتفاح والمشمش والخوخ واللوز والزعرور ... || جسمها صغير قضيف

الانثى الى الحمرة . روشنها الى الغبرة السمرء عند الشقّين . قوامها شديدة السمرة || تظهر الحشرة الجمالانة من نيسان الى ايار . تألف الزروع والمباقل || تمتح الانثى مكثها في التربة فينتقف عن يرقات تنهم جنور البقول والزروع اخصها البطاطا والشوندر والقطنيات .

٤٤٦٦ - بَيُونِيَّات
 Biblonidae (S).

Biblonidés (F). Biblonidae (E).
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها مستطيلة مبططة ، رؤوسها مستديرة . عويناتها كبيرة . قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة . ذكورها سمر واناها الى الحمرة || يرقاتها دودية الشكل لونها الى السمرة ، رؤوسها سود لامعة . نظامها الغذائي يختلف باختلاف محيطها الحيوي فهي تاربة وخاضعة ونخاشبة في آن واحد تعيش من التراب وعلى جذور النبات . اشهر اجناسها البيبيون والدلفوس .

٤٤٤٧ - بَيْت زَرَاعِي ، مَسْكَن زَرَاعِي
 Habitation rurale (F). Rural habitation, Rural abode (E).
 هو كل بناء ريفي يسكنه من تعاطى الزراعة .

٤٤٤٨ - بَيْتَا قِنَطُورُس ، الوَزَن
 Beta du Centaure (F). Agena (E).

الوزن او بيتا قنطورس نجم لير من كوكبة قنطورس . مركزه على حافر اليد اليسرى . اما النير الموجود على حافر اليد اليمنى فيدعى حصار || والوزن يبعد عن الارض نحو ٩٠ سنة ضوئية .

٤٤٤٩ - بَيْتَرَات البُونَّاس
 Bitartrate de potasse (F). Potassium bitartrate (E).

نوع من الاملاح البوتاسية يوجد في بعض الخمور بنسب قليلة متفاوتة .

٤٤٥٠ - بَيْدَانَة البيدانة الحمار الوحشية .

٤٤٥١ - بَيْدَر ، جَرِين ، أُنْدَر
 Aire (F). Area (E).
 هو المكان ، من الارض ، المعد لدرس الحبوب بالنورج وما اشبه .

٤٤٥٢ - بَيْدَسْتَر
 Castor
 هو الحارود اطلبه .

٤٤٥٣ - بَيْدَق * ، عَقَصِي
 Accipiter velox, A. fuscus (S). Epervier chatain, E. brun (F). Cast-net (E).

طائر من البواشق طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه ثوب الطوط يعلوه موج حنطي شديد اللمة . خلقه كخلق رفاقه من البواشق وهو من القواطع التي تجوب البلاد اسراباً كثيرة العدد . قوته العصافير والمغذاء والفار والجردان والحيات .

٤٤٥٤ - بَيْدْمَان *
 Vaillantia (S).
 Vaillantie (F). Vaillantia (E).


نبات عشبي بري حولي من فصيلة الفويات . ينبت حوض البحر الابيض المتوسط || ساقه فرعاء تعملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . فروعها مضلعة منتصب . اوراقه متقابلة ، اذينية ، ضمية التجميع ، صغيرة القد . نصالها ضيقة ، خلية البشرة ، باهتة الخضار . ازهاره ثلاثي التجميع ، ابطي الارتكاز . ازهاره وحيدة الشق ، الذكورية منها ثلاثية



بيدق



بيلمان



بيرنجهة



بَيُونَةُ مَلَوَانَة

الابيض المتوسط . تألف احراج الصنوبر ، خنافسها تعيش على البقائق والاهداب ، يرقاتها تسردب اللحاء والشكير || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٨ مم . ثوبها الى الجذوة الصنابية الموج تعلوها نمشة بيضاء وتزويق وزراكتش متباينة الالوان . رأسها يرمي الشكل ، صغير الجرم ينتهي بمثلث قاضم ثاقب . عيناها صغيرتان . زباناها مرفقيان صرلجانيان . ظهراتها ذلق المؤخر المستدير الطرف الاحف . غمداها كثيفتا الحمل والسف . ارساغها رباعية العقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر نيسان وتبقى حتى اواخر آب . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع . تمتح المكن في الخرايب والاعصان في ثقب تخليجها بمثلها || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٨ الى ١٠ مم . جسمها اسطواني الشكل مقوس . ثوبها الى التبي الاسمر . رأسها وفكاها الى الجذوة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في آخر نفق احتفرته اليرقة .

٤٤٦٨ - بيئسوس ٥ Byssus (F). Byssus (E).

البيسوس مادة ليفية تفرزها بعض الرخويات . راجع ليفن .

٤٤٦٩ - بيئسوس رباعي النقطة *

Beosus quadripunctatus (S).

Beosus quadripunctuè (F).

حشرة خاضلة من رتبة مختلفات الاجنحة نصفيات الجناح وفصيلة الطثريات . جسمها صغير مبطل يطول نحو ٧ مم . يعلو في الكوسل والمجدافين تدبيج اسود || رأسها شبه مزواني الشكل ، اسود اللون . عظمها معتدل الطول . عيناها صغيرة ، جانبية ، ناشرة . زباناها مستطيلان . كوسلها شبه مخروطي الشوزن ، مقطوم الطرف ، اسود القسم الامامي ، بني القسم الخلفي ، تملوه نقطتان فحميتان ويطوقه حثار ضيق ابيض . بطنها اسود السطح ، ابيض الخثار . حجفتها صغيرة ، محرمة الشكل ، سوداء || مجدافها الى البني يعلوها عند طرفيها تدبيج اسود يطوق الابيض || قشراتها ارمدة اللون . قوائمها مستطيلة ، مبلقة بالاسود والاصفر الخنطي || مسرحها البراري . تركيب جميع انواع الاعشاب .

٤٤٧٠ - بيئسوسي ٥ Byssogène (F).

نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالبيسوس . راجع ليفني .

٤٤٧١ - بيئسون * Bos bison (S). Bison

جنس ابقار وحشية من فصيلة البقرات . ضخم الرأس قصيره ، رفيع الحاروك ، طويل شعر الرأس والعنق والصدر . كبير الجثة ، طوله نحو ٤٠٠ سم . وارتفاعه ٢٣٠ سم . وزله من ٩٠٠ الى ١٠٠٠ كيلو . اما الانثى فأكبر جثة من الذكر لكنها اصغر رأساً واقصر قرناً || يوجد منه حالياً نوعان بحالة الانقراض .

٤٤٧٢ - بيئسون اوروبية Bos bonasus (S).

Bison d'Europe (F). European bison (E).

٤٤٧٣ - بيئسون امريكية Bos americanus (S).

Bison d'Amérique, Buffalo (F). American bison (E).

٤٤٧٤ - بيش Trou (F). Hole (E).

هي الحفرة في التربة وتدعى الجورة .

يطول من ٤ الى ٥ مم . بسطتها تراوح من ١٤ الى ١٦ مم . رأسها معتدل الجرم والخطم ، اسمر اللون . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها خيطيان . ملامسها دقيقة . مرشفها معتدل الطول . جوشها اشهب اللون . بطنها الى الخنطي || روشناها الاماميان الى الشبهة البيضاء الموج تعلوها رقشة سمراء تمتد من اواسط الزام الثاني الى الطرف . روشناها الخلفيان الى الشبهة السبورية . اهدابها الى الشبهة الفضية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في فصل الصيف . تسرح في الليل وتبيت في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو ثمانية ايام وتباشر متح المكن بعد الكوم بيوم واحد وتستمر عليه نحو سبعة ايام وتلقي بيحادياً على الاقناد والاعصان والجذوع تغلفه مادة غروية لاصقة شفافة || ينقف المكن في اوائل الربيع اي بعد متعه بنحو ٢٨ اسبوعاً عن اسابيع دقيقة تتوجه توال نحو الاوراق الفتية فتفتلها وتمتلقها بشباك حريرية المادة تعيش في داخلها على الوثن || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ١٥ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل اخضر اللون ، اصفر الموج ، يعلو خط ثبيجي عريض من الحلب القصير يمتد من الكوسل الى الشرج . رأسها ودوقها الصدرية الى السمرة اللامعة || طور الاكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلتجة خاوية تنسجها السرفة داخل الاوراق المفتولة .

٤٤٦٢ - بيريات ٥ Beraeidae (S).

Béraeids (F). Beraeidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد محصورة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها شديدة الصغر ، فحمية اللون . اجنحتها الامامية مدببة الاطراف المهذبة || اساريها تعيش في المياه الجارية وفي المناطق ملحوقة بجلايب اسطوانية الشكل مؤلفة خاصة من فتات الالياف والورق . اشهر اجناسها :

البيريا Beraea (S).

البيروود Beraeodes (S).

الارنود Ernodes (S).

٤٤٦٣ - بيريت ، بوريطيس ، بوريطيس ، مرقشيتا

Pyrite (F). Pyrites (E).

هو كبريتور الحديد الطبيعي وقد يكون اصفر اللون او ابيض والاصفر أجود نوعاً ويدهى حجر النار .

٤٤٦٤ - بيئسكاني ، بليوسين Pliocene (F).

Pliocene (E).

الطبقة العليا من الاباج الحديث وهي تحوي اطراف الاحافير .

٤٤٦٥ - بيئسه Oryx beisa

راجع أرخ افريقي .

٤٤٦٦ - بيئسم

شجر يشبه البلوط له حمل كالسفرجلة الص .

٤٤٦٧ - بيئسود منمش ٥ Pissodes notatus (S).


Pissode ponctué, Petit charançon ponctué, Petit charançon du pin (F). White pine weevil (E).

Keiferjungholzrüssler (D).


حشرة خاضلة ناهمة مؤذية من فصيلة السوسيات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر



بيسود منمش



بيسوس رباعي النقطة



بيسون

٤٤٨٦ - **بَيْض** Spermiote (F).

هو بيض النمل والصفادع . الواحدة بيضة .

٤٤٨٧ - **بَيْع** Vente (F). Sale (E).

البيع عقد يلتزم بمقتضاه أحد طرفيه الذي يدعى البائع بنقل ملكية شيء إلى الطرف الآخر الذي يدعى الشاري والذي يلتزم بدفع ثمنه . والبيع قد يكون على عدة أوجه وأشكال ، أعرفها قانوناً ما يتبع .

٤٤٨٨ - **بَيْع آجِل** Vente à terme (F).

هو الذي يضرب فيه أجل يؤخر وجوب أداء الالتزام لأحد الطرفين . فإذا أصر التزام الشاري بدفع الثمن فهو بيع بالائتمان . وإذا أصر التزام البائع بتسليم المبيع فهو البيع مع تأجيل التسليم .

٤٤٨٩ - **بَيْع إختياري** Vente volontaire (F).

هو الذي يصدر بمحض إرادة البائع ويقابله البيع الجبري .

٤٤٩٠ - **بَيْع إداري** Vente administrative (F).

هو الذي يتخذ على أموال ملك الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة ويمتاز عن البيع العادي بالتسهيلات الإدارية في إجراءاته .

٤٤٩١ - **بَيْع الأثاث بالمزاد**

Vente à l'encan (meubles) (F).

هو بيع الأثاث بالمزاد العلني .

٤٤٩٢ - **بَيْع الإستهلاك**

Vente à l'acquitté ou à la consommation (F).

هو الذي يلتزم البائع بمقتضاه تسليم المبيع المودع في الجمرع بعد دفع الرسوم عنه .

٤٤٩٣ - **بَيْع البراعة**

Vente sans garantie des vices (F).

هو الذي يتحمل به الشاري عيوب المبيع ومثل هذا البيع لا يجوز إلا إذا اتفق عليه .

٤٤٩٤ - **بَيْع التجربة** Vente à l'essai (F).

هو الذي ينمقد على شرط أن يحرب الشاري المبيع ولا يصبح البيع نهائياً إلا إذا وجد المبيع ملائماً للغاية التي أعد لها كبيع آلة أو أداة .

٤٤٩٥ - **بَيْع المتخزون بالتصرف**

Vente au disponible ou en disponible (F).

هو الذي يمرض به البائع بضاعة مستردة عنده أو عند غيره ويمكن الشاري من التصرف بها .

٤٤٩٦ - **بَيْع الوفاء** Vente à réméré (F).

هو الذي يحفظ البائع به الحق في استرداد المبيع إذا هو رد ثمنه إلى الشاري بعد أجل معين مضافة إليه المصاريف .

٤٤٩٧ - **بَيْع بالائتمان ، بيع الإستهجار**

Vente à crédit (F).

هو البيع الذي يؤجل دفع الثمن فيه .

٤٤٩٨ - **بَيْع بالتفصيل** Vente à tempérament (F).

هو نوع من أنواع البيع بالائتمان يشترط فيه دفع الثمن أقساطاً موزعة على آجال معينة في مدة طويلة وأكثر ما يستعمل لبيع المفروشات والمكاتب والآلات .

Aconit (F). Aconite (E).

٤٤٧٥ - **بيش**

راجع أكونيت .

٤٤٧٦ - **بَيْض**

البيض كواكب صغار عديدة تعلوق إحدى النعام في كوكبة النهر .

Crépide (F).

٤٤٧٧ - **بَيْض الأرض**

Hawk's-beard (E).

راجع سرغه .

Couvé (F).

٤٤٧٨ - **بَيْض الحُصنة**

Covey, Nest of eggs (E).

هو كل ما تحضنه الدجاجة (الرنقاء) من بيض في حصة واحدة . وهو أيضاً كل ما تستوعب الحاضنة الآلية من بيض في حصة واحدة .

٤٤٧٩ - **بَيْض الشَّيْخ** Arctotide (F). Wind seed (E).

راجع أذن الدب .

Œuf (F). Egg (E).

٤٤٨٠ - **بَيْضَة ***

جسم عضوي وضع لاستمرار البقاء ينشأ في مبيض أنثى بعض الرتب الحيوانية كالطيور والأسماك والحشرات وهو يحوي بويضة إن اخصبت تكون فيها حيوان شبيه بآبيه وأمه . ويختلف البيض من حيث الحجم والشكل والعدد باختلاف مصدره . أضخمه بيض النعام وأدقه بيض الحشرات . أما بيض الدجاج وهو أشهر البيوض وأعما نظراً لما يحويه من مواد غذائية يستهلكها الإنسان فهو يتكون من جسمين الملح والزلال أي صفار البيض وبياضه .

٤٤٨١ - **بَيْضِيَّات** Phycomycètes, Siphomycètes (F).

Phycomycetes (E).

هي رتبة الفطور البيضية تشمل ثلاث مراتب وسبع فصائل منها لا علاقة لها بالاقتصاد ومنها كثيرة الضرر كالصنائيات والعفشيات . أما مراتبها فهي التسنيات والسرنيات والنظريات .

٤٤٨٢ - **بَيْضِيّ ، بَيْضَوِيّ ، بَيْضِيَّة** Ovale (F).

Oval, Egg-shaped (E).

نمت وصفي يدل على الشكل الاهليلجي العديم الاستطالة الذي يشبه البيضة .

Maréchal ferrant (F).

٤٤٨٣ - **بَيْطَار**

Farrier, Shoeing-smith (E).

هو من تعامل مهنة البيطرة أي من يعمل الخيل والبقر ويقال له المبيطر .

Ferrure (F). Shoeing (E).

٤٤٨٤ - **بَيْطَرَة**


راجع إنعال .

Pomatias (S).

٤٤٨٥ - **بَيْطَس**

Pomatide (F). Pomatias (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الأرجل وفصيلة السريقيات . الأنواع المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط || أصدافها مردنية الشكل ، متناوبة الحلزونية ، متباعدة التحزيز الطولي ، دقيقة الأعقاب الذرية ، فسيحة الفوهات المستديرة . ألوانها متراكبة يغلب فيها الأزرق والصفر الزعفرانية .



بيض مختلف الاشكال

٤٥١٣ - بيعونية نباتات ، بيعونية

Begoniaceae (S). Bégoniacées (F). Begoniaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل البيغونية وغيرها . نباتاتها عشبية حولية أو معمرة . مهدبها المناطق الحارة الامريكية . انواعها تفوق الالف منها زراعة مأكولة تطبخ كالحماض لانها حامضة مثله ومنها طيبة جزيلة النعم وبعضها تزيني بحمل الاوراق والازهار .

٤٥١٤ - بيعونية ، بيعونية ، بيكونيه

Begonia (S). Bégonia, Bégonie, Bégone, Oseille sauvage (F). Begonia, Elephant's ear (E). Begonian, Begonie, Schiefblatt (D). Begonia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البيغونيات انواعه عديدة نحو ٨٠٠ منها العادي والمسقولي والبري والطبي والزراعي التزيني . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، لاقياسية الشكل والالوان المشربة . ازهارها وحيدة المسكن ، عديمة التويج ، رباعية البتلات السبلية . مبيضها ثلاثي الاجنحة سداسي الاغلام المزدوجة . الوانها عديدة يكثر فيها الالبيض والوردي والاحمر || تتكاثر بالبذر والتعجيل . تجود في جميع الاثرية القليلة الاندماج والمتوسطة . تزرع في المراكن داخل البيوت لانها تحشى البرد || اشهر انواعه التزينية المتداولة ما يلي .

٤٥١٥ - بيعونية بوليفيه B. boliviensis (S).

B. de Bolivie (F).

٤٥١٦ - بيعونية ثنائية اللون B. discolor (S).

B. à 2 couleurs (F).

٤٥١٧ - بيعونية خروعية الورق B. ricinifolia (S).

B. à feuilles de ricin (F).

٤٥١٨ - بيعونية دائمة الزهر * B. semperflorens (S).

B. toujours fleuri (F).

٤٥١٩ - بيعونية سدنية B. Sedeni (S).

B. de Sedeni (F).

٤٥٢٠ - بيعونية طويلة الزغب B. longipila (S).

B. à longs poils (E).

٤٥٢١ - بيعونية قسطلية الورق B. castanaefolia (S).

B. à feuilles de châtaignier (F).

٤٥٢٢ - بيعونية كثيرة الزهر B. multiflora (S).

B. multiflore (F).

٤٥٢٣ - بيعونية مهاوجة الورق * B. undulata (S).

B. à feuilles ondulées (F).

٤٥٢٤ - بيعونية متوسطة B. intermedia (S).

B. intermédiaire (F).

٤٥٢٥ - بيعونية مختلفة الزهر B. diversiflora (S).

B. à floraison (F).

٤٥٢٦ - بيعونية مرجانية B. corallina (S).

B. à fleurs corail (F).

٤٥٢٧ - بيعونية مضلعة الورق B. rex (S).

B. à feuilles marbrées (F).

٤٥٢٨ - بيعونية معدنية الموج B. metallica (S).

B. à reflets métalliques (F).

٤٥٢٩ - بيعونية منتصبة * B. erecta (S). B. érigée (F).

٤٤٩٩ - بيع بالعينة (F). Vente sur échantillon

هو الذي يلتزم به البائع تقديم بضاعه مطابقة للعينة التي سلمها للشاري قبل انعقاد البيع او عند انعقاده .

٤٥٠٠ - بيع بالمزاد (F). Vente aux enchères

هو الذي يجري علناً فيتبارى فيه المزايدون ويكون الشاري من عرض اعل ثمن في المبيع .

٤٥٠١ - بيع بالمذاق

Vente ad gustum (à la dégustation) (F).

هو الذي يتخذ على اشياء يذوقها الشاري قبل شرائها كالزيت والنيذ ولا يتخذ البيع الا بعد مذاقها .

٤٥٠٢ - بيع بالوزن والكيل

Vente au poids, à la mesure (F).

هو الذي يتعين فيه المبيع بالوزن والعدد والكيل .

٤٥٠٣ - بيع تسليم السفينة (F). Vente f.o.b.

٤٥٠٤ - بيع تسليم الميناء (F). Vente c.a.f. ou c.i.f.

٤٥٠٥ - بيع جبزي (F). Vente forcée

هو بيع املاك المدين على يد القضاء بعد ان يحجزها الدائنون . وهو مرادف بيع المحجوز (Vente sur saisie) .

٤٥٠٦ - بيع علني (F). Vente publique

هو الذي يجوز لكل امرئ ان يتقدم فيه للشراء ويراد به البيع بالمزاد .

٤٥٠٧ - بيع على الشحن

Vente sur embarquement (F).

هو من البيوع البحرية وفحواه ان يشحن البائع البضائع على اي سفينة في الميناء المعين وتبقى عليه اخطار سفرها الى حين تسليمها .

٤٥٠٨ - بيع على المكشوف (F). Vente à découvert

هو الذي لا يكون البائع مالكا للمبيع ساعة انعقاده . بل يحفظ لنفسه حق شرائه وتسليمه في الاجل الموقوت وبمثل هذا البيع يتخذ عادة في المصفق (البورصة) .

٤٥٠٩ - بيع على الوثائق (F). Vente sur documents

هو الذي يكتفي فيه البائع بتسليم الشاري الوثيقة التي تمكنه من تسليم البضائع الميينة فيها .

٤٥١٠ - بيع تاجيز ، بيع عاجل

Vente au comptant (F).

هو الذي يتقايض به البائع والمشتري المبيع والثمن لساعتها .

٤٥١١ - بيعونية

Piggotia

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . بكتيدات مفلطحة لاقياسية الحجم . نجمية الانفلاق . جوطا دقيق النسيج . بويقاتها مستطيلة شبه مخروطية الشكل ، شفافة او صفراء اللون || انواعه قليلة غير مؤذية .

٤٥١٢ - بيغور (F). Peltogaster

Peltogaster (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات جذوريات الرؤوس . انواعه المعروفة قليلة العدد تفضل على الباغوريات .



بيغونية دائمة الزهر




بيغونية مهاوجة الورق



بيغونية منتصبة



بيغونية وردية الزهر



بيقران



بيكة



بيلس

Melissa turca, Melissa di Moldavia (I).

عشبة طيبة حولية تعلو نحو ٦٠ سم. ساقها فرعاء. أوراقها مستطيلة، نصلها خلي البشرة واسع التسنين. أزهارها بنفسجية يملوها موج أبيض. أوراقها وأزهارها فواحة العبر تستعمل استعمال الشاي ويقال أنها لا تخلو من بعض المنافع الصحية والطبية وقد تفيد القلب وتلئم الجرح.

٤٥٣٩ - بيقييات، كيرسنيات (S). Viciées (S).

٤٥٤٠ - بيكة* (S). Lagomys, Ochotona (S).

٤٥٤١ - بيكرومة خديعة (F). Fidonie servante (F).

٤٥٤٢ - بيكونيا (F). Bégonia (F).

٤٥٤٣ - بيكييات (S). Lagomyidae, Ochotonidae (S).

٤٥٤٤ - بيكييات الشوزب (F). Lagomorphes (F).

٤٥٤٥ - بيئلة (F). Pitylus (S).

٤٥٤٦ - بيلس* (F). Pitylus (F).

٤٥٤٧ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٤٨ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٤٩ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٠ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥١ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٢ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٣ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٤ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٥ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٦ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٧ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٨ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٥٩ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٠ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦١ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٢ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٣ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٤ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٥ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٦ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٧ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٨ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٦٩ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٠ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧١ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٢ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٣ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٤ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٥ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٦ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٧ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٨ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٧٩ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٨٠ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٨١ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٨٢ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٨٣ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٨٤ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٨٥ - بيقران (F). Bégonia (F).

٤٥٣٠ - بيغونية وردية الزهر* (S). B. roseaeflora (S).

٤٥٣١ - بيقة (F). Vesce (F).

٤٥٣٢ - بيقران* (S). Dracocephalum (S).

٤٥٣٣ - بيقران الجبل (F). Dracocephalum (F).

٤٥٣٤ - بيقران النمسا (F). Dracocephalum (F).

٤٥٣٥ - بيقران أمليس (S). Dracocephalum (S).

٤٥٣٦ - بيقران رشيق (S). Dracocephalum (S).

٤٥٣٧ - بيقران كبير الزهر (S). Dracocephalum (S).

٤٥٣٨ - بيقران ملدافي، مليس تركي (S). Dracocephalum (S).

٤٥٣٩ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٠ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤١ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٢ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٣ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٤ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٥ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٦ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٧ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٨ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٤٩ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٠ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥١ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٢ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٣ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٤ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٥ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٦ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٧ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٨ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٥٩ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٠ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦١ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٢ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٣ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٤ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٥ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٦ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٧ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٨ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٦٩ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٠ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧١ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٢ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٣ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٤ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٥ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٦ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٧ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٨ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٧٩ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٨٠ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٨١ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٨٢ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٨٣ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

٤٥٨٤ - بيقران (F). Dracocephalum (F).

ساقها منتصبه فرعاء . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، اهليلجية . فصلها جامد الصفحة ، بارز العروق المتوازية . ازهارها فردية ، طرفية ، زنادية ، خاسية البتلات || جميع اجزائها من اللحم الى الاوراق والازهار والتار عطرية ، طيبة وصحية مقوية ، ناهضة . ويستخرج منها اطياب وادهان فاخرة .

٤٥٥٥ - بَيْيَالِيَه Pimelea (S). Pimélée (F).
Rice flower (E). Fettglanzstrauch (D). Pimella (I).

جنس جنبات برية وزينية من فصيلة المازريونيات . انواعه نحو ٧٠ جميعها اقية المنبت . اوراقها عروية متقابلة . ازهارها عشكولية التجميع ، محورية وقاجية الارتكاز ، حيلة الشكل وردية او بيضاء اللون .

٤٥٥٦ - بَيْيَتَة ، دَلَالَة Preuve (F). Proof (E).
البينة او الدلالة هي البرهان على وقوع الواقعة او حدوث العمل القانوني في الكيفية المأخوذ بها قانوناً وهي ايضاً الوسيلة المتبعة لاقامة الحجة .

٤٥٥٧ - بَيْيَنِي ، مُتَخَلَّل Intercalaire (F).
Intercalary (E).
الزراعات البينية او المتخللة هي الزراعات المختلفة القائمة بين انباق الاشجار معها كان تنسيقها .

٤٥٥٨ - بَيْيَنِيْث Bonite (F). Bonito (E).
هو البونيت جنس اسماك بحرية من الاسقمريات .

٤٥٥٩ - بَيْيَهَن Bursaria (S).
Bursaire (F). Bursaria (E).
جنس نباتات بحلة معمرة ابيدة من فصيلة الخبضيات . اوراقها صغيرة مستطيلة لسنة . ازهارها عشكولية التجميع ، صغيرة الحجم ، كثيرة العدد . بيضاء اللون ، عطرية العرف || انواعه قليلة اشهرها البين الشائك .

٤٥٦٠ - بَيْيَهَن شَائِك Bursaria spinosa (S).
Bursaire épineuse (F).
نوع من البين وهو بحلة شائكة ابيدة ازهارها غبراء اللون فواحة العرف المستحب تزرع للتزيين والسياج .

٤٥٦١ - بَيْيَهْدُونَال Bi-Hédonal (F).
عاشوب زراعي يرتكز على الهرمونات يستعمل في زراعات المصان والارز والحنطة والذرة والدخن وذلك للقضاء على الشوك والقصوان واللبان والحامض والهيضمان والبيقية والامسوخ والحوذان والحرم والحشخاش والرخاخ والايخيليا والبلاب ولسان الحمل والسرفل والقنطريون وكيس الراعي والجلوج وحشيشة القزاز والقراص والبطياط والشرونة . حاجة الهكتار تراوح من ٢ الى ٥ لتر من مادة البيهيدونال تذاب في المقدار اللازم من الماء عل ان لا يقل عن ٥٠٠ لتر ولا يتعدى ١٠٠٠ لتر .

٤٥٦٢ - بَيْيُوت * Echinocactus Williamsii,
Auhalonium W., Lophophora W. (S). Peyote (F).
Peyotl (E).

نبات طبي وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصباريات . يعلو نحو ٢٠ سم . جذره لفتي الشكل . ساقه سرعة اسطوانية تنتهي بارسوسة غليظة يرمية تعلوها صفوف من

٤٥٤٧ - بَيْيَلَسَان ، كَحَان Sambucus (S).
Sureau (F). Sambucus (E).
جنس شجيرات وجنيات حرجية وزينية من فصيلة البيلسانيات او الحانيات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من نباتات المناطق المعتدلة . اوراقها معنقة ، متقابلة ، مركبة ، خاسية الوريقات . ازهارها خنثوية خاسية التركيب ، عشكولية التجميع . ثمارها عنبية صغيرة القد تحوي من ٣ الى ٥ زور صغيرة آحية || اشهر انواعه البيلسان الاسود والبيلسان الصغير .

٤٥٤٨ - بَيْيَلَسَان اَسْوَد ، كَحَان كَبِير ، خَبَابُور ، دَمَدَمُون ، سَبْرَقَة Sambucus nigra (S).
Sureau, S. noir, Sullon, Haut bois (F). Elder tree, Arn tree, Boon tree (E). Schwarzer holunder, Holunder (D). Sambuco nero, S. nostrale (I).

هو البيلسان الشائع المعروف . شجيرة تعلو نحو خمسة امتار . ازهاره صلبة طيبة فواحة العرف المستحب ، نقيعها سرق ومسكن . قشور عيادته تدر البول وتفيد البواسير والحروق . قال ابن سينا حبها وعودها ينفعان من وجع الرئة وعرق النسا والصرع ويقاومان السموم ونهش الافاعي . ودهنها يخرج الجنين والمشيمة وينفع من عسر البول ومن سموم الهوام .

٤٥٤٩ - بَيْيَلَسَان صَغِير * ، كَحَان صَغِير ، خَامَا أَقْطَرِي Sambucus ebulus (S). Hièble, Yèbie, Petit sureau (F). Danewort, Dwarf elder, Ground elder (E). Attich, Attichholunder (D). Ebblo, Ebullo, Sambuco minore (I).
جنية صغيرة تعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم تزرع للتزيين . ازهارها عشكولية بحيلة لا تخلو من العرف المستحب .

٤٥٥٠ - بَيْيَلَسَانِيَّات ، كَحَانِيَّات Caprifoliaceae (S). Caprifoliacées (F). Caprifoliaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجات تشمل عدة اجناس منها البيلسان وسلطان الجبل .

٤٥٥١ - بَيْلَط * Pelates (S).
Pélate (F). Pelates (E).
سمكة بحرية ببوض من شائكات الزعانف تنتمي الى فصيلة الفرخيات . موطنها يمتد من المحيط الهندي الى الجزر الاقيانية || جسمها متوسط القد ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٢٥ سم . رأسها معتدل الجرم صغير الخطم والشدق . القسم الاكبر من زعنفتها الظهرية المستطيلة شائك المناسخ الذرية . زعنفتها الذيلية كبيرة مقعرة . ثوبها ازرق الظهر ، اريد الجانبين ، اغبر البطن || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٥٥٢ - بَيْلَتَم Capsule de coton (F).
Capsule of cotton (E).
البيلم هو جوز القطن .

٤٥٥٣ - بَيْيَلُوكَرَبُس * Pilocarpe (F).
جنس نباتات جنية طيبة من السدايات مهدا البرازيل مشهورة باسم جبورندي ، اطلبها .

٤٥٥٤ - بَيْيَلُون * ، قَرْفَة بِيضَاء Cannella alba (S).
Cannelier des Antilles, Cannelle blanche (F). White cinnamon tree, Antilles cinnamon tree (E).
شجيرة وحيدة الجنس والنوع من القرفيات . مهدا الانتيل .



بيلسان صغير



بَيْلَط



بِيلُون



بَيْيُوت

٤٥٦٨ - **بُيُوع مُتَعَاقِبَة** (F). Ventes par filière (F).
هي التي تتعاقب الى ان تصفى باذن التسليم .

٤٥٦٩ - **بَيُوفِيزِيَاء ، فِيزِيَا حَيَّة**
(F). Biophysique (F). Biophysic (E).
علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة .

٤٥٧٠ - **بَيُوكَهْفَتَة** (F). Blospéologie (F).
Blospaeology (E).
علم يبحث في الحياة الحيوانية والنباتية داخل الكهوف .

٤٥٧١ - **بَيُولُوجِيَّة ، عِلْمُ الْأَحْيَاء ، عِلْمُ الْحَيَاة**
(F). Biologie (F). Biology (E).

علم يبحث في ماهية الحياة واحوالها وعواملها المختلفة في
الحيوان والنبات . لذلك تقسم البيولوجية الى قسمين .
حيوانية ونباتية .

٤٥٧٢ - **بَيُولُوجِيَّة حَيَوَانِيَّة** (F). Zoobiologie (F).
Zoobiology (E).
علم حياة الحيوان وهو يشمل الاسباب والتركيب والاحوال
والنظم والعوامل والمعطيات والموجبات .

٤٥٧٣ - **بَيُولُوجِيَّة نَبَاتِيَّة** (F). Biologie végétale (F).
Vegetable biology (E).
علم حياة النبات وهو يشمل نظامها وتركيبها واحوالها .

٤٥٧٤ - **بَيُولُوجِيَسْت** (F). Biologiste (F). Biologist (E).
راجع أحيائي .

٤٥٧٥ - **بَيْئَة** (F). Milieu, Environnement (F).
Environment, Medium, Habitat (E).
الوسط الذي تعيش فيه المادة .

٤٥٧٦ - **بَيْئِيَّة** (F). Mésologique (F). Mesologic (E).
كل ما هو مختص بعلم البيئات .

٤٥٧٧ - **بُيُيَضَّة** (F). Ovule animale (F). Ovum (E).
هي المادة الحيوية التي تتكون ضمن المبيض الحيواني والتي
تؤمن استمرار الفسل عند انخصابها .

الشعول المفلطحة . ازهارها فردية صغيرة تنشب في الشعول .
يتلاتها خضر الصفحات الخارجية ، وردية الداخلية .
اعطانه بلاد المكسيك والتكساس . كان ولا يزال يعتبر من
النباتات الطبية المقوية التي يعزى اليها شفاء معظم الامراض .
عصارته تحوي بعض العناصر القلوية المتباينة المفاعيل
تؤثر على الدماغ وعلى مختلف اعصاب واعضاء الجسم .

٤٥٦٣ - **بَيُوجِغَرَا فِية** (F). Biogéographie (F).
Biogeography (E).

البيوجغرافيه علم يبحث في توزيع الكائنات الحية على سطح
الكرة الارضية وفي اسباب هذا التوزيع وما آل اليه منذ
نشأة الحياة الى عصرنا الحالي .


٤٥٦٤ - **بَيُوشَقِي** (F). Biosexuel (F). Biosexual (E).
نعت تعريفي توصف به الظواهر الشقية بالنسبة الى
علاقها بالحياة .

٤٥٦٥ - **بَيُيُوض ، سَرُوء** (F). Œuvé, Ovipare (F).
Hard-roed, Oviparous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان يتكاثر بالبيض او
بالسرء كالطير والسلك والحشرات .


٤٥٦٦ - **بَيُيُوض *** (F). Cylindrophora
جنس فطور مجهرية وحيد النوع من عمارة الطلسيات
وفصيلة الطلعيات . يتميز بكناثه الاسطوانية الجسم ،
المستدقة الاطراف التي تبدو كالحمل الكثيف يعلوه غبار
ابيض فضي الموج .

٤٥٦٧ - **بَيُيُوض النخل *** (F). Cylindrophora albedinis, Fusarium albedinis (S).
Bayoud (F).




وصم ونخيم الماقبة يقضي على سعف النخل وجثمائه سببه
فطر البيوض النهم الفتاك المؤذي . مظهره الخارجي
غبار ابيض اطحل ينشي الكرب واصول السعف ثم ينتشر
تدرجياً الى ان يمتلئ كامل سعف النخلة فيجلبه بوشاح
ابيض اللون فضي المراج يؤثر في المسام والنسج الخشبية
ثم ينحرف الى البني وهو نتيجة تأكسد المواد الدبقية
التي تحوها الاوراق بكثرة || يكافح عند ظهوره
باستعمال سائل بورديو او غيره من الفواطير الفعالة المركزة
على النحاس او الزنك .



بيوض



نخلة قضي
عليها البيوض



تاير



تاتو



تاتوزيه

آذانها بوقية . جرامزها قصيرة مسلحة باظافر حادة . تألف البراري . قوتها الزحافات والدويبات والحشرات والنمل وبعض الجلود النباتية .

٤٥٨٥ - تاتوزيه *
Tatusia (S).

Tatusia (F). Tatusia (E).
جنس حيوانات لبونة من فصيلة المدرعات . انواعه المعروفة ١٢ جميعها امريكية المهد || اجسامها مدرعة مستطيلة . رؤوسها مخروطية . عيونها صغيرة . آذانها كبيرة . اذنانها مستطيلة ، حديدية . قوائمها الامامية رباعية الاصابع ، الخلفية خماسية . اظافرها مخروطية الشكل ، لامتناهية الطول . دروعها لاقياسية الاحزمة التي يراوح عددها من ٥ الى ٩ || اناثها رباعية الابطباء ، منها زوج صدري وزوج كاذبي او اربي . وهي ثنورة تضع في كل رمص من ٤ الى ١٠ جراء || اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

٤٥٨٦ - تاتوزيه اوبره
Tatusia pilosa (S).

Tatusia pileux (F). Pilous tatusia (E).
نوع من التاتوزيه . اعطانه معظم مناطق البر و الاكوادور يألف السباسب والبراري . قوته الحشرات والمظاء والوزغ... ملجئه الحياتي فردي || جسمه يطول نحو ٧٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٣٠ سم . درعه خماسي الاحزمة المتحركة ، اسمر اللون يعلوه غلب دقيق يطول من ٣ الى ٤ سم . لونه الى السمرة التبنية الموج .

٤٥٨٧ - تاتوزيه بيته
Tatusia novemcincta (S). Tatusia péba (F).

نوع من التاتوزيه . اعطانه تمتد من امريكة الوسطى الى المكسيك والتكساس . يألف السباسب والسهول القاحلة . قوته الحشرات والدويبات والجيف . ملجئه الحياتي فردي ،

٤٥٧٨ - تابع النجم
Aldebaran
من منازل القمر ، يدعى الدبران . اطلبه .

٤٥٧٩ - تايل
Candiment
ما يطيب به الطعام . اشهر التوابل الملح ثم البهارات .

٤٥٨٠ - تآبيت
Graduation (F).
Graduation, Graduating (E).

تعيين الاقسام التي تحدد الابنة او الدرجة .

٤٥٨١ - تآبير
Pollinisation (F). Pollinization (E).
هو وصول جدره الوليع الى الميسم ودخولها من القلم الى المبيض . وقد يتم اما طبيعياً ويدعى التفطيج اي التآبير الذاتي . او بالواسطة ويدعى التنبيع والجب اي التآبير الاصطناعي . (راجع لمبارة) .

٤٥٨٢ - تآبير حشري
Entomophilie (F).
Entomophily (E).

هو التآبير الذي تقوم به الحشرات عندما تنقل طلع الزهرة الذكر الى ميسم الزهرة الانثى .

٤٥٨٣ - تآبير * ، تآبيروس
Tapir (F).
هو السناد ، حيوان هني الخلق غليظ الجثة موطنه الحالي جزر ماليزيا وبعض البلاد الامريكية . اطلب سناد .

٤٥٨٤ - تآنو * ، مدرع
Dasypus (S).
Armadille. Tatou (F). Armadillo (E).

جنس حيوانات درعاء من آكلات النمل . انواعه ستة موطنها امريكة الجنوبية مسرحها يمتد من الفويان الى القطب . جميعها ثقيلة الهبة ، اهليلجية الشكل . مفلطحة الجسم تطول من ٣٠ الى ١٠٠ سم . رؤوسها مخروطية ،

تأخر الاكساح او تأخر التقطين وبطء الاكساح او بطء التقطين هو التأخير العارض على تفتح الزبعات والبراعم وقد يكون سببه البرد وخلافه .

٤٦٠٠ - تَأْدَم ، تَدَعَص .

Putréfaction (F).

Putrefaction (E).

انحلال المواد النيتروجينية العضوية بفعل الجراثيم .

٤٦٠١ - تَار .

Juteux (F), Juicy (E).

نعت تمريني يطلق على لباب الثمار الغزيرة العصارة .

٤٦٠٢ - تَارِب ، طَاسِل ، كَيْمُوح .

Géophage (F), Geophagous (E).

نعت تعريفيني يطلق على كل دودة من اي نوع كانت تعيش من التراب .

٤٦٠٣ - تَارِج .

Insoluble (F), Insoluble (E).

غير ممكن حله .

٤٦٠٤ - تَأْرِيث ، تَأْرِيف ، تَحْدِيد .

Abornage, Abornement, Bornage (F), Settling bounds, Fixing limits (E).

هو وضع الارض او المتاور بين ارضين او اكثر لتثبيت الحدود .

٤٦٠٥ - تَارِيخ الكُرَّة الأرضية

Histoire du Globe terrestre (F).

World history (E).

تاريخ الكرة الارضية ، كن منبع عنه ، ينحصر بسرد مراحل التطورات ، بما فيها الحكيمية والجغرافية ، التي مرت بها منذ تكوينها ونشأة الحياة عليها وما آل اليه الوجود البشري || عمر البشرية بالنسبة الى عمر الارض جزء تافه لا يقاس ذلك لان التاريخ المعقول لبدء الحياة القبائلية بعد العائلية لا يتجاوز مدهاء ٢٥ او ٣٠ الف سنة || اما الازمنة التي سبقت هذا العصر ، والتي لا يزال اصحاب الاختصاص يقدرون مداهها ويعيدونه بعد كل معادلة مستجدة ، فانها رجة المجال تقاس بملايين السنين || الابحاث العلمية الحديثة ، بتحديد ازمته الوقائع والاحداث الفارقة ، بناء على معطيات علوم الآثار القديمة والاحاث والجيولوجية استناداً الى السداكة (ترسيب طبقات الارض) والاشعاعية ... ثم بتحديد المجالات الفضائية التي تفصلنا عن الكواكب والنجوم والمجرات .. تفيد وتقدر عمر الكرة الارضية بنحو سبع مليارات سنة ، وهو الزمن الذي انقضى منذ التكوين اي منذ الانفجار السديمي الذي تكونت منه الكرة الارضية بتكاثف المادة || اما التقلبات التي طرأت ، وازمنتها ، ومدى مراحلها ، فيمكن حصرها بخمس مراحل تسلسلها الزمني يأتي كما يلي :

١) المرحلة الاولى وتدعى ما قبل الكمبري ، تقسم الى ثلاث حقبة .

- الحقبة الاولى وتدعى التكوين ، تتميز بالمناسخ التالية :

الانفجار الاصلي .

تكوين الشرح الرقيعي الذي يضم الكرة الارضية .

بدء النظام الشمسي .

تكوين الارض .

- الحقبة الثانية وتدعى السحيقة ، تتميز :

الذكر لا يسمى للاجتماع بالانثى الا في زمن الوداق || جسمه يطول نحو ٧٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٥ سم . درعه تساعي الاحزمة المتحركة . ثوبه الى السمرة السوداء القائمة .

٤٥٨٨ - تَاتُوزِيَّة هَجِين .

Tatusia hybrida (S).

Tatusia mulet (F).

نوع من التاتوزيه . اعطائه بعض مناطق البرازيل . يألف البراري والاراضي المذحاة والقفر . قوته الحشرات والدوريات والوزغ . ملجئه الحياتي فردي كسائر انواع جنسه || جسمه يطول نحو ٧٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٥ سم . درعه سباعي الاحزمة المتحركة . ثوبه الى السمرة .

٤٥٨٩ - تَأْتِير .

Ethérification (F), Etherification (E).

تحويل الكحول الى إيتر .

٤٥٩٠ - تَأْتِيل ، رَسْمَلَة .

Capitalisation (F).

Capitalization (E).

هو تقدير قيمة ثمن الشيء على اساس دخله بمقتضى نسبة مئوية مقرر أو مروفة .

٤٥٩١ - تَأْتِيل الفائدة

Anatocisme (F).

Capitalization of the interest on a loan...

هو ضم فوائد دين حل اجل دفعها الى قيمة الدين الاصلية لتنتج بدورها الفوائد .

٤٥٩٢ - تَاجُ الجَبَّار ، تَاجُ الجَوَّاز

تاج الجبار او تاج الجوزاء تسعة نجوم من كوكبة الجبار مركزها على الكم .

٤٥٩٣ - تَاجِيَّة *

Mitraria (S).

Mitraire (F), Mitraria (E).

جنية معمرة من فصيلة الجسنيريات . ساقها تعلو نحو ١٢٠ سم . افئادها مضلعة ومزبزة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، بيضيه الشكل ، صغيرة القد ، شبه جلدية النصل اللشاري الحتار . ازهارها ابطية الانتشاب ، مستطيلة المالحق قرمزية اللون ، تطول نحو ٤ سم . ثمارها عنبة مخروطية الشكل كالتاج || تنويرها يستمر من ايار الى تموز .

٤٥٩٤ - تَاجِير مَزْرَعَة

Bail à ferme (F).

Lease of land (E).

هي الاجارة المعقودة على ارض زراعية لقاء بدل محدود يجوز ان يكون نقداً ام عيناً .

٤٥٩٥ - تَاجِيم .

Reboisement (F), Retimbering (E).

هو تجديد الحراج اي اعادة تحريجها .

٤٥٩٦ - تَاحِم ، سَاحِل ، تَاسِج .

Tisserand (F).

Weaver (E).

التاحم هو الحائك .

٤٥٩٧ - تَاحِي

Jardinier (F), Gardener (E).

التاحي هو خادام البستان .

٤٥٩٨ - تَآخَر ، لَبْطَاء .

Tardivité, Tardiveté (F).

Lateness (E).

هو التأخر أو الابطاء في نمو النبات والحيوان .

٤٥٩٩ - تَآخَر الاكساح

Echamplure (F).



تَاجِيَّة

(٥) المرحلة الخامسة وتدعى الاباج الرابعي ، وهي تقسم الى حقبتين .

- الاولى وتدعى البليستوسانية ، تتميز اولاً بتواتر ازمة الدميك والدفع . ثم بالحفاظة على جميع الفئات الحيوانية والنباتية البحرية والبرية الموجودة .

- الثانية وتدعى المعاصرة ، تشهد تطور الادراك والمعرفة عند الجنس البشري .

بدء رقي الانسان واستعماله الظرفان ان في الدفاع عن النفس ام في الصيد وغيره .

عصر الرعاة الرحل والقوس والنبال .

الانسان الصيني يستخدم النار .

اكتشاف الزراعة وفارسها .

اكتشاف الخط والرسم كاداة تعبير .

عصر النوقس .

الحضارة الفينيقية وملاحها .

الحضارة الفرعونية وكنوزها .

الحضارة الميسانية (اليونانية الاولى) .

اكتشاف الحلك (البوصلة) .

عصر بركليس اي عصر اثينا الذهبي .

مولد بوذا والحضارة البوذية .

هندسة اقليدس وطبيعات ارخميدس .

الامبراطورية الرومانية .

مولد المسيح والحضارة المسيحية .

حضارة مايا او الحضارة المايسية .

ظهور الاسلام والفتح الاسلامي .

الحروب الصليبية .

البعثات الاستطلاعية البحرية .

اكتشاف العالم الجديد .

عصر البخار والفحم الحجري .

استخدام الكيمياء واستنباط الكهرباء .

استخدام النفط ومشتقاته .

المناهج الاختبارية تتسم الصدارة .

النهضة العلمية والتقدم التقني السريع .

عصر الذرة .

معالم حضارة غنسية بعد ارضيات القمر .

معالم نهضة تقويمية ترمي الى اكتساح العالم وقد تسبب انقراض البشرية او القسم الاكبر منها .

٤٦٠٦ - تأشير Brinjure. Bringeure (F).

خطوط ضيقة الى سواد ثوب لون الثوب في الحيوان .
Brindleding (E).

٤٦٠٧ - تأشير ٥ ، دجسكة ٥ Resanguinage (F).
هو التهجين المفضل للعودة بالنبات الى صفات فقدتها تتميز بها دحه او عذفه .

٤٦٠٨ - تأشير ٥ ، قلونية Alcalinité (F).
هي صفة القلوية او حالتها . Alkalinity (E).

٤٦٠٩ - تأشير Hybridation dégénéréscente (F).
التجين الهابط بالنوع الى ادنى . Degenerating hybridization (E).

٤٦١٠ - تأشير Mandibule (F). Mandible (E).
تأشير ج. تأشير . هي الاجزاء القموية المتساوية الجانبية الارتكاز الموجودة تحت الجاهض والتي تقبض بواسطتها الحشرة على فريستها او ما تقتذي به .

بتكاثف المادة الجامدة وترسيف طبقات الارض .

بتواتر الهزات الارضية والثورات البركانية .

بانتشار الاوكسيجن وبشحن الجو الارضي من هذا المنصر .

- الحقة الثالثة وتدعى ما قبل الحيوان ، تتميز :
بنشأة الحياة على الارض .

بظهور اقدم المتحجرات اللامنسوبة .

بظهور اقدم الاحافير النباتية الخضيبية .

بنشأة التناسل الشقي (النفطير) .

بظهور اول خلايا مضغية ذات جيلة .

بظهور الديدان .

(٢) المرحلة الثانية وتدعى الاباج الاول او القديم وهي تقسم الى خمس حقب .

- الاولى وتدعى الكبرية ، تتميز بانتشار اللافقرات ،
التريلوبيت والرخويات والقشريات والشوكيات
والاسفنجيات والمجوفات .

وبظهور الطوح في المحيطات .

وبانعدام الحياة البرية على اليابسة .

- الثانية وتدعى السيلورية ، تتميز بظهور الفقريات ،
الاسماك المصفحة ، وبانتشار التريلوبيت والتوتيات .
وبظهور العناكب على اليابسة والنباتات الاولى من
مستورات الزهر الوعائية .

- الثالثة وتدعى الديفونية ، تتميز بانتشار الاسماك
المصفحة والتوتيات والفنياتيت .
بظهور القواذب وانتشار العناكب والدخاخيات .

- الرابعة وتدعى الكربونية ، تتميز بانتشار الاسماك
العظمية والقواذب .
وبظهور الزحافات والحشرات ومعديات الارجل .

- الخامسة وتدعى البرمية ، تتميز بانقراض التريلوبيت
وبانتشار الزحافات وبعض الحشرات المتباينة المحجوم
والاشكال .

(٣) المرحلة الثالثة وتدعى الاباج الثاني او الاوسط وهي تقسم الى ثلاث حقب .

- الاولى وتدعى الترياسية ، تتميز بانتشار الزحافات
المائية والسرتيت . وبانتشار الزحافات البرية الكبيرة
الهيكل العظمي ، التي تهيمن على الارض .

- الثانية وتدعى الجورية ، تتميز باستمرار انتشار
الزحافات المائية والعمويات . وبانتشار الدناصير
والحشرات الكبيرة على اليابسة . وبظهور الثدييات
والنباتات باديات الزهر .

- الثالثة وتدعى الطباشيرية ، تتميز بانقراض العمويات
ومعظم الزحافات المائية . وبانقراض الدناصير وانتشار
الزحافات البرية . وبظهور الطير .

(٤) المرحلة الرابعة وتدعى الاباج الثالثي ، وهي تقسم الى حقبتين .

- الاولى وتدعى النملية ، تتميز بانتشار النملويات في
البحار . وبانتشار الثدييات والطير والحشرات والنباتات
الكثيرة الزهر في البر .


- الثانية وتدعى النيوحيينية ، تتميز بمحافظتها على معظم
الاجناس والانواع البحرية . وباستمرار انتشار
الثدييات وبظهور الرئيسات ، ارومة الجنس البشري ،
كما يدهون .



تأشير



تاغندست



تاغو مبول



تاكوك



تال



تالينوم

٤٦٢٠ - **تأكسد** (F). Oxidation (E).
إذا اتحدت مادة بالأكسجين قبل أنها تأكسدت وإذا كانت المادة المتحدة عنصراً سمي ناتج الاتحاد أكسيداً كأكسيد الرصاص وأكسيد النحاس وأكسيد الكربون . وقد يكون اتحاد المادة بالأكسجين مصحوباً بحرارة فيدعى التأكسد احتراقاً .

٤٦٢١ - **تاكوت** (F). Euphorbia (E).
اطلب فرييون .

٤٦٢٢ - **تاكوك*** (S).
Fédie, Valériane d'Alger (F). African valerian, Horn of plenty (E). Algerischer baldrian (D). Fedia, valeriana porporina (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النارديةيات . انواعه اربعة جميعها اعشاب نجمية صغيرة القند تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . سوقها جوفاء فرعاء . اوراقها حاضرة اهليلجية ، نصلها مسنن الحافة ، مدبب العقصة . ازهارها كثيرة ، جميلة الشكل ، وردية اللون وبعضها ابيض .

٤٦٢٣ - **تال ، دؤم تدمر** (S). Borassus flabellifer (S).
Borasse, Palmier de Palmyre (F). Palmyra-palm, Tal-palm, Great fan palm (E). Palmyrapalme, Weinpalme (D). Palma di Palmira, P. de ferro (I).
شجرة من التاليات وفصيلة النخلية منبتها البلاد الحارة ساقها منتصبه رفيعة . اوراقها تاجية مروحية كبيرة . يستخرج من ساقها عصارة سكرية يصنع منها خر اليلج . خشبها صلب العود اسود اللون يصلح في صناعة الادوات .

٤٦٢٤ - **تالب** (F). Bouquetin, Ibex (E).
التالب شجر يتخذ منه القسي .

٤٦٢٥ - **تالب** (F). Bouquetin, Ibex (E).
التالب هو الوعل والاثني تالبة .

٤٦٢٦ - **تالي الشولة**

تالي الشولة نجم في برج العقرب يأتي بعد الشولة .

٤٦٢٧ - **تالي النجم**

تالي النجم نجم نير من كوكبة برج الثور .

٤٦٢٨ - **تاليات** (F). Borassées, Borassinées (F).
سبط من فصيلة النخلية يعد بعض الانواع الافريقية والهندية اشهرها التال .

٤٦٢٩ - **تالينوم*** ، **هرجرج** (S).
Talin, Taline (F). Puchero of Mexico (E). Brantpflanze, Taline (D). Tallno (I).

نبات عشبي بري وبقي من فصيلة الرجليات . اوراقه شبه لحمية متعاقبة معنقة . ازهاره عنقودية التجميع طرفية الارتكاز وحيدة اللون الابيض او الاحمر . منبته اقليم الشواطئ البحرية من امريكا الوسطى . وهو يستعمل استعمال الجرجير .

٤٦٣٠ - **تاليوم** (F).
عنصر معدني اكتشفه كروكس عام ١٨٦١ ودرسه لامي عام ١٨٦٢ . صفاته الحكيمة قريبة من الرصاص . رمزه (تا) ثقله النوعي ١١.٨٥ وزنه الانومي ٢٠.٤ ينصهر في ٢٩٠° سغ . وهو شديد الصلابة سريع

٤٦١١ - **تأشيين** (F).
استخراج القلي من امددة النباتات الاشنية .

٤٦١٢ - **تأصيص ، تركين** (F).
Empotage (F).
Potting (E).
وضع الامير مصطفى الشهابي وهو الزرع في اصيص او في مكن .

٤٦١٣ - **تاغندست*** ، **جاوي**

Imperatoria ostruthium (S). Impératoire de montagne, Benjoin français, Autruche, Otours (F). False pellitory of sapin, Fellow grass (E). Echte meisterwurz, Falsches spanisches glaskraut (D). Imperatoria, I. della montagna (I).

نبات طبي جذموري معمر من فصيلة الخيميات . منبته اقليم حوض البحر المتوسط . اوراقه مركبة خماسية ، مستطيلة الزناد . ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شواخ منتصب رفيع . ازهاره كثيرة العدد ، صغيرة القند ، بيضاء اللون . جلدوره يحوي بعض الخواص الطبية الجزيلة النفع التي اشتهرت في العهد الماضي وكادت تضمحل في عهدنا الحاضر .

٤٦١٤ - **تاغو** (S).
Sauvegarde, Tegu (F).

جنس حيوانات زحافة من العطاء وفصيلة التيديات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها المناطق الاستوائية الامريكية || تتميز بكبر اجسامها وباستطالة آلسنها المغلقة الاطراف الاخاذة . جلودها مغلقة بالخراف من الرأس الى الذنب . قوائمها قوية نشطة خماسية الاصابع . اغبابها كبيرة متدلية . اذنانها مستطيلة ضخمة القواعد دقيقة الاطراف || قوتها الحيوانات والطيور والحشرات .

٤٦١٥ - **تاغو أد هس**

Tupinambis rufescens (S).
Sauvegarde rougeâtre, Tegu rougeâtre (F).
نوع من التاغو . موطنه بعض مناطق الارجنتين . يألف صفاف مجاري الماء ولا يقترب من الاماكن الآملة . قوته الحيوان والطيور || جسمه كبير القند ، بطول نحو ١٢٠ سم ثوبه الى الدهسة يملوها تمشيع اخضر واسود . الصفحة السفلى من جسمه الى الغبرة الدنسة .

٤٦١٦ - **تاغو مبول***

Tupinambis teguixin (S).
Sauvegarde commun, Tegu commun (F).
نوع من التاغو . موطنه يمتد من البرازيل الى الارغواي والانتيل . يألف الغابات القريبة من الماء ويقترب من الاماكن المأهولة لانه يسطو على الدجاج والبيض . قوته الجرذ والفأر والوزغ والطيور ... || جسمه كبير القند بطول نحو ١٥٠ سم . ثوبه الى الخضار الزيتي يملوه تجذيع معترض اسود . بطنه وكامل الصفحة السفلى من جسمه الى الغبرة الصفراء .

٤٦١٧ - **تافول** (F).
Tacca
اطلب نقه .

٤٦١٨ - **تافي** (F). Anaphylaxie (F). Anaphylaxis (E).
فرط التحسس .

٤٦١٩ - **تافلوم** هو التبلد ، اطلبه .

٤٦٤٠ - **تَامِينَات مُتَّحِدَة** ، **تَامِينَات مُقْتَرَنَة**
Co-assurances (F). Co-Insurances (E).
هي التأمينات المتتابة على عين واحدة في سبيل خطر واحد
شرط ان لا تزيد جملتها عن ثمن العين المؤمنة .

٤٦٤١ - **تَامِيَة *** ، **صَيْدَلَانِي** Tamia (S). Tamia.
جنس حيوانات ليلية قاضمة من فصيلة السنجابيات انواعه
٢٦ منها ٢٥ امريكي ونوع واحد اسيوي . جميعها صغيرة
القد . اجسامها تطول من ١٤ الى ١٨ سم . واذناها من
١٠ الى ١٢ سم . اذناها الى الصفرة الغبراء تعلوها خمسة
خطوط سود . اصوافها قصيرة خشنة ، جحورها مساكن
فسحة المخازن والحجر عديدة المداخل والمخارج ، طويلة
الانفاق المنعرجة والسراريب المعرضة تحفرها قرب جذوع
الاشجار وبين جذورها وتخزن فيها ما تستطيع ادخاره
من بزور وجيوب يراوح وزنها من ٦ الى ٩ كيلو .

٤٦٤٢ - **تَاهِيِي** ° Métazoïque (F).
Metazoic (E).
نعت تعريف يطلق على ما استبق ظهور الحيوان . كقولك
المصور التاهيبي .

٤٦٤٣ - **تَبَارِيح النَّبَات** Inflorescence
هي ازهاره او مجموعة ازهاره .

٤٦٤٤ - **تَبَاعِد ، تَبَايُن** Divergence
اختلاف الاتجاه .

٤٦٤٥ - **تَبَاعِدِي ، مُتَبَاعِد ، مُتَبَايِن**
Divergent
مختلف الاتجاه .

٤٦٤٦ - **تَبَاغ °** Planteur de tabac (F).
Tobacco grower (E).
التبَاغ من تعاطى زراعة التبغ .

٤٦٤٧ - **تَبَاغَة °** Tabacologie (F).
Tobacology (E).
التبَاغَة البحث في التبوغ وصفاتها وميزاتها ومحتوياتها
العنصرية .

٤٦٤٨ - **تَبَان**
التبان هو بائع التبغ . والتبان هو المكان المعد لحزن التبغ
والجشيش وما اشبه .

٤٦٤٩ - **تَبْتِيل °** Pétalodie (F). Petalody (E).
التبيل عارض جسموري يعترى ازهار بعض النباتات
فيحول الاسدية الى بتلات .

٤٦٥٠ - **تَبْخُر** Evaporation
تحويل السائل الى بخار ، من سطحه الطلق ، ببطء وهوادة
بفعل حرارة الشمس .

٤٦٥١ - **تَبْخِير** Vaporisation, Fumigation (F).
Vaporization, Fumigation (E).
هو احداث بخار لغاية معينة قد تكون صحية او زراعية
او صناعية .

التأكسد في الهواء والماء . يمتزج مع الكبريت والكلور
والبروم واليود والزنك والنيحاس والالومينيوم والزنك
والرصاص || تراكيبه واملاحه سامة قتالة .

٤٦٣١ - **تَامِر *** ، **لُوبِيَاء عُسْقُولِيَّة**
Dolichos bulbosus (S). Dolique bulbeux (F).
Tuberous grané (E). Dolico bulboso (I).
نبات عشبي حولي عسقولي الجذور من اللوبياء وفصيلة
القطانيات الفراشية . اعطائه البلاد الحارة يزرع لخبه
وعساقله المأكولة .

٤٦٣٢ - **تَامِك**
التامك : الناقة العظيمة السنام . ج توامك (السان) .

٤٦٣٣ - **تَامِك** Elevé (F). High (E).
نعت وصفي يطلق على كل ما هو مرتفع من النبات والاشياء .
كقولك شجرة تامكة وبناء تامك .

٤٦٣٤ - **تَامُور** Péricarde (F). Pericardium (E).
هو الشغف ، غلاف القلب .


٤٦٣٥ - **تَامُول *** ، **تَنْبُل** ، **شَاه صِينِي**
Piper betel (S). Bétel, Temboul, Poivrier
betel (F). Betel pepper, Betel vine (E). Betelp-
fefferstrauch, Betel (D). Betel (I).
نبات معمر من فصيلة الفلفلث . ساقه ليفية عارشة .
اوراقه متعاقبة معنقة قلبية النصل . ازهاره ابطية . تكثر
زراعته في الهند حيث يصفون اوراقه . ثماره جوزية
يستخرج منها صباغ احمر مرغوب فيه . ويستخرج من
اوراقه بالتقطير وبعد معالجتها باليوتاس مادة مائنة فستقية
اللون تدعى «روح التامول» مفعولها التطهيري يزيد
مفعول الفينول خمسة اضعاف .

٤٦٣٦ - **تَامُول ضَيْقُ الْوَرَق *** ، **مَتِيْكُو** ، **عُرْطَنُث**
Piper angustifolium (S). Bétel à feuilles étroites,
Matiko, Herbe du soldat (F). Matiko plant,
Soldier's herb (E). Soldatenkraut (D). Erba di
soldato (I).
نوع من التامول . اوراقه ضيقة النصل يقال انها طيبة
نافعة كثيرة الفوائد الصحية . اوراقه وثماره تستعمل
استعمال التامول .

٤٦٣٧ - **تَأْمِين** Assurance (F). Insurance (E).
عقد يلتزم به المؤمن مقابل قبض بدل متفق عليه ان يدفع
الى المؤمن له او الى مستحق التأمين مبلغاً محدداً او دخلاً
منظماً اذا ما وقع خطر معين كالحريق وهلاك الماشية .

٤٦٣٨ - **تَأْمِين زِرَاعِي** ، **ضَمَان زِرَاعِي**
Assurance agricole (F). Agricultural Insurance (E).
اتفاق متبادل بين زارع وشركة تدفع هذه بموجبه الى الزارع
قيمة الهالك او التالف من الشيء المضمون لقاء عجالة
ثابتة او متبدلة . مثاله ضمان الماشية من الطوارئ وتأمين
الزروع من الصقيع .

٤٦٣٩ - **تَأْمِينَات** Sûretés (F). Warranty (E).
هي الضمان المتقدم لاجل تنفيذ الالتزام . والتأمينات قد
تكون شخصية او عينية .



تَامِر



تَامُول



تَامُول ضَيْقُ الْوَرَق



تَامِيَة

٤٦٦٣ - تَبَسُّس Sitelle (F).

طائر يدعى كاسر الجوز ، اطلبه . ومنه الاروبي والازرق والسرياني .

٤٦٦٤ - تَبَسُّس سِرْيَانِي Sitelle syriacus (F).

طائر يدعى كاسر الجوز السرياني ، اطلبه .

٤٦٦٥ - تَبَسُّسِيَّات Sittidae (S).

Sittidés (F). Sittidae (E).

فصيلة طير من الجواثم المتسلقات رقيقات المناقير . انواعها المعروفة ٢٤ اعطانها البلاد المعتدلة الحرارة وبعض المناطق الشمالية || معظم انواعها آبد وبعضها ضارب . تألف الحراج والغابات . قوتها الحشرات والدويبات اخصها العناكب وبعض البزور والحبوب || اجسامها صغيرة ، ربة . رؤوسها معتدلة الجرم . مناقيدها مخروطية مستطيلة . اجنحتها معتدلة الرخابة ، عشارية القوام . اذناها قصيرة مربعة الشكل ، تتألف من ١٢ رفة || تدن في تجاويف الاشجار وفي اوقاب الصخور . اناثها تحضن من ٣ الى ٩ بيضات . الترخيم يستمر من ١٣ الى ١٤ يوماً . الذكور تؤمن الغذاء || اشهر انواعها التَبَسُّس .

٤٦٦٦ - تَبَسُّشُ Loriot (F). Oriole (E).

طائر يقال له صفارية واجمعها .

٤٦٦٧ - تَبَسُّشِيَّات Oriolidae (S).

Oriolidés (F). Oriolidae (E).

فصيلة طير من الجواثم مشروبات المناقير . انواعها المعروفة نحو ٤٠ معظمها من ضوارب وقواطع العالم القديم || تألف الحراج والمواقع التي تكثر فيها الاشجار الباسقة . ملجنها الحياتي جماعي باستثناء زمن التصادف والحضانة || قوتها الحشرات الطائرة والدابة وبعض الثمار العنية || اجسامها رشيقة ، متفاوتة القد . اطوالها تراوح من ٢٠ الى ٢٧ سم . رؤوسها ومناقيدها معتدلة الجرم . اجنحتها مستطيلة ، ذلفة . اطول قوامها الرابعة . اذناها متوسطة القد ، مقطوعة الطرف . اناثها ملونة ، يكثر فيها الاصفر والاصفر الاخضر المواجه . اناثها ابيض ثوباً من ذكورها || اشهر انواعها التبشش المعروف بالصفارية .

٤٦٦٨ - تَبَشُّع Ricin (F). Castor-oil plant (E).

التبشع هو الخروع ، اطلبه .

٤٦٦٩ - تَبَعُ* Agrion (F). Dragon-fly (E).

جنس حشرات من فصيلة التبعية ، انواعه عديدة جميعها اسطوانية الجسم المستطيل النحيل . اجنحتها رباعية زاهية الالوان . تعيش قرب الماء .

٤٦٧٠ - تَبَعُّشُ Dispersion (F).

Dispersion, Breaking-up (E).

٤٦٧١ - تَبَعِي Vache en chaleur (F).

التبعي هي البقرة المستحمة (القاموس) .

٤٦٧٢ - تَبَعِيَّات Agrionidae, Calopterygidae (S).

Agrionidés, Calopterygidés (F).

Agrionidae, Calopterygidae (E).

فصيلة حشرات من الرعاشات اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها حشرات مفيدة تفترس الهوام . وهي تتميز بضعف طيرانها وبعدم استرسال اجنحتها عند الراحة . اناثها تمتح مكنتها على النباتات المائية تحت الماء .

٤٦٥٢ - تَبَدُّل Variation

هو التغير الذي يحصل في الصفات الاساسية لضرب او نوع ما من النبات او لعرق او سلالة حيوانية . ومن التبدلات ما تنتقل بالوراثة ومنها بالتطعيم .

٤٦٥٣ - تَبَدُّل فَجَائِي Mutation (F). Change (E).

هو الافتجاء ، اطلبه .

٤٦٥٤ - تَبْدِيد ، إِخْتِلَاس Détournement (F).

Turning away, Misappropriation (E).

هو ان يخرق حائز العين عمداً العقد القانوني الذي خوله وضع يده عليها محتفظاً بملكيتها لغيره فيتصرف في هذه العين تصرف المالك اما برفض ردها الى مالكها او بتسليمها للغير .

٤٦٥٥ - تَبِيرُ Or vierge (F). Native gold (E).

هو الذهب الطبيعي ، اطلب ذهب .

٤٦٥٦ - تَبَرَّع Libéralité (F). Bounty (E).

هو كل تصرف لا عوض عنه مهما كانت طريقته كالحبة والوصية الخ .

٤٦٥٧ - تَبَرُّعُ Débourement (F).

Bursting of the breds of trees (E).

تبرعت الشجرة : خرج برعمها .

٤٦٥٨ - تَبَرُّومَة Theobroma (S). Théobrome (F).

جنس نباتات شجرية من فصيلة البرازيات . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي يستثمر لبدوره التي يستخرج منها الكاكاو . اعطانها البلاد الحارة الرطبة . سوقها منتصب تعلو من ٤ الى ١٦ م . جذورها وتدية . اغصانها فرعاء . اوراقها معتقة متعاقبة لاقياسية الشكل . نصالها بارزة العروق . ازهارها خنثوية ، خاسية التركيب جذعية وفرعية الارتكاز . ثمارها قرون مخروطية مستطيلة يعلوها تخيط قطبي حنطي اللون عدد اضلاعه يراوح من ٥ الى ١٠ لبانها عنبية المادة سكري الطعم يلحف بعض البذور اللوزية الشكل التي يستخرج منها الكاكاو . اشهر انواعه تبرومة الكاكاو المعروفة بالكاكاو وتبرومه ماريا .

٤٦٥٩ - تَبَرُّومَة الكاكاو Théobrome cacao (F).

هي الكاكاو ، اطلبه .

٤٦٦٠ - تَبَرُّومَة مَارِيَا* Theobroma Mariae

Abroma Mariae, Herrania Mariae (S) Théobrome Marle, T. du Brésil (F).

نوع من التبرومه البرية مهددا البرازيل في مناطق الامازون العليا . شجرتها تعلو نحو ١٠ امتار . اوراقها كبيرة القد مركبة كفية سباعية او تساعية الوريقات الاهليلجية المستطيلة ، زانداها يطول نحو ٥ سم . ازهارها الى الصفار الموشح بالاخضر بزورها مستحبة الطعم والعرف ، عادمة المرأة تستعمل استعمال الكاكاو .


٤٦٦١ - تَبَرِّي Flave (F). Pale yellow (E).

هو اللون الاصفر المذهب .


٤٦٦٢ - تَبَرِير ، تَسْرِيَة Grainage (F).

Silk-worm's eggs (E).

عمل يرمي الى الحصول على سرء دود القز .



تَبَرُّومَة مَارِيَا



تَبَعُ

N. Maritima	١٦	تبغ مريتميا
N. Megalosiphon	٢٠	مفلوسيفون
N. Multivalvis	٢٤	مليثيفليس
N. Miersii	١٢	ميارسي
N. Nesophila	٢٤	نوفيليا
N. Noctiflora	١٢	نكتيفلوره
N. Nudicaulis	٢٤	نوديكوليس
N. Wigandoides	١٢	ويغنديويد

٤٦٧٥ - تبغ تباكم* ، نيكوليانا تباكم

Nicotiana tabacum (S).

عرة من التبوغ أنواعها ٦ . خمسة منها برية وزيينية
واحد يدعى باسم العرة تحدرت منه الضروب والاصرام
الزراعية المعروفة المشهورة || نباتاتها متباينة النشط
والقوة . سوقها منتصبه تكثر فيها الفروع الهامة .
اوراقها نظامية الارتكاز متفاوته العدد الذي يراوح من
١٦ الى ١٢٠ . نصالها حاضنة وبعضها لاطى* وهي مختلفة
الاشكال والاحجام يكثر فيها الاهليلجي الكبير الصفحة .
ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها لاقياسية اللون الذي
يراج من الابيض الى الارجواني || نظامها النطشي قياسي
الترتيب والعدد . نطاق انواعها ١٢ باستثناء نوع تباكم
المزدوج العدد || اوراقها تستعمل للتدخين والمضغ والسعوط
ويستخرج من بذورها مادة زيتية جفوفة تصلح لصناعة
الصابون وادهان البويا || اما انواعها الستة فهي ما يتبع :

N. Otophora	١٢	تبغ أوفوره
N. Tabacum	٢٤	تباكم
N. Tomentosa	١٢	تومتوزا
N. Rusbyi	١٢	رسي
N. Setchellii	١٢	ستشلي
N. Glutinosa	١٢	غلوتينوزه

٤٦٧٦ - تبغ رستنيكا* ، نيكوليانا رستنيكا

Nicotiana rustica (S).

عرة من التبوغ انواعها المعروفة ٩ معظمها بري وزييني
ضروبها واصرامها الزراعية عديدة . نباتاتها ناشطة قوية .
سوقها منتصبه . اوراقها معنقة مختلفة الاشكال والاحجام
يكثر فيها الشكل القلبي . ازهارها الى الصفرة يعطوها موج
اخضر || نظامها النطشي قياسي الترتيب والعدد . نطاق
انواعها ١٢ باستثناء نوع رستنيكا المزدوج العدد .
اشهر ضروبها الزراعية الصناعية وخصها الماخوركا تزرع
في بلاد الاتحاد السوفياتي وفي سائر اروبة الشرقية . ومن
ضروبها الحامية القوية الغنية بمادة النيكوتين تخص
بالذكر الزلاخ الذي يزرع في مراکش والسوفي الذي يزرع
في تونس والبرازيليا الذي يزرع في ايطاليا || اما انواعها
التسعة فهي :

N. Benavidesii	١٢	تبغ بنافيدسي
N. Paniculata	١٢	بنيكولاته
N. Thyrsiflora	١٢	تيرسيفلوره
N. Rustica	٢٤	رستنيكا
N. Raimondii	١٢	رموندي
N. Solanifolia	١٢	سولانيفوليا
N. Glauca	١٢	غلوكا ، سيس
N. Cordifolia	١٢	كرديفوليا
N. Knightiana	١٢	كنيكتيانه

Tabac, Nicotiana (F).

Tobacco, Nicotiana (E).

اسم شامل يدل على الجنس . يستعمل للتعريف النوعي
والضربي كقولك تبغ تباكم وتبغ رستنيكا وتبغ بافرا
وتبغ جزيني الخ . والتبغ من تعاطى زراعة التبغ .

٤٦٧٤ - تبغ بتونيويد* ، نيكوليانا بتونيويد

Nicotiana petunioides (S).

عرة من التبوغ انواعها المعروفة ٤٥ جميعها برية
وزيينية . نباتاتها اعشاب متناقلة الكسم والشوزن ،
لاقياسية التفريع معظمها ضمي الفروع الجزعية الانتشاب .
اوراقها لاقياسية التجميع والارتكاز قراكب عند اسفل
الجدع والفروع وهي متباينة الاشكال والاحجام . نصالها
لاطئة او معنقة . ازهارها مستطيلة الانابيب مختلفة الالوان
منها الابيض والوردي والاحمر والبنفسجي وهي بغالبيتها
تسكع وتنطبق في وجه النور ، تفتح وتتنور في الظل
والظلام || نظامها النطشي متفاوته الاعداد ، لاقياسي
الترتيب . نطاق انواعها يراوح من ٩ الى ٢٤ || اما
انواعها فهي ما يتبع :

N. Attenuata	١٢	تبغ أنواتا
N. Arentsii	٢٤	أرنتزي
N. Exigua	١٦	اكزيكوا
N. Excelsior	١٩	اكسلسيور
N. Occidentalis	٢١	اكسيدنتاليس
N. Acaulis	١٢	اكوليس
N. Acuminata	١٢	اكوميناتا
N. Alata	٩	الاتا
N. Ameghinii	١٢	أمغينو
N. Undulata	١٤	أندولاته
N. Inguiba	٩	إنغوليا
N. Palmeri	١٢	بلسميري
N. Petunioides	١٢	بتونيويد
N. Plumbaginifolia	١٠	بلمباجينيفوليه
N. Benthamiana	١٩	بنتميانه
N. Pauciflora	١٢	بوسيفلوره
N. Bonariensis	٩	بوناريينسيس
N. Bigelovii	٢٤	بيغلوفي
N. Trigonophylla	١٢	تريغونوفيليا
N. Debneyi	٢٤	دبني
N. Repanda	٢٤	ربندا
N. Rotundifolia	٢٢	روتنديفوليه
N. Spegazzinii	١٢	ستيفزيني
N. Stocktonii	٢٤	ستكتوني
N. Stenocarpa	٩	ستينوكربا
N. Suaveolens	١٦	سوافيولنس
N. Sylvestris	١٢	سيلفستريس
N. Goodspeedii	٢٠	غودسبيدي
N. Gossei	١٨	غوسي
N. Fragrans	٢٤	فراغرانس
N. Velutina	١٦	فلوتينا
N. Quadri-valvis	٢٤	كدريفلفيس
N. Clevelandii	٢٤	كليفلندي
N. Corymbosa	١٢	كورمبوزا
N. Longiflora	١٠	لنجيفلوره
N. Langsdorffii	٩	لنغسدورفي
N. Linearis	١٢	لينياريس



تبغ بتونيويد



تبغ تباكم



تبغ رستنيكا

٤٦٧٧ - تَبَقِيَّات ، نِيكُوتِيَانِيَّات

Nicotianées (F). Nicotianeae (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من الفصيلة الباذنجانية . انواعها عديدة وضروبها بضع مئات . يقال ان منبتها الاصلي امريكة الجنوبية ومنهم من قال الهند . وهي بمعظمها نباتات وحيدة الساق المنتصبة تعلق من ٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها مختلفة الاشكال والاحجام تحوي بعض المواد المخدرة الشبه قلوية اخصها وافعلها «النيكوتين» . ازهارها كاملة خنثوية خماسية البتلات والاسدية . ثمارها بزور صغيرة كستنائية اللون يجمعها حق ثنائي الفلن رباعي الغريفات || والتبقيات تقسم الى ثلاث عتر رئيسية وهي :

Nicotiana tabacum

تبغ تباكم

Nicotiana rustica

تبغ رستيكا

Nicotiana petunioïdes

تبغ بتوليويدي

اما الضروب والاصرام التي تحدثت من انواع هذه العتر فلا يقل عددها الحالي عن ٨٠٠ .

٤٦٧٨ - تَبْقِيل (F). Cross-breeding (E).

هو الانفال ، قوامه الجمع بالانزاع بين حيوانين من نوعين مختلفين للحصول على نتاج معين .

٤٦٧٩ - تَبَقُّع * (F). Spots (E).

وصم فطري يصيب بعض الاشجار المثمرة والخرجية فيؤذيها سببه فطور مجهرية تعرف بالموطب . اطلب عوطب .

٤٦٨٠ - تَبَلْدِي (F). Monkey bread (E).

راجع بوباب .

٤٦٨١ - تَبَلَّص

تبلصت الغم الارض : رعت ما فيها اجمع .

٤٦٨٢ - تَبَلُّل ، إِذْمِصَّاص (F). Adsorption

هو امتصاص الجوامد للسوائل وهو ايضاً تشرب الجوامد للغازات .

٤٦٨٣ - تَبَلُّور (F). Crystallization (E).

هي الاشكال الهندسية التي يكتسبها الجسم عند استحالاته من الميوعة الى الصلابة .

٤٦٨٤ - تَبْلِيد ، تَوَطِين ، تَأَقْلِم (F). Acclimatation (E).

هو اخضاع الحيوان او النبات الى مناخ جديد لم يألّفه .

٤٦٨٥ - تَبْلِيل ، تَرَشَّاش (F). Irroration (E).

تعرّض الشيء للتدلى او البلل .

٤٦٨٦ - تَبْن

التبن عصفية الزرع من بر ونحوه . الواحدة تبنة . وتبن : جعل التبن في المتبن . وتبن الدابة : علفها التبن .

٤٦٨٧ - تَبْن مَكَّة (F). Scenanth (E).

راجع لإذخرم .

٤٦٨٨ - تَبْنَة ، رُف (F). Paille hachée (E).

٤٦٨٩ - تَبُوع

Tabacs, Nicotianas (F).

Tobaccos, Nicotianas (E).

هي مجموعة ضروب واصرام التبغ المزروعة في بلاد ما لا رابط بينها سوى رابط البلاد او الوحدة الاقليمية .

٤٦٩٠ - تَبَوُّع ، تَجْوُّم (F). Sporulation, Sporallation (E).

هو حصول البوغ في النباتات المستورات الزهر .

٤٦٩١ - تَبْوِير (F). Laisser une terre en friche (E).

هو ترك الارض بوراً اي بلا زرع .

٤٦٩٢ - تَبْوِيز (F). Bossage (E).

٤٦٩٣ - تَبَيَّان ، بَيَّان (F). Déclaration (E).

هو اعلان او شهر او ابانة الحالة القانونية او الفعلية القائمة .

٤٦٩٤ - تَبْيِيع

هو ولد البقرة اول سنة . وبقرة تبيع : معها ولدها . والاثني تبعة . ج تباع .

٤٦٩٥ - تَبْيِيع (F). Congestion

راجع احتقان .

٤٦٩٦ - تَبْيِيكَة * (F). Phyllachora

جنس فطور مجهرية من البيبايات وفصيلة المشويات . تتميز باصانها المركبة المخوفة القائمة على وليمة لاجولية . بوغها وحيد الخلية بيضي الشكل شفاف || له نوعان اقتصاديان وهما :

٤٦٩٧ - تَبْيِيكَة العَرْن (F). Phyllachora lathyri

فطر مجهرية يصيب بعض القرنيات اخصها العرن . مظهره الخارجي يقع مستطيلة ، لونها الى السمرة ، تركيب النصل ، تفصلها عن بعضها العروق والشرابين || اضراره جسيمة اذا استحكم وسمحت له العوامل الجوية لانه يسبب يباس الاوراق .

٤٦٩٨ - تَبْيِيكَة النَجِيلَات (F). Phyllachora graminis (S).

فطر مجهرية يركب بعض النجيليات . اخصها النجيل والثرغول والثيل والمكرش والنسيل والعصوية والدخن . مظهره الخارجي يقع قدية الشكل لونها الى السمرة تصيب العصف واعنادها على صفحتها العليا فتسبب جفاف النسيج ثم يباس .

٤٦٩٩ - تَبْيُوكَة (F). Tapioca (E).


حميد خشن مأكول غني بهيدرات الكربون سريع الهضم يصنع من دقيق المنيوت ، راجع منيهوت .

٤٧٠٠ - تَبَابِع ، تَسَلْسُل (F). Séquence (E).

راجع تسلسل .

٤٧٠١ - تَبَانُوس ، تَبْتَانُوس (F). Tétanos (E).

هو الكزاز مرض وييل ، اطلبه .



تبغ



تبغ

٤٧٠٢ - تترافوسفات الكلس

Tétraphosphate de chaux (F). Tetrphosphate limestone (E).
سماد كيمائي فسفاتي يحوي نحو ٦٢ ٪ من الحامض الفسفوري.

٤٧١٢ - تشفل

التشفل : شجر يسميه أهل الحجاز مشط الذئب .
« : نبات مثل الاصبع انخضر في نخضرته خطبة .
« : ما يبس من العشب .

Colmatage, Limonage (F). تشقين
Warping (E).

هو ارسال الماء الزغل في الارض لتجود . يقال تقن الارض .

Tabacs en feuilles (F). تشن
Tobacco leaves (E).

هو التبغ الجاف بعد رزمه وتضييحه وتحمته بعض الوقت .

Tabac haché (F). تشن مفروم
Mixed tobacco, Choped tobacco (E).

هو التبغ الجاف المفروم الممكن لفه وتدخينه .

Terreautage (F). Moulding (E). تشيرب
التشيرب هو توزيع التيرب او الزيل المشترب .

Téthys (F). Tethys (E). تشيس

اسم اسطوري يطلقه علماء الجغرافية ، في هذا العصر ، على البحار الاستوائية ذات المياه الساخنة الكثيرة الملوحة .

Nivation (F). تشجين
كل تخديد في الحضيض سببه السيل مها كان مركزه ومها بلغ قدره .

Renardeau (F). Fox-cub (E). تشفل
ولد الثعلب .

Trisection تشليث
قسمة الشيء الى ثلاثة اجزاء متساوية .

Tierçage (F). تشليث
هو حرث التربة ثالث مرة لتطيب بعد تفكيك مدرها واندماجها .

٤٧٢٢ - تخمين ، تقدير الشمن ، تخمين الشمن
Estimation en argent (F). Appraising, Valuation (E).
هو تعيين ثمن الشيء المكشوف عليه او المراد بيعه .

Réassurance (F). تشسيّة التأمين
Reinsurance (E).

Essaimage (F). Swarming-time (E). تشوئل
هو اجتماع النحل عند مدخل الخلية او القفير او المباءة قبل الافراق او عندما يكون على اهبة الافراق .

Amativité (F). تشجاذب
Amativeness (E).

التجاذب ، عند محترفي فراسة الدماغ او من يتعاطاها ، اسم يطلق على الميل الطبيعي الذي يتكون بين مخلوقين فيقودهما الى التعارف والتحابب .

Maquignonnage (F). تجارة الخيل
Horse-dealing, Underhand wort (E).
عرض الخيل للبيع والشراء . وتدعى جنيزة ونحاسة .

Tetranychus (S). تترانيك
Tétranyque, Araignée rouge (F). Tetranychus, Red spider (E). Rote Spinnen (D).

جنس حشرات ضارة من فصيلة الخاشيات انواعه عديدة جميعها بيضية الشكل طولها يراوح من ٥،٠ الى ١،٠ مم .
اثوابها الى الحمرة الصفراء الموج ، جرامزها اربعة ازواج .
مكنها ذري القد ، مستدير الشكل ابيض اللون او احمر تتمحه الانثى على النبات داخل شبكة من النواس الدقيق فينفف عن يرقات تعرف بالعناكب الحمر تتعدى على مسام الفصل وخلاياه ونسغه فتؤذيها وتعطب النبات .

٤٧٠٤ - تترانيك الاشجار المثمرة

Tenuipalpus oudemansi (S).
حشرة من التترانيك ثوبها احمر اللون تركب اوراق وثمار التفاح والاباص والدراق والخوخ والمشمش واللوز...
فتؤذيها اشد الاذى بعد ان توشها برقشة من البثور المجهرية السراء اللون .

Anychus latus (S). تترانيك الحمضيات
حشرة من التترانيك ثوبها الى الخطي الاصفر . تركب اوراق وثمار الحمضيات اخضها الليمون الحلو وقد لا تعف عن بعض اشجار الزينة واللبخ والخروع .

٤٧٠٦ - تترانيك القراض
Tetranychus urticae, Tetranychus altheae (S).

حشرة من التترانيك ثوبها الى الحمرة الصفراء الموج تركب القراضيات والقرعيات واللوبياء والفول فتؤذيها اشد الاذى .

٤٧٠٧ - تترانيك النجيل
Dolichotetranychus floridanus (S).

حشرة من التترانيك ثوبها الى الجزء تصيب النجيل وبعض النباتات العشبية البرية التابعة للفصيلة نفسها .

٤٧٠٨ - تترانيك تيلاريوس


Tetranychus telarius (S).
حشرة من التترانيك كثيرة الاذى تركب مختلف النباتات العشبية واليفية والخشبية . ثوبها الى الحمرة الزاهية ، يصفر مع العمر وعند يياتها الشتوي . اجيالها الحولية ثلاثة .
جيلها الصيفي يتم باكل من اسبوعين وهي لذلك تتكاثر بسرعة وتعتبر من الحشرات المؤذية .

٤٧٠٩ - تترانيكيات


Tetranychidae (S).
Tétranychidés (F). Tetranychidae, Red spiders, Red spider unites (E). Rot Spinnen, Spinnmilben (D).
هي فصيلة الخاشيات ، اطلبها .

Lupinose (F). Lupinosis (E). تشومس
هو التسمم الذي يحصل من اكل حب الترمس او نباته مدة طويلة .


Terrage (F). Earthwork (E). تشريب
التشريب هو نقل تراب زراعي حسن التركيب وبسطه على ارض قليلة الحصب بقصد تحسينها . راجع لتراب .




تترانيك



تترانيك الاشجار المثمرة



تترانيك الحمضيات



تترانيك تيلاريوس




تشجين

٤٧٤٠ - تجزئة ، تقسيم (F). Démembrement (F).
Dismemberment (E).
هو فصل بعض حقوق من ملكية العين ونقلها الى غير مالك العين فتصبح هذه الحقوق عينية يملكها هذا الغير وتحوطه بعض صفات مالك العين كحق الاتفاق والانتفاع .

٤٧٤١ - تجسيم (F). Stéréométrie (F). Stereometry (E).
التجسيم ومنهم من قال التكريم هو قياس الاجرام المحسوسة .
٤٧٤٢ - تجعد ، تجعيد (F). Frisolée (F). Crinkle (E).
هو الزرفن وصم يعري البطاطا .

٤٧٤٣ - تجصيص (F). Plâtrage (F). Plastering (E).
هو الاصلاح بالجص اي باضافة الجص الى التراب بغية اصلاح تركيبه .



تجويل مترادف

٤٧٤٤ - تجفيف ، تبليس ، تنشيف (F). Dessiccation, Séchage (F). Desiccation, Drying (E).
هو ازالة الماء او العصارة المائية التي يخشى العطش من بقائها في معظم المحاصيل الزراعية .

٤٧٤٥ - تجفيل (F). Effoliage (F).
هو قطع رؤوس الزرع اذا طال تجفيفاً له وخوفاً من الضجعان .

٤٧٤٦ - تجلبس (F). Lathyrisme (F). Lathyrism (E).
هو التسمم الذي يحصل من غلف الحيران جلبساً مدة طويلة .

٤٧٤٧ - تجلية (F). Performance

٤٧٤٨ - تجنيس (F). Homogénéisation (F).
Homogeneization (E).

٤٧٤٩ - تجنيف (F). Talutage (F). Sloping (E).
التجنيف جعل الشيء منحدرًا كالتجنيف .

٤٧٥٠ - تجهيز (F). Equipement (F).
Outfit, Fitting out (E).

٤٧٥١ - تجويل مترادف* (F). Cloisonnement simultané (F). Dividing membrane (E).

٤٧٥٢ - تجويل معترض* (F). Scissiparité, Cloisonnement transversal (F). Scissiparity, Schizogenesis (E).

٤٧٥٣ - تحات (F). Cryergie (F). Cryergy (E).
التحات العمل التحتاني الذي يسببه الجليد وذوبانه في الصخور وفي التربة .

٤٧٥٤ - تحاريق (F). Etiage (F). Low-water mark (E).
راجع بروض .

٤٧٥٥ - تحال ، تنافذ (F). Osmose (F).
Osmose, Osmosis (E).

التحال هو التبادل الذي يحصل بين السوائل المختلفة الكثافة والمفصولة بعضها عن بعض بفشاء عضوي حتى يتم تجانس تركيبها . والتحال قد يكون داخلي او خارجي .

٤٧٢٧ - تجارة السمك (F). Mareyage (F).
Fresh-fish trade (E).

٤٧٢٨ - تجانس ، تناسب (F). Homogénéité (F).
Homogeneity (E).
صفة الاشياء المتشابهة الخلق او الشكل .

٤٧٢٩ - تجاوز حد الانتفاع (F). Abus de jouissance (F).
هو تجاوز حق المنفعة المحدود على عين ما كارتكاب الافعال التي تحط من قيمة الملك .

٤٧٣٠ - تجيب (F).
نوع من التجويل يعرف عنه بان لا يتجاوز بياض القوائم الركبتين او العرويين بل يستقر تحتهما .

٤٧٣١ - تجبين (F). Empréurage, Caséation (F).
Caseation (E).

هو اضافة المسوة او المنفحة الى الحليب بغية تخثيره وجعله جبناً .

٤٧٣٢ - تجديد ، مواصلة (F). Reconduction (F).
Renewal of a lease or tenancy (E).
هو تجديد او مواصلة مفعول العقد اذا لم يعلن احد الطرفين فسخه الى الآخر ضمن مدة معينة .

٤٧٣٣ - تجديد التحريج ، تاجيم (F). Reboisement (F).
Retimbering, Reafforestation (E).
هو اعادة غرس الاشجار او بذرهما في ارض كانت مشجرة وقطعت او اقتلعت اشجارها .

٤٧٣٤ - تجديد المزاد (F). Surenchère (F).
Higher bid, Outbidding (E).
هو انه اذا رسا رسمياً مزاد عقار على شار تقدم احد الراغبين في العقار في المدة القانونية وهي عشرة ايام فالتزم بشراء العقار بالثمن الذي رسا به على الشاري الاول مع زيادة عشر هذا الثمن وحينئذ تحدد جلسة للمزاد الجديد ويجوز لكل راغب آخر ان يزيد فيها .


٤٧٣٥ - تجديد ضمني (F). Tacite reconduction (F).
Renewal by tacit agreement (E).
هو تجديد عقد الايجار عند انتهائه دون ان يعارض المؤجر في ذلك .

٤٧٣٦ - تجدير (F). Extraction
عملية حساية غايها معرفة جذر العدد .

٤٧٣٧ - تجريب (F). Essai (F). Essay, Experiment (E).
التجربة هي الاختبار والامتحان مرة بعد اخرى وذلك لمعرفة مقدور الشيء او امكانياته او للتثبت منه او من بعضه .

٤٧٣٨ - تجزؤ ، تخذيع (F). Parcellement (F).
Parcelling (E).
قسة الارض الزراعية الى عدة قطع تنظيمياً للعمل .

٤٧٣٩ - تجزؤ الملكية (F). Morcellement de la propriété (F).
Parcelling out (E).
توزيع الارض المشتركة على مالكيها او تقسيمها الى حصص مختلفة .



تجويل معترض

Boisement (F). **٤٧٦٩ - تحريج**

Planting land with trees (E).

هو إنشاء الحراج في ارض كانت خلواً من الاشجار.

Mue (F). Moulting (E). **٤٧٧٠ - تحشير**

هو استبدال الريش عند الطير.

Améliorations (F). **٤٧٧١ - تحسينات**

Ameliorations, Improvements (E).

كل ما من شأنه رفع مستوى الاستثمار الزراعي والصناعي.

Coulure (F). **٤٧٧٢ - تحشيف، صاصة**

Falling off, Dropping off (E).

سقوط الزهر بعد امتناع الانصباب.

Macadamisage, **٤٧٧٣ - تحصيب، تكديم**

Macadamisation (F). Macadamization (E).

رصف الطرقات بالحصب لتعييدها على طريقة ماك آدم.

Réserves (F). Reservation (E). **٤٧٧٤ - تحفظات**

Drainage **٤٧٧٥ - تحفيض**

صرف المياه الزائدة من التربة المعرضة لاستيعاب الكثير منها. وقد يتم ذلك بواسطة المنازح او الاقنية.

Vérification (F). Verification (E). **٤٧٧٦ - تحقيق**

اجراء يرمي الى التأكد مما اذا كان الشيء الممرض ينطبق على المطلوب.

Arbitrage (F). Arbitration (E). **٤٧٧٧ - تحكيم**

التحكيم هو تسوية منازعة على يد فرد او افراد يقال لاحدهم حكم.

Phytographie (F). **٤٧٧٨ - تحلية**

Phytography (E).

التحلية في علم النبات البحث المختص بالوصف الشكلي الدقيق.

Description **٤٧٧٩ - تحلية**

هي وصف الشكل الحيواني او النباتي كما يبدو للعين.

Ampélographie (F). **٤٧٨٠ - تحلية الكروم**

Ampelography (E).

هو علمها النباتي الشامل مع وصف النوع والضرر.

Escargotage (F). **٤٧٨١ - تحليز**

التحليز هو القضاء على الحظرون وقد يكون ذلك اما بجمعه او باستعمال المساحيق الفعالة التي تبيده كالمثاليهيد وغيره.

Analyse (F). Analysis (E). **٤٧٨٢ - تحليل**

هو تفريق عناصر جسم معين لمعرفة ماهيتها ومقاديرها.

٤٧٨٣ - تحليل التربة، فحص التربة

Analyse des terres (F). Analysis of soils (E).

هو تفريق وتحديد العناصر والمواد التي تتركب منها التربة.

Eudiométrie (F). **٤٧٨٤ - تحليل الغازات**

Eudiometry (E). هو تحديد الغازات ومعرفة نسبها.

١٤٧٥٦ - **تحال خارجي، تنافذ خارجي**

Exosmose (F). Exosmose, Exosmosis (E).

هو مجرى نفوذ السائل من الداخل الى الخارج وقد يتم غالباً ببطء.

٤٧٥٧ - **تحال داخلي، تنافذ داخلي**

Endosmose (F). Endosmose, Endosmosis (E).

هو مجرى نفوذ السائل من الخارج الى الداخل وقد يتم غالباً بوقت قصير.

٤٧٥٨ - **تحايي**

التحايي ثلاثة كواكب حذاء الهمة. واحدها تحياة.

Effritement (F). **٤٧٥٩ - تحشت، تفتت**

Exhaustion, Crumbling (E).

Sous-sol (F). **٤٧٦٠ - تحتربة، هوم**

Subsoil, Substratum (E).

(التحتربة لفظة حديثة منحوتة من تحت التربة اما الهوم فرعية قديمة.) || طبقة التراب الكائنة تحت ما يتناولها المحراث من التربة الزراعية.

Prédétermination (F). **٤٧٦١ - تحتمية**

Predetermination (E).

التحتمية نظرية بيولوجية فحواها ان البويضة تحوي في كنهها جميع مركبات الجسم من خلايا ونسج واعضاء. وان الانسكام او التسمك يحوي النسج والاعضاء فتكاثر وتظهر وتنمو.

Hypotrishes (F). **٤٧٦٢ - تحشيات الهدب**

Hypotrishes (E).

رتبة من النقيعات الهدديات تشمل ست فصائل وعدة اجناس مع مئات الانواع.

٤٧٦٣ - **تحجبر، تحجير، تصلب**

Pétrification (F). Petrification (E).

تحول شيء الى حجر.

Balzane (F). White stocking (E). **٤٧٦٤ - تحجيل**

هو البياض في قوائم الفرس قل او كثر. والفرس تدعى بحجلة.

Arcure (F). Arching (E). **٤٧٦٥ - تحجين***

حجن او صرد العود؛ عويجه وعطفه فجاء مستديراً.

Délimitation (F). **٤٧٦٦ - تحديد، وضع الحدود**

Délimitation. Fixing of boundaries (E).

هو تعيين الحد بين عقار وعقار.

Roulage (F). **٤٧٦٧ - تحديل، حذل، تمليس**


Rolling (E).

هو حذل التربة لتسوية سطحها وتفتيت المدر في التراب المندمج. وللحدل اهداف اقتصادية عديدة جميعها في صالح التربة وزراعتها.

Prospection des mines (F). **٤٧٦٨ - تحمري المعادن**

Prospecting of mines (E).

حفر التربة تفتيشاً عن المعادن.



تحجين

٤٧٩٩ - تخ **Fermentation**
هو الاختيار ، اطلبه . وهو عصارة السمم اي دهن
المعروف بالسرج .

٤٨٠٠ - تخارج **Partage, Quote-part (F).**
Sharing, Quota (E).
التخارج هو اقتسام الحصص . يقال تخارج الشركاء :
اتقسموا فانخذ بعضهم المال وبعضهم الدار وبعضهم
الارض ...

٤٨٠١ - تخالض **Décharge (F). Discharge (E).**
راجع ابراء .

٤٨٠٢ - تحت **Réceptacle (F). Receptacle (E).**
ينهم من قال قرص الزهرة وكربي الزهرة . هو الجزء
القاعدي من الزهرة الذي يجتمع حوله الكأس والتريج
والاسدية واخبية المبيض .

٤٨٠٣ - تختير **Condensation**
التختير هو تكثيف الشيء او تجميده . الصقيع يكتف
البخار في الجو || والتختير كيمياوياً هو اتصال واتحاد
جزئين او اكثر .

٤٨٠٤ - تخديم **Balzane petite (F).**
Small white-footed (E).
هو عندما يجاوز بياض التحجيل الارباع .

٤٨٠٥ - تخويق **Remplacement des manquants (F).**
هو استبدال الشتول والنسوب المينة باخرى سليمة .

٤٨٠٦ - تخس* ، خنزير البحر **Phocoena (S).**
Marsouin (F). Porpoise (E).

جنس حيوانات لبونة من رتبة الحيتان وفصيلة الدلفينيات
انواعه ثلاثة اجسامها وشية الشكل تطول من ١٢٠ الى
١٥٠ سم . ظهورها الى الرمادي الاسود العابق . بطونها
الى الطحلة البيضاء الزاهية الموج . رؤوسها مستديرة ،
مناسفها قصيرة ، زعانفها الصدرية منفرجة الزوايا
المقطوعة اما الظهرية فتلاية مقربة || موطنها جميع
البحسار تكثر في الاوقيانوس الاطلسي والبحر المتوسط
والاسود والاحمر والاقيانس الهندي والهادي . تقترب من
المياه الاقليمية وتدخل مصبات الانهار . || تعيش
جماعات كثيرة العدد ترافق اسراب الرنكة والشابل
والاسقمري والسلمون || اناثها تضع في شهر ايار جرواً
واحداً طوله نحو ٥٠ سم . وزنه ٥ كيلو || تصاد
للحما المأكول ولشحها الكثير الاستعمال وجلدها الصناعي .

٤٨٠٧ - تخس الكرسنة* **Tychius quinquepunctatus (S).**

حشرة من السوسيات طولها نحو ٣ سم . ثوبها حنطي اللون
يملوه تخطيط وتجذيع اصفر وجلاباب من الحمل المذهب .
تعيش على القطنيات اخصها النباتات الكرسنة .
يرقاتها تركب حب الكرسنة والبيقية فتتخره وتعيش في
داخله كامل حياتها البرقية .

٤٨٠٨ - تخشيب **Lignification**
تحول المواد العشبية او الليفية الى خشبية .

٤٧٨٥ - تحليل حكيمى **Analyse physique (F).**
Physical analyse (E).
هو معرفة وتحديد العناصر الرئيسية التي تتركب منها التربة
كالرمل والصلصال والجص .

٤٧٨٦ - تحليل كمي **Analyse quantitative (F).**
Quantitative analyse (E).
هو تحديد كمية ونسبة العناصر التي تتركب منها التربة .

٤٧٨٧ - تحليل كيمياوي **Analyse chimique (F).**
Chemical analyse (E).
هو تحديد المواد الكيماوية الموجودة في التربة اخصها
الازوت والبوتاس وحامض الفسفور .

٤٧٨٨ - تحليل ميكانيكي **Analyse mécanique (F).**
Mechanical analyse (F).
هو تحديد قدر الاجرام ونسبتها .

٤٧٨٩ - تحميت **Edulcoration (F).**
Sweetening (E).

اضافة بعض السكر او المواد السكرية على غيرها من
المواد النافهة الطعم او المرة لتحسين مذاقها .

٤٧٩٠ - تحميم **Etuvage (F). Bathing (E).**
هو التجفيف بالبخار او بالهواء الساخن .

٤٧٩١ - تحميم الملت **Tourailage (F).**
Malt-kiln desiccation (E).
هو تجفيف الشير الناش والناتج عن صناعة الجعة (البيرا) .

٤٧٩٢ - تخميص **Acidification (F).**
Acidification (E).

تحويل المادة الى حامض .

٤٧٩٣ - تخميل **Mouillage (F). Wetting (E).**
هو اضافة بعض الماء الى الخمر او غيرها من المشروبات
الروحية .

٤٧٩٤ - تخنير **Voussure (F). Curve (E).**
حناية العقد وتقبهيه .


٤٧٩٥ - تخول ، تعكيس **Inversion (F).**
Reversal (E).
هو تبدل طبيعة الشيء كتحويل السكر العادم قابلية الاختار
الى سكر قابل للاختار .

٤٧٩٦ - تخوير* **Blanc, Maladie du blanc (F).**
وصم فطري يصيب النبات في بعض اعضائه اخصها
الاوراق والجذور . سببه فطور بجهرية مختلفة تركب العضو
السليم فتتلفه بوشاح من نواصها الابيض الغبر يقضي
على مسام البشرة وخلايا النسيج || اشهر الفطور التي
تسبب التخوير هي الارمداد والطريم والفسخ والنباغ .



٤٧٩٧ - تخوير **Dessollement (F).**
Altering the rotation of crops (E).

تنظيم تعاقب الزراعات الحقلية خلافاً لما تقتضيه الدورة
الزراعية .

٤٧٩٨ - تحويل **Conversion**
هو تغيير التركيب والشكل .



تخوير



بعض اشكال التخت



تخس



تخس الكرسنة

بترك العقان على ارويات الشجر المقطوع واما صنياً بذر
البزور او تنصيب الفراس || والتخليف هو ايضاً
تجديد اسماء الاحواض .

٤٨٢٥ - تخليل (F). Acetification (E).
تحويل النقيع الكحولي الاختار الى خل .

٤٨٢٦ - تخم ، تخمة ، عسر هضم ، بشتم ،
سنف ، حمر Indigestion (F).
Indigestion, Surfeit (E).

هو توقف الهضم في المعدة والامعاء لسبب ما ، كشرب
الماء البارد او الافراط في العلف او لابتلاع علف صعب
الهضم الى آخره . وعسر الهضم عند الخيل يدعى حمر .

٤٨٢٧ - تخم* ، تخم (F). Landmark (E).
هو الفصل بين الارضين من المعالم والحدود . ج تخوم
وهو كذلك منتهى كل ارض او قرية او بلدة .

٤٨٢٨ - تخمير (F). Yeasting (E).
وضع خميرة العنب في العصير ليختمر فيصير خمرأ .

٤٨٢٩ - تخميس* (F). Plantation en quinconce (E).
Quincunx planting (E).
هو الغرس المتعارض الانباق على شكل خمسات .

٤٨٣٠ - تخمين ، تقدير
Estimation en matière (F). Valuation (E).
هو معرفة وتحديد مقدار الشيء المكشوف عليه .

٤٨٣١ - تخمين الثمن ، تقدير الثمن ، تسمين
Estimation en argent (F). Appraising (E).
هو تحديد الثمن او وضع الثمن التقريبي للشيء المكشوف
عليه من اي نوع كان .

٤٨٣٢ - تخنيق ، كتم (F). Buttage, Chaussage (F).
Raising, Mounding, Girdling (E).
هو جمع التراب حول ساق النبات .

٤٨٣٣ - تداخل (F). Interference (E).
هي الظاهرة الناتجة عن تنظيم الحركات الارتجاجية بين
بعضها . شرحها وضبطها يعودان الى العالم « فرسل » .

٤٨٣٤ - تدبير ، إجراء (F). Measure (F). Measure (E).
كل احتياط يتخذ لمنع هلاك الاموال او للاعتناء الى
الحقيقة .

٤٨٣٥ - تدبيق (F). Engluement (F).
Grafting-wax (E).
اطلب دبق .

٤٨٣٦ - تدبيل ، إدبال Humification
هو تحول المواد العضوية الى دبال .

٤٨٣٧ - تدجين Domestication
هو جعل الحيوان الوحشي حيواناً داجناً .

٤٨٣٨ - تدخين (F). Fumage, Fumigation (F).
Smoking, Fumigation (E).
هو معالجة بعض المأكولات بالدخان لتحسينها وحفظها
أخصها اللحوم والاسماك .

٤٨٣٩ - تدريج (F). Falsan (F). Pheasant (E).
هو التدريج ، اطلبه .

٤٨٠٩ - تخشير (F). Lopping off (E).
هو في الشيع نزع الاوراق السفلى التي تلامس التراب ولا
قيسة لها .

٤٨١٠ - تخشيل Elimination.
راجع خشل .

٤٨١١ - تخصيص ، إختصاص Affectation
هو تعيين القصد الذي يستعمل المال في سبيله .

٤٨١٢ - تخصيص الحصص Assignment des parts (F).
Assigment (E).
هو اجراء قسمة مال مشترك وتعيين الحصص وقبول كل
شريك الحصة التي اختصه بها المقتسمون دون اللجوء الى القرعة .

٤٨١٣ - تخصيب Mordancage (F).
Mordicancing (E).

عملية تحضيرية تؤهب المادة لاقتبال الانوان .
٤٨١٤ - تخضير Engazonnement, Gazonnement (F).
Turfing (E).
جعل الارض خضيراً مع الاعتناء ببيئتها .

٤٨١٥ - تخضين
Eburnation, Eburnification (F). Eburnation (E).
التخضين تحويل العظم الى مادة شبيهة بالعاج بصلابتها
ويثقلها النوعي .

٤٨١٦ - تخفيض ، إشتقاص Réduction, Réfaction (F).
Reduction, Rebate (E).
هو رفع بعض المتوجب تأديته .

٤٨١٧ - تخفيف ، خفف ، تفريج ، تفريد
Eclaircissage (F). Clearing up (E).
هو اقتلاع النباتات الزائدة او الكثيفة التجميع التي تعيق
نمو رفيقاتها .

٤٨١٨ - تخفيف ، تدويب ، مدق Dilution
اضافة ما يلزم من الماء او غيره لتركيز الليار المطلوب .

٤٨١٩ - تخل Abandon (F). Relinquishment (E).
هو التخلص من شخص او حيوان او شيء او التنازل عن حق .



٤٨٢٠ - تخلف الشرط Défaillance de la condition (F).
Fainting fit (E).
هو الشرط الذي لم يتحقق .

٤٨٢١ - تخليب Epamprement (F). Lopping off (E).
انتزاع الاوراق التي تلامس التراب او الاوراق السفلى
من النبات بعد ان قل نفعها .

٤٨٢٢ - تخليط Métissage (F). Cross-breeding (E).
من طرائق الاسفاد . قوامه انزاع الهجين على الهجين .

٤٨٢٣ - تخليف ، تمليخ Céilletonnage (F).
Layering (E).
طريقة تكثير بعض النباتات بنواميها او خلوفها وملوخها .

٤٨٢٤ - تخليف ، إخلاف Repeuplement (F).
Repeopling, Restocking (E).
هو تجديد الحرجة التي قطع شجرها وقد يكون اما طبيعياً



٤٨٥١ - تَدَفُّقٌ ، مَدٌّ Flux (F). Flux, Flow (E).

هو ما يدعونه المد اي اندفاع مياه البحر نحو الشط في موابقتها . وهو كمية الضوء المندفقة في ثانية واحدة . وهو ايضاً فيض الدم ، من العوارض التي تتناب الاجسام الحيوانية .

٤٨٥٢ - تَدَمِيم Revêtement (F). Revetment (E).

هو طلي احواض ومحاقن الماء بالاصاد الواقى منعاً للتشيع .

٤٨٥٣ - تَدْنِين Cuvage, Cuaison (F).

Fermenting, Cuaison (E).

هو جعل عصير العنب يختمر في الدن .

٤٨٥٤ - تَدْوِين Enregistrement (F).

تسجيل الكتابة في سجل رسمي . Enregistering (E).

٤٨٥٥ - تَدْبِيل Javelage (F). Laying (E).

عملية صناعية تبني قوامها حفظ خيطان التبغ المشكوك في الظلمة الدامسة مدة من الوقت تراوح من ٢٤ الى ٤٨ ساعة قبل تعليقها على المنشر وتعرضها لاشعة الشمس . الغاية منها ايقاف مفاعيل الخضيب وتحضير الخلايا النباتية الى تفكيك موادها الغذائية وتحويلها واستيعاب الحرارة والبرد بدون اذى .

٤٨٥٦ - تَدْرِج ، تَدْرِجٌ

Phasianus (S). Faisan (F). Pheasant (E).

جنس طير من فصيلة التدرجيات . انواعه عديدة جميعها برية تألف الحراج والاجام الفضة الاشجار || يتميز بشكل ذيله المتراكب الريش المستطيل ، الضمي . التجميع ، المستدق الطرف . اجنحته قصيرة مستديرة . رأسه صغير الطرة الناعمة الريش . منقاره محدوب الفك الاعلى . محسره ثعلولي الجلد . رسته املط || قوته التهام والحبوب والاعشاب والحشرات والضفادع والحلزونات || انشاء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها في افحوص تدثنه في الارض بين العوسج والادغال الكثيفة . اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٤٨٥٧ - تَدْرِجٌ شَائِعٌ * Phasianus colchicus (S).

Faisan ordinaire, F. de Colchide, F. commun (F).

طائر من التدرج جميل الثوب المتراكب الالوان العديدة . هذه الشرق الاوسط ومنه انتشر في اوروبا الجنوبية والشرقية والشمالية || رأسه الى الخضار الازرق الاسفع الموج . صدره وبطنه وخشاه الى الجؤرة الخنطية ، رباشها سود الخافة . ظهره وجناحاه الى الصبهة السمراء المشومة بالابيض . افنيكه احمر اللون يعلو موج ارجواني اسفع .

٤٨٥٨ - تَدْرِجٌ فَضِّي * Phasianus argentatus (S).

Faisan argenté (F).

طائر من التدرج كبير الجثة مستطيل الذيل . كشته كثيفة مستطيلة الريش الاسود الناعم النائم على الرأس . محسره املط البشرة الحمراء اللون || ثوبه ابيض فضي يعلو خطوط سود ضيقة العرض . صدره الى الزرقة السمراء الفضية الموج || موطنه الصين الجنوبية . وهو سهل التدجين والربية . انشاء تبيض نحو ١٦ بيضة تحضنها من ٢٥ الى ٢٦ يوماً .

٤٨٥٩ - تَدْرِجٌ مُخَضَّب Phasianus versicolor (S).

Faisan versicolore, F. bigarré (F).

قريب الشبه من التدرج الشائع لكنه اقصر ذيلاً واعبق لوناً . رأسه وعنقه وصدره الى الزرقة السوداء اللامعة .

٤٨٤٠ - تَدْرِجِيَّات Phasianidés (F). Phasianidae (E).

هي فصيلة التدرجيات ، اطلبها .

٤٨٤١ - تَدْرُن رِئَوِي Phtisie pulmonaire (F).

هو السل الرئوي . Phthisis pulmonary (E).

٤٨٤٢ - تَدْرُومٌ ، طَائِرُ الزَّوَابِعِ *

Thalassidroma (S). Thalassidrome (F).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة الرغائيات . انواعه المعروفة اربعة اعطائها معظم مجادح بحار العالم باستثناء الشمالية والقطبية || تألف اوقاب الصخور . مسرحها العادي يستمر من العصر الى فحمة الليل . اما في العواصف والزوايع فانها تفرح من الفجر الى النجر . قوتها الاسماك والقشريات والرخويات || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ١٩ سم . مناقبها محجنة الالافك العليا . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة ، تلحف الاذنان وتتجاوزها . اذنانها معتدلة الطول ، منها المقطوبة ومنها الفارقة والمستديرة . اثوابها الى السمرة السوداء الكستنية الموج . بعض انواعها يعلو تبقيج ابيض في مؤخر البطن من اليمين واليسار ، وبعضها ابيض الافنيك || اناثها تبيض في كل فترة تجدها بين الصخور . حضنتها بيضة واحدة . وقد تبيض وتحضن اربع مرات في الحول || اما انواعه الاربعة فهي التالية :

٤٨٤٣ - تَدْرُومٌ أَبْيَضُ الْإَفْنِيكِ *

Thalassidroma leucorhoa (S).

Thalassidrome cul-blanc (F).

نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار الارجنطين والبرازيل .

٤٨٤٤ - تَدْرُومٌ الْعَاصِفَةِ *

Thalassidroma pelagica (S).

Thalassidrome tempête (F).

نوع من التدروم يكثر وجوده في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط وفي معظم بحار اروبة .

٤٨٤٥ - تَدْرُومٌ الْمَحِيْطِ *

Thalassidroma oceanica (S).

Thalassidrome océanien (F).

نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار المكسيك والانتيل .

٤٨٤٦ - تَدْرُومٌ بُلُور *

Thalassidroma Bulweri (S).

Thalassidrome de Bulwer (F).

نوع من التدروم يكثر وجوده في بحار افريقية الشمالية .

٤٨٤٧ - تَدْرِيجٌ Gradation (F).

Gradation, Climax (E).

الازدياد او الانتقاص المتوالي بترتيب .

٤٨٤٨ - تَدْرِيجٌ Marcottage (F). Layering (E).

او التعقيل اطلبه .

٤٨٤٩ - تَدْرِينٌ ، تَعَسُّفٌ Tubérisation (F).

Tuberisation (E).

تحويل القسم السفلي من النبات او بعضه الى عسقل .

٤٨٥٠ - تَدْعَصُ Putréfaction (F).

Putrefaction, Putrescence (E).

هو التآدم اي انحلال المواد النيتروجينية العضوية بفعل الجراثيم .



تَدْرُومٌ



تَدْرِجٌ شَائِعٌ



تَدْرِجٌ فَضِّي

٤٨٧١ - تَرَابَةٌ ، إِسْمَكْت Ciment (F).

Cement (E).

مزيج من الصلصال والجص يعرف كيمائياً بسيليكات الالومين المزدوجة أو سيليكات الكلس المزدوجة ، يحضر في أفران خاصة ويستعمل في البناء ، من ميزاته سرعة انكماشه وتصلبه .

٤٨٧٢ - تَرَاتُلوُوجِيَّة Tërátologie (F).

Teratology (E).

هي علم التعاجيب . علم يبحث عن أسباب غرائب المخلوقات كالاخداج والاعراب والشملة .

٤٨٧٣ - تَرَاخِيلُومٌ * ، زَهْرَةُ العِنَقِ

Trachellum (S). Trachélie (F). Throatwort (E). Halskraut (D). Trachelio (I).

جنس نباتات طبية وزينية محولة أو معمرة من فصيلة الجريسيات . يقال أنها تنفع أوجاع العنق || أنواعه قليلة أشهرها التراخيليوم الأزرق . سوقها منتصب كثيرة الفروع تعلو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم . لحاء سوقها مخططة بالأزرق والبنفسجي . أوراقها معنقة ، متعاقبة ، سنانية ، فصلها مالمس البشرة ، منشاري الحافة || أزهارها زرقاء اللون ثم ليلكية || أزهارها يستمر من حزيران إلى آب .

٤٨٧٤ - تَرَارٌ * Euplocamus (S).

Euplocome (F). Euplocamus (E).

جنس طير من الدجاجيات وفصيلة التدرجيات . أنواعه المعروفة ثلاثة : ترار ملقة وترار صوته وترار بورنيو المعروف بالترار النبيل || أجسامها متقاربة وأثوابها كذلك . جميعها صغيرة الرؤوس المتوجة بكشاة تعلو مؤخر الرأس . أرساغها عفية . أجنحتها معتدلة الطول وأذيالها كذلك . الإناث لا تتحل بأثواب الذكور || أما الترار النبيل فتوجه إلى الزرق البنفسجية المواج . ظهره ذهبي اللون . رفال ذنبه بيض . محسراه ولحاصه إلى الزرق . كشته زرقاء اللون سوداء المواج .

٤٨٧٥ - تَرَاصُعٌ Accouplement des oiseaux (F).

Copulation of birds (E).

هو التساند في الطيور إخصها الإهلية .

٤٨٧٦ - تَرَأَقٌ Huître (F). Oyster (E).

حيوان ذو صدف يعلق بالصخور في الماء المالح . اطلب بحار مألوف .

٤٨٧٧ - تَرَاكْثُورٌ ، جَرَّارَةٌ Tracteur (F).

Tractor (E).

جرارة آلية تستعمل في مختلف الاعمال الزراعية إخصها اعمال التربة كالحرث والمذق والخف .

٤٨٧٨ - تَرَبٌ

الترب : الكثير التراب . يقال ترى ترب وتربة تربت .

٤٨٧٩ - تَرُبٌ ، طُرْبٌ Tourbe (F). Peat (E).

تراب عضوي قابل الاشتعال تكوّن من البقايا النباتية المفحمة .

٤٨٨٠ - تَرَبٌ وضع عليه التراب .

٤٨٨١ - تَرُبَاءٌ ، طُرْبَاءٌ Tourbière (F).

Peat-bog, Peat-moss (E).

هو المكان الذي يكثر فيه الترب .

أجنحته وأفنيكه متراكبة الألوان الموشجة ، المؤذرة والمنشدة . موطنه الصين واليابان .

٤٨٦٠ - تَدْرِجٌ مُّذَهَّبٌ * Phasianus oratus (S).

Faisan doré, F. à collerette, Thaumalé (F).

طائر من التدرج . مستطيل القد والأفنيكه . يتميز بكشاة رأسه المذهبة وبطيبة ، من الريش الناعم المنتصب ، تطوق عنقه . ثوبه متراكب الألوان يغلب فيه الأبيض والأصفر المذهب . قوامه إلى الجؤوة . أباهره إلى الزرق السفعاء ، زيمكه أحمر الريش ، أفنيكه إلى الصهبة الصفراء المذهبة || موطنه الشرق الأقصى وهو سهل التدجين والتربية .

٤٨٦١ - تَدْرِجٌ مُّكْرَمٌ * ، تَدْرِجٌ مَلَكِي

Phasianus Reevesii (S). Faisan vénéré, F. royal, Oiseau-flèche, Tche-ky (F).

طائر من التدرج كبير القد . يطير كالسهم . يتميز باستطالة ريش أفنيكه || ثوبه متراكب الألوان يرتكز على الأبيض والأصفر الذهبي . توشيمه بقع وزراکش جؤوية وجؤزية وسوداء اللون || موطنه أحراج الصين .

٤٨٦٢ - تَدْرِجٌ مُّنْغُولِيٌّ * ، لُومٌ

Phasianus chrysomelas (S). Faisan de Mongolie, F. à collier (F).

طائر من التدرج موطنه بلاد المنغول وهو سهل التدجين والتربية . أثناء تبيض نحو ٦٠ بيضة || ثوبه عديد الألوان الزاهية المتراكبة المرتكزة على الأخضر الأصفر الجميل . يتميز بطوقه الأبيض وبزركشة أفنيكه وتوشيمه .

٤٨٦٣ - تَدْرِجَةٌ Faisane (F). Hen-pheasant (E).

أنثى التدرج .

٤٨٦٤ - تَدْرِجِيَّاتٌ ، تَدْرِجِيَّاتٌ

Phasianidae (S). Phasianidés (F). Phasianidae (E).

فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تتميز بسرعة عدوها ، يقلة وضعف طيرانها ، بقوة مقارها وباستدارة أجنحتها . مهدها العالم . أجناسها ثمانية : الارغوس والتدرج والحنقط والعترقان والسيفنة والشنكيس والطاوس والقبيط .

٤٨٦٥ - تَدْرِكِرَةٌ شَحْنٌ Connaissance (F).

Bill of lading (E).

هي سند الشحن ، إيصال بالبضائع المشحونة في السفينة يقدمه ربانها إلى مستأجرها ويشتمل عادة على كل شروط عقد النقل .

٤٨٦٦ - تَدْرِيْبٌ * Accouplement des insectes (F).

Copulation of insects (E).

التدنيب للضباب والفرش إذا أراد التعاقل والسفاد (اللسان)

٤٨٦٧ - تَدْرِيقٌ ، تَحْمُزٌ Dégustation (F).

Tasting (E).

هو الاستمذاق .

٤٨٦٨ - تَرٌ Cordeau (F). Cord (E).

هو الخيط الذي يمد البشاء فيبني عليه .

٤٨٦٩ - تَرَابٌ التراب : ذراع الشاة والكباش .

٤٨٧٠ - تَرَابٌ Terrain, Terra, Sol (F).

Ground, Land, Soil (E).

هو الجزء من تراب الأرض الذي يتناوله الحراث ويعرف بالتربة .



تدرج مذهب



تدرج مكرم



تدرج منغولي



تدنيب



تراخيلوم



ترار

٤٨٩٣ - تربة دولوميتية (F). Terrain dolomitique (F).
Dolomitic earth (E).
ارض مركبة من صخور كلسية مغنيزية اطلق عليها اسم الصخور الدولوميتية .

٤٨٩٤ - تربة دماشاء (F). Terre franche (F).
هي التربة الخصبة الرغاب التي اكتمل تركيبها الحكيمي والكيمياوي الممكن تحديده كما يلي :
طين من ٢٠ الى ٣٠ %
كلس « ٧ » ١٢ %
رمل « ٥٠ » ٧٠ %
دبال « ٤ » ١٠ %

٤٨٩٥ - تربة رغباب (F). Terrain perméable (F).
Permeable soil (E).
هي التربة التي ينفذ منها الماء أو بالاحرى هي التربة التي تركيبها يمنعها من التشبث بحفظ الماء .

٤٨٩٦ - تربة رملية ، تربة صوانية (F). Terrain siliceux (F).
Silicous soil (E).
هي التي تحوي من ٦٠ الى ٨٠ % من الرمل .

٤٨٩٧ - تربة رملية طينية ، تربة رملية صلتصالية (F). Terrain silico-argileux (F).
Silicous-clayey soil (E).
هي التربة الرملية التركيب التي تكثر فيها نسبة الصلصال .

٤٨٩٨ - تربة رملية كلسية ، تربة رملية جصية (F). Terrain silico-calcaire (F).
Silicous-calcareous soil (E).
هي التربة الرملية التركيب التي تكثر فيها نسبة الجص .

٤٨٩٩ - تربة زراعية (F). Terre arable (F).
Arable soil, Tillable (E).
هي طبقة التراب السطحية التي تتناولها الاعمال الزراعية من حرثة وغيرها .

٤٩٠٠ - تربة طباشيرية (F). Terrain crétacé (F).
Cretaceous ground (E).
تمود الى الحقة الثانية . ومعظم تراب هذه الحقة يتألف من الطباشير . والارض الطباشيرية تقسم الى فئتين الطباشيرية العليا والطباشيرية السفلى .

٤٩٠١ - تربة طينية ، تربة صلتصالية (F). Terrain argileux (F).
Clayish soil (E).
هي التي تحوي من الطين أو الصلصال أو الغضار من ٣٠ % وما فوق .

٤٩٠٢ - تربة طينية رملية ، تربة طينية صوانية (F). Terrain argilo-siliceux (F).
Clayish-silicous soil (E).
هي التي تحوي ما لا يقل عن ١٥ % من الطين ومقدار كبير من الرمل .

٤٩٠٣ - تربة طينية كلسية ، تربة صلتصالية جصية (F). Terrain argilo-calcaire (F).
Clayish-calcareous soil (E).
تعتبر من احسن الارربة تركيباً . تحوي من ١٥ الى ٢٥ % طين ومن ١٠ الى ١٥ % كلس ومن ٦٠ الى ٧٠ % رمل .

٤٨٨٢ - تربة (S). Tillaea (S).
Tillée (F). Tillaea (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة المخلدات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، منها الطوعي رمال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متقابلة ، رحيمة النصال اللحمية الحمراء اللون . ازهارها ابوية الارتكاز . بيضاء اللون او وردية || تنويرها ربيعي او صيفي .

٤٨٨٣ - تربة قز (F). Carthame des teinturiers (F).
Safflower (E).
هو قرطم الصباغين ، اطله .

٤٨٨٤ - تربة ، تراب (F). Terrain, Sol (F).
Ground, Soil (E).
التربة من الوجهة العملية هي الجزء من تراب الارض الذي يتناوله المحراث . والتربة قد تكون زراعية وغير قابلة للزراعة كما قد تختلف تركيبها . اما اقسامها واشكالها فعديدة . اعلمها التالية .

٤٨٨٥ - تربة أعبلية ، تربة غرانيتية (F). Terrain granitique (F).
Granitic ground (E).
هي التربة الناتجة عن تفتت الصخور الاعبلية .

٤٨٨٦ - تربة جورية (F). Terrain jurassique (F).
Jurassic ground (E).
ارض جيولوجية من الحقة الثانية . والكلمة منسوبة الى جبال جورا في فرنسا حيث تكثر هذه التربة .

٤٨٨٧ - تربة خصبة (F). Terre fertile (F).
Fertile soil (E).
ارض تكثر فيها العناصر الغذائية ليجود نباتها . ومن اسمائها المستعملة : خصبة ، غصبة ، مخصاب ، طيبة ، مبرعة .

٤٨٨٨ - تربة خلنجية (F). Terre de bruyère (F).
Heath soil (E).
التربة الخلنجية او تراب الخلج تربة حرجية تكثر فيها نسبة العناصر العضوية المتأينة عن تراكم الاوراق وسائر المواد النباتية المتحللة . وهي تفتقر عادة الى فسفات الكلور .

٤٨٨٩ - تربة خوّارة (F). Terrain meuble (F).
Mellow soil, Loose ground (E).
هي التي سلت ونعمت بالدبال والحرث .

٤٨٩٠ - تربة دبالية (F). Terrain humifère (F).
Mould soil (F).
وتدعى تربة عضوية . هي كل تربة منسوبة التركيب الحكيمي تحوي من ٨ الى ١٥ % من الدبال .

٤٨٩١ - تربة دلولية (F). Terrain dévonien (F).
Devonian ground (E).
طبقة جيولوجية من الحقة الاولى منسوبة الى احدى كور انكلترا .

٤٨٩٢ - تربة دُلغانية (F). Terre glaise (F).
Clay, Potter's earth (E).
هي التي تحوي من ٤٠ الى ٤٥ % من الطين مع ٥٠ الى ٥٥ % من الرمل الصواني والحزفي الناعم والشديد النعومة .

٤٩١٧ - تربية الدواجن
Elevage des animaux domestiques (F).
فن توليد وتربية الحيوانات الالهيّة واستثمارها اقتصادياً .

٤٩١٨ - تربية السرطان ، سرطنة
Astaciéulture (F).

فن تسريء السرطان وتربيته والعناية بصغارها ريثما تصلح للبيع . وقد يتم ذلك في أحواض خاصة ومواقع ملائمة من الوجهة البيئية والتقنية .

٤٩١٩ - تربية السمك
Pisciculture (F).
Pisciculture, Fish-culture (E).

فن تسريء الاسماك والعناية بها وقد يتم في أحواض خاصة او في اهورا طبيعية ملائمة .

٤٩٢٠ - تربية الطيور الداجنة
Aviculture (F).
Bird-raising, Poultry-farming (E).

علم يبحث في العناية بجميع الطيور الداجنة اخصها الدجاج والبط والاوز والحمام ...

٤٩٢١ - تربية العلق ، سلاعة
Hirudiniculture (F). Leech-culture (E).

فن تربية العلق وتكثيره ان في المناقع الطبيعية او في آبار صناعية .

٤٩٢٢ - تربية المائيات
Aquiculture (F).
Water-culture (E).

فن تربية الحيوانات والاسماك والنبوت المائية .

٤٩٢٣ - تربية المحار
Ostréiculture (F).
Oyster-culture (E).

فن العناية بالمحار واستثماره اقتصادياً .

٤٩٢٤ - تربية الميضية
Mytiliculture (F).
Mussel-culture (E).

علم توليد وتربية الميضية اي بلح البحر .

٤٩٢٥ - تربية دود القز
Sériciculture (F).
Sericulture, Silk-culture (E).

فن العناية بدود القز .

٤٩٢٦ - تربية القز
Arrosage par submersion (F).
Watering submersion (E).

هو الاسقاء بالغمر .

٤٩٢٧ - تربية الجذع
Quadrature
تحويل الاشكال المختلفة الى مربعات معادلة .

٤٩٢٨ - تربية الجذع
Equarissage (F).
Squaring (E).

هو نشر جوانب ساق الشجرة المقطوعة لتتوازي سطوحها الاربية .

٤٩٢٩ - تربيعي
Quadratique (F). Quadratic (E).

هو شكل مربع او مختص بمربع .

٤٩٣٠ - قرقرة
Hibiscus mutabilis (F).

Rose changeante (F). Changeable rose (E). Sine-

sische rose, Veränderlicher cibirische (D). Rosa

cangiante. Fior cangiante (I).

بجلة تزيينية معمرة من الحيازيات ازهارها جميلة الشكل ،

كبيرة القد ، متداخلة الالوان الزاهية . تعيش وتنمو في

٤٩٠٤ - تربة كيم
Terre imperméable (F).
Watertight soil (E).

هي التربة التي تمسك الماء وتمنع نفوذه كالتربة الطينية مثلاً .

٤٩٠٥ - تربة كلسية ، تربة جصية ، تربة جيرية
Terrain calcaire (F).
Calcareous soil (E).

هي التي تحوي من ٢٠ ٪ وما فوق من كربونات الكلس .

٤٩٠٦ - تربة كلسية رملية ، تربة جصية رملية ، تربة كلسية صوانية
Terrain calcaro-siliceux (F). Calcareous-siliceous soil (E).

هي التي يكثر فيها عنصر الرمل بعد الكلس .

٤٩٠٧ - تربة كلسية طينية ، تربة جصية صلتصالية
Terrain calcaro-argileux (F).
Calcareous-clayish soil (E).

هي التي يكثر فيها عنصر الصلتصال بعد الكلس .

٤٩٠٨ - تربة مجدية
Terrain improductif (F).
Unproductive ground (E).

التربة المجدية والجدياء والمجدة والمجداب والمحال والحلة هي العديمة الخصب والاثاء .

٤٩٠٩ - تربة مغلل ، تربة مرباع
Terrain productif (F). Productive ground (E).

هي التربة الخصبة الوفرة الاتاء .

٤٩١٠ - تربة مندية
Terrain compact (F).
Compact ground (E).

هي التربة المنكمشة المتساكة الذرات .

٤٩١١ - تربة
Ipomoea turpethum, Convolvulus turpethum (S).
Turbith (F). Turbeth (E). Turbith (D). Turblide (I).

نبات عشبي طبلي بري من فصيلة اللبلايات . جذوره مسهلة ومطهرة للمعدة والامعاء . راجع الثمان تربة .

٤٩١٢ - تربية الجذر
Endorhize (F).
Endorhize (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ينشأ جذره في التربة .

٤٩١٣ - تربية
حنطة حراء وسنبليها ايضاً احمر ناصع الحمرة وهي رقيقة تنتشر مع ادنى ريح او برد (التاج عن ابي حنيفة) .

٤٩١٤ - تربية الارانب
Cuniculture, Cuniculiculture (F). Rabbit-culture (E).

فن توليد الارانب والعناية بها .

٤٩١٥ - تربية الحلزون
Helliculture (F).
Snail-culture (E).

فن العناية باكثار الحلزون وتربيته الحديثة .

٤٩١٦ - تربية الخيل
Hippotechnie (F).
Hippotechny (E).

فن تربية الخيل وترويضها وهو يشمل كل ما له علاقة بالانساب والتربية والصفات وتجهيز الجوار ونماذجها والترويض والعلف الخ .



تربة



تربية الجذع



تربة

٤٩٤٠ - ترخيل الإعتياد ، نقل الإعتياد

Report de crédit (F).

اجراء مالي يعتبر استثناء في سنية الميزانية مؤداة ان ترخيل الى السنة المالية التالية اعتمادات مقيدة في السنة الحاضرة لم تستنفذ بأكملها .

٤٩٤١ - ترخون ، سهنون

Trachinus (S). Vive (F). Weever, Sting-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الترخونيات ورقبة شائكات الزعانف . انواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك المحيط الاطلسي والهادي وبعضها يستوطن البحر الابيض المتوسط || جميعها اهليلجية او رحيية الشكل ، متوسطة الحجم او صغيرة . رؤوسها غليظة خذروفية . اعظامها شبه جالسة الاشدق . عيونها رفيعة الارتكاز متقاربة . زعانفها الظهرية مشطية مستطيلة تتقدمها زعانف شعاعية شائكة المناخس الحادة الاطراف . زعانفها الشرجية تمتد من الحوض الى قاعدة الذنب || لحومها جيدة الصنف ، مستحبة الطعم ، الا انها من الاسماك المؤذية التي يخشاها الصياد لان مناخس زعانفها الظهرية الاولى قدشب في كفه اذا تناولها وتنشب في رجله اذا وطئ مخابئها في الرمال المنغمورة بالماء . شككتها مؤلة تستمر بعض الوقت وقد تكون مؤذية || اشهر انواعها الاربعة التالية :

٤٩٤٢ - ترخون صغير ، سهنون صغير ،

Trachinus vipera (S). درقني ، درقنة

Vive petite (F). Smaller Weever (E).

سمكة بحرية من الترخون . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها صغير القد ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . ثوبها الى الريدة الصفراء السفعاء الموج يعملوها تمشيح حنطي يسمر في الظهر . بطنها الى الغبرة الفضية . رأسها مستطيل الشكل ، قصير الخطم ، شبه جالس الفم . صيها صغيرتان ، جاسفتان . زعنفتها الظهرية الاولى خماسية المناخس الجامدة ، الحادة ، المسمة الاطراف . ويعملوها في كل من سفطها الايمن والايسر منخس ذرب مستطيل مسم الطرف || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

٤٩٤٣ - ترخون عنكبوتي ، سهنون عنكبوتي

Trachinus araneus (S).

Vive araignée (F). Spider-Weever (E).

سمكة بحرية من الترخون . اعطانها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها شبه اهليلجي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ثوبها الى الحنطي الاسمر يعملو تجذيع ازرق في الظهر وتسنيج معترض اصفر في الجانبين ، بطنها الى الغبرة العاجية . رأسها مستعرض القفن . غليظ الشكل ، واسع الشدق الجالس . مناخس زعانفها الظهرية الاولى والسفطية مسمة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٤٩٤٤ - ترخون مبدول ، سهنون مبدول

Trachinus draco (S). Vive commune, Vive grande (F). Common Weever, Common string-fish (E).

سمكة بحرية من الترخون . اعطانها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . ثوبها متداخل الالوان . ظهرها الى الحنطي الاسمر المجذع بالازرق . جانبها الى

جميع الاتربة الزراعية وهي لا تخشى سوى الممارض الشبيهة الباردة في الشتاء .

٤٩٣١ - ترخون

Astrild (F). Astrild (E).

الترخون عصفور مشهور باسم بنغالي ، اطلبه . ومنه :

ترخون أزرق الطوق Bengali cordon-bleu (F).

ترخون أشهب أزرق Bengali gris-bleu (F).

ترخون أكهب Astrild gris (F).

٤٩٣٢ - ترتيب الدين

Collocation (F).

Sum allowed to a creditor, Classification (E).

اجراء قضائي مؤداة تعيين درجة احد الدائنين وتقرير حقوقه بالنسبة الى الآخرين .

٤٩٣٣ - ترخير

Eriosperrum (S).

Eriosperrum (F). Eriosperrum (E).

جنس نباتات دوفضية جادحة من فصيلة الزنبقيات . منبتها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . اوراقها قرصية لاطئة سمكة النصل المعتدل الطول والعرض . ازهارها جرسية الشكل صغيرة || تزرع للتزيين . ترغب في الاتربة المتوسطة الانساج الوافرة العناصر الغذائية || اعرف انواعها واشهرها التالية :

٤٩٣٤ - ترخير أزغب

Eriosperrum

pubescens (S). Eriosperrum pubescent (F).

نوع من الترير . منته بعض اقاليم افريقية الجنوبية . زناده يعملو نحو ٣٠ سم . ازهاره الى الخضار الاغبر . اوراقه مستطيلة شبه قلبية الشكل . مزغبة النصل || تنويره يستمر طوال شهر حزيران .

٤٩٣٥ - ترخير ميكن

Eriosperrum

Mackeni (S). Eriosperrum de Macken (F).

نوع من الترير . نبات دوفضي جادح . منته بعض مناطق افريقية الشمالية والجنوبية . زناده يعملو نحو ٣٠ سم . ازهاره ذهبية اللون . اوراقه اهليلجية الشكل ، مالة النصل ، عادية الضلوع والعروق || تنويره يستمر طوال شهر تموز .

٤٩٣٦ - ترخجان

Mélisse (F). Lemon-balm (E).

هو الترنجان ، اطلبه .

٤٩٣٧ - ترخجة

Tergite (F).

هي في الحشرات احدى الحلقات البطنية العلوية .

٤٩٣٨ - ترخيب

Echalassage (F). Propping (E).

الترخيب ان تدعم الشجرة اذا كثر حملها لئلا تنكسر اغصانها .

٤٩٣٩ - ترخيل ، نقل

Report (F).

Carrying forward, Bringing forward (E).

الترخيل هو من مصطلحات المحاسبين ومؤداة نقل حساب او قيد من صحيفة الى صحيفة او من دفتر الى دفتر او من سنة حسابية الى اخرى || اما النقل فهو من مصطلحات المصنف وهو صفتان احدهما على البيع والثانية على الشراء تنعقدان في لحظة واحدة وفي مصنف واحد لتأجيل تنفيذ احد العقود .



ترخون



ترخون مبدول

٤٩٥٢ - تَرْسُونٌ نَهْرِيَّةٌ ، تَرْسُونٌ صَارِيَّةٌ *

Trionyx fluviatilis, T. ferox (S). Trionyx fluviatilis, T. ferox (F). Trionyx fluviatilis, T. ferox (E).

سلحفاة مائية لاحقة من فصيلة الترسيات . طولها نحو ٣٨ سم. بما فيه الذنب المقداني الشكل الذي يطول نحو ٦ سم. ذيلها ترسي الشكل عديم القتر الناشئة ، محجب الصفحة يطول نحو ٢٤ سم. ويعرض نحو ٢٠ سم. ثوبها الى الخضار الزيتي الاسمر الموج . رأسها اسطواني الشكل . عيناها مستديرتان . خطمها ينتهي بخرطوم تحترقه خنثابتان . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . لسانها متوسط الطول . عنقها كثيرة الاخاديد || تألف الأنهر والبحيرات . مسرحها في البر دجوي لا يتجاوز الضفاف ولا يستغرق من الوقت أكثر من ثلاث ساعات || قوتها البلاعيط والاسماك والحشرات المائية والحيات والحراطين والحلزونات والبزاق || يقال انها تعيش نحو ١٢٠ سنة .

٤٩٥٣ - تَرْسُونٌ ٥

Turslops (S). Tursiop (F). Blower (E).

جنس حيوانات بحرية ولودة لبونة من فصيلة الدلفينيات ورتبة الحيتان . انواعها المعروفة خمسة اعطائها مترامية الاطراف من المحيط الاطلسي الى الهادي والهندي والبحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر . ملجئها الحياتي جماعي . اسرابها تعد من ٥٠٠ الى ١٥٠٠ يقودها ذكر مسن . قوتها الاسماك والحبار والرخويات || اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. مسوكها عادية الثعول . اثوابها الى الشبهة الزرقاء تعلوها مابجات تختلف مع الانواع . رؤوسها معتدلة الاحجام ، مخروطية الاخطام . اسنانها حادة متائلة في الفكين . عيونها صغيرة ماسحة . نياستها تتوسط الجباء . زعانفها الظهرية والصدريه معتدلة الحجم ، متبعية الشكل . زعانفها الذيلية فارقة || تصاد لمسوكها وزيتونها ولحومها المتوسطة الصنف || اعرف انواعها واشهرها التالية :

٤٩٥٤ - تَرْسُونٌ أَبُو سَلَامٍ ٥

Turslops abusalam (S). Turslop abusalam (F).

نوع من الترسوب . اعطائه الخليج العربي والبحر الاحمر . سربه متوسط العدد || جسمه يطول من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. ثوبه الى الشبهة الزرقاء تعلوها موج اسمر في الظهر وفي الجانبيين . يتميز باستطالة زعانفه الصدرية || يصاد لمسكه ولزيتنه الجيد الصنف . لحمه متوسط الصنف مأكول .

٤٩٥٥ - تَرْسُونٌ فَصَّاحٌ ٥

Turslops tursio (S). Turslop néarnak, Souffleur (F). Tursio blower (E).

نوع من الترسوب . اعطائه بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط والمحيط الهندي والخليج العربي . سربه وافر العدد || جسمه يطول من ٣ الى ٤ امتار . ثوبه الى الشبهة الزرقاء تعلوها موج جوؤي في الظهر والجانبيين || يصاد لمسكه وزيتنه الجيد الصنف . اما لحمه فكاهن الصنف قل من يرغب فيه .

٤٩٥٦ - تَرْسُونٌ ٥

Tarsius (S). Tarsier (F). Tarsier (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الترسويات . انواعها المعروفة قليلة اعطائها صومتره والفيلين وبورنيو ... || تتميز برؤوسها المستضخمة وبعيونها الكبيرة الجاحظة وبآذانها المملقية الشكل المستعرضة الصيوان ، ويقوامها الخلفية

الخطلي الاصفر يعلوه تسليج معترض ازرق اللون واسمر . بطنها والقسم الاسفل من جانبيها الى الصفار التبي الفضي الموج || رأسها مستضخم الشكل ، قصير الخطم ، منتصب القم الواسع الشفق . عيناها ناشرتان ، رفيعة الارتكاز ، يعلوها فوق حاجبيها منحنى منعطف صغير || زعنفتها الظهرية الاولى خماسية المناخس الجامدة الصلبة الحادة المسمة الاطراف . مناخسها السقفية مسمة ايضاً || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٩٥٥ - تَرْسُونٌ مُشِيعُ الرَّأْسِ ، سُهْنُونٌ مُشِيعُ الرَّأْسِ

Trachinus radiatus (S).

Vive à tête rayonnée (F).

سمكة من الترخون . اعطائها بعض اقالم المحيط الاطلسي . جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها ثوب الترخون المبذول باستثناء رأسها المسنج بالاسمر على شكل الشعاع || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٤٩٥٦ - تَرْسُونِيَّاتٌ ، سُهْنُونِيَّاتٌ

Trachinidae (S). Trachinidés (F). Trachinidae (E).

فصيلة اسماك بحرية بيوضة من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . من المحيط الهادي الى الهندي والبحر الاحمر والمحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد او متوسطة تطول من ١٢ الى ٤٠ سم. تتميز برؤوسها المستغلظة وبعيونها الرفيعة الارتكاز اذ انها تتأخم قة الرأس . وباشداقها الكبيرة المستعيلة الفكوك الجالسة . ثم بزعانفها الظهرية الامامية الشائكة المسمة . واخيراً بالشوكة الذرية الحادة التي تملو الاعكام الحشوية في سقاطها الايمن والايسر || اشهر اجناسها الترخون والكورب .

٤٩٥٧ - تَرْخِيصٌ ، رُخْصَةٌ ، تَصْرِيحٌ

Permis (F). Permitted, Allowed (E).

سند رسمي يجب الحصول عليه لمباشرة عمل او اجراء . كترخصة البناء والصيد والمرور وقيادة السيارة والملاحة الجوية والبحرية ومزاولة المهنة .

٤٩٥٨ - تَرْخِيصٌ ، حَفَافَةٌ

Accoupage, Couvalson (F). Incubation, Brooding-time, Sitting (E).

هو الاحتضان ، اطلبة .

٤٩٥٩ - تَرْزٌ

Geler (F). To freeze (E).

ترز الماء ترزاً : جمد من الصقيع .

٤٩٥٠ - تَرْسُ الْمَاءِ *

Hydracéas nymphoides (S). Hydrocléide, Hydrocleis (F). Water poppy (E).

Wasserschiffel (D). Idrocleide (I). جنس نباتات عشبية مائية ترينية من فصيلة المزاريات . انواعه ٤ مهدها امريكة الاستوائية . اوراقها قلبية الشكل كبيرة الحجم تطفو على سطح الماء . ازهارها كبيرة القد ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، ثلاثية البتلات الصفرة .

٤٩٥١ - تَرْسُونَةٌ *

Trionyx (S). Trionyx, Tyrse (F). Tyrse, Soft turtle (E).


جنس سلاحف قاذبة من فصيلة الترسيات . انواعها نحو ١٥ اعطائها مياه المناطق الحارة . تفضل الأنهر على البحيرات . طولها يراوح من ٦٠ الى ٨٠ سم. جميعها مفترسة قوتها الاسماك والضفادع والحيات والطيور المائية .



ترس الماء



ترسة



ترسة نهريّة

٤٩٦٣ - ترسيب
Précipitation (F).
Precipitation (E).
هو ما يحصل عند انفصال جسم عن المادة المائعة التي كان ممزوجاً بها ، ان ماء أو غيره ، وهبوطه الى اسفل الاناء .

٤٩٦٤ - ترسيب ، دكينس
Thyrsites (S).
Thyrsite (F). Thyrsites (E).
جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السيفيات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة ||
اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .
زعانفها الظهرية قاطبة ، زعانفها الشرجية فارقة ، هلالية
الشكل . اثوابها تراوح من الريدة الفضية المواج الى السمرة
العابقة || لحومها مأكولة لكنها دون الوسط .



ترسوس أصهب

٤٩٦٥ - ترشيح
Filtration
هو جعل الماء أو أي مائع آخر يمر بالمصفاة أو ما يقوم مقامها ليرقى .

٤٩٦٦ - ترصيم ، رضم
Hourdage (F).
Rough-walling (E).
هو البناء بالرصم .

٤٩٦٧ - ترطيب ، تثرية ، تبليل ، تطبيع
Humidification (F). Damping, Moistening (E).
مد الشيء بالرطوبة اللازمة لتسكين شغله أو منماً لطبه .

٤٩٦٨ - ترعة
الترعة شجرة صغيرة تنبت مع البقل وتيسر معه وهي أحب
الشجر الى الحنجر (اللسان) .

٤٩٦٩ - ترعة
Canal (F). Channel (E).
مجرى ماء محفور يستمد مائه من النهر اذا كان للري أو
للملاحة الداخلية ويستمد مائه من البحر اذا كان للملاحة
البحرية كما هو الحال في ترعة السويس وبها وكيال .

٤٩٧٠ - ترغلة ، أطرغلة
Turtur (S).
Tourterelle (F). Turtle-dove (E).
جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه ٦ جميعها رشيقة
القوام . طولها يراوح من ٢٦ الى ٣٠ سم . مناقيدها جالسة
دقيقة . اجنحتها مستطيلة . ارساغها ومخالبها ملط . اثوابها
عديدة الالوان المتراكبة الموشحة والمنمقة يغلب فيها الازغب
الاصهب المواج || اكثر انواعها من القواطع . قوتها
الحبوب على اختلافها . تدن في الادغال والاشجار القليلة
الارتفاع . اناثها تضع بيضتين تحضنها بمناوبة الذكور .
اما انواعها فهي التابعة :

٤٩٧١ - ترغلة أسبوية
T. orientalis (S).
T. orientalis (F).

٤٩٧٢ - ترغلة الجزيرة
T. arenicola (S).
T. de l'Arabie (F).

٤٩٧٣ - ترغلة الغاب
T. auritus (S).
T. des bois (F).

٤٩٧٤ - ترغلة شائعة*
T. turtur (S).
T. commune (F).

٤٩٧٥ - ترغلة صهباء
T. douraca (S).
T. blonde (F).



ترغلة شائعة

المستطيلة الارساع || اناثها ترمص جرراً واحداً ترضعه بعض
الوقت || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٤٩٥٧ - ترسوس أصهب*
Tarsius fuscus (S).
Tarsier fauve (F). Fawn Tarsier (E).

نوع من الترسوس . موطنه جزر الزابج . يألف الغابات
ويتسلق الاشجار . ملجئه الحياتي زوجي . مسرجه دجوي .
قوته الحشرات والوزغ والعنقاء والثعابين || جسمه صغير القد
يطول نحو ٥٢ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٧ سم .
رأسه مستضخم الشكل . عيناه كبيرتان جاحظتان منشقة .
صغير الجرم . فقهه قصير وعريض الشدق . اذناه
كبيرتان . ثوبه الى الصهبية تسمر في الرأس والظهر وتغير
في الاطليين والبطن . ذنبه كاس ، قصير الوبر .

٤٩٥٨ - ترسوس الفيليبين
Tarsius philippinensis (S). Tarsier des
Philippines (F). Philippines Tarsier (E).

نوع من الترسوس . موطنه جزيرة الفيليبين . يألف الغابات
والاحراج . مسرجه دجوي . قوته الحشرات والدويبات
والعنقاء والثعابين || جسمه يطول نحو ٥٥ سم . بما فيه
الذنب الذي يبلغ ٣٠ سم . ذنبه كاس قصير الوبر .
ثوبه الى السمرة السوداء اللامعة . وجهه ادبس . صدره
وبطنه الى السمرة الخنطية .

٤٩٥٩ - ترسوس شبح
Tarsius spectrum (S).
Tarsier spectre (F). Spectre Tarsier (E).

نوع من الترسوس موطنه سجاو وبورنيو وصومتره وبنكا
وتيمور . يألف الغابات ويتنقل على اغصان اشجارها بخفة
لا مثيل لها . ملجئه الحياتي زوجي . يسرح في الليل ويبعث
في النهار . قوته الحشرات والوزغ والثعابين || جسمه صغير
القد يطول نحو ٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم .
رأسه متدل الضخمة . عيناه كبيرتان ، جاحظتان مطوختان
بالاسود . منشفة صغير الجرم . فقهه قصير ، ماسح .
اذناه ملعقيتا الشكل . اطراف اصابعه مجهزة بطبب يمكنه
من الترسخ عند القفز من غصن الى غصن || ثوبه الى
السمرة السوداء . ذنبه كاس قصير الوبر .

٤٩٦٠ - ترسوسيات
Tarsiidae (S).
Tarsiides (F). Tarsiidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الليسوريات . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد اعطائها جزر صومتره وبورنيو
والفيليبين || جميعها صغيرة القد ، مستطيلة القوام الخلفية
والاذناب . ملجئها الحياتي زوجي . تألف الغابات وتتسلق
الاشجار وتنقل بين الاغصان بخفة السنجاب || اعرف
اجناسها واشهرها الترسوس .

٤٩٦١ - ترسي
الترسي حشيشة تشبه الترس (اللسان) .

٤٩٦٢ - ترسيات
Trionychidae (S).
Trionychides Trionycides (F). Trionychidae (E).
فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف اجناسها
سنة جميعها مفترسة قازية . مهدا البلاد الحارة تألف
الانهر والبحيرات تتميز بذبلها البيضي الشكل ، المتبسط
الصفحة المستنجة والمزركشة بالاسود || اشهر اجناسها الترس .

نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اطولها تراوح من ١٠ الى ١٧ مم . كواسلها الى الزرقة السوداء المواج . اغمارها الى الزرقة الجميلة المبضعة بالاحمر او بالاصفر || تسرح في النهار . قوتها رحيق ازهار الفصيلة الصيوانية . يرقاتها قانصة تقضي على يرقات الحشرات الخاشبة وعلى دباب المنخيل والنحل البري .

٤٩٨٥ - تَرْغُولُ النَّخَارِيبِ °

Trichodes alvearius (S). Trichode des alvéoles (F). Trichodes alvearius (E).

حشرة واشعة قانصة من فصيلة الزونحيات ورتبة مفدمات الاجنحة . خنافسها تعيش على رحيق الازهار البرية . يرقاتها تفترس اساريع الحشرات الخاشبة ودباب النسوح والمنخيل والنحل البري || جسمها متوسط القد ، كثيف الهلب ، يطول من ١٢ الى ١٥ مم . ثوبها ازرق الرأس والكوسل والبطن والجرامز ، اخر الظهران المجدع بالازرق . رأسها معتدل الجرم ، مستطيل التأشير . زباناها صولجانيان . عينها صغيرتان بارزتان . ظهرانها مستعرض الطرف اللاحف ، عادم التحزيز الغمدي . اوساغها خماسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملافة في اواسط نيسان وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع . تمتنع المكن تحت لحاء الاشجار او تحت الجشالة || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ٢٠ الى ٢٢ مم . جسمها مردني الشكل ، سداسي الرواجب ، ضليع التأشير ، اسمر اللون كثيف الهلب اسود الرأس || طور الاكعال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً ينقضي في الجشالة او تحت اللحاء .

٤٩٨٦ - تَرْغِيدُ * Marcottage (F). Layering (E).

الترقيد والتدريج والتعقيل والتعكيس هي احدي طرائق تكثير النبات . قوامها حني النصف ودفنه في التربة دون فصله عن امه الى ان يشرش فيفصل عن امه ويغرس .

٤٩٨٧ - تَرْغِيدُ الْكَرْمَةِ Provignage (F).

Layering of vines (E). الغاية منها تكثير شروش الكرمة او اكثار عقلها .

٤٩٨٨ - تَرْقِيع ° Phléoplastie (F).

Phlooplasty (E). الترقيع عملية قوامها تجديد القشور المعطوبة في الاشجار .

٤٩٨٩ - تَرْقِيقُ ، تَبْطِيطُ Aplattissage (F).

Flattening (E). سحق الحبوب العلفية كالشعير والشوفان . لتسهيل اكلها على الحيوان .

٤٩٩٠ - تَرْقِيقُ Hachure

هو تخطيط الرسوم وغيرها للدلالة . ومنهم من استعمالها بمعنى تدوين وتسجيل .

٤٩٩١ - تَرْكُ ، تَحْتَلُ Abandon (F).

Relinquishment (E). هو التخلص او التنازل ، راجع تحل .

٤٩٩٢ - تَرْكَة ، مِيرَاثُ Succession

هي الذمة المالية التي يخلفها الميت وتنتقل بعده الى غيره .

٤٩٩٣ - تَرْكِيبُ ، صِيْفَة Formule (F). Formula (E).

٤٩٧٦ - تَرْغَلَة مُطَوَّقَة * T. risorius (S).

T. à collier, Streptopelia risoria (F).

٤٩٧٧ - تَرْغُولُ Tragule (F).

هو القنشير حيوان لبون مجتر . اطلبه .

٤٩٧٨ - تَرْغُونُ * ، اسبانخ زيلنده

Tetragonia expansa (S). Tétragone, Tétragonie, Epinaud de la Nouvelle Zélande (F). New Zealand spinach, N. Z. ice plant (E). Echter Neuseelandspinat (D). Tetragonla, Spinace della Nova Zelanda (I).

بقلة زراعية من فصيلة الغضريات اوراقها كثيرة العدد كبيرة الحجم تستعمل استعمال الاسبانخ . زراعتها سهلة . تتكاثر بالبذور . تعيش في جميع الاثربة تجود في الحواره .

٤٩٧٩ - تَرْفَاسُ ، تَرْفِيز Terfezia (S).

Terfex, Truffe des lions (F). فطر ديماسي من الترفيزات يشبه الكفا . اغبر البشرة . تبني اللباب ، مأكول مستحب الطعم .

٤٩٨٠ - تَرْفِيزِيَّاتُ ° Terfeziaceae (S).

Terféziacées (F). Terfeziaceae (E). عماره فطور ديماسية من فصيلة الوقسيات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة غير مؤذية .

٤٩٨١ - تَرْفِيدَة ° Thereva (S).

Thérève (F). Thereva (E). جنس حشرات من فصيلة الترفيديات ورتبة ذوات الجناحين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد ، مستغلظة الشكل ، تطول من ٩ الى ١٥ مم . رؤوسها كبيرة مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . اعظامها رخفة . ملاسها صغيرة . كواسلها وبطنها متكاثفة الحمل مبعثرة الهلب . رواشنها كبيرة . قوائمها كثيرة الهلب الشائك . اثوابها ملونة || تألف البراري والاراضي المزدحمة . جميعها قانصة . يرقاتها وانجته تعيش في الجشالة وفي التربة .

٤٩٨٢ - تَرْفِيدِيَّاتُ ° Therevidae (S).

Thérévidés (F). Therevidae (E). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تألف البراري والحراج المبعثرة الاشجار . معظم انواعها نائل وبعضها واشع او واثج || اجسامها متوسطة القد ، تطول من ٧ الى ١٥ مم . رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل . اعظامها رخفة . كواسلها وبطنها متكاثفة الزغب ، مبعثرة الهلب . رواشنها كبيرة . قوائمها شائكة || يرقاتها كثة ، دودية الشكل . اكثرها واثج وبعضها خاضل او دامن || اشهر اجناسها الترفيدة .

٤٩٨٣ - تَرْقُوَة Clavicule (F). Clavicle (E).

الترقوة عظم يصل بين القص والعائق اي شط الكتف من الجانبين .

٤٩٨٤ - تَرْغُولُ ° Trichodes (S).


Trichode (F). Trichodes (E). جنس حشرات من فصيلة الزونحيات . انواعها المعروفة




ترغلة مطوقة




ترغون



ترغود النخاريب



ترقيد



ترلاس



ترمس أزرق



ترمس أصفر عطر



ترمس زراعي

٥٠٠٩ - ترمس أزرق* *Lupinus hirsutus* (S).

Lupin bleu, Lupin hérissé (F).

عشبة حولية فردية الساق الزباء تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها خاسية أو سباعية الوريقات. أزهارها زرقاء اللون. أزهارها يستمر من نيسان إلى حزيران.

٥٠١٠ - ترمس أزغب *Lupinus pubescens* (S).

Lupin pubescent (F).

عشبة حولية فردية الساق الزباء تعلو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها سباعية أو تساعية الوريقات. أزهارها تبدو بنفسجية الاطراف والسطح الخارجي بيض الداخلى ثم تنحرف الى القرمزي. أزهارها يستمر من تموز الى تشرين أول.

٥٠١١ - ترمس أصفر عطر* *Lupinus luteus* (S).

Lupin jaune (F).

عشبة حولية فردية الساق تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها سباعية أو تساعية الوريقات الزباء المتصل. أزهارها زاهية الصفار، عطرية. أزهارها يستمر من آذار الى تموز.

٥٠١٢ - ترمس الشاطئ *Lupinus litoralis* (S).

Lupin du littoral (F).

عشبة ممررة فرعاء الساق تعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها خاسية أو سباعية الوريقات القليلة الزغب. أزهارها الى الزرقة الموشحة بالأصفر. أزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٥٠١٣ - ترمس الصحاري *Lupinus aridus* (S).

Lupin des déserts (F).

عشبة حولية فرعية الساق القصيرة تعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها سباعية الوريقات الزباء المتصل. زغبها أصفر اللون. أزهارها الى الزرقة البنفسجية يعلوها توشيح ابيض. أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٥٠١٤ - ترمس أنمر *Lupinus varius* (S).

Lupin bigarré (F).

عشبة حولية فرعاء الساق الزباء. تعلو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أوراقها خاسية الوريقات فصلها حلقي البشرة، فضي الزغب. أزهارها كبيرة القد زرقاء اللون موشحة بالابيض. أزهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٥٠١٥ - ترمس تخلي *Lupinus pilosus* (S).

Lupin velu (F).

عشبة حولية فردية الساق الزباء. تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقها تساعية الوريقات الحملية المتصل. أزهارها وردية اللون. أزهارها يستمر من نيسان الى أيار.

٥٠١٦ - ترمس زراعي* ، جرجير

Lupinus termis (S). *Lupin cultivé, L. d'Egypte* (F). *Egyptian lupine* (E). *Ägyptische lupine* (D). *Lupino egiziano* (I).

عشبة زراعية حولية تعلو من ٣٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها لاقبسية التجميع منها الخاسية والسباعية والتساعية الوريقات فصلها أهليلجي الشكل أزغب البشرة. أزهارها الى الزرقة الوردية. يستخرج من حبها مادة زيتية قلبية لها استعمالها الطبي || يزرع الترمس كمكثف للمواشي ولحبي حبه المأكول بعد نقعه بالماء، بغض الوقت، للقضاء على مرارته. ويستعمل أيضاً للتسويد الخفري. اما دقيق حبه فيدخل في تركيب أكثر المساحيق الجلدية لانه يصفل البشرة ويلينها.

٤٩٩٤ - توكيب *Synthèse* (F). *Synthesis* (E).

٤٩٩٥ - توكيب *Combinaison chimique* (F). *Chemical combination* (E).

٤٩٩٦ - تركيب القوى *Composition des forces* (F). *Forces composition* (E).

٤٩٩٧ - تركيب النسب

Composition des rapports (F).

٤٩٩٨ - تركيبني *Synthétique* (F). *Synthetic* (E).

٤٩٩٩ - تركيز *Dosage* (F). *Dosing* (E). التركيز هو اضافة ما يجب من مواد عادمة الفاعلية على المواد الفعالة لجعلها صالحة للاستعمال دون اذى.

٥٠٠٠ - توكيب *Falunage* (F). *Shell-marl* (E). هو اصلاح التربة بالركام او بالرميل المحاري.

٥٠٠١ - توكيب ، تكديس *Accumulation* (F). *Accumulating* (E). تجميع الشيء وتوقفه.

٥٠٠٢ - توكيب *Empotage* (F). *Potting* (E). هو التأصيص، اطلبه.

٥٠٠٣ - توكيب *Investissement* (F). راجع إركان.

٥٠٠٤ - ترلاس* ، لتيس *Drepans* (S). *Drépane* (F). *Drepans* (E).

ترلاس هو الاسم الهندي ولتيس الاسم الماليزي. جنس اسماك بحرية من شالكانات الزعانف وفصيلة السحليات. انواعه المعروفة قليلة العدد. اعطانها تمتد من المحيط الهندي الى ماليزية واستراليا || اجسامها مبطلعة، مستعرضة، تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ٢٠ الى ٢٥ سم. رقوسها عريضة، صغيرة الاغصان والاشداق. عيونها كبيرة، ناشزة، متقاربة. ظهورها هرمية الشوزن. زعانفها كبيرة، الظهرية الاولى سباعية المناخس الشائكة. الشرجية تقابل الظهرية وتماثلها وهي ثلاثية المناخس الامامية. زعانفها الصدرية مستطيلة، منجلية الشكل. اثوابها زاهية، فاقمة، سفاد الموج || لحمها متوسطة الصنف، مأكولة.

٥٠٠٥ - ترمدان *Pépinière* (F). *Nursery* (E). هو المشتل. عن ابن العوام.

٥٠٠٦ - ترمداني، مشائلي *Pépiniériste* (F). *Nurseryman* (E). هو من تعاطى استئثار المشاتل.

٥٠٠٧ - ترمدي *Faucon chicquera* (F). *Falcon cherrug* (E). هو صقر الفزال اي الشرق، اطلبه.

٥٠٠٨ - ترمس *Lupinus* (S). *Lupin* (F). *Lupine* (E). جنس نباتات عشبية وبجلية من فصيلة القطانيات انواعه عديدة معظمها حولي وبعضها معمر. أوراقها مركبة ورتبة التجميع. وريقاتها بيضوية الشكل، خلية الصفحة. أزهارها صنفودي التجميع، طرفي الارتكاز || اشهر انواعه ما يتبع.

ازهارها بيض تعلوها مشحة ليلكية وهي غزيرة الرحيق يحرسها النحل || اوراقها وازهارها فواحة العطر الليموني العرف . تستعمل في عدة علاجات صحية وهي من مقويات القلب ، توقف الاسهال والتشنج . نقيعها منبه وقد يزيل عسر الهضم . يستخرج من اوراقها بالتقطير زيوت طيارة وكحول نافعة .

٥٠٢٨ - تَرُونَجَان نَتِين *

Melittis melissophyllum (S). Mélitte, M. à feuilles de mélisse, M. sauvage, M. des bois, Herbe saine (F). Bastard balm, Balm melittis, Honey-balm (E). Echter immenblatt, Bastardmelisse (D). Melissa batarda, Melino, Bocca di lupo (I).

نبات عشبي بري طيب معمر من فصيلة الشفويات . يكثر في الاراضي الكلسية . يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقه معنقة ، بيضيه ، زباء ، خشنة ، قائمة الخضار . ازهاره مستطيلة الشكل . اوراقه وازهاره قوية العرف المستهجن .

٥٠٢٩ - تَرُونَجِين Manne (F). Manna (E). هو اللبن ، اطلبه .

٥٠٣٠ - تَرُونَجَة Cédrat (F). Cedrat (E). هي الاتربة ثمرة الاترج .

٥٠٣١ - تَرُونَجِي Serin (F). Canary (E). هو النفر ، اطلبه .

٥٠٣٢ - تَرُونَسَة هي الترسه حفرة تحت الارض .

٥٠٣٣ - تَرُونَسَاه ، تَرُونَسَان

Centaurea cyanus (S). Bleuet, Bluet, Barbeau bleu, Aubifoin, Casse-lunette, Centaurée barbeau (F). Blue-bottle, Bachelor button, Corn-flower (E). Kornfloekenblume, Kornblume (D). Floraliso, Fioralino, Farinello, Clano (I).

نبات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه ملتحة الانثشاب ، خيطية الشكل والنصل . ازهاره الى الازرقاق السايوي .

٥٠٣٤ - تَرُونُونِيَّات Treronidae (S). Tréronidés (F). Treronidae (E).

فصيلة طير من الجوائم حاميات الشكل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها معظم مناطق افريقية الاستوائية والحارة || جميع انواعها جواية تسمى في طلب الرزق . قوتها البزور والحبوب والحشرات || اعرف اجناسها واشهرها الترنون والحساس .

٥٠٣٥ - تَرُونَة : دويبة في الرمل (التكملة) .

٥٠٣٦ - تَرُونَة * ، أَطَرُوط Trutta (S). Truite (F). جنس اسماك نهريه وبحرية من السلمونيات . انواعه عديدة مختلفة القد واللون . منها النهريه التي لا تفارق المياه العذبة ومنها البحرية التي تترك البحر الى النهر في زمن السرم . طولها يراوح من ٤٠ الى ٨٠ سم . ووزنها من ٢ الى ١٥ كيلو . انواعها عديدة فيها الاخضر البحري والاخضر الشفاف والاخضر العابق والاسمر || جميعها من الاسماك المأكولة المستحبة الطعم .

٥٠١٧ - تَرْمُس كَبِيرِيَّيْ Lupinus sulphureus (S). Lupin de Menzies (F).

عشبة حولية فردية الساق تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقها تساعية الوريقات . ازهارها تبدو كبريتية ثم برتقالية قليلة العرف . ازهارها يدوم من حزيران الى ايلول .

٥٠١٨ - تَرْمُس مُشَجَّر Lupinus arboreus (S). Lupin en arbre (F).

جنية معمرة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . وريقاتها ذلقة الزام الاخير ، مدببة المعنقة . نصلها امرد الصفحة العليا ازغب السفلى . ثمارها قرون مستطيلة تعد من ١٠ الى ١٢ حبة لونها الى السواد الفحشي . ازهارها كبريتية اللون ، فواحة العرف المستحب || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٥٠١٩ - تَرْمُس مُعَمَّر Lupinus perennis (S). Lupin vivace (F).

عشبة معمرة فرعاء الساق تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . اوراقها سباعية او تساعية الوريقات نصلها امرد الصفحة العليا ازغب السفلى . ازهارها الى الزرق الموشحة . ازهارها يستمر من ايار الى تشرين .

٥٠٢٠ - تَرْمُس مُغَيَّر ، تَرْمُس مُلَوَّن

Lupinus mutabilis (S). Lupin muant, L. changeant (F). عشبة حولية فرعية الساق تعلو من ١٠٠ الى ١٧٥ سم . اوراقها سباعية او تساعية الوريقات القليلة ازغب . ازهارها قوية العرف متراكبة الالوان الموشحة بالاصفر والازرق والابيض . ازهارها يستمر من تموز الى تشرين اول .

٥٠٢١ - تَرْمُسَة ، تَرُونَسَة

الترسة او الترسه هي الحفرة تحت الارض .

٥٠٢٢ - تَرْمُسِين Lupinine (F). Lupinin (E). مادة شبه قلوية توجد في حب الترمس .

٥٠٢٣ - تَرْمِيد Incinération (F). Incineration (E). تحويل الشيء الى رماد .

٥٠٢٤ - تَرْمِيد Parturitlon هو الاضرع ، اطلبه .

٥٠٢٥ - تَرْمِيل Sablage (F). Sanded (E). توزيع الرمل على التربة . وهو عمل مفيد يصلح التربة المندمجة وينشط فيها اعمال الجراثيم الهوائية النافعة .

٥٠٢٦ - تَرُونَج Cédraier (F). Cedrat tree (E). هو الاترج ، اطلبه .

٥٠٢٧ - تَرُونَجَان * ، تَرُونَجَان ، حَبَق تَرُونَجَانِي ، حَشِيْشَة النَحْل ، بَادَرُونَجُونَة ، مَلِيْسَة

Melissa officinalis (S). Mélisse, M. officinale, Citronelle (F). Lemon-balm, Bee-balm, Balm-leaf, Zitronenmelisse, Citronenmelisse (D). Melissa, Cedronella, Applastro (I).


بجلة عشبية ليفية معمرة من فصيلة الشفويات . ساقها فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم . اوراقها متقابلة معنقة اذنيه بيضيه مسننة . ازهارها عذقي التجميع ابلي الارتكاز .



ترنجان



ترنجان ثن



ترنشاه



ترونة

٥٠٣٧ - تَرَوِّح

تَرَوِّح الشجر : تفطر بالورق قبل الشتاء من غير مطر .
وقيل اذا تفطر بورق بعد ادبار الصيف (اللسان) .

٥٠٣٨ - تروزيلين

Trosilin .

اسم شامل يطلق على عدة مركبات تستعمل في تنظيف مختلف الادوات التابعة للصناعات الزراعية والمنزلية ، اخصها عدة معامل الالبان والاجبان والخمور حيث يستعمل بمعدل ٥,٠٪ ، واذا ادخل على لياط الباطون في توريق الاقبية الرطبة فانه يمنع العفن عن جميع الحيطان التي يدخل في تركيب لياطها .

٥٠٣٩ - تروزيلين «ج»

Trosilin G

مركب من التروزيلين يستعمل في تنظيف قناني الحليب والزيت وكل ما له علاقة بالزيت والدهن والشحم . استعماله يستلزم بعض الادوات الخاصة كالغراشي . محلوله يركز ٧,٠٪ في تنظيف قناني الحليب ومن ١ الى ٢٪ في تنظيف قناني الزيت .

٥٠٤٠ - تروزيلين «ف»

Trosilin F

مركب من التروزيلين يستعمل في تنظيف القناني . انواعه خمسة صار ترتيبها وفقاً لقساوة المياه ، الممكن استعمالها ، على الشكل التالي :

التروزيلين «FW» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ١ الى ١٠ .

التروزيلين «F» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ٨ الى ١٥ .

التروزيلين «FH» يستعمل في المياه التي تراوح قساوتها من ١٢ الى ٢٠ .

التروزيلين اكسترا يستعمل في معظم المياه العادية التي تراوح قساوتها من ٠ الى ٤٠ .

التروزيلين اولترا يستعمل في جميع المياه التي تراوح قساوتها من ٠ الى ٥٠ .

استعماله لا يستلزم شيئاً من الادوات الخاصة . محلوله يركز من ٣,٠ الى ٥,٠٪ نظراً لحالة القناني وما تحمله من اوساخ .

٥٠٤١ - تَرَوِّب ، تَحْثِير ، تَجْمِيد Coagulation

تحيض الحليب بالروبة .

٥٠٤٢ - تَرَوِّيح ، تَهْوِيَة

Ventilation (F).

Ventilation, Airing (E).

هو تجديد الهواء .

٥٠٤٣ - تَرَوِّيض

Gymnastique fonctionnelle (F).

Functional gymnastic (E).

ومنهم من قال رياضة الاعضاء . وهو ترويض خاص بسائر اعضاء الحيوان او ببعضها غاية الوصول الى اكبر حد من الاستفادة .

٥٠٤٤ - تَرَوِّيض ، تَطْبِيع

Dressage (F).

Training (E).

اخضاع الحيوان بالعلم والتدريب والرياضة لمشيئة الانسان ، وهيئة للعمل المطلوب منه .

٥٠٤٥ - تَرَوِّيق

Collage, Défécation (F).

Clarifying, Defecation (E).

تصفية الخمور ببعض المواد الخاصة كالغلام والآح الخ .

٥٠٤٦ - تَرِيَّاسِي

Trias (F). Trias (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الاولى من الاباج الثاني المعروف ايضاً بالايوسط . يقال العصر الترياسي والحقبة الترياسية || تتميز هذه الحقبة ، من الوجهة الحيوانية ، بازدهار بعض اللافقاريات كالسفور وصفيحيات الخياشيم والعنويات وبانقراض معظم سقفيات الرؤوس . وبانتشار الاسماك اخصها مزدوجات التنفس . وبظهور بعض الزحافات والثدييات || وتتميز من الوجهة النباتية بمتابعة ازدهار عريانات البذور وبظهور بعض انواع الصنوبريات .

٥٠٤٧ - تَرِيَّاق

Antidote, Contrepoinson (F).

Antidote, Counter-poison (E).

كل دواء مضاد للسموم .

٥٠٤٨ - تَرِيَّاق أَبْيَض

Arum (F). Calf's foot (E).

هو الاروم ، اطلبه .

٥٠٤٩ - تَرِيَّسَة

Côte (F). Rib (E).

الترائب عظام الصدر . الواحدة تربية .

٥٠٥٠ - تَرِيَّيس

Thrips

جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة التريبيسيات . انواعه عديدة جميعها مستطيلة الشكل طولها من ١ الى ٢ مم . اجسامها اسطوانية ، اجنحتها طويلة ضيقة هدية . عظمها مخروطي ، متكها ثاقب ماص . زباناها قلادية مؤلفة من ثماني عقل . ارجلها عادية مكونة من حرقفة ومدور وقخذ وساق ورسغ ثنائي العقل والعقلة الطرفية تنتهي بوسادة ومحجم . بطنها ترجي يعلوه هلب دقيق . مرزها منشاري حاد الحمة || تكاثرها قد يكون عادياً كما في معظم الحشرات او لا جنسياً عندما تقل الذكور . الانثى تبيض نحو ٢٠٠ مكنة تمتلئها واحدة واحدة داخل بشرة النسيج . المكنة ذرية القد ، كلوية الشكل تنقف بعد وضعها بثلاثة او خمسة ايام عن يرقة صغيرة شفافة الجسم تبلغ كامل نموها في تسعة ايام حيث تتحول الى عذراء ومنها الى حشرة كاملة || اجيالها الحولية تراوح من الخمسة الى الستة . دورتها الحياتية الصيفية من المكنة الى الحشرة الكاملة تدوم من ١٥ الى ١٨ يوماً . تظهر الحشرة الكاملة في اواسط نيسان وتختفي في اوائل آب حيث تخلد الى السكينة في بيئاتها الشتوي بانتظار الربيع المقبل . تركيب عدة نباتات اخصها التبغ والقطن والزرع والبصل والباذنجان والبطاطا والزيتون والكرمة والتفاح والاجاص والخوخ ...

٥٠٥١ - ترويس الزرع *

Thrips cerealium,

Limothrips cerealium (S). Thrips des céréales (F).

Corn thrips, Grain thrips (E). Getreideblasenfuss (D).

نوع من الترييس . الانثى مجنحة سوداء اللون طولها نحو ٢ مم . الذكر عديم الجناح بني اللون اصغر قدماً من الانثى . الانثى تمتنع مكنتها في عصف الزرع فينقف عن يرقات صفر طولها نحو ١ مم . تنتقل الى القنابح حيث تمتص العصارة النسجية فتسببها عن الازهار التي تهيج قبل ان يتكون فيها الحب .



ترييس الزرع

العقل الطرفية. مؤخر بطون اناثها مخروطي الشكل.
مرزاتها منشارية حادة الحمة.

٥٠٦١ - ترييسين Trypsine (F). Trypsin (E).
هي خيرة الحلوة. الحمية التي تحلل المواد البروتينية الموجودة
في عصير الخلوة (البنكرياس) راجع حلون.

٥٠٦٢ - تريوتون Tributon arbustox

باجول زراعي مادته الفعالة شديدة النشاط تقضي على
النباتات الليفية المعمرة || يستعمل في الاسراج وعلى
جوانب الطرقات والاقنية وفي المراعي الثابتة للقضاء على
الفسرين والعوسج والعليق والصفصاف والخنان والجلهم
وصريمة الجدي والوزال والقندول واللتين والاقنشا
والقراص والسورنجان والارقطيون والسرفل البري والعرابة.
وهو يستعمل نضجاً بمعدل يراوح من ٦ الى ١٠ ليتر لكل
١٠٠٠ ليتر ماء في مساحة هكتار من الاسراج وجوانب
الطرقات. وبمعدل يراوح من ٤ الى ٦ ليتر لكل ١٠٠٠
ليتر ماء في مساحة هكتار من المراعي.

٥٠٦٣ - تريوتون « ٥ » Tributon D

باجول زراعي يستعمل في القضاء على ارومات الاشجار
الحرجية اخصها السنديان والشرم والزنان والبشية والسفندر
والبتولا والزعرور والبرقوق الشائك || تركيزه يراوح
من ٣ الى ٥ ٪ والهكتار يستوجب من ٣٠٠ الى ٥٠٠
ليتر. وهو لا يذوب في الماء انما يذوب في الزيوت
المعدنية كزيت ديزل.

٥٠٦٤ - تريوليوم Tribolium

جنس حشرات من فصيلة الفشيوات ورتبة غمديات الاجنحة.
انواعه عديدة جميعها من الحنافس الصغيرة القد طولها من
٣ الى ٤ سم. اجسامها ضيقة مقلطحة. اثنائها قائمة
تختلف مع النوع. قرونها الاستشعارية دقيقة قصيرة
صولجانية. اغمارها مستطيلة. قوائمها قصيرة ارساغها
الامامية والوسطى خماسية الفصل اما الخلفية فرباعية.
تعيش على الدقيق والمجمونات والحبوب والثمار الجافة.
حياتها طويلة تلموم من ٢٠ الى ٢٤ شهراً || اناثها
تبيض نحو ١٠٠٠ مكنة بظرف ٤٠٠ يوم بمعدل
يومي يراوح من المئتين الى الثلاث مكنات. مكنتها
مستطيلة الشكل، ابيض اللون، دبق البشرة ينقف بعد
متحه بأسبوع او اسبوعين، نظراً لحرارة المحيط،
عن يرقات تبني اللون خيطية الشكل تبلغ كامل تطورها
بعد نفقها بثلاثة اشهر وبعد مرورها بثمانية انسلاخات.
ثم تتحول الى حورية خدادتها تنوم من ٧ الى ٩ ايام
تظهر بعدها الحشرة الكاملة || احيائها الحولية عديدة
تكثر في الاقاليم الحارة وتقل في الباردة || اعرف واخر
انواعه الثلاثة التالية.

٥٠٦٥ - تريوليوم الدقيق، خنفساء الانبار

T. castaneum (S).

٥٠٦٦ - تريوليوم حديدية T. ferrugineum (S).

T. navale (F).

٥٠٦٧ - تريوليوم مبهمة T. confusum (S).

٥٠٦٨ - تريومة Tritoma (S). Tritome (F).

جنس نباتات تريينية زهرية من فصيلة الزنبقيات. مهدا

٥٠٥٢ - ترييس الفول* Thrips flavus (S).

Thrips des fèves (F). Pea thrips (E). Erbsenblasen-
fuss (D).

حشرة صغيرة القد طولها يراوح من ١ مم. الى واحد وثلاثة
خطوط. ثوبها شديد السمرة. تركيب عدة نباتات زراعية
اخصها الفول والحمص واللوبياء.

٥٠٥٣ - ترييس القرنفل Haplothrips cottel (S).

حشرة سوداء اللون طولها نحو ٢ مم. يرقاتها الى الصفار
المذهب تركيب اوراق القرنفل وتوقع بهسا الاذى.
تكافح عند ظهورها باستعمال احد الحواشير الفعالة اخصها
المركزة على الروتينون.

٥٠٥٤ - ترييس الكتان Thrips linarius (S).

Thrips du lin (F). Flax thrips (E). Flachsfliege (D).
حشرة سوداء اللون تظهر في اوائل ايار، تمتع مكنتها في
نصل اوراق الكتان فينقف عن يرقات فستقية اللون تقطع
غضيب الاوراق وتعرضها الى غزو الفطور المجهرية.

٥٠٥٥ - ترييس المنغو Sclerthrips mangiferae (S).

حشرة رمادية اللون طولها نحو ١ مم. يرقاتها صفر تركيب
اوراق المنغو فتجمدها وتؤذيها.

٥٠٥٦ - ترييس النجيليات

Anaphothrips striatus (S). Thrips des graminées (F).
نوع من الترييس لا جنسي التكاثر، عادم الذكور.
ثوبه الى الصفرة الخنطية. طولها نحو مليمتر وثلاثة خطوط.
يرقاته تركيب معظم النجيليات البرية والزراعية تمتص
عصارة الاوراق وتسببها.

٥٠٥٧ - ترييس سوري Thrips syriacus (S).

Thrips syrian (F). Syrian thrips (E). Syriatische
thrips (D).

حشرة سوداء اللون طولها نحو ١ مم. تركيب الكرمة والخنطة.
يرقاتها الى الصفار الوردي. تؤذي وتجمد اوراق الكرمة
وتعطب عصف الخنطة.

٥٠٥٨ - ترييس شائع، ترييس التبغ

Thrips communis, T. tabaci (S). Thrips commun,
T. du tabac (F). Tobacco thrips (E). Tabakblasen-
fuss, Tabakthrips (D).

حشرة صغيرة سمراء اللون خنطية المواجه طولها نحو ٢ مم.
يرقاتها صفراء اللون شفافة تركيب التبغ والبطاطا والشوندر
والبصل والملفوف والخنطة والاشجار المثمرة فتقسط غضيب
الاوراق وتمتص عصارة النسج والنسج النساخج.
يكافح عند ظهوره باستعمال احد الحواشير الفعالة على ان
يعاد النسخ على ثلاث مرات وذلك للقضاء على جميع
الانسال المتتابة.

٥٠٥٩ - ترييس مصري Retithrips aegyptiacus (S).

Thrips égyptien (F).

حشرة بنية اللون طولها نحو ١ مم تركيب الكرمة. يرقاتها
تبعية شفافة تقسط الغضيب فتجمد الاوراق وتؤذيها.

٥٠٦٠ - ترييسيات Thripidae (S).

Thripidae (F). Thripidae (E).

فصيلة حشرات من هديات الاجنحة. اجناسها وانواعها
عديدة جميعها متساوية الاجنحة الهدية عند وجودها.
قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل. ارساغها محجنية



ترييس الفول




ترييس سوري



ترييس شائع



تريوليوم



تريومة

الجذابة . الزوج العلوي مستطيل ومعيون ، اما السفلي فقصير . تجويفها الرئوي يتركز تحت الصدفة .



تريجة

٥٠٧٧ - تريستانيه ٥
Tristania (S).
Tristania, Tristanie (F). Brisbane box, Brush box (E). Weldenirgel (D). Tristania (I).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الآسيات . انواعه نحو ٢٠ جميعها اشجار وشجيرات معمرة . اوراقها عروية متعاقبة اهليلجية سنائية معنقة . ازهارها عذقي التجميع ، محوري وتاجي الارتكاز . ازهارها عديدة الالوان السوية التخضيب يكثر فيها الاصفر || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٥٠٧٨ - تريستانيه دلفية ٥
Tristania nerifolia (S).
Tristanie laurier-rose (F).

جنية فرعاء دلفية الالوان . ازهارها وردية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٥٠٧٩ - تريستانيه ضمية الورق ٥

Tristania conferta (S). Tristanie à feuilles en bouquets (F).

شجرة كبيرة القد رفيعة تملو من ٣-٤ م . اوراقها لسنة مستطيلة ضمية التجميع . ازهارها صفراء . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٥٠٨٠ - تريستانيه عطرية ٥
Tristania suaveolens (S).
Tristanie odorante (F).

شجيرة فرعاء كثيفة الورق . ازهارها الى الصفار الكبريتي . ازهارها يستمر من حزيران الى آب . اوراقها وازهارها عطرية الرائحة يستخرج منها بالتقطير عطر رائج الاستعمال .

٥٠٨١ - تريشين ٥
Trichina (F). Trichina (E).

هي دودة الخنزير وتسمى ايضا تريخين .

٥٠٨٢ - تريك ، تريكو ٥
Sauclet (F).

هو القشقوق ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٥٠٨٣ - تريك ٥

المنقود أكل ما عليه . والمذاق نفص ما عليه من بسر .

٥٠٨٤ - تريكة ٥ هي البيضة بعد خروج الفرخ منها .

٥٠٨٥ - تريكودرمة ٥
Trichoderma

جنس فطور مجهرية من الماصويات وفصيلة الوطحيات . انواعه قليلة العدد والاذى . شبيهه نذلي الشكل ، لبد التجميع ، مداد الانتشاب . جرابه الكنيدي مجداني التركيب متناسب الاقسام . كناقده وبويضاته صغيرة شفافة او ملونة || يكافح بالكبريت والنحاس . اعرف انواعه ما يلي .

٥٠٨٦ - تريكودرمة كوننجي ٥

Trichoderma koningii (S).

فطر مجهري يركب جذور التفاح في الاراضي الرطبة فيعطها . ويركب درنات البطاطا الحلوة فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع مستديرة سمراء اللون مخددة السطح تصيب البشرة وتغور في الجراة او في اللب .

المناطق الافريقية الاستوائية . انواعها المعروفة نحو ٢٠ . اوراقها حرقية التركيب عصفية النصل الضيق المستطيل . جذورها لحية بديلة . شراخها قرمي الارتكاز ، اجوف ، مستطيل ، تملو نورة متتابعة الصفوف متراسة الازهار . الزهرة بوقية الشكل اما لونها فيختلف باختلاف النوع ، يكثر فيها الارجواني الموشح والاصفر المشرب .

٥٠٦٩ - تريتيكال ٥
Triticale (F). Triticale (E).

نبات جديد من التجيليات وفئة الحبوب الغذائية نتج عن تصالب القمح مع الشيلم || زراعته الاختيارية كانت جد مشجعة لان متطلباته التربة لا تختلف عن متطلبات الشيلم ، ولان معدل انتاجه لا يقل عن ٧٠٠ كيلو للدم الواحد ، ولان محواه الغذائي شبيه بمحوى الخنطة || بوشر بزراعته الحقلية في مختلف المناطق والاقليم منذ عام ١٩٧٩ .

٥٠٧٠ - تريشيبة ٥
Photaxisme (F).
Photaxism (E).

الريشة مجموعة المناشع التي تؤخر النوبة في النبات وتعزى الى الضوء اي الى مغايل اشعة الشمس .

٥٠٧١ - تريجيكة ٥
Diapensia (S). Diapensie (F).

جنس نباتات برية ، ليفية ، معمرة ، من فصيلة التريجيحات . انواعها المعروفة قليلة لا تتجاوز السبعة . اعطانها جبال البلاد المتدلة الحارة || سوقها فرعاء . اوراقها صغيرة ، لسينية النصال ، خلية القشار . ازهارها صغيرة صفراء اللون او بيضاء .

٥٠٧٢ - تريجيحات ٥
Diapensicaceae (S).
Diapensicacées (F). Diapensicaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها جبال البلاد المتدلة الحارة || جميعها نباتات معمرة ، صغيرة الحجم ، ليفية غشوشية . اوراقها صغيرة ، متعاقبة ، متقاربة ، كثيرة العدد . ازهارها خنثوية ، خاسية الاجزاء . توجيحاتها متحدة القملات النظامية . وزيمها مرتفع . مبيضها ثلاثي الاخبية الكثيرة البويضات || اشهر اجناسها التريجة .

٥٠٧٣ - تريخين ٥
Trichine (F). Trichina (E).

هي دودة الخنزير من الديدان الخيطية تركب الخنزير وتنتقل مع لحمه الى الانسان .

٥٠٧٤ - تريخينوز ، تريشينوز ٥
Trichinose (F).
Trichinosis (E).

هو مرض دودة الخنزير .

٥٠٧٥ - ترييس ٥
Aspidiske

الريس او ترس السفينة نجم ثير من كوكبة السفينة .

٥٠٧٦ - ترييسكة ٥
Parmacella (S).
Parmacelle (F). Parmacella (E).

جنس حيوانات قاذبة من الرخويات معديات الارجل ، رئوية ، وفصيلة البزاقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها قاذبة ، بعضها يعيش في البرازيل والبعض الآخر في مدغسكر . يكثر وجودها على ضفاف البحيرات والمناقع || اجسامها اهليلجية ، مستطيلة ، رفيعة الوسط الذي يحمل صدفة صغيرة كلسية المادة ، مسطحة ، مفروسة الحمار الاسامي . رؤوسها قليلة الوضع ، رباعية الملاص




تريخين



تريسة



تريستانيه عطرية



تريكودرمة كوننجي

٥٠٩٨ - تَزْيِيل ، تَزْيِيلَة Fumure (F).

Spreading of dung on land (E).
التزيبيل هو اضافة المواد الخصبية الى التربة . راجع تسميد.
والتزيبيلة هي ما وضع من زبل لزراعة معينة .

٥٠٩٩ - تَزْمِيع Gemmiparité (F). Gemmiparity (E).

طريقة تكاثر لاشتي خاصة ببعض الحيوانات والنباتات
الدنيا الوحيدة الخلية كما هي الحال في خيرة الجملة
والاسفنجيات والمحجوفات والحيوانات الطحلبية والخراطين...

٥١٠٠ - تَزْنِين Nervulation (F).

Nervulation (E).
التزنين شكل الزنن والاعصاب ان في روشن الحشرة وجناحها
ام في نصل الورقة .

٥١٠١ - تَزْوِيق Décoration, Ornementation (F).

Decoration, Ornementation (E).
فن التزين والزخرفة .

٥١٠٢ - تَزْيِد ، غَبْض Exostose (F).

Exostosis (E).
عارض يصيب الدواب وهو انتفاخ سطح العظم . وقد
تختلف التزيدات او الغيوض باختلاف مواقعها من العضو
المصاب . راجع جرد ودخس .

٥١٠٣ - تَزْيِيت Hullage, Lubrification (F).

Oiling, Lubrication (E).
دهن الشيء او سحه بالزيت .

٥١٠٤ - تِسَاعِي Nonuple (F). Ninefold (E).

حاو تسع مرات .

٥١٠٥ - تِسَامِي Sublimation

صفة تتميز بها بعض الاجسام فتسامى اذا سخنت وتتكشف
اذا بردت .

٥١٠٦ - تِسَالِد ، بَلَك ، تِرَاع ، كَوْش ، نَزو

Reproduction, Accouplement
بجامعة الذكر انشاء .

٥١٠٧ - تَسْبِيق Bague (F). Ringing (E).

التسبيق وضع السباق في رجل الطائر .

٥١٠٨ - تَسْتُول Testule (F). Testule (E).

التستول الغلاف الخارجي للبيضة .

٥١٠٩ - تَسْتِيف ، تَسْبِيق Manutention (F).

Management (E).
جمع الشيء وسفه بترتيب ودراية .

٥١١٠ - تَسْجِيل Transcription

هو ان تلتخ في سجلات خاصة صورة طبق الاصل عن المقد
القانوني المراد تسجيله .

٥١١١ - تَسْرِئَة Frai (F). Fraying, Spawning (E).

التسرئة هي القاء السرم عند السمك .

٥١١٢ - تَسْرِئَة ، تَسْرِير Grainage (F).

Silkworm eggs (E).
هي العملية التي بواسطتها يتمكن الاختصاصي او المربي
من الحصول على سرم دود القز .

٥٠٨٧ - تريكودرمه لينورم * Trichoderma lignorum (S).

فطر مجهري يكثر في البلاد الحارة . يركب بعض الثمار
كالليمون فيعشها ويمفن جذور المصان ودرنات البطاطا
الخلوة . يكافح بمركبات الكبريت والنحاس .

٥٠٨٨ - تريكوستوريه * Trichoseptoria (S).

جنس فطور مجهري من فصيلة الصنبيات . بكتيداته
جراية تنشأ محصورة في الادمة ثم تنمو وترقى فتصعد
البشرة بعد ان تقرحها وتصلبها . قصباته لحمية النسيج
هلبية . بروفانة شفافة مژونة يملوها قطرات براقه .
انواعه قليلة أشهرها تريكوستوريه التفاحيات .

٥٠٨٩ - تريكوستوريه التفاحيات * Trichoseptoria fructigena (S).

فطر مجهري يركب ثمار التفاح والاحاص والسفرجل في
انحاء خزنها || مظهره الخارجي قروح صغيرة لاقياسية
الشكل والحجم تبدو وردية اللون ثم تنحرف نحو الخطي
وتستقر على السمرة || تتركب الثمار المخرونة عند ارتفاع
الحرارة والرطوبة فتشوهها . يكافح باجتناب الاسباب .

٥٠٩٠ - تريبوليت * Tribolites

فئة من القشريات تدعى ثلاثيات الفلق ، اطلها .

٥٠٩١ - تريشمة ، ديتريمة * Ditrema (S).

Ditrème (F). Ditrema (E).

جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة المندوليات .
انواعها المعروفة عديدة اعطانها تمتد من الهند الى اليابان ||
اجسامها شبه بيضية الشوزن ، معتدلة التسطيط ، تطول
من ١٨ الى ٢٤ سم . رؤوسها كبيرة خذروفية الشكل .
غطاؤها بجملة مندفعة صغيرة الاشدق . عيونها ماسحة .
زعانفها الظهرية مستطيلة . منخسية النصف الامامي .
زعانفها الذيلية فارقة || اثنائها تراوح من الفضي الى
الاصفر والذهبي ، ظهورها اعقب خضاباً من بطونها ||
لحومها مأكولة متوسطة الصنف .

٥٠٩٢ - ثريناكس * Thrinax (S). Thrinace (F).

جنس نباتات برية رزينية من فصيلة النخلات . انواعه
سنة مهددا جزر الاثليل وجوارها . جيمها صغيرة القد
تزرع في الحدائق والمراكن . اعما انتشاراً ما يلي .

٥٠٩٣ - ثرينكس برازيلية * T. Brasiliensis (S).

T. du Brésil (F).

٥٠٩٤ - ثرينكس صغيرة الزهر * T. parviflora (S).

T. à petites fleurs (F).

٥٠٩٥ - ثرينكس فضية * T. argentea (S).


T. argenté (F).

٥٠٩٦ - تَزْيِيب Passerillage (F).


راجع إزباب .

٥٠٩٧ - تَزْيِد Cardage du coton, Effilochage. (F). Carding (E).

تزويد القطن : تنفيشه . يقال زبدت المرأة القطن : نفشته
وجودته حتى يصلح لان تغزله (اللسان) .




تريكودرمه لينورم



تريكوستوريه



تريكوستوريه التفاحيات



نرعة



ترينكس برازيلية

٥١٢٦ - تسليح Armature (F). Reinforcement (E).

هو ما تستويجه اعمال الباطون من مختلف اشكال الجهاز الحديدي . والتسليح قد يكون :

تسليح حلزوني Armature en hélice (F).
Spiral reinforcement (E).

تسليح طولي Armature longitudinale (F).
Longitudinal reinforcement (E).

تسليح عرضي Armature transversale (F).
Traverse reinforcement (E).

تسليح مضاهي Armature symétrique (F).
Symmetrical reinforcement (E).

٥١٢٧ - تسليم ، تسليم العين

Livraison, Délivrance, Mise en possession (F).
Delivery, Give possession (E).

هو دفع مادة العين المنقولة الى مستحقها او الى من له الحق في حيازتها .

٥١٢٨ - تسميم ، تسميم

Empoisonnement, Intoxication (F). Poisoning (E).
تعطيل اعضاء الجسم عن العمل وقد يحصل من بلع مواد سامة نباتية او عضوية او معدنية .

٥١٢٩ - تسميم الدم Sépticémie (F).
Septicaemia, Septicemia (E).

مرض عديد الاشكال يحصل من نفوذ الميكروب الى الدم .

٥١٣٠ - تسמיד Fumure (F). Dung (E).
هو ما يدفن في التربة من اسمدة لحد النبات مما يفتقر اليه من عناصر غذائية ضرورية لحياته ونموه وأثماره . والتسميد قد يكون إما عضوياً او معدنياً او خضرياً .

٥١٣١ - تسמיד خضري Sideration (F).
Sideration (E).

هو التسميد بالنباتات القطائية كالباقية والترمس وما اشبه . وقد يتم ذلك بتمر النباتات المعنية للانتفاع من خاثرها العضوية المفيدة ومن محتوياتها الغذائية اخصها الازوت .

٥١٣٢ - تسמיד عضوي Fumure organique (F).
Organic dung (E).

هو التسميد بالمواد العضوية مهما كان مصدرها كالتربل على اختلاف تراكيبه وكحسن المعز والضأن وروث الخيل وسائر الدواب وخصي البقر وسلح الحمام والدجاج ومساحيق العظام والدم ورواسب المواد النباتية وقامة المدن الخ .

٥١٣٣ - تسמיד معدني Fumure minérale (F).
Mineral dung (E).

هو التسميد بالمواد المعدنية على اختلاف عناصرها وتراكيبها اخصها الازوت وحامض الفسفور والبوتاس .

٥١٣٤ - تسمين Engraissement (F). Fattening (E).
هي المبالغة في تغذية الحيوان حتى يجمع الشحم في عضله لتحسين لحمه ولزيادة وزنه .

٥١٣٥ - تسمين بالدقيق Pouture (F).
هو التسمين بدقيق الحبوب الملقية .

٥١١٣ - تسريح ، تنسيبه بالإحلاء

Congédiement (F). Discharging (E).
هو التصريح بالاستغناء .

٥١١٤ - تسريح ، زبارة ، جزومة

Taille de la vigne (F). Pruning of wine (E).
هو تشحيل الكرم وتقليمه .

٥١١٥ - تسطيع Stéréographie (F).
Stereography (E).
رسم الاجسام على سطح .

٥١١٦ - تسطيعي Stéréographique (F).
Stereographic (E).
ما كان سطح الرسم .

٥١١٧ - تسعير ، سمانة Cotation, cote (F).
Quotation (E).

السمانة او التسعير بيان سعر المعاملات والاسهم .

٥١١٨ - تسفية Ebarbage (F). Paring (E).
نزع السفا الذي لا يزال عالقاً بحب الشجير بعد الدراس .

٥١١٩ - تسكير Saccharification
تحويل النشا والسكرور الى غلوكوز قابل للاختبار .

٥١٢٠ - تسكيم Segmentation (F).
Segmentation (E).

التسكيم الانقسام الى سكم او التجزئة الى اقسام . ومن الوجهة التشريحية : الانقسام الكامل او غير الكامل للاجزاء التي يتألف منها الجسم او عضو من الجسم || ومن الوجهة البيولوجية : مجموعة الانقسامات التي تحصل في مختلف الاطوار الانتقالية للبيضة المزكوبة .

٥١٢١ - تسلم ، قبول Réception (F).
Receiving (E).

هو الاعتراف بتسلم الشيء المطلوب . وقد تستعمل في عدة صيغ منها تسلم الاعمال وتسلم البضائع .

٥١٢٢ - تسلم الاعمال Réception de travaux (F).
هو ان يعترف صاحب الاعمال للمقاول بصحة تنفيذها ورضائه عنها وهذا الاعتراف دليل قبولها وبرهان على كشف سابق عليها || وتسلم الاعمال غير تناولها الفعلي وربما سبقه او لحق به .

٥١٢٣ - تسلم البضائع Réception de marchandises


هو ان يتسلم المرسل اليه او وكيله البضائع من متعهد النقل وبهذا التسلم ينتهي عقد النقل .

٥١٢٤ - تسلم التركة Saisine (F). Seizin (E).
حق يستمده بعض الورثة من القانون او يستمده منقذ الوصية من الموصى .


٥١٢٥ - تسلم العين Prise de possession (F).
Occupancy (E).
هو العمل الذي يصبح به المرء حائزاً للعين .




تسنة



تسنة الكرمة




تسنة ثلجية



تسند



تشحيل



تشحيل

Fluidification ٥١٤٥ - تَسْيِيل ، تَمْيِيع

Amphimixis (F). ٥١٤٦ - تَشَابُك ٥

Amphimixy (E). التشابك المرحلة الثالثة من الاخصاب ذلك عندما يتم التقارب فالاتصال بين النشب الذكورية والانثوية .

Isoméris (F). Isomerid (E). ٥١٤٧ - تَشَابُه الاجزاء

Allogamie (F). ٥١٤٨ - تَشَاكُس ٥

Allogamy, Cross-fertilization (E). التشاكس الاخصاب المتصالب بين نباتين .

Erotisme (F). Erotism (E). ٥١٤٩ - تَشَبُّب

التشبيب والفزل مترادفان ، راسع فزل .

Dispersion ٥١٥٠ - تَشْتِيت

Hivernage (F). ٥١٥١ - تَشْتِيَة

Winter-ploughing, Winter-foddering (E). زرع الركون الى الثبات الحولي عند بعض الحيوانات ومعظم الحشرات .

Repiquage, Piquetage (F). ٥١٥٢ - تَشْتِيل

Transplantation (E). هو نقل النبتة او الفرسه من المشتل الى مستقرها .

Polypode de chêne (F). ٥١٥٣ - تَشْتِيَوَان

Polypody wall fern (E). راسع بسايح .

Taille (F). ٥١٥٤ - تَشْحِيل ، تَقْلِيم ، تَقْضِيب

Pruning (E). هو قطع بعض الاغصان او الافنان اما لاعطاء الشجرة الشكل المرغوب فيه او لتنظيم الاثمار او الحث على زيادته .

Diagnostic (F). Diagnostics (E). ٥١٥٥ - تَشْخِيص

التشخيص هو الاسترشاد الى معرفة المرض من وصف الاعراض وصفاً دقيقاً يرضى عن الشك والريبة .

Prévision du temps (F). ٥١٥٦ - تَشْخِيص الجَو

Prevision of time (E). الاستدلال عن حالة الطقس من معالم الجو .

Balivage (F). Staddling (E). ٥١٥٧ - تَشْخِيل

هي الطريقة القوية المتبعة ، في قطع شجر الخيس . تقوم على ترك المشاغل اي بعض الفروع او الاشجار الفتية لتكبر وتصير اعجاز .

٥١٥٨ - تَشْدِيخ البراعم ، نَزْع البراعم

Ebourgeonnement (F). Nipping of buds, Disbudding (E).

Elagage (F). Lopping (E). ٥١٥٩ - تَشْدِيْب

قطع الاغصان او الافناد العادمة الفائدة او التي تعيق نمو الشجرة او تسيء الى شكلها .

Anatomie (F). Anatomy (E). ٥١٦٠ - تَشْرِيج

علم يبحث في تركيب وصفات الاعضاء والانسجة الحيوانية والنباتية وفي شكلها وهيئتها وكيفية نموها .

Plasmopara ٥١٣٦ - تَسْنَة ٥*

جلس فطور مجهرية من عمارة الوصنيات وقصيلة الصنائيات تتميز بنحيطها البوغية التاجية الارتكاز ، المتقودية الشعب والعمودية الانتشاب . تكاثرها بوغي ، مرأشفا مستديرة او بيضية الشكل || انواعها المعروفة كثيرة لا يدخل منها ضمن نطاق هذا البحث سوى التسنة الثلجية وتسنة الكرمة .

Mildiou du tabac (F). ٥١٣٧ - تَسْنَة التبغ ٥

هي صناء التبغ ، اطلبه .

٥١٣٨ - تَسْنَة الكرمة ٥* ، مِيلْدِيُو الكرمة

Plasmopara viticola (S). Mildiou de la vigne, Rot gris, R. brun, R. juteux (F). Downy mildew of grape (E). Falscher Mehltau des Weinstockes (D).

ومنهم من قال «مرض اهداء العنب» . فطر مجهري من التسنة يركب الكرمة فيؤذيها في اوراقها وثمارها . مظهره الخارجي يقع فيحصة لا قياسية الشكل والحجم تعلو فصل الاوراق على صفحاتها العليا فتبدو سمراء اللون يقابلها على الصفحات السفلى خلل اغبر اطحل يقضي على الفنج والحلايا بعد ان يحرمها التعامل والتفاعل ويمنعها عن القيام بوظائفها الحياتية || وعندما يصيب الازهار يمنعه عن التفطوح فتتلصص قبل الانمقاد || وتبي اصاب حب المنقود يفشي بوشاح اطحل يسبب الففن والمريان والجفاف . يكافح عند ظهوره باستعمال سائل بورغينيون المحلول ٢٪ ومنهم من استعمل سائل بوردر المحلول ١٪ يضاف اليه اخضر النحاس بمعدل ١٪ ونحو ٥٠٪ من الاوكسيلكوريد . وهذه المكافحة ترتكز على عدة رشات اقلها ثلاث واكثرها خمس . الاولى عند ظهور الوصم ار عند العقد والثانية بعد الاولى باسبوعين والثالثة بعد الثانية باسبوعين وهكذا الرابعة والخامسة .

٥١٣٩ - تَسْنَة ثَلْجِيَّة ٥* Plasmopara nivea

وصم سبيه فطر مجهري يركب ورق مختلف نباتات الفصيلة الصروانية واخصها الجزر والسيسارون فيؤذيها ويعطلها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية تبدو الى الصفرة وتستقر على الصبغة . يملؤها خلل كثيف ابيض اللون كالثلج . يكافح باستعمال بعض الادوية التي ترتكز على النحاس .

Oomycetes (F). Oomycetes (E). ٥١٤٠ - تَسْنِيَّات ٥

مرتبة من رتبة الفطور البيضية تشمل ثلاث فصائل : السلاقيات والصنائيات والقسميات .

Tuteurage (F). Propping (E). ٥١٤١ - تَسْنِيد

هو وضع المسند قرب الفرسه او النبتة لربطها عليه حفاً لساق من الاشواء او الانكسار .

Règlement (F). Regulation (E). ٥١٤٢ - تَسْوِيَة

هي تصفية المتنازع فيه والصلح عليه .

٥١٤٣ - تَسْوِيَة ، تَصْوِيب ، تَحْدِيل

Péréquation (F). Equalization (E).

عملية تقسيم وتوزيع الضرائب وغيرها نسبة الى حالة المعيشة او تطبيقاً على حالة نسبية معينة .

٥١٤٤ - تَسْوِيس

Politisation (F). Giving of a political aspect to sth. (E).

التسييس ادخال السياسة حيث لا يجب ان تكون . كقولك تسييس دوائر الدولة .

Dissection

٥١٦١ - تَشْرِيح

قطع الشيء وفصل بعضه من بعض .

Zootomie (F).

٥١٦٢ - تَشْرِيح حَيَوَانِي

Zootomy (E).

علم يبحث في تشريح الجسم الحيواني .

Phytotomie (F).

٥١٦٣ - تَشْرِيح قَبَائِي

Phytotomy (E).

علم يبحث في تشريح النبات . راجع فيتوتومية .

Législation rurale (F).

٥١٦٤ - تَشْرِيع زَرَاعِي

Rural legislation (E).

مجلة القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالزراعة .

Octobre (F). October (E).

٥١٦٥ - | - تشرين الاول

يعرف ايضاً بـ أكتوبر الشهر العاشر من السنة الشمسية وهو من شهور الحريف مدته واحد وثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تهيج العسا وفي الثاني تكثر الرياح وفي الثالث يبرد الجو والهواء ..

تقويمه الزراعي - اعماله الزراعية عديدة ، اخصها :

١ - في الزراعات العامة الموسمية : متابعة جني القطن وفرزه . متابعة وانجاز قطف وتجفيف اوراق التبغ والتبناك والمباشرة بتوصيب ورزم القطفات الاولى . حرث الحواكير المعدة لزراعة التبغ فور الانتهاء من القطف وبعد اقتلاع الشتل . توزيع الاسمدة العضوية والمعدنية على الحقول المعدة لزراعة الحنطة ثم تحضير تربة حقول الحنطة والشعير والشوفان والباقية والترمس الخ .

٢ - في الاشجار المثمرة : تحضير التربة المعدة لاقتبال النصبوب الجديدة بالنقب العميق . تعيين مواقع النصبوب واعداد الحفر اللازمة وتركها بعض الوقت عرضة للشمس والهواء . متابعة قطف الثمار المتخارة والعناية بها مع اجتناب الرض والتخديش . رفع حواجز جميع المشابر والاقنية الداخلية في المتابع ومختلف الجنائن والبساتين لتصريف مياه الامطار الممكن هطولها على حين غفلة .

٣ - في الحمضيات : متابعة قطف الليمون الحامض المعد للتصدير . والعناية بالبرتقال واليوسفي على اختلاف ضرورهما وتزويد الاشجار الضعيفة او الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل .

٤ - في الاشجار المختلفة : متابعة قطف العنب المعد لصناعة الخمر والكحول . ابتداء موسم الزيتون الاخضر . المباشرة بحرث الزراعتين بعد قطف الثمار وتقليم الاشجار . غرس مشاتل الاشجار الحرجية واخصها التنوب والصنوبر .

٥ - في البقول والزهور : بذر وتشتيل جميع انواع الخضار الشتوية كالجزر واللفت والفجل والبازيلا والبصل والخس الخ ... بذر مشاتل الشوندر والارضني شوكي . انجاز زراعة البطاطا الشتوية على الساحل . متابعة غرس الزهور البصلية على انواعها .

Novembre (F). November (E).

٥١٦٦ - تشرين الثاني

يعرف ايضاً بنوفمبر . الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية وهو من شهور الحريف . مدته ثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تهب الجنوب وفي العقد الثالث يبلغ المد والجزر غاية الاقبال والادبار .

تقويمه الزراعي - اخص اعماله الزراعية ما يتبع :

١ - في الزراعات العامة الموسمية : بذر الحنطة والشعير والشوفان والبقول وجميع انواع النباتات العلفية . متابعة توصيب ورزم اوراق التبغ الجافة .

٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة تحضير التربة واعداد الحفر اللازمة لاقتبال النصبوب الجديدة . العناية بتسميد جميع الاشجار اخصها اللوزية كـ اللوز والمشمش والخوخ والدراقن والكرز ... المباشرة بغرس نصوب اللوز والخوخ والدراقن والمشمش ... المباشرة بالمكافحة الشتوية فور الاعمال . تغليف سوق الاشجار لوقايتها من الارنب البري وفأر الحقل . اخذ جميع الاحتياطات اللازمة لتصريف المياه عن البساتين .

٣ - في الحمضيات : متابعة موسم تصدير الليمون الحامض والمباشرة بقطف البرتقال واليوسفي . عدم التأخير في استعمال الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل لجميع الاشجار الضعيفة والكثيرة الحمل .

٤ - في الاشجار المختلفة : متابعة وانهاء موسم قطف العنب المعد للخمر والكحول . تسميد الكرمة ابتداء من العقد الثالث . متابعة قطف موسم الزيتون ثم تقليم الاشجار وحرث الزراعتين بعد التسميد العضوي او الكيماوي الكامل التركيب . المباشرة بغرس نصوب الخرنوب والسنديان والصنوبر والتنوب في المواقع القليلة والمتوسطة الارتفاع .

٥ - في البقول والزهور : متابعة بذر البقول وغرس الزهور البصلية . الاهتمام بمكافحة العناكب وبيوضها .

Ramification

٥١٦٧ - تَشْعُب

هو التفرع ، اطلبه .

Capillarimétrie (F).

٥١٦٨ - تَشْعِير

Capillarimetry (E).

علم يبحث في مختلف خصائص وقياسات الانابيب الشعرية .

Fanage (F). Tossing, Tedding (E).

٥١٦٩ - تَشْعِين

هو تبييس الكتأ .

٥١٧٠ - تَشْقِيق ، شَقَاق ، حَوَالَة شَق

Ranchage (F).

هي الحراثة المتباعدة الاتلام .

Taille de formation (F).

٥١٧١ - تَشْكِيل

Formation pruning (E).

هو التنصين ، اطلبه .

Rationnement (F). Rationing (E).

٥١٧٢ - تَشْكِيم

طريقة اطعام الحيوان وذلك بتحديد كمية العلف اليومي وتوقيت ميعاد كل شكلة .

Dégermage (F).

٥١٧٣ - تَشْلِيخ ، تَشْلِيط

Egermage (E).

هو انتزاع او فصل العيون او الزرع او النوامي عن عساقل البطاطا المدخرة .

Incération (F).

٥١٧٤ - تَشْمِيع

التشميع كـيماوياً هو دمج الشمع بمادة اخرى .

Dépente (F).

٥١٧٥ - تَشْنِيق

Sling. Depending (E).

عملية قوامها تعليق مشاكيك غيوط التبغ الجاف في الحواصل وتركها الوقت الكافي قبل تطعيمها ورزما .

٥١٩٢ - **تَصَرُّفِيَّة** ٥ Cybernétique (F).

Cybernetics (E).

التصرفية نظرية علمية محورها الاشتراك والقيادة في الجهاز الآلي وعند الكائنات الحية .

٥١٩٣ - **تَصْرِيح** Autorisation (F).

Authorisation (E).

هو الاذن الذي يجب على الافراد الحصول عليه قبل قيامهم باعمال معينة .

٥١٩٤ - **تَصْرِيد** Arrosage léger (F). Sprinling (E).

التصريد : سقي دون الري .

٥١٩٥ - **تَصْرِيف الْمِيَاه ، قَلَس** Drainage

هو تجويد الارض بصرف مياهها الزائدة الضارة .

٥١٩٦ - **تَصْفِيد** Sublimation

هو التسامي .

٥١٩٧ - **تَصْفِيَّة ، تَشْخِيل** Filtrage (F).

Filtering (E).

هو تنظيف السوائل من الاجرام والمواد الغريبة بواسطة المصفاة .

٥١٩٨ - **تَصْفِيَّة** Liquidation (F). Settlement (E).

هي العمل الذي به تنظم وترصد الحسابات وتعين مبالغها نهائياً كتصفية الديون والمصروفات .

٥١٩٩ - **تَصْفِيح** Laminage (F). Laminating (E).

جعل الشيء صفائح رقيقة بواسطة المصفاح .

٥٢٠٠ - **تَصْفِيط** Manoquage (F). Handling (E).

فرز اوراق التبغ وجمعها الى صفطات او بازات .

٥٢٠١ - **تَصْفِيق ، إِصْفَاق** Soutirage (F).

Drawing off (E).

هو نقل الشراب والسوائل من اناء الى آخر لتصفو .

٥٢٠٢ - **تَصَلَب** Sclérose (F). Sclerosis (E).

نشاف يحصل في نسيج الحيوان او النبات يمنحها عن القيام بوظيفتها على الوجه الاكمل .

٥٢٠٣ - **تَصَلَب المفاصيل** Aphosphorose

اطلب أفسفور .

٥٢٠٤ - **تَصْلِج** Décoconnage (F).

Crop of cocoons (E).

هو انتزاع الصلج اي الشرائق من الشيج وجمعها .

٥٢٠٥ - **تَصْنَع ، إِصْنَاع ، صِرْتَم**

Gommose (F). Gummosis (E).

وصم يصيب معظم الاشجار المثمرة والتزيينية والحرجية في سوتها وفروعها فيؤذيها وقد يميتها . اسبابه عديدة منها فطرية ومنها فيزيولوجية .

٥٢٠٦ - **تَصْنِيم** Projet, Plan (F). Project, Plan (E).

درس تبياني اعدادي تذكر فيه التفاصيل باقتضاب .

٥١٧٦ - **تشهير ، وَصَف** Signalement (F).

Description (E).

هو ذكر اهم الصفات والاشكال الفارقة ان في الحيوان او في النبات والاشياء للتعريف والدلالة .

٥١٧٧ - **تشريط** Flambage (F). Singeing (E).

هو معالجة سوق وفروع الاشجار باللهب للقضاء على الطفيليات والحشرات مع يوضها . راجع إلهاب .

٥١٧٨ - **تشويل** Etrapage (F).

اقتطاع الجذام .

٥١٧٩ - **تشويه** Mutilation

٥١٨٠ - **تَصَاعُد** Progressivité (F).

Progressivety (E).

٥١٨١ - **تَصَاعُدِي** Progressif (F). Progressive (E).

٥١٨٢ - **تَصَالِب** Croisement (F).

Cross-breeding (E).

من طرائق الاسفاد . قوامه ان يكون الذكر والانثى من نوع حيواني واحد ولكن من سلالتين او عرقين مختلفين كاتزاء حصان عربي عتيق على حجر كنديش او كقفط ثور هولندي على بقرة بلدية .

٥١٨٢ - **تَصْبِير** Taxidermie,

Empaillement (F). Taxidermy (E).

التصبير نوع من التحنيط الخاص بالحيوان والطيور ، قوامه تجويف الجثة ومعالجتها بالادوية اللازمة ثم حبسها وتركيزها في الوضع المطلوب .

٥١٨٤ - **تَصْبِين** Saponification

تحويل الشيء الى صابون او صناعة الصابون .

٥١٨٥ - **تَصْحِيح** Rectification

٥١٨٦ - **تَصْخِير ٥** Lithogénèse (F).

Lithogenesi (E).

التصخير النمط الذي اتبعته الصخور الرسوبية في تكوينها .

٥١٨٧ - **تَصَدُّع** Cadranure (F).

هو التصدع ، اطله .

٥١٨٨ - **تَصْدِير** Exportation

اخراج البضائع وكل ما له قيمة نقدية من البلاد . والتصدير يخضع لائتمنة لا بد من التقيد بها منها البيان والرخصة والرسوم .

٥١٨٩ - **تَصْدِيق** Homologation (F).

Ratification (E).

موافقة السلطة على عمل يدخل في نطاق نشاطها .

٥١٩٠ - **تَصَرَّف** Disposition

٥١٩١ - **تَصَرَّف تدليسي** Stellionat (F).

Fraudulent selling (E).

هو التصرف في مال الغير وهو على انواع منها بيع مال الغير او رهنه ومنها بيع المال الواحد الى شارين مختلفين بطريقة الخداع ومنها ايهام الشاري بخلو المقار المبيع من الديون . الخ .



تصنع

Entraînement, Suée (F). ٥٢١٦ - **تَضْمِير**

Training, Sweating (E).

هو تهيئة الفرس بالترويض وغيرها من الوسائل للاشتراك بحلبة السباق .

Application ٥٢١٧ - **تَطْبِيق**

اخضاع الحالة الفردية للأوامر العامة .

Rabattement (F). Abatement (E). ٥٢١٨ - **تَطْبِيق**

الحركة الاستدارية المحورية التي تمر بها السطوح المستوية قبل استقرارها في سطح المسقط .

Pondaison (F). Laying (E). ٥٢١٩ - **تَطْرِيق**

التطريق هو زمن يبض الطير .

Greffage, Greffe (F).

Grafting, Graft (E).

عملية جراحية تقوم على وصل نبات بآخر أو جزء من النبات بجزء آخر لينتجها وينميا كنبات واحد . فالجزء ذات الجذور وهو القائم في التربة يدعى المطعم والجزء الثاني الداخل على الأول يدعى الطعم . والنبات الذي تكون من مطعم وطعم يدعى المطعوم || فوائد التطعيم وغاياته عديدة نلخصها بما يلي :

١ - تكثير الانواع النباتية الجيدة مع الاحتفاظ بجميع صفاتها المميزة .

٢ - التمكن من استبدال نوع بآخر دون اللجوء الى القلع والفرس .

٣ - تجديد فتوة الاشجار التي بلغت دور الانحطاط .

٤ - اكثار الانواع المرغوب فيها في تربة لا تلائمها كتطعيم الاجاص بالسفرجل في التربة الجصية الرطبة .

٥ - تأمين انسجام الهيكل الشجري والطاقة الثمرية .

٦ - تأمين الطلع في الاشجار الثنائية المسكن كالفستق والكستنا .

اما التطعيم فقد يتم على عدة اشكال ضمن نطاق بعض الشروط الواجبة اخصها التجانس النوعي ، الزمن الانسب ، سلامة الاعضاء والعملية . إحكام الالتحام وتأمين عدم الجفاف . اما اهم الاشكال المستعملة فهي ما يتبع .

٥٢٢١ - **تَطْعِمُ احْتِطَاطِي**

Contre-greffe, Surgreffage (F). Counter-graft (E).

طعم احتياطي ، الغاية منه تمكين الاستعاضة عند الحاجة .

Greffe par approche (F). ٥٢٢٢ - **تَطْعِمُ ادْغَامِي ***

Graft by approach (E).

هو التطعيم بالادناء وقد يتم في بادئ امره بين مطعمين ويأتي كذلك حتى الالتحام التام حيث يقطع مطعم من الاثنين .

Greffe anglaise (F). ٥٢٢٣ - **تَطْعِمُ انْكِليْزِي ***

Whip-grafting (E).

شكل من التطعيم بالشق قوامه الاعتماد على المادة الخشبية في تركيز وتنشيط الطعم .

٥٢٢٤ - **تَطْعِمُ بالشق *** ، مَرْكُوف

Greffe en fente (F). Cleft-graft (E).

نوع من التطعيم قوامه ادخال قضيب الطعم في خشب المطعم مع الانتباه لوجوب ملاسة قشور الطعم والمطعم .

Contre-projet (F). ٥٢٠٧ - **تَصْمِيمُ مُعَاكِس**

Counter-plan (E).

درس تبياني واعدادي يناقش جملة أو جزئياً التصميم الموضوع .

Classification ٥٢٠٨ - **تَصْنِيف**

التصنيف هو ترتيب وتنسيق وتفصيل الكائنات الى ممالك واقسام ورتب وفصائل واجناس وانواع وضروب الخ ... على الوجه الآتي :

Règne (F) مملكة

Division, Embranchement (F). قسم

Classe (F). صف

Sous-classe (F). طائفة ، صفيف

Section (F). شعبة

Super-ordre (F). طبقة

Ordre (F). رتبة

Sous-ordre (F). رُتْبِيَّة ، مرتبة

Super-famille (F). لَمَّة

Famille (F). فصيلة

Tribu (F). سبط ، قبيلة ، ردف

Sous-famille (F). عمارة

Genre (F). جنس

Sous-genre, Genre spécifique (F). عترة

Espèce (F). نوع

Variété (F). صرب

Sous-variété (F). صرم ، سمخة

Race (F). سلالة ، عرق

Groupe (F). فئة

Zootaxie (F). ٥٢٠٩ - **تَصْنِيفُ الحَيَوَانَات**

Zootaxy (E). منهاج ترتيب وتنسيق الحيوانات .

Péréquation (F). Equalization (E). ٥٢١٠ - **تَصْوِيب**

هو التسوية ، اطلبها .

٥٢١١ - **تَصَيِّح ، تَصَدِّع**

Cadranure, Gélivure (F). Star-shake (E).

هو حصول شق مستطيل في لحاء ساق الشجرة سببه شدة البرد .

Solidarité (F). Solidarité (E). ٥٢١٢ - **تَضَامُن**

Mutualité agricole (F). ٥٢١٣ - **تَضَامُن زِرَاعِي**

Agricultural mutuality (E).

هو تضامن محترفي الزراعة أو المشتغلين بالشؤون الزراعية وجمعيات أو تعاونيات هذا التضامن .

Hypertrophie (F). ٥٢١٤ - **تَضَخُّم**

Hypertrophie, Hypertrophy (E).


هو فرط النمو وعدم ازالته في عضو ما .

Pansement (F). Grooming (E). ٥٢١٥ - **تَضْمِيد**

الضميد والتضميد هو وضع العلاج واللفائف على الجرح ليشفي .



تطعيم إدغامي



تطعيم إنكليزي



تطعيم بالشق

٥٢٣٩ - تَعَاوُن (F). Mutualité (F). Mutuality (E).
نوع من الادخار وتبادل المعونة يرتكز على نظام يتعهد بموجبه المتسبون ، مقابل اشتراك يدفعونه ، ان يؤمنوا بعضهم البعض من اخطار يعينونها .

٥٢٤٠ - تَعَاوُنِيَّة (F). Mutuelle (F). Mutual (E).
التعاونية شركة تقوم على مبدأ التعاون .

٥٢٤١ - تَعَاوُنِيَّة زِرَاعِيَّة (F). Coopérative agricole (F). Agricultural co-operative (E).
جمعية غايتها تعاون الافراد على القيام بالاعمال الزراعية الاقتصادية كنظيم بيع المحاصيل او حفظها .

٥٢٤٢ - تَعَايُش ، مُعَايِشَة (F). Symbiose (F). Symbiosis (E).
اشتراك في المعيشة بين فردين مختلفين وهو لا يصح بين الذكر والانثى او بين الاب والابن او بين العائل والطفيل .

٥٢٤٣ - تَعْبِثَة ، بَقْط ، رَزْم ، حَصْر (F). Emballage (F). Packing up (E).
٥٢٤٤ - تَعْتِيق ، تَفْرِيد (F). Démariage (F). Clearing up (E).
هو في الزراعة اقتلاع النباتات الزائدة او الضعيفة لاستبقاء القوة . وقد تجري هذه العملية في عدة زراعات اخصها القطن والشوندر والخيار .

٥٢٤٥ - تَعَجْرُد ، نَقْض (F). Défoliation (F). Defoliation (E).
سقوط وتناثر اوراق الشجر .

٥٢٤٦ - تَعْدَاد (F). Recensement, Dénombrement (F). Census, Enumeration (E).
هو التحرير الذي تجريه السلطة لمعرفة عدد الحيوانات والاشجار ويختلف الاشياء الممكن فرض الاتاة عليها .

٥٢٤٧ - تَعْدِي (F). Violation
هو خرق الحرمة التي ينص عليها القانون .

٥٢٤٨ - تَعْدِيل (F). Amendement (F). Amendement (E).
تديل في مشروع مطروح للمناقشة في جمعية .

٥٢٤٩ - تَعْرِية ، فَكَاك (F). Débuccage, Déchaussement (F). Laying bare the root of a plant (E).
الترية هي تقيض التخنيق او الكم .

٥٢٥٠ - تَعْرِيف ، تَحْدِيد (F). Définition (F). Definition (E).
٥٢٥١ - تَعْرِيفَة (F). Tarif (F). Tariff (E).
هي القيمة الواجبة الاداء التي تحددها السلطة وقد تستعمل في صيغ شتى اهمها تعريف الحاجيات وتعريف الحماية والتعريف الجبركية .

٥٢٥٢ - تَعَزِيز الحِسَاب (F). Soutènement de compte (F). Written of account (E).
يراد به الوسائل والبيانات التي من شأنها التدليل على صدق حساب مقدم في دعوى .

٥٢٥٣ - تَعَس (F). Dégénérescence (F). Degeneracy (E).
التعس هو الانحطاط الجسموري والشوربي في الحيوان والنبات .

٥٢٢٥ - تَطْعِيم تَاجِي * (F). Greffe en couronne (F). Crown-graft (E).
نوع من التطعيم قوامه تركيب العلم المزلول اي القصب المزلول في فرض حصر في خشب المظم .

٥٢٢٦ - تَطْعِيم رُقْعِي * ، تَطْعِيم بِالْعَيْن (F). Greffe en écusson (F). Graft by gems (E).
نوع من التطعيم يرتكز على تثبيت برعمة العلم بين لحاء وشكير المظم .

٥٢٢٧ - تَطْعِيم مِزْمَارِي * (F). Greffe en flûte (F). Graft by flute (E).
نوع من التطعيم البرعمي قوامه استبدال رقعة من لحاء المظم برقعة من لحاء العلم تعادها مساحة ويقوم فيها عين جلية رافضة .

٥٢٢٨ - تَطْهِير (F). Antiseptie, Assainissement, Désinfection (F). Antisepsis, Sanitation, Disinfection (E).
هو استعمال وسائل الحيلة والوقاية والمكافحة التي تمنع انتشار الامراض وتقضي على الميكروبات .

٥٢٢٩ - تَطْوَر (F). Transformisme (F). Transformism (E).
التطور نظرية بيولوجية تقول باستمرار تطور الانواع الحية ، وهي بذلك تعاكس نظرية الركاة وتندمج اذا صح التعبير بنظرية الارتقاء .

٥٢٣٠ - تَطْوِير (F). Processus (F). Process (E).
اطلب مدرج .

٥٢٣١ - تَطْوِيس (F). Submersion
هو الاسقاء بالنمر او التريص .

٥٢٣٢ - تَطْوِيش (F). Castration (F). Gelding (E).
انزاع خصيتي الذكر في الحيوان .

٥٢٣٣ - تَطْوِيق ، حَصْر (F). Enclave (F). Enclave, Gore (E).
هو حالة عين ثابتة تحيط بها اعيان مملوكة لغير فلا يبق لها منفذ الى الطريق العام او ان لها منفذاً لا يفي بالحاجة .


٥٢٣٤ - تَطْهِير (F). Endossement (F). Endorsement (E).
هي صيغة الاذن بالدفع التي يحررها صاحب السند .

٥٢٣٥ - تَعَادُلِي ، تَمَثَلِي (F). Symétrique (F). Symmetrical (E).
ما كان متعادلا الاجزاء او متماثلها .


٥٢٣٦ - تَعَار (F). Hémitrague de l'Arabie (F).
حيوان عاشب مجتر يدعى جهول الجزيرة العربية ، اطلبه .

٥٢٣٧ - تَعَاقِبُ الزُرُوع (F). Rotation des cultures (F). Rotation of crops (E).
هو المنهاج المتبع في تنامي الزروع قوامه الحفاظ على خصب التربة وعدم تعريضها لفقدان انسجام عناصرها الغذائية .


٥٢٣٨ - تَعَاقُدي (F). Contractuel (F). Stipulated (E).
ما هو مشروط في عقد .



تطعيم تاجي



تطعيم رقعي



تطعيم مزماري

٥٢٦٦ - تَعَفِين Mycogénie (F). Mycogeny (E).
التعفين انتاج العفن .

٥٢٧٠ - تَعْقِيل ، تَدْرِيع ، تَرْقِيد
Marcottage (F). Layering (E).

احدى طرق تكثير النبات . قواها ليّ الفصن وتحجينه
ودفته بالتراب حتى تبرز له الجذور . فيفصل عن امه اذ
يكون نبتة مستقلة .

٥٢٧١ - تَعْقِيم Stérilisation (F). Sterilization (E).
هو القضاء على جميع الخبائر الموجودة في المادة
المقصودة .

٥٢٧٢ - تَعْكِيْس Inversion (F). Reversal (E).
راجع تحول .

٥٢٧٣ - تَعْلِيْس Expérimentation (F).
Experimentation (E).
التعليس القيام بالامتحان والتجربة والاختبار .

٥٢٧٤ - تَعْلِيل Etiologie (F). Aetiology (E).
هو معرفة ودرس اسباب وعوامل المرض . والمرض قد يكون
موضعيًا فيصيب عضواً خاصاً في النبات كالجذر والساق
والورقة ... وقد يكون عاماً فيصيب اجزاء النبات عامة .

٥٢٧٥ - تَعْلِيم زِرَاعِي Enseignement agricole (F).
Agricultural teaching (E).

٥٢٧٦ - تَعْلِيم فَنِّي ، تَعْلِيم مِهْنِيّ
Instruction professionnelle (F). Professional
Instruction (E).

٥٢٧٧ - تَعْوِيم Vulgarisation (F).
Popularization (E).
التصميم نشر المعارف بالطرق البسيطة السهلة الادراك .

٥٢٧٨ - تَعَهْد ، صِيَانَةٌ Entretien (F).
Maintenance (E).
الحفاظ على الشيء .

٥٢٧٩ - تَعَهْدُ Engagement
هو الالتزام اي استئجار النفس لاجل عمل معين .

٥٢٨٠ - تَعْوِيْض Indemnité (F).
Indemnity (E).
هو ما يعطى المرء مقابل عمل قام به يستحق الجزاء .

٥٢٨١ - تَعْوِيْض عَنِ الضَّرَرِ Dédommagement (F). Indemnification (E).
هو ما يعطى المرء مقابل ضرر لحق به .

٥٢٨٢ - تَعْوِيْضَات ، تَضْمِيْنَات Dommages et intérêts (F). Damages (E).

٥٢٨٣ - تَعْوِيم Gerbage (F). Sheaf of wheats (E).
هو جمع غبوط الحصيد الى غامات وتكديسها .

٥٢٨٤ - تَعْوِيم الخشب Flottage du bois (F).
Floating of wood (E).
هي احدى طرق نقل الاخشاب نهراً وذلك بتركها طافية
على سطح الماء ودفعها الى المكان المقصود .

٥٢٥٤ - تَعَسُّقُل ، تَكْرِيْن Tubérisation (F).
Tuberisation (E).

٥٢٥٥ - تَعْسِيْد Diagnose (F). Diagnosis (E).
تحلية النبات ووصف ميزاتة .

٥٢٥٦ - تَعْسِيْل Mielée (F). Honey-time (E).
التسليل او زمن التسليل هو الزمن الذي تكثر فيه الازهار
المفترية التي يجرسها النحل ويحولها الى عسل .

٥٢٥٧ - تَعْسِيْم Assèchement, Dessèchement (F).
Drying up, Dryness (E).

هو تصريف المياه الزائدة عن التربة او اسالتها بشئ
الوسائل تجنباً لمواقبها الوخيمة فيما لو زادت او استنقمت .

٥٢٥٨ - تَعْسِيْب Désherbage (F).
Clearing (E).
هو اباداة الاعشاب .

٥٢٥٩ - تَعْسِيْكَ Scissiparité (F).
Scissiparity, Schizogenesis (E).
التناسل بالانقسام الى شطرين .

٥٢٦٠ - تَعْسِيْكَ Lotissement (F).
Allotment, Dividing into lots (E).
هي تقسيم عقار ما الى عدة اجزاء تسهيلاً لبيعه . والتعسية
تخضع لقوانين خاصة منها حد المساحة الادنى ووجوب
قيام الطرقات المعبدة الخ ...

٥٢٦١ - تَعْطِيل ، اِبْطَال Caducité (F).
Caducity (E).
التعطيل او الابطال هو حالة عمل قانوني أصبح عقيماً
بسبب حدث جديد .

٥٢٦٢ - تَعْطِيل Dénaturation (F). Denaturing.
Medication of spirit (E).
راجع إفساد .

٥٢٦٣ - تَعْطِيل Inactivation (F). Inactivation (E).
التعطيل ، طبياً ، اناء مفعول مادة دُعافية في الجسم .

٥٢٦٤ - تَعْطِيْن Rouissage (F).
Steeping, Retting (E).
هو نقع سوق القنب والكتان وما اشبه لانحلال وزوال
المواد الصمغية من اليافها .

٥٢٦٥ - تَعَفْنُ الجَنُور ، قَسَخ ، حَالُوط Pourridié (F). Rot (E).
وصم نباتي وخيم العاقبة اسبابه فطور مجهرية عديدة .
اظهرها باسمائها .

٥٢٦٦ - تَعَفْنُ الظِّلْف Piétin (F). Foot-rot (E).
مرض معد يعرف بمرض الظلف يصيب اخلاص الضأن .

٥٢٦٧ - تَعْفِيْر Poudrage, Soufrage (F).
Powdering, Sulphuring (E).

ذر احدى المساحيق الزراعية المستعملة لمكافحة او معالجة
او وقاية النبات من الاوصام والحشرات .

٥٢٦٨ - تَعْفِيْص Tanisage
احدى طرق معالجة الخمر . ترتكز على اضافة بعض
الحامض الثقيل الى الخمر لزيادة حموضتها وتسهيل حفظها .

٥٣٠٠ - تَفَرُّط (F). Defecation (E).
دفع المواد البرازية أو السليجية .

٥٣٠١ - تَغْيِيب (F). Nebulosity (E).
هو السديم والدجى راجعها .

٥٣٠٢ - تَفَّ
التف : دودة صغيرة تؤثر في الجلد (اللسان) .

٥٣٠٣ - تَفَّ (F). Poa (S). Pâturin (F).
Meadow-grass, Spear-grass (E).

جنس نباتات عشبية من العكروشيات وفصيلة النجيليات
أنواعه عديدة نحو ٢٠٠ معظمها معمر وبعضها حولي .
عصفها مسطح النصل مستطيل . أزهارها سنبل . جميعها
نباتات كلائية ترعاه الماشية ومنها زراعية يكثر استعمالها
في المراعي وبعضها يخضوري يصلح كخضير في الحدائق .
أهم وأشهر أنواعه ما يتبع .

٥٣٠٤ - تَفَّ البر ، قَلْتِيب

Poa communis, P. trivialis (S). Pâturin commun (F).
نبات عشبي بري وزراعي معمر يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم .
يوجد في كل مكان . يكثر في الأتربة القليلة والمتوسطة
الاندماج . ينذر في المراعي الاصطناعية لأنه مرغوب
من الماشية ويسمى . يصلح كخضير حدائق قابل الجز
لكنه يخشى دوس الأقدام ولا يتحمل الجز أكثر من ٤
أعوام متتالية يضعف بعدها نشاطه .

٥٣٠٥ - تَفَّ الغاب (F). Poa nemoralis (S).
Pâturin des bois (S).

نبات عشبي بري معمر يعلو نحو ٥٠ سم . يرغب في
المواقع الظليلة . يوجد في الأتربة الرملية . يستعمل لتخضير
الحدائق الوارفة الظل . لا يخشى الجز لكنه لا يتحملة أكثر
من ٤ سنوات متتالية .

٥٣٠٦ - تَفَّ المروج* ، كِلَانِيَّة (F). Poa pratensis (S).
Pâturin des prés (F). Meadow-grass, Spear-grass (E).
Rispengras (D). Fienarola, Poa dei prati (I).

نبات عشبي بري وزراعي معمر . يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم
يكثر في المراعي المتوسطة الرطوبة ، يوجد في جميع الأتربة
المتعادلة والقليلة الاندماج . ينذر في المراعي الاصطناعية
لأنه مرغوب من الماشية وقد تسم عليه . يصلح كخضير
حدائق قابل الجز لكنه يخشى دوس الأقدام التي تعطب
عصفه وبنياته .

٥٣٠٧ - تَفَّ المناقع* (F). Poa palustris (S).
Pâturin des marécages (F).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم . يعيش
في جميع الأماكن الرطبة مها كانت تربتها وأخصبها المناقع
ومجاري الماء .

٥٣٠٨ - تَفَّ حَبَشِي* (F). Poa Abyssinica (S).
Pâturin d'Abyssinie, Teff d'Abyssinie (F). Teff of
Abyssinia (E). Abessinische korn (D). Fienarola
d'Abissinia (I).

نبات عشبي بري معمر يكثر في المروج الطبيعية المعتدلة
الرطوبة وفي ظل الأشجار الحرجية . ترعاه الماشية بشهية .
ومن قائل أنه لا يخلو من بعض الخواص الطبية .

٥٢٨٥ - تَغْيِيب (F). Dénaturation (F).
Denaturing (E). راجع إفساد .

٥٢٨٦ - تَغْيِير ، كَيْل (F). Jaugeage (F).
Gauging (E). هو تحديد مقدار الاستيعاب الفعلي العائد إلى وعاء معين ما .

٥٢٨٧ - تَغْيِير الماء ، كَيْل الماء (F). Jaugeage de l'eau (F).
Water-gauging (E). هو تحديد كمية صبيب المياه الجارية في الثانية أو في اليوم .

٥٢٨٨ - تَغْيِين (F). Désignation, Détermination (F).
Designation, Determination (E). هو تبيان مظهر العين الثابتة وتعریف أخص صفاتها .
وهو أيضاً اسناد عمل إلى أمرى بعينه .

٥٢٨٩ - تَغْيِين محل الوفاء (F). Domiciliation pour paiement (F).
Domiciliation (E). هو في القانون التجاري تعيين محل وفاء الدين .

٥٢٩٠ - تَغَب (F). Défait (F). Default (E).
التغيب : العيب والنقص . يقال فرس ما فيه تغبة أي
ما فيه عيب . وثمار خالية من كل تغبة أي من كل عيب .

٥٢٩١ - تَغْبِيط (F). Javelage (F). Laying in swathes (E).
هو جمع قبضات الزرع المحصود إلى غيوط .

٥٢٩٢ - تَغْذِيَّة (F). Alimentation
هي مد الحيوان والنبات بالغذاء اللازم .

٥٢٩٣ - تَغْذِيَّة صَوَابِيَّة ، تَغْذِيَّة مُقَنَّنَة (F). Alimentation rationnelle (F).
Rational nourishment (E). هي التغذية المرتكزة على العلم وعلى معرفة خواص كل مادة
مع مقدورها وعدد وحداتها الغذائية .

٥٢٩٤ - تَغْرِسَة (F). Transplantation
نقل الفراس من مكان إلى آخر أو من الكود إلى المكن .

٥٢٩٥ - تَغْرِيد ، زَقْرَقَة ، صُدَّاح (F). Ramage (F).
Warbling (E). ارتفاع صوت الطائر والتطريب به .

٥٢٩٦ - تَغْس (F). Stratus léger (F). Light stratus (E).
التغس : لطف سحاب رقيق في السماء (ابن دريد) .

٥٢٩٧ - تَغْصِين ، تَشْكِيل (F). Taille de formation (F).
هو التشكيل الخاص الذي يعطي هيكل الشجرة الشكل
المقصود .

٥٢٩٨ - تَغْطِيس ، تَغْمِيس ، إِنْغِمَاس (F). Immersion (F).
Immersion, Dipping (E). قس الشيء في الماء أو في أي سائل آخر .


٥٢٩٩ - تَغْلِيف (F). Enrobage (F).
Coating, Wrapping (E). إحدى الوسائل الصناعية المستعملة لحفظ بعض المحاصيل
الزراعية والحيوانية من عبث الهواء وما ينتج عنه . كلف
الثمار بالورق الخاص وتغطيس البيض في ماء الكلس
الخ ...



تف المروج



تف المناقع




تف حبشي



تفاح



تفاح البرد



تفاح باردون برلبش



تفاح جشان



تفاح دليشس، ستاركن



تفاح رد استراكان



تفاح رد جون

والاندماج . يحسن تعليمها بالايست مولين رقم ٢ . اوراقها حساسة تحشى السوائل الكبريتية والسلفوكلسية || خصبها طوعي . حملها حولي متتابع . ثمارها صغيرة ومتوسطة القد، جيدة الصنف، لذيدة الطعم والنكهة .

٥٣١٨ - تَفَّاح جُنْثَان* Jonathan

ويعرف ايضاً باسم جنارد وبلارك جون . ضرب من التفاح امريكي المهد . وهو شجرة متوسطة الحجم والنشط ، فارشة الاغصان المتدلية الاطراف . تجود في جميع الاثرية الخوارة القليلة والمتوسطة الاندماج || خصبها طوعي ، طلعها وافر الجدرات النشيطة الغذاء التي تساهم في اخصاب غيرها . حملها حولي متتابع . ثمارها صغيرة القد مستطيلة الاذن . بشرتها ملساء ، لونها احمر قائم يعلوه توشيح عقيقي . لبها صلب المكسر ، اصفر اللون ، ناعم الرقعة ، مستحب المذاق العطري .

٥٣١٩ - تَفَّاح حَوْخِي الْوَرَق Malus prunifolia (S). Pommier à feuilles de Prunier (F).

نوع من التفاح البري والتزييني . شجرته تعلو من ٦ الى ١٠ امتار . اوراقه ضيقة النصل . خوخية الشكل ، باهتة الخضار ، زياء الصفحة السفلى . ازهاره الى البياض المشرب الصفار . ثماره صغيرة حامضة صفراء اللون . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٣٢٠ - تَفَّاح دِلِيشِس* ، ستاركن Delicious (starking)

ضرب امريكي المهد يشمل بعض الفجوة اخصبا رد دليشس ، وستاركن دويل رد ، وستاركن ريتش رد ، وستويل دليشس . فوارقها لون الثمار ومواج الاوراق || شجرته كبيرة القد ، قوية النشط ، باسقة ، تتحمل البرد القارس . تنمو وتجود في جميع الاثرية الرغاب القليلة والمتوسطة الاندماج لكنها قليلة المناعة ضد التبقع والنكبات الحمر . خصبها غوثي ، حملها متناوب . ثمارها متوسطة وكبيرة القد ، مخروطية الشكل ، مضلعة الحوض العميق . انها طويلة قوية ، قشورها سمكة ، بشرتها ملساء لونها الى الاحمر يعلوه توشيح جزوي بنفسجي المواج . لبها صلب المكسر ، ابيض اللون ، ناعم الرقعة ، غض العصير ، لذيد الطعم ، عطري العرف .

٥٣٢١ - تَفَّاح رِدْ اُسْتَرَاكَان Red Astrakhan

ضرب من التفاح الشرقي مهده مرفعات بحر قزوين . شجرته كبيرة القد فرعاء تجود في المناطق المنحرفة نحو البرد وفي معظم الاثرية المتوسطة الاندماج || خصبها لا قياسي ، حملها حولي متتابع . ثمارها مبكارة متوسطة الحجم . انها دقيقة منعقة . بشرتها ملساء فسقية الاساس حراء المشحة يعلوها خل شمعي اطحل اللون . لبها جامد المكسر ، ناعم الرقعة ، عطري العرف ، غض العصارة مشبع الحموضة .

٥٣٢٢ - تَفَّاح رِدْ جُون Red June

ومنه كروليت رد جون . ضرب امريكي المهد شجرته قوية منبسطة الاغصان تجود في المناطق التهامية المعتدلة الارتفاع . خصبها غوثي . حملها متناوب . ثمارها مبكارة، متتابعة الادراك، صغيرة القد . انها دقيقة طويلة . بشرتها لامعة ملساء ، لونها اصفر الاساس جزوي المشحة . لبها جامد المكسر ، ناعم الرقعة ، ابيض اللون ، غض العصارة، مشبع الحموضة المستحبة .

٥٣٠٩ - تِفْ حَوْلِي Poa annua (S).

Pâturin annuel (F).

نبات عشبي بري حولي صغير القد يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . يكثر في الاراضي الجبلية المروية .

٥٣١٠ - تِفْ ضُمِّي، عُنْزَيْعَة Poa compressa (S). Pâturin comprimé (F).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . يكثر في الاثرية الكلسية وهو من نباتاتها الطوعية . ساقه ضمية الفروع ضيقة العصف النحيل . ترعاه الماشية قبل ادراك زهره واخشياش فروعها .

٥٣١١ - تَفَّاح* ، مَيْسِب Malus (S). Pommier (F). Apple-tree (E). Apfel (D). Melo (I).

جنس اشجار وجنباث مشمرة من سبط التفاحيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منها نوعان مأكولان الثمار ضروريها تربو على الثلاثة آلاف . اما الانواع الاخرى فبرية وبعضها يزرع للتزيين || ساقه قصيرة . اغصانه منفرجة . اوراقه معتقة متعاقبة . نصلها بيضي الشكل لسن الزام الاخير المدبب ، وهو ناشز العروق والشرابين ، مسن الحافة ، امد البشرة او خملها . ازهاره نوري التجميع . ازهاره صغيرة القد ، مستديرة البتلات الوردية او البيضاء اللون . مآبرها صفر . اقلامها مندغمة القاعدة ثلاثية او خماسية التجميع . ثماره مستديرة الشكل جامدة اللباب || اعرف انواعه وضروبه الزراعية ما يتبع .

٥٣١٢ - تَفَّاح الْأَرْض Matricaire camomille (F). Wild chamomile (E).

هو البابونج ، اطلبه .

٥٣١٣ - تَفَّاح الْعَجَائِب Pomme de merveille (F). Balsam apple (E).

هو المنض البلسمي ، اطلبه .

٥٣١٤ - تَفَّاح الْفِيل Féronie (F). Elephant apple tree (E).

هو الفيرونية ، اطلبها .

٥٣١٥ - تَفَّاح الْوَرْد* ، جَنْبُوزَة، حَوْخ مَلَابَار Eugenia jambos, Jambosa vulgaris (S). Jambosier, Jambose, Jambolin, Jambosier, Pomme rose, Eugénier jambos, Prunier de Malabar (F). Rose apple, Malabar plum, Jambosa (E). Jambosenbaum, Jambos (D), Pomo rosa, Eugenia, Melo rosa, Prugna di Malabar (I).

شجرة صغيرة مشمرة من فصيلة الآسيات . منبتها الاصلي بلاد الهند ومنها انتقلت الى جميع الاصقاع الحارة . اوراقها عروية معتقة ، متعاقبة ، اهليلجية النصل . ازهارها جميلة الشكل ، كبيرة القد ، طرفية الارتكاز . ثمارها نوية، حمراء اللون ، وردية العرف ، حججها حجم التفاحة وهي مأكلة مستحبة الطعم . يستحضر من عصيرها مرطب صحي جزيل النفع .

٥٣١٦ - تَفَّاح أَيْار Pomme de Mai (F).

نبات جشموري معمر يدعى بدفيل درقي ، اطلبه .

٥٣١٧ - تَفَّاح بَارُون بَرْلِبَش* Baron de Berlepsch

ضرب من التفاح سويسراي المهد . شجرته متوسطة الحجم والنشط تجود في جميع المواقع والاثريه المعتدلة التركيب

اللون. ثماره صغيرة حامضة، لونها الى الصفار الصنابي. ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

Malus theifera (S).

٥٣٢٩ - تفاح صيني

Pommier-thé (F).

نوع من التفاح الصيني المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٥ الى ٨ أمتار. أوراقه مسننة الحافة، ضلعها احمر اللون وزنادها كذلك. ازهاره بيض البتلات، حمر النصل، عطرية العرف. ثماره صغيرة القد، صناعية اللون || ازهاره ربيعي.

٥٣٣٠ - تفاح ضيق الورق. Malus angustifolia (S).

Pommier à feuilles étroites (F).

نوع من التفاح الامريكى المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٤ الى ٥ أمتار. أوراقه عابقة الخضار ضيقة النصل طولها من ٣ الى ٥ سم. وعرضها من ٨ الى ١٥ مم. ازهاره وردية اللون، قصيرة البتلات، عرقية الرائحة. ازهاره يستمر من اذار الى ايار.

٥٣٣١ - تفاح عطير، تفاح كوروناريه

Malus coronaria (S). Pommier odorant (F).

نوع من التفاح الامريكى المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من اربعة الى خمسة أمتار. أوراقه البالغة قليلة الشكل ملطاة النصل. ازهاره وردية اللون بتفجسية العرف. ثماره صغيرة القد حامزة الطعم، فواحة العرف، لونها الى الخضار الفستقي || ازهاره ربيعي يستمر نحو ٧ اسابيع.

٥٣٣٢ - تفاح فلورنتيه Malus florentina (S).

Pommier florentin (F).

نوع من التفاح الايطالي المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٣ الى ٤ أمتار. افنادها وافنادها حنطية اللون. أوراقها زباء الصفحة السفلى. ازهارها تاجي الارتكاز. ازهارها بيض. ثمارها حمر اللون عند الادراك. طول الثمرة نحو ١٢ مم. وعرضها ١٠ مم. || ازهارها ربيعي.

٥٣٣٣ - تفاح كثير الزهر، تفاح منور

Malus floribonda (S). Pommier floribond (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٣ الى ٤ أمتار. فروعها نحيلة متدلية. أوراقها بيضية طولها نحو ٥ سم. وعرضها ٣، نصلها امرد البشرة عل صفحتيه. ازهارها كاسية وردية اللون تكثر فيها المكسبة. ثمارها اهليلجية طولها من ٦ الى ١٢ مم. لونها الى الصفار الحنطي.

٥٣٣٤ - تفاح كرافنشتين * Gravenstein

ومن كرافنشتين تريل رد ورد كرافنشتين. غرب الماني المهد شجرته كبيرة باسقة قوية منفرجة الاغصان تجود في المواقع المتوسطة الارتفاع التي تعلو من ٧٠٠ الى ١٢٠٠ م. عن سطح البحر. ترغب في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج. تحشى المعارض الطليقة لأنها لا تتحمل الرياح القوية || خصبها غوثي عسير. حملها حولي متتابع. ثمارها مبكارة متوسطة وكبيرة الحجم. انها قصيرة وغلظية. بشرتها خشنة الملمس برتقالية الاساس حمراء المشعة. لبها صلب المكسر، ثبي اللون، ناعم الرقعة، جيد النكهة، لذيد الطعم، عطري العرف، قليل الحموضة.

٥٣٣٥ - تفاح كرزى * Malus-baccata (S).

Pommier à bales, P. baccifère (F).

نوع من التفاح البري والزراعي المأكول الثمار. شجرته تعلو

٥٣٢٣ - تفاح رينت كندا * Reinette du Canada

ضرب فرنسي المهد شجرته متوسطة الحجم، نشيطة، فارشة الاغصان، سريعة الانتاج. ترغب في المواقع المرتفعة القليلة الرطوبة. تجود في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج. خصبها لا قياسي. حملها حولي متتابع. ثمارها كبيرة القد، مستديرة، مفلطحة. انها قصيرة غليظة. قشرتها سمكية، بشرتها خشنة، لونها الى الاخضر الفستقي. لبها صلب المكسر، ابيض اللون، غزير العصارة، لذيد الطعم، عطري العرف.

Malus zumi (S).

٥٣٢٤ - تفاح زومى

Pommier zumi (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته تعلو من ٦ الى ١٠ أمتار. أوراقها طويلة الزناد، نصلها مالمس البشرة. ازهارها رحية البتلات لونها الى الوردي. ثمارها نووية حقيقتية قطرها نحو ٢ سم. || ازهارها ربيعي يستمر شهراً واحداً.

Malus sargentii (S).

٥٣٢٥ - تفاح سترجنسي

Pommier de Sargent (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته صغيرة تعلو من المترين الى الاربعة. افنادها وافنادها حمر اللحاء أوراقها شديدة الخضار. نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهارها بيض. ثمارها صغيرة قطرها نحو ١٠ مم. لونها الى الحمرة يعلوها موج مخلي.

٥٣٢٦ - تفاح سيبولدي Malus sieboldi (S).

Pommier de Siebold (F).

نوع من التفاح الياباني المنبت. بري وتزييني. شجرته صغيرة شائكة تعلو من المترين الى الثلاثة. أوراقها معتقة اهليلجية، نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهارها حمر من الخارج بيض من الداخل. ثمارها صغيرة القد، قطرها يراوح من ٥ الى ٧ مم. لونها الى الصفار الحنطي.

٥٣٢٧ - تفاح شائع * Malus communis (S).

Pommier, Egrasseau (F). Apple tree (E). Apfelbaum (D). Pomo, Melo (I).

نوع من التفاح الزراعي الشائع الاستعمال. ضرابه المتداولة تربو على ثلاثة آلاف جميعها مأكولة الثمار. اشجارها متباينة الحجم والهيكل منها البجلة والجنية والشجيرة والشجرة. ثمارها متفاوتة القد والشكل واللون والطعم والعرف || اشهر ضرابه الرئيسية التي ارتكزت عليها واثبتت منها الضرروب والمالج الحالية هي :

Malus paradisilaca

تفاح الجنة

Malus acerba

تفاح حامز

Malus sylvestris

تفاح حرجي

Malus mitis

تفاح حلو

Malus aurea

تفاح ذهبي

Malus apetala

تفاح عادم البتلات

Malus pumila

تفاح قزم

اما ضرابه الزراعية المأكولة الثمار، المشهورة، فراجمها في مواقعها.

٥٣٢٨ - تفاح شرقي * Malus spectabilis (S).

Pommier à bouquets (F).

نوع من التفاح الشرقي المنبت. بري وتزييني. ضرابه عديدة. اشجاره تعلو من ٦ الى ٨ أمتار. أوراقه جلدية النصل زاهية الصفحة العليا، زباء السفلى. ازهاره وردية




تفاح رينت كندا



تفاح شائع



تفاح شرقي




تفاح كرافنشتين



تفاح كرزى

٥٣٤٢ - تفاح ووتر بنانا * Winter banana


ضرب هولندي الاصل . شجرته متوسطة النشط فارشة . تجود في معظم الاثربة والمواقع . تحشى البرد والتربة الكتوم . خصبها طوي لا قياسي . حلها حولي متتابع . ثمارها جيدة الصنف ، كبيرة القد ، مخروطية الشكل . انها ربة ، قشورها سميكة . بشرتها ملساء ، لونها الى الاصفر الفاقع تفشاء مشحة حراء باتجاه معرض الشمس . لبها صلب المكسر الخشن الرقة ، اصفر اللون ، لذيق الطعم ، قليل الحموضة ، مسكي العرف .



تفاح كلدن ديلش

٥٣٤٣ - تفاح يلو بلفلور * Yellow belleflower

ضرب امريكي المهد شجرته كبيرة الحجم باسقة نشيطة فارشة . تجود في المواقع المتوسطة الارتفاع . رغب في المعارض الجنوبية والاثربة الخصب . الرغب المتوسطة الاندماج . خصبها غوثي عسير . حلها متتابع . ثمارها جيدة الصنف متوسطة وكبيرة الحجم ، مخروطية الشكل ، انها دقيقة مستطيلة ، بشرتها ناعمة ، لونها الى الصفار الليموني تعلو حرة خفيفة من جهة معرض الشمس . لبها جامد المكسر ، قبي اللون ، غزير العصارة العطرية .



تفاح كوكس أوردنج بين

٥٣٤٤ - التفاحة * Pomme (F). Apple (E).

ثمرة التفاح . تأتي التفاحة في تصنيف الثمار وبالنظر الى نكهتها واقبال الناس عليها بالمرتبة الثانية ، بعد الدراق وقبل الاجاصة || يختلف لون التفاحة وشكلها وحجمها وطعمها ومكسر لبها ومقدار عصيرها باختلاف ضربها وموقع زراعتها وحالة بيئتها التربة ومقدار ما استهلك من ماء ، الخ... ومع ذلك ورغم التفاوت الاكيد نقول اولاً ان التفاحة تقسم الى ثلاثة اجزاء :

جزء القشور وقد يبلغ نحو ٥ %

وجزاء اللباب ومقداره نحو ٩٤ %

وجزاء البزور وقدره نحو ١ %

ثم نقول بناء على تحاليل « كونيغ وبالن » ان متوسط ما يحواه لباب التفاحة المأكولة من مواد هو :

مواد دهنية ٠,٥٨ %

مواد ازوتية ١,٤٤ %

مواد سكرية ١٤,٦٠ %

مواد استخلاصية ١٦,٥٠ %

سليولوز ١,٣٠ %

رماد ٠,٣٠ %


حريرات ٦٨٠ %

ويجوزي اللباب ايضاً بعض الكميات الضئيلة من مختلف الحوامض العضوية التالية : التفاحي والحلي والكبري والنسلي . اما العناصر المعدنية التي يحواها فهي

كبريت ٨ %	كلسيوم ٤,٥٠٠ %
فسفور ١٠ %	حديد ٠,٣٠٠ %
كلور ٣ %	نحاس ٠,١٢٠ %
بوتاس ١٢٠ %	زنك ٠,١٠٠ %
صوديوم ٢ %	منغنيز ٠,٥٤٥ %
منيز ٥ %	يود ٠,٠٠٢ %

اما الفيتامينات فتقدر على الوجه التالي :

فيتامين ا ١٠٠ وحدة دولية	فيتامين ب ١ ٣٠
فيتامين ب ٢ ٣٠	فيتامين ث من ٢ الى ٣٨ %



تفاح يلو بلفلور

من ٣ الى ٥ امتار . اوراقه عابقة الخضار مسنة الخافة . ازهاره وردية اللون . ثماره صغيرة قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الصفار المشرب الحمرة . لبها حامض الطعم .

٥٣٣٦ - تفاح كلدن ديلشس * Golden delicious

ضرب امريكي المهد . شجرته معتدلة النشط والحجم ، سريعة الانتاج تنمو وتجود في معظم الاثربة . رغب في المواقع المتوسطة الارتفاع التي تعلو من ٨٠٠ الى ١٢٠٠ م . عن سطح البحر . اوراقها وثمارها تتأثر بالاملاح النحاسية . خصبها طوي . طلعها واقر الجدرات النشيطة . حلها حولي متتابع . ثمارها متوسطة وكبيرة القد . انها طويلة . قشورها رقيقة ، بشرتها ملساء ، لونها اصفر ذهبي . لبها جامد المكسر ، قبي اللون ، ناعم الرقة ، لذيق الطعم ، جيد النكهة ، فواح العرف العطري .

٥٣٣٧ - تفاح كوكس أوردنج بين * Cox's orange pippin

ضرب بريطاني المهد شجرته معتدلة الحجم متوسطة النشط ، دقيقة الاغصان الكثيفة . رغب في الاثربة الطينية المتوسطة الاندماج . اوراقها تتأثر بالسوائل النحاسية || خصبها طوي . حلها حولي متتابع . ثمارها متوسطة القد ، انها قصيرة وغلظة . بشرتها ملساء ، لونها اصفر الاساس احمر الوشاح تعلو خطوط جووية حنطية الموج . لبها جامد المكسر ، زبدى اللون ، خشن الرقة ، غص العصير الحامض العطري العرف .

٥٣٣٨ - تفاح ماهي * Cédricier (F).

راجع أريج .

٥٣٣٩ - تفاح مكنتوش * Mc Intosh

ضرب كندي المنبت شجرته متوسطة القد مستديرة منبسة الاغصان الفرعاء . تجود في جميع الاثربة : رغب في المواقع الريفية التي تعلو نحو ١٥٠٠ م . عن سطح البحر . خصبها غوثي ، حلها متتابع حولي . ثمارها فاخرة الصنف متوسطة وكبيرة الحجم . انها قصيرة وغلظة . بشرتها ملساء سهلة الانسلاخ . لونها الى الاحمر تعلو مشحة بنفسجية ينشأها خل شمعي متراكب الموج . لبها جامد المكسر ناعم الرقة غزير العصارة ، عطري العرف ، لذيق الطعم ، جيد النكهة ، قليل الحموضة .

٥٣٤٠ - تفاح نرلين سبي * Northern spy

ضرب امريكي المهد شجرته كبيرة القد متوسطة النشط فارشة الاغصان متدلية الانداد والافنان . رغب في المواقع الجردية الريفية تجود في الاثربة المعتدلة التركيب المتوسطة الاندماج . خصبها غوثي عسير . حلها حولي متتابع . ثمارها كبيرة القد . انها ربة قوية . قشورها رقيقة . بشرتها ملساء ، لونها الى الاصفر تعلو مشحة حراء متفاوتة الخصب . لبها جامد المكسر ، اصفر اللون ، ناعم الرقة ، شديد الحلاوة ، قليل الحموضة ، عطري العرف .

٥٣٤١ - تفاح هاليانا * Malus Halliana (S).

Pommier de Hall (F).

نوع من التفاح الصيني المنبت . بري وتزييني . جنبته تعلو من مترين الى اربعة . اوراقها زياء الضلع . ازهارها وردية مستطيلة البتلات || ازهارها يشمر من ايار الى حزيران .

٥٣٥٦ - **تَفْتَت** Désagrégation (F).
Crumbling (E).

تفكيك الاجزاء التي من جمعها وتدمجها يتركب جسم .

٥٣٥٧ - **تَفْتَح** Deniscence (Bot.) (F).
Dehiscence (E).

طريقة الانفلاق الطبيعي في بعض الاعضاء النباتية كالمكبر والسنة والكبير .

٥٣٥٨ - **تَفْتِيت** Affouillement (F).
Undermining, Washing away (E).

هو الانحثاث .

٥٣٥٩ - **تَفْتِيت المد** Emottage (F).
Clod-crushing (E).

عملية زراعية القصد منها تكسير التلح لتنعيم التربة . تم باستعمال الحدي الادوات الزراعية الموضوعة لهذه الغاية كالمسلة والطباب .

٥٣٦٠ - **تَفْتِيج** Carbonisation (F).
Carbonization (E).

التحويل الى فحم كتحويل العظام والخطب .

٥٣٦١ - **تَفْتِير** Effritement (F).
Crumbling into dust (E).

الاحتاث وتكسير الحجارة القائمة وقد يكون السبب اما نوع الحجر او عوامل خارجية .

٥٣٦٢ - **تَفْتِين** Nivellement (F). Levelling (E).

التفدين هو قياس الارتفاع اي تعيين الارتفاع النسبي لثلاث اجزاء الارض ومواقعها .

٥٣٦٣ - **تَفْتِير**

التفر : النبات القصير الزمر (اللسان) . والتفرة : كل نبات له ورق ولا تتمكن منه الراعية الصغرى (التاج) . يقال ارض متفرة : فيها كلاء صغير لا تتمكن منه الراعية .

٥٣٦٤ - **تَفَرَات** Feuilles mortes (F).
Dead-leaves (E).

التفرات : ما تساقط من اوراق الشجر (ابن منظور) .

٥٣٦٥ - **تَفْرِجَة ، قَوْت** Espace entre 2 doigts ج . تفرج وافوات .

٥٣٦٦ - **تَفَرُّز** Téphrosie (F). Surinam poison (E).

جنس نباتات قرنية تعرف بالخوراء ، اطلها .

٥٣٦٧ - **تَفْرِع ، تَشَعُّب** Ramification

الانتشاب المتأني عن مصدر واحد .

٥٣٦٨ - **تَفَرُّوق** Cupule

هو قع الثمرة .

٥٣٦٩ - **تَفْرِيت** Tephritis (S). Téphrite (F).

جنس حشرات ذبابية الشكل من فصيلة الخرشيات . طولها من ٤ الى ٦ مم . ألوانها متعددة اجنحتها شفافة محززة ومخططة . تمتع مكها على سوق نباتات الفصيلة الصبوانية اخصها القنطريون والبابونج فيقتنف عن يرقات صغيرة تفرض السوق وتلتهم الحراشف الزهرية . اشهر انواعه .

٥٣٧٠ - **تَفْرِيت البابونج** *

Tephritis matricariae (S). Téphrite de la matricaire, Mouche de la matricaire (F).

نوع من التفريت طولها من ٢ الى ٤ مم . جهتها برتقالية

٥٣٤٥ - **تَفَّاحِي** Mélonide, Pommé (F).
Grown to a round head (E).

نمت وصني لشكل من اشكال التار يشبه التفاح .

٥٣٤٦ - **تَفَّاحِيَات** Pomacées (F). Pomaceae (E).

سبط من الفصيلة الوردية يشمل جميع اجناس وانواع التفاح البري والزراعي .

٥٣٤٧ - **تَفَّاضُل** Différentiation (F).
Differenciación (E).

عملية توامها الوصول الى الدالة المولدة او المشتقة .

٥٣٤٨ - **تَفَّاعِل** Réaction (F). Reaction (E).

التحاويل التي تتعرض لها الاجسام عند امتزاجها .

٥٣٤٩ - **تَفَّاعِل اَيُونِي ، تَفَّاعِل شَارِدِي**

Réaction ionique (F). Ionic reaction (E).

التفاعل الايوني او الشاردي عبارة رقية تدل على نسبة حامضية او حرضية الوسط او البيئة المطلوب معرفة تفاعلها . رمزه الدالف (pH) .

٥٣٥٠ - **تَفَّاف** Sonchus (S). Laiteron (F).

جنس نباتات برية من فصيلة المركبات السنية الزهر . انواعه نحو ٣٠ معظمها عشبي وبعضها شجيري يعلو من مر الى اربعة امتار . سوقها غليظة لبنية العصارة . اوراقها متعاقبة مركبة مفرصة الحافة الشائكة . ازهارها رؤسية يكثر فيها اللون الاصفر ثم الازرق والليلكي . اشهر انواعه التفاف المعروف وتفاف الحقل وتفاف المناقع .

٥٣٥١ - **تَفَّاف الحقل ، تَفَّاف** Sonchus arvensis (S).

Laiteron des champs, Laiteron (F).

عشبة من التفاف نجيلة الساق والفروع القليلة العدد . تكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . تعلو نحو المتر . اوراقها صغيرة قليلة الشوك . ازهارها الى الزرق .

٥٣٥٢ - **تَفَّاف المناقع ، جَعْفُظِيص**

Sonchus palustris (S). Laiteron des marais (F).

جنية مستطيلة الساق ، قليلة الفروع ، تعلو من متر الى اربعة امتار . تكثر في الاراضي الرطبة وقرب مجاري الماء وعلى ضفاف الانهر .

٥٣٥٣ - **تَفَّاف معروف ، بَقْلَة يهودية ، سَبْرِيك**

Sonchus oleraceus, S. ciliatus (S). Laiteron commun, L. potager, Laitue des lièvres, Chardon blanc, C. de porc (F). Sow thistle, Milk thistle, Hare's lettuce (E).

Gemeine saudistel (D). Cicerbita comune, Cres-pina, Lattuga, Sevone (I).

نوع من التفاف يوجد في جميع اترية المناطق المعتدلة . وهو عشبة برية ، جوفاء الساق ، غزيرة العصارة اللبنة . اوراقها يأكلها البشر والحيوان .

٥٣٥٤ - **تَفَّالْس ، اِفْتَالَس تَدْلِيْسِي**

Banqueroute frauduleuse (F). Fraudulent bank-ruptcy (E).


جريمة يقتربها التاجر الذي يخفي دفاتر حساباته او يمدنها او يهرب موجودات متجره او يبتدع ديوناً ليست عليه او يزور في حساب متجره الختامي .

٥٣٥٥ - **تَفَّة** Lynx caracal (F).


هو عناق الارض اي وشق القفر . Caracal, Red lynx (E).



تفاف الحقل



تفاف المناقع




تفاف معروف



تفريت البابونج

ويؤخر نمو الشجرة . مظهره الخارجي يقع مستديرة لاقياسية تعترى صفحة النصل العليا . تبتدئ خضراء اللون ثم ذهبية وتنتهي بالوردي الزاهي .



تفريث الحنّس

٥٣٨٤ - تفريث الخوخ ، قرون الخوخ ، مجعنة الخوخ ، جيوب الخوخ ، قرون الخوخ

Taphrina pruni, *Exoascus pruni* (S). *Maladie des pochettes du prunier* (F). *Plum pockets* (E). *Narrenoder*, *Taschenkrankheit der Pflaumen* (D).

وصم يصيب مدقات أزهار الخوخ عند تأبيرها فيحول دون تكوينها الخليلوي الصحيح ونموها الطبيعي ويوجهها نحو الاستطالة فتتفقد الشرة استدارة شكلها وعصارة لحيتها ونواتها وتصبح كالمقرن الصغير طولها من ٤ إلى ٦ سم. ومكها من ١ إلى ٢ سم. لحيتها جامدة جافة ، داخلها فارغ لا نواة فيها . يكافح وقائياً باستعمال أحد الادوية الفاطورية قبل الازهار وبعد التفطيط وسقوط البتلات (التويجات الزهرية).

٥٣٨٥ - تفريث الدراق واللوز ، مجعنة الدراق واللوز

Taphrina deformans, *Exoascus deformans* (S). *Cloque du pêcher et de l'amandier* (F). *Peach leaf curl* (E). *Kräuselkrankheit der Pfirsiche* (D).

وصم يصيب أوراق وافنان وثمار الدراق واللوز وهو اشد وقعا على الدراق ، يركب الأوراق الفتية فيمجمها ويجمدها ويمتها عن القيام بوظيفتها . يضني على الافنان فيحول دون نموها بعد أن يعطب قشورها . ويعترى الثمار فيؤذيها ويعيبها || يظهر عادة في اوائل الربيع وقد يستمر حتى الصيف || يكافح باستعمال أحد الادوية الفاطورية المركزة على النحاس أو الكبريت .

٥٣٨٦ - تفريث الدردار ، مجعنة الدردار

Taphrina ulmi, *Exoascus Ulmi*, *E. campester* (S). *Cloque des feuilles d'Orme* (F).

وصم يصيب أوراق الدردار فيسبب يباسها . مظهره الخارجي يقع مستديرة خضراء اللون ثم طحلاء فسراء تركب النصل فتجمعه وتميته .

٥٣٨٧ - تفريث السنديان ، مجعنة السنديان

Taphrina coerulescens, *Exoascus coerulescens*, *T. quercus*, *T. quercina* (S). *Cloque foliaire du chêne* (F).

وصم يصيب أوراق السنديان في اوائل الربيع فيعطها ويؤذي الشجرة || مظهره الخارجي يقع مستديرة تبدو زاهية الخضراء ثم تميل نحو الصهبة فالسمة . تركب الاوراق في زامها الاخير وعلى صفحتها بالسواء .

٥٣٨٨ - تفريث الشرم ، عكد الشرم

Taphrina carpini, *Exoascus carpini* (S). *Baie de sorcière du charme* (F).

وصم يصيب جذوع واغصان وافناد الشرم فيخلف عليها تجمعات عديدة من الافنان الدقيقة التي تقضي على اتران الشجرة وسير نموها الطبيعي . مظهره الخارجي ابلات كثيفة الافنان الدقيقة المستطيلة التي يبلغ قطر كل منها المتر تملأ الشجرة من جذعها الى اقنادها . اما الاوراق المصابة فتبدو صغيرة وقصيرة ، مجعنة النصل ، رصاصية اللون يعلوها موج آخر .

٥٣٨٩ - تفريث الكاكاو ، عكد الكاكاو

Taphrina bussei (S). *Cloque du cacaoyer* (F).

وصم يصيب الافناد عند انتشائها على الاغصان فيحها

اللون . ارجلها الى الصهبة الخطبة . تسرح من اذار الى ايلول . يرقاتها تعيش على الحراشف الزهرية .

٥٣٧١ - تفريث الحنّس ، تفريث مستحب

Trypanea amoenâ (S). *Téphrite des laitues*, *T. agréable* (F).

حشرة من التفريث طولها من ٤ الى ٥ مم . جسمها اغس اللون . ارجلها صفراء . مرزها اسود . تسرح من حزيران الى ايلول . يرقاتها تعيش على حراشف الحنّس الزهرية .

٥٣٧٢ - تفريث القنطريون ، تفريث القنطريون

Orellia jaceae (S). *Téphrite de la centaurée* (F).

حشرة من التفريث طولها من ٤ الى ٦ مم . رأسها ورجلها صفراء . تسرح من تموز الى ايلول . يرقاتها تعيش على حراشف القنطريون الزهرية .

٥٣٧٣ - تفريث ، تفريث

Eclaircissage (F). *Clearing up* (E). راجع تخفيف .

٥٣٧٤ - تفريث ، تفريث

Eclosion (F). *Opening* (E). راجع نقف وتفتيق .

٥٣٧٥ - تفريث ، تفريث

Essaimage (F). *Swarming* (E). راجع افراق النحل .

٥٣٧٦ - تفريث ، تفريث هو التفتيق ، اطلبه .

٥٣٧٧ - تفريث ، تفريث

Déchargement (F). *Unloading, Unlading* (E).

٥٣٧٨ - تفريث كهربائي ، تفريث كهربائي

Effluve électrique (F). *Electric effluvium* (E). اندفاع الشحنة الكهربائية .

٥٣٧٩ - تفريث كهربائي ، تفريث كهربائي

Décharge électrique (F). *Electric discharge* (E).

الظاهرة التي تحصل عند تفريث شحنة كهربائية .

٥٣٨٠ - تفريث ، تفريث

Dissociation التفريق كماويك هو تفكيك العناصر المركبة عن بعضها .

٥٣٨١ - تفريث الإجاص ، مجعنة الإجاص

Taphrina bullata, *Exoascus bullatus* (S). *Cloque des feuilles de poirier* (F).

وصم يصيب أوراق الاجاص والسفرجل . مظهره الخارجي يقع فردية او مجموعة ، قطر الواحدة منها نحو سنتيمتر مربع . تبدو خضراء اللون ثم صفراء واخيراً وردية ، يقابلها على صفحة النصل السفلى عرصات التفريث التي تجمع السيج وتشمل نشاطه فيسر ويدبل ، ويقضي على كامل الورقة فتأوى وتسقط || يكافح باستعمال أحد الادوية الفاطورية المركزة على النحاس أو الكبريت .

٥٣٨٢ - تفريث البتولا ، مجعنة البتولا

Taphrina betulæ, *Exoascus betulæ* (S). *Cloque foliaire du bouleau* (F).

وصم يصيب أوراق البتولا فيميتها . مظهره الخارجي يقع مستديرة تملأ صفحة النصل العليا فتجمها ، تبتدي خضراء اللون ثم غبراء وتنتهي باللون الرمادي الاصفر .


٥٣٨٣ - تفريث الحور ، مجعنة الحور

Taphrina aurea, *T. populina*, *Exoascus aureus* E. *populi*, *Ascomyces aureus* (S). *Cloque du peuplier* (F).

وصم يصيب أوراق الحور في اوائل الصيف فيقضي عليها



تفريث القنطريون



تفريث الإجاص



تفريث الحور



تفريث الدراق واللوز



تفريث السنديان

ظويلة وكثيفة كالمكنسة تملو الفصن وتنتج أفقياً ثم عمودياً . اما الاوراق فتبدو مجمدة النصل خلية الصفحة السفلى تكتنفها غبرة طحلاء اللون تستعمل يابسها وسقوطها . يكافح بقطع الاغصان المصابة وباستعمال احد الادوية الفاطورية قبل الاكاخ وبعده .

٥٣٩٦ - تَفْرِئِيَّاتٌ مُجَعَّدَاتٌ ٥ Exoasceae, Taphrinaceae (S). Exoascées, Taphrinacées (F). Exoasceae, Taphrinaceae (E). فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى مرتبة النغضيات ورتبة الزقيات . تتميز بازقاق عريضة تلحفها غلفة العن . انواعها عديدة بعضها يسبب تجمع الورق وبعضها يجمع الثمار وبعضها يعكس الافئاد والافئاد . اشهرها واعرفها :

تفريئة الدراق واللوز	مجمدة
« الاجاص »	«
« الحور »	«
« السديان »	«
« الدردار »	«
« المغث »	«
« المغث الغروي »	«
« البتولا »	«
« الخوخ »	مجمدة
« شبرقة الحور »	«
« شبرقة المغث »	«
« عكك الكرز »	مكدة
« الخوخ »	«
« البتولا »	«
« الشرم »	«
« الكاكار »	«

٥٣٩٧ - تَفْرِئَةُ Hachage (F). Chopping (E). هي الفرغ اي قطع او تجزئة العلف الطويل والكبير الحجم قبل تقديمه الى الماشية .

٥٣٩٨ - تَفْسِخ Putréfaction (F). Putrefaction (E). التفسخ أي الفساد هو انحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٥٣٩٩ - تَفْسِخ Synchronisation (F). Synchronizing (E). التفسخ تحديد التوقيت .

٥٤٠٠ - تَفْطِيع Autofécondation (F). Autofecundation (E). هو التأثير الذاتي .

٥٤٠١ - تَفْقِيس ، تَفْرِيع Eclosion (F). Opening (E). هو نطق البيض وقد يكون ذلك عند انفلاق القربة بعد اكتمال الحلقة .

٥٤٠٢ - تَفْلِق Rallus (S). Râle (F). Rall (E). جنس طير من فصيلة التفلقيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها من ٢٥ الى ٣٠ سم . مناقرها جالس مستطيل ، ذيلها مستدق صغير ، ارجلها وارساغها ومخالبها طويلة . ثوبها موشع ومحرز . معظمها من القواطع وبمفها آبد يألف المناطق والغابات الكثيرة الجداول . قوتها الحشرات وبعض حبوب النجيليات || تدن في الاعشاب الكثيفة وبين القصب والفرار . اناثها قبيض من ٦ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدتها نحو ثلاثة أسابيع .

وينشطها على اخلاف النواهي الابطية العديمة النفع والانتاج . مظهره الخارجي مكانس ضمية الشكل قصيرة القصبان الكثيفة تملو الافئاد هنا وهناك . والافئاد المصابة تهجم عن الازهار . اما اوراقها فتبدو مجمدة رصاصية اللون تملوها شجة خلية وردية المواج .

٥٣٩٠ - تَفْرِئَةُ الكَرَز ٥ ، عِكَد الكَرَز ٥ ، مَكْنَسَةُ السَعَلَاة ٥ Taphrina cerasi, Exoascus cerasi, E. wiesneri, E. Gilgii (S). Balai de sorcière du cerisier (F). Witchesbroom of cherries (E). Kirschenhexenbesen (D). وصم يصيب اغصان وافئاد الكرز فيميت نواهيها الطبيعية ويحشها على اخلاف غيرها قصيرة وكثيفة لا غير فيها ولا نفع . مظهره الخارجي ضمة من الافئاد الكثيفة تشبه المكنسة تملو بعض اغصان الشجرة هنا وهناك . يكافح بقطع الاغصان المصابة وباستعمال احد الادوية الفاطورية قبل الاكاخ وبعده .


٥٣٩١ - تَفْرِئَةُ المَغْث ٥ مُجَعَّدَةُ المَغْث ٥ Taphrina tosquetii, Exoascus tosquetii, T. alni-torqua, E. alni (S). Cloque foliaire de l'aune (F). وصم يصيب اوراق المغث فيقضي عليها . مظهره الخارجي يقع مستديرة او مستطيلة تركب النصل فيبدو اخضر اللون ثم اصفر وينتهي بالاطحل الى ان يتم التمتع فيسر وليس .

٥٣٩٢ - تَفْرِئَةُ المَغْث الغُرَوِي ٥ ، مُجَعَّدَةُ المَغْث الغُرَوِي ٥ Taphrina sadebeckii, Exoascus flavus (S). Cloque foliaire de l'aune glutineux (F). وصم يصيب اوراق المغث الغروي فيقضي عليها . مظهره الخارجي يقع مستديرة فسيحة تركب النصل وقد تغشي كامل الصفحة . تبدو ارجوانية اللون وتبقى عليه حتى اكتمال التمتع الذي يزيد بحجم الورقة . ثم تنحرف نحو الليكي وتنتهي بالاصهب الاسمر .

٥٣٩٣ - تَفْرِئَةُ شَبْرَقَةِ المَغْث ٥ ، مُجَعَّدَةُ المَغْث ٥ Taphrina alni-incanae, Exoascus alni-incanae, E. amentorum (S). Cloque des chatons de l'aune (F). وصم يصيب في المغث الشبارق الاثني فيعطب كرزها ويحول دون نمو الطبيعي وتكوينه الصحيح . مظهره الخارجي استطالة حراشف الشبارق وكبر حجم الازهار ثم تضخمها واستحالتها الى جرب صفار وردية اللون طول الجراب منها من ٢ الى ٣ سم .

٥٣٩٤ - تَفْرِئَةُ عِكَد البَتُولَا ٥ ، عِكَد البَتُولَا ٥ Taphrina turgida, Exoascus turgida (S). Balai de sorcière du bouleau (F). وصم يصيب اغصان وافئاد البتولا فيقضي على نواهيها الطبيعية ويحشها على اخلاف غيرها من النواهي الابطية العديمة النفع || مظهره الخارجي ابالة من الافئاد الدقيقة القصيرة الكثيفة قطرها نحو المتر تملو الاغصان وتعيها .


٥٣٩٥ - تَفْرِئَةُ عِكَد الخُوخ ٥ ، عِكَد الخُوخ ٥ Taphrina insitiae, Exoascus insitiae (S). Balai de sorcière du prunier (F). Witchesbroom of plums (E). Pflaumen-hexenbesen (D). وصم يصيب اغصان وافئاد الخوخ فيحشها على اخلاف الافئاد الدقيقة المستطيلة العديمة النفع والمضرة بهيكل الشجرة وبانتاجها || مظهره الخارجي اثنان دقيقة نحلة



تفريئة الكاكار




تفريئة الكرز



تفريئة المغث الغروي



تفريئة شبرقة المغث



تفريئة عكك الخوخ



تفلق

كوجه ذا وجه هذا في تدوره
كأنه منه في الاجفان معدود
له من الليث ناباء ومخلبه
ومن غرير الظباء الشمر والجديد
إذا رأى الصيد اخفى شخصه أدباً
وقلبه باقتناص الطير مزود



تفلوس دوري

٥٤١٠ - تَفْلُوِيض Option
حق يحول صاحبه الخيار بين حالات قضائية شتى .

٥٤١١ - تَفْلِيات Poacées (F). Poaceae (E).
سبط من النجيليات .

٥٤١٢ - تَفْلِيْفِيحِي Cannabina (S).
Linot, Linotte (F). Linnet (E).
جنس عصافير شبيهة بالدوري من فصيلة الشرشوريات .
انواعه المعروفة ١٥ ألوانها متعددة ضاربة الى الحمرة
والصفرة . تألف التهام والحداثق وحواشي الاراضي المزروعة .
قوتها البزور البرية والزراعية وتفضل بزور الكتان على
كل شيء . تدن في الادغال والاشجار المثبوتة . انثاها
تحضن من ٤ الى ٦ بيضات اهليلجية الشكل سماجوية
اللون مرقوشة بالاحمر والاسمر .



تفه

٥٤١٣ - تَفْلِيْفِيحِي مَبْدُول *
Cannabina linota, Carduelis cannabina (S).
Linotte vulgaire, Linotte mélodieuse (F).
Common Linnet, Common Redpoll (E).

عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات . موطنه بعض
مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . اعطاه الالبانية
تمتد من السواحل الى الجرد والبقاع || جسمه صغير
القد ، قريب الشبه بالدوري ، طوله نحو ١٤ سم .
وبسطه نحو ١٧ سم . منقاده مخروطي الشكل . اسمر
اللون . عيناه كستينيان . جناحه ذلق مستطيل . ذنبه
مقرق فارق . رشفاه الى السمرة || ثوبه يختلف باختلاف
الشق والعمر وفصول السنة . الذكر البالغ يكون في فصل
الربيع احمر الجبهة ومقدم الرأس ، اربد القنق والحسر
والعق ، كستني الرداء وخلف الجناح . قوادمه ومناكبه
واباهره سمر النصال ، بيض الحواشي . زوره ومقدم صدره
وانتيكه الى الشبهة الغبراء المرقوشة بالاسود . صدره الى
الحمرة الاربعونية . بطنه الى البياض العاجي . وهو في فصل
الخريف يستبدل بالاحمر والاربعواني بالاصهب والاشهب ||
الثوب الربيعي ، عند الانثى ، لا حرة فيه وهو الى الصبهة
الموشمة والمنشدة بالاسمر تملوها ماجة بنية تلمحف المنق
والرداء والظهر والعجز حتى الزمكاه . اما الثوب الخريفي
فلا فرق بينه وبين ثوب الذكر || تألف المضاب والتهام
وحواشي الاراضي المزروعة . يعيش في القفص ويتشيز
باقتداء شجر غيره ويتصالب مع الكنار والنفر . قوته
البزور البرية والزراعية اغصتها الكتان والحس والنفل
وبعض الهوام والخشرات || يدن حته في الادغال والاشجار
المثبوتة الداسية . الانثى تحضن من ٤ الى ٦ بيضات نحو
١٣ يوماً والذكر يؤمن لها الغذاء والحماية || يعتبر من
العصافير المتوسطة الطمع .



تففيحي



تففيحي مبدول

٥٤١٤ - تَقَادُم Prescription
احد طرق اكتساب الملكية او اسقاط بعض الحقوق بانقضاء
مدة من الزمن يحددها القانون .

٥٤١٣ - تَفْلِيقيات Rallidae (S).
Rallidés (F). Rallidae (E).
فصيلة طيور مائية من رتبة طوال الساق تشمل عدة اجناس
وانواع اشهرها التفلق والغر ودجاج الماء . جميعها من
الطيور القواطع النافعة التي تلهم الحشرات واخصها
القمصيات .

٥٤١٤ - تَفْلُوِس دُوْدِي * Typhlops
vermicularis (S). Typhlops vermiculaire (F).
حية بيوض ، جاسة ، لامؤذية ، من فصيلة التفلوسيات .
موطنها المناطق الحارة من الشرق الادنى والاطلس || جسمها
دودي الشكل بطول من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبها بني اللون
يملوه موج اسمر . سفها اسود الخثار الداخلى عند الذكر ||
تألف المواقع المعتدلة والرطوبة والاقربة المعتدلة الاندماج
حيث تنمن على اعماق تراوح من ٢٥ الى ٥٠ سم . ||
قوتها الحشرات والديدان .

٥٤١٥ - تَفْلُوِس مُنْقَطَّه Typhlops
punctatus (S). Typhlops punctué (F).
حية بيوض ، جاسة ، لامؤذية ، من فصيلة التفلوسيات .
موطنها معظم مناطق افريقية الاستوائية || جسمها اسطواني
الشكل بطول من ٧٠ الى ٨٠ سم . ثوبها متراكب الاسود
والاصفر ، يملوه تنقيط اغبر || تألف المواقع الرطبة
والاقربة القليلة الاندماج . قوتها الحشرات والديدان وبعض
العطاء اخصها الوزغ .

٥٤١٦ - تَفْلُوِسِيَات Typhlopidae (S).
Typhlopides (F). Typhlopidae (E).
فصيلة حيات بيوضة ، جاسة ، عديمة الاذى . انواعها
المعروفة ١٢٠ اعطائها البلاد الاستوائية والحارة من العالمين
القديم والجديد . قوتها الحشرات والديدان || اجسامها
اسطوانية الشكل تعطول من ٢٠ الى ٨٠ سم . قشورها مقوس
السيف المتماثل في جميع انحاء الجسم . رؤوسها تكاد لا
تتميز . عيونها صغيرة ، مستديرة ، ماسحة ، يظفها
بكاملها او يجزء منها فشاء سهفي-المادة . فكوكها السفلى
عادية الاسنان . اما اسنان فكوكها العليا فصغيرة الجرم ،
قليلة العدد .

٥٤١٧ - تَفْلِيج ، تَوَزِيج Répartition (F).
Distribution (E).
تقسيم الارض الزراعية الى مشاير تسهلاً لتوزيع زراعتها .

٥٤١٨ - تَفْلِيْد Phyllodie, Frondescence (F).
Phyllody (E).
شلوذ جسموري يطرأ على بعض اجزاء النبات اخصها
اعناق الاوراق فيحورها الى فلد ورقية كما في السط
والحماض والقنطرية وعلق الماء .

٥٤١٩ - تَفْه Lynx pardinus (S). Lynx pardé (F).
Southern lynx (E). Pardelluchs (D).
هو الوثق الفهدي . شكله وجهه بين الفهد والسنور .
يقال انه يألف وان صيده في غاية الجودة . وقد وصفه
الناس في ابيات منها :

حلوا الثبائل في اجفائه وطف

صاني الادم هضم الكشح لسود

فيه من البدر اشياء توافقه

منها له منع في وجهه سود

٥٤٣٠ - تَقْسِيم (F). Dividing (E).
هو تقطيع الأرض الزراعية الى عدة قطع تنظيمياً للعمل الحالي وتسهيلاً للأعمال المقبلة .

٥٤٣١ - تَقْسِيم الحُصَص (F).
Allotment (E).

هو تبيعض الملك حتى تميز حصص المتقاسمين عن بعضها البعض .

٥٤٣٢ - تَقَشِير (F).
Décortage, Décortication (F).
Decortication (E).

التقشير أو الكشط هو إزالة الغلف والسفقات عن البزور .

٥٤٣٣ - تَقْصِيب (F).
Taille des arbres d'ornement (F).
Pruning (E).

هو تشحيل الأشجار الزينية .

٥٤٣٤ - تَقْطِير (F).
Distillation
هو الفصل بواسطة الحرارة الاصول الطيارة عن الاصول الثابتة . وأكثر استعمال التقطير في صناعة الكحول والمطهر .

٥٤٣٥ - تَقْطِيع الجنين (F).
Embryotomie (F).
Embryotomy (E).

عملية يقوم بها الطبيب البيطري عند تعسر الولادة .

٥٤٣٦ - تَقْطِيع (F).
Débourrement (F).
Bursting (E).

راجع إكلاح .

٥٤٣٧ - تَقْع (F).
Chelmon
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد ، مستديرة الشكل ، مبططة الجسم . اخطامها بارزة كالمناقيد . زعانفها الظهرية والشرجية مثلثة الشكل كبيرة القد . اثنائها متراكبة الالوان الزاهية يملوها تخطيط مستعرض ازرق او اسود . اعطائها بحار البلاد الحارة تكثر في بحار الهند وفي البحر الاحمر . تعيش قرب الشواطئ الحشفة .

٥٤٣٨ - تَقَلِّبات جَوِيَّة (F).
Variations atmosphériques (F).
Atmospheric variations (E).

هي الاحداث الجوية العادية منتظرة كانت او غير منتظرة .

٥٤٣٩ - تَقْلَص، تَقْلِص (F).
Constriction, Contraction

هو الضغط الدائري الذي يزيد انكماش الشيء فيقصر قطره .

٥٤٤٠ - تَقْلَص إستِدَارِي (F).
Péristaltique (F).
Peristaltic (E).

هي الحركة الدورية الخاصة بالاعضاء القسوية وبالامعاء عند انقباضها اثناء البلع والهضم .

٥٤٤١ - تَقْلِيف (F).
Dessèchement des fruits (F).
Drying of fruits (E).

تجفيف الثمار او تجفيفها لحفظها .

٥٤٤٢ - تَقْلِيم (F).
Taille des arbres fruitiers (F).
Pruning of fruit-trees (E).

هو تشحيل الاشجار المثمرة .

٥٤٤٣ - تَقْن (F).
Limon (F).
Mud, Slime (E).

التقن : رسابة الماء في الارض وفي الجداول .

٥٤١٥ - تَقَادُم مُكْسِب (F).
Prescription acquisitive, Usucapion (F).
Acquisitive prescription (E).

هو التقادم الذي يكسب المرء حقوقاً عينية اصلية على منقولات او ثوابت بحياتها مدة من الزمن عينها القانون اقصاها خمس عشرة سنة .

٥٤١٦ - تَقَارُب مغْنَطِيسِي (F).
Induction magnétique (F).
Magnetic induction (E).

٥٤١٧ - تَقَطَّاع (F).
Intermittence (F).
Intermission (E).

صفة ما هو متقاطع الحركة كالنبض .

٥٤١٨ - تَقَالَة (F).
Caranx fusus
نوع من الشيم وهي سمكة صغيرة مأكولة توجد في المتوسط .

٥٤١٩ - تَقَانَة ، طَمِي ، طَرِين (F).
Limon (F).
Silt, Ooze, Mud, Alluvium (E).

جميع ما تحمل المياه العكرة من رواسب تتركها في الارض .

٥٤٢٠ - تَقَاوِي (F).
Semence (F).
Seed (E).

راجع بذار .

٥٤٢١ - تَقَبُّض (F).
Crispation (F).
Crispation (E).

التقبض انقباض الاعصاب .

٥٤٢٢ - تَقَّة * ، تَقُول (F).
Tacca
جنس نباتات عشبية عسقلية زراعية من فصيلة التفقيات .

انواعه قليلة تكثر زراعتها في الهند الصينية والكوشنشين وجزر أقيانيه ومدغسكر حيث يدعونها تافول (Tavoul) . عساقلها لحمية مأكولة اللباب ويستخرج منها مادة نشوية مستحبة الطعم لذيدة .

٥٤٢٣ - تَقْدَة ، تَقْدَة (F).
Coriandre (F).
Coriander (E).

هي الكزبرة او الكسبرة ، اطلبها .

٥٤٢٤ - تَقْدِير (F).
Evaluation (F).
Valuation or estimate (E).

راجع تخمين .

٥٤٢٥ - تَقْدِير الثَمَن (F).
Estimation en argent
راجع تخمين .

٥٤٢٦ - تَقْدِير الدخَل (F).
Allivrement
هو تقدير الدخل الصافي الذي تقرره مصلحة المساحة للاملاك العقارية لتحسب الضريبة على قاعدته .

٥٤٢٧ - تَقْرِير الغَيْبَة (F).
Déclaration d'absence
حكم يقرر حالة الغيبة ويسمح بقيام حقوق واتخاذ اجراءات عينها القانون حماية لمصالح شئ معلقة بسبب غيبة الغائب الذي يعتبر مفقوداً .

٥٤٢٨ - تَقْرِير المِلْكِيَّة (F).
Etablissement de propriété
بيان يدرج في متن العقد يبسط فيه كل من باع عيناً ثابتة او أنشأ حقاً عينياً على هذه العين طريقة ملكيته وملكية اسلافه لها .

٥٤٢٩ - تَقْرِيس ، تَبْرِيد (F).
Réfrigération (F).
Refrigeration (E).


عملية قوامها تخفيض درجة الحرارة الى المستوى الحراري الذي يناسب الشيء المطلوب تقيسه .



تَقَالَة



تَقَّة



تَقْع

٥٤٦٠ - تَكَّة٥ Thèqua (F). Theca (E).

خلية نباتية تتحول الى كهرس صغير ينشأ فيه بوغ الفطور.
ج. ثككات وتكك .

٥٤٦١ - تَكْثِيف Densimétrie (F). Densimetry (E).

قياس الكثافة أي الثقل النوعي .

٥٤٦٢ - تَكْحِيل Vinage (F).

Putting alcohol into wine (E).
اضافة ما يجب من الكحول الى الخمر او غيرها من
العصارات النباتية لتجود .

٥٤٦٣ - تَكْدِيس Bottelage (F).

Tying up in bundles (E).
جمع الثن اي الكلا اليابس الى اكداس .

٥٤٦٤ - تَكْدِيم Blocage (F). Blocking (E).

رصف الحجارة ورصها .

٥٤٦٥ - تَكْرُورِي* Pristipoma bennetti (S).

Pristipome ronfleur (F).
سمكة من الشجرم تنتمي الى فصيلة الفرغيات . يكثر
وجودها في البحر المتوسط والبحر الاحمر . طولها نحو
٦٠ سم . تتميز بكثافة حراشفها وبقوة زعانفها الشائكة .

٥٤٦٦ - تَكْرِيْب Culture en terre vierge (F).

التكريب هي الزراعة في الكريب الذي لم يزرع قط .

٥٤٦٧ - تَكْرِير Rectification

عملية يقصد بها تنقية الكحول وذلك بفصل جميع المواد
الغريبة عنها . قوامها الرئيسي اعادة التقطير .

٥٤٦٨ - تَكْزِيد Echenillage (F).

Ridding of caterpillars (E).
عملية غايتها القضاء على مختلف الديدان التي تعيش في
اطراف اقلان الاشجار . وقد تم بقطع الاقلان المائلة ثم
جمعها وحرقها .

٥٤٦٩ - تَكْسُو Tacso

هي آلامية تكسو ، جنبه عازشة مشرة .

٥٤٧٠ - تَكْسُودِيَوْمُ ، طَقْسُوسِي

Taxodium (S). Taxodier (F). Sabino tree (E).
جنس اشجار حرجية وزينية من السرويات وفصيلة
الصنوبريات . انواعه قليلة اعرفها واشهرها التاكسوديوم
الاقرع .

٥٤٧١ - تَكْسُودِيَوْمُ أَقْرَع*

Taxodium distichum (S). Taxodier chauve, Cyprès
chauve (F). Common bald cypress, Sabino tree,
America bald (E). Echte sumpleibe (D). Cipresso
calvo, C. gaggia, C. della Virginia (I).

نوع من التاكسوديوم شجرته كبيرة القد مردنية الشكل تعلو
من ٤٠ الى ٥٠ م . ساقها منتصبه . اغصانها متتابعة لينة .
اوراقها حشوية مهدبة لونها الى الخضرة الزاوية . ثمارها
اكواز بيضية الشكل صغيرة القد طولها نحو ٣ سم .
وهو من الاشجار الحرجية والزينية التي ترغب في الاراضي
الرطبة العميقة الغور .

٥٤٤٤ - تَقْن

تقن ارضه : سقاها الماء الخار لتجود .

٥٤٤٥ - تَقْسِين Restriction (F).

Restriction, Limitation (E).
الاتصار على الحاجة فقط .

٥٤٤٦ - تَقْوُسُ الْخَوْشَب Bouleture (F).

Upright on fetlock-joint (E).
عيب في قوائم الفرس ، راجع بروز الخشب .

٥٤٤٧ - تَقْوِيس Arcure (F). Arching (E).

التقويس او التحجين هو حي التقويس على شكل القوس .

٥٤٤٨ - تَقْوِيز Histolyse (F). Histolyse (E).

التقويس اضمحلال النسيج الحية عند الحيوان او الحشرة .

٥٤٤٩ - تَقْوِيم Prisée (F). Appraisalment (E).

هو تعيين جردة التركة من مقولات وامثلة الذي يقوم
به احد كتاب المحكمة .

٥٤٥٠ - تَقْوِيم ، رُزْنَامَة Calendrier (F).

Calendar (E).
جدول فصول السنة وشهورها وايامها وتواريخ اعيادها .

٥٤٥١ - تَقْوِيم زِرَاعِي ، رُزْنَامَة زِرَاعِيَة

Calendrier agricole (F). Agricultural calendar (E).
جدول مواعيد الاعمال الزراعية المختلفة انحصها المواسم .

٥٤٥٢ - تَقْصِيَّات Taccacées (F). Taccaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة قريبة الشبه من الترجسيات
تشمل التفه والشيذركبسا .

٥٤٥٣ - تَقْصِيَح Purulence

حالة الجرح الفاسد المادة الذي يعلوه القيح .

٥٤٥٤ - تَقْصِيد Enregistrement (F).

Enregistering (E).
هو التدوين او التسجيل .

٥٤٥٥ - تَكَّ طائر يقال له ابو تمر (التاج) .

٥٤٥٦ - تَكَاثُر ، تَكْثِير Multiplication

ازدياد العدد .

٥٤٥٧ - تَكَاثُف Valence


تكاثف المنصر ، كياوياً ، هو عدد ذرات الهيدروجين
التي تتحد بذرة واحدة من هذا المنصر .

٥٤٥٨ - تَكَاثُف Parité (F). Parity (E).

هو ان تكون قيمة النقد المعدني بالنسبة الى نقد آخر
متكافئة مع وزن المعدن الذي تحواه || اما في القيم
المنقولة فيقال ان سعرها متكافئ اذا كان سعر اصدارها
او بيعها او تسديدها متكافئاً مع قيمتها الاسمية .

٥٤٥٩ - تَكَامُل Rédintégration (F).

Redintegration (E).
طاقة كامنة في بعض الحيوانات الدنيا انحصها الخواطين
تمكنها عند قطع واحد منها الى شطرين من تجديد الاعضاء
المتبورة في كل قسم فيعود كل واحد من القسمين فرداً
كاملاً .



تكروري



تاكسوديوم اقرع

nensis, Tecoma grandiflora, Bignonia grandiflora (S). Tecoma de Chine, T. à grandes fleurs, Bignone de Chine, Campsidie de Chine (F).

نوع من التكومة التزيينية وهي جنية متسلقة تمتد نحو ٤ أمتار أوراقها مركبة تساعية الوريقات الجميلة الخضراء. نصلها مسنن الحافة مبعثر الزغب. أزهارها كبيرة القذ، عنقودية التجميع، برتقالية اللون.

٥٤٨٤ - **تكومة فيرجينية** Tecoma radicans, Bignonia radicans, Campsis radicans (S). Tecoma de Virginie, Bignone de Virginie, Jasmin trompette, Jasmin de Virginie, Campsidie (F).

جنية متسلقة تمتد نحو ١٠ أمتار. ضروبها عديدة. أوراقها تساعية الوريقات المنشارية التحزير. فروعها مستطيلة مستدقة حمر اللحاء. أزهارها عنقودية التجميع يختلف لونها باختلاف الضرب. يكثر فيها الأحمر ومشتقاته.

٥٤٨٥ - **تكومة منتصبة** Tecoma stans (S). Tecoma dressée (F).

نوع من التكومة وهي شجرة منتصبة، ساقها تعلو نحو ٤ أمتار. أوراقها تساعية الوريقات نصلها مسنن الحافة، أزغب الصفحة السفلى. أزهارها تاجي الارتكاز أزهارها إلى الصفار الزاهي الجميل.

٥٤٨٦ - **تكومة ياسمينية*** Tecoma jasminoïdes, Bignonia jasminoïdes, Pandorea jasminoïdes (S). Tecoma jasminoïde (F).

نوع من التكومة وهي جنية تزيينية متسلقة تمتد نحو ٦ أمتار أوراقها خماسية أو سباعية الوريقات. نصلها ملس البشرة، جميل الخضار الزاهي. أزهارها إلى البياض يملوها من الداخل توشيح أحمر متوازي الخطوط.

٥٤٨٧ - **تكوين** Mise en boule (F).

٥٤٨٨ - **تكوين** Genèse (F). Genesis (E).

شغل الكون والتكوين بال فلاسفة وعلماء الفلك منذ أقدم العصور وهو لا يزال مدار بحث أصحاب الاختصاص. أما الرأي السائد عن نشأة الكون ومداء فهو أن الكون المحدود نشأ منذ الوف ملايين السنين من كتلة غازية تراكت بتأثير العوامل الطبيعية المختلفة واستحالت إلى مجموعات شمسية مستقلة. أما مدى الكون، وهو درس خيالي لأنه يرتكز على تقدير السدم، فيراوح من ١٠٠٠٠ مليون إلى ٥٠٠ ألف مليون سنة ضوئية. أما التكوين بالمعنى المجازي الاصطلاحي فهو مجموعة الحوادث أو العناصر التي ساهمت في إيجاد الشيء.

٥٤٨٩ - **تكبيومتر*** Tachéomètre (F). Tacheometer (E).

آلة تستعمل في أرائة الأرض ومساحتها لأخذ القياسات بالسرعة الكلية.

٥٤٩٠ - **تكبيس، تغليف، غم، كمل، كمن** Ensachage (F). Sacking (E).

وضع الشيء ضمن الكيس أو الغلاف.

٥٤٩١ - **تكيف** Adaptation

هو تنوُّح النبات واستدراجه إلى مقتضيات الحاجة والاقليم.

٥٤٧٧ - **تكسيح القضبان** Plage des barres (F). Bending of bars (E).

عملية لي قضبان الحديد.

٥٤٧٣ - **توكسين** Toxine (F). Toxin (E).

التوكسين والتوكسين أي القشيب: مادة سامة مختلفة التركيب تفرزها بعض الميكروبات أو البكتيريات.

٥٤٧٤ - **تكش** التمش هو البازي المسن.

٥٤٧٥ - **تكقيب** Cubage, Cubature (F).

تحويل قياسات حجم الشيء إلى وحدات مكعبة.

٥٤٧٦ - **تكقيب الخشب** Cubage des bois (F).

Cubage of wood (E).

قياس حجم الخشب وقد يتم ذلك بضرب الطول بالعرض والارتفاع أو السماكة.

٥٤٧٧ - **تكفور** * Thecaphora

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزاهريات تتميز ببثورها البوغية التي تتركب مختلف أعضاء النبات من الجذور والمساق إلى الأوراق والأزهار || أنواعه عديدة تتطفل على القرنيات والمحموديات والمركبات وعلى بعض القطيفيات والسعديات والشببات والنسوانيات والفويات || مظهره الخارجي بثور بوغية لا قياسية الشكل والحجم. طيلاسها حشودة جامدة متجانسة تنفلق عند بلوغها عن غبيرات هبابية لونها إلى السمرة الداكنة.

٥٤٧٨ - **تكليس، تكلس** Calcination

التحويل إلى كلس بواسطة النار.

٥٤٧٩ - **تكنولوجيا زراعية** Technologie agricole (F).

Agricultural technology (E).

هي علم الصناعات الزراعية.

٥٤٨٠ - **تكومة** Tecoma (S).

Tecoma, Técome (F). Red trumpet flower (E).

Tecoma, Trompetenblume (D). Tecoma (I).

جنس شجيرات وجنابات برية وتزيينية من فصيلة البغونيات منبها البلاد المعتدلة. أوراقها متقابلة مركبة ريشية. أزهارها كبيرة بوقية الشكل مختلفة الألوان. خشابها صلبة عطرية الرائحة. أنواعها عديدة أشهرها ما يلي.


٥٤٨١ - **تكومة أسترالية** Tecoma australis, Pandorea australis (S). Tecoma d'Australie (F).

نوع من التكومة وهي جنية صفيرة عارشة تمتد نحو ٢٠٠ سم. أوراقها مركبة خماسية أو سباعية الوريقات، نصلها مسنن الحافة مبعثر الزغب. أزهارها تبنية اللون يملوها من الداخل، توشيح أرجواني.

٥٤٨٢ - **تكومة القطب** Tecoma capensis, Tecomaria capensis, Bignonia capensis (S). Tecoma du Cap (F).

نوع من التكومة التزيينية وهي جنية عارشة تمتد نحو ٥ أمتار أوراقها مركبة تساعية الوريقات. نصلها مسنن الحافة أزغب الصفحة السفلى. أزهارها إلى الحمرة النارية.


٥٤٨٣ - **تكومة صينية** Tecoma chinensis, Bignonia chinensis, Campsis chi-



تكفور



تكومة ياسمينية



تكبيومتر

Intensification (F). **٥٥١٠ - تَلْخِيب**
Intensification (E).
التلخيب استعمال اضمن الوسائل لاكثر الانتاج .

Voiles de bateau (F). **٥٥١١ - تَلْعَات**
Sails (E).
التلعات هي قُلُوع السفن . م تلعة (التاج) .

Glèbe, Motte de boue (F). **٥٥١٢ - تَلْعَة**
Glebe, Clod (E).
هي المدرة أي الكتلة من التراب .

Conopode à tige nue (F). **٥٥١٣ - تَلْعُوطَة**
Earth-nut (E).
نبات يدعى آكثر اجرد ، اطلبه .

Thelygonum (S). **٥٥١٤ - تَلْعُون**
Thélygone (F). Dog's cabbage (E). Hundskohl.
Sprunkraut (D). Teligono (I).
جنس نباتات عشبية حولية برية من سبط التلغونيات .
انواعه عديدة جميعها اشباب فراء السوق . فروعها غيد
ايئة لذيدة الطعم . اوراقها بيضية معتقة مالة النصل .
ازهارها خضراء اللون . منبتها يختلف كور حوض البحر
المتوسط .

Cynocrambe prostrata (S). **٥٥١٥ - تَلْعُون واهين**
Cynocrambe prostré, Thelygoné prostré (F).
نوع من التلغون ، نبات عشبي بري حولي منبتة معظم
مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || مائه فراء .
اوراقه متقابلة ، معتقة ، بيضية النصال المالة . ازهاره
صغيرة القد لونها الى الخضار الاصفر الموج .

Thélygonées (F). **٥٥١٦ - تَلْعُونِيَّات**
سبط نباتات عشبية حولية برية من فصيلة اللكيتيات .

Laceron (F). **٥٥١٧ - تَلْفَاف**
هو تلفاف الحقل ، اطلبه .

Telephorus (S). **٥٥١٨ - تَلْفُور**
Téléphore (F). Telephorus (E).
جنس حشرات مبدولة من غديات الاجتحة اللينة وفصيلة
التلفوريات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع
العالم || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٨ م .
رؤوسها شبه مستديرة . عيونها جاحظة . قرونها الاستشعارية
مستطيلة . اغمارها لينة ، لاحفة . اثوابها تختلف مع
اختلاف الانواع ، يكثر فيها البني الاشجع الموج .

Telephoridae (S). **٥٥١٩ - تَلْفُورِيَّات**
Téléphoridés (F). Telephoridae (E).
فصيلة حشرات من غديات الاجتحة اللينة . اجناسها
وانواعها عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم || جميع انواعها
لينة الاغمار ، بخيلة الالوان الزاهية . بعضها بصاص يشع
في الظلمة || اشهر اجناسها التلفور والذلاق .

Relargage (F). Soapy (E). **٥٥١٠ - تَلْفِيد**
عمل قوامه سكب الماء المزوج بالقطرون ، ماء القل ،
فوق الزيت وتحريكه ليتصب || والتلفيد يعني كياروا
التصبين بالمعنى الشامل .

Telfairia (S). **٥٥١١ - تَلْفِيرِيَّة**
Telfairie, Kouème (F).
جنبة معمرة عارشة برية وزراعية من فصيلة القرعيات .

Coteau (F). **٥٤٩٢ - تَلَّ ، تَلَّة**
Slope, Little hill (E).
قطعة من التراب ارفع قليلاً عما حوفا .

Cohésion (F). **٥٤٩٣ - تَلَاحُج ، تَمَاسُك**
Cohesion (E).
المقدور التلاصقي الطوعي الذي يجمع جزئيات الاجسام
الى بعضها .

Thladiantha (S). Thladianthe (F). **٥٤٩٤ - تَلَادِيَانْتَه**
جنس نباتات مدادة معمرة من فصيلة القرعيات . انواعها
قليلة تزرع للزيين . جذورها عسقلية غير مأكولة .
اوراقها معتقة متعاقبة . قلبية الشكل ، زباء النصل .
ازهارها ذهبية اللون ثنائية المسكن ، الانثوية فردية
التجميع اما الاكبرية نعنقودية . ثمارها بيضية الشكل
طوطا براوح من ٦ الى ٨ سم . لونها الى الحمرة القائمة .


Anastomose (F). Anastomosis (E). **٥٤٩٥ - تَلَاصُص**
هو في النبات اقتراب عروق الاوراق من بعضها البعض
الى حد الجمع .

Intersection **٥٤٩٦ - تَلَاقِي**
نقطة او نقط التقاء خطين او سطحين او جرمين .

٥٤٩٧ - تَلْبُوفِيلَة عَجُولَة
Thalpophila matura, Celaena matura (S).
Thalpophile empressé, Celaene empressée (F).
Thalpophila matura (E).
حشرة من فصيلة النفسيات ورتبة حشرقيات الاجتحة .
موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط .
فراشها جارسة نوتها رحيق الازهار . سرفها خاضلة تعيش
على النجيليات || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٧ م .
جسطنها تراوح من ٣٨ الى ٤٠ م . رأسها صغير الجرم .
عينها كبيرتان . زباناها شحيطان . مرشفاها معتدل الطول .
جوشنها كثيف الحمل حنطلي اللون . بطنها شبه مردني
الشكل ، اسمر اللون ، اصفر الموج || رراشها عند
الشقين الى الحنطلي يعلوه في الزوج الامامي تيقيق وزركشة
وتبضج تراوح من الجفوي الى الكسفي . ويعلوه في الزوج
الخلفي بقجة طرفية كسنية . اهدابها الى الحنطلي || لها
جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى
ايلول . تسرح في الليل . تعاغل بعد ظهورها بنحو ستة
اسبوع . تمتح المكن لطخاً على الصفحات السفلى من
نصال الاوراق || السرة عند بلوغها الادراك التام تطول
نحو ٣٥ م . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى
السرة يعلوها ، واج اخضر وثلاثة خطوط قاطبة جزوية .
وخطوط معتزلة تبنية تملو جميع السكم من الجهتين اليمنى
واليسرى . رأسها الى الجفوة . مدها ورواجها الى السرة
القائمة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينتفضي
في التربة حيث تنفخ السرة على عمق ٤ او ٥ سم .

Glace (F). Ice (E). **٥٤٩٨ - تَلَج**
راجع جمد .


Aiglon (F). Eaglet (E). **٥٤٩٩ - تَلَج ، تُلْد**
التلج هو فرخ العقاب والتلد ايضاً .



تلبوفيله عجولة



تلغون



تلفور



تلفيرية

الجرم مكور الشكل ، مستطيل الخطم الراشف . زباناها صولجانيان . عينها صغيرتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، متتابع التحزيم الغمدي القاطب . ارساغها خماسية العقل || لها جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجبلانة في ايار وتميش حتى حزيران . تسرح في النهار . تسافد بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع . تمتح المكن بين الحاء الاشجار وقشورها || البرقة عند بلوغها الادراك التام ، تطول نحو ١٥ مم . جسمها مردئي الشكل ، سداسي الرواجب ضليح التأشير ، اسمر اللون ، اسود الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي تحت اللحاء او القشور .

٥٥١٩ - تلويث Pollution (F). Pollution (E).

استعمال ما من شأنه افساد الهواء او تدنيس المياه .

٥٥٢٠ - تليسة Testicule (F). Testicle (E).

هما تليستان في ذكور الحشرات . والتليسة هي الخصية .

٥٥٢١ - تم ، تيم ، ققنس Cygnus (S).

Cygne (F). Swan (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البطيات . تعمر نحو مئة عام . انواعه خمسة . مهدها العالم . جميعها من القواطع مستطيلة العنق ، كبيرة المنقار المفلطح ، فضفاضة الجناح ، قصيرة الذيل المستدير || تألف المياه القليلة الغور وتميش على سطحها اسرابا كبيرة يراوح عددها من ٢٠ الى ٥٠٠ زوج . حياتها الجماعية ذكرا وانثى لا يفترقان . قوتها النباتات المائية والبرية والجذور والاوراق والحبوب والحشرات واليرقات والديدان والورغ والضفادع والسلك . الانثى تبيض من ٦ الى ٨ بيضات تحضنها وسعدها من ٥ الى ٦ اسابيع تحت حراسة الذكر في افحوص كبير القد تدثنه في الارض او في عش تقيمه على سطح الماء بين العشب والاسل .

٥٥٢٢ - تم اخرس * Cygnus clor, C. mansuetus (S).

Cygne muet, C. commun (F). Domestic swan, Mute or tame swan (E).

نوع من التم طوله نحو ١٤٥ سم . وبسطة سقطيه من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم . ثوبه ناصع البياض . متقار اخمر اللون اسود الحافة . رجلاه الى الجؤوة . موطنه المياه الاسيوية من الصين واليابان الى الشرق الاوسط والبحر الاسود .

٥٥٢٣ - تم اسود * Cygnus atratus (S).

Cygne noir (F). Black swan (E).

نوع من التم طوله نحو ١٤٠ سم . وبسطة سقطيه من ٢٣٠ الى ٢٨٠ سم . ثوبه اسود . اياهه ببيض . متقار قرمزي . رجلاه سوداوان . موطنه بحيرات ومناقع استراليا .

٥٥٢٤ - تم صداح * Cygnus musicus, C. ferus (S).

Cygne chanteur, C. sauvage (F). Whistling swan, Wild swan (E).

نوع من التم طوله نحو ١٦٠ سم . وبسطة سقطيه من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم . ثوبه ابيض تعلو رأسه مشعة من الصفار المذهب . متقار اصفر اللون اسود الانتشاب . رجلاه الى السمرة . موطنه شواطئ البحار الباردة والمعتدلة من ايسلند الى افريقيه .

٥٥٢٥ - تم قزم * Cygnus minor (S).

Cygne nain, C. de Bewick (F). Swan of Bewick (E).

نوع من التم طوله نحو ١٢٥ سم . وبسطة سقطيه من

مهدا افريقيه الاستوائية || ساقها تطول من ١٥ الى ٣٠ م اوراقها متعاقبة مركبة وثرة التجميع ، ثلاثية او خماسية الوريقات المنقطة البيضاء النصل المسنن الحافة . نصالحا تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٧ سم . ازهارها بنفسجية اللون ، ثنائية المآبر . الانثوية فردية التجميع ، عنقودية التجميع ، ثلاثية المآبر . الانثوية فردية التجميع ، خماسية البتلات المهذبة الاطراف . حوالقها مستطيلة ، متشعبة || ثمارها قرعية الشكل ، خضراء اللون ، كبيرة القد ، طولها يراوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . وقطرها من ٤٠ الى ٧٥ سم . ومتوسط وزنها نحو ٢٠ كيلو . سوزقها سميك المادة اللبائية المليافية المأكولة يغلف مجموعة من البزور يراوح عددها من ٢٠٠ الى ٣٠٠ || بزورها مستديرة ، مبطنه ، صلبة القشور ، جامدة الالبوب العاجي اللون ، اللوزي الطعم . تؤكل مسلوقة او محمصة ويستخرج منها بالمصر نحو ٤٠ ٪ من الزيت الاصفر اللون الصافي الذي يضاهي زيت الزيتون .

٥٥١٢ - تلقيح ، حمل Fécondation (F).

اخصاب اناث الحيوان . Fecundation (E).

٥٥١٣ - تلقيح ، لقاح Vaccination

تلقيم مادة الطعم في الجسم السليم .

٥٥١٤ - تلقيح ذاتي Auto-vaccination (F).

Self-vaccination (E).

هر التطعيم الذاتي الذي يجري بدون وساطة .

٥٥١٥ - تلم ، تلم Sillon (F). Furrow (E).

هر اثر الموية التي يحرت بها في التربة . ج أتلأم وتلام .

٥٥١٦ - تلور Tellure (F). Tellurium (E).

معدن بسيط مشكال يوجد في الطبيعة على اشكال مختلفة اعماها المتبلور . اكتشف عام ١٧٨٢ . رمزه (تل) ، رقه الاتومي ٥٢ ، وزنه الاتومي ١٢٧.٦١ ثقله النوعي نحو ٦.٣ ، ينصهر عند ٤٥٢° سغ . وينلي عند ١٣٩٠° سغ . تكافؤه الاجمالي ٦ والسليبي ٢ .

٥٥١٧ - تلوس ٥ Tillus (S).

Tille (F). Tillus (E).

جنس حشرات غنفسية من فصيلة الزوحنيات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ منتشرة في معظم المناطق الحارة والمعتدلة من المالين القديم والجديد . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اطوالها تراوح من ٤ الى ١٢ مم . اثوابها عديدة ومختلفة الالوان انما تكثر فيها الالوان السوية || مسرحها نهاري . قوتها رحيق الازهار اخصها ازهار الفصيلة الخيمية || يرقانها خاشبة تعيش على جذوع السنديان والزان والصنصاف والملول والحور الرجراج .

٥٥١٨ - تلوس مستطيل ٥ Tillus elongatus (S).

Tille allongé (F). Tillus elongatus (E).

حشرة واشعة خاشبة من فصيلة الزوحنيات ورتبة مفصدرات الاجنحة . تألف البراري والاحراج . غنائسها تعيش على رحيق ازهار الصيوانيات . يرقانها تركب جذوع السنديان والمقص والملول والحور .. || جسمها صغير القد يطول من ٦ الى ٩٠ مم . ثوبها ازرق الرأس والظهران في الشقين ، اسود الكوسل عند الذكر ، احمر عند الانثى . رأسها صغير



تلوس مستطيل



تم اخرس



تم اسود



تم صداح



تم قزم



تَمَّ مُطَوَّق



تَمْر هِنْدِي



تَمْر

تدعى الخضيب توجد في أوراق النبات وأجزاء الخضر. تمتص ثاني أكسيد الكربون من الجو فيتحد بالماء داخل الخلايا النباتية ويولد الأكسجين ويكون بعض المواد الهيدروكربونية كالكسكرو والنشا || من المعروف والثابت أن احتراق الوقود والفسط والخشب يستهلك الكثير من الأكسجين فنظام الطبيعة المحكم الدورة يقضي بأن يعوض هذا النقص الذي يحدث في أكسجين الهواء بكيميات الأكسجين الذي يتولد من عملية التمثيل الخضيب. ولما كان التفاعل الكيماوي الذي يحدث في التمثيل عكس التفاعل الذي يحدث في احتراق المواد الهيدروكربونية وغيرها ... ولما كان احتراق المواد الهيدروكربونية يولد مقداراً من الطاقة. وحيث أن المصدر الذي يمد النبات بهذه الطاقة هو الشمس. لذلك نشهد أن النبات لا يتم نموه إلا بضوء الشمس. وأنه يدخر الطاقة في سائر أعضائه. وأنه عندما تحترق قطعة من الخشب مثلاً يتولد عنها مقدار من الحرارة هي في الواقع جزء من طاقة الشمس المدخنة فيها. وأنه عندما يأكل الإنسان الفاكهة أو الحبوب أو الخضر فإنه يستمد منها الطاقة اللازمة لجسمه وهي الطاقة التي يرجع مصدرها إلى الشمس.

٥٥٤٠ - تَمَحِيص Sucrage, Chaptalisation (F).
Sucaring (E).
إضافة السكر اللازم إلى الحمر لرفع نسبة كحولها.

٥٥٤١ - تَمَخِيض Barattage (F). Churning (E).
عمل يراد به تجميع الكريات الزبدية وفصلها عن الحليب.

٥٥٤٢ - تَمَدَد Dilatabilité (F). Dilatability (E).

٥٥٤٣ - تَمَدِيد Dilatation (F). Dilation (E).

٥٥٤٤ - تَمْدِيد طَوِيل Dilatation linéaire (F).
Linear dilation (E).

٥٥٤٥ - تَمْر هِنْدِي*، حَوْمَر، حَمْر Tamarindus indica (S). Tamarinier, Tamarin (F).
Tamarind tree (E). Tamarindenbaum (D). Tamarindo, T. dulce, T. dizio (I).

شجرة زراعية شجرة من فصيلة القرنيات. تملو من ٢٠ إلى ٢٥ م. أوراقها عابلة متعاقبة معنقة ريشية. أزهارها عنقودي الشجيع تاجي الارتكاز. أزهارها صفر وحمر. منبتها الهند وقد انتشرت زراعتها في جميع الاصقاع الحارة نظراً لكثرة فوائدها. أوراقها طاردة للدود. أزهارها تفيد الكبد. ثمارها تنفع المعدة وتسهلها، وتربب ويستحضر منها شراب مفيد. قشورها غنية بالمواد القابضة تستعمل ضد الاسهال المزمن. خشبها صلب. أوراقها علفية تأكلها الماشية.

٥٥٤٦ - تَمْرَاد، تَمْرِيد Colombier (F).
Pigeon-house (E).
التمراد هو برج الحمام والتمريد أيضاً ج تمريد.

٥٥٤٧ - تَمْرَان Tamarin (F).
هو الميداس من القرود الندية.

٥٥٤٨ - تَمْرَة*، رُطْبَة Datte (F). Date (E).
هي ثمرة التخليل الجافة. وقد جاء في الحديث الشريف: «أما الرطب فطعام مريم ولو علم الله طعاماً خيراً منه لأطعمها إياه». وجاء في سورة مريم: «وهزي إليك

٢٠٠ إلى ٢٤٠ سم. ثوبه أبيض ناصع. منقاره ورجلاه إلى السمرة. موطنه شواطئ بحار سيبيريا وشمال أوروبا.

٥٥٢٦ - تَمَّ مُطَوَّق* Cygnus nigricollis (S).
Cygne à cou noir (F).

نوع من التَمَّ طولُه نحو ١٥٠ سم. وبسطة سقطية من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ سم. ثوبه ناصع البياض رأسه وعنقه إلى السواد اللامع. منقاره اطحل اللون، رجلاه إلى الحمرة. موطنه بحيرات ومناقع امريكا الجنوبية.

٥٥٢٧ - تَمَّ السَمَكَة Muflier des jardins (F).
Dragon's mouth (F).

هو السيسم الماجوسي نبات زراعي تزييني عديد الضروب والالوان الجميلة الزاهية. اطلب سيسم ماجوس.

٥٥٢٨ - تَمَثُل، تَمَاكَاة Homothétie
Homothétie (F). Similarity (E).

٥٥٢٩ - تَمَثُل الأجزاء Métamérisation (F).
Metamerisation (E).

حالة الاجسام أو الاعضاء المتماثلة الاجزاء.

٥٥٣٠ - تَمَارِي شجرة لها مصع كصع العرج إلا أنها اطيب منها وهي تشبه النبع. (اللسان).

٥٥٣١ - تَمَاس، مَلَامَسَة، مَمَاسَة Contact, Osculation (F). Contact, Touch, Osculation (E).

٥٥٣٢ - تَمَاسِيح Crocodilidae (S).
Crocodilidés (F). Crocodilidae (E).
فصيلة التماسيح من رتبة الزحافات.

٥٥٣٣ - تَمَبَاك Tombac
راجع تنباك.

٥٥٣٤ - تَمَت Calepina (S). Calépine (F).

نبات عشبي، حولي، بري، وحيد الجنس والنوع من فصيلة الصليبيات. اعطائه تمتد من الشرق الأوسط إلى بعض مناطق أوروبا الجنوبية والغربية || ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه متعاقبة، السفلى منها قيثارية الشكل أما العليا فسنانية النصال. أزهاره صغيرة، ابطية وطرفية الارتكاز، بيضاء اللون.

٥٥٣٥ - تَمَمَة، تَمَمَة هي الجزء من الشمر والوبر والصوف.

٥٥٣٦ - تَمَتُّم التتم هو السباق. راجعه.

٥٥٣٧ - تَمْتِير Métrage, Mètre (F).
Measurement (E).
القياس بالمتر وحاصل القياس.

٥٥٣٨ - تَمَثِيل Assimilation
هو العمل الذي تقوم به بعض اعضاء الاحياء فتحول المواد الغذائية الميسورة أو المتوفرة لها إلى مواد نافعة يستفيد منها جسم تلك الاحياء.

٥٥٣٩ - تَمَثِيل خَضِيبِي Photosynthèse (F).
Photosynthesis (E).
عملية تحدث في ضوء الشمس. العامل في حدوثها مادة

٥٥٥٦ - تمساح كيتمان* ، كيتمان (F). Caïman
Calman, American crocodile (E).
جنس تمساح يعد بعض الأنواع المتفاوتة القد . بعضها
كبير الجثة طوله يراوح من ٥ الى ٧ امتار . وبعضها
صغير القد طوله نحو ٢٠٠ سم . أشهر أنواعه الكيان
الامريكي وكيان النيجر وكيان الصين .

٥٥٥٧ - تمساحيات (F). Crocodilliens
Crocodiles (E).
مرتبة من الزحافات تشمل فصيلة التماسيح .

٥٥٥٨ - تمشيط ، مشط (F). Hersage
Harrowing (E).
عملية زراعية الغاية منها اما تنعيم التربة بتفتيت مدرها
او تبسيطها بعد الحرث لتسوية اخاديدھا مع جمع اعشابها
او لطمر البذار والسماد .

٥٥٥٩ - تمعج (F). Boursoufflure
Bloatedness (E).
ارتفاع والتواء وتثني سطح فصل الورقة .

٥٥٦٠ - تمغنط ، مغنطة (F). Aimantation
Magnetization (E).
الحاق خواص المغنطيس بالجسم المقصود .

٥٥٦١ - تمغنط كهربي (F). Electromagnétique
Electromagnetic (E).
كل ما له علاقة بعوامل المغنطيس والكهرباء .

٥٥٦٢ - تمغيط ، إغماط (F). Extensibilité
Extensibility (E).
قابلية الشيء الى التمدد .

٥٥٦٣ - تمقلب ، مقلبة (F). Tropicalisation
Tropicalisation (E).
التقلب او المقلبة جعل المواد واللوازم الصناعية وجيرھا
لا تتأثر بالمناخ المقلبي .

٥٥٦٤ - تمك (F). Bosse du chameau
Hump, Hunch (E).
سنام الجمل .

٥٥٦٥ - تمكينة (F). Pondaison des insectes
Laying of insects (E).
التمكينة زمن القاء المكن او متحه عند الحشرات .

٥٥٦٦ - تمكك (F). Acquisition
Acquisition, Acquiring (E).
راجع اكتساب الملكية .

٥٥٦٧ - ثملوس (S). Thymallus
Ombre (F). Umber, Grayling (E).
جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلمونيات .
انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك البلاد الباردة والمعتدلة
الحرارة . يكثر وجودها في معظم انهر اروبة الوسطى
والشمالية || اجسامها وشعبة الشكل . زعانفها الظهرية
كبيرة . زعانفها الشرجية فارقة . لحمها جيدة الصنف ||
اشهر انواعه التملوس المبطل .

٥٥٦٨ - ثملوس مبدول (F). Thymallus
vaxillifer (S). Ombre commun (F). Common
Umber (E).
سمكة من التملوس . اعطانها معظم الانهر الاروبية والتركية
السريعة الانسياب || جسمها وشعي الشكل يطول نحو

يخرج النخلة تساقط عليك . رطباً جنياً فكلّي واشربي وقرّي
عيناً . || وقال فيها شوقي :
« طعام الفقير وحلوى الغني وزاد المسافر والمغترّب » .
وهي من الثمار الغذائية الغنية بالاملاح المعدنية القلوية
وبالفيتامينات « ا » و « ث » . وحداتها الغذائية تبلغ
٨٥ ٪ متوسط تركيب لبها المأكول :

هيدرات الكربون	٧٨,٥ ٪
بروتين	٢,٥ ٪
مواد دهنية	٣,٥ ٪
مواد معدنية	١,٥ ٪

٥٥٤٩ - ثمرة (F). Clnnyris
راجع تمر .

٥٥٥٠ - تمزق (F). Dégustation
Tasting (E).
راجع تذوق .

٥٥٥١ - تمزيق (F). Lacération
Laceration (E).
مزق تقطيع الشيء كالصحيفة .

٥٥٥٢ - تمس أحمر الزور (F). Bucco ruficollis (S).
Tamatia à gorge rouge (F).
طائر من البقائ . موطنه بعض مناطق المكسيك . يألف
الغابات الكثيفة الاشجار ولا يقترب من الاماكن الآهلة ||
جسمه متوسط القد ، ربع القامة ، يطول نحو ٢٠ سم .
يتميز بكبر رأسه وبسباله المهدبة وبمنقاده المخروطي الذرب
الطرف . ثوبه الى الشبهة المتفاوتة الموج يطوها قوشيم
اصفر . زوره الى الحمرة الفاقمة يحدّها طوق اسمر ينتهي
بالشبهة . صدره ويطنه الى الشبهة الموشمة بالاسمر . جناحه
معتدل الطول . ذنبه مستدير الطرف . ساقه دقيقة سمراء
اللون . حدقة عينه الى الصفار العسلي || قوته الحشرات على
اختلاف اشكالها وانواعها والنمل || يدثن عشه في تجاويف
الاشجار . الانثى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها
نحو اسبوعين بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٥٥٥٣ - تمساح (S). Crocodilus
Crocodile (E).
جنس حيوانات قازية لاحة من فصيلة التماسيح . انواعه
عديدة مهدها مياه البلاد الحارة والاسعوائية من اسبوية
وافريقية وامريكية . جميعها مستطيلة الاجسام الخشنة
تتميز بطول رؤوسها واذنابها ، بقوة فكوكها الكبيرة
وبصغر عيونها الجاحظة . مناخرها مرتفعة طرفية الارتكاز ،
جرامزها رباعية ، جانبية ، قصيرة . جلودها صفنية
قاسية . اثوابها الى السمرة الرصاصية الخضراء الموج .
يطونها اقل سمرة من ظهورها . وهي من الحيوانات الشديدة
البطش المؤذية . اناثها تبيض على الشطوط الرملية بين الخز
والطلي .

٥٥٥٤ - تمساح الهند* ، أزوم (F). Gavial
نوع من التمساح يعيش في مياه الهند . طوله نحو ٦ امتار .
يتميز باستطالة رأسه وفكيه . يقال انه لا يخشى البحر وقد
شوه على بضعة اميال من الشاطئ* .

٥٥٥٥ - تمساح امريكي* ، أليمانور (F). Alligator
نوع من التماسيح الكبيرة القد . مهد المياه الامريكية .
طوله نحو خمسة امتار . يقال انه شرس الاخلاق كثير
الشبق لا يقلب انشاء التي يستبطنها لسفادها الا بعد كلة
الثام او عند اقتراب ذكر آخر .




تمس أحمر الزور



تمساح الهند



تمساح امريكي



تمساح كيان



ثملوس مبدول

٥٥٨١ - تمنور أعرف ، يرومي

Myrmecophaga jubata (S). Tamanoir à crinière, Grand Fourmilier, Yurumi (F). Great Ant-eater (E).

حيوان لين أودد وحيد الجنس والنوع من دوديات الالسة وفصيلة النملات. أعطائه بعض مناطق أمريكا الاستوائية. يألف البراري والاماكن القليلة الاشجار. ملجئه الحياتي فردي. لا يقترب الذكر من الانثى الا في زمن الوداق. الانثى تضع جرواً واحداً ترضعه نحو اربعة اشهر. قوته النمل وبعض الحشرات || جسمه مستهجن الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٧٠ سم. ارتفاعه نحو ٦٠ سم. رأسه صغير الجرم مستطيل الفم الخرطومي الشكل. لسانه خشن ينشب عند قذفه نحو ٥٠ سم عيناه صغيرتان واذناه ايضاً. قوائمه ضخمة غليظة. قائمته الاماميتان مجهزتان باظافر مستطيلة محببة. عفرته تمتد من الرأس الى الذنب. ذنبه جليل السيب الذي يطول من ٢٠ الى ٤٠ سم. ثوبه الى الرمكة تشوبها نمشة سوداء ويعلوه في عنقه وصدره جده سوداء تمتد وتضيق حتى الكفل ويطوق الجدة حثار ابيض. قائمته الاماميتان ميقجتان بالاسود || الانثى اصغر قدماً من الذكر وسيب ذنبها اقصر من سيبه.



تمندوة

٥٥٨٢ - تمنور مقعر الذنب

Temnurus albicollis (S). Temnure à queue échanquée, Priotèle à queue échanquée (F).

طائر من فصيلة الطرغوثيات. موطنه جزيرة كوبا. يألف الغابات والاحراج. ملجئه الحياتي جماعي. جماعته قليلة العدد. قوته المواد النباتية انحصارها الثمار والبزور || جسمه صغير القد يطول نحو ١٨ سم. يتميز باستطالة ذنبه المقعر الرقال. ثوبه العلوي اسفع لامع متداخل الازرق والاخضر. صدره ابيض. بطنه احمر. منقاده قرمزي اللون. جناحاه وذنبه مبقعة بالابيض || يدن عشه في تجاويف الاشجار الانثى تحضن عنابة الذكر نحو اربع بيضات. الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً.



تمنور أعرف

٥٥٨٣ - تمنور ينس منقط البطن

Cléone piqueté (F).

هو الكونج. المنقط البطن، حشرة مؤذية من السوسيات، اطلبها.

٥٥٨٤ - تمنوشيل زرقاء

Temnochila bleu (F). حشرة تدعى اسطوانة الصنوبر. راجع رقم ١٤٠٩.

٥٥٨٥ - تمنوفيل

Thamnophilus (S). Thamnophile (F). Thamnophilus (E).

جنس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الجيشتيات. انواعه المعروفة قليلة منتشرة في بعض انطار القارة الامريكية انحصارها الجنوبية. تألف الاحراج والغابات الحريفة البائقة. ملجئها الحياتي زوجي. قوتها الحشرات والدويبات والعطاء... اجسامها ربة تطول من ١٨ الى ٢١ سم. رؤوسها كبيرة مناقيدها ضليعة. اجنحتها واذنابها معتدلة الحجم، مستديرة الاطراف. اثوابها تختلف مع الانواع، جميعها مبلقة بالالوان الزاهية || احرف انواعه واشهرها التمنوفيل الاشهب.

٥٥. سم. ظهرها الى الرتبة الفراء بعد الزرقاة الخافتة التي تعلوه في زمن النمو. جانبها وبطنها الى الرتبة الفضية. رأسها ونحطها الى الرتبة السمراء. محسراها منقطة بالاسود || لحمها لذيذ الطعم، صغري العرف، مرغوب فيه.

٥٥٦٩ - تمنول

التمنول: نبت يكثر في اول الربيع وايام الدف (التاج).

٥٥٧٠ - تمليح

Salage (F). Salting (E).

رش الملح على العلف او الحشيش او غلى بعض المأكولات المعدة للحفظ كالسمك واللحم الخ...

٥٥٧١ - تمليح

Celletonnage (F). Layering (E).

راجع تخليف.

٥٥٧٢ - تمليس

Roulage (F). Rolling (E).

راجع تعديل.

٥٥٧٣ - تمليك

Aliénation (F). Alienation (E).

هو نقل ملكية عين او حق.

٥٥٧٤ - تمليكة

Brède caya (F).

Bastard mustard (E).

راجع ابو قرن.

٥٥٧٥ - تمليين

Malléination, Malléinisation

(وضع الامير مصطفى الشهابي) هو حقن الفرس بسائل المليون (Mailéine) لتشخيص مرض الرعام.

٥٥٧٦ - تمندوة ، دقير الحراج

Tamandua (S). Tamandua, Puant de la forêt (F). Middle Ant-eater (E).

جنس حيوانات لبونة درداء من دوديات الالسة وفصيلة النملات. انواعه المعروفة اربعة. اعطائها امريكة الاستوائية. ملجئها الحياتي فردي لا تجتمع الا في زمن الوداق. تألف البراري والاحراج. مسرحها دجوي. تتسلق الاشجار بحفة في طلب النمل والحشرات والعسل || اجسامها تطول من ٨٥ الى ١١٠ سم. بما فيه الاذناب التي تطول من ٣٥ الى ٤٦ سم. ارتفاعها يراوح من ٢٠ الى ٣٤ سم. رؤوسها صغيرة، مستطيلة، شبه مخروطية الشكل. السنن شبه اسطوانية الشكل، حشاحة. عيونها واذناتها صغيرة. قوائمه قصيرة، الامامية منها محببة الاظافر القوية، اللامتساوية الطول. اذنانها مستطيلة، سرحة، أخاذة. اثوابها تختلف مع الانواع || اناتها اصغر قدماً من ذكورها وتضع جرواً واحداً ترضعه نحو اربعة اشهر.

اما انواعه فهي التالية :

٥٥٧٧ - تمندوة أسود

Tamandua nigra (S).

Tamandua noir (F).

٥٥٧٨ - تمندوة يئسي اللون

Tamandua straminea (S). Tamandua couleur de paille (F).

٥٥٧٩ - تمندوة مسروج

Tamandua sellata (S). Tamandua à selle (F).

٥٥٨٠ - تمندوة مستطيل الذيل

Tamandua longicauda (S). Tamandua à longue queue (F).

والنسرين والاعتناء بجميع الزهور الصيفية مع مكانة حشراتنا وأوصافها الفطرية .

٥٥٩١ - تَمَنُوفِيل . Rotation (F). Rotation (E). الحركة حول محور أو دورة محورية .

٥٥٩٢ - تَمَنُوفِيل . Financement (F). Financing (E). التمويل الامداد بالمال .

٥٥٩٣ - تَمَيَّر *، تَمَرَّة، أَبُو تَمَرَّة، إِبْن تَمَرَّة Cinnyrus, Nectarina (S). Souis-Mangas, Suce-fleurs (F). Sunbird, Bloom-suyger, Suyker-woogel (E).

جنس طير من فصيلة المغنريات ورثة الجواثم الرقيقات المناقير . أنواعه ٢٣ أعطائها أفريقية ومدغشكر وبعض الجزر والمناطق الآسيوية الحارة . جميعها عصافير صغيرة القد مستطيلة المناقير والالسة المنمطة الخيطية الزوائد الطرفية . أثواب ذكورها جميلة الالوان المتراكبة المتداخلة الزاهية . وهي تجرس الزهر كالنحل وتأكل التمر وكل ثمر حلو المذاق || تدس في الادغال القليلة الارتفاع . اناثها تضع من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابذة الذكور . أشهر أنواعه ما يتبع .

٥٥٩٤ - تَمَيَّر أبيض البطن ، نُسَك Cinnyrus albiventris (S). تمير صغير القد ابيض البطن موطنه الخليج الفارسي .

٥٥٩٥ - تَمَيَّر النيل Nectarina metallica (S). نوع من التمرير صغير القد متراكب الالوان السفعية الموج موطنه وادي النيل والحبشة والصومال .

٥٥٩٦ - تَمَيَّر حَبَشِي Cinnyrus habessinicus (S). نوع من التمرير صغير القد متراكب الالوان الزاهية موطنه الحبشة وأترية وحوض البحر الاحمر .

٥٥٩٧ - تَمَيَّر فلسطيني ، أَبُو الزُّهُور Cinnyrus oseea (S). نوع من التمرير صغير القد جميل الالوان الزاهية . موطنه فلسطين ولبنان الجنوبي . يكثر في غور الاردن .

٥٥٩٨ - تَمِيكَة صُغِيرَة *، قَوْبَعَة البَرَاغيم، قَوْبَعَة الزُّعُرُور، قَوْبَعَة الأشجار المثمرة .

Recurvaria nanella, R. crataegella (S). Teigne des bourgeons, T. de l'aubépine, T. des arbres fruitiers (F). Lesser bud moth (E).

حشرة من فصيلة القوبيات حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الأدنى الى اوروبا وأمريكا . فراشتها عجيبة تعيش على مخزونها الامعائي . سرفتها غامضة لاغمة تنقب البراعم الزهرية وتعيش في داخلها وتضم نصل الاوراق . تركيب الزعرور والتفاح والمشمش والخوخ والدراق ولا تمت عن اللوز والكرز والاجاص || جسمها صغير قصيف يطول نحو ٤ مم . بسطتها تراوح من ١٠ الى ١٢ مم . رأسها صغير الجرم ، اسمر الطحله . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان . ملابسها نحيلة . مرشفها جدعة . جوشها اطحل اللون حنطي الموج كالبطن || روشناها الاماميان الى الطحلة الخنطية يعلوها تسبيج وزركشة بيضاء . روشناها

٥٥٨٦ - تَمَنُوفِيل أَشْهَب *، بَطْرَة ٥
Thamnophilus cinereus (S).
Thamnophile gris, Batara (F).

طائر من التمنوفيل وفصيلة الجيثلديات . موطنه غابات البرازيل . ملجئه الحياتي زوجي . قوته الحشرات والديدان والوزغ وفئران الحقل .. || جسمه ربعة يطول نحو ٢١ سم . رأسه كبير الجرم تملوه كشة صغيرة منعدلة على القفن . منقاده ذرب ضليع . ثوبه الى الشبهة . رأسه وكشته الى الجؤوة . زوره وصدره مقلدان بالجؤوة السعفاء الموج . جناحاه مبقمان بالاحمر الاليس . ذنبه مجذع بالاحمر الامفر || يدثن عشه في الاشجار الرفيعة الملتفة الافناد والافنان الانثى تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات . الذكر يؤمن لها الغذاء والحماية .

٥٥٨٧ - تَمِيه Ranci (F). Rancid (E). التمه من الدهن والبن واللحم والطعام : الذي فسد وتغير ريحه وطعمه .

٥٥٨٨ - تَمَمُوء Hydratation (F). Hydration (E). التمموء عملية اتحاد الماء او مركباته مع بعض المعادن او الاجسام .

٥٥٨٩ - تَمَمُوجِي Ondulatoire (F). Undulatory (E). نمت تمريني يطلق على ما كان طابعه الحركة الموجية .

٥٥٩٠ - تَمُوز Juillet (F). July (E). يعرف ايضا بـ يوليو . الشهر السابع من السنة الشمسية . وهو من شهور الصيف الحارة . مدته واحد وثلاثون يوماً . في العقد الاول منه تطلع الشعرى وفي اليوم الثامن عشر تبتدئ الباحور العربية (راجع باحور) .

تقويمه الزراعي - اعماله الزراعية عديدة اخصها :
١ - في الزراعات العامة الموسمية : العناية بزراعة القطن ، متابعة عرقها وربها وتعشيبها مع مكافحة حشراتنا وأوصافها الفطرية . توزيع الاسمدة على الاراضي المعدة للزراعات الشتوية . تعشيب زراعات التبغ ومتابعة قطاف الاوراق وتجفيفها . متابعة اسقاء التبوغ المروية اخصها الفرجينية وعدم الاسراف في سقاية التبنك . متابعة الاعتناء بجميع الزراعات الصيفية ووقايتها من الحشرات والاصنام .
٢ - في الاشجار المثمرة : متابعة الاسقاء والعرق والتعشيب والتطعيم . مكافحة الحشرات والاصنام على اختلاف انواعها . توزيع الاسمدة الكيماوية اللازمة على التفاح والاجاص والسفرجل والدراق . لتسكينها من الادخار اللازم للسوم الثقيل . متابعة وانهاء التطعيم الرقعي في اللوزيات .

٣ - في الحمضيات : متابعة العرق والتعشيب والاسقاء . يحسن من الاشجار الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة الازوتية السريعة التمثيل كالتيرات . المباشرة بتطعيم النصبوب . متابعة مكافحة الحشرات القشرية .

٤ - في الاشجار المختلفة : اسقاء الموز وتعشيبه وتوزيع الاسمدة الكيماوية المركبة مع الانتباه لجوب اكنار عنصر البوتاس الضروري للثمر . اما في الكرومة فن الواجب متابعة استعمال الفواطير الخاصة بالارمداد والميلديو .


٥ - في البقول والزهور : اعداد مشاتل البندوة والباذنجان والملفوف ... بذر مشاتل الزهور الشتوية . تعليم الوردة



تَمَنُوفِيل أَشْهَب



تَمِير



تَمِيكَة صُغِيرَة

٥٦١١ - **تَنَاسُلٌ يَرْقِيّ** ^٥ Paedogenèse.

Pédogenèse (F), Paedogenesis (E).

التناسل اليرقي ملجن وراقي يكيث استمرار الحياة عند بعض فئات الحشرات والحيوانات الدنيا فينجم اما عن القمعة او عن اخصاب العناصر الجنسية او عن التوالد العذري .

٥٦١٢ - **تَنَاسُلِيّ، نَزْوِيّ** ^٥ Génital, Génésique (F).

Genital (E).

صفة ما يعود الى التناسل او ما يمت الى اعضاء التناسل .

٥٦١٣ - **تَنَاسُلِيّ** Générationnel (F).

Generational (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما يتم عن طريق التناسل او التوالد .

٥٦١٤ - **تَنَافٍ، تَنَافُرٍ، تَنَاقُصٍ**

Incompatibilité (F), Incompatibility (E).

هو عدم ملائمة الاشياء بعضها الى بعض .

٥٦١٥ - **تَنَافُذٌ** Osmose (F), Osmose, Osmosis (E).

التنافذ او التحال او الانتشار الغشائي هي الخاصية التي تمكن مرور السوائل والمواد البلورية المذابة خلال الحواجز الطبيعية ذات المسام .

٥٦١٦ - **تَنَافُذٌ خَارِجِيّ** Exosmose

راجع تحال خارجي .

٥٦١٧ - **تَنَافُذٌ دَاخِلِيّ** Endosmose

راجع تحال داخلي .

٥٦١٨ - **تَنَافُذِيّ، تَنَاضُجِيّ** Osmotique (F).

Osmotic (E).

صفة ما هو خاضع للتنافذ .

٥٦١٩ - **تَنَافُرٌ** Discordance (F), Discordancy (E).

صفة الشيء العادم التناسب والانسجام .

٥٦٢٠ - **تَنَافُسِيّ** Compétitif (F).

Competitive (E).

ما هو قابل المنافسة او له علاقة بها .

٥٦٢١ - **تَنَاقُصِيّ** Dégressif (F).

Decreasing (E).

٥٦٢٢ - **تَنَاوُبٌ** Relais (F), Relay (E).

٥٦٢٣ - **تُنْبَاكٌ، تُمْبَاكٌ** Tombac

نبات زراعي صناعي تكثر زراعته في ايران وسورية ولبنان حيث يستعملون اوراقه الجافة للتدخين بواسطة الازاكيل . وهو نبات حولي متوسط الانتاج يستلزم الري . زراعته كزراعة التبغ تخضع لنظام الحصر ان في لبنان او في سورية || ضرورية عديدة اشهرها الاصفهاني والشيرازي .

٥٦٢٤ - **تُنْبَاكٌ أَصْفَهَانِيّ***

Nicotiana petunioides alata persica (S).

ضرب من التنباك يتميز بأوراقه الخاصة الفارشة . نصلها كبير القد ، متمج الصفحة ، قلبي القاعدة ، ذرب الزام الاخير || منه تحدر التنباك اللبناني الذي تحافظ على سلامته ادارة حصر التبغ ومنه ايضاً تحدر التنباك اللاذقاني الذي اصبح الآن سمخة مستقلة || زراعته مروية . يعود

الخلفيان الى الشبهة السورية . اهدابها كبيرة || لها جبل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . حياتها قصيرة الامل تعيش نحو ١٥ يوماً . تسرح من الغروب الى فحة الليل . تعاغل بعد ظهورها بيومين وتباثر متح الممكن بعد الكوم بيوم واحد وتلقه مبحادياً في مجموعات لامتناهية العدد على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٥ الى ٦ مم . جسمها اسطواني الشكل ، دقيق الجرم ، امغر اللون ، اسود الرأس ، يعلوه في ثيج الظهر ثعل جؤوية صغيرة يتوسطها هلب قصير منتصب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً يتقضي ضمن صلجة تنسجها السرفة داخل طيات الاوراق المشبكة التي حبكتها في آخر طورها اليرقي .

٥٥٩٩ - **تُمَيْلَة** دوية على قدر الهرة (الجاحظ) .

٥٦٠٠ - **تَمَيُّيزٌ** Différenciation (F).

Differentiation (E).

تقدير الفرق بين شيئين او اكثر .

٥٦٠١ - **تُنٌّ** Thon (F), Tunny-fish (E).

هو التون ، اطلبه . الواحدة تنة .

٥٦٠٢ - **تَنَاتُلٌ** Hétérogénéité (F).

Heterogeneity (E).

التناتل والزمع والزماع هي صفة الاشياء غير المتجانسة .

٥٦٠٣ - **تَنَاجُلٌ** Multiplication

هو التكاثر عند الحيوان والحشرات .

٥٦٠٤ - **تَنَازُلٌ** Désistement (F), Desistance (E).

هو ان يترك المرء بمطلق ارادته حقاً له او فائدة تعود عليه .

٥٦٠٥ - **تَنَاسُبٌ** Homogénéité (F).

Homogeneity (E).

راجع تجانس .

٥٦٠٦ - **تَنَاسُقٌ، تَنَاطُرٌ، مُطَابَقَةٌ، مُعَادَلَةٌ**

Symétrie (F), Symmetry (E).

ترتيب اجزاء ماثلة في مجموعة واحدة منسجمة التنظيم .

٥٦٠٧ - **تَنَاسُقِيَّةٌ** ^٥ Uniformitarisme (F).

Uniformitarism (E).

نظرية تأهسية تقول بوجود ايفساح ماضي الكرة الارضية والكائنات الحية بناء على المعطيات الحالية واستناداً الى مدى تأثيراتها التطويرية في الوثل الحكمي والاضاضي العام .

٥٦٠٨ - **تَنَاسُلٌ، قَوَالِدٌ** Reproduction

هو في الحيوان والنبات مجموعة الطرائق المتبعة في الاكثار التناسلي الصحيح للوصول الى الافراد والسلالات المقصودة . وقد يتم ذلك بالاصطفاء والتصلب والتيجين والتخليط .

٥٦٠٩ - **تَنَاسُلٌ تَنَاقُيٌّ** Gnéagenèse (F).

Geneagenesis (E).

يريدى التناسل الدوري او التعاقبي .

٥٦١٠ - **تَنَاسُلٌ شَقِيّ** Sexiparité (F).

Sexiparity (E).

التناسل الشقي تناسل يوجب التحام الركن الذكري بالانثوي .



تنباك لبناني أصفهاني الأصل

والمشّي || اثوابها جميلة الالوان . اجسامها صغيرة . مناقيرها مخروطية غليظة . قوائمها معتدلة الطول . اجنحتها ذلقة الاطراف . اطول قوائمها الثانية والثالثة والرابعة ، اما الاولى والخامسة فتساويتان || تألف الحياة الجماعية والحراج والغابات . قوتها البزور البرية والحشرات || تتميز باقتباس الالحان وترديدها || أشهرها التنجي القرمزي والتنجي الوردي .

٥٦٣٤ - تنجي قيرمزي *

Carpodacus erythrins, Erythrins erythrins (S).
Roselin cramoisi (F). Scarlet grosbeak (E).

طائر من التنجي موطنه الشرق الاوسط وبعض مناطق اوروبا الجنوبية والغربية || جسمه يطول نحو ١٤ سم . ثوبه الى الحمرة القرمزية السفعاء الموج يعقب في الرأس والرداء والظهر والصدر وتعلوه ماحجات مختلفة في الجناح والذنب تراوح من الكلسة الى الشبهة . بطنه الى الحمرة الصنابية تحف وتبيض مع اقترابها من الافنيك . عيناه عسلتان . مناقره وقائمته واصابعه الى السمرة || يألف الحراج والغابات والاجام ومجاري الماء والحدائق . سر به لا يتجاوز عشرة ازواج || قوته البزور البرية والحشرات الصغيرة || يدثن عشه في الاشجار القليلة ، الاثني تضع من ٤ الى ٥ بيضات مرة واحدة في العام . الحفن يستمر نحو ١٢ يوماً تقوم به الاثني دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء || يألف القفص ويقتبس الالحان والتأديب .

٥٦٣٥ - تنجي وزدي

Carpodacus roseus, Erythrins rosea (S). Roselin rose (F).
طائر من التنجي موطنه اوروبا الوسطى وروسية || جسمه يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الى الحمرة القرمزية الوردية الموج . جبهته بيضاء وجناحاه مجذعان بحدتين لونهما الى الوردية البيضاء الماجة || يألف حراج السديان والبتولا . سر به نحو ستة ازواج . قوته البزور البرية وبعض الحشرات || يدثن عشه في الاشجار القريبة من مجاري الماء .

٥٦٣٦ - تنخ

Acclimater (F). To acclimatize (E).
اخضع الحيوان او النبات الى مناخ لم يألفه سابقاً .

٥٦٣٧ - تندر

Tundra (F). Tundra (E).
التندر سهول مترامية الاطراف تمتد على شواطئ بحر الجليد من سيبيريا الى دائرة القطب . تربتها لا تعرف ذوبان الجليد السطحي الا في فصل الصيف . نباتها الطوعي طحالب وخزاز ولا يعيش فيها من الحيوان الاليف سوى قطمان الرنة .

٥٦٣٨ - تنسيق ، ترتيب

Manutention (F). Management (E).
٥٦٣٩ - تنشيع
Dosage (F). Dosing (E).
هو التركيز .

٥٦٤٠ - تنشيف

Séchage (F). Drying (E).
راجع تجفيف .

٥٦٤١ - تنصّاب ، عراض

Placier (F).
من عرض الشيء لتصريفه او بيعه .
٥٦٤٢ - تنطّب ، سداد

Capparis sodada (S).
Caprier du désert (F).
نبات معمر مداد عارض من فصيلة الكبريات . يكثر

في الاتربة المتوسطة الاندماج ، العميقة الغور ، الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية . يزرع بمعدل ٤ شتول في المتر المربع . تقرف شتوله قبل الازهار وبعد انتزاع الاوراق السفلى العادمة الفائدة . ويترك على الساق الواحدة من اربع الى خمس ورقات تقطع وتجفف عند اكتمال ازديادها .

٥٦٢٥ - تنباك شيرازي

Nicotiana rustica asiatica persica (S).
ضرب من التنباك يتميز باوراقه المنقطة القلبية الشكل . نصلها مالم الصفحة المتوسطة القند . اوراقه الجافة عادمة التبقيج ، سوية اللون الكستني الفاتح || يزرع ويعامل كالشبع دون اللجوء الى القرف او خصي الازهار . يجفف باقتلاع الشتل وتعريضها لاشعة الشمس . يوصف ويرزم بسوقه واوراقه وازهاره . يستعمل استعمال التنباك الاسفها في .

٥٦٢٦ - تنبل

Betel, Temboul (F).
Betel pepper (E).
راجع تامول .

٥٦٢٧ - تنبيت

Levé (F). Raising (E).
التبيت هو اول خروج النبات . راجع قصوع .

٥٦٢٨ - تنبيج ، جب

Pollinisation artificielle (F). Artificial pollinization (E).
هو تعفير الازهار الانثوية بمجدرات وليع الازهار الذكرية . وهي عملية شائعة الاستعمال بالنخل وبغيره من النباتات الثنائية المسكن او الضعيفة الاخصاب الذاتي .

٥٦٢٩ - تنسيق ، تنسيق ، تنسيق

Plantation en lignes (F). Planting in lines (E).
هو الفرس بالصف في خطوط متساوية الابعاد . يقال صف وفسق وقسط ونبق النصب اي غرسها صفوف متتامة متساوية الابعاد .

٥٦٣٠ - تنبيه

Avertissement, Information
راجع إلهار .

٥٦٣١ - تنثورة مجيدة

Tanyptera gloriosa (S). Tanyptère glorieuse (F).
حشرة لامؤذية من فصيلة القصبيات . جسمها معتدل القند يطول من ١٤ الى ٢٤ سم || ثوبها الى السمرة القاتمة يعملها طوق احمر يكتنف الزام الاول من البطن || زباناها قلادينان . دوشناها الى الصفار الكبريتي . قوائمها حنطية ، صنابية الموج || الاثني اكبر قدماً من الذكر . تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى آب . تألف الحراج والغابات والحدائق || تمتع الاثني مكنها في لحاء الاشجار الحمرية النخرة ، اخصها السديان ، فينتف عن يرقات تعيش على المواد النهائية المنحلّة .

٥٦٣٢ - تنثيش

Egermage (F).
ازالة نتوش الشعر المعد لصنع الجعة .

٥٦٣٣ - تنجي

Carpodacus, Erythrins (S).
Roselin (F).
جنس طير من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم مخروطيات المناقير . انواعه المعروفة نحو ٥ منتشرة من اليابان الى الشرق الاوسط واروبة . جميعها من الضوارب التي تنتقل من منطقة الى اخرى سعيًا وراء الرزق او طلباً للمصيف



وجوده في البلاد الصحراوية الحارة . ثماره عنبية حمراء اللون
مأكولة || ثمرته تدعى تنضبة .

٥٦٤٣ - تَنْصِيد * Stratification

هو وضع البذور الصلبة القشور بين طبقات من الرمل
الرطب لتسهيل انتاشها والسرعة فيه . ويستعمل أيضاً
للفسائل والعقل فيسهل بروز جذورها .

٥٦٤٤ - تَنْطَل * Tantal (F). Tantalus (E).

جنس طير من طوال الساق ينتمي الى فصيلة التنطليات
انواعه اربعة جميعها من القواطع . تجوب البلاد الحارة
والاستوائية الافريقية والامريكية . تتميز باستطالة مناقيدها
الاسفينية الشكل المقوسة . اثنائها مختلفة الالوان فيها
الابيض السوي والابيض الموشح بالاسود ثم الوردى المتأرجح
والوردي الموشم بالابيض || تألف المناقع وضفاف الأنهر
ومجاري الماء . قوتها العظام والصفادع والاسماك والحشرات
والجيف الخ .

٥٦٤٥ - تَنْطَلِيَّات ، حَارَسِيَّات Tantalidae,

Ibididae (S). Tantalidés, Ibididés (F). Ibididae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق . اجناسها عديدة نحو ٢٢
جميعها من الطيور القواطع . قريبة الشبه من البلشون
واللقلق . تتميز بمناقيدها المستطيلة ، الاسفينية الشكل ،
المقوسة .

٥٦٤٦ - تَنْظِيف ، كَرِي ، قَبْث Curage (F).

Cleansing (E).

هو تنظيف المجاري والاقنية من الاعشاب والوحول ..

٥٦٤٧ - تَنْظِيم Alignment (F). Alinement (E).

هو تخطيط الطرق العامة .

٥٦٤٨ - تَنْغَرَكَة * Tangara (S).

Tangara (F). Tanager (E).

جنس طير من فصيلة التنغريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠
موطنها تمتد من امريكا الجنوبية الى الوسطى وبعض مناطق
الشمالية . تألف الادغال والغابات والاسراج المهيمنة
الاشجار . نظامها الحياتي جماعي . اسرارها متفاوتة العدد ||
اجسامها صغيرة القد . مناقيدها صغيرة مخروطية الشكل .
اجنحتها رتاجية معتدلة الحجم . اذناها متوسطة القد ،
مستديرة الاطراف . ارساغها دقيقة . اصابعها نشيطة .
اثنائها جميلة الالوان الزاهية ، المتداخلة ، الملبقة ، فيها
الاحمر والاصفر والاسود والاخضر والازرق والالطلح
والارمك والاصهب والصنابي || معظم انواعها يعيش على
البذور والحشرات وبعضها على البذور والثمار || تكثر
اعشاشها في الادغال وفي الاشجار الداسية على ارتفاع
بضعة اقدام عن سطح الارض . اثنائها تضع من ٣ الى ٥
بيضات تحضنها بمناوبة الذكور من ١٢ الى ١٥ يوماً .

٥٦٤٩ - تَنْغَرِيَّات Tanagridae (S).

Tanagridés (F). Tanagridae (E).

فصيلة طير من الجواثم مخروطيات المناقير . انواعها المعروفة
كثيرة العدد ، نحو ٤٢٠ ، تنضم الى عدة اجناس . جميعها
من طيور امريكا الجنوبية والوسطى ولا يوجد منها في
امريكا الشمالية سوى الصوارب التي تمضي فصل الصيف
ثم تعود الى اعطائها . نظامها الحياتي جماعي . مجموعاتها
متفاوتة العدد ، منها الفوج الذي يعد من ٤٠ الى ١٠٠ .

زوج ومنها السرب الذي يعد من ١٠٠ الى ١٠٠٠ زوج
وأكثر || اجسامها قراوح بين الصغيرة والوسطى . مناقيدها
مخروطية الشكل او شبه مخروطية ، مسننة اطراف الافاك
العليا . اجنحتها واذناها معتدلة الطول . اثنائها متداخلة
الالوان الزاهية || قوتها الثمار والبذور والحشرات || اعرف
انواعها واشهرها التنغر والبيرنيسة والرمفوسيل والعزاف
والوسيم ...

٥٦٥٠ - تَنْغِيل Métissage (F). Cross-breeding (E).

راجع إنثال وتغيل .

٥٦٥١ - تَنْفَس Respiration

عمل فيزيولوجي طبيعي تقوم به الاجسام الحية غايته
ادخال الاكسجين على دم الحيوان ونسج النبات وطرد
الحامض الكربونيكي والماء .

٥٦٥٢ - تَنْفِيد ، تَحْقِيق Exécution, Réalisation (F).

Execution, Realization (E).

اجراء ما صار الاتفاق عليه .

٥٦٥٣ - تَنْفُس Tanche (F). Tench (E).

هو الكمه من الاسماك النهرية ، اطله .

٥٦٥٤ - تَنْقِيب Forage (F). Boring (E).

البحث ، بسر الغور ، عن المعادن والمياه .

٥٦٥٥ - تَنْقِيَة Raffinage (F). Refining (E).

هي التصفية الفنية التي بواسطتها يمكن تحديد نسبة جميع
العناصر .

٥٦٥٦ - تَنْقِيل Dépotage, Rempotage (F).

Unpotting, Repotting (E).

التنقل او تبديل الاصيص او تغيير المكن هو نقل
النبات من شقفة الى اخرى اكبر حجماً او اجود تربة .

٥٦٥٧ - تَنْكُورَة * Thinocore

جنس طير من فصيلة النغريات . انواعه قليلة . قوتها
الاعشاب والحبوب والحشرات . تألف السهول والحقول
والمراعي . شكلها بين الحجل والحباري . مستدقة الجثة
طولها من ١٨ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الرعدة المسهب الموشحة
والموشة بالابيض والخطي والاسمر || الاثنى تكثر في الارض
بين الاعشاب . تبطن افحصها بالقش والوبر تبيض
وتحضن من ثلاث الى اربع بيضات .

٥٦٥٨ - تَنْوَب Abies (S). Sapin (F).

Fir-tree, Silver fir (E). Tanne (D). Abeto (I).


جنس اشجار عروة دائمة الخضار من التنوبيات وفصيلة
الصنوبريات . انواعه نحو ٢٥ منتشرة في جميع اصقاع
العالم . منها الباسقة العظيمة القد التي يبلغ ارتفاعها نحو
٩٠ م . ومنها المتوسطة الحجم التي تملو نحو ٢٠ م . اخشابها
شائعة الاستعمال . يستخرج منها عصارة وانتجية بلسمية
عميمة النفع والاستعمال || اشهر انواعه الحرجية والتزيينية
ما يتبع .

٥٦٥٩ - تَنْوَب أبيض

هو التنوب السوي اللون ، اطله .

٥٦٦٠ - تَنْوَب إسباني


هو التنوب الصنوبري ، اطله .



تنصيد



تنظ



تنغرة



تنكور

٥٦٦١ - تنوب القفقاس

هو التنوب المسكوبي ، اطلبه .

٥٦٦٢ - تنوب أناضولي ، تنوب كيليكية ،

قطراني أصفر

Abies cilicica (S).
Sapin de Cilicie, S. cilicien (F). Cilician fir, Cilician pruce (E). Cilicianische tanne (D). Abeto del Cilicia (I).

شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٣٠ الى ٣٥ م. اهدابها صغيرة تطول نحو ٣ سم. اكرازها مستطيلة الشكل سطحية الاسقاط لونها الى الخضرة .

٥٦٦٣ - تنوب باماسي *

Abies grandis (S).
Sapin élané, S. de Vancouver (F).

شجرة باسقة تعلو من ٦٠ الى ٩٠ م. اهدابها حرشفية مسطحة تبدو كاستن المشط . اكرازها مخروطية الشكل ، متوسطة القد ، غائرة الاسقاط .

٥٦٦٤ - تنوب بيماسي هو التنوب السوي اللون ، اطلبه .

٥٦٦٥ - تنوب جميل ، تنوب ظريفي ، تنوب

مستحب ، قطراني

Abies amabilis (S).
Sapin gracieux (F). Spruce, Silver fir (E). Liebliche tanne, Silber tanne (D). Abeto amabile (I).

شجرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ٥٠ الى ٦٠ م. اهدابها صغيرة طولها نحو ٣ سم. لونها الى الخضار الزاهي ، دعكها فواح العرف الراتنجي . اكرازها مستطيلة تبدو جؤوية اللون ثم تنحرف الى الخنطي الاصفر . اسقاطها عادية ظاهرة الجوانب .

٥٦٦٦ - تنوب رومي

Abies cephalonica (S).
Sapin de Céphalonie, S. hellénique (F). Greek fir, Black mountain fir (E). Fichten tanne (D). Abeto d'Ellenico (I).

شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اهدابها شائكة العقصة ، صغيرة ، طولها نحو ٣ سم. لونها الى الاخضر الزاهي . اكرازها مستطيلة نافرة الاسقاط لونها الى الخضرة .

٥٦٦٧ - تنوب سوي اللون ، تنوب بيماسي ،

تنوب أبيض

Abies concolor (S).
Sapin concolore, Sapin blanc (F). White silver fir, White spruce (E). Kalifornische tanne (D). Abeto bianco (I).

شجرة كبيرة القد سريعة النمو تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اهدابها مزدوجة الانتشاب طولها من ٦ الى ٨ سم. عرضها من ٢ الى ٣ م. افئفاتها الفتية ونواميها الى الريدة الطحلاء . اكرازها مستطيلة يراوح طولها من ٨ الى ١٤ سم. وقطرها من ٣ الى ٥ سم.

٥٦٦٨ - تنوب سيبيري

Abies sibirica (S).
Sapin de Sibérie (F).

شجرة سبروتية متوسطة القد تعلو من ٣٠ الى ٤٠ م. اهدابها خيطية لونها الى الريدة الطحلاء . اكرازها صغيرة طولها من ٥ الى ٨ سم. قطرها ٣ سم. لونها الى السمرة البنية . اسقاطها غائرة .


٥٦٦٩ - تنوب صنوبري ، تنوب إسباني

Abies pinsapo (S). Sapin pinsapo, Pinsapo (F).

شجرة سبروتية جميلة الشكل متوسطة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اهدابها قصيرة ثخينة مدبة الطرف ، سوية اللون الاخضر الاطل ، اكرازها جؤوية اللون طولها من ١٠ الى ١٥ سم. قطرها نحو ٤ سم. اسقاطها غائرة .



تنوب باسق



تنوب فخيم

٥٦٧٠ - تنوب ظريفي هو التنوب الجميل ، اطلبه .

٥٦٧١ - تنوب قاحير ، تنوب نبييل

Abies nobilis (S). Sapin noble (F). Noble fir (E). Edel tanne (D). Abeto nobile (I).

شجرة كبيرة الحجم جميلة الشكل تعلو من ٧٠ الى ٩٠ م. اوراقها حرشفية مسطحة طولها نحو ٣ سم. اكرازها تبدو زرقاء اللون العابق ثم تنحرف الى البني الاسمر ، طولها من ١٥ الى ٢٥ سم. قطرها من ٦ الى ١٠ || تجود في جميع الاثرية العميقة الغور التي لا تخلو من الرطوبة .

٥٦٧٢ - تنوب فخيم *

Abies magnifica (S).
Sapin magnifique, S. majestueux (F).

شجرة سبروتية كبيرة القد تعلو من ٥٠ الى ٧٥ م. اهدابها صغيرة ، طولها نحو ٢ سم. دعكها فواح العرف الراتنجي ، لونها اخضر الصفحة العليا فضي السفلى . اكرازها صغيرة مخروطية غائرة الاسقاط .

٥٦٧٣ - تنوب فضي هو التنوب المشطي ، اطلبه .

٥٦٧٤ - تنوب فيرما ، تنوب مؤمي

Abies firma (S). Sapin momi (F).

شجرة متوسطة القد تعلو من ٣٥ الى ٥٠ م. اهدابها سوية اللون الاخضر الباهت ، مدبة العقصة الشائكة . اكرازها صغيرة مستطيلة . اسقاطها نافرة . يكثر وجودها في الصين واليابان .

٥٦٧٥ - تنوب كيليكية هو التنوب الاناضولي ، اطلبه .

٥٦٧٦ - تنوب مسكوبي ، تنوب القفقاس

Abies nordmanniana (S). Sapin du Caucase (F).

شجرة سبروتية جميلة الشكل متوسطة النمو تعلو من ٣٠ الى ٥٠ م. اهدابها صغيرة ، مقطومة الطرف ، شديدة الخضار . اكرازها بنية عابقة ، طولها من ١٥ الى ١٧ سم. قطرها نحو ٤ سم. اسقاطها ظاهرة . موطنها القفقاس والشرق الاوسط .

٥٦٧٧ - تنوب مشطي ، تنوب فضي

Abies pectinata, A. alba (S). Sapin pectiné, S. argenté, S. des Vosges (F). Common silver fir tree (E). Weiss tanne (D). Abeto comune, A. maschio (I).

شجرة كبيرة القد هرمية الشكل ، متوسطة النمو . تعلو من ٢٠ الى ٦٠ م. اهدابها مشطية الارتكاز متتامة . لون صفحة نصلها العليا يختلف من لون الصفحة السفلى . نواميا زباء . اكرازها مستطيلة لونها الى البني الاسمر . طولها من ١٠ الى ١٨ سم وقطرها من ٣ الى ٥ .

٥٦٧٨ - تنوب نبييل هو التنوب القاحير ، اطلبه .

٥٦٧٩ - تنوبيات

Ablataceae (S).
Ablatacées, Pinacées (F). Ablataceae (E).

عمارة من الصنوبريات تشمل التنوب والصنوبر والاوز والانسوفة والابيسة والسكوا وغيرها .

٥٦٨٠ - تنوبيّة

Ablatinées (F). Abies (E).

سبط من عمارة التنوبيات وفصيلة الصنوبريات .

٥٦٨١ - تنوخ

Ecologie (F). Ecology (E).

علم اثر البيئة على الكائنات الحية من حيوان ونبات .

ازهارها الى الصفار الزاهي الوهاج . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٦٩٢ - تنوم القفقاس (S). Trolle du Caucase (F).

عشبة برية وزراعية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ازهارها برتقالية البتلات ، ارجوانية الالوان والياسم . ازهارها ربيعي .

٥٦٩٣ - تنوم رهيل (S). Trolle lâche (F).

عشبة برية وزراعية تملو من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهارها خاسية او سباعية الفصل . بتلاتها نحو ١٥ لوناً فستقي . ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩٤ - تنوم قعير (S). Trolle épanoui (F).

عشبة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . ازهارها جميلة الصفار المذهب . ازهارها ربيعي .

٥٦٩٥ - تنوم نجمي (S). Trolle acule (F).

عشبة نجمية تملو من ٦ الى ١٠ سم . ازهارها سباعية الفصل الالوانية الارثكاز ، البرتقالية اللون . بتلاتها صفر مذهب . ازهارها يستمر شهراً واحداً .

٥٦٩٦ - تنوير (F). Efflorescence (E). راجع ازهار .

٥٦٩٧ - تينين (F). the Dragon, Draco (E).

التنين كوكبة من ثمانين نجماً تشبه بشكلها ذاك الحيوان الخرافي المعروف بالتينين . موقعها الشمال . رأس التنين الذي يتشبه باربطة نجوم والقريب من كوكبة القيثارة ، يحابه كوكبة الجاني . اما جسمه فيمتد بين كوكبتين الدب الاكبر والاصغر . وذنبه منحرف نحو القطب || والعرب تسمي النجم الذي على اللسان « الرابض » ، والاربعة التي على الرأس العوائد ومنها « انور العوائد » و « اخفى العوائد » و « رأس الثعبان » . وفي وسط العوائد نجم صغير جداً يدعى « الربيع » . وتسمي النيرين اللذين على مؤخره « اللذين » . والاثنتين اللذين هما في غاية الخفاء ، قبل اللذين ، « اخفار اللب » . وفي أصل اللب نجم يدعى « اللين » .

٥٦٩٨ - تينين مجنح * (S). Dragon ailé (F). Flying dragon (E).

جنس حيوانات زحافة من العطاء المحميات الالسة . انواعها المعروفة ٨ اعطانها الهند الصينية وجزر الزابج جميعها صغيرة القد تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . تحمل على جانبيها اجنحة غضروفية تلشرها كالمظلة ساعة تشاء تتمكنها من الانتقال بين الاشجار حيث تعيش . قوتها الحشرات والهوام .

٥٦٩٩ - تهبط (F). Coliou à joues blanches (F).

طائر من الموزاييات يدعى حنطور ابيض المحاسر ، اطله .

٥٦٨٢ - تنوخ جماعي (F). Synécologie (F).

التنوخ اي علم اثر البيئة الذي يشمل جماعة نباتية تعيش في منطقة معينة محدودة || ويقابل التنوخ الجماعي تنوخ نوعي او فردي يقتصر على نوع واحد من النبات او على فرد واحد دون سواء .

٥٦٨٣ - تنوخي (F). Ecologique (F). Ecological (E).

ما هو منوط بالتنوخ اي باثر البيئة على الكائنات الحية .

٥٦٨٤ - تنور (F). التنور هو الكانون يخبز فيه . وهو محفل ماء الوادي . وكل مفجر ماء .

٥٦٨٥ - تنوط * (S). Tisserin (F).

Weaver-bird (E). جنس عصافير صغيرة القد ، بحجم الدوري ، من فصيلة التنوطيات . انواعها عديدة موطنها البلاد الحارة . اثنائها متراكبة الالوان فيها الاسود والابيض والاصفر والاحضر . تعيش جماعات كبيرة قوتها البزور والحشرات . تألف مجاري الماء . يقال لها النساجة لانها تنسج عشها وتحبكه بعناية فائقة . فيبدو بشكل ققمة متدلية فوق سطح الماء رباطها خيوط ليفية قوية || الاثنى تبيض من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها اما الذكر فيعتني بالصفار من يوم نقفها الى حين طيرانها .

٥٦٨٦ - تنوطيات (S). Ploceidae (S).

Plocéidés (F). Ploceidae (E). فصيلة طيور من الجواثم الخروطيات المناقير . اجناسها عديدة جميعها صغيرة القد اشهرها التنوط .

٥٦٨٧ - تنوم (F). Hemp-seed (E). Chenevis (F).

ويدعى الطلام والقنيز وحب الشاهدانج .

٥٦٨٨ - تنوم (S). Trolle (F). Globe-flower (E). Trollblume, Trollen (D). Luparia, Papparia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من الخربقيات وفصيلة الشقيقيات . اوراقها متعاقبة كفية مفرصة . ازهارها جميلة مستديرة عديدة البتلات تزرع للزينة || انواعها البرية والزراعية عديدة اعرفها ما يلي .

٥٦٨٩ - تنوم اوروبي * (S). Trolle d'Europe, Boule d'or (F).

عشبة برية وزراعية تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ازهارها تاجية ، قرصية ، وحيدة ، كروية الشكل لونها الى الصفار العابق || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩٠ - تنوم اسيوي (S). Trolle d'Asie (F).

عشبة تزيينية تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها كبيرة القد لونها الى الصفار البرتقالي ، ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٥٦٩١ - تنوم الصين (S). Trollius chinensis (S). Trolle de China (F).

عشبة برية وتزيينية متبها الصين تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم .



تنوط



تنوم اوروبي



تينين مجنح

٥٧١٥ - **تَوَاقُتْ** (F). Isochronisme (F). Isochronism (E).
هو تساوي الدوام أو المدة .

٥٧١٦ - **تَوَالٍ ، خَلَوِيَّات** (F). Métazoaires (F).
Metazoa (E).

هي الحيوانات الدنيا من ذوات الخلايا المتعددة . تنمو وتتجمع بانقسام البويضة . وهي مركبة من خلايا كثيرة مختلفة الشكل والوظيفة . كما وأنها تقسم الى فئتين فئة ذوات المسام التي تتغذى بواسطة مسامها الدقيقة القائمة على سطوح أجسامها وفئة ذوات القناة الهضمية التي تتغذى بواسطة افواهها اللاقطة :

٥٧١٧ - **تَوَالِد** Reproduction
هو التناسل راجعه .

٥٧١٨ - **تَوَالِدٌ خَارِجِيٌّ** (F). Ectogénèse (F).
Ectogenesis (E).
النمو خارج الجسم .

٥٧١٩ - **تَوَام** (F). Jumeau (F). Twin (E).
التوأم من جميع الحيوان : المولود مع غيره في بطن واحد .
ج توأم وتوأم .

٥٧٢٠ - **تَوَامَان**
التوأمين عشبة صغيرة لها ثمرة مثل الكمون كثيرة الورق تثبت في القيعان مسطحة ولها زهرة صفراء (أبو حنيفة) .

٥٧٢١ - **تَوَامِي** (F). Gémíné (F). Geminé (E).
نعت وصفي يدل على كل ما هو ثنائي الترتيب .

٥٧٢٢ - **تَوَامِي الزَّهَر** Gémelliflore, Gémíniflore
نعت وصفي يطلق على الازهار الشفعية العدد ، الثنائية الترتيب .

٥٧٢٣ - **تُوبَال الحديد ، خَبَث الحديد ، سكوري توماس ، فُسْفَاة توماس**

Phosphates métallurgiques, P. Thomas, Scories de déphosphoration, S. Thomas
نوع من الاسمدة الفسفورية المعدنية القاعدية الناجمة عن صناعة الحديد والناتجة عن استعمال طريقة توماس في تحويل الفسفور المفصول عن الحديد الى فسفات الكلس || مظهره الخارجي مسحوق ناعم ، رصاصي اللون ، قليل التحسب بالرطوبة ، ثقيل الوزن النسبي ، لا يذوب بالماء العذب نظراً لاتحاد الحامض الفسفوري بالكلس والسيليس ولا ينجرف بمياه الري ولا يغور من الامطار بل يذوب تدريجياً تحت تأثير المياه المشبعة بالحوامض العضوية ، اغصها الحامض الكربوني || ومن ميزات الخاصة ان املاح التربة وحوامضها لا تمنع انفعاله وتمثيله . اما متوسط تركيبه العنصري فهو ما يلي :

حامض فسفوري	من ١٥	الى ٢٣ %
كلس	من ٤٥	الى ٥٥ %
سيليس	من ٧	الى ١٠ %
أكسيد الحديد	من ٧	الى ٩ %
منغنيزا	من ٤	الى ٥ %
منيزا	من ٢	الى ٦ %

ويحوي ايضاً بعض العناصر المكونة الزهيدة النسبة كالكبريت والنحاس والكروم والكوبلت الخ ... يستعمل أولاً في تسميد الاشجار المثمرة على اختلاف اجناسها وانواعها ثم في تسميد معظم الزراعات الحولية كالحنظل

٥٧٠٠ - **تَهْنِيد** (F). Défécation (F).
Defecation, Clarification (E).
هي في صناعة السكر ، تصفية العصارة السكرية بواسطة الكلس .

٥٧٠١ - **تَهْنِجِين** (F). Hybridation (F). Hybridization (E).
هو في النبات تأبير نباتان من نوعين أو ضربين مختلفين .

٥٧٠٢ - **تَهْدِيب** (F). Cueillette (époque) (F).
Gathering-time (E).
زمن جني الثمار .

٥٧٠٣ - **تَهْدِيل ، تَهْصِير**
انعطاف والتواء اغصان الشجرة نحو الارض .

٥٧٠٤ - **تَهْرِيف** (F). Précocité (F). Precocity (E).
هو الابكار ، اطلبه .

٥٧٠٥ - **تَهْمَة** Terre orientée vers la mer
التهمة والتهم والتهائم والتهام : الارض المنصوبة الى البحر .

٥٧٠٦ - **تَهْنُون** * (S). Bathyergus (S).
Bathyergue, Oryctère (F).

جنس حيوان من فصيلة الخلديات . انواعه قليلة العدد . اجسامها اسطوانية غليظة طويلاً نحو ٢٥ سم . قوائمها قصيرة . اطرافها جاسة قوية . عيونها خرزية صغيرة . آذانها لا قوفية . اذنانها تحمل شعر تعلق جرداع . اثوابها كثيفة الشعر لونها الى الصهبة المختلفة الموج تعبق مع اقترابها من ثبج الظهر || اناته تضع من الجروين الى الاربعة . يألف الشطوط الرملية . اجحاره عميقة الغور ، متشعبة الالتقاء العديدة . قوته ما استطاع من النبات .

٥٧٠٧ - **تَهْوِيَة** (F). Aération (F). Airing (E).
اطلاق المجال للهواء الرطب .

٥٧٠٨ - **تَهْيِئَة** (F). Préformation (F).
Preformation (E).
نظرية علمية تعتبر ان جميع اعضاء الجسم مهينة شكلياً في الملقوحة .

٥٧٠٩ - **تَهْيِئَة الغَرْسَة** (F). Habillage du plant (F).
عملية زراعية الغاية منها تحضير الغرسة قبل وضعها في التربة وذلك بتشذيبها وتخفيف جذورها الكثيفة واقتطاع المعطوب منها الخ .

٥٧١٠ - **تَوَائِل** Condiments
هي المواد التي تضاف الى الاطعمة فتزيد الشهوة الى اكلها . والملح هو التابل الرئيسي للحيوان .

٥٧١١ - **تَوَاتُر** (F). Fréquence (F). Frequency (E).
التواتر هو التكرار الموقوت .

٥٧١٢ - **تَوَاتُرُ الاَخْطَار** (F). Fréquence des risques (F). Frequency of risks (E).
تكرار الاخطار في ظروف واوقات تبث الرية .

٥٧١٣ - **تَوَازُن القِيَوِي** (F). Equilibre des forces (F).
Equilibrium of forces (E).
هي المعادلة الحقيقية بين القوى المختلفة .

٥٧١٤ - **تَوَاطُؤ** Collusion
هو الاتفاق سراً بين اثنين أو اكثر على ايقاع الضرر بالغير .



تهنون

٥٧٣٠ - تَوْتُ الْعَلِيْق * Ronce framboise (F).

Loganberry (E).

هلاج من الفرايمبواز والعليق صار تحقيقه في امريكة وهو جنبه معمرة مشمرة شائكة سوقها مدادة تطول من ٣ الى ٤ امتار. اوراقها مركبة لاقياسية التجسيم. وريقاتها شديدة الخضار، بارزة العروق، مسنة الحافة، خلية الصفحة السفلى. ثمارها شاميل كبيرة القند وردية اللون لذيدة الطعم. زراعتها تدوم من ١٢ الى ١٥ سنة. تتكاثر بالفسائل التي تغرس على ابعاد بينية تراوح من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم. وابعاد متخللة تراوح من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. || وهي ترطب في الارربة العميقة، المتوسطة الاندماج، الحسنة التركيب.

٥٧٣١ - تَوْتُ الْوَرَق Broussonetia papyrifera,

Morus papyrifera (S). Broussonétie, Mûrier à papier (F). Paper-mulberry (E). Japanischer papierbaum (D). Gelso papirifero, Moro da carta (I).

نوع من التوت الزراعي الصناعي مهدد الشرق الأقصى. اشجاره تعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقه معنقة متعاقبة كاملة مسنة الحافة، ملساء النصل. ازهاره ثنائية المسكن. ثماره شمولية حراء اللون. قشور قصبانه تستعمل في صناعة الورق الصيني.

٥٧٣٢ - تَوْتَة ، تَوَلَة ، تَهْوَل Mûre (F).

Mulberry (E).

ثمرة التوت.

٥٧٣٣ - تَوْتَر Tension

حالة ما هو متوتر.

٥٧٣٤ - تَوْتِيَا Tuthie, Tutle (F). Tutty (E).

التوتيا والتوتياء هي اكسيد الزنك، اطلب ذلك.

٥٧٣٥ - تَوْتِيَا ، كَرْتَمَان Echinus melo (S).

Oursin melon (F). Sea urchin (E).

نوع من الاخينوس المأكول. اعطانه بحار البلاد الحارة يكثر في بحري المتوسط والقلزوم وهو كروي الشكل كبير الشوك مستطيل الجرامز الدقيقة المنتية بمحاجم ونمية القدر.

٥٧٣٦ - تَوْتِيَا Moracées, Morées (F).

Moraceae (E).

سبط من فصيلة الانجريات اجناسه وانواعه عديدة اشهرها التوت.

٥٧٣٧ - تَوْتِيَا Sorosa

شكل من اشكال التار يشبه التوتة.

٥٧٣٨ - تَوْجِيَه Orientation

راجع انحاء.

٥٧٣٩ - تَوْجِيَه الْيَمِين Délation de serment (F).

Informing of oath (E).

هو الزام احد الخصوم بحلف اليمين.

٥٧٤٠ - تَوْجِيَه Dirlisme (F). Dirligism (E).

التوجيهية مذهب سياسي اقتصادي زمانه بيد السلطة. راجع انتعائية.

٥٧٤١ - تَوْخِيْف Macération (F). Maceration (E).

اطلب ونحف.

والبطاطا والبوندر والبندورة والباذنجان وقصب السكر والتبوغ والزرور والنباتات الزيتية. ولما كان لا يجوز مزجه بسائر الاسمدة على السواء نقول:

١ - انه يمكن مزجه قبل الاستعمال وبدون تحديد وقت بنيترات الصودا ونيترات الجير والسياناميد ومساحيق العظام.

ب - انه يمكن مزجه عند الاستعمال فقط باملاص البوتاس وبصلحات الجص والمغنيزا والبورق.

ج - لا يجوز مزجه بالاسمدة الامونياكية كسلفات الامونياك ونيترات الامونياك وسلفونيترات الامونياك.

د - لا يجوز استعماله مع الاسمدة العضوية كروث الماعز ونشكة الخيل ونخي البقر وبعير الجبال وسلح

الدجاج الخ... الا بعد توزيع وطمر هذه الاسمدة بنحو اسبوعين.

٥٧٢٤ - تَوْبِير

التوبير: اخفاء معالم الاثر وقد يمارسه عفواً بعض الحيوان كالارنب الوحشي، القواقع.

٥٧٢٥ - تَوْت ، تَوْت ، تَوْت ، فَرَصَاد Morus (S).

Mûrier (F). Mulberry-tree (E).

جنس اشجار برية وزراعية من سبط التوتيات منبها البلاد الحارة وقد انتشرت في معظم الاصقاع المعتدلة || انواعه المعروفة لا تقل عن ٢٥ منها التوت الابيض الذي يربي عليه دود القز ومنها التوت الاسود المأكول الثمار والتوت الاحمر الخ.. جميعها لبينة العصارة سلبية الازهار.

٥٧٢٦ - تَوْت أبيض، تَوْت الْقَز Morus alba (S).

Mûrier blanc (F). White mulberry-tree (E). Weisser maulbeerbaum, Weisse maulbeer (D). Moro, Gelso blanco, G. moro, G. romano (I).

نوع من التوت الزراعي الصيني الاصل. ساقه فراء. اوراقه عابلة، معنقة، متعاقبة، قلبية الشكل، نصلها اخضر اللون، ثلاثي او خماسي التفصيص. ثماره شاميل مستطيلة، قصيرة الاذن، بيضاء او وردية اللون، مأكولة حلوة المذاق || اوراقه غذاء دود القز.

٥٧٢٧ - تَوْت أَحْمَر Morus rubra (S).

Mûrier rouge (F). Red mulberry-tree (E).

نوع من التوت الزراعي التريبي. اشجاره كبيرة القند تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. اغصانه غليظة فارشة. اوراقه معنقة متعاقبة، نصلها قلبي الشكل، مستدير القاعدة، ناعم البشرة خلي الصفحة السفلى، خليا اطحل اللون. ثماره شمولية اسطوانية الشكل، ارجوانية اللون، تطول نحو ٣ سم. اخشابها ناعمة الرقعة، صلبة المكسر، صفراء اللون، تستعمل في الصناعات الخشبية.

٥٧٢٨ - تَوْت أسود* ، تَوْت شَامِي Morus nigra (S). Mûrier noir (F). Black mulberry,

Sycamine, Blackberry bush (E). Schwarzer maulbeerbaum (D). Gelso nero (I).

نوع من التوت الزراعي الشرقي المنبت يزرع لثماره المأكولة المرية. اشجاره دائمة كبيرة القند تعلو من ٨ الى ١٥ م. اوراقه عابلة معنقة متعاقبة قلبية الشكل خشنة الملمس زباء الصفحة السفلى قائمة الخضار. ثماره شاميل لذيدة الطعم لوئها الى السواد الاحمر.

٥٧٢٩ - تَوْت الْأَرْض Fralsier (F).

Strawberry-plant (E).

هو الثيلك، اطلبه.



توت أسود



توت العليق

٥٧٤٩ - تودس ^٥ Todus (S).

Todier (F). Todus (E).

جنس طير من فصيلة التودسيات . انواعه المعروفة عديدة جميعها من عصافير امريكة الوسطى وجزر الانتيل || اجسامها صغيرة تطول من ١١ الى ١٣ سم . مناقيرها مستطيلة ، مبططة ، ذرّة الملاقط . السنتها رقيقة ، قرنية الطرف . اجنحتها عريضة ، معتدلة الطول . اذنانها مقطوعة . ارساغها قصيرة || قوتها الحشرات والهوام . تدثن في تجاويف الاشجار أو في اوجار تخلدها في التربة على عمق ٢٠ او ٣٠ سم . اوجارها انفاق مستطيلة تنتهي بردها فسيحة كروية الشكل تبطتها الاناث بالحشيش والتيل || أشهر انواعه التودس الاخضر .

٥٧٥٠ - تودس أخضر ^٥ Todus viridis (S).

Todier vert (F).

نوع من التودس . موطنه يشمل معظم مناطق امريكة الوسطى . يألف المواقع المبعثرة الاشجار ثم الادغال ولا يخشى الاقتراب من الاماكن الآهلة || جسمه صغير القد طوله نحو ١٢ سم وبسطه نحو ١٨ سم . ثوبه متباين الالوان . ظهره الى الخضار الازرق الموج . جناحاه الى الخضار الاغبر الاريد . زوره وردي اللون . جوشنه الى الربدة الصنابية الموج . بطنه الى الصفار التني . ذنبه اخضر القاعدة والوسط ، اطحل الاطراف . منقاره ورغناه حمر || قوته الحشرات والهوام يقتنصها طائفة ويلتقطها سارحة على الاشجار || يدثن افحوصه في وجار يخلده في التربة على عمق ٢٥ سم . مسلكه نفق مستطيل ، عديد التعاريج ، لا يقل طوله عن ١٢٠ سم . || الانثى تحضن من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها تتألف من ٤ الى ٥ بيضات ترخها وحدها بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٥٧٥١ - تودسيات ^٥ Todidae (S).

Todidés (F). Todidae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها جميع الاقاليم الحارة من البلاد الامريكية . تألف الادغال والغابات || اجسامها صغيرة القد . تتميز بمناقيرها المبطة ، المستعرضة القواعد || اعرف اجناسها واشهرها التودس .

٥٧٥٢ - تودنة Nivellement (F). Surveying (E).

هي التفردين .

٥٧٥٣ - تودريج Sisymbra (F).

Hedge mustard (E).

راجع سمارة .

٥٧٥٤ - توراني Turonien

الساف الاوسط من الطبقة العلياشيرية .

٥٧٥٥ - تورد القمّة

مرض فتاك يسببه نوع من الفيرس المهم التحديد يصيب الموز فيركب عصارة النبات ويسير معها الى كامل الاعضاء || مظهره الخارجي سقم في النبات يعقبه نحول في الاوراق التي تبدو وردية اللون ، صغيرة الحجم ، ضيقة النصل ، ضمية التجميع تنشأها مادة شمعية لزجة تسبب صلك اليافها || وهو من اعطى امراض الموز واشدها فتكاً . ينقله الارق وغيره من الحشرات التي تعيش على عصارة النبات || يكافح باقتلاع وحرق النباتات الموصومة وبطهير التربة .

٥٧٤٢ - تود Sorbaria (S). Sorbaire (F).

جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات . اوراقها عابلة ، متعاقبة ، مركبة ، وتريه العدد الذي يراوح من ١١ الى ٢١ . وريقاتها سنافية النصل ، منشارية الخفاف . ازهارها عشكولية التجميع ، صندرة القد بيضاء اللون || انواعه المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

٥٧٤٣ - تود شجري ^٥ Sorbaria arborea (S).

Sorbaire en arbre (F).

نوع من التود . مهدد الهند . ساقه كبيرة غليظة تملو نحو عشرة امتار . اوراقه مركبة ، وريقاتها تطول من ٥ الى ٨ سم . وتعرض من ١٥ الى ٣٠ سم . نصالها خلية الصفحات السفلى . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم .

٥٧٤٤ - تود صيني ^٥ Sorbaria sinensis (S).

Sorbaire de Chine (F).

نوع من التود . موطنه بعض مناطق الصين . ساقه تملو من مترين الى ثلاثة امتار . افناده وافنانه جرداء اللحاء . اوراقه مركبة . وريقاتها ضيقة النصال الناعمة الملمس . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره نحو ١٨ سم .

٥٧٤٥ - تود ضيق الورق ^٥

Sorbaria angustifolia (S).

Sorbaire à feuilles étroites (F).

نوع من التود . موطنه بلاد الافغان . ساقه تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه تطول نحو ٢٢ سم . وتعرض نحو ١٤ سم . وريقاتها ضيقة النصال التي تطول نحو ٧ سم وتعرض نحو ١٣ سم . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره من ١٥ الى ١٨ سم .

٥٧٤٦ - تود غبيريالي الورق ^٥

Sorbaria sorbifolia (S).

Sorbaire à feuilles de sorbier (F).

نوع من التود . مهدد يمتد من اليابان الى سيبيرية . ساقه تملو من متر الى مترين . افنانه مزغبة اللحاء . اوراقه مركبة تطول نحو ٣٠ سم . وريقاتها تطول نحو ٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره يراوح من ٢٥ الى ٣٠ سم .

٥٧٤٧ - تود كبير الزهر ^٥

Sorbaria grandiflora (S).


Sorbaire à grandes fleurs (F).

نوع من التود . موطنه بعض المناطق الروسية اخصها سيبيرية . ساقه تملو من ٦٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة . وريقاته قصيرة النصال الضيقة تطول من ٢ الى ٤ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم . عشكوله الزهري صغير القد قطره نحو ١٢ سم . ازهاره مستطيلة كبيرة .

٥٧٤٨ - تود منتصب ^٥ Sorbaria assurgens (S).

Sorbaire dressée (F).


نوع من التود . مهدد الصين . ساقه تملو من مترين الى ثلاثة امتار . افنانه جرداء اللحاء . اوراقه مركبة . وريقاتها خلية الصفحات السفلى . عشكوله الزهري كبير القد ، قطره نحو ٢٥ سم .




ورقة تود شجري



تودس اخضر



تورم مصري




توريلس



تورينيه زرقاء



توز صندلي



توز مخزني

اهليلجية الشكل ، تطول من ٢ الى ٤ سم. وتعرض من ٨ الى ١٦ م. نصالها مسننة الخفاف. ازهارها هامي. ازهارها الى الارجواني اللبس. قطر الزهرة نحو ٣٥ م. تنويرها صيفي. منبتها بعض اصقاع الهند ومليزيا.

٥٧٦٤ - **تورينيه اسيوية** (S). *Torenia asiatica* (F).
Torénie asiatique (F).

نوع من التورينيه. عشب حولية معتدلة الحجم تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. ساقها ملساء. اوراقها متقابلة، مسننة، اهليلجية الشكل، تطول من ٣ الى ٥ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٨ م. نصالها مسننة الخفاف. ازهارها محوري الانتشاب، شبه عثكولي التجميع. ازهارها ارجوانية اللون يعلوها موج ليكني. تنويرها يستمر من الصيف الى الخريف. منبتها الهند وسيلان وجاوا وقد انتشرت زراعتها التزيينية في معظم اقطار العالم.

٥٧٦٥ - **تورينيه زرقاء** *

Torenia Fournieri (S). *Torénie de Fournier* (F).
نوع من التورينيه. عشب حولية معتدلة الحجم. ساقها ملساء تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها متقابلة، مسننة، تطول من ٢ الى ٤ سم. نصالها قليلة القواعد، ذلقة الاطراف، منشارية الخفاف. ازهارها محوري الانتشاب. ازهارها بنفسجية الكؤوس، زرق البتلات الملية، قطرها نحو ٤ سم. تنويرها صيفي. منبتها الهند الصينية وقد عمت زراعتها التزيينية معظم اقطار العالم.

٥٧٦٦ - **تورينيه صفراء** (S). *Torenia flava* (S).
Torénie jaune (F).

نوع من التورينيه، عشب حولية صغيرة القد. ساقها مزغبة تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. اوراقها متقابلة، مسننة، تطول من ٢ الى ٤ سم. نصالها بيضية الشكل، مسننة الاطراف. ازهارها محوري هامي. ازهارها صفراء اللون. تنويرها صيفي. منبتها البلاد الاسيوية اخصها الهند الصينية وصومترا.

٥٧٦٧ - **توز** (S). *Pterocarpus* (F).

جنس اشجار وشجيرات حرجية وزينية من فصيلة القرنيات الفراشية. انواعه نحو ٢٠ اوراقها متعاقبة مركبة ثلاثية. وريقاتها بيضية النصل الجامد المماس البشرة. ازهارها بيض وصفر. ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع، محوري الارتكاز او هامي. اخشابها صناعية فاخرة الصنف. اشهر انواعه ما يلي.

٥٧٦٨ - **توز صندلي** *، صندلان

Pterocarpus santalinus (S). *Ptérocarpe santal* (F).
Red sandal wood, Ruby wood (E). Roter sandelbaum (D). Sandalo rosso (I).

نوع من التوز الطبي والصناعي. شجرته كبيرة القد. ازهاره طيبة. اخشابها صناعية مرغوب فيها ويستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال.

٥٧٦٩ - **توز مخزني** *، دم الاخوين

Pterocarpus draco (S). *Ptérocarpe officinal*, P. sang-dragon (F). Dragon gum tree (E). Drachenbaum (D). *Pterocarpus draco* (I).

نوع من التوز الطبي والصناعي. شجرته كبيرة القد تعلو نحو ٢٠ م. اوراقها جميلة الخضار، طويلة الزناد. ازهارها الى البياض الاصفر. يستخرج منها عصارة حمراء اللون

٥٧٥٦ - **تورق الزهر** Chloranthie (F).

شذوذ جسموري يقبل الزهر ورقاً.

٥٧٥٧ - **تورم، قطقاط، سقساق، طير التمساح** Pluvianus (S).

Pluvian (F). Plover (E).

جنس طيور مائية من طوال الساق. انواعه قليلة جميعها صغيرة القد يلقاء الثوب تحمل في جناحيها شوكتان هما سلاحها. يقال انها تدخل في التمساح وتثنيه. من اللود وتخرج واذا اطبق عليها التمساح فـ نخسته فيفتح فاه فتخرج || قوتها انديدان والحشرات وبعض البزور. تألف الانهار والبحيرات الافريقية. تدن افعوصها في رمال الشواطئ || اعرف انواعه واشهرها التورم المصري.

٥٧٥٨ - **تورم مصري** *، أبو ظفر

Hoplopterus spinosus (S). Pluvian d'Egypte (F).
Spur-winged plover (E).

نوع من التورم يألف ضفاف النيل وسائر انهر وبحيرات افريقية الشرقية والشمالية. طوله نحو ٢٢ سم. ثوبه ابلق اللون يعيش كالحمام ذكراً وأنثى. عدد سربه يراوح من اربعة الى ستة ازواج.

٥٧٥٩ - **تورمالين** Tourmaline (F).

Tourmaline (E).

التورمالين مادة معدنية متبلورة مركبة، خاصة، من بوروسيليكات الالومنيوم وتحتوي بغض البوتاس والصودا والمغنيزا والليثين واكسيد الحديد واكسيد المنغنيز || ثقلها النوعي يراوح من ٢,٩ الى ٣,٢. درجة صلاقتها من ٧ الى ٧,٥ وهي اصلد من المرمر واقل صلادة من الزبرجد || من ابرز خصائصها تكهرجها بالاحتكاك. لونها السائد الاسود ومنها الاحمر والازرق والاخضر والاصفر. ومنها الشفاف وشبه الشفاف والمتم || تستعمل استعمال الاحجار الكريمة في مصنوعات الخلى.

٥٧٦٠ - **توريق** Feuillaison (F). Foliation (E).

هو تجدد ورق النبات السنوي.

٥٧٦١ - **توريلس** * Torilis (S). Torillide (F).

Hedge parsley (E). Zirmet, Drehkraut (D).
Torillide (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومحولة من فصيلة النجيليات. انواعه عديدة بعضها من نباتات الاراضي المذحاة والبعض الآخر يوجد في الاسراج الجبلية. اوراقها مركبة وزرية او شفعية التفصيل الريشي.

٥٧٦٢ - **تورينيه** Torenia (S).

Torénie (F). Torenia (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الخنازيريات. معقودة التعريف على اسم العلامة السويدي «ألف تورين» سوقها منتصبية، مركبة الزوايا والصلوع. اوراقها متقابلة. ازهارها معتدلة الحجم. كؤوسها مخمسة الفصل الملية || انواعها المعروفة نحو ٦٠ اشهرها الاربعة التابعة.

٥٧٦٣ - **تورينيه ارجوانية**

Torenia atropurpurea (S).

Torénie pourpre foncé (F).

نوع من التورينيه. عشب حولية صغيرة القد تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. ساقها ملساء. اوراقها متقابلة، مسننة،

Acclimatation (F). ٥٧٨١ - **تَوْطِين**

Acclimatization (E). راجع تبليد .

Tugon ٥٧٨٢ - **تَوْغُون**

حاشور يستعمل في مكافحة حشرات المنازل والاسطبلات والزرائب اخصها الذباب وبنات وردان (الصراصير) والجذاجد واللاحسات والنمل || استعماله يستوجب بمض اليقظة لانه يحذر ان يكون بمتناول الحيوانات .

Epargne (F). Saving (E). ٥٧٨٣ - **تَوْفِير**

هو الادخار ، اطلبه .

Combinaison (F). Combination (E). ٥٧٨٤ - **تَوْفِيق**

جمع الاشياء وتدميجها وفقاً لترتيب مقرر . ج توافيق وتوفيقات .

Dipterocarpus (S). ٥٧٨٥ - **تَوْفِيل** *

Diptérocarpe (F).

جنس اشجار حرجية وصناعية من فصيلة التوفيليات . انواعه المعروفة نحو ٢٥ اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من القارة الاسيوية والجزر || جميعها اشجار كبيرة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضجة النصال . ازهارها كبيرة . ثمارها ليفية البث الذي يلف عجمة صغيرة || اخشابها صناعية ويستخرج منها مادة زيتية داملة تنفع الجرح .

Dipterocarpaceae (S). ٥٧٨٦ - **تَوْفِيلِيَّات** °

Diptérocarpacées (F). Dipterocarpaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة التعاللات مرتفعة المبيض . انواعها المعروفة نحو ٢٠٠ تجمعها سبعة اجناس . اعطانها معظم مناطق البلاد الاستوائية || جميعها اشجار وشجيرات . سوقها مائلة القشور ، فرعاء اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالها غائرة العروق المتوازية الترتيب ، مبعثرة العدد المشحونة بمواد دهنية راتنجية . ازهارها كبيرة . ثمارها فقيرة ، اخنية وقينة . اخشابها صناعية || اشهر اجناسها التوفيل والتيلك .

Chronométrage (F). ٥٧٨٧ - **تَوْقِيت**

Time-Keeping (E).

التوقيت تحديد المقياس الزمني .

Mutage (F). ٥٧٨٨ - **تَوْقِيف الاختيار**

راجع ايقاف الاختيار .

Confirmation ٥٧٨٩ - **تَوْكِيد**

راجع اقرار .

٥٧٩٠ - **تَوْكِيل الحساب**

Affirmation d'un compte (F). Affirmation an account (E). الاقرار بصحة الحساب .

Procuration ٥٧٩١ - **تَوْكِيل**

تعيين نطاق الاعمال التي اسندت الى الوكيل .

Nidation (F). ٥٧٩٢ - **تَوْكِين** °

التوكين استقرار البويضة المزكوبة في الغشاء المخاطي الرحمي عند ابتداء الحمل في اناث القبونات .

Tularémie (F). ٥٧٩٣ - **تَوْلَارِيَع**

مرض يصيب القواضم فيسم دما ويميتها .

تدعى دم الاخوين تستعمل في بعض المستحضرات الصحية والطبية . خشبها احمر اللون ، ناعم الرقعة صلب المكسر فاخر الصنف مرغوب فيه .

Pterocarpus angolans (S). ٥٧٧٠ - **تُوْز مرجاني**

Ptérocarpe d'Angola (F). Angola wood (E).

نوع من التوز مهدد افريقية الاستوائية . شجرته كبيرة القد . خشبها فاخر الصنف مرجاني اللون يعرف بالخشب المرجاني الصلب .

Pterocarpus marsupium (S). ٥٧٧١ - **تُوْز مَلَبَار**

Ptérocarpe du Malabar P. d'Amboine, Kino (F).

نوع من التوز . شجرته متوسطة القد ثماره حامزة الطعم صناعية يستخرج منها مادة قريبة من الكاد تستعمل استعماله .

Pterocarpus indicus (S). ٥٧٧٢ - **تُوْز هندي**

Ptérocarpe de l'Inde (F). Red sandal wood, India wood (E).

نوع من التوز مهدد الهند . شجرته كبيرة القد . خشبها فاخر الصنف احمر اللون مرغوب فيه ، يعرف بخشب السندل الاحمر .

Tuzet (Tuzan) ٥٧٧٣ - **تُوْزيت** °

التوزيت او التوزان فطور زراعي مركب يرتكز على عدة مواد فعالة اخصها مشتقات الزنك والزنك || يستعمل في مكافحة تبغ الاشجار المثمرة اخصها الاجاص . يركز المحلول بمعدل ١٢٥/١٠٠ اي ١٢٥ غ . توزيت لكل ١٠٠ لتر ماء || يباشر بالاستعمال بعد سقوط التويجات الزهرية لانه يؤدي النحل . ويمنع النضج قبل جني الثمار باربعة اسابيع .

Répartition (F). Distribution (E). ٥٧٧٤ - **تُوْزيع**

هو قسمة او تجزئة اموال او تركة او موجودات ودفع كل حصة الى مستحقها .

٥٧٧٥ - **تُوْزيع الاسمدة**

Epandage des engrais (F).

هو ذر الاسمدة او نشرها على التربة .

Répartement (F). ٥٧٧٦ - **تُوْزيع الضرائب**

Assesment (E).

تعيين محصنات المناطق الادارية بما استوفي من الضرائب .

٥٧٧٧ - **تُوْزيع المحاصة**

Distribution par contribution (F).

هو التوزيع على القرواء بالنسبة الى ديونهم .

Desquamation (F). ٥٧٧٨ - **تَوْسُف** °

Desquamation, Peeling (E).

عارض يصيب البشرة فتتقق وتنقشر كالخراشف الصغيرة .

٥٧٧٩ - **تَوْسِيع ، تَفْسِيع ، تَفْرِيع**


Eclaircie (F). Opening (E).

هو قطع بعض الاشجار النحيلة او القريبة من رفيقاتها بنية ترك الفسحة اللازمة لنمو الاشجار الباقية . وهي من الاعمال الحرجية .

Pathogénicité (F). ٥٧٨٠ - **تَوْصِيم** °

Pathogenesis (E).


التوصيم مبحث في اسباب تناسل الازعاج .



توفيل



توليب الزعارين



توليب إيشر



توليب برّي



توليب عين الشمس



توليب كوفن

٨ سم. لونها الى الصفار الزاهي السوي الموج || ازهاره يدوم طوال شهر ايار .

٥٨٠٤ - **تُولِب عَطِر** Tulipa suaveolens (S).

Tulipe odorante (F).
نوع من التوليب اوراقه صغيرة النصل الضيق . شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. زهرته قواحة العرف العطري تطول نحو ٧ سم. ثوبها الى الحمرة القرمزية حثارها مذهب اللون او ارجواني || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٥ - **تُولِب عَيْنِ الشَّمْسِ***

Tulipa oculus-solis (S). Tulipe œil du soleil (F).
نوع من التوليب اوراقه قليلة العدد نصلها يطول نحو ٢٥ سم. ويعرض نحو ٤ سم. شراخه يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. زهرته كبيرة القد ، حمراء اللون ، بنفسجية القاعدة المطوقة بالاصفر || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٦ - **تُولِب كلوزيانه** Tulipa clusiana (S).

Tulipe de l'Ecluse (F).
نوع من التوليب اوراقه ضيقة النصل . شراخه يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. زهرته وردية اللون يعلوها تجذيع ابيض ومشعة غبراء . اقلامها واسديتها الى السمرة اللامعة || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

٥٨٠٧ - **تُولِب كُوفَن*** Tulipa kaufmanniana (S).

Tulipe de kaufmann (F).
نوع من التوليب اوراقه مستطيلة القد عريضة النصل . شراخه يعلو نحو ٥٠ سم. زهرته كبيرة الحجم تطول نحو ٨ سم. لونها الى الصفار الزاهي يعلوه توشيم احمر || ازهاره ربيعي .

٥٨٠٨ - **تُولِب مِبْكَار** Tulipa praecox (S).

Tulipe précoce (F).
نوع من التوليب اوراقه ٤ نصلها يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ويعرض نحو ٨ سم. شراخه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. زهرته مستطيلة قليلة الانشراح لونها الى الحمرة القرمزية يشوبها تمشيع داخلي وسطي الارتكاز اصفر اللون || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٥٨٠٩ - **تُولِب مُدَبَّب** Tulipa acuminata (S).

Tulipe cornue (F).
نوع من التوليب اوراقه مستعرضة النصل المدبب الطرف . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم. زهرته كبيرة القد تطول نحو ١٠ سم. لونها الى البياض الوردى تعلوه مشعة عتيقة صفراء الموج || ازهاره يستمر شهراً واحداً .

٥٨١٠ - **تُولِب مِشْخَر** Tulipa strangulata (S).

Tulipe tardive (F).
نوع من التوليب اوراقه مستطيلة القد . ضيقة النصل الازغب المجنح . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٤٥ سم. زهرته قرمزية اللون || ازهاره يستمر شهراً واحداً .

٥٨١١ - **تُولِبِيَّات** Tulipacées (F). Tulipaceae (E).

سيط من فصيلة الزنبقيات انواعه وضروبه كثيرة العدد جميعها بصلية . بصلها مكرر الشكل . سوقها قرصية الانتشاب ، شراخية ، جوفاء . ازهارها فردية ، هامية ، تركيب الشراخ .

٥٨١٢ - **ثوم** Ail (F). Garlic (E).

اطلب ثوم زراعي .

٥٧٩٤ - **تُولِب** Anon (F). Ass's foal, Young ass (E).

التولب هو الجحش . ويقال للثان ام تولب . ويقال اطوع من تولب .

٥٧٩٥ - **تُولَج ، دُولَج**

التولج الكناس الذي يلج فيه الطيبي وغيره من البهيم . وقد يتخذ في اصول الشجر .

٥٧٩٦ - **تُولِب** Tulipa (S). Tulipe (F).

Tulip (E). Tulpe (D). Tullipano (I).

جنس نباتات بصلية برية وزينية من سبط التوليبات وفصيلة الزنبقيات . انواعه نحو ١٠٠ اما ضروره فتبلغ الالف . جميعها قرصية الاوراق المستطيلة العريضة النصل . سوقها شراخية جوفاء وحيدة الزهرة الهامية || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٥٧٩٧ - **تُولِب اُزْغَب** Tulipa pubescens (S).

Tulipe pubescente (F).
نوع من التوليب اوراقه شاحبة الخضار نصلها ضيق الصفحة المستطيلة ، خلي البشرة شراخه يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. زهرته متوسطة القد مختلفة الالوان || ازهاره يستمر طوال شهر نيسان .

٥٧٩٨ - **تُولِب الزَّهَّارِين*** Tulipa gesneriana (S).

Tulipe des fleuristes, Tulipe de Gesner (F).
اشهر انواع التوليب وأكثرها ضرورياً والواناً . اوراقه قليلة العدد ، عريضة النصل ، تطول نحو ٢٠ سم. شراخه امرط البشرة يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. زهرته كبيرة القد جؤوية القاعدة ملوانة الصفحة || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٧٩٩ - **تُولِب المُرُوج** Tulipe des prés (F).

هو عرار الغاب ، اطلبه .
Checkered lily (E).

٥٨٠٠ - **تُولِب إِيْشَلِر*** Tulipa Eichleri (S).

Tulipe d'Eichler (F).
نوع من التوليب اوراقه مستطيلة . نصلها ميزابي الشكل مرتفع الحثار . شراخه يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم. زهرته الى الحمرة القرمزية يعلوها تقيج اسود طوقه اصفر وابيض . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٨٠١ - **تُولِب بَرّي*** Tulipa sylvestris (S).

Tulipe sauvage (F).
نوع من التوليب اوراقه مستطيلة نصلها ضيق الصفحة . شراخه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. زهرته عطرية العرف لونها الى الصفار الزاهي . اقلامها واسديتها مهدبة الزغب . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٥٨٠٢ - **تُولِب توكستان**

Tulipa kolpakowskiana (S). Tulipe de kolpa-

kowski (F).
نوع من التوليب اوراقه مهدبة الحافة ضيقة النصل . شراخه يعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. زهرته مستطيلة الشكل ، نارية اللون || ازهاره يستمر شهراً واحداً .

٥٨٠٣ - **تُولِب زَنْبَقِي** Tulipa retroflexa (S).

Tulipe-lis (F).
نوع من التوليب اوراقه مستطيلة النصل الضيق . شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم. زهرته كبيرة القد تطول نحو

٥٨٢٠ - تُون معروف* ، تُون شائع

Thynnus thynnus (S). Thon commun (F). Common tunny-fish (E).

سمكة كبيرة القد يبلغ طولها نحو خمسة امتار ووزنها ٩٠٠ كيلو. ثوبها الى الازرقاق الفولاذي، ايطاليا الى الريدة بطنها فضي المواجه. تكثر في المحيط الاطلسي وفي شمالي البحر المتوسط.

٥٨٢١ - تُونَة
Toona odorant (F).
False cedar (E). هي السدرال شجرة حرجية وزينية.

٥٨٢٢ - تَوَهَج
Incandescence
سطوع الفياء من الاجسام الملتبة.

٥٨٢٣ - تَوَى
Insolvabilité (F). Insolvency (E).
راجع إعسار.

٥٨٢٤ - تَوِيَا
Thuya (F). Arbor vitae (E).
جنس اشجار حرجية وزينية دائمة الخضار من سبط السرويات وفصيلة الصنوبريات. انواعه خمسة مختلفة القد جميعها هرمية او مغزلية الشكل يراوح علوها من ٧ الى ٥٠ م. اوراقها صغيرة جميلة الخضار. اكاراها مخروطية صغيرة. اخشابها صناعية فواحة العرف. يستخرج منها مادة راتنجية شائعة الاستعمال. اشهر انواعه ما يتبع:

٥٨٢٥ - تَوِيَا شَرْقِيَّة* ، شَجَرَة الْحَيَاة

Thuya orientalis (S). Thuya oriental, Arbre de vie, A. de paradis (F). Arbor vitae, Chinese arbor vitae (E). Echter Fächerlebensbaum, Lebensbaum (D). Tuia d'Oriente, Albero della vita (I).

شجرة من التويا السروية البطيئة النمو المتوسطة القد تعلو من ٧ الى ١٥ م. اوراقها خافتة العرف لونها الى الخضار السوي الذي ينحرف الى الجؤوة من اواسط الخريف الى آواخر الشتاء ثم يعود الى الاخضر العابق فالزاهي فالباهت. اكاراها صغيرة مخروطية شديدة الخضار. تصلح للزينة. اخشابها صناعية.

٥٨٢٦ - تَوِيَا عَقْدِيَّة
Thuya articulé (F).
Sanderach tree (E). هي السندرک، اطلبه.

٥٨٢٧ - تَوِيَا كَبِيرَة* ، شَجَرَة الْحَيَاة الْكَبِيرَة

Thuya gigantea, T. plicata (S). Thuya géant, T. de Lobb, Arbre de vie (F). White cedar, Giant arbor vitae (E). Riesenlebensbaum, Gelbe cypresse (D). Tuia, Tuglia, Libocedrus (I).

شجرة من التويا السروية السريعة النمو الكبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٥٠ م. اوراقها صغيرة عابطة الخضار طحلاء الصلغ فواحة العرف اليلسي. اكاراها صغيرة مخروطية الشكل. تزرع لصدر الرياح. اخشابها صناعية.

٥٨٢٨ - تَوِيَج
Corolle (F). Corolla (E).
هو غلاف الزهرة الداخلي الذي يحيط بالامدية والمدقة.

٥٨٢٩ - تَوِيَجِيَّة
Pétale (F). Petal (E).
راجع بتلة.

٥٨٣٠ - تَبَار ، تَجْرَى
Courant (F). Current (E).

٥٨١٣ - تُوْمَافِيكْس

Tomafix
هرمون زراعي يستعمل على البندورة فيحثها على الازهار وينمغ تكوين البزور في الثمار || يركز المحلول بمعدل ١٪ وتنضخ الازهار عند انبلاجها. الليتر الواحد من المحلول يكفي نحو ٥٠٠ زهرة || يحسن استعمال مياه المطر واجتناب المياه الكلسية وعدم نضخ اوراق الشتل لانها تتحجن وتلتف.

٥٨١٤ - تُوْمَة
Œuf de l'Atruche (F).
Egg of ostrich (E).
التومة: بيضة النعام ج تؤم.

٥٨١٥ - تُوْمَلَة

Thaumalea (S).
Thaumalée (F). Thaumalea (E).
جنس حشرات من فصيلة التومليات ورتبة ذوات الجناحين. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها جبال البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، هيفاء، تطول من ٣ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة. عيونها صغيرة، متقاربة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ودقيقة، حشارية الفصل. ملاسها طويلة. مرافقها قصيرة. كواسلها مستطيلة. بطونها شبه افبوية الشكل. رواشها كبيرة، تبنية اللون. قوائمها مستطيلة || تألف المواقع الرطبة وضفاف مجاري الماء. قوتها رحيق الازهار. يرقاتها هواكة قوتها النفايات النباتية التي يكثر وجودها قرب الماء.

٥٨١٦ - تُوْمَلِيَّات

Thaumalaeidae (S).
Thaumaléidés (F). Thaumalaeidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المعروفة بتوسطة العدد، تألف البلاد الباردة والمناطق الجبلية || اجسامها صغيرة القد تطول من ٣ الى ٥ مم. رؤوسها صغيرة عيونها متقاربة عند الشقين. قرونها الاستشعارية دقيقة، حشارية الفصل، اقصر من الملامس، ملاسها طويلة. مرافقها قصيرة. كواسلها اهليلجية. رواشها كبيرة، تبنية اللون، صفراء المواجه || يرقاتها تعيش على المواد النباتية وعلى النباتات المجهرية كالمشطورات || اشهر اجناسها التوملة.

٥٨١٧ - تُون ، طُون ، تْن

Thynnus (S). Thon (F). Tunny-fish (E).
جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسقمريات ورتبة شائكات الزعانف. انواعه المعروفة قليلة. خمسة او ستة جميعها مأكولة يكثر وجودها في بحار الاقاليم الحارة. اشهرها الثلاثة التالية:

٥٨١٨ - تُون أَيْض* ، جُرْمُون ، كَنْعَد ، كَعْنَد

Thynnus alalonga (S). Thon blanc, Germon (F).
Whit tunny-fish (E).
سمكة من التون صغيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم. وزنها يراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ كيلو. ثوبها الى الزرقة الفاتحة يعلوها مواج اسفع. بطنها اغبر اللون فضي المواجه || يعتبر من اجود انواع التون وقد يكثر وجوده في المتوسط.

٥٨١٩ - تُون الْمتوسط*

Thynnus brachypterus (S).
Thon brachyptère (F). Brachypterus tunny-fish (E).
سمكة كبيرة يبلغ طولها نحو ٣ امتار ووزنها ٥٠٠ كيلو. ثوبها الى الريدة العابقة. بطنها فضي المواجه تكثر في البحر المتوسط والبحر الاسود.




تون أبيض



تون المتوسط




تون معروف



تويا شرقية



تويا كبيرة



تيتيس

متنصبة فرعاء تعلو من ٨٠ الى ٣٠٠ سم. أوراقها معنقة، متعاقبة، ثلاثية التفصيص والعروق تشبه أوراق التين. نصلها جامد الصلابة، خفي البثرة. ازهارها رؤسية، قرصية التجميع، مختلفة الالوان فيها الاصفر والبرتقالي والارجواني والاحمر. بزورها مستطيلة الشكل رباعية التضلع، متوجة القاعدة || ازهارها صيني.

٥٨٤٥ - تيتيس *
Tethys (S).

Téthys (F). Tethys (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم العديدة. انواعه المعروفة ثلاثة، اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة. تعيش معظم حياتها في القاع على اعماق تراوح من ٣٠ الى ١٠٠ م. || اجسامها عريضة، كبيرة، هلامية، اهليلجية، مبطلة، تطول من ٢٥ الى ٣٢ سم. رؤوسها مبطلة، كبيرة، ترسية الشكل، مطوقة برداء فارش نصف دائري الشكل، مهدب الحثار. افواهها خطمية يلحفها الرداء. لواسنها سطحية تعلو الافواه. خياشيمها ظهرية الارتكاز، ناشزة، ثنائية الصف. ويعاوها في جانبي ظهرها حلقات صغيرة يراوح عددها من سبعة ازوج الى تسعة. اثوابها الى الرمكة او الربة || اشهر انواعه التيتيس الارنبية (Tethys leporina) الذي يبلغ طوله نحو ٣٢ سم.

٥٨٤٦ - تيتيسيات *
Tethyidae (S).

Téthydés (F). Tethyidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم العديدة. انواعها المعروفة سبعة تجتمع الى جنسين التيتيس والمليب. اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط. ملجئها الحياتي جماعي. مجموعاتها متوسطة العدد. تعيش معظم حياتها بين نبوت القاع || اجسامها عريضة متفاوتة الجرم. اطوالها تراوح من ١٠ الى ٣٠ سم.

٥٨٤٧ - تيجن *
Fasciolaria (S).

Fasciolaire (F). Fasciolaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة التيجنيات. انواعه المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة وبعضها معاصر منتشر في معظم بحار العالم || اصداقها متوسطة الاحجام او صغيرة، متباينة الاشكال يكثر فيها البرمعي المقلوب القاعدة المحصورة. فوهاتها فرجية مستطيلة.

٥٨٤٨ - تيجنيات *
Fasciolaridae (S).

Fasciolaridés (F). Fasciolaridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم مسننات اللسان. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والعلباشيرية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار العالم || اصداقها اشكال هندسية مزوزقة ومطعمة يكثر فيها البرمعي والقمقي. فوهاتها شبه بيضية منضنة الجوانب || اعرف اجناسها واشهرها التيجن والردون والشكس.

٥٨٤٩ - تيجنة *
Tije (F).

التيجنة طائر من التنفريات يدعى رمقوسيل، اطلبه.

٥٨٥٠ - تيديات *
Taeidae (S).

Téidés, Tejidés (F). Taeidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من العطاء. اجناسها وانواعها

٥٨٣١ - تيار الخليج
Courant du Golfe,

Gulf-Stream (F). Gulf-Stream (E).

تيار مياه حارة في المحيط الاطلسي. يعود اكتشافه الى البحارة الاسبان في اواسط عام ١٥١٣ || اشيع نظرية تقول ان هذا التيار او النهر، ينبع بالقرب من افريقية الجنوبية ويتجه نحو البرازيل ويمر بين امريكة الوسطى وجزر الانتيل فيدور حول فلوريدا ثم يتحول من جراء اصطدامه بالمياه الباردة القادمة من اللبرادور الى شبه مروحة تمتد شعبها او ضلوعها الى الارض الجديدة وايرلنده والنرويج... وهو من منبعه حتى فلوريدا يجري بسرعة ٨ كيلومتر بالساعة. عمقه نحو ٨٠٠ متر. عرضه نحو ٨٠ كيلومتر. حرارة مياهه ٢٨° سنغراد. وبعد فلوريدا، حيث ينشعب، تصبح سرعته نحو ٥ كيلومتر. وعمقه نحو ٢٠٠ متر. وحرارته نحو ٢٠°. اما عرضه فيختلف مع الشعب لكنه لا يقل عن ٤٠ كيلومتر ولا يتجاوز ١٣٠ كيلومتر.

٥٨٣٢ - تيار إيجابي
Courant positif (F).

Positive current (E).

٥٨٣٣ - تيار تناوبي
Courant alternatif (F).

Alternative current (E).

٥٨٣٤ - تيار حث، تيار هوتر
Courant inducteur (F). Inductor current (E).

٥٨٣٥ - تيار سلبي
Courant négatif (F).

Negative current (E).

٥٨٣٦ - تيار طردي
Courant direct (F).

Straight current (E).

٥٨٣٧ - تيار كهربائي
Courant électrique (F).

Electric current (E).

٥٨٣٨ - تيار متواصل
Courant continu (F).

Uninterrupted current (E).

٥٨٣٩ - تيار محثوث، تيار متأثر
Courant induit (F). Induced current (E).

٥٨٤٠ - تيسان
التيسان نجمان (محيط المحيط).

٥٨٤١ - تيسيس
Dessiccation (F). Desiccation (E).

هو التجفيف، اطلبه.

٥٨٤٢ - تيتان، تيتانيوم
Titane (F). Titanium (E).

عنصر فلزاتي شديد الصلابة، سريع الانفلات، ابيض المكسر، براق، يجرح الفولاذ || رمزه (Ti) ثقله النوعي ٤٨ ووزنه الاتومي ٥٠. يذوب ويتبخر في الحرارة العالية. يشتعل في الاوكسجين ويحترق في الفلور والازوت عند بلوغ ٨٠٠ درجة سف.

٥٨٤٣ - تيتل
تحريف تيتل وهو نوع من بقر الوحش.

٥٨٤٤ - تيتونيه
Tithonia (S). Tithonie (F).

جنس نباتات عشبية ليفية حولية من فصيلة المركبات. انواعه المعروفة ٨ منبتها بلاد امريكة الجنوبية، سوقها



تيجن

في ذوبانه || ومن الطرق الوقائية تخفيف كثافة البذار نحو ٢٠٪ وحدل التربة عند الحاحه والاستماضة عن الزروع الباكورية بزروع عادية او متأخرة .

٥٨٦٠ - تيل *Eléotrague (F).*
هو الغفر ، اطلبه .

٥٨٦١ - تيسل * ، جيلجل *Hibiscus cannabinus (S)*
Chanvre du Deccan, Ketmie à chanvre (F). Deccan hemp, Hemp mallow (E). Hanfblättriger elbisch (D). Canapa del Deccan (I).
نبات من الخطمي وفصيلة الخبازيات ساقه منتصبه رفيعة قوية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه معتقة خماسية التفصيص مسنة الحافة . ازهاره خماسية الفصل حراء اللون || يزرع لاليانه المستعملة في صناعة الاكياس والحبال .

٥٨٦٢ - تيسل بلدي * ، تيسل قنبي ، خبيرة قنابية *Althea cannabina (S). Canebas, Gulmauve à feuilles de chanvre (F). Egyptian hemp (E). Hanfstockmalve, Hanfpappel (D). Altea salvatica, Canapa salvatica (I).*
نبات معمر من الخبازيات . ساقه دقيقة منتصبه تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه معتقة خماسية التفصيص . نصلها منشاري الحافة ، ياهت الخضار ، اطحل الصفحة السفلى . ازهاره وردية اللون مضلمة ، طويلة الزناد .

٥٨٦٣ - تيسل شيطاني *Ketmie d'Afrique (F).*
راجع خطمي افريقي . *Bladder Ketmia (E).*

٥٨٦٤ - تيلة *Fibre de coton (F).*
Fibre of cotton (E).

٥٨٦٥ - تيلس * *Thylacynus cynocephalus (S).*
Thylacine, Tasmanian wolf (E).

حيوان مفترس وحيد الجنس والنوع من الجربيات وفصيلة الدزيوريات . موطنه جزيرة تسمانية . يسرح في الليل ويبست في النهار في اوعر المواقع واظلمها كالكهوف واوقاب الصدوع والفجاج لانه يحشى النور . وهو شرس الاخلاق بطاش يسطو على كل حيوان اضعف منه اخصها الغنم || شكله شكل الكلب والذئب في آن واحد . طوله نحو ١٥٠ سم . بما فيه الذئب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . ارتفاعه نحو ٨٠ سم . رأسه شبه مخروطي الشكل . عيناه كبيرتان . اذناه جالستان . وبره قصير معتدل الخشونة . ثوبه الى الكهبة يعلوه في ظهره تجذيع معترض اسود || الاثني اصفر قدأ من الذكر وتتحل بنفس الثوب وهي رباعية الاطباء تحمل في اسفل بطنها جراب تقيم فيه ادراعها التي يراوح عددها من ٢ الى ٥ حتى الفطام .

٥٨٦٦ - تيلندس * *Tillandsia (S). Tillandsie (F).*
Old man's beard, Long moss (E). Tillandsie (D). Tillandsia (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من التيلندسيات . انواعه قليلة معظمها نباتات تزيينية ضية الاوراق اللحية الكبيرة . ازهارها سفلية التجميع مستطيلة يحملها شراخ طويل اجوف مستقيم . ومنها نباتات برية مقعدة تعيش على بعض الاشجار الحرجية دون ان تؤذيها .

٥٨٦٧ - تيلندسيات *Tillandsiées (F).*
Tillandsiae (E).

سبط من الانناسيات يشمل بعض الاجناس والانواع النباتية البرية والتزيينية جميعها عشبية اشهرها التيلندس .

المعروفة زهاء ٢٠٠ جميعها من عطاء البلاد الامريكية اخصها الجنوبية والوسطى || وهذه الفصيلة تمثل في امريكا ما تمثله الضبايات او السقايات في العالم القديم || اشهر اجناسها التاغو والعساس والفيوق والميجل .

٥٨٥١ - تيرب *Terreau (F). Mould (E).*

هي التربة التي زادت فيها نسبة المواد العضوية الدبالية عن ٥٠٪

٥٨٥٢ - تيس *Bouc (F). Ha-goat (E).*
هو ذكر الماعز المد للضراب .

٥٨٥٣ - تيس الجبل *Bouquetin (F).*
هو الوعل . *Bouquetin, ibex (E).*

٥٨٥٤ - تيفس الكلب *Maladie de Stuttgart*

٥٨٥٥ - تيفود الدجاج *Salmonellosis gallinarum*
مرض معد يصيب الدجاج .

٥٨٥٦ - تيفولا *Typhula*
جنس فطور ثعلوية مجهرية من فصيلة الدبوسيات تتميز بثمانيتها الكروية البيض اللباب . غلافها يبدو اغبر اللون ثم ينحرف نحو الصفرة وينتهي في الخطي الاسمر . انواعه عديدة اما المؤذية التي تتطفل على النباتات الزراعية فقليلة . اعرفها الثلاثة التالية .

٥٨٥٧ - تيفولا الشوندرو * *Typhula betae.*
Typhula brassicae, Sclerotium semen (S).


فطر مجهري يتطفل على الشوندرو والبطاطا والملثوف والجزر فيعطب البشرة وما تحتها من النسيج الخليوية والليفية . مظهره الخارجي ثعالي لا قياسية الحجم قطرها يراوح من ١ الى ٢ سم . ثوبها عديد الالوان يغلب فيه الابيض والخطي والاسمر وهو دائماً ابيض المحور والمقطع || يكافح باجتنا البذار الموصوم وباجتتاب التربة الرطبة القوية الاندماج .

٥٨٥٨ - تيفولا النفل * *Typhula trifolii*

فطر مجهري يعيش في البلاد الباردة يتطفل على معظم النباتات القرنية وعلى النفل والفصة فيعطب الاوراق بعد السوق ويسبب ذبولها وسقوطها || مظهره الخارجي اسوداد يحل بالاوراق يعقبه نواس مشيجي يكتنف المعاليق مصدره الثعالي القائمة على السوق . وهذه الثعالي تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى السمرة .

٥٨٥٩ - تيفولا إيتوانا * ، تيفولا النجيليات ،

عفن الثلوج *Typhula itoana, T. graminum, Sclerotium fulvum (S). Pourriture des neiges (F).*
فطر مجهري يتطفل على الزروع وسائر النجيليات البرية فيعطب العصف ويؤذي السوق ويؤخر النمو وقد يقضي عليه || يكثر وجوده في البلاد الباردة لانه ربيب الثلوج وارتفاع الحرارة يفقده كل نشاط وحيوية . حرارته الفضلى من صفر الى ٨ درجات . وقد يتكاثر ايضاً بين ٨ و ١٥ درجة شرط ان يكون ذلك بمأمن من النور || مظهره الخارجي بثور صغيرة متراصة تركب نصل العصف فتوشه بقروح مستديرة قطرها من ١٠ الى ٢٠ مم . لوها الى الجؤة ثم ينحرف الى السمرة العابقة || يكافح باستعمال الاسمدة البوتاسية التي يجب نشرها على الثلج لانها تسرع



تيفولا الشوندرو



تيفولا النفل



تيفولا إيتوانا




تيل



تيل بلدي



تيلس



تيلندس



تيملة مبدولة



تين المطاط

تعلو من ١٠ الى ١٥ م. أوراقها معنقة متعاقبة مستطيلة الشكل ، نصلها حالس الصفحة العليا خلي السفلى ، زغبها أصهب اللون . تزرع للتزين .

٥٨٧٧ - تين الأرض (F). Euphorbe monnayer (F).
Crenated annual spurge (E).
هو الخامسوقي ، اطلبه .

٥٨٧٨ - تين الأصنام (F). Figuier des Pagodes (F).
Peepul tree (E).
هو اثاب الهند ، اطلبه .

٥٨٧٩ - تين البرء تين حاميز (S). Ficus hispida (S).
Figuier âpre (F). Red-wood fig tree (E). Rangoon-kautchuk-feigenbaum (D). Fico hispida (I).
نوع من التين ، وهو شجرة كبيرة دائمة ، اقليمها البلاد الحارة ، تعلو من ١٢ الى ١٧ م. أوراقها كبيرة كفية معنقة ، نصلها خشن الصفحة . ثمارها حامزة لا تؤكل لكنها تستعمل في عدة علاجات طبية محلية .

٥٨٨٠ - تين البنغال (F). Figuier de Bengale (F).
Bengal fig (E).
هو الاثاب ، اطلبه .

٥٨٨١ - تين الصمغ المر (F). Figuier à caoutchouc (F).
Indian rubber tree (E).
هو تين المطاط ، اطلبه .

٥٨٨٢ - تين الفيل هو الهال الجوزي ، اطلبه .

٥٨٨٣ - تين المجوس هو اثاب الهند ، اطلبه .

٥٨٨٤ - تين المطاط* (S). Ficus elastica (S).
Figuier à caoutchouc, Caoutchouc des jardins (F). Indian rubber tree (E). Gummifeigenbaum, Gummibaum (D). Albero di gomma elastica, Fico della gomma (I).
نوع من التين ، وهو شجرة كبيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م. أوراقها عروة معنقة متعاقبة رباعية الشكل ، نصلها جلدي مصقول لامع تقطبه من جهتي الضلع عروق كثيرة مستقيمة الزاوية يبلغ عددها نحو ٥٠ زوجاً . يستخرج منها بحز سوقها عصارة صفية لزجة تستعمل استعمال المطاط .

٥٨٨٥ - تين الهند هو صبار الهند ، اطلبه .

٥٨٨٦ - تين بري (F). Caprifiguler (F). Wild fig (E).
هو الذكار ، اطلبه .

٥٨٨٧ - تين جبلي ، حماط (S). Ficus variegata (S).
Figuier de Sumatra (F). Getah fig tree (E). Wachs-feigenbaum (D). Fico de Somatra (I).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد قلنسوية الشكل تعلو من ٤ الى ٧ امتار ، مهدها سويترة والمناطق الحارة . ثمارها صغيرة حامزة الطعم . تزرع للتزين .

٥٨٨٨ - تين ربائي الورق (S). Ficus pandurata (S).
Figuier panduriforme (E).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد مهدها الصين ، تعلو من ٨ الى ١٢ م. أوراقها كبيرة الحجم طولها من ٣٠ الى ٦٠ سم. وعرضها من ٢٠ الى ٢٥ . نصلها امرط البشرة على صفحتيه تعلو عروق ناشزة عديدة الشرايين || يزرع للتزين يعيش في المراكن وفي البيوت .

٥٨٨٩ - تين شوكي (F). Figuier de Barbarie (F).
Barbary fig (E).
هو الصبار المعروف ، اطلبه .

٥٨٦٨ - تيلودين* (S). Tylocline (S).

Tylodine (F). Tylocline (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل سقفيات الخياشيم وفصيلة المظاعيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض شطوط المحيط الهادي اخمصها ماليزا وفورموزا || اصداؤها صغيرة مظلية الشكل قليلة الارتفاع . اجسامها مستديرة مبطة . ارجلها فضفاضة . عيونها جاحظة . خياشيمها ورقية الشكل . ارجلها وحيدة رحية الانبساط مالة الصفحة السفلى .

٥٨٦٩ - تيماء (F). Etolles d'Orion (F).
التيماء هي نجوم اجزاء (E). Orion stars (E).

٥٨٧٠ - تيممة
التيممة والتيممة : النعجة المفصولة عن القطيع تربي وتلد على حدة .

٥٨٧١ - تيمكة مبدولة* (S). Timalia vulgaris (S).
Timalie vulgaire (F).

طائر من فصيلة التيمليات ورتبة الجواثم . موطنها يمتد من الهند الى ماليزيا . تألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار || جسمها متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم. ثوبها العلوي الى الشقحة السمرى تعلوها تمشيع فحمي في الجناح والذنب . رأسها موشع بالاحمر الجوزي . عنقها وصدرها وبطنها الى الصخرة المرقوشة بالاسمر والاسود . منقادها وساقها الى السمرة الخطية الموج . حذقة عينها كستنية اللون || طيراتها خفيف الحركة ، معتدل الشوط . قوتها النمل والديدان والاساريع والحشرات الصغيرة والحوام والثمار العنبية || تدفن عشها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر أو مترين عن سطح الارض . الانثى تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٤ يوماً .

٥٨٧٢ - تيمليات* (S). Timaliidae (S).
Timaliidés (F). Timaliidae (E).

فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . معظمها من طيور البلاد الاسيوية والافريقية وبعضها يعيش في امريكا الجنوبية || تألف الادغال والاحراج المبعثرة الاشجار . معظم انواعها من الاوابد وبعضها من القواطع || اشهر اجناسها التيملة والثراثة والغرلقة .

٥٨٧٣ - تيمينية* (F). Holantarctique (F).
Holantarctic (E).

نعت تعريفي يطلق على كامل المنطقة الجنوبية بما فيها القطبية .

٥٨٧٤ - تيمول (S). Thymol
مادة دهنية عطرية تستخرج من السمتر .

٥٨٧٥ - تين (S). Ficus (S). Figuler (F). Fig-tree (E).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية ، منتضبة وعارضة من سبط التوتيات وفصيلة الانجريات . سوقها فرعاء لبنة العصارة . أوراقها كاملة معنقة متعاقبة || انواعه كثيرة العدد مهدها البلاد الحارة والمعتدلة . اعرفها واشهرها مايتيج .

٥٨٧٦ - تين أصهب (S). Ficus rubiginosa (S).
Figuier rouillé (F).
نوع من التين ، وهو شجرة متوسطة القد مهدها استراليه

الثمرة الجافة من عناصر ومركبات ، نقلاً عن الدكتور
تراير ما معده :

مواد سكرية	من ٥٠ الى ٥٨ ٪
مواد بروتينية	٥ ٪
مواد نشوية	٨ ٪
مواد دهنية	١ ٪
سليولوز	٥ ٪
رماد	من ٢ الى ٣ ٪
ماء	من ١٧ الى ٢٤ ٪

٥٨٩٦ - **تينيا** Taenia (S). Taenia, Ténia (F).
Taenia, Tap-worm (E).

جنس ديدان ، من فصيلة التينيديات ، انواعه عديدة
بعضها ضار بالانسان .

٥٨٩٧ - **تينيا رشماء** Bothricephalus
هي النقيرة ، نوع من التينيا .

٥٨٩٨ - **تينيا شوكية** Taenia echinococcus (S).
Ténia échinocoque (F).
نوع من التينيا ثوبها امعاء الكلاب حيث تعيش وتتكاثر .

٥٨٩٩ - **تينيا عزلاء** Taenia saginata (S).
Ténia inerme (F).
نوع من التينيا ثوبها عضل البقر وقد تعيش في امعاء
الانسان .

٥٩٠٠ - **تينيا قزمية** Hymenolepis murina (S).
Ténia nain (F).
نوع من التينيا صغيرة القد ، نحيلة . ثوبها القواضم تعيش
في امعائها وقد تنتقل الى الانسان .

٥٩٠١ - **تينيا مخززة** Taenia serrata (S).
Ténia dentele (F).
نوع من التينيا تصيب الارانب و كلاب الصيد .

٥٩٠٢ - **تينيا مسكحة ، دودة وحيدة**
Taenia solium (S). Ténia armé, Ver solitaire (F).
نوع من التينيا ثوبها الخنزير وقد تنتقل الى امعاء الانسان .

٥٩٠٣ - **تينيديات** Teniadae (S).
Téniadés (F). Teniadae (E).
هي الفصيلة التينيدية من رتبة المنطقيات العريضات ،
اجناسها واتواعها عديدة جميعها من الديدان القدية الشكل
المستقيمة المستطيلة .

٥٩٠٤ - **تينية** Sycone
نعت تعريفي وصفي يطلق على الثمار اللحمية التينية الشكل .

٥٩٠٥ - **تية** Labyrinth (F). Labyrinth (E).
كل مكان لا علامة فيه يهتدى بها منعاً للضلال .

٥٩٠٦ - **تيهور ، ثلثة ، هيار** Eboulis (F).
Fallen rocks (E).
المواد المنهارة اخصها الصخور .

٥٩٠٧ - **تينيهي** Labyrinthique (F).
Labyrinthian (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالتية .

٥٩٠٨ - **تينوع** Plante lactifère (F).
Lactiferous plant (E).
كل نبات يسيل منه عصارة لبنية متى قطع .

٥٨٩٠ - **تين فرعون** Sycomore (F). Pharao's fig (E).
هو الجميز ، اطلبه .

٥٨٩١ - **تين قزم** Ficus pumila (S).
Figuler nain (F).
نوع من التين ، وهو جنبة عارضة صغيرة القد . اوراقها
بيضية الشكل قصيرة الاعناق . نصلها لامع الصفحة ،
بحيل الخضار الزاهي || تكثر زراعتها في المراكز وفي
البيوت .

٥٨٩٢ - **تين قنفذ** Ficus hirta (S).
Figuler hérissé (F).
نوع من التين ، وهو شجرة صغيرة مهدا الصين تعلو من
٤ الى ٥ امتار . فروعها الفتية زياء اللحاء . اوراقها لسنة
مستطيلة . ثمارها صغيرة كروية مقطوعة القاعدة هلبية
البشرة . || تزرع للتزيين تعيش في المراكز والبيوت .

٥٨٩٣ - **تين معرّوف ، بكس** Ficus carica (S).
Figuler commun, Carique (F). Common fig tree (E).
Echter feigenbaum (D). Fico, Ficaia (I).
نوع من التين ، وهو شجرة زراعية فرعاء دائمة ، تعلو من
٣ الى ١٠ امتار . ساقها طحلاء اللون غزيرة العصارة اللبنة
اللزجة الكاوية . اوراقها عابلة ، معنقة ، متعاقبة ، كفية
الشكل ، ثلاثية او خماسية التفريض ، جامدة النصل ،
زياء الصفحة السفلى || ثمارها صغيرة القد ، لا قياسية
الشكل ، ملساء البشرة ، سكرية اللب غذائية تؤكل رطبة
وجافة || ضرره كثيرة العدد جميعها سبوتية تجود في
جميع الارربة من الرملية الى الطينية . وهي تتكاثر بالتعقل
والترديخ والتريق || اشهر ضرره الزراعية اللبنانية
مما يتبع :

البقراطي * : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل ،
خضراء القشرة ، وردية اللب ، سكرية المذاق ، لذيدة ،
تنضج في آب .

البياضي * : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل ، بياض
القشرة ، صفراء اللب ، سكرية المذاق ، جيدة النكهة ،
تنضج في آب وايلول .

الحميري : ثمرته متوسطة القد ، كروية الشكل .
قشرتها خضراء اللون يعلوها موج بنفسجي . لها الى الحمرة
سكري المذاق ، لذيد النكهة . ثماره تنضج في آب وايلول .

الخصيري : ثمرته صغيرة القد ، مستديرة الشكل .
قشرتها خضراء اللون . لها وردي غزير العصارة السكرية
اللذيدة . تنضج في آب وايلول .

السويدي * : ثمرته صغيرة القد ، كروية الشكل . قشرتها
بنفسجية اللون . لها احمر عابق سكري الطعم المستحب .
تنضج في آب وايلول .

الشتوي : ثمرته متوسطة القد ، اجاصية الشكل
مستطيلة . قشرتها خضراء اللون . لها احمر مستحب الطعم
فيه بعض الحموضة . تنضج في تشرين الاول والثاني .

الفرنجي : ثمرته كبيرة القد ، اجاصية الشكل ، قشرتها
خضراء اللون . لها وردي غزير العصارة السكرية القليلة
النكهة . تنضج في حزيران .

٥٨٩٤ - **تين مدغسكار** هو الادبو ، اطلبه .

٥٨٩٥ - **تينة** Figue (F). Fig (E).
هي ثمرة التين تتركب خضراء وجافة . تفيد بنوع خاص
الحوامل والرضع . تقدر قيمتها الغذائية ، اي مسا تحواه





تين بقراطي



تين بياضي



تين سويدي



ثبج

٥٩١٨ - ثاني سلفيت Bisulfite (F).

Bisulphite (E). راجع بيسلفيت .

٥٩١٩ - ثساوة Brebis âgée (F). Elderly ewe (E). الثساوة هي النعجة الهرمة وهي أيضاً الشاة المهزولة .

٥٩٢٠ - ثاية ، ثوية ، جديرة Bergerie (F). هي مأوى الضأن اذا بنيت بحجر . Sheepfold (E).

٥٩٢١ - ثياقة Limnologie (F). Limnology (E). علم يبحث في جميع المناشع الحكيمية والبيولوجية العائدة الى البحيرات والاهوار .

٥٩٢٢ - ثبيت Francoiin vulgaire (F). هو الدراج الشائع ، اطلبه . Common francolin (E).

٥٩٢٣ - ثبة Centre du bassin (F). الثبة : وسط الحوض . Centre of the basin (E).

٥٩٢٤ - ثبج Milieu du dos (F). الثبج هو وسط الظهر . ج أثباج . Middle of the back (E).

٥٩٢٥ - ثبج Scops (S). Scops, Petit-Duc (F). جنس طير من البوم ينتمي الى عمارة البهويات . انواعه كثيرة العدد جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ١٨ الى ٢٢ سم . رؤوسها معتدلة الحجم ، محاسرها خافتة ، مناسرها قصيرة منعقفة سواقطها مستطيلة للحف الاذنان القصيرة المربعة الشكل . ارساغها دقيقة كاسية . محالبها خالية من الريش || اعطانها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . نظامها جماعي . تعيش اسراباً كبيرة . وهي من الطيور

٥٩١٩ - ثاد

الثاد هو النبات الناعم الغض وهو الندى وهو الرطوبة .

٥٩١٠ - ثافسيثا Thapsie (F). Drias plant (E). هو الدرياس نبات بري طبي .

٥٩١١ - ثاقب الأذن Perce-oreille (F). Earwig (E). هو النهلك ، اطلبه . Ohrwurm (D).

٥٩١٢ - ثاقب الورق Perce-feuille (F). هو الحليلاب المستدير الورق ، اطلبه . Hare's-ear (E).

٥٩١٣ - ثاقبات الأذن Forficulidés (F). هي النبيكيات ، اطلبها . Forficulidae (E).

٥٩١٤ - ثالث أكسيد Trloxyde (F). Trioxid (E).

٥٩١٥ - ثالتي ، ثلاثي Ternaire (F). Ternary (E). ما هو مركب من ثلاثة اجزاء .

٥٩١٦ - ثامرات Frugivores (F). Frugivorous (E). هي آكلات الثمر من الحيوانات والحشرات .

٥٩١٧ - ثاني أكسيد الكربون ، غاز الكربون

Anhydride carbonique (F). Carbon dioxide, Anhydrid carbonic (E).

غاز عديم اللون والرائحة . اقل من الهواء . لا يساعد على الاحتراق بل يستخدم في اطفاء الحرائق وهو قليل الذوبان في الماء || تعريفه الرمزي (CO₂ - ك) يوجد في الهواء يأتيه من تنفس الاحياء ومن الاختبارات واحتراق المواد الكربونية ويود من الهواء الى النبات بعمل الخصب المعروف بالتمثيل الخصب .

اوراقها ضيقة النصال تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. لونها الى الخضار البحري. ازهارها قمرزية اللون || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

٥٩٣٦ - ثَبِينَة
Urceolina (S).
Urcéoline (F). Urceolina (E).

جنس نباتات عشبية دوفضية من فصيلة النرجسيات. مهدا بعض مناطق امريكا الجنوبية. اوراقها صغيرة معشقة. ازهارها صفراء اللون او حمراء، صيوانية التجميع، ترتكز على شمرايح مصنعة منتفخة القواعد، مستطيلة الاعناق الضيقة، تنتهي بانتفاخات ثنائية اجاجية الشكل ترتكز عليها الازهار || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق. ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية العضوية والمعدنية، الغنية بعنصر الكلور || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٥٩٣٧ - ثَبِينَة قِرْمِزِيَّة
Urceolina miniata (S).
Urcéoline écarlate (F).

نوع من الثبينة. عشبة دوفضية سبروتية. شمرايحها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم. اوراقها تعد من ٣ الى ٤ نصالها تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. لونها الى الخضار البحري. ازهارها دقيقة الالوان، تطول نحو ٤ سم. لونها الى الحمرة القرمزية السفعاء المواج || تنويرها يستمر طوال شهر ايلول.

٥٩٣٨ - ثَبِينَة مُتَهَدِّلَة *
Urceolina pendula (S). Urcéoline pendante (F).

نوع من الثبينة. عشبة دوفضية جاذحة متطيلة. شمرايحها محجن الطرف المتهدل يطول نحو ٣٠ سم. اوراقها قليلة العدد الذي يراوح من ١ الى ٣ نصالها تطول من ٨ الى ١٢ سم. ازهارها دقيقة الالوان تطول نحو ٥ سم. لونها الى الصفار الكبريتي يعلوه طوق حثاري ابيض || تنويرها يستمر من تشرين الاول الى الثاني.

٥٩٣٩ - ثَبْت
الثبت الشق او الفلع في الصخرة.

٥٩٤٠ - ثَبْتِي
التي: حطام الثبن ودقاق الثبن او حسافة الثمر وكل شيء حشوت به غرارة بما دق فهو الثبي || وقال ابو حنيفة الثبنة والثبي: قشر الثمر وردشه (اللسان).

٥٩٤١ - ثَبَجَانَة جَبَلِيَّة *
Trichocera montana (S).
Trichocère de montagne (F).

عشرة لامؤذية من فصيلة الثبجائيات ورتبة ذوات الجناحين || جسمها صغير القد، نحيل، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها شبه مكور الشكل. عينها زئيمتان. زباناها غليظتان. روشنها كبيران، مهدبا الاطراف. قوائمها نحيلة، مستطيلة. ثوبها الى الرمكة القبراء || تألف جميع المواقع المشجرة. تظهر الحشرة الجمالانة في اوائل الخريف وتبقى حتى اوائل الربيع. تسرح في النهار || الالفى اكبر قدا من الذكر. بطنها مردني الشكل. تبرز الانثى مكنها في الجشالة فينقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة.

٥٩٤٢ - ثَبَجَالِيَّات *
Trichoceridae (S).
Trichocérídes (F). Trichoceridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها

القواطع تأوي الى الاحراج المبعثرة الاشجار والكروم والجناث النائية. تلتس قوتها في الليل. تصيد جميع انواع الحشرات والقواضم.

٥٩٢٦ - ثَبَجَارَة
الثبجارة حفرة يحفرها ماء الميزاب.

٥٩٢٧ - ثَبْرَة *
Calloutis (F). Broken stones (E).
حضيض حصبة حصم وحصى.

٥٩٢٨ - ثَبَل ، ثَبَل
Lie (F). Lees, Drags (E).
البقية الراسبة في اسفل الاناء وغيره.

٥٩٢٩ - ثَبْنَة *
Panier (F). Pannier, Basket (E).
هي الحجرة تحمل فيها الفاكهة. ج ثبان. اشكالها واحجامها لاقياسية لانها تعود الى نوع الثمار المرغوب في نقلها.

٥٩٣٠ - ثَبَوْت
Cibotium (S). Cibote (F).
نبات سرخسي مشجر من السيتاسيات. جذعه يعلو نحو ٤ امتار. قشوره ليفية زغبية. زغبه ناعم الملمس مستطيل، لونه الى السمرة. اوراقه قرصية هامية تطول من مترين الى ثلاثة امتار وتعرض من ٦٠ الى ١٢٠ سم. نصالها كثير التفريش، باهت الخضار يعلوه مواج ازرق. كبرها متوسط الضخامة كثيف الزغب الخنطي اللون. يزرع للتزيين. يخشى الاتربة الكلسية. يرغب في المواقع الرطبة.

٥٩٣١ - ثَبِيْت *
Insécable (F). Indivisible (E).
صفة ما لا يقبل التجزيء والتحطيم.

٥٩٣٢ - ثَبِيَجَة *
Anigosanthus (S).
Anigosanthe (F). Anigosanthus (E).

جنس نباتات برية وتزيينية عشبية معمرة من فصيلة النرجسيات. مهدا بعض مناطق الشرق واسترالية. سوقها منتصب، مورقة. اوراقها ضيقة النصال السيفية الشكل. ازهارها انبوية، مستطيلة الزغب، لانظامية الترتيب || انواعها المعروفة عديدة، اشهرها التالية.

٥٩٣٣ - ثَبِيَجَة اُرْجَوَانِيَّة *
Anigosanthus thyrianthinus (S).
Anigosanthe pourpre (F).

نوع من الثبيجة. ساقها مزغبة اللحاء في ثلثها الاول ثم مرطاء في الثلثين التاليين. ترفقع نحو ١٠٠ سم. اوراقها ضيقة تطول نحو ٣٥ سم. نصالها الى الخضار العابق. ازهارها ارجوانية اللون يعلوها تبقيج ابيض وزغب بنفسجي || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.

٥٩٣٤ - ثَبِيَجَة فَاخِرَة *
Anigosanthus pulcherimus (S).
Anighosanthe superbe (F).


نوع من الثبيجة. ساقها ترفقع نحو ١٠٠ سم. اوراقها ضيقة للنصل المثلعل. ثملها نجمية الشكل سمراء اللون. ازهارها صفراء اللون كثيفة الزغب الاشقر || تنويرها يستمر من ايار الى تموز.

٥٩٣٥ - ثَبِيَجَة قِرْمِزِيَّة *
Anigosanthus coccineus (S).
Anigosanthe écarlate (F).


نوع من الثبيجة. ساقها مهدبة اللحاء ترفقع نحو ١٥٠ سم.



ثَبْنَة



ثَبِيَجَة اَرْجَوَانِيَّة



ثَبِينَة مُتَهَدِّلَة

الأمريكية . وهي قريبة الشبه بفصيلة الحمحميات لافارق بينهما سوى الأزهار السمي المصّل الشكل || أشهر أجناسها النجمة والدقيقة والوبيرة .

٥٩٥١ - نَجْن ٥
Nive
كل الخدود أو ساقية وما أشبه سببه السيل .

٥٩٥٢ - نَجْبِيج
Débit (F).
Measurement, Duty, Flow (E).
نَجْبِيج ونَجْر الماء : كال مقدار انصبابه . ومقدار انصبابه بالثانية يدعى نَجْبِيجاً .

٥٩٥٣ - نَجْبِير
Marc (F). Residuüm (E).
هو ثفل عصير الثمار كالعنب والتفاح والتمر والتين وغيرها ، وقيل ثفل كل شيء يعصر .

٥٩٥٤ - نَجْبِرَاء
Vinsasse (F).
Bad wine, Very weak (E).
هو ما يبقى من العصرة مع ثفلها في تقطير المشروبات الكحولية .

٥٩٥٥ - نَجْحَاة
Melasphaerula (S).
Mélaspérula (F). Melasphaerula (E).
نبات عشبي دولفي وحيد الجنس والنوع من فصيلة السوسنيات . منبته بعض المناطق الإفريقية المعتدلة الحرارة . ساقها دقيقة ترتفع من ١٥ إلى ٣٠ سم . أوراقها عسفية الشكل ، خيلة الخضار الزاهي . أزهارها عسكولي التجميع . أزهارها صغيرة القد ، أهليلجية البتلات الفستقية اللون يعلوها تجميع أرجواني || تزرع للزينة ضمن البيوت وفي الحدائق || تنويرها يستمر طوال شهر نيسان .

٥٩٥٦ - نَحْنَحَة *
Philesia (S).
Philésie (F). Philesia (E).
جنية معمرة ، أبدية ، مبروتية من فصيلة الزنبقيات . وحيدة الجنس والنوع . مهدا بلاد الشيلي وقد انتشرت زراعتها التريينية في معظم اقطار العالم . ساقها فروع تعلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقها متعاقبة ، لاطئة ، أهليلجية الشكل تطول نحو ٤ سم . نصلها جامدة الصفحة ، وحيدة الضلع . أزهارها طرفية الارتكاز ، ثنائية التجميع ، حمراء اللون || تنويرها يستمر من الربيع الى الخريف .

٥٩٥٧ - نُحْرُط
Angustura vera, Galipea
officinalis (S). Angustura, Cusparée, Galipée (F).
Angostura Bark (E).
شجرة حرجية طبية وصناعية من فصيلة السذابيات منبها الأصلي بعض مناطق أمريكا الجنوبية انحصها فزويلا على ضفاف الارينوك || ساقها رفيعة فروع دائمة تعلو نحو ٣٥ متراً . أوراقها كبيرة ، مستطيلة الزناد ، ثلاثية التجميع . أزهارها عشقودي . أزهارها خماسية البتلات البيض . ثمارها حبوب مستطيلة ، مبططة ، سوداء اللون ، عطرية العرف || خواصها الطبية في لحاء السوق والاغصان ، مسحوقها مقو ودافع للملحى .

٥٩٥٨ - نُحْطِر
Aegiphile (F).
جنس نباتات عشبية مدادة معمرة من فصيلة الساجيات . مهدا البلاد الحارة والاستوائية || يقال أن عصارة أوراقها مضادة لسم الافاعي .

المعروفة عديدة معظمها من عظم الاقاليم الباردة . يكثر وجودها في الغابات وفي الحدائق قرب المساكن . تعيش على رحيق الأزهار || أجسامها صغيرة ، نجيلة ، عيونها زهمية . قرونها الاستشعارية خيطية تتألف من ١٦ فصلة . قوائمها مستطيلة ، نجيلة ، قصبة || أناثها أكبر قدماً من ذكورها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة .

٥٩٤٣ - نَجَّة

هي الروضة فيها حياض ومساكن للماء . ج نجات .

٥٩٤٤ - نَجْر
Large (F). Wide (E).
نعت وصفي بمعنى عريض . يقال ورق نجر اي عريض . والجر يأتي بذات المعنى .

٥٩٤٥ - نَجْرَة
Milieu d'une vallée (F).
Midst in valley (E).
هي وسط الوادي وقد تكون تربتها عميقة الغور وافرة الغذاء اذا حفظت من عبث الانجراف .

٥٩٤٦ - نَجْمَة ٥
Hydrophyllum (S).
Hydrophyll (F). Hydrophyllum (E).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « أوراق مليئة بالماء » . جنس نباتات عشبية من فصيلة النجميات . مهدا بعض مناطق أمريكا الشمالية . أوراقها كبيرة فضفاضة ، الجلدية منها متعاقبة . أزهارها بيضاء اللون أو زرقاء || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

٥٩٤٧ - نَجْمَة بُنْقُوسِيَّة ٥
Hydrophyllum capitatum (S).
Hydrophyll capité (F).
نوع من النجمة . عشبة معمرة . جثمها لحمية . ساقها قصيرة تعلو نحو ٢٠ سم . أوراقها مركبة من خمس أو سبع وريقات فضفاضة . أزهارها بنقوسية رأسية الارتكاز قصيرة المعاليق ، زرقاء اللون || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٩٤٨ - نَجْمَة فيرجينية *
Hydrophyllum virginicum (S).
Hydrophyll de Virginie (F).
نوع من النجمة . عشبة معمرة . ساقها تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها الجلدية خماسية أو سباعية الوريقات المنشارية الحتار . أزهارها مستطيلة المعاليق ، بيضاء اللون ، تطول نحو ٨ سم . فصلها مهدبة الاطراف || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٩٤٩ - نَجْمَة كَنَدَا ٥
Hydrophyllum Canadense (S).
Hydrophyll du Canada (F).
نوع من النجمة . عشبة معمرة . ساقها تعلو من ٤٠ إلى ٧٥ سم . أوراقها كبيرة سباعية أو تساعية الفصوص ، تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض نحو ٢٥ سم . فصوصها مسننة الحتار . أزهارها أرجوانية اللون ، مستطيلة المعاليق || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

٥٩٥٠ - نَجْمِيَّات ٥
Hydrophyllaceae (S).
Hydrophyllacées (F). Hydrophyllaceae (E).
فصيلة نباتية من متحذات القعالات مرتفعات المبيض . أجناسها وأنواعها عديدة ، معظمها من نباتات القارة



نجمة فيرجينية



نَحْنَحَة

٩٠٠٠ تنتمي الى ٩٣٢ جنساً ، تجمعها حسب التصنيف الحديث ١١٨ فصيلة تنفوي تحت لواء ١٤ رتبة كما هو مبين في الجدول التابع الذي يضم معظم الفصائل وأشهر الاجناس .

٥٩٦٩ - ثَرَاء ٥ Divitisme (F). Divitism (E).
الثراء اليسر المفرط الفاخس .

٥٩٧٠ - ثَرَاء ٥ Ixioliron (S).
Ixiolire (F). Ixioliron (E).

جنس نباتات عشبية دوفضية من فصيلة النرجسيات . مهدا الشرق الأدنى . سوقها نخيلة مورقة . اوراقها رقيقة النصال الضيقة . ازهارها جميلة ، صغيرة ، عنقودية التجميع أو صيوانية رتاجية || تزرع للزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة قليلة العدد أشهرها الثراء الجبلية .

٥٩٧١ - ثَرَاء جبالية ٥ Ixioliron montanum (S).
Ixiolire montagnard (F).
نوع من الثراء . عشبة دوفضية سبروتية . ساقها نخيلة ترتفع من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها سنانية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم . فصالحها بحرية الخضار ، محددة الصفحات . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها الى الزرقا البنفسجية اللامعة تطول من ٣ الى ٤ سم . || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٥٩٧٢ - ثَرَاة ٥ Xénologie (F). Xenology (E).
الثراة علم موضوعي يبحث في المشاكل التاريخية والاجتماعية والاخلاقية الناتجة عن اسكان غرباء في وطن معين .

٥٩٧٣ - ثَرَامَة ٥ Hygrophorus (S).
Hygrophore (F). Hygrophorus (E).
جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الغاريقونيات . انواعها المعروفة نحو ٣٠ جميعها ملونة . اعطائها معظم اقاليم المناطق المعتدلة الحرارة . تعيش على المواد النباتية المتحللة في المواقع الرطبة . تتميز بيوغها الابيض اللون وباطراسها شبه الشفافة المعتدلة التقارب . بعض انواعها دبق الارسوسة والساق || منها انواع مأكولة لذيدة الطعم واخرى كاعنة غير مرغوب فيها .

٥٩٧٤ - ثَرَامَة الحيراج ٥ Hygrophorus nemoreus (S).
Hygrophore des bois (F).
نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . رائحته رائحة الدقيق . ارسوسه كبيرة القد ، تبنية اللون يعلوها موج اسمر . وهو من الفطور المبذولة في أكثر الحراج .

٥٩٧٥ - ثَرَامَة الماعز ٥ Hygrophorus caprinus (S).
Hygrophore des chèvres (F).
نوع من الثرامة ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه . يكثر وجوده في حراج الصنوبريات . ارسوسه مخروطية الشكل في اول عهدها ثم محدودة ، فطرها نحو ١٠ سم . لونها الى الطحلة السمراء .

٥٩٥٩ - نُخَيْلَة ٥ Hypogastrura (S).
Hypogastrure (F). Hypogastrura (E).
جنس حشرات قافزة قارضة من فصيلة النخيليات ورتبة الكهدليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها صغيرة تطول من ١ الى ٣ مم . اثنائها وحيدة اللون يكثر فيها الاسمر القاتم والاسود والاخضر الاليس . رؤوسها نائقة ، ضخمة . قرونها الاستشعارية صغيرة . عيونها ماسحة . جهازها القفزي ثنائي الاقدام ، صغير القد . ارساغها وحيدة الظفر المحجن الذرب || يكثر وجودها تحت الحجارة والاشخاب وفي الجلالة .

٥٩٦٠ - نُخَيْلِيَّات ٥ Hypogastruridae (S).
Hypogastruridés (F). Hypogastruridae (E).
فصيلة حشرات قافزة قارضة من رتبة الكهدليات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، مستطيلة الشكل ، مبعثرة الحلب . رؤوسها نائقة ، مكورة . عيونها ، عند وجودها ، نقيمة الارتكاز . قرونها الاستشعارية قصيرة رباعية الفصل . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها سداسية السكم مجهزة بجهاز قفزي وبحويصلات تفرز مادة لزجة تساعد الحشرة على تسلق السطوح الناعمة . قوائمها قصيرة . ارساغها وحيدة الظفر الذرب او ثنائيتة || اعرف اجناسها النخيلة .

٥٩٦١ - نُخَيْنُ البتلة Crassipétale (F).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات بتلات ازهاره أنخن من المؤلف .

٥٩٦٢ - نُخَيْنُ الفلّس Crassisque (F).
نعت تعريفي يطلق على كل سمكة نخينة الحراشف .

٥٩٦٣ - نُخَيْنُ القوائم Crassipède (F).
نعت تعريفي يطلق على كل حشرة نخينة القوائم .


٥٩٦٤ - ثَدَاء
الثداء : نبات يجف في الصيف ويخضر في الشتاء (اقرب الموارد) || الثداء : نبت له ورق الكراث وقضبان طولاً تدقها الناس وهي رطبة فيتخذون منها أرشية يسقون بها . (قول أبي حنيفة) || الثداء : شجرة طيبة يجها المال ويأكلها وأصوبها بيض حلوة ولها نور مثل نور الخطمي الابيض . في اصلها شيء من حرة يسيرة وينبت في أضعافها الطرائث والضغابيس (قول مرة) .

٥٩٦٥ - ثَدَام * ، مصفأة Filtre (F). Filter (E).
اداة تمبرها المياه والسوائل فتخرج منها نظيفة من الاذى .

٥٩٦٦ - ثَدَن Raccourcir (F). To shorten (E).
ثدن وأثدن الشيء : قصره . اشجار ثدنة : ناقصة . اشجار مثدنة ومشدونة الاغصان : صغيرتها وقصيرتها .

٥٩٦٧ - ثَدَن Gras, Replet (F). Fat, Bulky (E).
الثدن هو الكثير اللحم من كل ذي ظلف كالبقر والضأن والماعز . والاثني ثدنة .

٥٩٦٨ - ثَدِيَّات ، هَرَعِيَّات ، لَسُونَات Mammifères (F). Mammalia (E).
صف من مملكة الحيوان . انواعه المعاصرة المعروفة نحو



ثَدَام



ثَرَامَة الحراج



ثَرَامَة الماعز

الثدييات

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
وحيدات المسلك	Monotrèmes	نضاضيات	Echidné Zaglosse
		نضاض	
		ذغلو ص	
		خلد الماء	Ornithorhynque
		خلديات الماء	Ornithorhynchidés
جرايات	Marsupiaux	ذوات الجرابين	Didelphidés
		أبو سوم	Opossum
		بيرميس	Péramys
		سريع	Sarigue
		دزوريات	Dasyuridés
		دزور	Dasyure
		سر كوفيل	Sarcophile
		فسكوغال	Phascogale
		تيلسيات	Thylacinidés
		تيلس	Thylacine
		لقافات الارضة	Myrmécobiidés
		لقاف الارضة	Myrmecobius
		زيزيات	Péramélidés
		زيزب	Péramèle
		تلكميس	Thalacomys
		كمبيات	Notoryctidés
		كمبية	Notoryctes
		سينولستيات	Coenolestidés
		سينولسته	Coenoleste
		فلنجريات	Phalangéridés
		فلنجر	Phalanger
		بطورس	Petaurus
		بهلوان	Acrobate
		درميس	Dromicia
		كولج	Koala
		فارة العسل	Tarsipe
		طويلات الأرجل	Macropodidés
		قنفر	Kangourou
		قنفر جرذي	Rat-Kangonrou
		ولاب	Wallabie
		عباطيات	Phascolumyidés
		عباط	Wombat
فرد شرخوية	Edentés xénarthres	ناملات	Myrmécophagidés
		تمنورة، يرومي	Tamanoir
		دفر الحراج	Tamandua
		صقلوب	Cyclope
		دابات	Bradypodidés
		داب	Bradype
		مدرعات	Dasypodidés
		تانو	Tatou
		تاتوزية	Tatousia
فرد مانسة	Edentés pholidotes	قرفيات	Manidés
		ام قرفة جبار	Pangolin géant, Smutsia
		ام قرفة مستطيل الذنب	Pangolin, Uromanis
		مانس	Pangolin, Manis
		فتاج	Phatages

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
ذُرْد منجخرة	Tubulidentés	منجخرات	Oryctérope
قواضم	Rongeurs	سنجانيات	Sciuridés
		سنجاب	Ecureuil
		تاميه ، صيدنافي	Tamia
		هوقل	Spermophile
		بلطوش	Pelatouche
	مرموطيات	Marmotidés	Marmotte
		مرموط	Cynomys
	بهرتات	anomauridés	Anomalure
	حاروديات	Castoridés	Castor
	حاروديات الجبال	Aplodontidés	Aplodonte
	يرنيات	Pédetidés	Pédète
	جوميديات	Géomyidés	Géomys
		جومييس	Thomomys
	هتروميديات	Hétéromyidés	Hétéromys
		هترومييس	Dipodomys
	يربوعيات	Dipodidés	Gerboise
	زغيات	Muscardinidés	Loir
		فرنپ	Lérot
		زغبة	Muscardin
		غفيور	Graphiure
	لفيوميات	Lophiomyidés	Lophiomys
	مناجد	Spalacidés	Rhizomys
		فأرة عمياء ، خلد	Spalax
	فأريات	Muridés	Déomys
		دومييس	Arvicole
		فأرة الزرع	Lemming
		لمين	Campagnol
		عكبر	Rat musqué
		جرذ ممسك	Rhynchomys
		رينكوميس	Gerbille
		جربيل	Psammomys
		عضل	Tatera
		تنيره	Otomys
		جرذ قصير الذنب	Hamster
		فأرة همستر	Hydromys
		هيدرومييس	Dendromus
		دندر	Rat
		جرذ	Souris
		فأرة	Mulot
		دثيمة	Coucha
		كوشة	

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
قوارض	Rongeurs	Muridés	قذاز
			ركين
تهنويات	Bathyergidés	Bathyergue	تهنون
		Heliophobius	هليوفوبيوس
		Géorychus	جوريكوس
قنقليات	Cuniculidés	Paca	باكاس ، قنقول
دينوميديات	Dinomyidés	Dinomys	دينوميس
شنشيليات	Chinchillidés	Chinchilla	شنشيلة
		Viscache	لغستوم
غرزويات	Eréthizontidés	Eréthizon	غرزون
		Coendou	قندوس
		Chaetomys	قطموس ، شطموس
شردقيات	Dasyproctidés	Agouti	اغوتي
شيميات	Hystrioidés	Porc-épic	شيهيم
		Athérure	اطرور
		Trichys	دلدل صومره
اخميسيات	Echimyidés	Echimys	اخميس
		Capromys	كبروميس
		Aulacode	قباج
غندقيات	Cténodactylidés	Gundi	غندي
		Massoutiera	مسوتيره
		Felovia	لفوفه
كوبليات	Caviidés	Cobaye	كوباي
		Kérodon	كردون
		Mara	ماره
		Cabiai	كابياء
بيكيات	Ochotoniides	Ochotona	بيكة
ارنيات	Léporidés	Lapin	ارنب
		Lièvre	قواع
حافريات	Ongulés	Procaviidés	دمانيات
			دمان
			زلم
			طيسون
فيليات	Eléphantidés	Elephant	فيل
كركدنيات	Rhinocerotidés	Rhinocéros	كركدن
سناديات	Tapiridés	Tapir	سناد ، تابير
خيليات	Equidés	Chevaux	خيل
		Anes	حمير

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
حافريات	Ongulés	خيليات	Equidés
		حمير الزرد	Zèbres
		فراء التبت ، هميون	Hemione
		فراء اشوري	Hemippe
		الخدر	Onagre
	هيموتيات	Hippopotamidés	هيموت ، فرس البحر
			Hippopotame
خنزيريات	Suidés	رت ، خنزير	Sanglier, Porc
		هلوف	Phacochère
		حلوف	Potamochère
		هوشر	Hylochère
		بابيروسة	Babirossa
		مجلح	Pécari
بقريات	Bovidés	بقر اهلي	Bœufs domestiques
		جاموس ، ذئب	Buffles
		قطاس	Yack
		جبل	Gayal
		بيسون	Bison
		ثور المسك	Bœuf musqué
		بازن ، بزل	Pasang
		وعل	Bouquetin
		جهل ، نغار	Hémitrague, Thar
		أروية	Mouflon
		ضأن	Mouton
		ماعز	Chèvre
		شمواء ، فادر	Chamois
		نمرود	Nemorhède
		طخيم ، طاقان	Budorcas, Takin
		صمغور	Oreamne
		سيكا ، مهاة سيكا	Saiga
		جبل	Tragélaphe
		قنمار	Limnotrague
		برع	Nyala
		قرمود	Koudou
		اروس	Oreas
		علب	Bongo
		ابو زلاف	Nylgaut
		شخارة	Tétracère
		حريم	Bubale
		حلالوم	Damalisque
		نو	Gnou
		علب ، ابو عرف	Hippotrague
		ارخ	Oryx
		ابو عدس	Addax
		مرامري	Cobes
		ظبي	Antilope

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
حافريات	Ongulés	بقريات	Bovidés
		غزال	Gazelle
		نراق، ابو صفن	Antidorcas, Springbock
		هليم	Céphalophe
		اديس	Ourebie
		طقار	Oréotrague
		مدوكة	Madoqua
		شدان	Raphicère
زرافيات	Giraffidés	زرافة	Girafe
		وكاب، وكبي	Okapi
جمليات، ابلكات	Camélidés	جمل	Chameau
		لاما	Lama
أبليات	Cervidés	أيل	Cerf
		ياغور، يحمور	Chevrenil
		ايل، ادرع	Daim
		أيل الهند، صمبر	Sambar, Rusa
		أيل مختري	Para
		أيل ارقط	Chital, Axis
		ميجاك	Muntjac
		سيكة	Sika
		أيل فيرجينية، كريبكو	Cariacou
		مزامه	Mazama
		بودو	Pudu
		ألكة	Elan
		دقة، رلدبر	Renne
		أيل المسك	Chevrotain porte-musc
ترغوليات	Tragulidés	قنشير، ترغول	Tragule
		شقار	Chevrotain
حوتيات	Cétacés	باليات	Baleine
		مركوليات	Rorqual
		ناليات	Baleine grise
فوقيات	Delphinaptéridés	حريش البحر، قوفي	Narval
		بالوغة، حفش روسي	Béluga
عنبريات	Phyétéridés	عنبر	Cachalot
		زفيوس	Ziphius
		دخاس	Hyperoodon
		محبول	Mesoplodon
دلفينيات	Delphinidés	دلفين	Dauphin
		توسوب	Tursiop
		دلفين الأنهر	Sptalia
		تحس	Marsouin
		اركة	Orque

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
حوتيات	Cétacés	دلفينيات	Delphinidés
		جرش	Grampus
		جرأقة	Globicéphale
		نحس أسود	Marsonin noir
	جبحليات	Platanistidés	جبحل ، سبوق
		اينيا ، بوتو الامازون	Inia, Boutou de l'Amazone
		لبوت	Lipote
خيلائيات	Siréniens	خراف البحر	Manatidés
		اطوميات	Halicoridés
		غيتنيات	Rhytinidés
		خروف البحر	Lamantin
		اطوم ، زالخة	Dugong
		غيتين	Rhytine
زعفيات الالدام	Pinnipèdes	فقميات	Phocidés
		فقمية	Phoque
		مقرنس	Macrorhine
		أثاريات	Otariidés
		فطيات	Trichéidés
		أثاريه	Otarie
		فط ، فيل البحر	Morse
لواحم	Carnivores	سنوريات	Félidés
		سنور	Chat
		وشق	Lynx
		عسلق	Ocelot
		مرغي	Margay
		جفوندي ، سبتي امريكي	Jaguarondi
		ايره	Eyra
		بوماء ، كوجر	Puma
		اسد	Lion
		ببر	Tigre
		نمر	Panthère, Léopard
		جفوار	Jaguar
		بج	Serval
		فهد	Guepard
	زباديات	Viverridés	زيادة
			Civette
			رباح
			Genette
			زيادة النخل
			Paradoxure
			زيادة سوداء
			Binturong
			فلنوك
			Euplère
			غملاس
			Crossarche
			نمس
			Mangouste
			مرقاط
			Suricate
			عساس
			Cryptoprocte
	ضبعيات	Hyénidés	ضبع
			عسبار
			Hyène
			Protèle
	كلبيات	Canidés	كلب
			ذئب
			Loup
			دنكو ، ذئب استراليه
			Dingo
			ابن آوى
			Chacal

الرتبة	الفصيلة	الجنس	الرتبة
لواحم	Carnivores	كليات	Canidès
Renard	ثعلب		
Fennec	فئك		
Dohle	ضهل		
Otocyon	هنياس		
Icticyon	ضيفب		
Lycan	سبع		
رأونيآت	Procyonidès	بندا	Panda
Raton	رأتون ، رأكون		
Coati	قوطي ، نروآة		
Kinkajou	كينكأجو		
دبآت	Ursidès	دب	Ours
Grizzly	دب آشعظ		
Baribal	دب أمريكبي ، بربال		
Ailurope	دب الخيزران		
سرعوبيآت	Mustélidès	سرعوپ	Belette
Hermine	هرمين ، قأقم		
Putois	أبن عرس		
Furet	أبن مقرض		
Vison	فبزون		
Zorille	ظريل		
Ratel	رأتل		
Marte	سمور		
Fouine	دلق		
Glouton	شره ، غلوطن		
Grison	غرزون ، هورن		
Blaireau	غرير ، لزب		
Mydaus	ميدوس		
Mouffette	ظربان أمريكبي		
Conépaté	قنبأط		
Loutre	قضبأة		
Loutre de mer	هدرس		
مجمأآت الأيدي	Chiroptères	وطوأطيآت	Ptéropidès
Roussette	شقأة		
Epomorphe	حبتر		
Cynoptère	مفقطوم		
Macroglosse	مأآة		
Nésonyctéris	حبوش ، أشرف		
Cynonyctéris	ردأسة		
Eonyctéris	سرحأب		
Harpie	مسأخة		
Harpyionyctéris	مسأخة الفيلبيين		
منطأبيآت	Mégadermidès	منطأب قيثأري	Mégaderme lyre
Megaderme géant		منطأب جبأر	


الرتبة	الفصيلة	الجنس	الجنس
مخنجات الابدی	Chiroptères	وحریات	Nyctéridés
			Nyctère
		عماشیات	Rhinolophidés
			Rhinolophe
		دوبر	Aselle
		حناطل	Triaclops
		دباش	Phyllorhine
		دملوح	Anthops orné
		ذنباب	Coelops
		ورقیات	Phyllostomidés
			Vampire
		ورقیة	Phyllostome
		رينوفيل	Rhinophylla
		مصاص	Glossophage
		عرطيب	Artibeus
		علوق	Desmode
		عولق	Diphyllie
		عينوميات	Rhinopomatidés
			Rhinopome
		رئاسيات	Emballonuridés
			Emballonure
		خضوف	Saccopteryx
		دئاس	Diclidure
		دومس	Furie
		شقذان	Taphien
		نكتيل	Noctilion
		خفاشيات	Vespertilionidés
			Vespertilion
		خفاش فاري	Murin
		نقطول	Noctule
		خفدود	Pipistrelle
		سرتين	Serotine
		كريفوله	Kérivoula
		عطلاف	Atalapha
		خشاف	Vesperugo
		طمروقي	Oreillard
		سحاة	Barbastelle
		ذعماط	Scotophile
		نيكتوفيل	Nyctophyle
		زنباع	Minioptère
		نثلوسيات	Natalidés
			Natalus
		هوجن	Furipterus
		ثيروب	Thyroptère
		مزبوديات	Myzopodidés
			Myzopode

الرتبة	الفصيلة	الجنس	
مجموعات الابهدي	Chiroptères	هيمرات	Molosse Nyctinome Chiromèle Mystacine
حشرات	Insectivores	زبانيات	Musaraigne Crocidure Crossope
		Soricidés	زبابة زبابة مقدسة غرسوب
		Talpidés	طويين طسمان عرسيل
		Potamogalidés	بيانيات
		Erinacéidés	قنفذيات جمنور
		Centétidés	مذاليات يرقول ميدل ميكروغال ليمنوغال
		Macroscélidés	حذاديات
		Tupalidés	طوباجيات
		Galéopithécidés	كوبيات
رئيسات	Primates	Tarsiidés Daubentoniidés	ترسوسيات دوبنتونيات
		Lorisidés	وسانيات لوريس هيجم دعفوص عوجم
		Callithricidés	كليثريشيات هبال ، مرموزة ميراس ، ثمران قرد اعفر كليثريش
		Lémuridés	ليموريات ليمور ليمور اطحل ليمور مدغسكير شرغال ميكروسيب


الرتبة	الفصيلة	الجنس	
رئيسات	Primates	ليموريات	Lémuridés
		عندريس	Indri
		سيفق	Propithèque
		ليمور مصوف	Avahi
	سيوسيات		Cébidés
		دروكولي	Douroucouli
		ساكي	Saki
		اواكاري	Ouakari
		ستتور ، زياط	Hurleur
		سيوس ، ساجو	Sajou
		كريزوتريكس ، سيمريس	Saimiri
		آتل	Atèle
		لغوتريش	Lagotriche
		براكتيل ، اريود	Brachytèle
	قطروبيات		Colobidés
		هبار	Semnopithèque
		هور	Rhinopithèque
		نريك ، كاكو	Nasique
		قطروب ، قطروب	Colobe
	هجرسيات		Cercopithécidés
		ماكاك	Macaque
		شديم	Magot
		قشة	Cynopithèque
		هجرس	Cercopithèque
		نسناس	Nisnas
		شادي	Cercopithèque de saba
		هجرس ديانا	Diane
		هجرس اسبل ، ابو شنب	Moustac
		حودل	Mangaby
		هجرس احمر ، بطاس	Patas
	فردوحيات		Papioidés
		فردوح بيوان ، رنج	Babouin
		فردوح خنزيري ، شقمة	Chacma
		رنج	Hamadryas
		ميمون	Mandrill
		عوفر	Theropithèque
	هيلوباتيات		Hylobatidés
		جبون ، هيلوبات	Gibbon
		جبون سيامان	Siamang
	اشباه الانسان		Anthropoidés
		سحلاة	Orang
		بعامة	Chimpanzé
		غول ، غوريلا	Gorille



ثَرَامَةُ المَرَاعِي



ثَرَامَةُ بَيْغَاء



ثَرَامَةُ حَمْرَاء



ثَرَامَةُ خَضْرَاء المَوَاج



ثَرَامَةُ سَمْرَاء اللّون



ثَرَامَةُ عَاجِيَةِ اللّون

الشكل في اول عهدها ثم منبسطة ، لونها الى الحمرة . اطراسها الى الصفار الباهت .

٥٩٨٤ - ثَرَامَةُ نَظْرُونِيَّةِ الرَّايِحَةِ ٥

Hygrophorus nitrat (S).
Hygrophore à odeur nitreuse (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه .
يكثر في المَرَاعِي . ارسوسته مظلية الشكل ، دابقة ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الكهبة السمرء . رائحتها نظرونية مستهجنة . ساقها قصيرة .

٥٩٨٥ - ثَرُوب

Epiploon
شم رقيق على الكرش والامعاء . ج ثروب وأثر . يقال
أثر الكبش اذا زاد ثربه اي شممه .

٥٩٨٦ - ثَرُوبَاء

Grasse (F). Fatty (E).
الانثى السمينه الكانزة اللحم من الضأن والماعز .

٥٩٨٧ - ثَرُوبِيّ

Epiploïque (F), Epiploïc (E).

٥٩٨٨ - ثَرُوبِيَّة ٥

Stylophorum (S).
Stylophore (F). Stylophorum (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخشخاشيات . سوقها
دقيقة تعلو من ١٥ الى ٥٠ سم . اوراقها ريشية ، مخرمة
ومفصصة . نصالها بحرية الخضار ، خلية الزغب . ازهارها
صفراء اللون || تزورح للزبين . انواعها المعروفة قليلة
العدد ، اشهرها التالية .

٥٩٨٩ - ثَرُوبِيَّة اليابان ٥

Stylophorum japonicum (S).
Stylophore du Japon (F).

نوع من الثَرُوبِيَّة . ساقها دقيقة تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .
اوراقها ريشية مخرمة ومفصصة . ازهارها محورية الارتكاز
كازهار الخشخاش ، وهي كبيرة القد ، صفراء اللون ||
تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٥٩٩٠ - ثَرُوبِيَّة ثُنَائِيَّة الاوراق ٥

Stylophorum diphyllum (S).
Stylophore à 2 feuilles (F).

نوع من الثَرُوبِيَّة . ساقها دقيقة تعلو من ١٥ الى ٣٠ سم .
اوراقها قريبة الشبه باوراق عروق الصباغين وهما اثنتان
لاغير . ازهارها هامية الارتكاز ، قليلة العدد ، من ٢
الى ٤ ، صفراء اللون ، مستطيلة الاذن || تنويرها في
ايار يستمر نحو ١٥ يوماً .

٥٩٩١ - ثَرَّة ، ثَرُور

Bonne laitière (F).
Great deal of milk (E).

الثرة والثُرور هي الغزيرة اللبن من اناث اندواجن كالبقرة
والشاة والعز والناقة . ج ثرار وثرر .

٥٩٩٢ - ثَرُورَاء

Crateropus (S).
Cratérope (F). Babbler (E).

جنس طير من الجواثم . انواعه نحو ٢٠ اعطانها البلاد
الحارة جميعها متوسطة القد قدرها قدر الشحرور . اثنائها
الى الصهبة والكهبة تعلوها رقشة لاقياسية الشكل ، غبراء
اللون . وهي كثيرة الزفرقة قوتها الحشرات والهوام .

٥٩٩٣ - ثَرْدُمَةُ ٥

Blaste, Blastème (F).
Blastus, Blastema (E).

من الشيط ، الجزء الذي يشمل القصرة والسريق .

٥٩٧٦ - ثَرَامَةُ المَرَاعِي ٥*

Hygrophorus pratensis (S).

Hygrophore des prés (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه .
يكثر وجوده في المَرَاعِي . ارسوسته صفراء اللون كالمشمش ،
قطرها نحو ٤ سم . اطراسها الى المغرة .

٥٩٧٧ - ثَرَامَةُ بَيْغَاء ٥*

Hygrophorus psittacinus (S).

Hygrophore perroquet (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه .
يكثر وجوده في الغابات الظليلة . ارسوسته مخروطية الشكل
ثم قعية ، قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الخضار البحري
الاصفر المواج . ساقها صفراء اللون تخضر وتزرق مع
الاقتراب من الارسوسة .

٥٩٧٨ - ثَرَامَةُ حَمْرَاء ٥*

Hygrophorus puniceus (S).

Hygrophore rouge ponceau (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر مأكول يكثر وجوده في احراج
السنديان . ارسوسته مظلية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم .
لونها الى الحمرة الدردية .

٥٩٧٩ - ثَرَامَةُ خَضْرَاء المَوَاج ٥*

Hygrophorus chlorophanus (S).

Hygrophore à reflets verts (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر مأكول يكثر وجوده في احراج
الصنوبر ارسوسته مخروطية او جرسية الشكل ، قطرها نحو
٦ سم . لونها الى الصفار المذهب الاخضر المواج .

٥٩٨٠ - ثَرَامَةُ سَمْرَاء اللّون ٥*

Hygrophorus leucophaeus (S).

Hygrophore brunâtre (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه .
يكثر وجوده في احراج الصنوبريات . ارسوسته شبه قعية
الشكل قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الصفرة السمرء تعلوها
مادة لزجة .

٥٩٨١ - ثَرَامَةُ عَاجِيَةِ اللّون *

Hygrophorus eburneus (S).

Hygrophore blanc ivoire (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه .
يكثر وجوده في احراج الصنوبريات . ارسوسته لزجة ،
قلنسوية الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض
العاجي ، رائحتها رائحة الكرفس .

٥٩٨٢ - ثَرَامَةُ قِرْمِزِيَّة اللّون

Hygrophorus coccineus (S).

Hygrophore rouge cochenille (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه .
يكثر وجوده في الغابات . ارسوسته صغيرة القد ، قلنسوية
الشكل ، قرمزية اللون .

٥٩٨٣ - ثَرَامَةُ مَخْرُوطِيَّةِ الشّكْلِ ٥

Hygrophorus conicus (S).

Hygrophore conique (F).

نوع من الثَرَامَةِ ، فطر كاعن الصنف غير مرغوب فيه .
يكثر وجوده في الغابات . ارسوسته صغيرة القد مخروطية

٦٠٠٤ - ثَرْغُول مُسْهِل (S). Bromus purgans (S).
Brome purgatif (F).
عشبة حولية برية تملو من ٢٥ الى ٤٥ سم جذورها غليظة
طبية نقيعها يسهل المعدة .

٦٠٠٥ - ثَرْم ، دُرْد (S). Edentés (F). Edentates (E).
رتبة من الحيوانات الليفة تتميز بقلة أسنانها أو بانعدامها .
من فصائلها المشهورة آكلات النمل والذباب والقرفيات
والكسالى .

٦٠٠٦ - ثَرْمَان (S). Hablitzia (F). Hablitzie (F).
نبات بري من السرمقيات ترعاه الابل والغنم . أوراقه
متعاقبة منعقة نصلها قلبي الشكل مدبب القصبة ملس
الصفحة فاقع اللون الاخضر . ازهاره عنقودية التجميع ،
صغيرة القد ، خضراء اللون .

٦٠٠٧ - ثَرْمَدَة (S).
الثرمة : من الحمض تسمو دون الذراع وهي اغلظ من
القلام اغصان بلا ورق خضراء شديدة الخضرة وإذا
تقادت سنتين غلظ ساقها فاتخذت امشاطاً لجودتها وصلابتها .
تصلب حتى تكاد تعجز الحديد ويكون طول ساقها اذا
تقادت شبراً . ج ثرمد وثرمدات (اللسان) .

٦٠٠٨ - ثَرْي (F). Humecter (F). To humectate (E).
ثرى التربة ثرية : بلها . وثرى المكان : رشه بالماء .

٦٠٠٩ - ثَرْي (F). Divitiaire (F).
الثرى من كان صاحب يسر فاحش .

٦٠١٠ - ثَرْيَا (F). Pléiades (F). Pleiad (E).
الثرى كوكبة من سبعة نجوم على كاهل الثور وعنته .
سميت بذلك لاقتراب نجومها من بعضها البعض . والثرى
ايضاً منزل من منازل القمر الشامية ينزلها القمر في الليلة
الثالثة من الشهر . وريقيب الثرى يدعى الاكليل .

٦٠١١ - ثَطَاء* ، ثَطَاءَة ، ثَطَاءَة (S).
Laches perversa (S).
Lache pervers (F). Laches perversa (E).

دويبة من العناكب الجواللة من فصيلة الهبوريات رباعيات
الروايا والمشاتين || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم .
عند الذكر ونحو ٢٦ مم عند الانثى . صدراسها مجني الشكل
حنطي اللون ، تملو زخرفة صفراء ولثوه بلوطي الشكل
يدعى الرأس ، عينها زيميتان . شيفها قويان . فكها
مستغلظا الطرف . جوامزها نشيطة ، كثيفة اللمب . بطنها
حنطي اللون ، اسود التسنيج ، ينتهي بزائدتين متلاصقتين ||
تألف الاراضي المذحاة . شعها متوسط القد تحيكة بين
الحجارة والنباتات الدفلة . عكديتها بيض بعيد النور
تحتفره تحت الحجارة . مسرحها دجوي وتغير موضع شعها
كلما دعت الحاجة || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة
اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . والانثى تمتح المكن في
غشاء تلفته وتحمله لاصقاً بمشاتها حتى النقف || لسمها
مؤلمة ومؤذية .

٦٠١٢ - ثَعَارِير (S).
الثمارير : نبات كاهليون يخرج ابيض (التاج) .

٥٩٩٤ - ثَرَر (F). Humecter (F). To humectate (E).
نضج الشيء بالماء ليرطبه .

٥٩٩٥ - ثَرْعَلَة (F). Camail (F). Hackle (E).
هي البرائل : الريش المحتج على عنق الديك .

٥٩٩٦ - ثَرْعَمَة * (S). Meretrix (S).
Meretrix, Mérétrice, Cythérée, Conque de
Vénus (F). Meretrix (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم
معديات الارجل وفصيلة الزهريرات || انواعها المعروفة
نحو ١٣٠ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتندلة
الحارة || اصداقها متباينة الاشكال ، يكثر فيها الصيواني .
مصاريمها متساوية ، ثلاثية الاسنان الرئيسية . اصفاها
مالسة او متتابعة التحزير الدقيق . اطرافها مستنة الختار .
مناعبها ثنائية ، طليقة ، نهضة الاطراف || تعيش منغممة
في الرمال المغورة بالماء او بين الصخور || لحمها
مأكولة ، جيدة الصنف .

٥٩٩٧ - ثَرْغُل ، ثَرْمَلَة (F). Renarde (F).
She-fox, Vixen (E).
هي انثى الثعلب .

٥٩٩٨ - ثَرْغُول (S). Bromus (S). Brome (F).
جنس نباتات عشبية من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة
منها الحولية والحولة والمنمرة . ومنها البرية والزراعية العلفية
والطبية || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٥٩٩٩ - ثَرْغُول الحَقِيل* ، عَلَقِيَّة (S). Bromus arvensis (S). Brome des champs (F). Corn
brome grass (E). Ackertrespe, Hudelgras (D). Bro-
mo, Forasacchi dei campi (I).


عشبة كلاتية معمرة تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم . تكثر في
الاراضي البور . تتلفها الماشية بشية . تزرع في المراعي
الاصطناعية مع غيرها من الاعشاب الكلاتية .

٦٠٠٠ - ثَرْغُول الشَّيْلَم* (S). Bromus secalinus (S). Brome des seigles, Sélin (F).
Cheat, Chess-grass, Drake (E). Roggentrespe, Ger-
sten-trespe (D). Segalino, Ventolano, Erba lolio (I).
عشبة برية حولية تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . تكثر بين
الزروع اخصها ذروع الشيلم . ترعاها الماشية وتعتلفها .
تعتبر من الاعشاب الضارة . يقضى عليها ببعض العواشيب .


٦٠٠١ - ثَرْغُول دَنْقَة* ، كَرْي (S). Bromus tectorum (S). Brome des murs, B. des toits
(F). Wall brome grass (E). Dach-trespe, Manertrespe
(D). Fieno tettaolo, Forasacchi dei tetti (I).
عشبة برية حولية تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . تكثر في
الاماكن القاحلة ، ترعى في التربة الكلسية . ترعاها
الماشية فيحسن صنف درمها .

٦٠٠٢ - ثَرْغُول شَرَادِر (S). Bromus Schrader (S).
Brome de Schrader (F).
عشبة كلاتية زراعية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . توجد
في جميع التربة . زراعتها تعمس خمس سنوات . انتاجها
وافر العلف الجيد الصنف . تبذر في اذار او نيسان
بمعدل ٥ كيلو للدم الواحد .


٦٠٠٣ - ثَرْغُول كَنْتَارِيَّة (S). Bromus Canariensis (S). Brome des Canaries (F).
عشبة برية حولية تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . حصفها الزغب
النصل تكثر في الاراضي الرطبة . ترعاها الماشية .



ثَرْعَمَة



ثَرْغُول الحَقِيل



ثَرْغُول الشَّيْلَم



ثَرْغُول دَنْقَة




ثَطَاء

مرتبة	فصيلة	عائلة	جنس
Tylenchoidea	Tylenchidae	Hoplolaiminae	Hoplolaimus Rotylenchus Helicotylenchus
		Pratylenchinae	Paratylenchus Radopholus Nacobbus Rotylenchulus
		Tylenchinae	Tylenchorhynchus Tetylenchus Ditylenchus Anguina Tylenchus Psilenchus Chitinotylenchus Trophurus Paranguina Atylenchus
	Tylenchulidae	Tylenchulinae	Tylenchulus Throphotylenchulus
		Sphaeronematinae	Sphaeronema Throphonema
	Heteroderidae	Heteroderinae	Heterodera Meloidogyne
	Cricone-matidae	Paratylenchinae	Meloidodera Paratylenchus Cacopaurus
		Criconematinae	Criconema Criconemoides Hemicycliophora
	Neotylenchidae	Neotylenchinae	Neotylenchus Hexatylenchus Deladenus
		Nothotylenchinae	Nothotylenchus Thada Boleodorus
		Paurodontinae	Halenchus Paurodontus Stictylus
Aphelenchoidea	Aphelenchidae	Aphelenchinae	Aphelenchus Aphelenchoides Anomyctus
		Paraphelenchinae	Paraphelenchus Metaphelenchus



ثعبان مرقط



ثعبانية الجذور

لما أنواعها فكثيرة العدد يعرف عنها ، حالياً ، بالنبات أو بالعضو النباتي الذي تنطفل عليه كقولك ثعبانية الحنطة و ثعبانية الجذور الخ ...

٦٠٢١ - ثَعْبَانِيَّة ٥ ، دودة ثَعْبَانِيَّة

Tylenchus (S). Anguillule (F).

جنس دويديات صغيرة من الثعبانيات ، أنواعه عديدة جميعها اسطوانية غيطية الشكل طولها من ١ الى ٥ سم. تركيب مختلف النباتات في مختلف اعضاءها || اعماها واشهرها ثعبانية الجذور والحنطة والساق والشوندرة .

٦٠٢٢ - ثَعْبَانِيَّة الجُدُور ٥ ، دودة الجذور الثعبانية

Heterodera radiculicola (S). Anguillule des racines (F). Wurzelälchen (D).

نوع من الثعبانيات . تركيب اكثر من الف نوع من النبات غير انها لا تضر وتؤدي الأ بعضها ، منها البطاطا والتبغ والبندورة والبطيخ والشمام والخيار الخ ... مظهرها الخارجي ثأليل عدسية وجرابية الشكل مملوءة بالبويضات والديدان تحيق بالجذور وتمنعها عن القيام بعملها الطبيعي .

٦٠١٣ - ثَعَالَة Renard (F). Fox (E).

الثعالة هو الثعلب . ويقال ارض مشعلة اي كثيرة الثعالب كما يقال معقرة للارض الكثيرة العقارب . ويقال اروغ من ثعالة .

٦٠١٤ - ثَعَام ٥ Tylopoma (S).

Tylopome (F). Tylopoma (E).

جنس دويبات قازبة سرلودة من الرخويات المعديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة البلدونيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم الاقطار الاسيوية والاروبية تعيش على ضفاف المناقع وبحاري المساء . اصداها حلزونية الشكل رقيقة القشار الكلسي .

٦٠١٥ - ثَعَب

الثعب : مسيل الماء في الوادي ج ثعبان .

٦٠١٦ - ثَعْبَان Le Serpent (F). The serpent (E).

الثعبان كوكبة نجوم شمالية الموقع تمتد بين الجاني والفكة وراعي الشتاء وبرج العذراء فتطوق حور وحية وتعرف نحو العقاب . تشمل العديد من السدم واكداس النجوم . عدد نجومها الواضحة المرققة ٦٤ .

٦٠١٧ - ثَعْبَان Serpent (F). Serpent, Snake (E).

اسم شامل يقع على الذكر والانثى يطلق على معظم الحيات ان خبيثة او غير خبيثة .

٦٠١٨ - ثَعْبَان مَرْقَط * ، أبو السُّور ، صَافِرَة

Psammophis sibilans (S). Couleuvre-chapelet, Chapelet (F). Hissing sand snake (E).

حية بيوض من البواغيات وفصيلة الحنشيات خلفيات الاغاريذ . جسمها يطول من ١٢٠ الى ١٥٠ سم. ثوبها الى الزرقاء السمره يعلوها ثلاثة غطوط قاطبة وتنقبط اسود . رأسها بيضي الشكل ، افطس الحطم . شدقها ضيق الملاقى واسع الانفراج . عدد اسنانها ٤٥ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الفك الاعلى من اصلها اربعة عظام مخددة ثابتة خلفية الارتكاز تبع السم في كل عضو تصيبه عندما يرقى حتى مستواها الداخلي || تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة . الانثى تسافد بعمر ست سنوات وتضع من ١٥ الى ٤٠ بيضة مجموعة في سبحتين تحضيتها في نفقين متباعدين معرضها الجنوب || تألف البر وتعيش بين الصخور . تسرح في النهار وفي اوائل الليل || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . قوتها القواضم والمضاء والثعابين . تقضي على الكبير من القواضم بالتقليص لتتمكن من ابتلاعه || فحيحها صفير صار يعلو وينخفض اكثر من دقيقة || تعتبر من الثعابين المؤذية .

٦٠١٩ - ثَعْبَانِي Serpigneux (F). Serpignous (E).

نعت تعريفية يطلق على العلل الجلدية المتلوية التبضيع .

٦٠٢٠ - ثَعْبَانِيَّات ، دِيدَان ثَعْبَانِيَّة

Tylenchoidea

رتبة حيوانات دنيا من طبقة السلكيات تشمل مرتبتين وست فصائل وثلاث عشرة عائلة ونحو ثلاثة وأربعين جنساً . تفصيلها باسمائها العلمية اللاتينية ما يتبع .

تلقاها ايداً الا فاتحة فاها وهي من شر الدواب تلدغ فلا يكاد يبرأ سليماً . اعطائها فسيحة الاربعاء تمتد من افريقية الشمالية الى السودان والحبشة والصومال والجزيرة وسورية وفلسطين . تعيش في الاماكن الجرداء قوتها الجراد والجنادب والاساريح والعناكب والنمل . ج ثعب .

٦٠٣٠ - **ثَعْبَع** * Huitre perlière, Pintadine (F). Pearl-oyster (E).

هو الصدفة اللؤلؤية نوع من المحار ينتمي الى الرخويات الصفيحيات الخياشيم . يربق اللؤلؤ في جوفه . يكثر وجوده في البحر الاحمر والخليج العربي وقرب شطوط سرديب وفي مضيق موزمبيق وفي بعض خلجان اليابان .

٦٠٣١ - **ثَعْد** الثعد : الرطب الغض من البقل .

٦٠٣٢ - **ثَعْر ، ثَعْر** Suc vénéneux (F). Poisonous juice (E). هو العصارة النباتية السامة .

٦٠٣٣ - **ثَعْرَان ، ثَعْرَوَان** Trayons supplémentaires (F). Supplementary dug, Additional dug (E). حلتان زائدتان في ضرع البقرة والشاة والعنز .

٦٠٣٤ - **ثَعْرُور**

الثعورور : الطرثوث وقيل طرفه وهو نبت يؤكل (التاج) . والثعورور هو اسل العنصل الابيض (التاج) . والقشاة الصفار وثمر الذونون وشجرة مرة . ج ثعارير (التاج) .

٦٠٣٥ - **ثَعْطَة** Œuf gâté (F). Spoiltegg (E). الثعطة : البيضة المذرة (اللسان) .

٦٠٣٦ - **ثَعْل** Trayon supplémentaire (F). Supplementary dug (E).

الثعل : خلف زائد في اخلاف الناقة وضرع الشاة والبقرة . ج ثعل . يقال ما أبين ثعل هذه البقرة .

٦٠٣٧ - **ثَعْل** Cladosporium, Megacladosporium جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات وفصيلة اللطحيات جريه الكنديية واضحة الشكل اسطوانية معوجة الطرف . كنانته صولجانية ، مؤثرة . بويضاته ثنائية الخلية . انواعه قليلة تكثر في بعض النباتات وأخصها الاشجار المثمرة فتوصفها بالتبع .

٦٠٣٨ - **ثَعْل البندورة**

Cladosporium fulvum (S). Cladosporiose de la tomate (F). Leaf mould of tomato (E). Braun-oder, Samtfleckigkeit der tomate (D).

فطر مجهري يعمرى اوراق البندورة فيعطها ويلويها . مظهره الخارجي يقع لاقياسية الشكل والحجم تركيب النصل فتطوح بلونه على الصفحة العليا وتمنطقه بوشاح ليد التركيب خلي النسيج ، زيتوني اللون يعطب الطبقة الادمية ويلويها فيسبب يبأس الاوراق يعقبه انملاص الازهار وذبول الشلة والنهار || يكافح باستعمال السوائل السلفوكلسية المحلولة ١٪ او السوائل المرتكزة على بوليسلفور الباريوم المحلول ٢٪ || ويدارك ايضاً باجتنااب الاكثار من الاسمدة الازوتية لانها تنشط هذا الوسم الفطري .

٦٠٣٩ - **ثَعْل الصبوانيات**

Cladosporium depressum فطر مجهري يعمرى بعض النباتات الصبوانية ، اخصها

٦٠٢٣ - **تُعبانيّة الحنطة** * ، دودة القمح الثعبانيّة

Tylenchus tritici (S).

Anguillule du blé (F). Wheat nematode (E). Weizenälchen (D).

نوع من الديدان التعبانية . ذكوره واناثه متساوية الحلقة . طولها نحو ١ مم . لونها الى السرة الحنطية الشفافة . تركيب البر فتؤذيها وتسبب له مرض الخرم . وذلك لانها تدخل السنايل عند تكوين برها فتتخره وتستقر في داخله ثم تجف وتبقى على هذه الحالة حتى زمن البذار حيث تنتشر من رطوبة التربة فتخرج من سباتها او يبيتها الزمي وتسرح في طاب قوتها فتتركب سوق الزرع وحذفه وينتهي بها المطاف الى السنايل والبر .

٦٠٢٤ - **تُعبانيّة الخلل** * Anguillula acetii (S). Anguillule du vinaigre (F).

دويذة من السلوكيات الكمية . جسمها خيطي نحيل يطول نحو ٢ مم . خطمها عادم الحلقات . قشارها شديد النعومة . تعيش في الخل الصادر عن الخمر لانه يحوي بعض المواد السكرية والزلالية التي تعيش عليها بعض الخشيات الدنيا والفطور المجهرية التي تركبها التعبانية لامتصاص ما فيها من عناصر ازوتية ركيزة قوتها الوحيدة .

٦٠٢٥ - **تُعبانيّة الساق** * ، دودة الساق التعبانية Tylenchus devastatrix (S). Anguillule de la tige (F). Stem eelworm (E). Stengelälchen (D).

نوع من الديدان التعبانية طولها من ١ الى ٢ مم . جسمها ابيض شفاف . اناثها تكبر ذكورها وتزيد بها بنحو ١ مم . تركب عدة نباتات فتؤذيها وتسبب لها بعض الامراض الفطرية . اكثر النباتات عرضة لاذي هذه الديدان الخروطال والجوئن .

٦٠٢٦ - **تُعبانيّة الشوندر** * ، دودة الشوندر التعبانية Heterodera schachtii (S). Anguillule des betteraves (F). Beet and potato eelworm (E). Rüben-und kartoffelälchen (D).

نوع من التعبانيات ذكورها اسطوانية خيطية . اناثها اجاصية الشكل طولها نحو مليمتر واحد . تركيب جذور وجذيرات الشوندر فتتخرها وتحترقها وتوقع بها اشد الاذي خاصة في الصروب السكرية .

٦٠٢٧ - **تُعبانيّة الشيلك** *

Aphelenchoides fragariae, Aphelenchus fragariae (S). Anguillule du fraisier (F). Strawberry eelworm (E). Erdbeerälchen (D).

نوع من الديدان التعبانية طولها يراوح من ١ الى ٢ مم . ذكورها واناثها متساوية القدر . ثوبها الى البياض التبي يملوه موج وردي . تركب جذور الشيلك فتؤذيها اشد الاذي وقد تسبب انملاص الازهار .

٦٠٢٨ - **ثَعْبَة**


الثعبة شجرة شبيهة بالثوعة الا انها اخشن ورقاً وساقها اغبر وليس لها حمل ولا منفعة فيها وهي من شجر الجبل ولها ظل كثيف (التاج) .

٦٠٢٩ - **ثَعْبَة** * Acanthodactylus pardalis (S). Acanthodactyle panthère (F).

رذغة خبيثة طولها يراوح من ١٦ الى ١٧ سم . تشبه سام ابرص غير انها خضراء الرأس والحلق جاحظة العينين لا




تُعبانيّة الحنطة




تُعبانيّة الخل



تُعبانيّة الساق



تُعبانيّة الشوندر



تُعبانيّة الشيلك




ثعبة




ثعشع

البش والسر والمكن عند بعض الطير والسماك والحشرات




طير: 1 حوام - 2 مفر - 3 باشق - 4 شحور - 5 سم - 6 غلاف - 7 درنة كبيرة - 8 نقاذ - 9 دري - 10 شرشور - 11 حشة - 12 درنة القصب - 13 رواق - 14 غريس
 ملتان - 15 صق - 16 وصة - 17 كاسر الجوز - 18 عذليب - 19 صوة - 20 عصفور الشوك - 21 مفتح - 22 دخلة التزار - 23 هازجة - 24 دخلة - 25 قرق - 26 ذعلوبة -
 27 حنكاد - 28 تبشر، صفراية - 29 جكة - 30 عند ايكوب - 31 عند - 32 تدرج - 33 حجل - 34 فراية - 35 نكات، ابو فعت - 36 طيطوي سلطاني - 37 زقراق - 38 زقراق
 فريجية - 39 طيط - 40 طيطوي اخضر - 41 عرشة - 42 زيتم - 43 عرشة صغيرة - 44 زيتج الماء، لورس - 45 غساس - 46 لم - 47 بطريق - 48 مقار - 49 مقار - 50 غطاس
 قوارب واسماك: 51 حمة - 52 ملحفاة - 53 غراء ملبجة - 54 غراء منشقة - 55 قرش - 56 حوجل - 57 جلكن - 58 سبتار، سبتج - حشرات: 59 حرمدة - 60 وراك -
 61 نمورية - 62 قرد - 61 ديلويه - 64 حجان - 65 صغلوب - 66 لفيفة - 67 عرمس - 68 انوس - 69 رسالة - 70 بشرة - 71 برفيل - 72 عيلة

لدييات




- 1 سملا ، شهم - 2 جيتون رشيق - 3 هتار ، قرد مقدس - 4 هجوس اسيل - 5 مكالك الفات - 6 قردوح مزواج - 7 قردوح يمني - 8 آبل - 9 ميداس - 10 ليور مكي - 11 شقشقة - 12 حيتو - 13 مزال - 14 ذقب امفر - 15 ثعلب - 16 قنك ، احص - 17 خبيج مجذعة ، عرقاء - 18 اسد - 19 بير - 20 نمر - 21 بوماء ، اسد امريكي - 22 بيج - 23 رباح - 24 زياده - 25 واثون - 26 قوطي - 27 دب اسمر - 28 دب سوري - 29 دب ابيض - 30 راتل - 31 مقور - 32 قاتم ، هرين


لديكات




- 1 طاكبان ، ملخيم - 2 مارغور - 3 بزل ، وعل فارسي - 4 وعل ارويتي - 5 ارويتي الاردان - 6 قاهور - 7 ثور المسك - 8 جاموس الملا - 9 جاموس ارلي - 10 بيسون امريكة - 11 قطاس ، غشقاء - 12 جيهل - 13 درياني - 14 زرافة - 15 وكتاب - 16 نالغ - 17 جل - 18 ألبك ، لانه - 19 بلطوش - 20 سنجاب - 21 قردون - 22 يربوع - 23 شيم - 24 ماره - 25 باكاس - 26 حارود - 27 دآب آي - 28 مدرع - 29 تَمَنُور - 30 ام قرة - 31 ثيلس - 32 فلنجر - 33 هلولان - 34 نفقر - 35 نخله الماء - 36 نصفاض




1 أناريه ، أميد البحر - 2 فظا - 3 مقرينس - 4 شيخ البحر - 5 فقمة ، عجل البحر - 6 بال المحيط - 7 حريش البحر - 8 فيل افريقي - 9 كركدن هندي - 10 سعاد هندي - 11 حمار
الزرد - 12 حمار الزرد المطواني - 13 فراء التبت - 14 فرس البحر ، هيموت - 15 رت ، غنير بري - 16 هاتوف - 17 حاتوف ، غنير النهر - 18 أيل - 19 أيل إلد - 20 يامور -
21 أيل ايل - 22 رنة ، رندير - 23 اروس - 24 غزال - 25 مراسي - 26 حيرة - 27 أرخ ، ماريتة - 28 حذلوم أغز - 29 نو - 30 اروس القطب - 31 ابو عرف ، غلب






- 1 قانود ، قرلى - 2 فيون الغاب - 3 فيون جليل - 4 فيون ازرق - 5 فيون ازغب - 6 دقيش اكحل - 7 دقيش ويدل - 8 غنثا - 9 ارقش ، ابر رقة - 10 هريق - 11 هريق الجنوب
 12 هريق المكسيك - 13 هريق كويا - 14 طوقان مزتر - 15 طوقان برهانه - 16 طوقان اكطر - 17 طوقان اصفر الزور - 18 طوقان احمر المنقاد - 19 بوقير ابيض الغرزة - 20 اودانور هين
 21 يحوم ، ققيع مدنى - 22 عفاة هبة - 23 ديسي - 24 ابو كشة - 25 ديسي - 26 قطة - 27 شرمكة - 28 طيهوج - 29 حبل ريمي ، شنار - 30 هكس - 31 فعامه
 32 روهاء ، ري - 33 آسو - 34 كزور ، شيم - 35 كوي - 36 يمجبي ، طير البوق - 37 حيارى - 38 طيبط - 39 قنزاغ - 40 طول ، ابو ساق - 41 حارس احمر ، غنر احمر
 42 ملاعقي ودي ، ابو مسوط - 43 ابو سمن - 44 طنطل - 45 بلشون ارجواني ، بجمفة - 46 بلشون ارسد ، دنكلة - 47 كركي متوج - 48 دمو الجنة ، دواد - 49 فوفو ، فرخة سلطانية
 50 بشروش - 51 نحام ، سرخاب - 52 وز قلمي - 53 وطار - 54 كيش ، ابو مالك - 55 غفاس كبير - 56 غاق - 57 زمج الماء ، نورس - 58 بجم ، حوصل - 59 متار


بعض فرائش الحشرية الأجيحة




- 1 متفون - 2 هينام الزوائد - 3 أبولون - 4 كليوترا - 5 غرة جميلة - 6 فولد - 7 بهوم - 8 جزيريس - 9 نمفولة - 10 اريبيس البراري الكبير - 11 لولاية صغيرة - 12 لقيية سيلار -
 13 لقيية ادونيس - 14 حلوقل زمردي - 15 بشورة الغروب - 16 بشورة انقبوبا - 17 بشورة النهار - 18 بشورة الصيف - 19 مسجان مور - 20 عربوة - 21 صعل الدقل - 22 صعل السم -
 23 صبقم - 24 بزة - 25 بشورة الليل - 26 لفة ايزابيل - 27 سفاطة - 28 حرمدة اكثارة - 29 خلاصة خضراء - 30 كوكلة مضطصة - 31 قهوة زرقاء - 32 غصيفة



ثُعلُ الصِيَوَانِيَّات



ثُعلُ القَرَعِيَّات



ثُعلُ المُوَزِيَّات



ثُعلُ البرازيل



ثُعلُ البَنَغَال



ثُعلُ أَمْرِيكَا



ثُعلُ تَدْرِي



ثُعلُ عَادِي

٦٠٤٧ - ثُعلُ الماء (Loutre (F). Otter (E).

هو القضاة ، اطلبها .

٦٠٤٨ - ثُعلُ أَمْرِيكَا * (Vulpes fulva (S).

Renard d'Amérique, R. rouge (F). Red fox (E).

ويدعى الثعلب الأحمر . نوع من الثعالب اعطانه البلاد الأمريكية . يكثر في الولايات المتحدة . وهو كبير الجثة مستطيلها وبره احمر اللون اسمر المواج .

٦٠٤٩ - ثُعلُ تَدْرِي * ، ثُعلُ كِيرْسَا ، قُرْصَاق (Vulpes corsac (S).

Renard corsac, R. adire, R. kirsa (F). Corsac (E).

نوع من الثعالب الصغيرة القد اعطانه بلاد التتر والمنغول وصفاف بحر قزوين . وبرها اغبر اللون اشقر المواج ، ذيلها مشيز بخطوط سود او رمادية اللون .

٦٠٥٠ - ثُعلُ سَنَجَانِي (Vulpes virginiana, Urocyon cinereo-argenteus (S).

Renard de Virginie, R. gris (F). Grey fox (E).

نوع من الثعالب الأمريكية اعطانه تمتد من الولايات المتحدة الى المكسيك وكستريكا . وهو صغير الجثة ، سنجاني اللون . فروه جميل الوبر الناعم ، ثمين القيمة .

٦٠٥١ - ثُعلُ عَادِي * ، ثُعلُ مَعْهُود (Vulpes alopex, V. vulgaria (S).

Renard commun (F). Common fox (E).

هو الثعلب الشائع المعروف المنتشر في معظم اقطار العالم القديم . ضرابه تسعة . اعرفها :

الثعلب الجبلي (Vulpes vulgaria montana (S).

Renard de montagne (F).

الثعلب السوري (Vulpes vulgaria syriaca (S).

Renard de Syrie (F).

الثعلب الفارسي (Vulpes vulgaria persica (S).

Renard de Perse (F).

الثعلب المصري (Vulpes vulgaria aegyptiaca (S).

Renard d'Egypte R. du Nil (F).

الثعلب الياباني (Vulpes vulgaria japonica (S).

Renard du Japon (F).

٦٠٥٢ - ثُعلُ فَضِي (Vulpes argentea, V. argentata (S).

Renard argenté, R. noir (F). Silver fox (E).

نوع من الثعالب الأمريكية . اعطانه مختلف مناطق نهر المسيسيبي . جثته متوسطة القد . ثوبه الى الرصاصي الفضي المواج . وبره شديد النعومة والكثافة . فروه جيد الصنف غالي الثمن .

٦٠٥٣ - ثُعلُ قُطْبِي ، ثُعلُ أَزْرَق (Vulpes lagopus (S).

Renard polaire, R. bleu, Isatis (F). Arctic fox, White fox, Blue fox (E).

نوع من الثعالب الصغيرة القد القصيرة الارجل يتميز باستطالة خطمه واستدارة اذنه . ثوبه مقيار اللون يتبدل مع فصول السنة من الابيض الى الازرق . وبره شديد النعومة والكثافة . فروه فاخر الصنف غالي الثمن . اعطانه بلاد القطب الشمالي .

٦٠٥٤ - ثُعلُ كَنَدَا (Vulpes velox (S).

Renard de Canada (F). Black fox (E).

نوع من الثعالب الأمريكية . موطنه بلاد كندا . وهو اصفر جثة من الثعلب العادي ، ثوبه الى السمرة الرمداء يملوها مواج فضي . فروه متوسط الصنف بخس الثمن .

الثمار والسذاب وحشيشة الملاك || يركب الاوراق على صفحاتها السفلى فيوشمها ببقع صغيرة رمادية اللون صفراء الحثار تقضي على النسيج المنحارة وتسبب ذبول ويابس الاوراق || يكافح باستعمال مركبات الكبريت وغيرها من الادوية الحديثة .

٦٠٤٠ - ثُعلُ القَرَعِيَّات * (Cladosporium cucumerinum, Scolicotrachum melophthorum (S).

Cladosporiose du melon, Nulle du melon, N. du concombre (F). Scab of cucumbers (E). Gurkenkrätze (D).

فطر مجهري يصيب بعض القرعيات اخضها الشام والبطيخ والخيار . يركب الاوراق فيرقشها ببقع سود تطوح بالنسج المنحارة . ويركب الثمار فيرقشها ببقع قرحية رمادية اللون ، دساعة ، صمغية الصبغة اللزجة تغمر في اللب فتتفطنه وتقضي عليه || يكافح باستعمال مركبات الكبريت والزنك بعد اجتناب الزراعة في التربة الطينية الرطبة الشديدة الاندماج .

٦٠٤١ - ثُعلُ اللُّوزِيَّات * (Cladosporium carpophilum, Megacladosporium carpophilum (S).

Tavelure du pêcher, T. de l'aman-dier, T. de l'abricotier, T. du prunier (F). Schrotschub-krankheit (D).

فطر مجهري عيم الانتشار يركب الاوراق والاغصان والثمار فيصدع البشرة ويشقق الادمة ويقرحها ويحطب اللحاء وينطق الثمار ببثور القرعية الجافة الصلصة الفحمية اللون || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواظير الفعالة الكثيرة العدد في وقتنا هذا .

٦٠٤٢ - ثُعلُ ، ثُعلُ أَصْفَر (Renard (F).

Vulpecula (E).

الثعلب او الثعلب الاصفر كوكبة نجوم موقعها الشمال . مركزها بين الدلفين والمقاب والدجاجة .

٦٠٤٣ - ثُعلُ (Vulpes (S).

Renard (F). Fox (E).

جنس حيوانات وحشية من فصيلة الكلبيات . انواعه ١٠ اما ضرابه فعديدة . اوطانه معظم اصقاع العالم القديم والجديد . وهو قريب الشبه من ابن آوى لا يفرقه عنه سوى حدقة عينيه اللوزية الشكل وذنبه الاكث . قوته ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والطير والعطاء والحشرات والثمار السكرية . انشاء تفص من اربعة الى ستة جراء تبصر النور بعد وضعها باسبوعين || وهو مشهور بالتحيل والروغان . الذكر منه يدعى ثعلبان وكنيته ابو الحصين وابو النجم وابو نوفل وابو الوثاب وابو الحبص . والانثى تدعى ثعلبة وكنيتها ام عويل .

٦٠٤٤ - ثُعلُ أَزْرَق (Renard bleu (F).

Blue fox (E).

هو الثعلب القطبي ، اطلبه .

٦٠٤٥ - ثُعلُ البرازيل * (Vulpes azarae (S).

Renard du Brésil (F). Brazilian fox (E).

نوع من الثعالب يعيش في البرازيل والبلاد المتاخمة لها . جثته جثة الثعلب العادي . وبره اصعب اشقر يزاد اسمراراً مع اقترابه من ثيج الظهر اما رأسه فارمد اللون .

٦٠٤٦ - ثُعلُ البَنَغَال * (Vulpes bengalensis (S).

Renard du Bengale, Renard indien (F). Indian fox (E).

نوع من الثعالب صغير القد يعيش في الهند . وبره اصعب اللون تملوه سمرة وسواد . فقرته وحدقة عينيه سود .

طرفي الارتكاز || أوراقه وسوقه تستعمل في الصناعات القشبة كالسلال والحصر وغيرها .

٦٠٦٩ - ثَغْرِي ، قَرْجِي Vulvaire (F).
Vulval, Vulvar (E). مختص بالثغر أي الفرج .

٦٠٧٠ - قُغِم Chien féroce (F). Fierce dog (E).
الضاري من الكلاب .

٦٠٧١ - ثُفَا* ، ثُفَّة ، ثُفَّة Felis chaus (S).
Chaus, Chat commun des jungles (F) Jungle cat (E).
نوع من السنابير البرية كبير الجثة طوله الكامل نحو ٩٠ سم. ثوبه الى الكهبة يسمر ويعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . قوائمه وذنبه مجذعة بالاسود . طرف ذنبه عابق السواد . اعطانه قسيحة الارعاء تشمل كامل آسية الصغرى وايران وافغانستان وبرماتية .

٦٠٧٢ - ثُفَاء Senebière (F). Wart-cress (E).
هو الرشاد البري ، اطلبه .

٦٠٧٣ - ثُفَاجَة* Ocydromus (S).
Ocydrome (F). Ocydromus (E).
طائر وحيد الجنس والنوع من طوال الساق وفصيلة الثغليات . اعطانه تمتد من الهند الى ماليزيه وزيلندا الجديدة . ملجته الحياقي بخاعي . جماعاته قليلة العدد . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى الفجر . تألف البراري والاحراج القريبة من جداول الماء . قربها الحشرات على اختلاف اجناسها وانواعها وبعض بزور النجيليات || جسمها ربعة ، متوسط القد ، يطول نحو ٢٧ سم . تتميز باستطالة المنقاد الجالس ، بصغر الجناح المستدير الطرف ، وبقصر الذيل المخروطي الشكل . ساقاها واصابعها شديدة النشط . ثوبها الى الشقحة يعلوها توشيح وتوشيم جؤوي واسمر || تدثن انحوصها في المواقع الدغلة بين الاعشاب الكثيفة المتنفة . الانثى تبيض من ٦ الى ١٠ بيضات . الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٦٠٧٤ - ثُفَافِيد Cirro-cumulus
الثفافيد هي الغيوم البيض المستطيلة المتراكبة .

٦٠٧٥ - ثُفَال Meulière (F). Millstone grit (E).
الحجر الاسفل من الرحي .

٦٠٧٦ - ثُفَد* Productidae (S).
Productidés (F). Productidae (E).
فئة من عضديات الارجل المفصليات يعود ظهورها الى الاباج الاول . احافير اجناسها وانواعها تمتد من الحقبة الديفونية الى البرمية .

٦٠٧٧ - ثُفَر ، حِيَاصَة Croupière (F). Crupper (E).
يقال ثُفَر الدابة وثُفَرها وضع لها الثُفَر . ج اثناء .

٦٠٧٨ - ثُفْرُوق Pédoncule de la datte (F).
Peduncle of date (E). علاقة قع البلجة .

٦٠٧٩ - ثُفْرُوق Rafle (F). Grape-stalk (E).
هو ما يبقى من عنقود العنب بعد اكل حبه او عنبه .

٦٠٥٥ - ثَغْلَب مَعْهُود Renard commun (F).
Common fox (E). هو الثعلب العادي ، اطلبه .

٦٠٥٦ - ثَغْلَبِيَّة Alopécure (F).
Meadow foxtail grass (E). هي ثعلبية الحقول وثلبية المروج تعرف بذنب وذيل الثعلب .

٦٠٥٧ - ثُعْلُول Papille (F). Papilla (E).
كل زائدة طبيعية صغيرة القد تنشب في الجسم وتعلو سطحه .

٦٠٥٨ - ثُعْلِيل Scutum (F). Scutum (E).
الثعليل الجزء السفلي من البرجاد عند الحشرات .

٦٠٥٩ - ثُعْلَبِيَّة Pelade (F). Pelada, Fox-evil (E).
هي داء الثعلب مرض عضوي يسبب انمعاط وبر وصوف الحيوان . وسقوط ريش الطير .

٦٠٦٠ - ثُعْلِيلَة Spicule (F). Spikulet (E).
اسم يطلق على بعض الاجرام الصغيرة المنتمزة من سيليس او كربونات الكلسيوم التي تأخذ ، غالباً ، شكل الشوك ويؤلف اجتماعها واتحادها هياكل الاسفنج .

٦٠٦١ - ثُغَاء ، رُغَاء Bèlement (F). Bleating (E).
صوت ذوات الخلف كالشاء والمعز وما شاكلها .

٦٠٦٢ - ثُغَارِير ضرب من البطيخ طيب الرائحة معلم بخطوط حر وصفر (فريتغ) .

٦٠٦٣ - ثُغَام شجر ابيض الزهر والثمر . واحدته ثغامة .

٦٠٦٤ - ثُغَب Décongelation (F).
Thawing (E). الثغب ذوبان جليد الأصراد او الاستصراد .

٦٠٦٥ - ثُغَر ، ثُغَر Vulve (F). Vulva (E).
الحياء لجميع ضروب السباع ولكل ذات مخلب (اللسان) .

٦٠٦٦ - ثُغَرَة Lacune (F). Lacuna, Air-cell (E).
كل فراغ داخل نسيج الجسم .

٦٠٦٧ - ثُغَرَة الثغرة : من خيار العشب وهي خضراء وقيل غبراء تضخم حتى تصير كأنها زنبيل مكفأ بما يركبها من الورق والنصنة وورقها على طول الاظافر وعرضها وفيها ملحقة قليلة مع خضرتها . وزهرتها بيضاء . ينبت لها غصنة في اصل واحد . وهي تنبت في جلد الارض ولا تنبت في الرمل . والابل تأكلها اكلاً شديداً ولها أرك اي تقيم الابل فيها وتعاود اكلها . ج ثُغَر (اللسان) .

٦٠٦٨ - ثُغْرُور Lygaea (S).
Lygée (F). Lygaea (E). نبات عشبي بري معمّر من فصيلة النجيليات . موطنه حوض البحر الابيض المتوسط . منهته المناقع وضفاف مجاري الماء || كمبرته قرصية دوفصية عديدة السوق . سوقه دقيقة ، منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . أوراقه صفية أسلية خفيفة مستطيلة . ازهاره سنبل الجميع ،



ثغور




ثفا



ثفاجة




ثغابة



ثَلَاثِيّ التَّجْزِيءِ




ثَلَاثِيّ التَّجْمِيعِ




ثَلَاثِيّ التَّرْكِيبِ




ثَلَاثِيّ الزَّوَايَا



ثَلَاثِيّ الشُّوكِ



ثَلَاثِيّ الْفُصُوصِ



ثَلَاثِيّ الْمَسَاكِينِ

٦٠٩٢ - ثَلَاثِيّ الْبُزُورِ Trisperme (F).

Trisperm (E).
نعت تعريفي يطلق على ما سوى ثلاث بلور .

٦٠٩٣ - ثَلَاثِيّ التَّجْزِيءِ* Trifide (F). Trifid (E).

نعت تعريفي يطلق على الاعضاء النباتية والحيوانية الثلاثية التجزئية .

٦٠٩٤ - ثَلَاثِيّ التَّجْمِيعِ*

Trifolié (F). Trifoliated (E).
نعت تعريفي يطلق على الاوراق الثلاثية التجميع .

٦٠٩٥ - ثَلَاثِيّ التَّرْكِيبِ* Trichotome (F).

Trichotoma (E).
نعت وصفي يدل على الاعضاء النباتية الثلاثية التركيب او التجميع .

٦٠٩٦ - ثَلَاثِيّ الْحُدُودِ Trinôme (F).

Trinomial (E).
كيفية جبرية ثلاثية او ذات ثلاثة حدود .

٦٠٩٧ - ثَلَاثِيّ الْحَوْلِ Triennal (F). Triennial (E).

كل ما استمر ثلاث سنوات .

٦٠٩٨ - ثَلَاثِيّ الذَّرِيَّاتِ Tricuspid (F).

Tricuspid (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ثلاثي الاطراف او الرؤوس كالجنجل والسفرس .

٦٠٩٩ - ثَلَاثِيّ الزَّوَايَا* Trigone (F). Trigon (E).

نعت تعريفي وصفي يطلق على الاعضاء النباتية الثلاثية الزوايا اخصها الاوراق والخرايب والافنان والثمار .

٦١٠٠ - ثَلَاثِيّ الشَّكْلِ

Trimorphe (F). Trimorphous (E).
نعت تعريفي يطلق على المواد القابلة للتبلور في ثلاثة اشكال متناقضة .

٦١٠١ - ثَلَاثِيّ الشُّوكِ*

Tricanth (F). Tricanthus (E).
نعت تعريفي يطلق على الشوك الثلاثي التركيب .

٦١٠٢ - ثَلَاثِيّ الصَّفِ Tristique (F).

Tristichous (E).
ما كان ترتيبه ثلاثي الصف .

٦١٠٣ - ثَلَاثِيّ الْعُرُوقِ Trinervé (F).

Trinervate (E).
نعت تعريفي يطلق على اتصال الاوراق الثلاثية العروق .

٦١٠٤ - ثَلَاثِيّ الْفُصُوصِ* Trilobé (F).

Trilobate (E).
ما كان مركب من ثلاثة فصوص .

٦١٠٥ - ثَلَاثِيّ الْمَحَوَّرِ Triaxe (F). Triaxle (E).

ما كان محوره ثلاثي الاجزاء .

٦١٠٦ - ثَلَاثِيّ الْمِدَقَّاتِ* Trigyne (F).

Trigynous, Trigyn (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار الثلاثية الاقلام ومدقاتها .

٦١٠٧ - ثَلَاثِيّ الْمَسَاكِينِ* Triloculaire (F).

Trilocular (E).
ما كان ينقسم الى ثلاثة احيية .

٦٠٨٠ - ثُفْلُ Dépôt (F). Sediment (E).

ما سفل من كل شيء وهو خثارته . يقال علا صفوه ورسب ثفله .

٦٠٨١ - ثُفْلُ الْجِيْعَةِ ، ثُفْلُ الْبِيْرَا

Drêche (F). Draff (E).
هو ما يبقى من الشعير بعد استحلاب مواده اللازمة لصناعة البيرة وهو يستعمل كحلف للدواجن اخصها البقر الخلوب . ومن الواجب اجتناب تخميره فيما لو حفظ عدة ايام لذلك يحسن تجفيفه .

٦٠٨٢ - ثُفْلُ الدِّبَاغِ Tannée (F). Tanned (E).

هو ما يبقى بعد ديبغ الجلود من قشور ومواد مختلفة .

٦٠٨٣ - ثُفْلُ الْقَصَبِ Bagasse (F).

Bagasse, Cane-trash (E).
هو ما يبقى من الياف قصب السكر بعد سحقه لاستخراج عصيره السكري .

٦٠٨٤ - ثُفْنَةُ Grasset (F). Stifle (E).

الثفنة او الداغصة في رجل الفرس هي موصل الفخذ بالساق . والثفنة من البعير : ما يقع على الارض من اعضائه اذا استناخ كالركبتين .

٦٠٨٥ - ثُقَابَةٌ* Tereido (S).

Taret (F). Tereido, Ship-worm (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الحياشيم وفصيلة الغوثريرات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بحار اربعة الشمالية || اجسامها دودية ، شبه مردنية الشكل . اصدافها صغيرة تلحف القليل من مقدم الجسم || تعيش على الاخشاب العائمة وعلى اخشاب المراكب والصادات فتثقبها وتسبب الاضرار الجسيمة . وهي التي سببت انهيار الكثير من الاسدة الهولندية عام ١٧٣٤ .

٦٠٨٦ - ثِقَلٌ ، ثِقَالَةٌ ، رَزَانَةٌ

Pesanteur (F). Weight, Heaviness (E).
قوة جذب الارض للجسام نحو نقطتها المركزية وهي مستقيمة الاتجاه شدتها تساوي وزن الجسم الملبط .

٦٠٨٧ - ثِقْلٌ نَوْعِيٌّ ، ثِقْلٌ نَسْبِيٌّ ، وَزْنٌ نَسْبِيٌّ

Densité (F). Density, Specific gravity (E).
هو معيار وزن المادة ومقارنته بوزن حجم من الماء مساو له اذا كانت المادة جامداً او سائلا اما اذا كانت المادة من الغازات فقارنتها تكون مع الهواء .

٦٠٨٨ - ثُكْنَةٌ هي السرب من الحمام وغيره .

٦٠٨٩ - ثَلَاثِيٌّ ، مَثْلُوثٌ Triple (F).

Treble, Triple (E).
ما حوى الشيء ثلاث مرات .

٦٠٩٠ - ثَلَاثِيّ الْاَدْوَارِ Triphasé (F). Triphased (E).

نعت تعريفي يطلق على التيار الكهربائي الثلاثي الادوار .

٦٠٩١ - ثَلَاثِيّ الْاَوْجَةِ ، ثَلَاثِيّ الصَّفَحَاتِ

Trièdre (F). Trihedral (E).
نعت تعريفي يطلق على الرسوم الهندسية الثلاثية السطوح المحدودة بنقطة تقاطعها .

خاسية التفريص . ازهارها عناقيد متدلية لونها الى البياض الوردى ، مآبرها صفر . ثمارها صغيرة مستديرة فستقية اللون يستخرج منها بعض المواد الطبية . عصير ساقها وفروعها مر المذاق ثم حلوه .

٦١٢١ - ثلثان كبير المثير

Solanum macrantherum (S). *Morelle à grandes anthers* (F).

جنية عارشة برية وتزيينية مهدها المكسيك . ساقها تمتد من مترين الى ثلاثة . اوراقها اهليلجية الشكل ، مستديرة القاعدة . زباء النصل . ازهارها بنفسجية اللون غليظة المآبر السمر . ثمارها صغيرة ، بيضية ، حمراء اللون .

٦١٢٢ - ثلثان ويندلندي

Solanum Wendlandi (S). *Morelle de Wendland* (F).

جنية عارشة برية وزراعية تزيينية مهدها البلاد الامريكية ، كوستاريكا وجوارها . ساقها تمتد من ٥ الى ٨ امتار . فروعها قليلة الشوك القصير الاحجن . اوراقها ملساء النصل بحيلة الخضار الزاهي . ازهارها طرفية الارتكاز متدلية لونها الى الزرقة اليلكية .

٦١٢٣ - ثلثان ياسميني

Solanum jasminoides (S). *Morelle-jasmin* (F).
جنية عارشة برية وتزيينية مهدها البرازيل . ساقها مرطاه تمتد من متر الى مترين . فروعها نحيلة مستطيلة . اوراقها اهليلجية . نصلها امس البشرة مسن الحافة . ازهارها عنقودية التجميع لونها الى البياض تعلوه مشحة زرقاء .

٦١٢٤ - ثلج

Neige (F). *Snow* (E).
ماء جامد يسقط رضاباً من الغيوم الدجئة والركام واحده ثلجة والجمع ثلوج . والثلج يقي الزرع اضرار الجمد ويندي التربة بالماء احسن من المطر كما انه يقضي على الكثير من الحشرات وبعض الفطور المجهرية .

٦١٢٥ - ثلج

Algion (F). *Eaglet* (E).
الثلج هو فرخ العقاب .

٦١٢٦ - ثلجينة

Selago (S). *Sélagine* (F).
جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الثلجنيات . انواعها المعروفة نحو ١٢ جميعها معمرة . معظمها جنبي وبعضها مجلي ونحبي . فروعها متراكبة دقيقة . اوراقها متعاقبة خيطية . ازهارها سنبلية التجميع . صغيرة القد . خاسية البتلات الزرق .

٦١٢٧ - ثلجينية

Selaginaceae (S). *Sélaginacées* (F). *Selaginaceae* (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . نباتاتها قريبة الشبه من الحزازيريات . اجناسها ثلاثة اشهرها الثلجينة .

٦١٢٨ - ثلخ، ثلث

Bouse de vache (F). *Cow-dung* (E).
هو غثي البقر الرقيق وقد يحصل من اكل الربيع .

٦١٢٩ - ثلغ

Ecorcher (F). *To skin, To peel off* (E).
انتزع البشرة مع شيء من اللحم .

٦١٣٠ - ثلغثة

الثلغثة هي الثلثة هي الثمار الساقطة المفشخة .

٦١٠٨ - ثلاثي المصارع

Trivalve (F). *Trivalvular* (E).
نعت تعريفي يطلق على ما حوى ثلاثة مصارع .

٦١٠٩ - ثلاثي التكافؤ

Trivalent
نعت تعريفي يطلق على العناصر الكيماوية الثلاثية التكافؤ .

٦١١٠ - ثلاثي المنطش

Tripløide (F). *Tripløid* (E).
النباتات الثلاثية المنطش هي التي يبلغ عدد نشبها ضعف عدد فردية المنطش .

٦١١١ - ثلاثيات الفلق ، ثلثيات

Trilobites (F). *Trilobites* (E).
فئة من القشريات حشريات الصدف . جميع انواعها من متحجرات الاحقاب الغابرة العائدة الى الاباج الاول || اجسامها مركبة من مجموعة حلقات مقسومة الى ثلاثة فصوص متلاحة ومؤلفة من ثلاثة اجزاء : الصدراس بما فيه الجبهة ونقرنا العين ثم الحلقات السكمية المتساوية الفلق الجانبية ثم القصيص .

Trilobites (F). *Trilobites* (E).
فئة من القشريات حشريات الصدف . جميع انواعها من متحجرات الاحقاب الغابرة العائدة الى الاباج الاول || اجسامها مركبة من مجموعة حلقات مقسومة الى ثلاثة فصوص متلاحة ومؤلفة من ثلاثة اجزاء : الصدراس بما فيه الجبهة ونقرنا العين ثم الحلقات السكمية المتساوية الفلق الجانبية ثم القصيص .

٦١١٢ - ثلاجة

Glacière (F).
Ice-cave, Ice-house, Freezing-machine (E).
هي المكان الطبيعي او الصناعي لحفظ الثلج وهي أيضاً الآلة التي تصنع الثلج والوعاء الذي تحفظ فيه الاشياء الممكن تثليجها .

٦١١٣ - ثلث

البعير انكسرت انيابه من الهرم وتناثر ذنبه . مؤنثه ثلثة وجمعه ثلثة .

٦١١٤ - ثلثة ، فرز

Troupeau de mouton (F).
القطيع من الغنم كثر عدده .

٦١١٥ - ثلثة

Eboulis (F). *Fallen rocks* (E).
هي التهور ، اطلبه .

٦١١٦ - ثلثوكي

Thélytoque (F).
نعت تعريفي بيولوجي يطلق على الولادة العذرية الانثوية النسل او السلالة .

٦١١٧ - ثلث

Tripler (F). *To treble, To triple* (E).
كثر الشيء ثلاثة اضعاف .

٦١١٨ - ثلثال

الثلثال : ضرب من الحمض (القاموس) .

٦١١٩ - ثلثان

Morelle (F). *Nightshade* (E).
عرة من الباذنجان انواعها قليلة العدد تتميز بنباتاتها العارشة المعمرة . اعرفها ما يلي .

٦١٢٠ - ثلثان لثلان ، حلومر ، عب الذئب

Solanum dulcamara (S). *M. douce amère, Vigne de Judée, Bourreau des arbres* (F). *Bitter-sweet, Wood nightshade, Felon-wort* (E). *Bittersüss, Bittersüss-nachtschatten* (D). *Dulcamara, Solatro dulcamara, Vite di Giudea* (I).
جنية مدادة متسلقة برية وتزيينية . ساقها تمتد من مترين الى اربعة امتار . فروعها ملس اللحماء . اوراقها ثلاثية او



ثلثان ثلثان



ثلجينة

Millet à chandelle, Sorgho-à épis, Couscou (F).
Pearl millet, Indian millet (E).

عشبة علفية زراعية ساقها غليظة وطويلة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. عصفها ازغب البشرة طويل النصل عريضه . سيلتها منتصبه ، اسطوانية الشكل قصيرة الهدب .

٦١٤٠ - ثمام حَبَشِيّ (S). Pennisetum Ruppeli (S).

Pennisetum de Ruppel, P. d'Abyssinie (F).
عشبة علفية زراعية عديدة الضروب مهدا الحبشة . ساقها تعلو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. سيلتها اسطوانية الشكل طوطا من ١٠ الى ٢٠ سم. اهدابها عديدة الالون فيها الوردي والاحمر والعقيني والبنيقسي .

٦١٤١ - ثمام صُوفِيّ (S). Pennisetum villosum (S).

Pennisetum laineux (F).
عشبة علفية برية وزراعية مهدا حوض البحر المتوسط والصومال والحبشة . ساقها تعلو من ٣٠ الى ٧٥ سم. عصفها متوسط الطول والعرض . سيلتها بيضية الشكل طوطا من ٥ الى ١٠ سم. اهدابها طويلة وكثيفة تبدو كجز الصفوف .

٦١٤٢ - ثمام هِنْدِيّ (S). Pennisetum à grands épis (F).

عشبة علفية زراعية مهدا الهند . ساقها تعلو من ١٢٠ الى ٢٥٠ سم. عصفها عريض مستطيل . سيلتها كبيرة القد طوطا من ٢٠ الى ٣٠ سم. لونها ال احمره العابقة .

٦١٤٣ - ثمام يَابَانِيّ (S). Pennisetum japonicum, P. compressum, P. purpurascens (S). Pennisetum japonais (F).

عشبة علفية زراعية مهدا اليابان . ساقها تعلو من ٦٠ الى ٩٠ سم. عصفها ضيق مستطيل . سيلتها اسطوانية قصيرة لبدة لونها ال الارجواني .

٦١٤٤ - ثمانيّ أَعْضَاءُ الثَّمَانِيّ (F). Octogyne (F).

صفة الازهار التي تحمل ثمان مدقات . Octogynous (E).

٦١٤٥ - ثمانيّ أَعْضَاءُ الثَمَانِيّ كَبِير (F). Octandre (F).

صفة الازهار التي تحمل ثمانية مآبر . Octandrian (E).

٦١٤٦ - ثمانيّ الأضلاع (F). Octogonal

ما كان شكله الهندسي مركب من ثمان زوايا وثمانية اضلاع متساوية .

٦١٤٧ - ثمانيّ الأوجه (F). Octaèdre (F).

ثماني أو ثمنن الارجح أو الصفحات . Octahedron (E).

٦١٤٨ - ثمة (F). Faisceau, Poignée d'herbe (F).

القبضة من الحشيش ومن العيدان اللدقيقة . Bundle (E).

٦١٤٩ - ثشم (F). Chien de chasse (F). Dog of hunting (E).

الثشم هو كلب الصيد من أي عرق كان .

٦١٥٠ - ثمرّة (F). Fruit

الثمرة ج. ثمر وثمار هي نتيجة التطور الطبيعي الذي يحل بالمبيض بعد تأبير مدقته لذلك فهي لتاج النبات لاستمراره . والثمار تقسم الى فئتين رئيسيتين الاولى تشمل الثمار الغضة

٦١٣١ - ثليب ، ثماعة (S). Thalicttrum (S).

Pigamon (F).
جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الشقاريات اوراقها مركبة ثلاثية ملساء البشرة || انواعه نحو ٧٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرارة . اعماها ما يلي .

٦١٣٢ - ثليب أصفر* ، كزبرة الحبشة (S). Thalicttrum flavum (S). Pigamon des prés, P. jaune, Rue des prés, Pied de milan, Fausse rhubarbe (F). Common meadow-rue, Feu-rue, False rhubarb (E). Gelbe weissenraute, Falscher rhabarber (D). Pigamo, P. delle palude, P. giallastro, Ruta falso, R. del prati (I).

نبات عشبي بري معمر . ساقه مضلعة تعلو من ٤٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه لامعة النصل جزئية العروق يقال انها مسهلة للمعدة . ازهاره صباغية لونها ال الاصفر الزاهي . ازهاره يستمر في حزيران وتموز .

٦١٣٣ - ثليب صغير* (S). Thalicttrum minus (S).

Pigamon mineur, Petit pigamon (F). Small meadowrue, Lesser meadowrue (E). Kleine welsenraute (D). Erba scopala (I).
نبات هشبي بري معمر يوجد بين الصخور في المناطق الجبلية . ساقه مضلعة تعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره صغيرة القد لونها ال الخضار الاصفر . ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

٦١٣٤ - ثمار ، غلّة (F). Fruits

هي ما يغلّه المال في اجال موقوتة دون ان يفقد او يستبدل شيئاً من جوهره . فاذا كانت من منتجات الطبيعة فهي الثمار الطبيعية . واذا تدخل في انتاجها الانسان فهي الثمار الصناعية كمحاصيل الارض من الحبوب والفاكهة . واذا كانت ربحاً يحق من مال كفوائد رؤوس الاموال بقيمة اجارة المنازل فهي الثمار المدلية .

٦١٣٥ - ثمار ٥ (F). Caprophile (F).

Caprophilous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الثمار وفيها . او على بعض انواع الطير الذي يرغب في الثمار .

٦١٣٦ - ثماريّة (F). Fruitier (F).

مكان حفظ الثمار . Fruiterer, Green-grocer (E).


٦١٣٧ - ثمام* (S). Pennisetum (S). Pennisète (F).

جنس نباتات عشبية برية زراعية من فصيلة النجيليات انواعه عديدة بعضها معمر . يتميز بسفيلاته الحريرية الاهداب || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

٦١٣٨ - ثمام أَرْجَنْتِيّ (S). Pennisetum latifolium (S). Pennisetum à larges feuilles (F).

عشبة علفية زراعية مهدا الارجنتين . ساقها تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. عصفها ازغب النصل ضيق العرض مستطيل الصفحة . سيلتها مركبة متدلية سيلاتها صغيرة القد كثيفة التجميع .

٦١٣٩ - ثمام أَرْغَب* (S). Pennisetum typhoideum, P. americanum (S).




ثليب أصفر



ثليب صغير



ثمام



ثمام ازغب

٦١٦٢ - ثنائي البويضة Biovulé (F). Biovul (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته ثنائية البويضة .

٦١٦٣ - ثنائي التخريم* ، تجزل Bifide (F). Bifid (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض اجزاء النبات الثنائية الانفلاق الطولي .

٦١٦٤ - ثنائي التوام Bigéminé (F).
Bigeminate (E).
نعت تعريفي يطلق على كل تنوير يضم في زبد واحد توأمين من الأزهار .

٦١٦٥ - ثنائي الجنس Bigénère (F).
Bigenerous (E).
نعت تعريفي يطلق على كل هجين ناتج عن تصالب جنسي .

٦١٦٦ - ثنائي الجيل Bivoltain, Bivoltin (F).
Bivoltin (E).
اسم يطلق على كل شجرة تعيد دورتها الحياتية الكاملة ، المعروفة بالجيل ، مرتان في الحول ومنها بعض أنواع قزبة الحرير اي دودة القز .

٦١٦٧ - ثنائي الحدود ، ذو حدين Binôme (F). Binomial (E).
عبارة جبرية مركبة من حدين تجمعها علامة + أو - .

٦١٦٨ - ثنائي الحول ، محول Biennal (F).
Biennial (E).
ما يستمر سنتان او ما يتم بحولين .

٦١٦٩ - ثنائي الخباء Biloculaire (F).
Bilocular (E).
نعت تعريفي يطلق على الثمار المزدوجة الخدر او الخباء .

٦١٧٠ - ثنائي السداة Diandre (F). Diandrous (E).
هو في النبات المزدوج العضو الذكري .

٦١٧١ - ثنائي الغلاف Dipérianthé (F). Diperianth (E).
نعت تعريفي يطلق على الأزهار المزدوجة الكم .

٦١٧٢ - ثنائي الفص Bilobé (F). Bilobate (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو منقسم الى فصين .

٦١٧٣ - ثنائي القعالة Dipétale (F). Dipetal (E).
نعت تعريفي يطلق على الأزهار المزدوجة القعالات اي البتلات .

٦١٧٤ - ثنائي المحور Biaxe (F). Bisax (E).

٦١٧٥ - ثنائي المدقة Digyné (F). Digynous (E).
هو في النبات المزدوج العضو الانثوي .

٦١٧٦ - ثنائي المسكن Dioïque (F). Dioecious (E).
هو كل نبات تكون ازهاره الانثوية على نبتة وازهاره الذكورية على نبتة اخرى كالنخل والفسق والكستنا .

٦١٧٧ - ثنائي المكافئ Bivalent
نعت تعريفي يطلق على الاجسام الكيماوية الثنائية التكافؤ .

وهي التي تتضمن فيها اجزاء خاصة تمكنها من اختزان المواد الغذائية والثانية تشمل الثمار الجافة وهي التي يحف جدار مبيضها ومحتوياته عند النضج .

٦١٥١ - ثمرة فقيرة ، فقيرة ، أكثة Achaine, Akène (F). Achene, Akene (E).
هي كل ثمرة جافة او يابسة مطبقة وحيدة البذرة اللامتلاصقة بغلافها . كالهندقة واللوزة والكستناء .

٦١٥٢ - ثمن Octant (F). Octant (E).
الثلث كوكبة نجوم موقعها بالقرب من القطب الجنوبي مركزها تحت كوكبة الطاوس || والثلث يني ، في علم الرياضيات ، ثمن الدائرة اي ١/٦ من الدائرة .

٦١٥٣ - ثمن ، قيممة Coût (F). Costs (E).
هو قدر الشيء بالعملة المتداولة .

٦١٥٤ - شمش Arbuste, arbrisseau (F).
Shrub, Shubby tree (E).
الشمش من اشجار ما كان بين العشب والشجر . والكلمة يونانية الاصل من استعمال ابن البيطار .

٦١٥٥ - ثميلة* Platylophus (S).
Platylophe (F). Platylophus (E).
جنس طير من الجواثم وفصيلة الفراشيات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها جزر الزابج . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها تعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً . قوتها الحشرات والدوريات والثمار || اجسامها شبيهة بالزرياب . رؤوسها متوجة بفتازع ضمية الشكل . اذناها مقطوعة الاطراف . اثوابها جميلة الالوان الزاهية التي تختلف مع الانواع || تدن في الاشجار الرقيقة الوارفة . اناثها تضع من ٢ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها بينما الذكور تؤمن لها الغذاء .

٦١٥٦ - ثين Foin (F). Hay (E).
الثن هو يابس الحشيش . قال الراجز تكي اللواقح اكلة من ثين .

٦١٥٧ - ثنائي ، ثنائي Binaire (F). Binary (E).
ما هو مركب من عنصرين او ما هو يرتكز على عدد ٢ .

٦١٥٨ - ثنائي الأتوم ، ثنائي الذريرة Blatomique, Diatomique (F). Blatomic, Diatomic (E).
نعت تعريفي يطلق على الاجسام الكيماوية المركبة من اتيومين اي ذريتين .


٦١٥٩ - ثنائي الأساس ، ثنائي القاعدة Bibasique (F). Dibasic (E).
نعت تعريفي يطلق على كل جسم كياوي يتميز بازدواج خاصته القاعدية .

٦١٦٠ - ثنائي البذور Dispermatique, Disperme (F). Disperm (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة مزدوجة البذور وعلى كل نبات ثماره ثنائية البذور .


٦١٦١ - ثنائي البرعمة Bigemme (F).
Bigemmus (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يحمل براعم مزدوجة .



ثميلة



ثنائي التخريم




ثنائي الخباء

والابيض || تنويرها يستمر من اوائل الصيف الى اواسط الخريف .

٦١٨٩ - ثَوَاجِيَّات °
Theophrastaceae (S).
Theophrastacées (F). Theophrastaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض المناطق الحارة اخصها امريكة الجنوبية || نباتاتها بحال وجنيات متفاوتة الارتفاع . اوراقها متعاقبة ، قصيرة الاذينات . نصالها سنائية الشكل ، جامدة . ازهارها محوري الانتشاب ، ضمي التجميع . ازهارها كبيرة بحيلة الالوان الزاهية . اشهر اجناسها الشوابة .



نهلوله

٦١٩٠ - ثَوَار °
Eruptif (F). Eruptive (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما يثور فجأة .

٦١٩١ - ثَوَال °
Essaimant (F). Swarming (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض الحشرات المجتحة الجمال . وهو في النحل والنمل والارض والبعوضان نعت الذكور والاناث المجتحة .

٦١٩٢ - ثَوَج °
الثوج هو «الصابورية» شبه جوق من الخوص يستعمل في نقل التراب وغيره .



ثوجل سوي

٦١٩٣ - ثَوَجَل °
Sarcodon (S).
Sarcodon (F). Sarcodon (E).
جنس فطور من فصيلة الابريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها الغابات والحراج الجبلية . يعيش على المواد النباتية المتحللة . يتميز ببوخته الابيض وبنكاهه الكبيرة المختلفة الاشكال . بعض انواعه جيد الصنف مأكول والبعض الآخر كاعنه او رديته || اعرف انواعه واشهرها الخمسة التالية .

٦١٩٤ - ثَوَجَل أَشْقَح °
Sarcodon rufescens (S). Sarcodon rufescent (F).
نوع من الثوجل . يوجد في الغابات المختلطة الاشجار من وريقة وعروة وصنوبريات . ساقه معتدلة الضخامة والارتفاع ، صفراء اللون . نكته صابجية الشكل محدودة ، لونها الى الشقحة السعفاء ، قطرها نحو ٨ سم . || لحميته جامدة المكسر ، جيدة الصنف ، مأكولة .

٦١٩٥ - ثَوَجَل سَوِي °
Sarcodon laevigatum (S). Sarcodon uni (F).
نوع من الثوجل . يوجد في غابات الصنوبر . يعيش على المواد النباتية المتحللة . ساقه قصيرة ، غليظة ، طحلاء اللون . نكته كبيرة القد ، قمية الشكل ، سوية السطح الذي يتشقق عند الادراك ، قطرها من ١٥ الى ٢٠ سم . لونها الى الرمكة العفراء || لحميته كاعنه الصنف ، مرة المذاق ، لا تؤكل .

٦١٩٦ - ثَوَجَل قَارَش °
Sarcodon repandum (S). Sarcodon étalé (F).
نوع من الثوجل . يعيش جماعات وافرة العدد في ظل السديان الاخضر والملول . ساقه قصيرة ضخمة غبراء اللون يعلوها موج اطحل . نكته فارشة ، حلبة ، مجمدة ومفلقة ،

٦١٧٨ - ثَنَائِيَّي المنطش ، زَوَجِيَّي المنطش
Diploide (F). Diploid (E).

النباتات الثنائية المنطش هي التي يبلغ عدد نسلها ضعف عدد وحيدات المنطش . فالضروب الثنائية المنطش في التفاح مثلاً تحمل ارباعاً وثلاثين نسلية في حين ان فردية المنطش تحمل ١٧ .

٦١٧٩ - ثَنَائِيَّات الفِصَل
Disépale (F).
Disepal (E).
من الازهار من كانت مركبة من فصلتين منفصلتين .

٦١٨٠ - ثَنَائِيَّات الفَلَقَّة ، مُزْدَوِجَات الفَلَقَّة
Dicotylédones (F). Dicotyledons (E).
احد قسمي مستورات البزور . اما القسم الثاني فوحيدات الفلقة .

٦١٨١ - ثَنَائِيَّات القِصَال °
Dimyaires (F).
شعبة من الرخويات صفيحيات الحياشيم . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة جميعها ثنائية العضلات المصرعية القافلة .

٦١٨٢ - ثَنَّة
Fanon (F). Fetlock (E).
هو الشعر الطويل في مؤخر حوشب الفرس اي في راسها .

٦١٨٣ - ثَنَثَل ، ثَنَثَلَة
Œuf gâté (F).
الثنثل والثنثلة هي البيضة المذرة . Damaged egg (E).

٦١٨٤ - ثَنَظ
Levée des semis (F). Gathering (E).
الثنظ هو آليات اذا صدع الارض وظهر (التاج) والثنظ هو خروج الكمأة من الارض .

٦١٨٥ - ثَنِيَّي
Doublon (F). Doubleon (E).
هو من الدواجن بوجه عام ومن النعم والمعر بوجه خاص كل من اكمل سن السنتين ودخل في الثالثة . والاثني ثنية .


٦١٨٦ - ثَنِيَّة
Incisive, Pince (F).
Incisive tooth, Incisor (E).
هي السن القاطعة في الخيل والبقر والغنم والماعز ... وهما ثنيتان في كل فك .

٦١٨٧ - ثَهْلُولَة °
Beschorneria (S).
Beschornerie (F). Beschorneria (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النرجسيات . مهدا بلاد المكسيك . اوراقها ضبية الانتشاب كاوراق الباهرة واليوكا . نصالها كبيرة القد تطول من ٣٠ الى ٥٠ سم . وهي جامدة الصفحة ، لحمية الضلع ، مستنة الحفاف ، لونها الى الخضار الاطحل . ازهارها انبوية الشكل ، صغيرة القد ، صفراء اللون او حمراء او خضراء . ترتكز على شماريخ منتصبه ترتفع من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || انواعها المعروفة سبعة الفارق بينها حجم الاوراق واستطالة السراخ ولون الازهار || تزرع للتزيين ومزغب في المواقع المعتدلة الحرارة .

٦١٨٨ - ثَوَاجَة °
Theophrasta (S).
Théophraste, Coquemollier (F).
جنس نباتات جنبيه وبجلمية من فصيلة الشواحيات انواعها المعروفة اربعة ، جميعها شائمة الاستعمال التزييني || سوقها فراء . اوراقها متعاقبة . نصالها سنائية جامدة ، بحيلة الخضار الزاهي . ازهارها كبيرة نباح الاحمر والازرق



ثَوَجَلٌ مُحَرَّشَفٌ



ثَوَجَلٌ مَرَصُوفٌ



ثَوْرُ الْمَاءِ



ثَوْرُ الْمَسْكِ



ثَوَلٌ



ثَوَمٌ أَيْضٌ

قطرها نحو ١٠ سم. لونها الى الصفرة يعلوها موج تبنى
يخالطه الاسمر. أطرافها الى الصفرة السمر || لحميته
جامدة المكسر، جيدة الصنف، مأكولة.

٦١٩٧ - ثَوَجَلٌ مُحَرَّشَفٌ *

Sarcodon scabrosus (S). Sarcodon écailléux (F).

نوع من الثوجل. يوجد في غابات الصنوبر. يعيش جماعات
وافرة العدد على المواد النباتية المنحلة. ساقه قصيرة، غليظة
محددة، كستنية اللون، غبراء الموج. نكته فارشة،
محدودة، متاركة، محرشفة، كبيرة القد، قطرها نحو
١٥ سم. لونها الى البني الاشقق الاسفع الموج || لحميته
كرية الرائحة، مرة المذاق، لا تؤكل.

٦١٩٨ - ثَوَجَلٌ مَرَصُوفٌ *

Sarcodon imbricatum (S). Sarcodon imbriqué (F).

نوع من الثوجل. يوجد في غابات الصنوبر. يعيش على
المواد النباتية المنحلة. ساقه قصيرة، غليظة، غبراء اللون.
نكته فارشة، مرصوفة بالثمول الصغيرة الحادة الرؤوس،
لونها الى البني الاسفع الموج، ثموها الى البني الكستني.
قطرها نحو ١٢ سم. || لحميته كاعنة الصنف، غير
مرغوب فيها.

٦١٩٩ - ثَوْرٌ

Taureau (F). Bull (E).

هو ذكر البقر الصالح للنظ. ج ثيران وثيار وثوار.

٦٢٠٠ - ثَوْرُ الْمَاءِ *، مِرْجَانِيَّةٌ

Corallina (S). Coralline, Mousse marine (F). Coral-
lina (E). Korallenalge (D). Corallina (I).

جنس نباتات بحرية طيبة من الاشنيات. انواعه نحو ٢٠
عشرة منها محصورة ببحار المناطق الحارة والعشرة الاخرى
منتشرة في جميع بحار العالم. تعيش بمعظمها على الصخور
المرقطة بمياه البحر وبعضها يتطفل على الفؤوس. يقال
انها لا تخلو من المنافع الطبية.

٦٢٠١ - ثَوْرُ الْمَاءِ الْمُخْزَفِي *، مِرْجَانِيَّةٌ تَخْزِنِيَّةٌ

Corallina officinalis (S). Coralline officinale, Brion
(F). Corallina of the shops (E). Echte Korallenalge,
Korallen moss (D). Corallina officinali (I).

نوع من ثور الماء وهو نبات بحري طيب يعيش طفيلياً
على الفؤوس. يستعمل كطاردة للديدان.

٦٢٠٢ - ثَوْرُ الْمَسْكِ *

Ovibos moschatus (S).

Ovibos, Boeuf musqué (F). Musk-ox (E).

حيوان لبون يجتر من ذوات الاخلاف. يشبه الثور والكبش
معاً. طوله نحو ٢٤٠ سم. وارتفاعه ١٠٠ سم. اما وزنه
فن ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو. وهو غليظ القرن قصير الذيل.
موطنه البلاد الباردة الواقعة بين ٦٠ و ٨٢ من درجات
خطوط العرض. يعيش قطعان كبيرة يراوح عددها من
٣٠ الى ١٠٠ وازود || وهو يدعى ثور المسك لان
لحم الثور يحمل رائحة المسك.

٦٢٠٣ - ثَوْرٌ وَحْشِيٌّ، Bos primigenius (S). Aurochs, Urus (F). Aurochs, Urus (E).

نوع من الثيران البرية التي انقرضت منذ بضعة اجيال.

٦٢٠٤ - ثَوْرَانٌ

Eruption

حالة الشيء الثائر كالبركان ينفذ الحم.

٦٢٠٥ - ثَوَمٌ

« شجر من اشجار البلاد عظام تسو له ساق غليظة وعناقيد

كعناقيد البطم وهو بما تدوم خضرته وورقه مثل ورق
الجوز وهو سبط الاغصان وليس له حمل ولا ينتفع به في
شيء. « واحدته ثومة (اللسان).

٦٢٠٦ - ثَوَمٌ كَمَّةٌ

Neurada (S).

Neurade (F). Neurada (E).

جنس نباتات عشبية، برية، حولية او معمسة من فصيلة
الورديات. انواعها المعروفة عديدة اعطائها بعض مناطق حوض
البحر الابيض المتوسط، اخصها الشطوط الافريقية ||
سوقها مزغبة فرعاء بعضها يفرش الارض. اوراقها شعاعية،
أذينية، خلية النصال. ازهارها فردية، ابطية الارتكاز،
صغيرة القد، زنادية، وردية اللون او تبنية || تنويرها
يستمر من اواسط الربيع الى اواسط الصيف.

٦٢٠٧ - ثَوَلٌ *

Essaim (F). Swarm (E).

الثول هو جماعة النحل عند الافراق بعد هجرها القفير
الام وقبل دخولها النحיתה الجديدة. وهو مؤلف من ملكة
مبكوكة وبعض الذكور وعدة الاف من العاملات.

٦٢٠٨ - ثَوَلٌ

عارض جنون يصيب الغنم والماعز. يقال: شاة ثولاء وتيس
اثول.

٦٢٠٩ - ثَوَلٌ، ثَوَلٌ، ثَوَلٌ

Fourreau (F). Sheath (E).

هو وعاء قضيب البعير والثور والتيس. واصله في البعير
وقبل هو القضيب نفسه (اللسان).

٦٢١٠ - ثَوَلٌ ثَوَلٌ

Verrue (F). Wart (E).

خراج في الجسم ناقى صلب مستدير.

٦٢١١ - ثَوَمٌ

Allium (S). Ail (F). Garlic (E).

جنس نباتات بصلية عشبية من فصيلة الزنبقيات. انواعه
عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقلي كالثوم والكراث
والقفلوط || اوراقها قرصية الانتشاب عصفية الشكل
خفيفة النصل. ازهارها نورة خيمية قائمة على سبراخ قرصي
ليني منتصب اجوف. ثمارها بزور دقيقة مسترقة سوداء
اللون. اعرف انواعه ما يتبع.

٦٢١٢ - ثَوَمٌ أَيْضٌ *

Allium neapolitanum (S).

Ail blanc (F). White garlic (E).

نوع من الثوم البري والزراعي التزييني. اوراقه عصفية
مسنتة. ستراخه مضلع الزوايا ثلاثيها يعلو من ٣٠ الى
٦٠ سم. ازهاره زهلة بيضاء اللون. ازهاره يستمر من اذار
الى ايار.

٦٢١٣ - ثَوَمٌ الْحَيَّةِ

Germandrée aquatique (F).

هو الاسقودريون المائي، اطلبه.

٦٢١٤ - ثَوَمٌ الشَّرْقِ

Ail d'Orient (F).

هو الكراث النبطي، اطلبه.

٦٢١٥ - ثَوَمٌ الْغَزَالِ *

Allium victorialis (S).

Ail de cerf (F). Long rooted garlic (E). Mäusellauch,
Wilder knoblauch (D). Cipolla salvatica, Nardo
falso, Aglio con foglie di piantaggine (I).


نوع من الثوم البري يكثر في الاحراج الجبلية. اوراقه
سطيطة ملقحة الزام الاخير.



ثوم النزال



ثوم بري



ثوم جبلي



ثوم زراعي



ثباتونيس أحمر البطن



ثبتل

٦٢٢٧ - ثوملاء

Spilanthus, Spilanthus (S).

Spilanthus (F). Spilanthus (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة اللبدييات أو المركبات اللبدييات. أنواعها المعروفة ١٢ أعطتها بعض المناطق الحارة من العالمين القديم والجديد || معظم أنواعها طبي يحوي بعض الادهان الاساسية النشطة العرف المعطري والحريفة العلم || أشهر أنواعها ثوملاء اكلة المعروفة بحشيشة النطق. وثوملاء بارا المعروفة بحشيشة التناق.

Bergerie (F). Sheepfold (E).

٦٢٢٨ - ثوية

هي مأوى الغنم.

Uliginaire, Uligineux (F).

٦٢٢٩ - ثشد

Uligineux, Uliginal (E).

م. ثشدة. نعت تعريفي يطلق على كل نبات يعيش في المواقع الرطبة.

Thiamine (F).

٦٢٣٠ - ثيامين

الثيامين هو الاسم العلمي لفيتامين ب١ ويدعى أيضاً ثورين ، اطلبه .

٦٢٣١ - ثباتونيس أحمر البطن

Cyanotis rubigastrea (S).

Tachuris à ventre rouge (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم مشرويات المناقير وفصيلة الفصوييات. يألف المروج والغابات وضفاف مجاري الماء. قوته الحشرات. موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية اخصها الشيلي || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم. ثوبه جميل الالوان المزوذة. رأسه متوج بكشة مستديرة قليلة الارتفاع تشبه التاج. رأسه وكشته وسائر الصفحة العليا الى الخضار اللامع يعلوه تجذيع ابيض في الجناح وفي الذنب. ذنبه معتدل الحجم ، مستدير الطرف. كشته خضراء الحافة الداخلية، حمراء الخارجية. زوره وصدره وبطنه الى الحمرة الزاهية. خوافه الى الشفحة. ايطلاه مرقوشتان بالاسود || يدئش عشه في الاشجار الرفيعة. الانثى تحضن بمتابعة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات. الترخيم يستمر نحو اسبوعين.

٦٢٣٢ - ثبتل ، ثبتل ، أبو زلاف

Boselaphus, Portax, Tragelaphus trago camelus, Tragelaphus picta (S). Boselaphe, B. Nilgaut, Tragelaphe (F). Tragelaph (E).

حيوان من بقر الوحش وحيد الجنس والنوع كبير الجثة طوله يراوح من ٢٤٥ الى ٢٧٠ سم. وارتفاعه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم. وهو اكهب الثوب تعلوه سمرة وزرقة. مستطيل الرأس ، عريض الصدر والزور. مرتفع الخارك. منحدر الكفل. قائمتاه الاماميتان ارفع من الخلفيتين. للذكر قرنان صديران منعطفان فوق رأسه وهما اصغر واحدة من قرني الوعل. طول القرن نحو ٢٢ سم. اما الانثى فجاء. والذكر عقيصة شعر جثل تقله زوره. وصغار الثبتل تدعى أرعية. اجله يراوح من زوجين الى خمسة ازواج. موطنه الحالي يمتد من الخليج الفارسي الى جنوب حملايا.

Ordinateur (F).

٦٢٣٣ - ثقف ، كمبيوتر

Computer (E).

الثقف جهاز الكتروني ينظم المعطيات بغائق السرعة ويعطي بجميع الحواصل المطلوبة في جميع المجالات.

٦٢١٦ - ثوم بري* ، شقرديون

Allium silvestrum, A. xiphopetalum (S). All sauvage (F). Wild garlic (E). Wilder knoblauch (D). Aglio salvatico, (I).

هو الثوم البري المبدول. مهدد البلاد المعتدلة الحرارة. اوراقه تحضن جزءاً من الشمراخ المستطيل الغليظ الانتشاب.

Allium carinatum (S).

٦٢١٧ - ثوم جبلي*

Ail à feuilles carinées (F). Mountain garlic, Keeled garlic (E). Berglauch, Waldlauch (D). Aglio di montagna, A. carinata (I).

نوع من الثوم البري. يكثر في الجبال والأتربة الطينية. اوراقه مستطيلة لسنة. ازهاره سماوية اللون.

Ail doré (F).

٦٢١٨ - ثوم ذهبي

هو الحمزل الابيض ، اطلبه .

Allium sativum, Porrum sativum (S). All cultivé (F).

٦٢١٩ - ثوم زراعي* ، ثوم ، ثوم

Garlic (E). Knoblauch (D). Aglio (I).

نوع من الثوم وهو البقلة الزراعية المعروفة. ضروريه عديدة تختلف بشكل وحجم ولون فصوصها وزمن زرعها وسرعة ادراكها || زراعته عميقة يوجد في جميع الأتربة الخفيفة والمتوسطة الاندماج يحسن صفته في الأتربة الحوارة الرغاب.

٦٢٢٠ - ثوم فلسطيني ، ثوم شوبر

Allium Schuberti (S). Ail de Palestine, Ail de Schubert (F). Schubert garlic (E).

نوع من الثوم البري والزراعي التزييني. مهدد فلسطين اوراقه عصفية مستطيلة. شمراخه يملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. ثورته خيمية كبيرة كثيفة الازهار العديدة. لونها الى الابيض الودي. ازهاره يستمر طوال فصل الصيف.

Ciboule (F). Stone-leek (E).

٦٢٢١ - ثوم قصبي

هو السبول ، اطلبه .

Allium odorum (S).

٦٢٢٢ - ثوم مروح

All odorant (F). Odoriferous garlic (E).

نوع من الثوم البري والزراعي التزييني اوراقه عصفية ضيقة مستطيلة. شمراخه الزهري يملو من ١٥ الى ٥٠ سم. ازهاره كثيفة التجميع بيضاء اللون. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

Ciboulette (F). Chive (E).

٦٢٢٣ - ثوم معمّر

هو القرط ، اطلبه .

٦٢٢٤ - ثومة

الثومة ج. ثوم. الثوم شجر طيب الريح عظام واسع الورق اخضر اطيب ريحاً من الآس يبسط في المجالس كما يبسط الریحان وتنخذ منه المساويك (اللسان).

٦٢٢٥ - ثومرّن

الثومرّن: نبات بزره قوي الحرارة (فريتغ).

٦٢٢٦ - ثومس

نبات يعرف بصمتر الحجار (اللسان).

فتها الاستطالة . اغدادها عادمة التخديد ، معظمها لا يلحف
كامل البطن . اثوابها بنية أو سمراء || جميعها مفترسة
وبعضها عاشب . مسرحها دجوي . معظمها يعيش كراشن
في قرى النمل || اشهر اجناسها التيكّم .

Verge du chameau (F).

Rod of camel (E).

٦٢٣٦ - ثيل

قضيبي البعير .

٦٢٣٧ - ثيل * ، كليل

Cynodon dactylon, Panicum dactylon, Dactylon
officinalis, Digitaria stolonifera (S). Herbe des Ber-
mudes, Chiendent pied de poule, Gros chiendent,
Paspale (F). Bermuda-grass, Dog's-tooth-grass, Scut-
ch-grass (E). Echter hunds Zahn, Bermudagrass (D).
Gramigna maggiore, Dante canino (I).

نبات عشبي عرضي مداد معسر من فصيلة النجيليات .
مبدول في جميع الأصقاع يكثر في الأتربة المروية . يعتبر
من النباتات الضارة المؤذية .

Dactyle pelotonné (F).

Hard grass (E).

٦٢٣٨ - ثيل 'عمران

هو الدكتيل المكعب ، اطلبه .

Pêcherie de perles (F).

Pearl fishery (E).

٦٢٣٩ - ثين

صيد اللؤلؤ واستخراجه من البحر .

Paussus (S).

Paussus (F). Paussus (E).

جنس حشرات من فصيلة التيكميات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض
اقاليم البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة
تطول من ٣ الى ٥ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها ناشزة .
قرونها الاستشعارية ثنائية الفصل ، الفصيلة الاولى صغيرة
الجرم اما الثانية فكبيرة ، مستضخمة ، اسطوانية الشكل ،
حيدبة السطح . تأثيرها وفكوكها وملامسها صغيرة . كواسلها
ضيقة . بطونها مستعرضة . اغدادها عادمة التخديد ،
مقطوعة المؤخر ، لا تلحف كامل البطن . قوائمها نشيطة .
اثوابها كستنية أو بنية أو شديدة السمرة || الحشرة الجملانة
مفترسة . مسرحها دجوي وبعض انواعها يعيش في قرى
النمل .

Paussidae (S).

Paussidés (F). Paussidae (E).


فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة
والمعتدلة الحرارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة ،
معتدلة التبسيط ، تطول من ٤ الى ٦ مم . رؤوسها صغيرة ،
مستعرضة . عيونها ناشزة . قرونها الاستشعارية ثنائية
الفصل ، الفصيلة الاولى صغيرة اما الثانية فكبيرة ،
مستضخمة ، اسطوانية الشكل . كواسلها لافياسية ، تكثر



تيكّم



ثيل



٦٢٤٧ - جَادِي Crocus, Safran (F).
هو الزعفران ، اطلبه . Crocus, Saffron (E).

٦٢٤٨ - جَادِبُ النَّسْغِ Ttre-sève (F).
Drawing-sap (E).
تضبيب يترك على النبتة الام في اثناء التطعيم لجذب النسغ.

٦٢٤٩ - جَادِبِيَّة Attraction, Gravitation
احدى الظواهر الطبيعية التي تنظم علاقة قوة الجر والانجذاب في الاجسام || صيغة قانون الجاذبية كما وضعه نيوتن تنص :
« كل جسم يتجاذب مع كل جسم آخر بقوة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مع ربع البعد بينهما . » وهو ما يفسر دوران الكواكب والارض حول الشمس ودوران القمر حول الارض .

٦٢٥٠ - جَادِبِيَّةُ الْمَاءِ Hydrocroplisme (F).
راجع شذخ .

٦٢٥١ - جَادِبِيَّةُ النُّورِ Phototropisme (F).
راجع ندد .

٦٢٥٢ - جَادِبِيَّةُ شَعْرِيَّة Capillarité (F).
Capillarity (E).
ظاهرة طبيعية تجعل النسغ يصعد في النبات . ويجعل الماء يصعد في التربة من العمق الى السطح حيث يتبخر .

٦٢٥٣ - جَادِر Rhizophage (F).
Rhizophagous (E).
الجاذز من الحيوان والحشرات الذي يقضي على جذور النبات .

٦٢٤٠ - جَاب Onagre (F), Onager (E).
الجَاب : الغليظ الشين من حمر الوحش .

٦٢٤١ - جَابَة الجابة هي بقرة الوحش

٦٢٤٢ - جَالِي ، رَاقِص Hercule (F).
Hercules (E).

الجالي او الراقص كوكبة نجوم شمالية الموقع ، تحيطها من اليسار القيثارة ومن اليمين الفكة ومن الجنوب العواء . وهي صورة رجل قد مد يده وجثا على ركبته ، احدى رجليه على طرف عصا العواء ، وهي اليمنى ، والاخرى عند الاربعه التي على رأس التين والتي تسمى العوائد || عدد نجومها ١١٣ ألمعها من المرتبة الثالثة والرابعة . أشهرها « رأس الجالي » ويدعى ايضاً « كلب الراعي » .

٦٢٤٣ - جَاحِم ، مَعْيُون Oculifère (F).
Oculiferous (E).

نعت تعريفي يطلق في علم التاريخ الطبي على كل من يحصل عيناً .

٦٢٤٤ - جَادِح Demi-rustique, assez rustique (F).
Sufficiently rustic (E).

نعت تعريفي يطلق على النباتات التي تتطلب بعض العناية ولا تجود إلا في اقاليم معينة واثربة خاصة .

٦٢٤٥ - جَادِر Onagre (F).
Onager, Wild ass (E).

الجادر حمار الوحش .

٦٢٤٦ - جَادِسة Terre inculte (F), Waste land (E).
كل ارض لم تعمر ولم تحرث ولم تزرع . ج . جوادس .

٦٢٧٠ - **جَاسٌ** (F). Burrowing (E).
صفة الحيوان أو الشيء الذي يحفر التربة .

٦٢٧١ - **جَاسَدٌ ، جَسِيدٌ** (F). Coagulé (sang) (F).
هو الدم متى جمد وليس .

٦٢٧٢ - **جَاسَنَتٌ** (F). Hyacinth (E).
هو الجوثن اطلبه .

٦٢٧٣ - **جَاضِمٌ*** (F). Labrum (E).
هو في الحشرات عضو يتصل بأزار البخق ويلحف التأثير
مركزه مركز الشفة وقد يمثلها .

٦٢٧٤ - **جَاعِرَةٌ ، رَقْمَةٌ** (F).
Buttock, Rump (E).
الجاعة هي إلية الحيوان وهما جاعرتان ورقتان قال الاصمعي
هما حرفا الوركين المشرفان على الفخذين . ومنهم من قال
مضرب الفرس بذنبه على فخذيه .

٦٢٧٥ - **جَأَفٌ** (F).
Déraciner (F).
To root up, To deracinate (E).
يقال جأف الشجرة من جذورها أي اقتلعها .

٦٢٧٦ - **جَافِرٌ** (F).
Anaphrodisiaque (F).
Anaphrodisiac (E).
الجافر كل ما من شأنه اضعاف الشهوة الجنسية عند
الانسان والحيوان .

٦٢٧٧ - **جَافِيَاتٌ** (F).
Ampélophages (F).
Ampelophagous (E).
الحشرات من أي فصيلة كانت تقضم الكرمة وتقربها .
مفردا جافن وجافنة .

٦٢٧٨ - **جَاكَآ*** ، **أَرْقُوكَرُبُسٌ** ، **شَجَرَةُ الْخُبْزِ**
Artocarpus (S). Artocarpe, Arbre à pain, Jacquier,
Jaquier (F). Bread tree, Bread fruit tree (E). Brod-
baum, Brotfruchtbaum (D). Artocarpo, Albero de
pane, Frutto di pane (I).

جنس اشجار من سبط الخبزيات وفصيلة الانجريات .
انواعه المعروفة نحو ٢٠ اعطانها البلاد الاستوائية . جميعها
اشجار دائمة تملو من ١٥ الى ٢٠ م . سوقها غليظة .
اغصانها منبسطة . اوراقها مفروسة تشبه اوراق التين .
ثمراها ضخمة بطيخية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .
قشورها محببة خضراء اللون . لبها ابيض . بذورها
كستنية الشكل والقذ واللون . لبها نشوي التركيب
مأكول بعد سلقه او شيه او طبخه . طعمه طعم الخبز مع
شيء من الارضي شوكي .

٦٢٧٩ - **جَاكْسُونِيَّةٌ*** ، **جَاكْسُونِيَّةٌ**

Jacksonia (S). Jacksonia (F).
جنس جنبات برية وتربينية من فصيلة القرنيات الفراشية
منبتها استراليه . انواعها المعروفة ٣٠ سوقها منتصبه .
قليلة الفروع ، كثيرة الاغصان . اوراقها حشوية الشكل .
ازهارها لائساي التجميع بكث في العنقودي والسبلي .
ازهارها فواحة العرف المستحب ، ارجوانية اللون او صفراء .

٦٢٨٠ - **جَاكُو*** ، **بَبْغَاءٌ رَمَادِيَّةٌ**

Psittacus erythacus (S).
Perroquet cendré, Jaco (F).
طائر من الببغاء . موطنه بعض مناطق افريقية الشمالية .

٦٢٥٤ - **جَادُورٌ** (F). Radicivore (F). Radicivorous (E).
آكل جذور النبات . نعت تعريف ي يطلق على كل حيوان
او حشرة تقرض جذور النبات وتعيش عليها .

٦٢٥٥ - **جَارٌ** (F). Luxuriant
الجَار من النبات : النض الريان .

٦٢٥٦ - **جَارُ الْمَاءِ** (F). Common alder (E).
Aune (F).
هو المغث ، اطلبه .

٦٢٥٧ - **جَارُ النَّهْرِ*** ، **سَلَقُ الْمَاءِ** ، **لِسَانُ الْبَحْرِ**
Potamogeton natans (S). Potamogeton flottant,
Epi d'eau, Potamot (F). Pondweed, Deill's spoons,
Tench weed (E). Schwimmdendes laichkraut (D). Po-
tamogeto maggiore, Lingua d'acqua (I).
نبات عشبي مائي مداد من فصيلة عرائس الماء . اوراقه
حاضنة ، بيضيه ، جلدية النصل ، شبه شفافة ، متقابلة .
ازهاره سنبل التجميع محوري الارتكاز . ازهاره خنثوية ،
طويلة الزناد خضراء اللون || كان ولا يزال من النباتات
الطبية ذات الاستعمال الخارجي نقيعه يفيد الحكايك .

٦٢٥٨ - **جَارَةُ الْمَاءِ** (F).
Aponogeton (F).
Water hawthorn (E).
راجع ابقونه .

٦٢٥٩ - **جَارَةُ الْمَاءِ السُّبُلِيَّةُ** (F).
Aponogeton en épis
راجع ابقونه سبيلية .

٦٢٦٠ - **جَارِحَةٌ** (F).
Bête de chasse
ما تعلم الاصطياد من كلب او فهد او بازي او نحو ذلك
ج . جوارح .

٦٢٦١ - **جَارِدٌ** (F).
Acridophagous (E).
نعت تعريف ي يطلق على كل من يأكل الجراد من انسان
وطائر وحيوان وحشرة .

٦٢٦٢ - **جَارِسٌ** ، **وَاشِعٌ** (F).
Anthophage, Floricole (F). Floricol (E).
نعت تعريف ي يطلق على كل طائر او حشرة مرتعها الزهر .

٦٢٦٣ - **جَارِنٌ** (F). Young serpent (E).
Serpenteau (F).
ولد الحية من يوم نفضه حتى الثلاثة او الاربعة اشهر .

٦٢٦٤ - **جَارِنُكٌ** (F).
Prunier abricoté (F).
هو الجارنك ، اطلبه .

٦٢٦٥ - **جَارُودٌ** (F).
الجارود : السنة الشديدة الجل .

٦٢٦٦ - **جَارُودٌ** (F). Rat-polson (E).
Raticide (F).
كل مادة سامة تستعمل للقضاء على الجرذان واشباهها .


٦٢٦٧ - **جَارُوشٌ*** ، **مَجْرَشَةٌ** ، **مِرْضَاخٌ** ، **مِرْضَخَةٌ**
Concasseur (F). Bruising-mill, Crushing-mill (E).
آلة تستعمل لجرش الحبوب التي تتلفها الدواجن .

٦٢٦٨ - **جَارِعةٌ** (F).
Espalier (F).
الجارعة هي كل خشبة معروضة بين شيتين ليحمل عليها .


٦٢٦٩ - **جَارِلٌ** (F).
Dimère (F).
نعت تعريف ي يطلق ، في علم التاريخ الطبيعي ، على كل
عضو مركب من مفصلين أو جزئين .



جار النهر




جاروش



جاضم



جاكا



جاكسونيه



جاكو



جَاكُونِين



جَاكُونِين



جَامُوس أُرْنِي



جَامُوس أَصْهَب



جَامُوس الْخَلَا

أخطامها مستعرضة . جباهها نافرة محدبة وقصيرة . قرونها مستغلطة ، منعققة ، متتابعة الحيد ، مدببة الأطراف . أذناها كبيرة متدلية . أذناها متوسطة الطول || موطنها البلاد الآسيوية والأفريقية ، تألف المناقع وضياف الأنهار والبحيرات حيث تكثر من الإقامة في الماء . قوتها الأعشاب . أناثها أصغر جثة من ذكورها وهي حولية الحمل فردية التاج توضع صغيرها من ٣ إلى ٤ أشهر || أما أنواعه السبعة فهي ما يتبع .

٦٢٩١ - جَامُوس أُرْنِي * Bubalus arni (S).

Buffle arni, Arni (F).

نوع من الجاموس الآسيوي . أعطانه فسيحة الأرجاء تمتد من الهند إلى الهند الصينية وتجاووزها . يقال أنه يفرض الاحترام على البير والنمر ويقتحم الغيل إذا تعدى على مرعاه . وهو أكبر الجواميس جثة وأشدّها بأساً وبطشاً . يعلو نحو ٢٣٠ سم . ويطول نحو ٣٥٠ .

٦٢٩٢ - جَامُوس أَصْهَب * Bubalus b. fulvus (S).

Buffle fauve (F).

يقال أنه ضرب من النوع الهندي دجن منذ زمن بعيد يرتقي إلى عصر كنفوشيوس أو قبله . وهو يتميز باعتدال غلاظة أطرافه وبغزارة لبنه الأبيض || وما الجاموس الأفغاني والایراني والعراقي والسوري والمصري والتركي والأرميني واليوناني والإيطالي والدانوبي سوى سلالات تحدرت من هذا الضرب .

٦٢٩٣ - جَامُوس الْبَرّ

Bubalus pumilus, B. brachyceros (S). Buffle brachycère, Niari, Vache des buissons (F).

نوع من الجاموس الأفريقي . أعطانه فسيحة الأرجاء تمتد من حدود الصحراء الكبرى إلى شواطئ الأطلس وإلهادي . وهو صغير الجثة والقرن يعلو نحو ١٣٠ سم . ويطول نحو ٢٢٠ . يألف السهل والجبل على السواء لكنه لا يبتعد عن الماء أكثر من مسير ثلاث ساعات . أجله لاقياسي العدد يكثر في السهل ويقل في الجبل .

٦٢٩٤ - جَامُوس الْخَلَا * ، جَامُوس الْكَفَر

Bubalus caffer (S). Buffle de la Cafrerie (F).

نوع من الجاموس الأفريقي . أعطانه فسيحة الأرجاء تمتد من بحيرة فيكتوريا نيارزا إلى ضفاف الأورنج وبلاد الأنكولا . وهو ضخم الجثة كبيرها . يعلو نحو ١٤٠ سم . ويطول نحو ٢٤٥ سم . أما قرنه فلا يقل عن ٨٥ سم . وذنبه ٨٠ سم . وأذنه ٣٠ سم . أجله يراوح من ٥٠ إلى ٣٠٠ نفر .

٦٢٩٥ - جَامُوس النَّشَل

Bubalus acquinoctialis (S). Buffle équinoxial (F).

نوع من الجاموس الأفريقي . أعطانه تشمل كافة مناطق خط الاستواء الأفريقية التي لا تخلو من المناقع وبجاري الماء . وهو أصغر جثة من جاموس الكفر وأقصر قرناً وأذاً . أجله يراوح من ٢٠ إلى ٢٠٠ نفر .

٦٢٩٦ - جَامُوس الْهِنْد

Bubalus bubalus (S).

Buffle de l'Inde (F).

نوع من الجاموس الآسيوي دجن وتحدت منه جميع السلالات الأهلية المعروفة . يتميز باستطالة جثته وذنبه ، بقصر رأسه وانبساط جبهته ، بكبر أذنه وبصغر عينه . علوه يراوح من ١٣٠ إلى ٢٠٠ سم . وطوله من ٢٨٠ إلى ٣٢٠ سم . أما ذنبه فن ١٠٠ إلى ١٢٠ سم .

يألف الغابات وضياف مجاري الماء . ملجئه الخياقي بخاعي الأ في زمن التساند والحضانة . قوته الثمار والحبوب . يقتبس الكلام ويردده بسهولة فائقة خاصة إذا كان لا يزال نياً || ثوبه إلى الشبهة الرمادية الزرقاء الموج . ذنبه أحمر . عينه مطوقة بالأبيض . حدقة عينه كستنية اللون . متقاده ورسفاه وأصابه سود || يدثن عشه في تجاويف الأشجار . الأنثى لا تضع أكثر من بيضتين تحضنها وحدها بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

٦٢٨١ - جَاكُونِين * Heliiothryx (S).

Jacobiine (F). Heliiothryx (E).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناخير وفصيلة الفريسيات . أنواعه المعروفة سبعة موطنها معظم مناطق أمريكا الاستوائية . تألف الرياض وضياف الأنهر والمواقع الدغلة . قوتها الحشرات أخصها المجنحة وبعض الثمار العنبية البرية . أجسامها صغيرة تطول من ١٠ إلى ١٥ سم . تتميز باستطالة مناقيرها الجائسة وبكبر أذنان ذكورها . أثوابها العلوية متباينة الألوان العابقة الصفراء الموج . صدورها وبطنها عاجية . أناثها أصغر قدماً من ذكورها وأهت ثوباً .

٦٢٨٢ - جَاكُونِيَّة Jackia (S). Jackie (F).

جنس أشجار حرجية وتزيينية من فصيلة القويات . منبتها الهند الصينية وجزر الزابج . أنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مغزلية الشكل ، بأسقة القد . أوراقها منعقة ، متقابلة ، متوسطة النصل . أزهارها عنقودية التجميع . ثمارها جلدية ، ثنائية البزور تستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

٦٢٨٣ - جَاكُونِيَّة * Jacquinia (S).

Jacquiele, Jacquiner (F). Jacquinia, Bracelet wood (E). Jacquinia (D). Jacquinia (I).

جنس جنات برية وتزيينية من فصيلة الربيعيات أنواعها المعروفة ستة . مهدها أمريكا الاستوائية . أوراقها منعقة ، متماقبة . نصلها أهليلجي الشكل ، لامع البشرة . أزهارها جميلة القالب ، عنقودية التجميع ، متدلية .

٦٢٨٤ - جَالِحَة ، سَبِيخَة ، تَحْمِيَّة

Flocon (F). Flock, Tuft (E).

الجوالح ما تطاير من رؤوس القصب والبردي يشبه القطن .

٦٢٨٥ - جَالُون Jalon (F). Levelling-staff (E).

راجع أرفة .

٦٢٨٦ - جَام ، قَلَدَح Gobelet (F). Goblet (E).

شكل من أشكال تشذيب الأشجار المثمرة يكثر استعماله في التفاح .

٦٢٨٧ - جَامِس Desséché (F). Dried (E).

نبات جامس : ذهب غرضوته ورطوبته فول وجسا .

٦٢٨٨ - جَامَسَة Nelombo

اطلب نيلوفر قبطي .

٦٢٨٩ - جَامُورَة هي الجارة ، اطلبها .

٦٢٩٠ - جَامُوس ، ذُنُوب Bos bubalus (S).

Buffle (F). Buffalo (E).

جنس حيوانات وحشية وداجنة من فصيلة البقريات . أنواعه المعروفة سبعة جميعها ربعة الأجسام الغليظة .

٦٣٠٧ - جَاوْدَار - Seigle (F). Rye (E).

هو الشيلم ، اطلبه .

٦٣٠٨ - جَاوَشِير - Oporanax

هو الكاوشير ، اطلبه .

٦٣٠٩ - جَاوِي - Impératoire des montagnes (F).

راجع تاغندست . Fellow grass (E).

٦٣١٠ - جَائِحَة - Fléau (F). Calamity (E).

الجائحة والجوائح كل آفة سماوية تجتاح النبات فتؤذي أو تقضي على ثماره أو انتاجه .

٦٣١١ - جَبَّ - Pollinisation (F). Pollinization (E).

هو التأيير ، اطلبه .

٦٣١٢ - جُبَّ - البئر الكثيرة الماء البعيدة القمر .

٦٣١٣ - جَبَّء - Truffe rouge (F). Red truffle (E).

الجبء واحد الجبأة وهي الحمر من الكفاة . قال الاحمر : الجبأة هي التي الى الحمرة . والكفاة هي التي الى الغبرة والسواد . والققعة البيض . وبنات اوهر الصغار . (اقرب الموارد) .

٦٣١٤ - جَبَا - الجبا : شفة البئر .

٦٣١٥ - جَبَّاء - الجباء هو طرف قرن الثور .

٦٣١٦ - جَبَّاب - Pollinisation des dattiers (F).

Pollinization of date trees (E).

الجباب هو تفتيح النخل . وجب النخل : ثبته . وزمن الجباب : زمن تأيير النخل .

٦٣١٧ - جُبَّاب * - Spathe

هو رعاء الطلع ويدعى جف وكافور .

٦٣١٨ - جَبَّار ، جَوَزَاء - Orion (F). Orion (E).

الجبار او الجوزاء كوكبة نجوم جنوبية الموضع تمتد الى ما فوق خط الاستواء بالقرب من برج الثور || عدد نجومها ٧٨ وهي على صورة رجل قائم في ناحية الجنوب بيده عصا وعلى وسطه سيف . والعرب تسمي الكواكب الثلاثة التي على الوجه «الهنة» . والنير الاعظم الذي على منكبه اليمنى «منكب الجوزاء» و«يد الجوزاء» ايضاً . والكوكب النير الذي على المنكب اليسرى «النايد» و«المرزم» ايضاً . والثلاثة المصطفة التي على وسطه «منطقة الجوزاء» . والثلاثة المنحدرة المتقاربة «سيف الجبار» . والنير العظيم الذي على قدمه اليسرى «رجل الجبار» . والكوكبان اللذان يتقدمان الرجل «الناعقان» . وتسمي التسعة المقسومة التي على الكم «تاج الجوزاء» || وتحت منطقة الجوزاء ينتشر سديم الجوزاء الذي اكتشفه «هويغنس» عام ١٦٥٦ .

٦٣١٩ - جَبَّار - Hypermétrique (F).

Hypermétric (E).

نعت يطلق على جبابرة الحيوانات الداجنة من اي نوع كانت من الطير الى الثدييات .

٦٣٢٠ - جَبَّاس ، مَمْبَة ، شَجَرَة الأنداء

Mammea (S). Mammée (F). Mamey (E).

جنس اشجار مشمرة برية وزراعية من فصيلة الكلوزيات . النوعه خمسة منبتها البلاد الاستوائية . جميعها اشجار كبيرة

٦٢٩٧ - جَامُوس خَرَبَانِي * - Bubalus kerabau (S).

Buffle kérébau, Kérabau (F).

نوع من الجاموس الاسيوي المتوسط القد يعلو نحو ١٤٥ سم . ويطول نحو ٢٠٠ أما ذنبه فنحو ٦٦ سم . يتميز باستطالة قرويه المنبطحة المقوسة . اعطائه فسيحة الارجاع تشمل الهند وسرنديب والهند الصينية وجزر الزابج . يربونه للجر والقصابة . اناثه متوسطة الدر .

٦٢٩٨ - جَامُوس غِينِيَّة - Bubalus centralis (S).

Buffle central (F).

نوع من الجاموس الافريقي مهدد غينيه ومناطق شمال السودان . جسمه ربع القامة متوسط القد . قرنه متبسط الانتشاب ، اعوج الشكل ، منحرف الى الوراء . هلبه مبعر ، فادر الوجود ، حنطي اللون . اجله يراوح من ٢٠ الى ١٢٠ نفر .

٦٢٩٩ - جَامُوسَة - Bufflesse (F). She-Buffer (E).

انثى الجاموس .

٦٣٠٠ - جَانِبِي - Latéral (F). Lateral, Side (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان مركزه في جانب الشيء .

٦٣٠١ - جَانِبِي الخَبَاء ° - Pleurocarpe (F).

Pleurocarpous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل طحلب تنبت سديناته على جانب الساق او الفرع .

٦٣٠٢ - جَانِبِيَّات العَوَم ، مُفْلَطَحَات - Pleuronectidés, Poissons plats (F). Pleuronectidae (E).

فصيلة من الاسماك المسطوات تشمل بعض الاجناس المفلطحة الشكل كسمك موسى وسمك الترس وغيرها .

٦٣٠٣ - جَانِبِي ° - Radicole (F).

Root-eating (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على اجنات وشروش النبات وتقتات منها .

٦٣٠٤ - جَانِرِك * ، جَارْنِك - Prunus armenioides (S). Prunier abricoté, Abricotée, Mirabellier (F).

شجرة مشمرة من فصيلة الورديات . منهم من قال ان الجانرك ينتمي الى الكرز ومنهم من اتبته بالخوخ . خسرويه عديدة ، اشجاره متوسطة الحجم اوراقه معنقة متعاقبة اطول من اوراق المشمش واصغر منها خضرة . ازهاره نوري . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام والالوان والطعم والحلاوة والحموضة . جميعها مأكولة وزيب ويستخرج منها بالتقطير ، بعد التخدير كحول جيد الصنف || يغرس وينمو في جميع الاودية . يرجع الكاملة التركيب العميقة الغور . يوجد في المناطق المتوسطة الارتفاع الممكن ربا . يتكاثر بالبذر والتطعيم || اشهر انواعه التفاحي والحامض والسكري .


٦٣٠٥ - جَانِرِكَة - Mirabelle (F).

Mirabelle plum (E).

الجانركة والجانركة هي ثمرة الجانرك .

٦٣٠٦ - جَانُوس ° - Janus (F).

هو الضيكل ، حيوان من الرخويات ، اطلبه .



جاموس خرباني



جانرك



جباب



جَبَّاسْ أَمْرِيكَة



جَبَّحْلُ الصِّينِ



جَبَّحْلُ الكَنْجِ



جَبْدْ



جَبْكْسْ

٦٣٢٧ - جَبَّحْلِيَّاتْ ٥ Platanistidae (S).

Platanistidae (F). Platanistidae (E).

فصيلة حيوانات مائية ، نهريّة ، لبونة من مرتبة متاثلاث الاسنان ورقبة الخوئيات || انواعها المعروفة ثلاثة : جَبَّحْل الكنج او السيّسوق ، وجَبَّحْل الصين او البوت ، وبوتو الامازون .

٦٣٢٨ - جَبْدْ ٥ Millerandage (F).

جَبْد العنب : صنروقفت . والجَبْد هو ان يكون العنب صغيراً مقفلاً وان لا ينعدق بعض زهره .

٦٣٢٩ - جَبْدَة الجبارة قبل ان يكشط عنها الليف .

٦٣٣٠ - جَبْرْ Algèbre (F). Algebra (E).

علم رياضي ينسب ابتكاره الى العرب وهو علم يشترك مع الحساب في موضوعاته ويختلف عنه في استخدام الرموز لذلك اصبح اشتمل من الحساب في معالجة المسائل الرياضية . ومع ذلك فكل قانون في علم الحساب له ما يناظره في علم الجبر . والرموز الجبرية هي حروف ابجدية فاذا ضربت بعضها في بعض او قسمت بعضها على بعض سمي ذلك بالحد الجبري . واذا استخدمت الاعداد مع الرموز سمي العدد بالمعامل الحسابي وهو يسبق دائماً الحد الجبري . واذا استبدلت الرموز باعداد فهي عملية التعويض . ويتميز الجبر عن الحساب باستعمال الاشارتين + و - للدلالة على ان الكمية الاولى موجبة والثانية سالبة . ومن ابحاث علم الجبر : المعادلات والجذور واللوغاريتم الخ .

٦٣٣١ - جَبْرَة

الجبرة : نبت اكثر ما يكون في المغرب طولها نحو ثلاث اصابع . (اقرب الموارد) .

٦٣٣٢ - جَبَّسْ Pastèque (F). Water-melon (E).

راجع بطيخ .

٦٣٣٣ - جَبَّسْ Sélénite (F). Selenite (E).

هو سلفات الكلس .

٦٣٣٤ - جَبَّسْ Ourse (F). She-bear (E).

الجَبَّس انثى الدب .

٦٣٣٥ - جَبَّسِين ، جَبَّسِين ، جَبَّسِين Gypse (F). Gypsum (E).

هو كبريتات الكلس المائي الطبيعي المتبلور .

٦٣٣٦ - جَبَّكْسْ ٥ Japyx (S).

Japyx (F). Japyx (E).

جنس حشرات ناهمة من فصيلة الجبكيديات ورقبة لاطثات المتك . انواعه المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم المناطق الحارة وفي بعض المناطق المعتدلة الحرارة || اجسامها ضعيفة ، مستطيلة ، معتدلة التبسيط ، مبعثرة الحلب الدقيق . اطواها تراوح من ٨ الى ٢٤ سم . اثوابها الى البياض التني . رؤوسها شبه مربعة الشكل . عيونها كحلة . قرونها الاستشعارية قلادية ، مركبة من ٣٠ فصلة . صدورها ثلاثية الحلقات . بطونها عشارية السكم ، تنتهي بزوج من السرك الصغير الكلافي الشكل الاسمر اللون . قوائمها قصيرة ، دقيقة . ارساغها وحيدة العقل ، ثنائية الاظفار اللامتساوية القد || يكثر وجودها تحت الحجارة في المواقع الدافئة . قوتها المواد العضوية المنحلة .

القد هرمية الشكل تعلو من ١٠ الى ٢٠ م . اورقها عروية ، متقابلة ، معتقة ، بيضية ، جلدية النصل . ازهارها كبيرة القد بيضاء اللون فواحة العرف مبعثرة على الافناد والافنان . ثمارها لحمية اللب كروية الشكل قطرها يراوح من ١٤ الى ٢٠ سم . لونها الى الصفار الكبريتي || اشهر انواعه وافضلها جبباس امريكة .

٦٣٢١ - جَبَّاسْ أَمْرِيكَة ٥ ، مِشْمِشْ أَمْرِيكَة ،

مَمِيَة أَمْرِيكَة Mammea americana (S).

Mammée d'Amérique, Abricotier de St. Dominique, Arbre aux mamelles (F). Mamme apple, Mamey, Wild apricot (E). Amerikanischer brüstenbaum (D). Mamel, Albicocco d'Americo (I).

نوع من الجباس منبته امريكة الاستوائية . شجرته كبيرة القد هرمية الشكل مأكولة الثمار الصفراء اللون الذكية العرف .

٦٣٢٢ - جَبَّايَا Troux de plantation (F).

الجبايا : الركايا التي تحفر وتنصب فيها قضبان الكرم .

٦٣٢٣ - جَبَّيْتِيَة ٥ Panchéisme (F).

Panchelism (E).

الجبتية او الوهية الكون مذهب فلسفي يعترف بالاله انما في جميع الكائنات .

٦٣٢٤ - جَبَّحْ ، جَبَّحْ Ruchée sauvage (F).

Wild Hivful (E).

هي الاقواب الصخرية الطبيعية التي تسكن فيها النحل . ج ايجح وأجباح وجبوح وجباح .

٦٣٢٥ - جَبَّحْلُ الصِّينِ ٥ ، لَبُونْ ٥

Lipotes vexillifer (S).

Dauphin de Chine, Lipote (F).

حيوان مائي ولود لبون من فصيلة الجببليات ورقبة الخوئيات . اعطائه بعض المياه الصينيه اغصها بحيرة توغ - تنغ . قوته الاسماك || جسمه اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم ثوبه في انشطر الاعلى الى الزرقه السوداء الموج ، وفي انشطر الاسفل والبطن الى البياض الاغبر . رأسه اسفني الشكل . خطمه كالمنقاد الجالس الميظط . اسنانه صغيرة ، كثيرة ، ذربة . عيناه صغيرتان ، ماسحتان . نيسمه نفرة صغيرة تتوسط الجبهة . زعنفته الظهرية متوسطة الحجم . زعنفته الصدرية سنانيتا الشكل ، اما الذيلية ففارقة ومتساوية الفلق || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٦٣٢٦ - جَبَّحْلُ الكَنْجِ ٥ ، سَبَّسُوقْ ٥

Platanista gangetica (S).

Plataniste du Gange, Sousouk (F).

حيوان مائي ولود لبون من فصيلة الجببليات ورقبة الخوئيات . اعطائه المياه الهندية اغصها الكنج . والهندوس والبرما بوترا || جسمه شبه وشي الشكل يطول نحو ٢٥٠ سم . ثوبه اسود الشطر الاعلى ، ابيض الاسفل . رأسه واضح المعالم والحدود . خطمه ذلق مستطيل . اسنانه كبيرة وكثيرة . عيناه صغيرتان ، مستديرتان ماسحتان . نيسمه نفرة صغيرة تتوسط الجبهة . زعنفته الظهرية صغيرة ، هرمية الشكل . زعنفته الصدرية سنانيتا الشكل ، معتدلة الحجم . زعنفته الذيلية كبيرة فارقة ، متساوية الفلق || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٦٣٤٦ - جَبُونَنْدِي الْأَنْتِيل °

Pilocarpus racemosus (S).

Jaborandi des Antilles (F).

نوع من الجبوريندي . منبته الانتيل . تصنيفه يأتي في المرتبة السادسة لانه ضعيف المادة الطبية المتوسطة الصنف .

٦٣٤٧ - جَبُونَنْدِي رِيشِي الْوَرَق °

Pilocarpus pennatifolius (S).

Jaborandi de Paraguay (F).

نوع من الجبوريندي . منبته جنوبي غربي البرازيل وبلاد البراغواي . يعتبر من الاصناف الجيدة الوافرة المادة الطبية . مركزه التصنيفي يأتي في المرتبة الثانية اي بعد المخزني .

٦٣٤٨ - جَبُونَنْدِي سِيَارَا °

Pilocarpus trachylophus (S).

Jaborandi de Ceará (F).

نوع من الجبوريندي متوسط الجودة والمادة الطبية . منبته مقاطعة سيارا . اوراقه صغيرة النصال . مركزه في المرتبة الرابعة .

٦٣٤٩ - جَبُونَنْدِي شَالِك °

Pilocarpus spicatus (S). Jaborandi d'Aracaty (F).

نوع من الجبوريندي . منبته مقاطعة الريو وبمض مقاطعة سان باولو . اوراقه بسيطة ذريرة شائكة العقصة تطول من ١ سم . وهو ضعيف المادة الطبية ، متوسط الجودة ، تصنيفه يأتي في المرتبة الخامسة .

٦٣٥٠ - جَبُونَنْدِي صَغِير الْوَرَق °

Pilocarpus microphyllus (S).

Jaborandi de Maranhão (F).

نوع من الجبوريندي جيد الصنف وافر المادة الطبية . منبته مقاطعات الباراء والباراهيبيا والمارنهام . تصنيفه يأتي في المرتبة الثالثة بعد المخزني والريشي الورق .

٦٣٥١ - جَبُونَنْدِي مَخْزَنِي °

Pilocarpus officinalis, Pil. Jaborandi (S).

Jaborandi officinal, J. de Pernambuco (F).

نوع من الجبوريندي جيد الصنف غزير المادة الطبية . منبته مناطق الشمال والشمال الشرقي من البرازيل ويجود خاصة في منطقة برنمبوك التي تنتج اجود الاصناف . مركزه يأتي في المرتبة الاولى .

٦٣٥٢ - جَبُون ، جَبُون ، هِيلُونَات

Hylobates (S). Gibbon (F). Gibbon, Long-armed apes (E).

جنس قرود من فصيلة اشباه الانسان . انواعه ١٠ جميعها رشيقة القوام والحركة . اجسامها متوسطة القد . قاماتها معتدلة لا تتجاوز المتر . صدورهم مقوسة . ايديهم مستطيلة . اناثها تضع ولداً واحداً ترضعه نحو ٦ شهور . موطنه البلاد الاسيوية الحارة انحصاراً شبه جزيرة الهند الصينية وما جاورها من القارة والجزر . اشهر انواعه ما يتبع .

٦٣٥٣ - جَبُون رَشِيْق * ، أُونْكُو

Hylobates agilis (S). Gibbon agile, Ungko (F). Agile gibbon, Ungko (E).

نوع من الجبون ، رشيق القوام . قامتة نحو ٧٢ سم . ثوبه يراوح بين البياض الاغبر والصفار الخنطي . موطنه احرار السيام وجزيرة سومطرة . قوته الثار . يعيش على الاشجار . قفزته من شجرة الى اخرى تبلغ ١٠ امتار .

٦٣٣٧ - جَبَكْسِيَّات °

Japygidae (S).

Japygides (F). Japygidae (E).

فصيلة حشرات دامتة وناهمة من رتبة لاطئات المتك . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد معظمها من عظم البلاد الحارة || اجسامها ضعيفة ، مستطيلة ، مبعثرة . الهلب . رؤوسها مربعة او شبه مكورة . عيونها كحلة . قرونها الاستشعارية مستطيلة . صدورهم ثلاثية الحلقات . بطونهم عشارية السكم . قوائمهم نحيلة . اسراكهم صغيرة كلابية الشكل كما في النيك . اثنائها الى البياض النقي او الاغبر || اعرف اجناسها الجبكس .

٦٣٣٨ - جَبُل . Arbres desséchés (F). Dried trees (E).

الجبل هو الشجر اليابس .

٦٣٣٩ - جَبِيلَة * ، نَوَاق . Noyau (F). Nucleus (E).

الجبيلة هي الجزء الحي القابل للتكاثر في الخلية . والجبيلة تتركب من شبكة نووية تدعى مهية مكونة من نشب صغيرة تسبح في سائل خاص يعرف بالسائل النووي . ويحيط بالجبيلة من الخارج غشاء رقيق يدعى الغشاء النووي . وقد يوجد داخل الجبيلة جسم كروي صغير يدعى المنة . وقد تحوي الجبيلة منة واحدة او اكثر .

٦٣٤٠ - جُبْن ، جُبْن ، جُبْن . Fromage (F). Cheese (E).

حليب جبن وقولب وحضر فاصبح صالحاً للاكل . انواعه عديدة مختلفة الطعم والمذاق والرائحة . جميعها غذائية غنية ببعض الفيتامينات .

٦٣٤١ - جُبْنَاَز ، كَاَزِيَاَز . Caséase (F).

Casease (E).

خيرة تذيب الجبنين المختر .

٦٣٤٢ - جُبْنِين ، كَاَزِيِين ، دَوَغ

Caséine (F). Casein (E).

المادة الازوتية البيضاء اللون الموجودة في حليب الثدييات .

٦٣٤٣ - جَبْهَة . Front (F). Forehead (E).

هي الجزء الاعلى من الوجه . تمتد من حاجب العين الى حدود مستوى الشعر || وهي في الحشرات الجزء الامامي من البطن .


٦٣٤٤ - جَبْهَة . Algaiba, Aigleba

الجبهة منزل من منازل القصر الشامية ، ويقال لها جبهة الاسد ايضاً . وهي اربعة النجم . ينزلها القصر في الليلة العاشرة || رقيب الجبهة يدعى سعد السمود .


٦٣٤٥ - جَبُونَنْدِي بِيلُوكَرْبُونِس °

Pilocarpus (S). Pilocarpe, Jaborandi, Jaguandandy (F). Jaborandy (E).

جنس نباتات جنبية ، طبية من فصيلة السذابيات . انواعه المعروفة ستة مهددا البرازيل || جميعها جنبات كبيرة . اوراقها متباينة الاشكال والارتكاز . منها البسيطة المتعاقبة والمتعاقبة ومنها المركبة الورقية . نصالها اهليلجية ، جامدة الوثل ، كثيرة الاعصاب تتخللها نكت زيتية اللون او حنطية تم عن وجود جيوب الافرازات الوثلية || ازهارها خاسية البتلات والمآبر . ازهارها لا تياسى التجميع . منه المتقودي والمشكولي والسنبلي || منافعها الطبية عديدة ، فهي معروفة ومرضابية وبلسمية وتدر البول وتفيد الظهارة الكلوية . ويستخرج منها مادة عطرية واخرى قلووية تدعى بيلوكربين (Pilocarpine) تستعمل خاصة في علاج العين || اما انواعه الستة فهي التابمة :



جبلة



جبوريندي مخزني



جبون رشيق



جِبُون رَمَادِي



جِبُون سِينْدَكْتِيل



جِبُون لَار



جِيَّة



جَشُون



جَشِيث

٦٣٦٤ - جُثَّ - Péricarpe (F). Pericarp (E).

الجُثَّ هو غلاف الثمرة.

٦٣٦٥ - جَثَّ - Dessouchement (F). Stumping (E).

راجع استئصال .

٦٣٦٦ - جُثَالَة - Feuilles mortes (F). Dead leaves (E).

ما تنثر من اوراق الشجر .

٦٣٦٧ - جَشَجَات -

الجشجات ثبت من احرار الشجر وهو اخضر ينبت بالقيظ له زهرة صفراء كأنها عرصة طيبة الريح تأكله الابل . واحدته جشجانة (بن البيطار) .

٦٣٦٨ - جُثْلَة - Arbre touffu (F). Tufted tree (E).

الجُثْلَة : الشجرة الكثيرة الورق الضخمة (القاموس) .

٦٣٦٩ - جُثْلَة - Fourmi moissonneuse (F).

هي النملة الحصادة ، اطنبها .

٦٣٧٠ - جُثْم -

الجُثْم من الزرع : الذي ارتفع عن الارض واستقل نباته .

٦٣٧١ - جُثْمَة - Remblai (F).

Embanking, Filling up (E).

الجُثْمَة ومنهم من قال الردمية هي التراب اللازم لردم حفرة او لتسوية ارض .

٦٣٧٢ - جُثْوَة * - Glomérule (F). Glomerule (E).

ازهار لبد التجميع قصير المحور كما في الكشوث .

٦٣٧٣ - جُثْوَة - Tas de terre (F). Heap of shore (E).

هي الكومة من التراب .

٦٣٧٤ - جُثِيث * - Rejet de dattier (F).

Sprout of date tree (E).

الجُثِيث هو فصيل النخل وما غرس من فراخه لا من النوى الواحدة جثيثة (اقرب الموارد) .

٦٣٧٥ - جُثِيْلَات الذَّكَب ، دَرْيُورِيَّات ه -

Dasyuridae (S). Dasyuridés (F). Dasyuridae (E).

فصيلة حيوانات لبولة من رتبة الجرابيات . انواعها المعروفة عشرة تنتمي الى جنسين . اعطائها المناطق البرية من استرالية وزيلندا الجديدة رغيفة الجديدة وجاوا .

٦٣٧٦ - جُجَّ - Melon cantaloup (F). Cantaloup (E).

الجُجَّ هو الشمام المستدير المشنج الصغير القد . واحدته ججة . اطلب شمام .

٦٣٧٧ - جُحَاف - Courant d'eau violent

جدول دفاق المياه السريعة التي تجرف كل شيء وتذهب به .

٦٣٧٨ - جُحَال - Poison végétal (F).

Vegetable poison (E).

كل سم نباتي مرجعه المواد القلوية الموجودة في العصارة النباتية او في النسيج الخلوي .

٦٣٧٩ - جُحَالِي - Vénéneux (F). Poisonous (E).

ما كان سمه نباتياً .

٦٣٨٠ - جَحْجَح -

الجحجج : بقلة تثبت نبتة الجزر . ويقال لها الحزباب .

٦٣٥٤ - جِبُون رَمَادِي * ، يُوُو -

Hylobates leuciscus (S). Gibbon cendré, G. oa, Wouwou (F). Silvery gibbon (E).

نوع من الجبون متوسط القامة ، ثوبه الى الوردية . صدره اكهم عابق . حثار وجهه اشيب || موطنه جزر الزابج والسولو . يعيش جماعات تعد من ٦٠ الى ١٠٠ . قوته الثار والبراعم والنوامي .

٦٣٥٥ - جِبُون سِينْدَكْتِيل * ، جِبُون سِيَامَان ،

سِيَامَان - Hylobates syndactylus (S).

Gibbon siamang, Siamang (F). Siamang (E).

من اكبر انواع الجبون . قامته نحو ٩٠ سم . جسمه كثيف الشعر الاسود . ذقنه اغبر الشعر . موطنه ملقه وجزر الزابج . يعتبر من الانواع القليلة النهم . قوته الثار . يتسلق الاشجار بخفة . يعيش جماعات قليلة العدد .

٦٣٥٦ - جِبُون لَار * ، لَار - Hylobates lar (S).

Gibbon lar, Lar, Gibbon à mains blanches (F).

نوع من الجبون رشيق القوام قامته نحو ٧٥ سم . ثوبه الى السواد العام . وجهه مطوق بحثار من الشعر الابيض . يذاه ورجلاه بيض || موطنه احراج شبه جزيرة ملقه . يعيش جماعات صغيرة متوسط عددها يراوح من ١٢ الى ٢٠ .

٦٣٥٧ - جِبُون هُولُوك - Hylobates hoolock (S).

Gibbon hoolock (F).

نوع من الجبون قامته نحو ٨٠ سم . ثوبه الى الثمرة السوداء . حاجبا عينيه وحثار جبهته بيض . موطنه بلاد الاصنام من اعمال البنغال . يألف الغابات . جماعته تعد من ٢٠ الى ٤٠ . يعيش على الاشجار . قوته الثار والبراعم والنوامي وبعض الحشرات والعناكب وبيض العصافير || يعتبر من افهم قروء هذا الجنس .

٦٣٥٨ - جَبِيَّة ه - Gebia (S).

Gébie (F). Gebia (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طويلات الذيل وقصيلة الطلاسميات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم اخصها المعتدلة الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل . بطونها حديدية التركيب . قوائمها الامامية كبيرة شديدة النشاط || تعيش منفردة في الاسماك والرمال المنمورة بانتظار ما تستطيع قتله .

٦٣٥٩ - جَبِيْس - Ourson (F). Bear's cub (E).

صغير الدب وهو الديسم .

٦٣٦٠ - جَبِيْسُوم حَاطِي الشَّكَل -

Gibbium psylloïde (F).

هو المبون الاحدب ، اطلبه .

٦٣٦١ - جَتْر - Tonnelle (F). Arbour, Bower (E).

خيمة لاقياسية الشكل والحجم تكثر فيها الاستطالة تملوها النباتات العارضة .

٦٣٦٢ - جَتْرُفَة - Médecinier cathartique (F).

Jatropha (E).

اطلب دند الملوك .

٦٣٦٣ - جَتَّ - Cire (F). Bees wax (E).


هو الشمع السلي . مادة لينة لدنة صفراء اللون يصطنها النحل لبنان نحاريه .



جُخْب



جُخْلَم



جُخْم



جُخْبَار



جُخَادِب




جُخَادِب



جُخْدُب المَصَارِي

- ٦٣٩٢ - جُخْم *
Ossifraga (S). Ossifrage,
Briseur d'os, Mallamoque (F). Ossifraga (E).
طائر وحيد الجلس والنوع من كفتيات القدم وفصيلة
جلديات الماء. أعطانه تشمل القطب الجنوبي وبعض
المناطق الأفريقية والأمريكية. يتميز بمنقاده الكبير
الضليح المصفتح الملاقط. جسمه كبير القد يطول نحو
١٠٠ سم. ذنبه جدعة ذلقة. ثوبه كستني اللون تعلوه
نمشة غبراء. قوته الاسماك والطير وبقايا الحيوان.
- ٦٣٩٤ - جُخْمَة
Cell (F). Eye (E).
الجمجمة العين وجحمتا الانسان والحيوان: عيناء.
- ٦٣٩٥ - جُخْمَرَش
Lapine (F). Brood-rabbit (E).
الجحمرش: الارنب المرضع ج. جحمر (الجاحظ).
- ٦٣٩٦ - جُخْمِي *
Oculiforme (F).
Oculiform (E).
نعت تعريفني يطلق في علم التاريخ الطبيعي على كل ما
كان شكله كالعين.
- ٦٣٩٧ - جُخْن *
Carence (F). Hunger signs (E).
هو المظهر الخارجي الذي يعبر عن العوز الملح الى بعض
العناصر الغذائية.
- ٦٣٩٨ - جُخْنَبَار *
Nicandra (S).
Nicandre (F). Nicandra (E).
عشبة حولية زعفرية الرائحة من فصيلة الباذنجانيات. ساقها
فرعاء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. أوراقها متعاقبة، معنقة،
قلبية الشكل. نصلها بحرية الخضار. ازهارها زرقاء اللون،
صغيرة القد، فردية او ثلاثية التجميع، محورية الارتكاز.
ثمارها زيتونية الشكل والقد، لونها الى الزرقة العابقة ||
تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.
- ٦٣٩٩ - جُخَادِب *
Saga pedo, S. serrata (S).
Magicienne dentelée (F).
نوع من الجنادب المفترسة من فصيلة القبوطيات. ذكوره
مجهولة. انثاه كبيرة الجثة طولها من ٦٢ الى ٧٨ مم. فخذها
الخلي نحو ٤٥ مم. ومرزها ٤٠. ثوبها الى الخضار الباهت
يقطبها من كلتي جانبيها، من العين الى المرز، خط
ابيض وردي. أفضاها وسيقانها وارساغها مذكارية شائكة.
تكثر في الصيف والخريف. تسرح على الارض بين
الاعشاب والادغال. قوتها الحشرات الصغيرة.
- ٦٤٠٠ - جُخْدُب *
Phasgonura viridissima, Tettigonia viridissima (S).
Grande sauterelle verte (F). Green Grasshopper,
Meadow grasshopper (E). Heupferd, Grünes
Heupferd (D).
نوع من الجنادب من فصيلة القبوطيات. كبير الجثة
ثخينها. اخضر اللون. طوله يراوح من ٢٨ الى ٤٦ مم.
أفضاه الخلفية نحو ٢٨ مم. وأغضاده من ٣٥ الى ٦٠ مم.
الانثى اكبر جثة من الذكر. مرزها نحو ٣٠ مم. كوسلها
أملس. حذافرها شائك. سرك الذكر مستطيل || يكثر
وجوده في الصيف والخريف. يألف الاراضي المزروعة
والادغال والاشجار.
- ٦٤٠١ - جُخْدُب المَصَارِي *
Tachycines asynamorus (S). Sauterelle de serres (F).
جندب من القبوطيات طوله يراوح من ١٣ الى ١٦ مم.

- ٦٣٨١ - جُخْر
Terrier (F). Burrow, Hole (E).
الجحر هو مكن السباع او كل مكان تحتفره الوحوش
لايلولتها واختبائها.
- ٦٣٨٢ - جُخْش
Anon (F). Ass's foal, Young ass (E).
هو ولد الاثان لا يزال يتبع امه.
- ٦٣٨٣ - جُخْف
Charrier (F). To drift, To scud (E).
جحف الرياح الغيم: سار به. وجحف الماء الشيء:
ذهب به.
- ٦٣٨٤ - جُخْف
Dragage, Dragage (F).
Dragage (E).
هو جرف الرمل.
- ٦٣٨٥ - جُخْف ، ذَكْد
Pacage (F).
Pasture-land (E).
كل مرعى قليل الكلا رديته.
- ٦٣٨٦ - جُخْفَة
Heron pourpre (F).
Purple heron (E).
راجع بلشون ارجواني.
- ٦٣٨٧ - جُخْفَلَة
Babine (F). Pendulous lip (E).
شفة كل ذي حافر.
- ٦٣٨٨ - جُخْفَلَة الفَرَس
جحفلة الفرس نجم من كوكبة قطعة الفرس اي الفرس
الصغير.
- ٦٣٨٩ - جُخْل
Abeille femelle (F).
Queen bee (E).
الجحل ويدعى الملكة. هي النحلة الانثى الكاملة الشواد
الشقي. اطلب ملكة.
- ٦٣٩٠ - جُخْلَب *
Rougetius roujeti (S).
Rougetius du Choa (F).
طائر من طوال الساق وفصيلة التفلقيات. اعطانه بلاد
الحبشة || جسمه متوسط القد. منقاده مخززي الشكل.
ذنبه جدعة. جناحاه لاحقان. ثوبه العلوي الى السمرة
السوداء. ثوبه السفلي الى الصهبة. بطنه منمش بالاسود.
محسراه رماديا اللون. عيناه مكحلستان بالاصفر || يألف
البراري ومجاري الماء. قوته الحشرات والحوام وبعض
الاعشاب والبرور البرية.
- ٦٣٩١ - جُخْلَم *
Blaberopus (S).
Blabérope (F).
جنبه معمرة ابيدة من فصيلة الدفليات. موطنها بعض
المناطق الحارة من البلاد الاسيوية. عصارة سوقها حلوية
المادة جحالية، مميته. تستعمل في القضاء على الحيوانات
المفترسة || ساقها كثيرة الاشطاء والفروع تعلو نحو ثلاثة
امتار. أوراقها عروية، معنقة، متعاقبة، ثلاثية التجميع.
نصلها سناني الشكل، قصير المنق، ذرب الطرف،
جامد البزل. ازهارها ضمي التجميع، طرفي الارتكاز.
ازهارها نجيلة، خماسية البتلات، صفراء اللون. ثمارها
سنية مستطيلة. بزورها بيضوية الشكل، مبططة، شديدة
السمة، صغيرة الحجم.
- ٦٣٩٢ - جُخْلِيَّات
Méganisoptères (F).
Meganisoptera (E).
رتبة حشرات من طبقة الرعيديات.



جُدْأَة

٦٤١٣ - جُدْأَة ، جُدْأَة (F). Glume supérieure (F).
Upper glume (E).
الجدامة هي قشرة الحبة العليا اما قشرتها السفلى فيقال لها القصرة والجشرة .

٦٤١٤ - جُدْأَة (F). Gazelle (jeune) (F).
Gazelle (Young) (E).

هي الغزالة قبل استكمالها الحول وهي من الظباء بمنزلة الناق من المعز .

٦٤١٥ - جُدْأَة ، جُدْأَة ، مُجْدَب

Stérile (terre) (F). Sterile, Barren (E).
هي التربة الماحلة العديمة الخير .

٦٤١٦ - جُدْأَة (F). Rale (F). Stripe, Stroke (E).
الجدة هي الخط في الثوب مهما عرض واستطال ج . جدد .



جُدْأَة


٦٤١٧ - جُدْجُدْ ، صِرَّار الليل (S). Gryllus (S).
Grillon (F). Cricket (E).

جنس حشرات من فصيلة الجُدْجُدِيَّات . انواعه عديدة منتشرة في جميع اقطار العالم . تتميز بفلاظة رؤوسها واستطالة قرونها الاستشعارية المستدقة . ذكورها مجهزة بعدة صرصارية نشيطة تستعملها في الليل والنهار || وهو من الحشرات المبشرة التي تعيش على المواد العضوية والنباتية . أشهر انواعه ما يلي .


٦٤١٨ - جُدْجُدْ البر* ، صِرَّار الغَيْط

Liogryllus bimaculatus (S). Grillon bimaculé (F). Bimaculated cricket (E).

نوع من الجُدْجُد كبير الجثة المخروطية الشكل . طوله يراوح من ٣ الى ٤ سم . انثاه اكبر قدماً من ذكوره وقد يبلغ طول اشرة الانثى نحو ١٥ م . ثوبه الى السواد اللامع الاسفع المواج يعلوه عند قواعد انتشار ظهرانه بقع صفراء حنطية ضيقة في الذكور ، فسيحة في الاناث .



جدال



جُدْجُدْ البر*


٦٤١٩ - جُدْجُدْ أهْلي* (S). Gryllus domesticus (S).
Grillon domestique (F). House-cricket (E).
Hausgrille (D).

نوع من الجُدْجُد مخروطي الشكل اصعب اللون طوله يراوح من ١٥ الى ٢٠ مم . يعيش في المنازل المأهولة ويكثر في المطاحن حيث لا يخشى الجوع .


٦٤٢٠ - جُدْجُد حَقْلِي*

Gryllus campestris (S). Grillon champêtre (F). Sylvan-cricket, European field cricket (E). Feldgrille (D).

نوع من الجُدْجُد غليظ الجثة طوله يراوح من ٢٠ الى ٣٠ مم . ثوبه الى السواد اللامع . يعيش في جميع الاماكن اغصها البساتين والارربة المزروعة . وهو من الدويبات النافعة لانه يلتهم النمل واكثر الحشرات الضارة الصغيرة القد .



جُدْجُدْ أهْلي



جُدْجُدْ حَقْلِي

٦٤٢١ - جُدْجُدِيَّات (F). Gryllidae (E). Gryllidés (F).
Gryllidae (S).

فصيلة حشرات من رتبة مستقيمات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد أشهرها الجُدْجُد والحالوش . من ميزاتهما الخاصة ان قرونها الاستشعارية طويلة دقيقة . أرجلهما الخلفية معدة للقفز . ارساغها مركبة من ثلاث عقل . ذكورها عديمة الملامس الكومية . انثاهما مبرجة

ثوبه الى الريدة يعلوه تسنيج اسمر . زبانه مستطيلة دقيقة . جسمه ربع الشكل . اجنحته اثرية . سرکه ملس وجليظ . يكثر وجوده في المواقع الدافئة اغصها المصاري حيث يقضم جميع انواع الاوراق والازهار || يكافح بالروتينين وسائر الحواشير الفتاكة .

٦٤٠٢ - جُدْأَة (F). Produit de la multiplication (F).
Product of multiplication (E).

الجداء هو الحاصل من ضرب عدد في عدد كالاربعة الحاصلة من ضرب اثنين في اثنين .

٦٤٠٣ - جُدْأَة

الجداء التي لا لبن لها من كل حلوية لآفة ايبست ضرعها . والجداء من الغم والاييل : المقطوعة الاذن .

٦٤٠٤ - جُدْأَة (F). Caranx djeddaba

نوع من الشيم وهي سمكة مأكولة تكثر في بحر القلزم .

٦٤٠٥ - جُدْأَة ، جُدْأَة اوان صرام النخل .

٦٤٠٦ - جُدْأَة (F). Marchand de vin (F).

الجداد هو بالغ الخمر ومعالجها . Dealer of wine (E).

٦٤٠٧ - جُدْأَة* (F). Pterois (F).

سمكة بحرية من الجلائخ . طولها نحو ٣٠ سم . رأسها غريب الشكل المستهجن . زعانفها كبيرة شائكة . ثوبها الى الحمرة يعلوه تجزيع معترض متباين الالوان يكثر فيه الابيض والاسمر . اعطانها بحار البلاد الحارة والمحتلة .

٦٤٠٨ - جُدْأَة ، جُدْأَة الحافير (F). Parol (F).

هو الغلاف المنظور من حافر الفرس . Coat, Wall (E).

٦٤٠٩ - جُدْأَة ، جُدْأَة (F). Parietal (E). Pariétal (F).
نعت تعريف يطلق على الاجزاء الجسدية الدعامية .

٦٤١٠ - جُدْأَة* ، دُجْ أَسْفَع

Juidas, Lamprotornis (S).

Juida, Merle métallique (F). Juidas (E).

جنس طير من الجواثم سيات المناقير وفصيلة الزرزوريات . انواعه المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في معظم الاصقاع الافريقية . جميعها متوسطة القد ، قريبة الشبه من الزراذير . اثواب معظم انواعه الى السواد الفحشي يعلوه مواج اسفع او ذهبي او زهرجدي او فضي .

٦٤١١ - جُدْأَة* (S). Dolichoderus (S).

Dolichodère (F). Dolichoderus (E).

الواحدة جدالة . جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة وفصيلة النمليات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من عظم امريكا الجنوبية والبعض الآخر منتشر في البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || اجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٤ مم . رؤوسها شبه اسطوانية الشكل . بطونها كبيرة مجهزة في اطرافها بمناحس حادة تهريق منها مادة سامة تفرزها غدة شرجية مركزها فوق المنخس || اثوابها تراوح من الحمرة الجوزية الى السواد الفحشي ، ومنها انواع سود الرؤوس حر البطون او المعكس .

٦٤١٢ - جُدْأَة : اصل السعف (اللسان) .

السلكوتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها افريقية . تعيش في الادغال قوتها ما تفتقره من دويبات وحشرات صغيرة وديدان || اجسامها تطول من ١٠ الى ١٣ مم . رؤوسها مستعرضة . تأشيرها ضليعة . قرونها الاستشعارية خيطية . عيونها مكورة ناشزة . كواسلها مستعرضة مصفحة . اثوابها تراوح من السمرة القائمة الى السواد الفحمي || مسرحها دهوي ، تبيت في النهار تحت الجشالة وفي كل مكان مظلم .

٦٤٣١ - جُدَرِيّ البَقَر Vaccine, Variole (F).
Vaccinia, Cowpox (E).
مرض كثير العدوى قليل الاذى يصيب البقر . مظهره الخارجي بثور قرجية تعلو الجلد في اماكن معينة من الجسم كالضرع والمشفرة والفم .

٦٤٣٢ - جُدَرِيّ الخَيْل Vaccine (F).
Vaccinia, Horse-pox (E).
مرض كثير العدوى قليل الاذى يصيب الخيل وينتقل الى الانسان . مظهره الخارجي بثور رافعة لؤلؤية تعلو الجلد في اماكن معينة اخصها المناطق السرمية والزوية والجحفية والبصرية . يكافح بالتلقيح .

٦٤٣٣ - جُدَرِيّ الضَّأْن ، نَبْخ ، قَعَاص Clavelée, Clavelade, Claveau, Picotte, Rougeole, Variole ovine (F). Sheep-pox (E).
مرض معد يصيب الغنم دون الماعز .

٦٤٣٤ - جُدَرِيّ الطَّيْر ، دِيفْتَرِيَا الطَّيْر Epithelloma contagium, Variola avium (S). Diphthérie variolique, Variole des volailles, Epithéliome contagieux, (F). Bird-pox, Chicken-pox. (E).
مرض معد ونخيم العواقب يصيب الدجاج وبعض الطيور الداجنة الاخرى كالخيش وغيره .

٦٤٣٥ - جُدَش Terre inculte (F).
الجدش كلي ارض غليظة غير مستصلحة .

٦٤٣٦ - جُدَعَة Moignon (F). Stump (E).
ما يبقى من العضو او الجزء المقطوع .

٦٤٣٧ - جُدَف الجدف نبات باليس ينفي آكله عن شرب الماء .

٦٤٣٨ - جُدَل Faucon sacre (F). Saker falcon (E).
هو الصقر اطلبه . والجدل هو حب الخنطة النضيج .

٦٤٣٩ - جُدَلَة Pilon du mortier (F).
الجدلة : مدقة الهاون اي المهراس . Pestle of mortar (E).

٦٤٤٠ - جُدَم الجدم : طير كالعصافير حمر المناقير (الجاحظ) .

٦٤٤١ - جُدَمَة هي الجدامة قشرة الحبة العليا .

٦٤٤٢ - جَدَوَار اَسْوَد Zédoaire noir (F).
Black zedoary (E).
هو الكركم الاسود نبات طبي زراعي اطلبه .

٦٤٤٣ - جَدَوَار اَنْدَلُسِي Anthore (F).
Wholesome aconite (E).
راجع اكونيت اسود .

اللامس الشرجية مرزاتها ثنائية التركيب اسطوانية الشكل مدببة الحمة . وهي تعيش في انفاق مستطيلة قليلة التعاريج والعمق تحفرها في الاتربة الحلوة والاماكن الرقيقة التي لا تخشى غمر الماء .

٦٤٢٢ - جَدَد Agalaxie (F). Agalactia, Agalaxy (E).
هو انقطاع الدُر عند اناث الدواجن .

٦٤٢٣ - جَدَد مُعَد ، جُدَاد Agalaxie contagieuse (F). Contagious agalaxy (E).
مرض معد يصيب البقر والنعاج والماعز في ضرورها فيسبب رفع الحليب .

٦٤٢٤ - جُدَر جذر العنب : صار حبه فويق النفص . وجذر الزرع : كثرت اشطاؤه . وجذر الشجر : طلعت رؤوسه في اول الربيع . ويقال أجدر الشجر فهو جذر حتى يطول فاذا طال تفرقت اسماؤه .

٦٤٢٥ - جُدَر ، جِدَر نبات رملي واحدته جذرة قال ابو حنيفة وابن البيطار : الجدر كالحلمة غير انه صغير يربل وهو من نبات الرمل ينبت مع المكر . ج جذور .

٦٤٢٦ - جُدَر Bilon (F). Ridge, Rafter (E).
هو ظهر التلم .

٦٤٢٧ - جُدَر ، سَدَّ المَكْسَر Diguette (F).
هو الحاجز الذي يمسك الماء عند السقاية . Dam (E).

٦٤٢٨ - جُدَرَة Grain de Pollen (F).
Pollen grain (E).

الجذرة هي حبة الطلع . وقد تختلف هذه الحبة شكلاً وحجماً ولوناً مع اختلاف نوع النبات . غير انه يغلب فيها الحجم الذري والشكل الكروي فالبيضي فالراقودي فالقضيبي فالانثوي . اما اللون البائد فهو الاصفر مع مشتقاته ثم الاخضر الباهت والاحمر والاعبر والاسمر || والجذرة تتكون من سائل سيتوبلازمي يحوي جيلتين تمثلان خليتين ، الخلية التناسلية والخلية الزادية ، لا جدار بينهما مغلفتين معاً بغشاء داخلي يدعى « انتين » يطوقه غلاف خارجي يدعى « اكسين » . ولكل من الخليتين دور خاص . فالخلية التناسلية اي الذكرية تقوم بالاخصاب اما الخلية الزادية فهي التي تمد رفيقها بالغذاء . وهذا الغذاء يتكون من المواد التالية :

حامض تفاحي
فسفات الكلس والمغنيزا
هلام عضوي
مواد آحينية جافة
فيتامينات من مختلف الفئات .

اما اشهر النباتات التي يكثر فيها الطلع اي المكبر الذي يجنيه النحل فهي موضوع الجدول الاول . اما الجدول الثاني فانه يمثل شكل الجذرة وحجمها الميكروني كما تشاهد تحت عدسة المجهر . (صفحة ٣٥٨ و ٣٥٩) .

٦٤٢٩ - جُدَرَة اُم Grain mere de pollen (F).
Mother pollen grain (E).

٦٤٣٠ - جُدَرُوم * Geodromus (S).
Géodrome (F). Geodromus (E).
جنس حشرات مفترسة من غديات الاجنحة وفصيلة



جدروم

Centromère (F). ٦٤٥٨ - جذيرة ٥

Centromere (E).

حبيبة شديدة الصغر توجد في النشب تساهم في تكوين الوشيمة عند الانقسام الجبروي أو الخليوي .

Bergerie (F). Sheepfold (E). ٦٤٥٩ - جذيرة

هي الثوية، أطلها .

Multiple (F). Multiple (E). ٦٤٦٠ - جذاء

هو حاصل العدد المضروب في ذاته .

Tronc volumineux (F). ٦٤٦١ - جذاة

Voluminous trunk (E).

الجذاة هي جذع الشجرة العظيمة . ج جذاء .

Glanure (F). Gleanings (E). ٦٤٦٢ - جذامة

جذامة الزرع : ما بقي بعد الحصد .

Culmifère (F). ٦٤٦٣ - جذامي ٥

Culmiferous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه جوفاء كما في القمح والشعير والشيلم ...

٦٤٦٤ - جذاب

Bourgeon terminal du dattier (F). Terminal bud of date tree (E).

الجدب والجداب : الشحمة التي تكون في رأس النخلة يكشف عنها الليف فتؤكل || وجدب النخلة : قطع جذعها .

Racine carrée (F). ٦٤٦٥ - جذر ، جذر

Square root (E).

الجذر والجذر المربع هو العدد المضروب في نفسه . الشرة في حساب الضرب هي جذر مائة . جذر العدد : حاصل جذره .

Racine (F). ٦٤٦٦ - جذر ، جذر ، شرش

Root (E).

عضو رئيسي في النبات يمكنه من التغذية والصدور في التربة . والجذر يكون عادة في التربة وينمو باتجاه العمق من فوق الى تحت يتميز بشعيراته الخاصة التي تمتص الماء والغذاء ويحفظه الطرقي الذي يشق له الطريق || والجذر لا ينمو من طرفه بل من منطقة نمو الواقعة بين الشعيرات الخاصة والحول || والجذور قد تكون بالنسبة الى شكلها واتجاهها وموقعها وتدية وعرضية ومتشعبة وهوائية وتنفسية .

Racine adventive (F). ٦٤٦٧ - جذر عرضي *

Adventitious root (E).

هو كل جذر ينتش من الساق مباشرة .

٦٤٦٨ - جذر متشعب ، جذر حزمي ، جذر متفرع

Racine fasciculée (F).

Fasciculate root (E).

يدعى الجذر متشعباً أو حزمياً عندما يكون نموه يضاهي نمو الجذر الاصل كما في الخنطة والبصل .



جذيرة



جذر عرضي



جذر متشعب

Zédoaire (F). Zedoary (E). ٦٤٤٤ - جذوار عقيد

هو الكركم الزدوار نبات عشقولي زراعي .

Troupeau (F). ٦٤٤٥ - جندوة

Flock, Herd, Drove (E).

الجندوة هو السرب وهو أيضاً القطيع ج . جدد .

٦٤٤٦ - جندود

النعجة التي قل لبنها من غير بأس ويقال للنعز مصور .

Affluent ٦٤٤٧ - جندول

Cote (F).

Price-list, Share-list (E).

٦٤٤٨ - جندول الاسعار

Ordre du jour (F). ٦٤٤٩ - جندول الأعمال

Order of the day (E).

هو جدول المواضيع المطلوب بحثها في الاجتماع .

٦٤٥٠ - جندول ترقيم ، طمئل ٥

Table de pointage (F). Table of pointing (E).

جدول قياسي تحدد فيه قيمة الجزء من الشيء بالنسبة الى كامله .

Cabri, Chevreau (F). Kid (E). ٦٤٥١ - جندوي

هو الذكر من اولاد المزمز . الجمع جداء وجديان وأجد .

Algedi ٦٤٥٢ - جندوي ، جندوي الفرقند

الجندوي نجم الى جنب القطب يدور مع بنات نعش تعرف به القبلة .

Littorina (S). ٦٤٥٣ - جندية ٥

Littorine (F). Littorina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجديحيات . انواعها المتعاصرة المعروفة نحو ١٣٠ منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الشواطئ الرملية المغشورة . اكثر انواعها كبير القد مأكول ، مرغوب فيه || اصداؤها سمكة ، شبه مخروطية الشكل ، محلزة الاعقاب ، جانبية الفوهات اللاقياسية الاستدارة . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

Littorina littoralis (S). ٦٤٥٤ - جندية الشواطئ

Littorine de rivage, Vignot, Bigorneau (F).

Littorina scabritia (S). ٦٤٥٥ - جندية خشنة

Littorine scabre (F).

Littorina rudis (S). ٦٤٥٦ - جندية غليظة

Littorine rude (F).


Littorinidae (S). ٦٤٥٧ - جنديةحيات ٥

Littorinidés (F). Littorinidae (E).


فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم المشطية . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم . تعيش على الشواطئ الرملية والخصية المغشورة || اصداؤها متسامكة بيضية الشكل او مخروطية ، بعضها جميل الالوان المتناسقة || اعرف اجناسها واشهرها الجديحة .

النبات	La Plante	خزام	Réséda	عصل	Rhododendron
أثرارة	Épine-vinette	خزامي	Lavande	عوسج	Ronce
أجاص	Poirier	خللاف	Eleagne	غاليون	Gaillet
أخيون	Vipérine	خلنج	Bruyère	فاشرتين	Tamier
أذريون الماء	Populage des marais	خوخ	Prunier	فربيون	Euphorbe
أربس	Arabette	دراق	Pêcher	قصة	Luzerne
أرقطيون	Bardane	دردار	Orme	قول	Fève
آس ، حبلاس	Myrte	ذيل الثعلب	Alopécure des champs	فيرونكا	Véronique
إشقييل	Scille	ريحان بري	Calament acinos	قبرية	Corydalle
أضاليا	Dahlia	زعرور	Aubépine	قت	Minette
أكيدنيا	Néflier du Japon	زعفران	Crocus; Safran	قوعيات	Cucurbitacées
الأمية	Passiflore	زمريق	Gaïnier	قصاب	Pervenche
أوكالبتوس	Eucalyptus	زنبق	Lis	قندلي	Marronnier
أيريترون	Erythrone	زهرة الثلج	Perce-neige	قطريون	Centauree
بنولا	Bouleau	زهرة الربيع	Primevère	قوقحان	Matricaire
يرقوق	Prunier épineux	زهرة اللبن	Galanthe	قويسة	Sauge
بقس	Buis	زيزفون	Tilleul	قيقب	Érable
بليس ، عنصيف	Pâquerette	سرفل	Cerfeuil	كرز	Cerisier
بندق	Noisetier	سرفل بري	Chérophylle	كستنة	Châtaigner
بنفسج	Violette	سطاقس	Épiaire	كشمش	Groseillier
بوصير	Molène	سعادى	Laiche	كفنة مذادة	Lierre terrestre
بيقية	Vesce	سكج	Cyclamen	كنسوده	Consoude
بيلسان ، خجان	Sureau	سلجم	Colza	لاميون	Ortie fétide
تيغ	Tabac	سقفورين	Symphorine	لبلاب	Liseron
ترمس	Lupin	سنديان	Chêne	لئين ، شبرق	Bugrane
تفاح	Pommier	سسط	Acacia	لخيس	Lychnis
تفاف	Laiteron	سورنجان	Colchique	لزان	Cytise
توليب	Tulipe	سيسارون	Chervis; Panais	لزولة	Luzule
تين	Figuier	شرم	Charme	لسان الحمل	Plantain
ثوم	Ail	شرونة	Seneçon	ليلك	Lilas
جلبان	Gesse	شقار	Anémone	ليمون	Citrus
جوز	Noyer	شقيق	Coquelicot	مازريون	Daphné
جويسة	Aspérule	شمار	Fenouille	مران	Frêne
حرف الماء	Cardamine des prés	شجرة مرة	Tabouret	مشمش	Abricotier
حسيكة	Bident	شيلك	Fraisier	ملفوف	Chou
حشيشة الحفر	Barbarée	صعتر	Thym	نبق	Nerprun
حشيشة الخطاف	Chélidoine	صفصاف	Saule	نرجس	Narcisse
حشيشة السعال ، فرارة	Tussilage	صناب	Cardamine	نسرين	Églantier
حشيشة الفراز ، لبن	Mouron des oiseaux	صنوبر	Pin	نفسم	Sarrasin
حندقوق	Mélilot	طقسوس	If	نفل	Trèfle
حودان	Renoncule	عدس	Lentille	هندب بري	Pissenlit
خبازي	Mauve	عون	Sainfoin	هندباء	Chicorée
خبيرة	Guinauve	عشبة البواسير العقدا	Scrofulaire	هليون	Asperge
خربق	Rose de Noël	عشقة	Lierre grimpane	ورد	Rosier
خردل بري ، لبان	Moutarde des champs	عصاف	Passerage	وزال	Ajone


الجدول الثاني - شكل جذرة الطلع
وحجمها الميكروني




(٢٥) خبازي. (٢٦) خبيزة. (٢٧) خريق. (٢٨) خراسي. (٢٩) خلنج.
(٣٠) خوخ. (٣١) ذراق. (٣٢) دردار. (٣٣) ذيل الثعلب. (٣٤) زعرور.
(٣٥) زعفران. (٣٦) زيزفون. (٣٧) زنبق. (٣٨) زهرة الربيع. (٣٩) زهرة
اللين. (٤٠) زيزفون. (٤١) سطاقرس. (٤٢) سكم. (٤٣) سلجم.
(٤٤) سديان. (٤٥) سطل. (٤٦) شرم. (٤٧) شقار. (٤٨) شقيق.



(١) اثراة. (٢) اجاص. (٣) اريس. (٤) اشقيل. (٥) اضاليا. (٦) الآبة.
(٧) اوكالبتوس. (٨) ايريترون. (٩) بنولا. (١٠) بقس. (١١) بدق.
(١٢) بلنج. (١٣) بيقية. (١٤) تبج. (١٥) نقاج. (١٦) توليب.
(١٧) تين. (١٨) نوم. (١٩) جوسية. (٢٠) حرف الماء. (٢١) حشيشة
السعال. (٢٢) حشيشة القزاز. (٢٣) حوزان. (٢٤) حور.



(٧٣) كرز. (٧٤) كشمش. (٧٥) كنسودة. (٧٦) لاميون. (٧٧) لبلاب.
(٧٨) لبنين. (٧٩) لزان. (٨٠) لوزلة. (٨١) يون. (٨٢) مازريون.
(٨٣) علب. (٨٤) شمش. (٨٥) ملح. (٨٦) ملفوف. (٨٧) منثور.
(٨٨) نبق. (٨٩) لرجس. (٩٠) لسرين. (٩١) لقسم. (٩٢) نقل.
(٩٣) هليون. (٩٤) فيضيان. (٩٥) ورد. (٩٦) رزال.



(٩٧) شيار. (٩٨) شبلق. (٩٩) صبتر. (١٠٠) صمغاف. (١٠١) صاب.
(١٠٢) صنوبر. (١٠٣) طقسوس. (١٠٤) عرن. (١٠٥) عشبة البواسير.
(١٠٦) حصن. (١٠٧) حوسج. (١٠٨) غاليون. (١٠٩) فاشرشين. (١١٠) فرامبواز.
(١١١) فريون. (١١٢) فول. (١١٣) قنبرة. (١١٤) قن. (١١٥) قريعات.
(١١٦) قطرم. (١١٧) قنللي. (١١٨) قوقحان. (١١٩) قوسية. (١٢٠) قيقب.

٦٤٨٣ - جذمة
بلحات يخرجن في قع واحد . مجموعها يقال له جذمة .
Rhizome
٦٤٨٤ - جذمور* ، ريزوم
هو الساق النباتية الأرضية الشبيهة بالجذر العرضي .

٦٤٨٥ - جذموريات الرؤوس
Rhizocéphales (F). Rhizocephales (E).
رتبة من القشريات الدنيا . فصائلها وأجناسها قليلة العدد .
جميع أنواعها طفيلية . بعضها كالمعلقين والبيغور يتطفل
على القشريات اغصها عشاريات الارجل || اجسامها
جرابية الشكل . دعائيمها فقط تتصف بصفات القشريات .

٦٤٨٦ - جذور طفيلية
Racines endophytes (F). Endophytes roots (E).
هي جذور النباتات الطفيلية التي تنمو وتتغذى من النباتات
التي تعيش عليها .

٦٤٨٧ - جذير* ، شريش
Radicelle (F). Radicle (E).
هو من الجذور ما يتفرع عن الاصيل والعرضي والوتدي
الخ ... وهو الذي يحمل الشمر الماصة والحوفل .

٦٤٨٨ - جذيم
Rhizophère (F). Rhizopter (E).
الجذيم الطبقة من التربة التي تكثر فيها جذور النبات .

٦٤٨٩ - جذيمة*
Troncatella (S). Troncatelle (F). Troncatella (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة
الجذيمات . انواعها المماصرة المعروفة عديدة منتشرة في
معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تعيش بين
الاعشاب وتحت الجثث في المواقع الرطبة || اصداؤها رقيقة ،
شفافة ، ملونة ، اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، مقطوعة
الاعقاب ، نحاسية اللون الحلزونية ، غائرة الخط اللولبي .

٦٤٩٠ - جذيميات
Troncatellidae (S). Troncatellidés (F). Troncatellidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الحياشيم .
اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد
الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها رقيقة ، ملونة ، متباينة
الاشكال ، يكثر فيها الاسطواني . جميعها نحاسية اللون
الحلزونية . اجسامها صغيرة . انواعها مجهزة باخطام غليظة
مستطيلة || اعرف اجناسها واشهرها الجذيمة والفصيمة .

٦٤٩١ - جذينة*
Amphiprionus (S). Amphiprion (F). Amphiprionus (E).
جنس اسماك بحرية بيوض من شالكات الزعانف وفصيلة
الفرخيات . انواعها المعروفة كثيرة العدد تألف بحار
المناطق الحارة اغصها المحيط الهندي والبحر الاخر ||
اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، مبططة الجرم ،
تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . اثوبها بحيلة الالوان الزاهية
الزاهية اغصها الاحمر والازرق والصنابي والاكهف ،
جميعها مجذعة بخط معترض اسود || لحومها متوسطة الصنف ،
ماكولة .

٦٤٦٩ - جذر هوائي*
Racine aérienne (F). Aerial root (E).
هو جذر عرضي كما في الاثاب يخرج من الساق الهوائية
ومن فروعها ويتدل في الفضاء حتى التربة حيث ينشعب
فيها جذيراته .

٦٤٧٠ - جذر وتدي* ، جذر عمودي ،
جذر جنسي
Racine pivotante (F). Tap root (E).
هو الجذر الاصيل نمت وعظم وغار في الارض عمودياً .

٦٤٧١ - جذري
Radical

٦٤٧٢ - جذرييات
Rhizopodes (F). Rhizopoda (E).
صف كائنات حيوانية دنيا من الاوالي عديد الفصائل
والاجناس تجمعها أربع رتب تنتمي الى شعبتين شعبة
الجذريات الشبكية وشعبة الجذريات الفصية . معظمها
يعيش في البحار وبعضها في الماء العذب .

٦٤٧٣ - جذرييات شبكية
Rhizopodes réticulés (F). Reticulated rhizopoda (E).
شعبة من الجذريات تشمل رتبة الشعاعيات ورتبة المنخرات

٦٤٧٤ - جذرييات فصية
Rhizopodes lobés (F). Lobate rhizopoda (E).
شعبة من الجذريات تشمل رتبة الشيمسيات ورتبة النفاضات .

٦٤٧٥ - جذع
Taurillon (F). Young bull (E).
هو العجل في السنة الثانية من عمره والانثى جذعة .

٦٤٧٦ - جذع
Antenais (F). Teg (E).
هو من القبان ما له سنة كاملة تامة . والانثى تدعى جذعة
والجمع جذاع .

٦٤٧٧ - جذع
Stipe
هو ساق النخل وما اشبه تكون بمعظمها شبه اسطوانية
لا فروع لها . اوراقها هامية .

٦٤٧٨ - جذعي
Caulinaire (F). Cauline (E).
نعت لهرقي يطلق على الاوراق الناشئة في الساق بخلاف
الاوراق النامية على الفروع .

٦٤٧٩ - جذل
Culée, Estoc, Souche, Moignon (F). Trunk, Stock, Stump (E).
الجذل هو اصل الشجرة او الجزء من الجذع او الارومة
الباقى في الارض بعد قطع الفرع . ج جذال وأجذال
وجذول .


٦٤٨٠ - جذم
Racine (F). Root (E).
الجذم الجذر : ج جذوم واجذام .

٦٤٨١ - جذم
Section
هو المقطع .

٦٤٨٢ - جذم عرضي ، قطع عرضي
Section transversale (F). Transversal section (E).




جذر هوائي



جذر وتدي




جذمور



جذير



جذيمة



جذينة

٦٦٢٥ - جَرْنِيْطِيّ ٥ Campicole (F).

نعت تعريفي يطلق على كل من يعيش في الحقول .

٦٦٢٦ - جَرِيْثُ الْبَحْرِ Congre (F).

سمكة بحرية مشهورة باسم زرقوم ، اطلبها .

٦٦٢٧ - جَرِيْثُ الْبَحْرِ الْمَبْدُول

Congre commun (F).

هي الزرقومة المبدولة ، من الاسماك البحرية اطلبها .

٦٦٢٨ - جَرِيْدَة

هي السفة التي تجرد من نصوصها كما يجرد القضيب من ورقه . ج جريد وجرائد .

٦٦٢٩ - جَرِيْس ، جَرِيْسَة Campanula (S).

Campanule (F). Campanula (E).

جنس نباتات عشبية من سبط الجريسات وفصيلة الجريسيات . انواعه نحو ٢٣٠ منشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها نباتات عشبية متعاقبة الاوراق . ازهارها محوري وهامي الارتكاز . ازهارها حيلة الشكل الجرمي عديدة الالوان . اعم انواعه واشهرها ما يتبع .

٦٦٣٠ - جَرِيْسُ اَرْغَبِ الزَّهَر

Campanula lanata (S). Campanule laineuse (F).

نوع من الجريس المشبي المعمر يعلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . اوراقه زغبية ، قلبية الشكل ، معنقة . ازهاره خلية زرقاء اللون . ازهاره يستمر في حيزان وتموز .

٦٦٣١ - جَرِيْسُ اَعْجَن * ، مُسْتَب ، مَحْبُز

العُقَاب ، ذَنْبُ الْاَيْل

Campanula laciniata (S). Campanule lacinulée (F). Bell-flower, Hara-bell (E). Glockenblume (D). Campanella (I).

نوع من الجريس وهو نبات عشبي معمر يعلو نحو ٣٠ سم . اوراقه ريشية مخمرة رباعية . ازهاره عشودي التجميع ازهاره زرق . تنويره يستمر طوال الصيف .

٦٦٣٢ - جَرِيْسُ السَّت * ، قَفَّاز مَرَّيْم

Campanula trachelium (S). Campanule à feuilles d'ortie, C. gantée, Gantelée, Gant de Notre-Dame, Herbe aux tranchées (F). Blue foxglove, Hask-wort, Throatwort (E). Braune fingerhütcher, Nesselglockenblume (D). Campanella guantata, Guanto del madona (I).

نوع من الجريس الخشوشب المعمر . يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم . سوقه مضلعة زباء . اوراقه السفلى تشبه المثلثات . نصلها هلبي الزغب ، مسنن الحافة . ازهاره متعددة الالوان فيها الازرق والابيض والبنفسجي .

٦٦٣٣ - جَرِيْسُ دَرَّافِي الْوَرَق

Campanula persicifolia (S). Campanule à feuilles de pêcher (F).

نوع من الجريس الامرط الخشوشب المعمر . يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه تشبه اوراق الدراقن . ازهاره مكبسة كبيرة القد ، قليلة العدد لونها الى الزرقة يعلوها اطار ابيض او بالمعكس || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٦٦١٢ - جَرْنِيْط Genette du Sénégal (F).

هو رباح السنغال ، اطلبه . Civet cat of Senegal (E).

٦٦١٣ - جِرْهَاس ، جِرْهَاس Lion

من اسماء الاسد .

٦٦١٤ - جِرْهَة ٥ Ecaille de cône (F).

هي سفة كرز الصنوبر وما اشبه . Scale of cone (E).

٦٦١٥ - جَرُو Chiot (F). Puppy (E).

الجرو : ولد الكلب تخصيصاً وكل سبع عامة .

٦٦١٦ - جَرُو ، حِقْ ، عُلْبِيَّة ، كُغْبُوْر

Capsule (F).

كل ثمرة جافة منتفخة رقيقة الغلاف تحوي العديد من البذور . وهي لاقياسية الشكل وقد تكون شعية او وربية الاخبية .

٦٦١٧ - جَرُوْد Anagyre fétide (F).

هو اليفوت النتن ، اطلبه . Stinking wood (E).

٦٦١٨ - جَرُوْل Assise rocheuse (F).

Stratum stony (E).

جرول ج جراول . هي الارض الصخرية . يقال حفر التربة فبلغ الجراول او الجراول .

٦٦١٩ - جَرُوْمَة * ، صَقْرَاب

Cecropia (S). Cécropie, Bois trompette (F). Trumpet tree, Snake wood tree (E). Kanonenbaum (D). Legno trombetta (I).

جنس اشجار دساعة برية من فصيلة الانجريات . مهدا امريكة الوسطى والجنوبية . انواعها المعروفة ٤٠ سوقها اسطوانية منتصبة فارغة متباعدة الحيد تملو من ٣ الى ١٠ امتار . اوراقها ترسية مفصصة معنقة طويلة الزناد . ازهارها قوية التجميع || خشبها ابيض اللون ، خفيف الوزن ، خشن الرقمة . جذوعها تستعمل استعمال القساطل والنقر .

٦٦٢٠ - جَرِيّ Régisseur (F).

Manager, Steward (E).

الجري هو الذي يدبر شؤون مصلحة او مزرعة او معمل وليج امره نيابة عن صاحبه او بدلاً منه .

٦٦٢١ - جَرِيّ * ، جَرِيّ ، جَرِيْث ، سِلُوْر الْفَرَات

Silurus glanis (S). Silure commun (F). Sheat-fish (E).

سمكة نهريّة من فصيلة السلوريات العاديات الحراشف يكثر وجودها في بحر قزوين وفي بعض بحيرات وانهر الشرق واروپة كالفرات والدانوب والفولكا . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف ، الكبيرة القد التي يبلغ طولها نحو ٥ امتار . ثوبها الى السمرة الخنطية الخضراء يعبق مع اقترابه من ثيج الظهر وينعرف الى الصفرة قرب البطن .

٦٦٢٢ - جَرِيْشَة ، جَرِيْشَة Mulette, Ventricle (F).

Ventricle (E).

٦٦٢٣ - جَرِيْال Vin rouge (F). Red wine (E).

النبيذ الاحمر اللون .

٦٦٢٤ - جَرِيْب Champ cultivé (F).

Cultivated ground (E).

هو الحقل المزروع .



جروية



جري



جريس أعجن .



جريس الست



جريس رهل الورق



جريس ضبي



جريس مديوم



جريس موشم



جريس هرمي



جرين

٦٦٤١ - جُرَيْس هَرَمِي*

Campanula pyramidalis (S). Campanule pyramidale (F).

نوع من الجريس المعمر يعلو من المتر الى المترين. جنثه غليظ وتدي. ساقه مضلعة. اوراقه ملتحة معتقة مستطيلة. ازهاره قمية الشكل الهرمي، ثلاثية الارتكاز، عنقودية التجميع، عنقودها منتصب يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. لوونها الى الزرقاء || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٦٦٤٢ - جُرَيْس هَلْسِي الزَهْر

Campanula barbata (S). Campanule barbue (F).

نوع من الجريس العشبي البري المعمر يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم. اوراقه ضبية مراكبة. ازهاره حلبيية النصل زرقاء اللون. ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

٦٦٤٣ - جُرَيْسَات

Campanulées (F).

سبط من فصيلة الجريسيات. اجناسه وانواعه عديدة معظمها نباتات عشبية وبعضها محشوش. عصارها لبنية. ازهارها جريسية الشكل عديدة الالوان.

٦٦٤٤ - جُرَيْسِي

Campanulé (F).

Campanulate (E).

نعت تعريفي يطلق على الازهار الجريسية الشكل.

٦٦٤٥ - جُرَيْسِيَّات

Campanulaceae (S).

Campanulacées (F). Campanuliferae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات. عديدة الاجناس والانواع. جميعها نباتات عشبية وجنيبة تحوي عصارة لبنية مرة المذاق. اوراقها باكثريتها متعاقبة مسننة. ازهارها جريسية جميلة يغلب في الوانها الازرق والابيض.

٦٦٤٦ - جُرَيْس، رَحْبَة

Séchoir à fruits (F).

هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار. Drying-room (E).

٦٦٤٧ - جُرَيْس

Alre (F). Area (E).

راجع بيدر.

٦٦٤٨ - جُرَيْسِي

Tridacna (S).

Tridacne, Bénitier (F). Tridacna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الجرينيات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اصداها كبيرة متفاوتة الاحجام. اطوالها تراوح من ٥٠ الى ١٤٠ سم. واثقالها من ٤٠ الى ٢٥٠ كيلو. وهي ثنائية المصاريح اللامتساوية، متراكبة الصفيحات المحدبة البالغة التخديد || تعيش لاصقة بالصخور المغورة بالماء. ليفها غزير المادة نشيطها.

٦٦٤٩ - جُرَيْس التَّجِير

Maie (F).

جورة مكبس العصر. Kneading-trough, Bread-pan (E).

٦٦٥٠ - جُرَيْسِيَّات

Tridacnidae (S).

Tridacnides (F). Tridacnidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بحار البلاد الحارة || اصداها ثنائية المصاريح اللامتساوية، متراكبة الصفيحات المضلعة والمحددة، متفاوتة الاشكال

٦٦٣٤ - جُرَيْس رَهْلُ الْوَرَق*

Campanula mollis (S). Campanule à feuilles molles (F).

نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوراقه كاملة خلية النصل المتمتع المماوج. ازهاره منتصبه مرطاء لوونها الى الزرقاء الزاهية || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٦٦٣٥ - جُرَيْس سُنبُلِي

Campanula spicata (S).

Campanule en épi (F).

نوع من الجريس المحشوش الحولي. يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. سوقه واوراقه زباء خشنة. اوراقه لاطئة حاضنه ازهاره الى الزرقاء البنفسجية يعلوها خل كثيف زغبى الملمس || ازهاره يستمر شهري تموز وآب.

٦٦٣٦ - جُرَيْس ضُمِّي*

Campanula glomerata (S).

Campanule à bouquets (F).

نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٢٥ الى ٦٠ سم. اوراقه السفلى معتقة قلبية، اوراقه الوسطى لاطئة وقرية الفواصل. ازهاره كبيرة القد بعضها مكبس. لوونها الى الزرقاء يعلوه مواج بنفسجي عابق. ازهاره يستمر من حزيران الى آب || ضرابه واصرامه عديدة.

٦٦٣٧ - جُرَيْس شَرِق

Campanula dichotoma (S).

Campanule dichotome (F).

نوع من الجريس الحولي. يعلو نحو ٣٠ سم. سوقه وفروعه فرقة زباء. اوراقه لاطئة. ازهاره زرق. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

٦٦٣٨ - جُرَيْس مَدْيُوم*

Campanula medium (S). Campanule carillon, C. des

Jardins, Carillon, Violette de Marie (F). Canterbury bells, Mercury's violet (E). Gartenglockenblume (D). Campanella a fiori grandi, Violetta di Maria (I).

نوع من الجريس الحولي الازغب الساق والاوراق. ضرابه واصرامه عديدة. ساقه تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه اهليلجية سنانية الزام الاخير. مسننة الحافة. ازهاره عنقودي. ازهاره كبيرة القد مكبسة متدلية. الوانها عديدة يغلب فيها الازرق البنفسجي ومنها الابيض والبيجي والوردي والارجواني والموشح || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٦٦٣٩ - جُرَيْس مُوَشَّم*

Campanula punctata (S).

Campanule ponctuée (F).

نوع من الجريس العشبي المعمر يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه السفلى معتقة قلبية الشكل. ازهاره خلية متدلية لوونها الى الصفار يعلوه توشيح جزوي ومنها بنفسجية اللون قمرية التوشيم || ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٦٦٤٠ - جُرَيْس نَنَّا

Campanula nana, C. alpestris (S). Campanule naine (F).

نوع من الجريس العشبي البري المعمر. يعلو من ١٠ الى ١٥ سم. سوقه مدادة. اوراقه خبطية. ازهاره الى الزرقاء الساوية. يوجد في الجبال. ازهاره يستمر شهري تموز وآب.

٦٦٦٠ - جَزَاب مُخَرَّق ، دَهَامِين مُخَرَّق

Erodium laciniatum (S). Erodium lacinié (F).

نبات عشبي حولي ازغب . ساقه متكة كثيفة الحلب .
أوراقه السفلى بيضية كاملة الفصوص والعليا مفصصة
قصيرة الخرق . ازهاره زنادية سداسية التجميع || ازهاره
ربيعي يوجد على الساحل السوري اللبناني .

٦٦٦١ - جَزَاب مِسْكِي ، دَهَامِين مِسْكِي ، مِسْكِيكَة

Erodium moschatum (S). Erodium musqué, Erodium musqué (F). Ground needle, Musk-erodium, M. clover (E). Bisamreiherschnabel, Moschus bisamkraut (D). Geranio muschiato, Erba moscada (I).

نبات عشبي حولي عطري ازغب لزج . ساقه منتصبه تعلو
من ٢٠ الى ٥٠ سم . أوراقه مركبة ريشية بيضية النصل
المزدوج القسنيين . ازهاره وردية اللون يعنوها توشيح ليلي .
ازهاره يستمر من نيسان الى ايلول .

٦٦٦٢ - جَزَاب مِصْرِي ، دَهَامِين مِصْرِي

Erodium aegyptiacum (S). Erodium égyptien (F).

نبات عشبي حولي ازغب . ساقه فرعاء . أوراقه بيضية
مستطيلة ثلاثية الفصوص . ازهاره زنادية كثيرة التجميع ،
لونها الى الالبيض الكدر || ازهاره ربيعي . يوجد
في مصر .

٦٦٦٣ - جَزُاقَة

الجزأة هي مغرز الذنب ومنهم من قال اصل ذنب البعير .

٦٦٦٤ - جَزُاقَة

Echelas (F). Vine-prop, V-stick (E).

هي المرنج ، خشبة يرفع بها الكرم عن الارض .

٦٦٦٥ - جَزَّاز ، جَزَّاز

هو زن جز الغنم وحصاد الزرع او صرام النخل وغيره .

٦٦٦٦ - جَزُوف

Forfait (F). Contract (E).

هو التعاقد على صفقة بمبلغ مقطوع معين .

٦٦٦٧ - جَزُافِي

Forfaitaire (F). Contractual (E).

ما تم الاتفاق عليه مقابل ثمن مقطوع .

٦٦٦٨ - جَزُوف

Fagots (F). Faggots (E).

حطب غليظ يابس (فريتغ) .

٦٦٦٩ - جَزَالَة ٥

Dichapetalum (S).

Dichapétale (F).

جنس نباتات جنبيه ، معمرة ، برية من فصيلة الجزاليات .
انواعها المعروفة نحو ٣٠ اعطائها المناطق الاستوائية الاسيوية
والافريقية || جنباها فرعاء تعلو من مترين الى خمسة
امتار . أوراقها منقطة ، متعاقبة . نصالها اهليلجية ،
متسمة ، غائرة المروق ، شديدة الخضار . ازهارها
عنقودي التجميع ، متشعب مستطيل . ازهارها متباينة
الالوان يكثر فيها الوردي ثم الاصفر والتبني والابيض
الذنس || ثمارها مغلفة السوذك لا تؤكل . عجباها آحبة .

٦٦٧٠ - جَزَالِيَّات ٥

Dichapetalaceae (S).

Dichapétalacées (F). Dichapetalaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القعالات . اجناسها
ثلاثة اما انواعها فكثيرة العدد ، اعطائها الاصقاع
الاستوائية والحارة || جميع نباتاتها جنباها فرعاء متفاوتة
الارتفاع . أوراقها متعاقبة ، منقطة ، اذينية . نصالها

والاحجام . جميعها كبيرة القد ومنها الحارة الكبر || اعرف
اجناسها واشهرها الجرين والهيوب .

٦٦٥١ - جَزُوف

Tonte (F).

Sheep-shearing, Clipping (E).

هو قلع صوف الضأن .

٦٦٥٢ - جَزَاء نَقْدِي

Amende (F). Penalty (E).

غرامة نقدية تفرض فرضاً بصفة عقوبة .

٦٦٥٣ - جَزَاب * ، دَهَامِين

Erodium, Erodion

جنس نباتات عشبية من فصيلة الغرنوقيات انواعه نحو
٥٠ اعطائها جميع اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة من
السواحل الى الجرد || اشهر انواعه ابرة العجوز
وأبو مشقة ومسكة .

٦٦٥٤ - جَزَاب أَغْبَر الْوَرَق ، دَهَامِين أَغْبَر الْوَرَق

Erodium glaucophyllum (S). Erodium glauque (F).

نبات عشبي معمر . ساقه مستقيمة متشعبة ملساء . أوراقه
بيضية ، مستطيلة ، زغبية النصل المفصص ، غبراء
اللون . ازهاره زنادية لونها الى البياض الاغبر || ازهاره
ربيعي . يوجد في بادية التيه وسينا وشرقي البحر الاحمر .

٦٦٥٥ - جَزَاب عَفْثِي ، دَهَامِين عَفْثِي ، بَدُو

Erodium hirtum (S). Erodium hérissé (F).

نبات عشبي معمر . ساقه قصيرة متكة . أوراقه مركبة
ثنائية التقسيم الريشي . ازهاره زنادية خاسية او سداسية
التجميع لونها الى البياض الاغبر || ازهاره ربيعي .
يكثر في فلسطين .

٦٦٥٦ - جَزَاب عُقُودِي ، دَهَامِين عُقُودِي

Erodium botrys (S). Erodium an grappes (F).

نبات عشبي حولي ازغب . ساقه منتصبه زباء . أوراقه
مركبة ، ثنائية التقسيم الريشي ، ضيقة الخرق ، خلية النصل .
ازهاره زنادية قليلة التجميع والعدد . لونها الى البياض
الليلكي || ازهاره ربيعي يوجد في تها لبنان وسورية .

٦٦٥٧ - جَزَاب فَاشِرِي الْوَرَق ، دَهَامِين

فَاشِرِي الْوَرَق ، مَرُغِيَط

Erodium bryoniaefolium (S). Erodium à feuilles de

bryone (F).

نبات عشبي حولي . ساقه مستقيمة . أوراقه السفلى
مغضة قلبية ثلاثية الفصوص والعليا متصاغرة . نصلها
حريري الملمس فضي الموج . ازهاره زنادية شفمية .
البسات اطول من الكأس لونها الى البياض . ازهاره ربيعي .
يوجد في فياني فلسطين وبادية سينا .

٦٦٥٨ - جَزَاب كُرْكِي ، دَهَامِين كُرْكِي

Erodium gruinum (S). Erodium à bec de grue (F).


نبات عشبي حولي ازغب . ساقه تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم .
أوراقه مركبة مفصصة . ازهاره زنادية كبيرة القد بنفسجية
اللون || ازهاره ربيعي يستمر من نيسان الى ايار يوجد
في جميع مناطق حوض البحر المتوسط .

٦٦٥٩ - جَزَاب لَقْلَقِي ، دَهَامِين لَقْلَقِي

Erodium cichonium (S). Erodium à bec de

cigogne (F).


نبات عشبي حولي ازغب لزج . ساقه منتصبه تعلو من
٢٠ الى ٦٠ سم . أوراقه مركبة ريشية . ازهاره زنادية ،
متوسطة القد ، زرقاء اللون || ازهاره ربيعي . يوجد في
تها فلسطين ولبنان وسورية .




جَزَاب



جَزَالَة




جزر



جزر الرعدة



جزر بري



جزبون أزرق

٦٦٨٤ - جَزَل ، هَدِيل Roucoulement (F).
Cooling (E).
هو صوت الحمام ومهم من شخص الهديل بوحشها .

٦٦٨٥ - جَزَم

الجزم : بيع الثمرة في اكامها بالدرهم . (ابن الاعرابي).
واجزم الشجرة : اشترى ثمرها فقط .

٦٦٨٦ - جُزْيِيء ذَرَّة Moisécule (F). Molecule (E).
اصفر جزء طليق من جسم ما .

٦٦٨٧ - جَزِيَّة Impôt foncier (F). Land-tax (E).
هي الضريبة العقارية او الخراج . تجبى من الاراضي الزراعية والعقارات المبينة .

٦٦٨٨ - جَزَيُون Jaslone

جنس اشباب برية حولية وبحولة ومعمرة من فصيلة الجريسيات . انواعه نحو ١٢ جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط واروبه الغربية . سوقها نحيلة تعلو نحو ٥٠ سم . اوراقها صغيرة لسنة ازهارها ناجية الارتكاز طويلة الزناد لونها الى الازرق او الليلي . اعما انتشاراً الجزيون الازرق .

٦٦٨٩ - جَزَيُون أَزْرَق

Jaslone montana (S). Jaslone de montagne, Herbe bleue, H. à midi, Fausse scabieuse (F). Common sheep's-bit scabious (E). Blaue flockenblume, Kleine scabiose (D). Lapacello annuo, Scabiosa falsa (I).

نوع من الجزيون وهو نبات طبي محول . جذره وتدي ، ساقه ملطاة تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه صغيرة لسنة . ازهاره زرقاء اللون جميلة الشكل || ازهاره يستمر من سزيان الى ايلول .

٦٦٩٠ - جَسْ Palpatio

٦٦٩١ - جَسَاة Callosité, Dureté (F). Callosity (E).
تكاثف وتصلب الادمة او البشرة .

٦٦٩٢ - جُسَاة ، كَنَب Caliose
علة تصيب البشرة او الادمة فتصلبها وتمنعها من القيام بعملها الطبيعي .

٦٦٩٣ - جُسَّاد Crocus, Safran (F).
Crocus, Saffron (E).
هو الزعفران ، اطلبه .

٦٦٩٤ - جِسْلُوم Geissoloma (S).
Geissolome (F). Geissoloma (E).

جنس نباتات برية وتزيينية من فصيلة الجسلومييات . انواعه المعروفة قليلة العدد مهددا بعض اصقاع افريقية الجنوبية || نباتاته شجيرات صغيرة تعلو نحو اربعة امتار . افنادها وافنانها رباعية الاضلع . اوراقها متقابلة ، معنقة . ازهارها محورية الانتشاب ، فردية . يكثر فيها اللون الاحمر ثم الاصفر .

٦٦٩٥ - جِسْلُومِيَّات Geissolomataceae (S).
Geissolomatacées (F). Geissolomataceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد اعطائها بعض مناطق افريقية الجنوبية || نباتاتها شجيرات وجنيات برية وزراعية تزيينية . سوقها متعصبة

اهليلجية ، غائرة العروق والاعصاب . ازهارها عنقودي . ازهارها ثنائية الكم ، توريحاتها متحدة البتلات . ثمارها لاقياسية الانفلاق . عجباتها آحية || اشهر اجناسها الجزالة والطابورة .

٦٦٧١ - جِزْب Part (F). Part, Share (E).
هو النصيب والحصة .

٦٦٧٢ - جِزَّة Tolson (F). Fleece (E).
مجموع ما يجز من صوف النعجة او الكبش .

٦٦٧٣ - جِزَح جرح الشجرة : ضررها ليحت ورقها .

٦٦٧٤ - جِزَر Reflux (F). Reflux, Ebb (E).
الجزر ضد المد وهو رجوع ماء البحر الى خلف .

٦٦٧٥ - جِزَر Abattage (F). Slaughtering (E).
هو ذبح حيوانات القصابة .

٦٦٧٦ - جِزَر * ، إِصْطَقْلِين

Daucus carota sativa (S). Carotte (F). Carrot (E).
Karrotten, Echte möhre (D). Carota (I).
نبات حولي زراعي غليظ الجذر المأكول من فصيلة الخيميات . ضرره كثيرة . فوائد الصحية عديدة تتمثل بمادة الكاروتين التي تتحول الى فيتامين «ا» (راجع جدول الفيتامين) وينفع القوة الجنسية والحضم والاعصاب والتوازن الغذائي وينشط المناعة الجسدية وطاقة مقاومتها الامراض المعدية ويمنع تكوين الحصى في الكلى . الجزر الاصفر انفع من الاحمر .

٦٦٧٧ - جِزَر أبيض Panais cultivé (F).
Common-parsnip (E).
هو السيسارون الكبير ، اطلبه .

٦٦٧٨ - جِزَر إقْلِيْطِي Sécacul (F).
Rough parsnip (E).
هو الشقاقل نبات طبي بري ، اطلبه .

٦٦٧٩ - جِزَر الرُعَاة * ، دُوْقُس

Athamanta cretensis (S). Athamante de Crète, Daucus de Candie (F). Candy carrot, Cretan carrot (E).
Kretische augenwurz (D). Dauco Cretico, D. di Candia (I).

نبات عشبي بري معمر غليظ الجذر الجنئي من فصيلة الخيميات يقال انه لا يخلو من بعض المنافع الطبية لكنها مبهمة ولذا لم نذكرها .

٦٦٨٠ - جِزَر الشَّبِطَان Cerfeuil (F).
Cerfolium (E).
راجع أطريال .

٦٦٨١ - جِزَر بَرِّي * Daucus carota (S).

Carotte sauvage, Pastenade (F). Wild carrot, Parsnip (E). Pastinake (D). Carota salvatica, Falso sisaro (I).

نوع من الجزر وهو نبات عشبي بري من فصيلة الخيميات يتميز بشخانة جشه الذي يتحلل ، من الوجهة الطبية ، بجميع خصائص جنسه .

٦٦٨٢ - جَزَل Bifide (F). Bifid (E).
هو كل عضو من اعضاء النبات ثنائي التفليق .

٦٦٨٣ - جَزَل ، سَخْد Bifidité (F). Bifidity (E).
التصاق عضوان نباتيان ببعضهما البعض كورقتين وعسلوجين .

والاستوائية. معظمها اعشاب صغيرة ومتوسطة القد. وبعضها جنات وشجيرات. اوراقها بسيطة متقابلة. ازهارها مختلفة الالوان، خاسية البتلات، رباعية الاسدية، وحيدة الميسم القصير القلم.

١٧٠٣ - جُسُوء، صِلَابَة. Rigidité (F). Rigidity (E).

١٧٠٤ - جَسْثِي، صَفِيْق. Pachyderme (F). Pachydermatous (E).

١٧٠٥ - جَسْثِيَّات. Pachydermes (F). هي رتبة صفيقات الجلد من الثدييات. Pachyderms (E).

١٧٠٦ - جُسَيْمَات. Corpuscules (F). Corpuscles, Corpuscles (E). من الحيوانات الدنيا ما كانت اجسامها ذرية القد.

١٧٠٧ - جُشْ، *، كُشْ، عَطِيْل. Androcée (F). Androcium (E). هو جهاز التذكير في النبات.

١٧٠٨ - جَشَّاب. هو الندى الذي يقع على البقل.

١٧٠٩ - جَشَّار. * Angliopteris (S). Anglioptère (F). Angliopteris (E).

جنس نباتات سرخسية، جبارة، معمرة. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق آسية الاستوائية وجزر المحيط الهندي || حراشفها مجنات متراكبة. مراحها جبارة تقول أكثر من سبعة امتار. اكياس بوغها ضخمة بحجم الجوز || تعيش في جميع المواقع الحارة الرطبة لكنها لا تبلغ الحجم المعهود الا في اقاليمها الطوعية.

١٧١٠ - جُشْب. Ecorces de grenade (F). قشور الرمان. قابضة وتستعمل في الدباغة واحده جشيب.

١٧١١ - جَشْرَة. Glume inférieure (F). Inferior glume (E). الجشرة او القصرة: القشرة السفلى التي على حبة الحنطة.

١٧١٢ - جُسْنَة، جُسْنَة، عُرْبَزَاء. Anthus (S). Pipit, Pit-pit (F). Pipit (E). جنس طير من الجوام انواعه عديدة جميعها عصافير صغيرة القد. مصيفها البلاد المعتدلة الحارة، مشتاها البلاد الحارة. طولها يراوح من ١٥ الى ١٨ سم. منقارها دقيق مستقيم. اجنحتها مستطيلة. اذناها عامرة مقعرة. ارساغها ومخالبها دقيقة. اثنائها متعددة الالوان المتداخلة || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

١٧١٣ - جُسْنَةُ الْحَقْل، طُرْسُوم، كَيْخَن. Agrodroma campestris, Anthus campestris (S). Agrodrome champêtre, Pipit rousseline, Rousse-line (F). Tawny pipit (E).

طائر من الجسنة وفصيلة الذعريات. اعطاه العالم القديم يألف الحقول والبور والسهول. قوته الحشرات والديدان. طيراته سفيف وحوم وهو قريب الشبه بطيران القبر || جسمه صغير القد، رشيق القوام بطول نحو ١٨ سم. وبسطه نحو ٢٤ سم. ثوبه متراكب الالوان. رأسه ورداؤه وظهره الى السمرة الزيتية المنسنة بالقرني. جناحاه رتاجيا الريش. الاسمر المابق. كلاء مطوقة بالابيض. عيناه

فراء. فروعها مربعة الاصلع. اوراقها متقابلة، قصيرة الاعناق، اهليلجية النصال الضيقة. ازهارها فردية، محورية الارتكاز، منها الاحمر والاصفر والليلكي || اشهر اجناسها الجسلوم.

١٦٩٦ - جُسْمُورِي، شَوْرَبِي. Morphologique (F). Morphological (E).

ما كان له صلة بالاعسام والشوزبة اي درس الاشكال الخارجية والباطنية في الكائنات الحية.

١٦٩٧ - جُسْمُورِيَة. Physiologie (F). Physiology (E).

الجسمورية علم يبحث في تركيب المخلوقات الحية وفي وظائف اعضائها.

١٦٩٨ - جَسْمِي. Hysope officinale (F). Common hyssop (E). اطلب زوفا.

١٦٩٩ - جُسْنَة. Mora (S). سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من الملساوات وفصيلة الغادسيات. اعطانها المتوسط. جسمها مردني الشكل بطول نحو ٦٥ سم. لها ذبانيان في مقدم الحطم. ثوبها الى السمرة الرصاصية الفضية الموج. لحمها مستحب الطعم. تعيش ضمن المياه الاقليمية في المناطق الصخرية الوعرة.

١٧٠٠ - جُسْنَةُ الْمُتَوَسِّط، مَوْزَة. Mora mediterranea (S). Mora de la Méditerranée (F). Mora mediterranea (E).


سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغادسيات. اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط واخصها الشرقية والجنوبية. تعتبر من اسماك النفاق. مسرحها المواقع التي تكثر فيها الحشاف. قوتها القشريات والرخويات والاسماك الصغيرة || جسمها مردني الشكل، بطول من ٥٠ الى ٦٥ سم. ثوبها الى السمرة الرصاصية الفضية الموج يعلوها تمشيج بنفسجي في الظهر. بطنها الى الغبرة الفضية. زعانفها الظهرية والشرجية الى السمرة الموشحة بالازرق. زعانفها الصدرية والحوضية الى السمرة الموشحة بالاحمر. زعنفتها الذيلية موشحة بالازرق والاحمر || رأسها مخروطي الشكل، مستدير الحطم. شدقها معتدل الانفراج. فكاهما متعادلان والسفلي يحمل في مقدمه عذبتان دقيقتان. اسناتها ثلاثية الصفوف في الفكين. ثنائياها مستطيلة، ذربة. عينها كبيرتان، مستديرتان، ناشرتان || ترتيب زعانفها يشذ عن المألوف: الظهرية اثنتان، والشرجية اثنتان والحوضية وداجية الارتكاز. زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

١٧٠١ - جِسْنِيْرَة. Gesnera (S). Gesnerie, Gesnère (F).

جنس نباتات عشبية جذمورية من فصيلة الجسنيريات. انواعها نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها تزييني. سوقها قصيرة اوراقها متقابلة خلية النصل. ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان.

١٧٠٢ - جِسْنِيْرِيَّات. Gesneraceae (S). Gesnéracées, Gesnériacées (F). Gesneraceae (E).


فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة. انواعها نحو ١٠٠٠ تنتمي الى ١٠٠ جنس. منبها البلاد الحارة



جسنة



جسنة المتوسط



جش



جشار



جسنة الحقل

١٧٢١ - جُعْرَان Hyène (F). Hyena (E).
هو الضبع وفي المثل اعيث من جعار.

١٧٢٢ - جُعَام

داء يعرض للابل وغيرها من رعي النضر.

١٧٢٣ - جُعَانِس Coléoptères (F).
Coleoptera (E).

رتبة حشرات تعرف بغمديات الاجنحة او مغمديات الاجنحة ، اطلبها .

١٧٢٤ - جُعْبُوبَة * Ormyrus (S).
Ormyre (F). Ormyrus (E).

جنس حشرات من فصيلة الطرميديات ورتبة غشائيات الاجنحة المخصوصة . انواعها المعروفة نحو سبعة اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على الآبراث || اجسامها صغيرة مستغلظة تطول من ٢ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة . جواشها ضخمة . بطونها مخروطية الشكل . مرزاتها ذلقة قصيرة . انوثها الى الخضار الاليس . ترجماتها مزينة بخطوط من النقط الصفرة .

١٧٢٥ - جُعْبِي Fourmi rouge (F). Red ant (E).
نوع من النمل . وقال الليث هو نمل احمر . ج جعبيات .

١٧٢٦ - جُعَة ، بَيْرَا ، مِزْر Bière (F). Beer (E).
مشروب صحي شائع الاستعمال قليل المادة الكحولية يستخرج من الشعير مع الجنجل .

١٧٢٧ - جُعْشَنَة Souche (F). Stump, Stem (E).
ارومة كل شجرة تبقى على الشتاء من عظام الشجر وصفارها . وقال ابو زياد الجعشنة اصل كل شجرة قد ذهب سوي الغصاه . (اللسان) ج جعش وجعشنت وجعاش .

١٧٢٨ - جُعْدُبَة ، كُعْدُبَة هي بيت العنكبوت .

١٧٢٩ - جُعْدَة Pollium
الجعدة عشبة برية طيبة تعرف بحشيشة الريح ومسك الجن والطوريون البلد . قيل في وصفها ما يلي : « حشيشة تنبت على شاطئ الانهار وتجعد » || « شجرة خضراء تنبت في شعاب الجبال بنجد وفي القيعان » || « عشبة خضراء وغبراء تنبت في الجبال ، لها رعدة مثل رعدة الديك طيبة الريح تنبت في الربيع وتيبس في الشتاء وهي من البقول » عن ابي حنيفة || « بقلة برية لا تنبت على شطوط الانهار وليس لها رعدة » الازهري || « شجرة طيبة الريح خضراء لها قصب في اطرافها ثمر ابيض تحشى بها الوسائد لطيب ريحها . وهي جهيدة يصلح عليها المال » (النضر بن شميل) .

١٧٣٠ - جُعْدَة Cloque (F). Leaf-curl (E).
الجمدة او مرض الجعد وصف فطري مجهري يعمرى اوراق وعسالج الاشجار المشمرة وقد يصيب ثمارها . سببه فطر من المغمديات يدعى تفريته ، اطلبها .

١٧٣١ - جُعْر

الجعر : نجو كل ذي برن من السباع .

١٧٣٢ - جُعْرَان Scarabée (F). Scarabaeus (E).
هو الجعل ، اطلبه .

مكحلتان بالاسود . عنقه وصدره الى البياض الاخير الموشم بالاسمر . بطنه الى الصهبة الرملية المواج . ذنبه مستطيل القد مقطوم الطرف . منقاره ورغاه واصابعه الى السمرة الخنطية العابقة || الشقان لا يختلفان قدماً وثوباً واليافع يتحل بشوب البالغ || يدثن عشه في افحوص يختفونه بين الدغل والاعشاب الكثيفة . اثناء تضع من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الحوض يستمر من ١٤ الى ١٥ يوماً تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

١٧١٤ - جُشْنَةُ الغَاب * Anthus arboreus (S).
Pipit des arbres, P. des bois, Cujelier (F). Tree Pipit (E).

نوع من الجشنة طوله نحو ١٦ سم . ثوبه متراكب الالوان رأسه وظهره بلون الرماد يعلوه موج زيتوني ورقشة سمراء . صدره وبطنه الى الصهبة الصفراء يعلوها توشيم اسمر . حاجب العين اصهب اللون والمنقار اسمر || قوته الحشرات والهام . يألف الاحراج . يدثن عشه في الخلتج وبين الادغال . اناته تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

١٧١٥ - جُشْنَةُ الماء * Anthus spinoletta (S).
Pipit spinolette, P. aquatique (F). Rock pipit (E).

نوع من الجشنة طوله نحو ١٨ سم . ثوبه الى الصهبة العابقة يعلوه موج ازرق ورقشة سوداء . بطنه وصدره الى الصهبة المؤذرة بالرودة الغبراء . اطراف قوادمه واباهره الى الرودة الطحلاء . حاجب العين ابيض اللون والمنقار اسمر || قوته الحشرات والهام اخصها الذباب والاروق والديدان والعناكب . يألف الغابات الرطبة وضفاف الانهر ومجاري الماء . يدثن افحوصه في التراب بين الخصى او جذور الاشجار . اناته تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .

١٧١٦ - جُشْنَةُ المَرْوَج * Anthus pratensis (S).
Pipit des prés (F). Meadow pipit (E).

نوع من الجشنة طوله نحو ١٥ سم . ثوبه متراكب الالوان . رأسه وظهره الى السمرة الزيتونية يعلوها توشيم اسود . زوره وصدره وبطنه الى النصفار الاخير الموشم بالاسمر . اطراف قوادمه واباهره الى البياض . حاجب العين اصفر اللون ، والمنقار اسمر || يألف المروج والمراعي الرطبة قوته الحشرات والهام . يدثن افحوصه في الارض بين المشب والاسل والفزار . اناته تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين .


١٧١٧ - جِصّ Calcaire (F).
Calcareous, Lime-stone (E).

اسم شامل يطلق على المعادن التي يدخل في تركيبها كربونات الكلس || وهو ايضاً صفة ما كانت طبيعته الكلس او الذي حوى مقداراً من الكلس .

١٧١٨ - جِصّ Plâtre (F). Plaster (E).
هو الجص الطبيعي ازيل ماؤه .

١٧١٩ - جِصَّاص ، إلف الكلس Calcicole (F).
نمت يطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً الا في الاتربة الجصية (الكلسية) .

١٧٢٠ - جِصَّص ، كَلَّس Calcifier (F).
حوّل الى كربونات الكلس .




جشنة الغاب



جشنة الماء



جشنة المروج



جعبوبة

كثيفة التجميع لونها الى البياض الاصفر المواجه || يركب الصمتر والندغ .

٦٧٤٢ - جَعْفِيل دَمَوِي

Orobancha cruenta (S). Orobancha sanglante (F).
جنته غليظ الدرنة . ساقه وحيدة عقية حمراء اللون . ازهاره كبيرة القد ، زياء الاسدية ، صفر السمات ، حر التويج || يركب بعض النباتات القرنية والكرمة .

٦٧٤٣ - جَعْفِيل سَاطِع

Orobancha speciosa (S). Orobancha specieuse (F).
ساقه وحيدة ، غليظة الجنت الدرني ، عقية ، تعلو نحو ٧٠ سم . ازهاره عطرية العرف ، بيضاء اللون مشيرة بخطوط بنفسجية || مهد حوض البحر المتوسط . يركب بعض القرنيات اخصها الفول والبزيلة والحمص .

٦٧٤٤ - جَعْفِيل فَلْسِي

Lathraea squamaria (S). Orobancha squameuse (F).
ساقه وحيدة ، عقية ، درماء ، فلسية الحراشف ، تعلو نحو ٦٠ سم . ازهاره كبيرة القد متدللة لونها الى البياض الوردي || يعيش في المواقع الظليلة الرطبة . يركب جذور بعض الاشجار منها الكرمة .

٦٧٤٥ - جَعْفِيل مَاجُور

Orobancha major (S). Orobancha majeure (F).
ساقه وحيدة ، كبيرة القد ، عقية ، تعلو نحو ٧٠ سم . حراشفها مدبية متقابلة متباعدة . ازهاره كبيرة الحجم لونها الى الابيض الوردي تعلو توشيح جزوي || يركب بعض النباتات البرية والتريينية اخصها السكايبوزا .

٦٧٤٦ - جَعْفِيل مُتَشَعَّب

Orobancha racemosa, Phelipaea ramosa (S). Orobancha rameuse, Phéllpéo (F).
جنته درني مستدير عديد السوق النحيلة الضمية ، لونها الى الزرقة الباهتة تعلوها موج ابيض واصفر . ازهاره سنبلية ، رهلة ، صغيرة القد ، صفراء اللون تعلوها عند اطرافها موج بنفسجي || يركب عدة نباتات اخصها التبغ والكتان والذرة والبندورة والباقية والكرمة .

٦٧٤٧ - جَعْفِيل مِينُور

Orobancha minor (S). Orobancha mineure (F).
جنته غليظ الدرنة الضمية السوق او الوحيدة الساق . ازهاره غبراء اللون تعلوها موج متفاوت الالوان يراوح بين الابيض والاصفر والبنفسجي || يركب عدة نباتات من القرنيات والخبيات اخصها النفل على اختلاف انواعه .

٦٧٤٨ - جَعْفِيلِيَّات

Orobanchaceae (S). Orobanchacées (F). Orobanchaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات القعالة . تشمل نحو ١٥٠ نوعاً ثلثها من نباتات اقليم حوض البحر المتوسط . نباتاتها عديمة الخضيب ، طفيلية تنشب في جذور غيرها وتعيش مما تمتصه من نسغ . سوقها درماء تكسوها حراشف لسة او مدبية تقوم مقام الاوراق . ازهارها سنبلية او عنقودي التجميع . ازهارها عديمة الالوان .

٦٧٤٩ - جُعَل ، جَعِيلَة

Salaire (F). Salary (E).
الأجر الذي يأخذه العامل على فعل الشيء .

٦٧٥٠ - جُعَل ، جُعْرَان

Scarabée (F). Scarabaeus, Scarab beetle (E).
جلس خنافس من فصيلة الجعلليات . انواعه كثيرة العدد

٦٧٣٣ - جُعْرَة *

Escourgeon (F). Winter-barley (E).
شعير غليظ القصب عريض عظيم طويل الحب ابيض ضخم السنابل كأن سنابله جراء الخشخاش ولسنبله حروف عدة اربعة او ستة وهو رقيق خفيف المونة في الدياتس . والآفة اليه سريعة وهو كثير الريع طيب الخبز .

٦٧٣٤ - جُعْرُور

Gerrhosaurus (S). Gerrhosaura (F).
جنس عطاء من فصيلة الجعروريات . انواعه المعروفة ١٠ طولها يراوح من ٣٠ الى ٤٠ سم . اثوابها الى السمرة تعلوها تدبيج ابيض وخطوط سود يكتنفها حثار اخضر . موطنها البلاد الحارة . تألف الفياقي والواحات .

٦٧٣٥ - جُعْرُورِيَّات

Gerrhosauridae (S). Gerrhosauridés (F). Gerrhosauridae (E).
فصيلة من العظائيات الرباعيات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد او متوسطة . اثوابها الى السمرة تعلوها نمشة بيضاء وتجديع او تخطيط مختلف الالوان يغلب فيه الاسود والاصفر والاصفر .

٦٧٣٦ - جَعْفِيض

Laiteron des marais (F). Fen thistle (E).
راجع ثقاف المنافع .

٦٧٣٧ - جَعْف

Extirpation
راجع انحاء .

٦٧٣٨ - جَعْف ، قَعَر

Déraciner (F). To root up (E).
جعت الشجرة : قلعها . واجتعت الشجرة : اقتلعها .

٦٧٣٩ - جَعْفِيل ، سَبْع ، حَامُول ، هَالُوك

Orobancha (S). Orobancha (F). Clove scented, Broom-rape (E). Nelken sommerwurz (D). Orobanché, Erba scalogna (I).

جنس نباتات طفيلية ضارة عديمة الخضيب من فصيلة الجعفيليات . انواعه عديدة نحو المئة . تنشب في جذور عائلها من النبات فتلتصق به وتنمو عليه وتعيش من نسغه . سوقها درماء ، لونها عديدة منها الاخر والاصفر والبنفسجي والوردي والافبر ... اوراقها حرشية مدبية تحمل لون الساق . ازهارها سنبلية التجميع يتمركز في الزام الاعلى من الساق . ازهارها خنثوية خاسية . ثمارها كمار صغيرة تغلف العديد من البزور . بزورها مستدقة مستديرة تعيش في التربة من ثمانية الى عشرة اعوام لا يفلقها وينتشها سوى افراز جذور النباتات الحاضنة لها || نقيعه مر المذاق مدر للصفراء ويقال ان مسحوقه يستعمل في علاج السرطان وقروحه || اعرف واشهر انواعه الضارة ماييلي .

٦٧٤٠ - جَعْفِيل أَزْغَب

Orobancha pubescens (S). Orobancha pubescente (F).

ساقه زياء فردية ، عقية ، متوسطة القد ، تعلو نحو ٤٠ سم . حراشفها صغيرة لسة ، زغبية . ازهاره خلية لونها الى الصفار الوردي تعلوها مشحة بنفسجية || يركب بعض النباتات البرية والتريينية . اضراره قليلة .

٦٧٤١ - جَعْفِيل الصَعْتَر

Orobancha epithymum (S). Orobancha du thym (F).


ساقه وحيدة عقية متوسطة القد تعلو نحو ٣٠ سم . ازهاره



جعرة



جعروور



جعفيل ساطع



جعفيل متشعب



جعفيل مينور

جَعَلُ أَخْبَلُ جَعَلُ مُقَدَّسٌ



جعل البساتين



جعل اخبل

الزنجاري . تعيش على ورق الصفصاف ولا تعف عن خلب الكرم . يرقها نمة تقرض كل ما وصلت اليه من جذور النبات .

٦٧٥٩ - جَعَلُ الْوَرْدِ هو السيتوان المذهبة ، اطلبها .

٦٧٦٠ - جَعَلُ خَلِيٍّ * Tropinata squalida (S).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٢ مم . ثوبها الى السواد اللامع تعلوه بكامله مع غمدتها خجلة صفراء تشوبها خضرة زاهية . قوتها مضر الزهار وبتلاتها . وهي تسطو على نباتات كثيرة اخصها الورد .

٦٧٦١ - جَعَلُ زَاهِرٍ * Anoxia villosa (S). Hanneton velu (F).

خنفساء من الجعليات ، متوسطة القد تطول نحو ٢٥ مم . ثوبها الى البني تعلوه بكامله زغبة كثيفة صفراء اللون والمواج . يرقته تركب جذور الكرم والنجيليات البرية والزراعية فتعطبها .

٦٧٦٢ - جَعَلُ زُرْدِيَّ * Potosia cuprea (S). Potosie métallique (F).

خنفساء من الجعليات متوسطة القد تطول نحو ٢٠ مم . ثوبها الى الاخضر الاسفع يعلوه مواج زمردية || يلقم الثمار الناضجة من اي نوع كانت ويركب ازهار اللسان والورد فيتلغها . يرقته تعيش على المواد العضوية .

٦٧٦٣ - جَعَلُ شَالِمٍ * ، هَنْشُونٌ ، أَقْبَحُ

Melolontha melolontha, M. vulgaris (S). Hanneton H. commun (F). May beetle, White grub cockchafer (E). Feldmaikäfer, Engerling (D).

خنفساء من الجعليات . طولها يراوح من ٢٥ الى ٣٠ مم . رأسها اسود ترجها الصدرية سمراء اللون ، نحاسية المواج . ظهراتها الى السمرة الخطية تنعوه خلة دقيقة . تركب وتلقم اوراق جميع الاشجار اخصها المشمرة . مكثها اغبر اللون مستدير الشكل ترزه الانثى ، في التربة ، على عمق ٥ سم . ينقف بعد مئحة بنحو ٥٠٠ ساعة عن يرقات مقوسة الجسم ، غليظة الطرف ، لونها الى ابيضاض الاغبر تعرف بالدودة البيضاء تعيش طوال حياتها البرقية وقد تدوم من ٣ الى ٤ سنوات على جذور معظم النباتات فتقرضها وتوقع بها اشد الاذى . اطلب دودة بيضاء .

٦٧٦٤ - جَعَلُ صَبْفِيٍّ * ، رِيْزُوتْرُوكْ

Rhizotrogus aestivus, R. solstitialis (S). Hanneton d'été, Petit hanneton de la St. Jean (F). Summer chafer (E). Junikäfer, Brachkäfer (D).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٦ مم . ثوبها حنطي اللون تعلوه ماجة بنية . زبانها عشارية الفواصل . اضرارها كحشرة كاملة لا قيمة لها . اما البرقة فهي كاللودة البيضاء لكنها اصغر حجماً واقصر عمراً تعيش في الحقول والمراعي والكروم تلثم ما استطاعت من جذور .

٦٧٦٥ - جَعَلُ مُقَدَّسٍ * ، أَبُو جَعْرَانِ ، أَمَّ جَعْرَانِ

Atenichus sacer (S). Scarabée sacrée (F). Sacred beetle (E). خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٠ مم . ثوبها اسود اللون لامع المواج . يكثر وجودها مع يرقاتها في المزابل . مأواها

والالوان الزاهية . تتميز بجشها الربعة ، المفلطحة ، المحدبة الظهر . قرونها الاستشعارية ورقية الشكل . تعيش على المواد النباتية والعضوية . يرقاتها مؤذية || اشهر انواعها ما يتبع .

٦٧٥١ - جَعَلُ أَخْبَلُ * Potosia morio (S).

Potosie folle (F). خنفساء من الجعليات متوسطة القد تطول نحو ١٦ مم . ثوبها اسمر اللون او بني يعلوه مواج اسود || يركب الاشواك والثمار الناضجة والاشجار الجديدة التشذيب لامتصاص نفسها || يرقته تعيش على المواد العضوية .

٦٧٥٢ - جَعَلُ الْبَسَاتِيْنِ * Phyllopertha horticola (S). Hanneton horticole, H. des jardins (F). Garden chafer (E). Gartenlaubkäfer (D).

خنفساء من الجعليات صغيرة . القد تطول نحو ١٠ مم . رأسها وترجتها الصدرية الى الخضار العابق . غمداها الى الصفار الحنطي تعلوه ماجة سمراء || يركب ازهار الاشجار المشمرة ولا يعف عن الاوراق الفتية النضرة . يرقته تركب جذور الزروع وبعض النباتات المروية .

٦٧٥٣ - جَعَلُ الدَّرَاقِيْنِ * ، جَعَلُ مَقْمَطٍ ، بَكْنُودِه

Pachnoda foscata (S). Pachnode bandée (F). خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٠ مم . ثوبها الى السواد اللامع تحمل على جانبي ترجة الحلقة الصدرية خط اصفر يمتد الى الغمدين فيقضيهما عند انصافيهما || يركب ثمار الدراق فيعطها ولا يعف عن ازهار الورد . يرقته تعيش في التربة على المواد العضوية .

٦٧٥٤ - جَعَلُ الشُّوكِ * Polyphylla fullo (S).

Hanneton foulon, H. du pin (F). Scarred melolontha (E). Müller, Walker (D).

خنفساء من الجعليات تطول نحو ٣٥ مم . ثوبها كستني اللون تعلوه ماجة سوداء . ظهراتها مرقوش بالايض . زبانها عظيمة الوريقات في الذكور || يركب الشوك واوراق الصنوبر فيؤذيها . يرقته تركب جذور الكرم والصنوبريات والنجيليات .

٦٧٥٥ - جَعَلُ الصَّنَوْبَرِ * Hanneton du pin (F).

خنفساء من غمديات الاجنحة تدعى جعل الشوك ، اطلبها .

٦٧٥٦ - جَعَلُ الْقَصَبِ * ، رُبِيَّة الْقَصَبِ

Peutodon dispar (S). خنفساء من الجعليات تطول نحو ٢٠ مم . ثوبها بني اللون تشوبه ماجة سوداء . تأثيرها قوية ، ارجلها مهازية الاطراف ، حافرة . تعيش مع يرقاتها في التربة . تركب سوق القصب مسح الارض فتتغذى من عصيرها وقد تسبب في بعض الظروف القضاء على الاقلاب .

٦٧٥٧ - جَعَلُ الْكُثْبَانِ * Hanneton foulon (F).


هو جعل الشوك ، اطلبه .

٦٧٥٨ - جَعَلُ الْكَرْمَةِ الْاَخْضَرِ * ، اَنُومَالِ الْكَرْمَةِ

Anomala vitis (S). Anomale de la vigne, Hanneton vert de la vigne (F). Anomala vitis (E). Anomala vitis (D). خنفساء من الجعليات تطول نحو ١٦ مم . ثوبها الى الخضار



(الانثى)



جعل الشوك (الذكر)



جعل خلي



جعل الكرم



جعل زمردى



جعل زاهر



جعل صيفي



جعل شائع

٦٧٧٣ - جَغْرَافِي
Géographique (F).
Geographical (E).
مختص بعلم الجغرافية .

٦٧٧٤ - جَغْلَاس
Gagate (F).
هو الجنفل ، سمكة نهريّة ، اطلبه .

٦٧٧٥ - جَغْوَار *
Felis onça (S). Jaguar (F).
نوع من الفهد وهو حيوان مفترس شرس الطباع ، شديد البطش ، كبير الجثة ، أنمر الثوب المرقط . اعطانه تشمل امريكة الجنوبية وبعض مقاطعات امريكة الشمالية . يألف الاحراج والغابات القريبة من مجاري الماء . يسرح في الليل ويتسلق الاشجار بحفّة .

٦٧٧٦ - جَغْوَرُنْدِي *
Fells jaguarundi (S).
Jaguarundi (F). Jaguarundi (E).
حيوان لاسم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه معظم مناطق امريكة الاستوائية . يألف الاحراج التي تجاور مجاري الماء . ملجئه الحياتي زوجي . الاثني لا تضع أكثر من جروين . يحلبها يدوم نحو ٧٠ يوماً || جسمه اهيف القوام رشيقه ، يطول نحو ١٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٦٢ سم . رأسه صغير الجرم . اذناه صغيرتان مستديرتان . عيناه كبيرتان مكحلّتان . ثوبه الى الشقعة السوية يسر في الرأس والظهر ويغير في الصدر والبطن . الاثني افصح ثوباً من الذكر || مسرعه دجوي . يتسلق الاشجار بحفّة ويمدو على الارض بسرعة . قوته الطير وكل ما يستطيع اليه من الحيوان .

٦٧٧٧ - جَفْ
Spatha (F). Spathe (E).
الجف غلاف طلع النخل ويدعى الجباب .

٦٧٧٨ - جَغْفَاخَة
Mourine glorieuse (F).
الجفاخة ، المورينة المبدولة ، سمكة بحرية من الاشلاق ، اطلبها .

٦٧٧٩ - جَغْفَار
Trypanosomiasis vivax (S).
Surra (F).
مرض يصيب بعض الحيوانات سببه وجود نقيعيات كرباجية في الدم .

٦٧٨٠ - جَغْفَاة
Sècheuse (F). Dryer (E).
كل آلة تستعمل في تجفيف المواد النباتية .

٦٧٨١ - جَغْفَال
هو رغوّة اللبن .

٦٧٨٢ - جَغْفَانَة *
Ampelographie (F).
Ampelography (E).
الجفانة علم يبحث في تحلية الكروم وفي ماهيتها النباتية الشاملة مع وصف الانواع والضروب .

٦٧٨٣ - جَفِثَتِ الزَّيْت
Grignon (F). Olive cake (E).
هو الثفل الناتج عن عصر الزيتون وذلك بعد رض الزيتون وعصره لاستخراج زيت .

٦٧٨٤ - جَفِثَتِ الشَّعِير
Tourallion (F).
Malt-Kilm (E).
هو ثفل الشعير الناتج عن صناعة الجعة (البيرا) بعد تجفيفه او تحميمه .

الذي تحفره في التربة يدعى كبرتل وهو مؤلف من نفقين وسردابين وحجرة فسيحة مستديرة . الاثني تمتح مكثها دانتل الكبرتل ترزه في كرة من الطين والمواد العضوية وتحافظ عليه لا تفارقه طوال مدة الارحام .

٦٧٦٦ - جَعَلٌ مُكْرَدَم
Scarabée à large dôme (F).
هو القبتور ، حشرة نائلة ، اطلبها .

٦٧٦٧ - جَعَلٌ يَابَانِي *
Popillia japonica (S). Hanneton japonais (F).
Japanese beetle (E). Japankäfer (D).
خنفساء من الجعليات صغيرة القد تطول نحو ٨ مم . وهي تشبه جعل البساتين الا ان مواجها اخف سمرة وأكثر خضرة وحرمة . الحشرة الكاملة تركب جميع انواع الاشجار المشجرة تقرض الازهار والثمار والارواق .

٦٧٦٨ - جَعَلِيَّات
Scarabaeidae (S).
Scarabéidés (F). Scarabaeidae, May beetles, June beetles, Grubs (E). Skarabäen, Blatthornkäfer, Fächerhornkäfer (D).
فصيلة خنافس من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها بضعة آلاف . معظمها متوسط القد ، مفلطح الشكل ، محدوب الظهر . رؤوسها قصيرة تحمل بعض التتوءات الشكلية المميزة . قرونها الاستشعارية ورقية التركيب شفعية التجميع مؤلفة من ٨ او ١٠ فواصل . اغمارها لا تلحف كامل البطن . الوانها زاهية . جرامها جاسة . ارساغها خماسية العقول وقد تخلو من الامامية في بعض الانواع . قوتها الازهار والثمار ويختلف الاجزاء النباتية الاخرى || يرقأها غليظة الجسم والطرف . مثنية الشكل . قصيرة القوائم . قوية الفكوك . يغلب فيها اللون الاغبر . قوتها المواد العضوية وجذور النباتات وسوقها قرب سطح التربة .

٦٧٦٩ - جَعْمُول
Autruchon (F). Young ostrich (E).
صغير النعام قبل بلوغه الحول .

٦٧٧٠ - جَعْمِيَّة *
Ringicula (S).
Ringicule (F). Ringicula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجمعديات . انواعها المماصرة المعروفة عديدة منتشرة في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة معظمها يعيش على رمال الشواطئ || اصداقها يرمية الشكل ضيقة قواعد النفوثة المرفضة . اعقابها لولبية ثلاثية الدورة الحلزونية . الوانها عديدة تختلف مع الانواع يكثر فيها اللون الكستني والجذوي .

٦٧٧١ - جَعْمِيَّات *
Ringiculidae (S).
Ringiculidés (F). Ringiculidae (E).

فصيلة من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المماصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها شبه يرمية الشكل ، مزومة النفوثة المحمدة المعتدلة الانفراج ، لولبية القسم العلوي الدقيق الاعقاب || اعرف اجناسها واشهرها الجمعدة والولانة .

٦٧٧٢ - جَعْمِيَّة *
Zoolite, Zoolithe (F).
Zoolite (E).
الجميقة ج جمائف البقايا المطبورة المتحجرة من كل حيوان . ومنهم من غربها بكلمة « زوليت » .



جعل مقدس



جعل ياباني



جميدة



جنوار



جغورندي

٦٧٨٥ - جَفَر

جفر الفحل : انقطع عن الضراب وقل ماؤه وذلك اذا اكثر الضراب حتى حسر وانقطع وعدل عنه . ويقال في الكيش ربض . (اللسان) || ويقال ايضاً جفر واجتفر .

٦٧٨٦ - جَفَر Herbe puante (F). Stinking herb (E). القبيح الرائحة من النبات .

٦٧٨٧ - جُفْرَة Cavitè des côtes (F). جوف الصدر القائم بين القص ومنحني الضلوع .

٦٧٨٨ - جُفْرَة هي خرق الدعيمة التي تحفر لها في الارض . ج جفر .

٦٧٨٩ - جَفَرُ سُونِيَا* ، جَفَرُ صُونِيَة Jeffersonia (S). Jeffersonie (F). Twin-leaf (E). Jeffersonie (D). Jeffersonia (I).

نبات عشبي نجمي تزيني معمر من فصيلة البرباريسيات . اوراقه فلقتان متقابلتان يجمعها زناد قرصي الانتشاب . والورقة ملطاة خضراء نافرة العروق والشرابين . ازهاره فردية يحملها شمراخ مستطيل وهي تساعية البتلات والاسدية وحيدة الميسم الغليظ القلم . انواعه المعروفة اثنان واحد امريكي المنبت والاخر منشوري .

٦٧٩٠ - جِفْرِ يَات ° Géphyriens (F).

فتة من الدوبيات البحرية تعيش في الاسمال . البعض يعتبرها من الديدان والبعض الآخر من اشباه الديدان . دوبياتها تبدو كأنها لاسكية في حين ان الاعضاء قابلة التسكيم . جهازها العصبي يتألف من طوق بلعومي ومن شلّة بطنية كما هي الحال عند الحلفيات . القناة الهضمية مستطيلة ومتعرجة . الشقان منفصلان .

٦٧٩١ - جِفْصِين Gypse (F). Gypsum (E). هو الجبصين ، اطلبه .

٦٧٩٢ - جَقْل Crotte d'éléphant (F). الجفل هو روث الفيل . Dung of elephant (E).

٦٧٩٣ - جَقْلَة الحفلة هي النسل . والجفلة من الشجر : الكثيرة الورق . والجفلة من الصوف : الحزة .

٦٧٩٤ - جَفَن Cépaga (F). Vine-plant (E). هي النبتة الواحدة من الكرم ويقال لها كرمه .

٦٧٩٥ - جَفْنَة ، حَبْلَة Cep (F). Vine-stock (E). هي اصل الكرم وساقها .

٦٧٩٦ - جَفْنَة عذراء Vigne-vierge (F). Wild-grape (E). جنس نباتات برية مدادة ، عارشة ، من فصيلة الكرنبات انواعه عديدة تجمعها عترتان : العنيب والهاذ اطلبهما .

٦٧٩٧ - جُفُور ° Anaphrodisis (F). Anaphrodisy (E).

الجفور انعدام الشهوة الجنسية عند الانسان والحيوان ان ذكراً او انثى .

٦٧٩٨ - جَفُوف Siccatif (F). Siccative (E). نمت يطلق على الادهان والزيوت الحادة السريعة الجفاف

٦٧٩٩ - جَفِيل

الجفيل ما يقطع من الزرع اذا طال تخفيفاً له . راجع تجفيل وجفيل الغم صوفها .

٦٨٠٠ - جَفِيل الحِيل

Lymphangite épizootique (F). Epizootic lymphangitis (E). هو ذنان الحيل .

٦٨٠١ - جَقْل Chacal aboyeur (F). Prairie wolf, Caygotte of Mexico (E). Prairiewolf (D). نوع من ابن آوى يعرف بابن آوى الجفل ، اطلبه .

٦٨٠٢ - جَقَمَار ° Galbula (S). Jacamar (F). Jacamar (E).

جنس طير من فصيلة الفلبوليات ورتبة الجواثم واهنات المناقير . انواعه المعروفة عديدة جميعها من طيور البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || اجسامها صغيرة رشيقة تطول من ٢٠ الى ٢٣ سم . تتميز باستطالة المناقير المردنية الشكل . اجنحتها قصيرة . اذناها مستطيلة . اناؤها جميلة الالوان السفماء الموج || تألف الاحراج الرطبة . قوتها الحشرات . اعرف انواع هذا الجنس واشهرها الجقمار الاخضر والجقمار الاحمر الذنب .

٦٨٠٣ - جَقَمَار أحمر الذنب °

Galbula ruficauda (S). Jacamar à queue rouge (F).

طائر من الجقمار . موطنه بعض مناطق امريكة الحارة والاستوائية . يألف الاحراج الكثيفة الرطبة وضفاف البحيرات ومجاري الماء || جسمه رشيق انقوام يطول نحو ٢٠ سم . ثوبه العلوي الى الخضار الاليس الزيتي الموج . ذنبه اهليلجي الشكل ، احمر اللون . زوره الى البياض التبي . صدره الى الشقحة يطولها تمشيج اخضر وصنابي . بطنه وزيكاه الى الشبهة . ساقه قصيرة سمراء اللون . حدة عينه حمراء قرمزية || قوته الحشرات اخصها الفراش يلتقطها طائفة وقلها يطاردها على الارض لانه اخرق لا يجيد الانتقال عليها || يدثن عشه في افحوص يخلده في الجرف || الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٦ يوماً . الذكر يؤمن لها الغذاء وتنظيف الافحوص ومدخله من الاوغام .

٦٨٠٤ - جَقَمَار أخضر ° Galbula viridis (S). Jamacar vert (F).

طائر من الجقمار . موطنه امريكة الاستوائية . يألف الرياض وضفاف مجاري الماء || جسمه رشيق القوام يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه العلوي الى الخضار الذهبي الموج . صدره وبطنه الى الشقحة . زوره الى البياض العاجي . مناقده مردني الشكل ، مستطيل الجرم . قائمتاه قصيرتان . حدة عينه ذهبية اللون || قوته الحشرات اخصها الفراش يلتقطها طائفة وجائمة || يدثن عشه في افحوص يخلده عند ضفاف الانهر وفي جرفها . الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين بينما الذكر يؤمن لها الغذاء وتنظيف الافحوص ومدخله من الوخم .

٦٨٠٥ - جَكَرْسِين ° Gecarcinus (S). Gécarcin (F). Gecarcinus (E).

جنس حيوانات برية - بحرية من القشريات عشاريات الارجل وفصيلة الجكرسينيات . انواعه المعروفة قليلة العدد



جفرسونيا




جقمار احمر الذنب




جكرسين



جَلَاخ رَتِيّ



جَلَاخ عَفْرِيّ



جَلَاخ مِيدُول



جَلَاهِب

جسمه كبير القد يطول نحو ١٤٠ سم. بما فيه الذنب ويعمل نحو ٦٥ سم. رأسه مستضخم الجرم. شططه زلقومي الشكل مقطوم. أذناه وعيناه صغيرتان. عفرته كثيفة، مستطيلة الشعر، تمتد إلى الرأس والعنق والصدر والظهر. الأنثى عادمة العفرة. قوائمه معتدلة الطول، غليظة وقوية. ذنبه بالغ الطول، اسطوانى الشكل، جشل الكشّة || ثوبه إلى السمرة القاتمة. منكباه وظهريه والمنطقة الخلفية وساعدها وكشّة ذنبه إلى السواد الاحمر. رأسه وعنقه وإبطاه إلى الشبه السمره || الأنثى تضع جرواً واحداً ترصده نحو ستة شهور.

Galeus (S).

Milandre (F). Tope (E).

جنس اسماك بحرية، ولودة، مفترسة، من فصيلة البنيقيات انواعه المعروفة خمسة. جميعها شرسة، بطاشة، مفامرة || اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها وشية الشكل، قليلة الضخامة تطول من ١٥٠ إلى ٣٥٠ سم. انثواها إلى الطحلة السمره تعبق في الظهر وتغير وتبيض في البطن || اشهر انواعه الجلاخ المبدول والجلاخ الكلبي.

Galeus canis (S).

Milandre d'Europe (F). European Tope (E).

نوع من الجلاخ الشرس البطاش. اعطانه بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي قرب البلاد الاوربية والافريقية || يعتبر من الاسماك اليمية ويقترب من المجاح حيث تكثر القشريات والرخويات || جسمه وشية الشكل يطول نحو ٢٠٠ سم. رأسه مقطوم الخطم كما في الكلب. فـه سفلي الارتكاز واسع الشدق. اسنانه محرمة، حادة الاطراف || لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه.

Eugaleus galeus (S).

Milandre commun (F). Common Tope (E).

نوع من الجلاخ. اعطانه جميع اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || يعتبر من الاسماك اليمية الشرسة البطاشة المفامرة. لا يعبر المياه الاقليمية الا عند تعقبه اسراب السردين والبوردي || جسمه وشية الشكل يطول نحو ٣٠٠ سم. رأسه ذلق الخطم. فـه سفلي الارتكاز، واسع الشدق. اسنانه محرمة حادة الاطراف كالخنجر || لحمه كاعن الصنف قل من يرغب فيه.

Exhibitionisme (F). جَلَاخَة، مُجَالَعَة (E).

Exhibitionism (E).

الجلاعة الميل المفرط لعرض الحاسر والشوار او لمشاهدة عرضها. جنون الهالج.

٦٨٢٧ - جَلَام هي التيوس المجلومة الشعر.

Tonte (F). Clipping (E).

٦٨٢٨ - جَلَامَة : ما جز من الصوف. وجلم الصوف : جزه.

Pterocera (S).

Pterocère (F). Scorpion shell (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الدلاعيات. انواعه المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اصداها متسامكة، شبه

٦٨١٩ - جَلَاخ رَتِيّ *، أَشْتَرُبْ أَخْمَر،

Scorpaena scrofa (S).

Scorpène truite, Rascasse rouge (F). Red scorpion-fish (E).

نوع من الجلاخ. سمكة بحرية بيوض. اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك المجاح. تعيش عند قواعد الثقاف بين المشريات وفي الاسمال. قوتها القشريات والرخويات... || جسمها اهليلجي الشكل، يطول من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ثوبها إلى الحمرة المغراء يعلوها توشيح اسمر واصفر يعبق في الجانبين وفي الظهر. زعانفها إلى الزرقة يعلوها تمشيع حنطي. رأسها غليظ الجرم، مستهجن الشكل، مراكب الطنوف العظمية والمزق الجلدية والشول. خطمها مقطوم الطرف. فكها الاسفل يتقدم الاعلى. اسنانه متراسة حادة وصغيرة. شدقها معتدل الانفراج. عينها كبيرتان، ماحتان، رفيعة الارتكاز. زعانفها متباينة الاشكال، الظهرية واحدة مستطيلة، الذيلية محدودة الطرف || لحمها كاعن الصنف، قل من يرغب فيه.

٦٨٢٠ - جَلَاخ عَفْرِيّ *، أَشْتَرُبْ أَسْمَر،

Scorpaena porcus (S).

Scorpène porc, Rascasse brune (F). Brown scorpion-fish (E).

نوع آخر من الجلاخ. اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك الشطوط والمجادح الصخرية. تتميز بمناسخها الظهرية الحادة الاطراف السامة || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. ثوبها إلى الكلسة يسر وينحرف نحو الكستني من الخط الجانبى إلى الظهر، ويغير ويبيض من الخط الجانبى إلى البطن. رأسها مستهجن الشكل، كثير التتواتر البسيطة والمركبة، مراكب الطنوف والتجاويف العظمية. فكها غليظان، متباين الاسنان الصغيرة. شدقها معتدل الانفراج. عينها كبيرتان، رفيعة الارتكاز، قليلتا البروز. زعنفتها الظهرية واحدة، قاطبة. زعنفتها الذيلية مضلعة الصفحة، مستديرة الطرف السرح || لحمها كاعن الصنف، قل من يرغب فيه.

Scorpaenidae (S).

Scorpaenidés (F). Scorpaenidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم بحار العالم || جميع انواعها معتدلة القد او صغيرة. تتميز باشكالها المستهجنة وبرؤوسها الغليظة، المزبرة، الشائكة. وبحاسرها المدرعة المتراكبة الاطناف. زعانفها حادة المناخس السامة || اشهر اجناسها واعرفها الجلاخ والجلاخ والسبوجة.

٦٨٢٢ - جَلَاخ ٥، عَوَقَر ٥

Theropithecus gelada (S).

Théropithèque gélada (F). Gelada (E).

قرد وحيد الجنس والنوع من فصيلة الهجسيات. موطنه بعض جبال الحبشة من ارتفاع ٢٥٠٠ إلى ٤٠٠٠ متر عن سطح البحر. ملجئه الحياتي جماعي. جماعته كثيرة العدد الذي يراوح من ١٠٠ إلى ٥٠٠ || قوته الحبوب والثمار على اختلافها ويصل الزنايق والسحليات وبعض الاحشاب والحشرات والديدان والحلزون والبزاق والغذاء... ||

ende platterbse, Woh, Wicke (D). Cicerchia odorosa, Pisello odoroso, P. flore (I).

نبات عشبي حولي عارش عديد الضروب والاصرام . يعلو من متر الى مترين . ساقه مضلعة مجنحة . اوراقه ثنائية قليلة الزغب . وريقاته بيضية مستطيلة . ازهاره فواحة العرف العطري المستحب . وهي كبيرة القد ، طويلة الزناد . ثماره سنفية ليفية خشنة . حبه كروي الشكل ، ملس القشرة || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٦٨٤٠ - جلبان كبير الزهر

Lathyrus grandiflorus (S). Gesse à grandes fleurs (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو نحو ١٥٠ سم . ساقه مضلعة مجنحة . وريقاته بيضية الشكل نافرة العروق . ازهاره متوسطة القد وردية اللون ، طويلة المعاليق || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٦٨٤١ - جلبان مجلان

Lathyrus magellanicus (S). Gesse de Magellan (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو من ٢٠٠ الى ٣٥٠ سم . ساقه مضلعة . وريقاته مستعرضة النصل الامرد . ازهاره عنقودية بنفسجية عادمة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٦٨٤٢ - جلبان مزروع* ، خلر

Lathyrus sativus (S). Gesse cultivée, Lentille d'Espagne, Pois de brebis, Jarosse, Jarousse (F). Bitter vetch, chickling vetch (E). Saatplatterbse (D). Cicerchia coltivata, Pisello cicerchia (I). نبات عشبي زراعي حولي تغتلفه الماشية فينشعلها ويسنها . حبه غني بالمواد الغذائية اخصها الازوت والعنصر النشوي .

٦٨٤٣ - جلبان مستدير الورق

Lathyrus rotundifolius (S). Gesse à feuilles rondes (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه مضلعة مجنحة . وريقاته شبه مستديرة ، بارزة العروق . ازهاره وردية اللون طويلة المعاليق || ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٦٨٤٤ - جلبان مفصلي* ، دُحْرَج

Lathyrus articulatus (S). Gesse articulée (F). Jointed pea (E). Platterbse (D). Cicerchia articolata (I). نبات عشبي بري حولي يكثر بين الزروع وفي الارض البور ساقه مفصلية كثيرة العقد . وريقاته ضيقة مستطيلة . ازهاره صغيرة حمراء اللون . بذوره مستديرة شديدة الصلابة .

٦٨٤٥ - جلبالين ، لاثيرين

Lathyrine (F). مادة شبه ثلوية موجودة في حبوب الجلبان .

٦٨٤٦ - جلبنر

Rhinothèque (F). الجلبنر بشرة المختاد عند الطائر .

٦٨٤٧ - جلبتهنك

Réséda blanc (F). هو الخزام الابيض ، اطلبه .

٦٨٤٨ - جلببوط

Oiselet, Oisillon (F). Small bird, fledgling (E).

الجلببوط فرخ العصفور من حين نقفه الى حين طيرانه واستقلاله . ج جلببوط .

اهليلجية الشكل ، متباينة الحجم ، منها الصغيرة والكبيرة التي تطول نحو ٣٢ سم . || تتميز بزوائدها الحثارية الصدفية المادة ، المحدبة ، المقرنة الشكل المحدد ، منها خمس جانبية انسية . وواحدة رأسية تقابلها العقبية .

٦٨٣٠ - جلب

Duramen (F). Heart-wood (E). خشب قلب ساق الشجرة وهو اصلب جزء من الخشب .

٦٨٣١ - جلب

Nuage sans pluie (F). Cloud without rain (E). هو السحاب لا ماء فيه .

٦٨٣٢ - جلب

Ipomée (F). Ipomœa (E). هو الجلاب ، اطلبه .

٦٨٣٣ - جلبان

Lathyrus (S). Gesse (F). Vetch (E). جنس نباتات عشبية برية وزراعية من سبط الكرسيات وفصيلة القطانيات الفراشية . انواعه عديدة تقارب المئة معظمها بري ومنها زراعي علني وبعضها تزييني . أشهرها ما يتبع .

٦٨٣٤ - جلبان أزرق

Lathyrus cyanens (S). Gesse bleue (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو نحو ٣٠ سم . اوراقه مركبة شفمية . وريقاته من ٤ الى ٨ ضيقة مستطيلة مدببة . ازهاره ثنائية او ثلاثية التجميع متوسطة القد زرقاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

٦٨٣٥ - جلبان أزغب

Lathyrus pubescens (S). Gesse pubescente (F). نبات عشبي عارش معمر يعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سوقه واوراقه زهاء . ازهاره عنقودية كبيرة القد لونها الى الازرق البنفسجي يعلو توشيح ابيض || ازهاره صيفي .

٦٨٣٦ - جلبان أفاق* ، شوارب القط

Lathyrus aphaca (S). Gesse sans feuillés, Poigreau, Pois de serpent (F). Yellow vetchling (E). Ranken-platterbse (D). Cicerchia senza foglie, Pitine, Vecchia bastarda (I).

نبات عشبي بري حولي . ساقه مستقيمة ملساء غبراء اللون . وريقاته صغيرة شبه خيطية اذيناتها طرية الشكل . ازهاره فردية طويلة الزناد . يكثر في الاراضي الجبلية .

٦٨٣٧ - جلبان طنجة

Lathyrus tingitanus (S). Gesse de Tanger (F).

نبات عشبي حولي عارش . يعلو نحو المتر . وريقاته سنائية النصل الامرد . ازهاره عديمة العرف لونها الى الحمرة المابقة || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٦٨٣٨ - جلبان عريض الورق*

Lathyrus latifolius (S). Gesse à larges feuilles, G. à bouquets (F). Everlasting pea (E). Grosse platterbse, Wicke (D). Pisello a mazzetti (I).

نبات عشبي عارش معمر عديد الضروب يعلو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقه مضلعة رباعية الاجنحة . وريقاته مستعرضة لسنة النصل البارز العروق . ازهاره كبيرة مستطيلة المعاليق . ألوانها مختلفة يكثر فيها الاحمر . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٦٨٣٩ - جلبان عطر* ، خلر المسك ، خلر عطر

Lathyrus odoratus (S). Pois de senteur, Gesse odorante, Pois musqué (F). Sweet-pea (E). Wohlriech-



جلبان أفاق




جلبان عريض الورق



جلبان عطر



جلبان مزروع



جلبان مفصلي

انقرضت ولا نأقي على ذكرها . والثانية ، حالية ، تعرف
بجلدية الاجنحة . اشهر انواعها واعرفها البهيك .

٦٨٦٣ - **جلدية الاجنحة** (S).
Dermaptera (F). Dermaptera, Earwigs (E).
Ohrwürmer (U).

رتبة حشرات من جلديات الجناح بعضها عديم الاجنحة
وبعضها الآخر يحمل اجنحة جلدية قصيرة . ارساغها
ثلاثية العقل . مركها على شكل الجلم اللاقط تستعمله
الحشرة في الدفاع والهجوم || فصائلها واجناسها وانواعها
نحو ٥٠٠٠ . جميعها من الحشرات الدالسة تعيش تحت
الاشخاب والاحجار . قوتها المواد النباتية والحيوانية .
اناثها تضع المكن وتحضنه حتى النقف .

٦٨٦٤ - **جلدية التنفس** (F).
Dermatobranchie (F). Dermobranchiate (E).

نعت تعريفني يطلق على الرخويات وغيرها من الدويبات
البحرية التي تقوم جلودها مقام الخياشيم في التنفس .

٦٨٦٥ - **جلد** (F). Mole (E).
هو الخلد ، اطلبه . ج مناجذ .

٦٨٦٦ - **جلدية** (F).
شجرة صغيرة . ج جلادي . قال ابو حنيفة الجلادي
صغار الطلح .

٦٨٦٧ - **جلينين** ، **جيلينين** (S).
Gélasine (F). Gélasine (E).

نبات عشبي درفسي سبروتي وحيد الجنس وأنوع من فصيلة
السوسنيات . منبته بعض مناطق الاروغواي . ساقه شراخية
تنتهي بشراخف تطوقه الازهار . اثمارها جرسية الشكل ،
قصيرة الانبوب ، زرقاء اللون مرقوشة بالابيض والاسود .
اوراقه مغفنة صغيرة الجرم ، باهتة الخضار البحري
المواج || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق ||
تنويرها يستمر طوال شهر ايار .

٦٨٦٨ - **جلسان** * ، **ازالية** (F).
Rhodora, Rhododendron azalea (S). Azalée (F).
Azalea (E). Azalie (D). Azalea (I).

جنس نباتات شجرية وجنبية من فصيلة الخلنجيات .
انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني . اوراقه خلية ، عابلة
بمعظمها . ازهاره لاقاسية ، تويجها خاسية التفصيص ،
بتلاتها جميلة الشكل مختلفة الالوان الزاهية . اسديتها من
٥ الى ١٠ ، مآبرها بارزة || يزرع للتزيين في الحدائق
والمراكن وداخل البيوت . يتكاثر بالعقل ، يرغب في
الاثربة الخوارة المعتدلة التركيب . يحثي الرطوبة
المستحكمة وكثرة المواد الازوتية || اشهر انواعه
الترينينية ما يتبع .

٦٨٦٩ - **جلسان ابيض** (F).
Rhododendron albiflorum (S). Azalée blanche (F).

نوع من الجلسان مهدء امريكة الشمالية . لا يخشى البرد ،
يملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه مستطيلة قليلة الزغب .
ازهاره نورية ورتية التجميع لونها الى البياض الثلجي ،
قطرها نحو ٤ سم . || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٦٨٧٠ - **جلسان القرم** (F).
Rhododendron luteum (S). Azalée pontique (F).

نوع من الجلسان مهدء القرم والفوقاز . ضرابه عديدة

٦٨٤٩ - **جلجان** (F).
Sésame, Jugeoline (F).
Sesame, Gingelly (E).
راجع سمسم .

٦٨٥٠ - **جلجل** (F).
Chanvre du Deccan (F).
Deccan hemp (E).
راجع تيل .

٦٨٥١ - **جلجليات** (F).
Campanulaires (F).
رتبة من الهدريات وهي من الحيوانات الدنيا المائية .

٦٨٥٢ - **جلج** (F).
Abroutissement (F).
Damage done (E).
الجلج هو رعي الماشية للاطراف الخضر من الشجر .
يقال جلجت الماعز الشجر واشجار مجلوجة . ويقال
ايضا جلج الماعز الشجر : رعي اعاليه وقشره (الاساس) .

٦٨٥٣ - **جلحاب** (F).
Pollinisateur (F).
الجلحاب : فعال النخل (اللسان) .

٦٨٥٤ - **جلد** (F). Skin (E).
هو غشاء جسد الحيوان .

٦٨٥٥ - **جلد** (F). Frost (E).
هو جمود الماء اي تماسك اجزائه من هبوط الحرارة الى
ما دون الصفر .

٦٨٥٦ - **جلد اسود** (F).
Gelée noire, G. de groseille (F). Red-currant
jelly (E).

جلد يحصل في فصل اشتهاء يحس البراعم والانان فتسود .

٦٨٥٧ - **جلد الربيع** ، **كلاح** ، **صبارة** ، **صبر** ،
جند الندي (F).
Gelée blanche, G. printanière (F). White frost,
Hoar-frost (E).

جلد يحصل في الربيع يحمد الندي على الورق فيبدو كالج
ابيض ناعم نثرته الطبيعة فوق الارض وما عليها .

٦٨٥٨ - **جلدوم** * (S).
Gélide, Gélidie (F). Gelidium (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الحمر . انواعه المعروفة
كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة || كلاليتها صغيرة . سوقها فرقة . اوراقها ريشية ،
متشعبة ، هلامية التركيب . خلاياها ثلاثية الطبقات ،
ضمية التلك . لوانها تراوح من الاحمر الباهت الى الارجواني
العابق || جميعها مأكولة وتعد من التوابل الفاخرة .

٦٨٥٩ - **جلدي** ، **فضائي** (F).
Spatial
نعت تعريفني يطلق على ما يختص بالجلد او بالفضاء .

٦٨٦٠ - **جلدي** (F).
Coriace (F).
Tough, Leathery (E).
نعت تعريي توصف به الاشياء الصلبة كالجلد .

٦٨٦١ - **جلدي التنسم** (F).
Dermatopnonte (F).
Dermatopnonte (E).

نعت تعريفني يطلق على كل حيوان يتنسم اي يتنفس من
جلده .

٦٨٦٢ - **جلديات الجناح** (F).
Dermatéroïdes
طبقة حشرات من شعبة البرقائيات تشمل رتبتي الاولى



جلدوم



جلسان

تعلو من متر الى مترين . اوراقها معينة الشكل ، نصلها خفي الصفحة السفلى الصفراء البشرة . ازهارها عشارية الاسدية وثرية او شفعية التجميع لونها الى الوردي ، قطرها نحو ٤ سم . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٧٧ - جُلْسَانُ مُكَبَّس

Rhododendron rosmarinifolium (S). Azalée à feuilles de romarin (F).

نوع من الجلسان مهدد الصين . ضرابه عديدة جميعها بجلات تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها عروية مستطيلة ، نصلها جامد التركيب ، قليل الزغب ، يطول نحو ٦ سم . ويعرض ٤ . ازهارها مكبسة فواحة العرف المستحب . لونها متعددة يكثر فيها الاحمر والابيض والوردي || ازهارها يستمر نحو ستة اسابيع ابتداء من اواسط نيسان .

٦٨٧٨ - جُلْسَانُ هِنْدِي

Rhododendron indicum (S). Azalée de l'Inde (F).

نوع من الجلسان مهدد الهند ضرابه كثيرة العدد جميعها بجلات صغيرة القد تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . سوقها وفروعها مهدبة . اوراقها عروية ، اهليلجية ، نصلها لامع البشرة يطول نحو ٥ سم . ازهارها فردية كبيرة القد قطرها نحو ٨ سم . بتلاتها مختلفة الالوان ، مآبرها حر . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٦٨٧٩ - جُلْسَانُ يَابَانِي

Rhododendron japonicum (S). Azalée du Japon (F).

نوع من الجلسان الياباني المنبت يعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقه سنانية الشكل طولها نحو ٨ سم . عرضها ٣ ، نصلها امرط الصفحة العليا ازغب السفلى . ازهاره نورية التجميع متوسطة القد ، قطرها نحو ٥ سم . || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٨٠ - جُلْسَانُة ٥ *Concrescence* (F).

Concrescence (E).

الجلسدة ، في علم النبات ، اثتلاف او التحام اجزاء متلاصقة . وهي من الاسباب الرئيسية في التنوع الشكلي المفرط الملحوظ في الهيكلية النباتية .

٦٨٨١ - جُلْسَانِيَّة ٥ *Hermannia denudata* (S).

Hermannie dénudée (F).

نبات جنبي معمر من فصيلة الخيازيات . موطنها بعض مناطق افريقية الشمالية والجنوبية . تزور للتزين || ساقها منتصبه قليلة الفروع تعلو نحو ١٧٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضية النصل البحري الخضار . ازهارها توأمية ، محورية وطرفية الارتكاز ، متدلية ، شبه جرسية الشكل ، مستطيلة المالحق ، لونها الى الصفار الكبريتي ، عرفها عذب الازيح . ثمارها حقية صغيرة الحجم || تنويرها يستمر من نيسان الى تشرين .

٦٨٨٢ - جُلْسِيم ٥ *Gelasimus* (S).

Gélasime (F). *Gelasimus* (E).

جنس حيوانات قازبة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل وفصيلة الدوبريات . انواعه المعروفة خمسة اعطائها بعض المناطق الاستوائية والحارة . تعيش في مناطق الشواطئ البحرية وفي اوسال الشوار . اوجارها انفاق مستطيلة افقية الامتداد تحتفروها في التربة وتنتهي برءاء فسيحة || اجسامها صغيرة تزاوية الشكل . تتميز بالفارق

جميعها جنبات متوسطة وصغيرة القد تعلو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم . اوراقها اهليلجية طولها من ٩ الى ١٤ سم . عرضها من ٣ الى ٤ سم . نصلها امرط الصفحة العليا خفي السفلى . ازهارها فواحة العرف المستحب ، كبيرة القد قطرها نحو ٧ سم || ازهارها يدوم شهراً واحداً من اواخر نيسان الى اواخر ايار .

٦٨٧١ - جُلْسَانُ خُمَاسِيّ الْوَرَق

Rhododendron quinquefolium (S). Azalée à 5 feuilles (F).

نوع من الجلسان مهدد اليابان . بجلاته صغيرة القد تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها طرفية الارتكاز ضمية خماسية . نصلها ضيق الصفحة ، مهدب البشرة . ازهارها فردية كبيرة ، قطرها نحو ٧ سم . ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

٦٨٧٢ - جُلْسَانُ شَجَرِي

Rhododendron arborescens (S). Azalée arborescente (F).

نوع من الجلسان مهدد امريكا الشمالية يعلو من ثلاثة الى ستة امتار . اوراقه مستطيلة ، نصلها مهدب البشرة اللامعة ، يطول نحو ٧ سم . ويعرض ٣ ، ازهاره فواحة العرف المستحب ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الابيض يعلوه موج وردي || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

٦٨٧٣ - جُلْسَانُ صِيْنِي

Rhododendron sinense (S). Azalée de Chine (F).

نوع من الجلسان . ضرابه وهجنه عديدة جميعها جنبات متوسطة القد تعلو من متر الى مترين . اوراقها سنانية مستطيلة ، طولها نحو ١٠ سم . وعرضها ٣ نصلها خفي البشرة المهدبة . ازهارها نورية التجميع ، كبيرة الفصلات . انبوبية التويجات ، خلية البتلات ، خماسية الاسدية . ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٦٨٧٤ - جُلْسَانُ كَنَدِي

Rhododendron canadense (S). Azalée du Canada (F).

نوع من الجلسان مهدد كندا . ضرابه عديدة جميعها بجلات صغيرة القد تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها اهليلجية ، نصلها بحري اللون ، ازغب الصفحة السفلى . ازهارها نورية التجميع تويحية الارتكاز قطرها يراوح من ٣ الى ٤ سم . لونها مختلفة منها الابيض والوردي والاحمر || ازهارها يدوم من اذار الى ايار .

٦٨٧٥ - جُلْسَانُ كُورِيَّة

Rhododendron Coreanum (S). Azalée de Corée (F).

نوع من الجلسان مهدد بلاد كورية . ضرابه خسة جميعها بجلات تعلو من ٢٠ الى ٩٠ سم . اوراقها سنانية . نصلها جامد التركيب ، خفي البشرة ، يطول من ٥ الى ٧ سم . ازهارها نورية وثرية التجميع ، مكبسة ، ليلكية اللون ، ارجوانية الرقشة ، عشارية الاسدية ، صغيرة القد قطرها نحو ٣ سم . || ازهارها يستمر شهراً واحداً من نيسان الى ايار .


٦٨٧٦ - جُلْسَانُ مَعِين

Rhododendron rhombicum (S). Azalée à feuilles en losange (F).

نوع من الجلسان مهدد اليابان وهو جنبه متوسطة القد



جُلْسَانِيَّة



جُلْسِيم

الشاسع بين ملقطينها ، الواحد بحجم القائمة أي الرجل والثاني أربعة أصابع الأول أن لم يكن أكثر . اثوابها الى الحمرة البنفسجية يملوها موج وردي .

٦٨٨٣ - جَلَفِيَّات

Embloptères (F).

Embloptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح . اجناسها نحو ٧٠ جميعها صغيرة القد غليظة الرأس مستطيلة الجسم . ذكورها مجنحة ، اناثها معاري . قرونها الاستشعارية خيطية . عيونها قاشرة بسيطة . تحمل في طرف كل عقلة من ارساخ ارجلها الامامية غدة صغيرة تفرز خيوطاً حريرية .

٦٨٨٤ - جُلْكَآ* ، جَلْكَى

Petromyzon (S).

Lamprole (F), Lamprey (E).

جنس اسماك غضروفية ماصة من الاشلاق وفصيلة الجلوكيات . انواعها ثلاثة تعيش في البحار وتسره في المياه العذبة حيث تقيم من ٣ الى ٥ شهور . اجسامها مستطيلة كاجسام الحنكليس وهي عريانة دقة خالية من الحراشف . قوتها ما تمتصه من دماء الحيوانات والجيف البحرية .

٦٨٨٥ - جَلْكَِيَّات

Péromyzonidés (F).

Petromyzonidae (E).

Catastrophisme (F).

Catastrophism (E).

نظرية حصلية تقول بان التغييرات التي طرأت على سطح الكرة الارضية كان سببها انفجارات مفاجئة وانقلابات عظيمة الوقع بدلت المعالم الاصلية . وهذه النظرية تعاكس التناقية والركانة والارتقاء .

Nouvelle lune (F).

New moon (E).

٦٨٨٧ - جَلَم

الجلم الهلال ليلة يهل .

٦٨٨٨ - جَلَم ، جَلَمَان ، مَقْرَاض ، مَجَزْ

Forces (F), Shears (E).

مقص كبير يستعمل لجز الصوف .

Pincement (F), Nipping off (E).

الجلم والقرط والقرص تعني قطع رؤوس الاغصان او الاذنات الطرية .

Emerillon (F), Merlin (E).

٦٨٩٠ - جَلَم طائر من الكونج يعرف باليؤيؤ ، اطلبه .

Puffinus (S).

Puffin (F), Shearwater (E).

٦٨٩١ - جَلَم الماء* جنس طيور بحرية من كفيات القدم تطير على الماء فتبدو كأنها تقصها في طيرانها . وهي كبيرة الجثة بسطحها نحو المتر . مناقيرها حجن الاطراف . سواقطها وظهورها سود . اعناقها وصدورها وبطونها بيض . موطنها البحار الباردة . يكثر وجودها على شواطئ اوروبا الشمالية .

Lithophile (F).

Lithophile (E).

٦٨٩٢ - جَلَمُودِي* نمت تعريفي يطلق على كل نبات يستطيع الانتاش فالنمو على الصخور .

Puffinidés (F).

Puffinidae (E).

٦٨٩٣ - جَلَمِيَّات الماء عمارة وحيدة الجنس ، خماسية الانواع ، من فصيلة الرغائيات كفيات القدم . اشهر انواعها :

Puffin des anglais

جلم الماء الانكليزي

Puffin cendré

جلم الماء الرمادي

Puffin majeur

جلم الماء الكبير

Fleurs de grenadier (F).

Blossoms of pomegranate tree (E).

٦٨٩٤ - جُلَنَار زهر الريان . واحدته جلنارة .

Miel rosat (F).

٦٨٩٥ - جَلَنَجَتَيْن عصير يستحب من بتلات الورد الجافة الحمراء اللون بعد نقعها بالماء الساخن .

Eglantier (F), Dog-rose (E).

٦٨٩٦ - جُلَنَسْرِين اطلب نسرين .

Ripicole (F).

٦٨٩٧ - جَلَنَهَبِي* نمت تعريفي يطلق على كل حيوان يعيش على ضفاف الانهر والبحيرات .

Glabeille (F), Glabella (E).

٦٨٩٨ - جَلَهْة الجلهة التواء الافقي الحاصل في عظم الجبين بين حجاجي حواجب العين .

Bourdaie (F), Black alder (E).

٦٨٩٩ - جَلْهُم اطلب نبق اسود .

Xérus (F), Xerus (E).

٦٩٠٠ - جُلْهُم جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجابيات . انواعه نحو ٢٠ جميعها افريقية سريعة الحركة والانتقال . رؤوسها مستديرة ، جباهها ضيقة ، اذانها صغيرة ، اذنانها طويلة اسطوانية ، قوائمها قصيرة ، اطرافها قليلة الانمكاف ، صوفها خشن شائك || تتسلق الاشجار برشاقة . قوتها النبات والحشرات وصغار الطير والعطاء . جحورها انفاق وسرايب مستطيلة تحفرها في الارض . اناثها تضع من ٢ الى ٤ ادراص تبصر بعد وضعها بأسبوع . اشهر انواعه ما يلي :

Xerus flavus (S).

Xérus blond (F).

٦٩٠١ - جُلْهُم أَصْهَب نوع من الجلم صغير القد طوله نحو ٢٠ سم . وذنبه ١٨ ثوبه الى الصبهة الشقراء || موطنه الصومال ، يعيش قرب الدساكر والحقول المزروعة .

Xerus getulus (S).

Xérus barbaresque (F).

٦٩٠٢ - جُلْهُم الأَطْلَس نوع من الجلم صغير القد طوله نحو ١٨ سم . وذنبه ١٤ ثوبه الى الصبهة الطحلاء يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . راسه وظهوره موشحان بخطين اضرين يفصلهما خط عريض اسمر || موطنه جبال الاطلس يألف الاحراج والادغال والمواقع الصخرية .



جلكا



جلم الماء

٦٩١١ - جُلَيَّات *
Rosées (F).
سبط من فصيلة الورديات .

٦٩١٢ - جَلِيد
Gel (F). Frost (E).
هو الماء الذي جمد من كثرة الصقيع الناتج عن هبوط درجة الحرارة .

٦٩١٣ - جَلِيف
الجليف : نبت سهلي سنهه كالبلوط يملوء حباً مسنة للآل (اللسان) .

٦٩١٤ - جَلِيل
Courvite (F).
الجليل طائر من الزقزاقيات يدعى ايضاً زغزغ ، اطلبه .

٦٩١٥ - جَلِيل أَغْبَس
Courvite Isabelle (F).
هو الزغزغ الاغبس ، اطلبه .

٦٩١٦ - جَلِيَهَة
Paratome (F).
الجلية القسم الجانبي من الافك الاعلى في متقاد الطائر .
وما جليعتان يمينى ويسرى .

٦٩١٧ - جَلِيو كَلادِيوم
Gliocladium (S).
جنس فطور مجهرية من عمارة الهبويات وفصيلة الوقسيات يتميز بشكله المكنسي الاطراف . انواعه عديدة منها واحد لا غير له علاقة بالزراعة يدعى جليوكلاديوم ارمد (G. cinereum) يركب ثمار الاجاص ويفتحم ثمار التفاح على اثر الكربوكبس . مظهره الخارجي نواس دقيق ارمد اللون يغشي البشرة والنسج فيتلفها .

٦٩١٨ - جُم
Anomie (F). Anomia (E).
جنس حيوانات بحرية من ذوات الصدفتين .

٦٩١٩ - جُجَار ، جُجَارَة ، جَامُورَة
Palmite (F). Palm-marrow (E).
هو قلب النخلة اي برعمها الانتهائي يتكون من مادة بيضاء لينة لذينة الطعم مأكولة طعمها كالحليب المتجمد . والكافور يخرج من الجمارة بين مشق السعفتين || وجر النخلة : قطع جمارها او جامورها .

٦٩٢٠ - جُجَانَة
Perle (F). Pearl (E).
هي اللؤلؤة ج جان . قال لبيد :
وتضيء في وجد الفلام منيرة
كجنانة البحري سل نظامها .

٦٩٢١ - جَمَاهِيرِيَة
Autarchie (F).
نظام شبه اشتراكي يتركز على سلطة الجماهير الشعبية التي يمثلها زمرة من الباهلة او عهبل فرد .

٦٩٢٢ - جُمَة
Opis (S).
Opis (F). Opis (E).
ويقال جُم . جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة القنقنيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد ، اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى الخليج فبحار الهند || اصداها شبه قلبية الشوزن ، متباينة الحجم ، يكثر فيها الاعتدال . وهي ثنائية المصارع المتساوية ، شفرية السطوح الخارجية ، فريجية الداخلية ||

٦٩٠٣ - جُلُهم الحَبَشَة *
Xerus rutilus (S). Xérus rutilant, Schiler (F).
نوع من الجلم طولهُ نحو ٢٧ سم . وذنبه ٢٣ ثوبه الى الصهبة الصفراء يعقب مع اقترابه من الظهر ، مواجه ابيض لامع . بطنه ينحرف الى البياض . ذنبه صنابي اللون ابيض الجاتين || موطنه الحبشة ومعظم مناطق افريقية الشرقية . قوته انبثات والحشرات والعطاء وصغار الطير .

٦٩٠٤ - جُلُهم مَخَطَط *
Xerus erythropus (S). Xérus à pieds rouges, Sabéra (F).
نوع من الجلم طولهُ نحو ٥٠ سم . وذنبه ٤٠ ثوبه الى الصهبة الغبراء يعلوه خطان مستطيلان من نقرة الرأس الى طرف الذنب . اذناه صديرتان . قوائمه الى الجؤوة . موطنه نسيح الارحاء يمتد من افريقية الشرقية والحبشة وزنبار الى السنغال .

٦٩٠٥ - جَلَوَة النَحْل
Enfumage (F). Smoked (E).
هو طرد النحل او تخدير اعصابه بالدخان .

٦٩٠٦ - جَلُود *
Julodis (S).

Julodis (F). Julodis (E).
جنس خنافس من غمديات الاجنحة وفصيلة الزقنبوطيات انواعه المعروفة نحو ١٠٠ اعطانها معظم المناطق الحارة من العالم القديم وانحصها الصحراوية || اجسامها شبه مجنية الشوزن طول من ٢٠ الى ٢٧ مم . رؤوسها قصيرة . قرونها الاستشعارية منشارية التركيب تتألف من ١١ فصلة . ارساها خماسية العقول . اغمادها لاحفة ومحددة . اثوابها تراوح من الخططي الاسمر الاسفع الى الاخضر المذهب يملوها في تخاديد الاغماد خضاب احمر او اصفر او اطحل او تبني || جميعها تسرح في النهار . قوتها المواد النباتية . يرقاتها غاضلة تعيش على جذور النبات وسوقه واوراقه .

٦٩٠٧ - جَلُوز
Noisetier, Avelinier (F).
Hazel-nut tree (E).
هو البندق ، اطلبه .

٦٩٠٨ - جَلُوزَة
Aveline (F). Hazel-nut (E).
ثمرة الجلوز الكبيرة .

٦٩٠٩ - جِلُوزِيَة
Corylopse (F). Corylus (E).
نمت تعريبي يطلق على الثمار الشبيهة بالجلوز .

٦٩١٠ - جُلَيَّات *
Goliathus (S).
Goliath (F). Goliathus (E).


جنس حشرات قانصة وأثمة من غمديات الاجنحة صفيحيات القرون وفصيلة الجمليات . انواعها المعروفة نحو ١٢ اعطانها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . تسرح في الليل . طيراتها بطيئة الحركة متوسط الشوط || تعتبر من جبابرة الجمليات . اجسامها كبيرة القد طول من ١٠ الى ١٢ سم . رؤوسها شبه مربعة فاشرة المقدم الاقرون . قرونها الاستشعارية صغيرة دقيقة صفيحية التركيب . كواسلها مكورة ، مستطيلة التخديد اغمادها لاحفة مجنية الشكل . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاسود والجؤوي والاسمر الموشح بالاخضر والاسمر الصنابي الموج والاسود الارجواني الموج .




جلهم الحبشة



جلود



جليات



جُمّة

٦٩٣٥ - جَمَسْت ، جَمَشْت (F). Améthyste (F).
Amethyst (E).
حجر كريم وهو ضرب من المرو بنفسجي اللون كانوا يدعون انه يدفع النشوة .



جمزة

٦٩٣٦ - جَمَض * Swertia (S).

Swertia (F). Swertia (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الكوشاديات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اقطار العالم القديم .
ترغب في المواقع الرطبة || سوتها لانياسية الشكل والارتفاع تملو من ١٥ الى ٨٠ سم . اورانها السفلى متعاقبة اما الجذعية فتقابلة . نصالها معنقة ، سنانية الشكل ، متسامكة .
ازهارها عنقودي التجميع ، هامي الارتكاز . ازهارها متباينة الالوان يكثر فيها الالبيض ثم الاصفر فالوردي فالاحمر فالليلكي || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .



جَمَض

٦٩٣٧ - جَمْعَر Marne argileuse (F).

Clayish marl (E).

تراب اصفر اللون كثرت فيه نسبة العناصر الصلصالية .

٦٩٣٨ - جَمْعَرَة Marnage (F). Marling (E).

توزيع الجمر على التربة وقد يكون ذلك في الحريف .

٦٩٣٩ - جُمُود ° Phymatodes (S).

Phymatode (F). Phymatodes (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها مناطق الكرم والكستناء والخور . اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل . اثوابها مختلفة الالوان . تسرح في النهار . قوتها رحيق الازهار . يرقاتها خاشبة تعيش تحت لحاء الاشجار فتسردب الشكير وتعطب .

اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٦٩٤٠ - جُمُود الخور °، جُمُود مُحَوَف ° Phymatodes fasciatus (S).

Phymatode bandé, P. fascié, P. du peuplier (F).

حشرة من الجمود صغيرة القد طولها نحو ٧ مم . ثوبها الى الخوذة يعبق مع ابتعاده عن الرأس باتجاه الاطراف . غداها مجذعان بالابيض || تظهر في نيسان وتبقى حتى حزيران . مرتعها الازهار || يرقتها خاشبة تعيش تحت لحاء الخور واخصها الخور الابيض فتسردب الشكير وتؤذيه اشد الاذى

٦٩٤١ - جُمُود المَغْث ° Phymatodes alni (S).


Phymatode de l'aune (F).

حشرة من الجمود ، صغيرة القد ، طولها نحو ٥ مم . رأسها وكوسلها وجرازمها سود . غداها منتظما التليق الاحمر والابخر والاسود تعلوها زغبنة شهباء || تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر حزيران . مرتعها الازهار الحرجية || يرقتها خاشبة تتركب اغصان المغث وافئاده فتسردب شكيرها وتسبب يباسها وقد تفعل كذلك في الكستناء والبندق .

٦٩٤٢ - جُمُود قَرْمِيدِي °، جُمُود مُصَدَف ° Phymatodes testaceus (S).

Phymatode rouge briqué, Phymatode testacé (F).

حشرة من الجمود . طولها نحو ١٠ مم . اناثها اكبر قدأ من ذكورها . ثوبها الى الحمرة القرميدية الشهباء الموج ||



جُمُود قَرْمِيدِي

جميعها دجوية المسرح ، تعيش قرب المجاح والشطوط المتوسطة الغور .

٦٩٣٣ - جُمُورَة Terre entassée (F).

الجمثورة : التراب المجموع . Heaped soil (E).

٦٩٣٤ - جُمُومَة ، قِخْف Crâne (F).

Cranium, Skull (E).

صندوق عظمي يشمل الرأس ويتكون عند معظم الحيوانات الفقرية من قسمين القسم المقدمي والقسم الفقري . والجمجمة تغلف الدماغ بجميع اجزائه وتشمل عدة تجاويف تستقر بها مراكز الحس والشم والبصر وهي تتصل اتصالاً مفصلياً بمظام العنق التي ترتكز بدورها على القفص الصدري .

٦٩٣٥ - جُمُحَل Gruge (F). Crunch (E).

الجمحل : كل ما في جوف الصدف من شيء مأكول .

٦٩٣٦ - جَمَد ، تَلَج Glace (F). Ice (E).

هو الماء الذي جمد .

٦٩٣٧ - جَمَد ، جَلَد Geler (F).

To freeze, To frost-bite (E).

هو الماء تماسكت اجزائه .

٦٩٣٨ - جَمَرَة النَّسَان الْخَبِيثَة Glossanthrax

مرض معد قتال يصيب المجترات . ندر وجوده في ايامنا هذه .

٦٩٣٩ - جَمَرَة خَبِيثَة Anthrax

هي الحمى الجمرافية : مرض معد قتال يصيب المواشي .

٦٩٣٠ - جَمَرَة عَرَضِيَّة Charbon symptomatique, C. emphysemateux (F).

Symptomatic anthrax, Black-leg and quarter evil (E).

من اسمائها اوش وابو دراع . مرض ميكروبي معد يصيب البقر والغنم .

٦٩٣١ - جَمْرُك ، مَكْس Douane (E).

Customs, Custom-house (E).

قسم الادارة المنوط به تحصيل الرسوم المفروضة على البضائع الواردة والصادرة . وهو ايضاً مكان استلام وتسليم البضاعة الى اربابها بعد دفع ما يتوجب من رسوم معينة .

٦٩٣٢ - جَمْرِي Crevette (F). Prawn, Shrimp (E).

زاجع اربيان .

٦٩٣٣ - جَمْرَة * Courson, Coursonne (F).

Branch or shoot left (E).

الجمزة هي فئ او قضيب الحمل الذي تترك عليه البراعم الثمرية او بعضها .

٦٩٣٤ - جَمَس Repos des plantes (F).

Repose of plants (E).

هي فترة الاستراحة الحولية عند النباتات المعمرة ، تدوم من الاعمال الى الرعل لذلك فزمنها ومدتها يختلفان اولاً بالنسبة الى النبات ان نقيض او ابيد وبالتالي الى العوامل الجنسية والاقليمية .

٦٩٥٤ - جُمُودٌ ، جُمُودٌ ، جُمُودٌ Total

٦٩٥٥ - جُمُودٌ* ، جُمُودٌ ، جُمُودٌ ، رأسُ الهَرِّ Galeopsis (S). Galéopse, Galéopside (F). Galeopsis (E). Daun, Katzengesicht (D). Canapino, Ortica (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الشفويات. أنواعه نحو ١٢ أوراقها متقابلة ، مدبقة ، كاملة . نصلها زغبى البشرة ، مسنن الحافة . أزهارها نوري التجميع ، محوري الارتكاز. أزهارها صغيرة القدر لونها أبيض أو وردي || أشهر أنواعه الثلاثة التالية .

٦٩٥٦ - جُمُودٌ أحمر Galeopsis ladanum (S). Galéopse rouge, Ortie rouge (F).

٦٩٥٧ - جُمُودٌ تخلي Galeopsis tetrahit (S). Galéopse volouté, Ortie jaune (F).

٦٩٥٨ - جُمُودٌ مَحَيَّي Galeopsis ochroleuca (S). Chanvre batard (F).

يستعمل استعمال الشاي في أكثر بلاد أروبة الوسطى خاصة في ألمانيا حيث يدعى « شاي بلنكنهم » .

٦٩٥٩ - جُمُودِيَّاتٌ ٥ Cnidaires (F).

اسم يطلق على فئة من اللاحشويات أي المحففات مجهزة بخلايا مشرقة . وهي تشمل العديد من العذارات والمصاصات والمدوسيات - القراصيات والرجانيات .

٦٩٦٠ - جُمُودِيَّاتُ الأَجْنِحَةِ Trichoptères (F). Trichoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح . فصائلها مع اجناسها وأنواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها لاعقة . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل . أرساغها خماسية العقول . اجنحتها تنطبق على شكل جلود . دعائصها مائية لا مفترسة .

٦٩٦١ - جُمُودِيَّاتٌ Camélidés (F). Camelidae (E). هي فصيلة الإبلات ، أطلبها .

٦٩٦٢ - جُمُودُ رَعَّاشٌ ٥*

Gymnotus electricus (S). Gymnote électrique, Anguille électrique (F). Electric-eel, Gymnotus electricus (E).

سمكة نهريّة بيوض من فصيلة الجمنوتيات . اعطائها معظم أنهر وبحيرات أمريكا الجنوبية . عمجها تموّجي الحركة || تتميز بعمدتها الكهربائية المؤلفة من جهازين مركزهما عند مؤخر البطن من جانبي قاعدة الذنب || جسمها مستطيل الشكل ، قريب الشبه بجسم الانقليس ، بطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . حراشفها رقيقة ، شديدة الصغر يتخللها غدد دقيقة ماسحة . ثوبها الى الخضار الاغبر . مقدم عنقها أصفر وأحمر . ايطلاها مبقجان بالأصفر . غدها تفرز اخلاط فروية تنشط الايصالية الكهربائية التي تنج من الذنب نحو العنق . اما التفريغ الكهربائي فانه اختياري تقوم به السمكة عندما يطيب لها || زعانفها لانظامية الترتيب . تتميز بخلوها من الزعانف الظهرية والحوضية والذيلية . زعنفتها الشرجية خارقة الطول تمتد من الخوض الى قاعدة الذنب || لحمها متوسط الصنف مأكول .

تظهر في أوائل حزيران وتبقى حتى أواخر تموز . مرتعها الأزهار الحرجية || يرقتها خاشبة تعيش تحت لحاء الأشجار الضعيفة فتسردب شكيرها وتمجّل في القضاء عليها . تركب السنديان والزبان والكسثناء ومختلف اشجار فصيلة القدييات .

٦٩٦٣ - جُمُودُ مُحَوِّفٍ

Phymatode bandé (F).

هو حمود الحور ، أطلبه .

٦٩٦٤ - جُمُودُ مُصَدِّقٍ

Phymatode testacé (F).

هو الجمود القرميدي ، أطلبه .

٦٩٦٥ - جُمُودِيَّةٌ تَعَاوُيَّةٌ

Association de secours mutuel (F). Friendly benefit society (E).

هي الجمعية التي تقوم على مبدأ التعاون والتأزر في سبيل قصد معين .

٦٩٦٦ - جُمُودٌ Camelus (S).

Chameau (F). Camel (E).

جنس حيوانات داجنة مجهزة من ذوات الحف مزدوجات الاصابع تنتمي الى فصيلة الإبلات . وهي كبيرة الاجسام صغيرة الرؤوس ، مشقوقة المشافر تتميز باستطالة اعناقها وقوائمها وبقدورها على الانقطاع عن المأمة طويلة . مهدا الصحاري الاسيوية وقد انتشرت في معظم البلاد الاسيوية وبض الاثريقية . والجمال نوهان وحيد السنم والقالج ، أطلبها .

٦٩٦٧ - جُمُودُ البَحْرِ Mégaoptère (F).

Megaptera (E).

هو الكمع ، أطلبه .

٦٩٦٨ - جُمُودُ المَاءِ Pélican (F). Pelican (E).

هو البجع ، أطلبه .

٦٩٦٩ - جُمُودُ اليَهُودِ Caméléon (F). Chameleon (E).

هو الحرياء ، أطلبها .

٦٩٥٠ - جُمُودُ أَمْرِيكَةِ Lama

هو اللامة ، أطلبها .

٦٩٥١ - جُمُودُ وَحِيدِ السَنَامِ*

Camelus dromedarius (S). Dromadaire, Chameau à une bosse (F). Dromedary (E).

هو الجمل المعروف في جميع البلاد العربية وهو حيوان داجن كبير الجثة رفيع القوائم طويل العنق وحيد السنم . كنيته أبو ايوب وأبو صنوان وسفينة البر . الاثنى تدعى ناقة وكلاهما بغير للذكر والاثنى . والنجيب الجمل الكريم . والهجين الجمل النجيب السريع . والذلول النجيب المدرب للركوب . والرحول والراحلة الجمل الصالح للرحل || سلالاته وعروقه عديدة أشهرها المهرية والبجة والبخت .

٦٩٥٢ - جُمُودٌ ٥ ، جُمُودَانِ Imago (F).


Imago (E).

نعت تعريفي توصف به الحشرة الكاملة التطور ، المتمتعة بميزات الشق أن ذكر أو انثى .

٦٩٥٣ - جُمُودَانِ Fauvette grise (F).

White throat (E).

طائر من الدخاخيل يعرف بالدخلة الشائمة ، أطلبها .



جمل وحيد السنم



جملج



جمنوت رعّاش

في بعض المناطق أخارة وهي شجرة كبيرة الحجم ، دائمة ، ضخمة الساق ، منبسطة الأغصان الكبيرة . أوراقها كثيفة ، قليلة الشكل ، نصلها أخضر اللون العابق . ثمارها مأكولة تشبه التين ، مستحبة العرف ، قرميدية اللون ، مليئة ، مسهلة . حلها متتابع ، مواسمها السنوية من ٥ الى ٦ . خشبها خفيف الوزن شديد الصلابة قوي على الفساد .

٦٩٧١ - **جَمِيمِيَّة*** Jamesia (S). Jamesie (F).
جنبة تزيينية من فصيلة القليبات وحيدة الجنس والنوع . منبتها أمريكية الجنوبية . ساقها فرعاء ليفية اللحاء المتناثرة . أوراقها متقابلة ، نصلها أزغب الصفحة السفلى ، مسنن الحافة . أزهارها عشكولية التجميع ، بيضاء اللون ، عطرية العرف . تنحشى الأتربة الرطبة والمعارض الشالية .

٦٩٧٢ - **جُمَيْشَة*** Corylophus (S). Corylophe (F). Corylophus (E).
جنس حشرات من فصيلة الجُمَيْشِيَّات ورثة غديات الاجتحة . أنواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز الخمسة اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الأدنى وأروبة || أجسامها شديدة الصغر ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ١ الى ٢ مم . رؤوسها صغيرة ، مخروطية الشكل . عيونها بارزة . تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية دهبوسية الاطراف ، تساعية الفصل . كواسلها نصف دائرية الشكل ، تلحف الرؤوس . اغنادها لاحفة ، نحيلة التخديد القاطب . اثوابها وحيدة اللون منها الاسود والاسدف والاشقق والاصم || تألف صفات المنافع ومجاري الماء . تعيش على الفطور والدردي النباتي .

٦٩٧٣ - **جُمَيْشِيَّات** Corylophidae (S). Corylophidés (F). Corylophidae (E).
فصيلة حشرات من غديات الاجتحة . اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها شديدة الصغر ، شبه بيضية الشوزن ، تطول من ١ الى ٣ مم . رؤوسها مخروطية . عيونها بارزة . تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية او دهبوسية ، لاقياسية الطول وعدد الفصل الذي يراوح من ٩ الى ١١ . كواسلها نصف دائرية الشكل . اغنادها لاحفة . ارساغها رباعية العقول . اثوابها ملونة وحيدة اللون || تعيش على الفطور والدردي النباتي والجثالة والجذام . أشهر اجناسها الجُمَيْشَة .

٦٩٧٤ - **جَمِيْطَة*** ، **غَامَة** Gamete (F). Gamete (E).
هي الخلية التناسلية . وقد رسمناها في مختلف مراحل ادوارها الحياتية التي تمثل التكوين والانعتاق والتزاوج والاندماج .

٦٩٧٥ - **جُمَيْل** ، **جُمَيْل** Pycnonote, Bulbul (F). Pycnonotus, Bulbul (E).
راجع بلبل . ج . جلان .

٦٩٧٦ - **جُمَيْل** Fuchsia
راجع فوشيا .

٦٩٧٧ - **جَمِيم**
الجَمِيم : ما غطى الارض من النبات . يقال رعت الماشية الجَمِيم .

٦٩٦٣ - **جَمُونُ قَدِّي** Gymnotus acus (S). Gymnote lanière (F). Gymnotus acus (E).
سمكة بحرية بيوض من الجمنوت . ربما كانت الوحيدة من نوعها وفصيلتها تألف المياه البحرية . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها معاشب النشاف المتوسطة الغور || جسمها مبسط الجرم ، قدي الشكل ، قريب الشبه بجسم الانقليس ، يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم . ثوبها الى البياض الاغبر يعلوه تقيج احمر واسمر . بطنها الى البياض الازرق الموج . رأسها معتدل الجرم ، مخروطي الخطم الذلق . فكها الاعلى يتقدم الاسفل بعض الشيء . عيناها صغيرتان بارزتان || تتميز بخلوها من الزعانف الظهرية واخوضية والذيلية . زعنفتها الشرجية تمتد من الخوض الى قاعدة الذنب || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٦٩٦٤ - **جَمُونِيَّات** Gymnotidae (S). Gymnotidés (F). Gymnotidae (E).
فصيلة اسماك بحرية ونهرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وأنواعها قليلة العدد معظمها من اسماك المياه الامريكية النهرية والبحرية || اجسامها مستطيلة قريبة الشبه بالانقليس . أشهر اجناسها الجمنوت واعرف انواعها الجمنوت الرعاش .

٦٩٦٥ - **جَمِينِيد** Géminides (F).
الجمنيد والجانيد اسم يطلق على الرجوم والنبازك المنبثقة من كوكبة التوأمن .

٦٩٦٦ - **جَمَهُورِي*** Philetoerus socius (S). République social (F).
عصفور من فصيلة التنوطيات . موطنه بعض مناطق اريقية الجنوبية . يألف الاحراج المبعثرة الاشجار والقرية من الماء . نظامه الحياتي جماعي . اسرابه وافرة العدد غير انها تتفرق في زمن التطريق الى مجموعات تعد من ٢٠٠ الى ٤٠٠ جسمه صغير القد ريمة يطول نحو ١٥ سم . ثوبه الى الربدة يعلوها تمشيع اسود . محسراه وعنقه الى السواد الاحم . منقاده مخروطي الشكل ، شديد السمرة . حدقة عينه سوداء اللون رسغاه الى الجؤوة . || قوته الحشرات والبزور والثار العنبية || وهو من الطيور الضرية اي ان اناثها تسافد عدة ذكور || يدئن عشه في السولج وقد يوجد على سولمة واحدة من ٢٠٠ الى ٣٠٠ عش متراكبة فوق بعضها تطوق الشجرة كبرج الحمام ويغلفها سطح شاحط كما في البرج . الانثى تحضن وحدها من ٢ الى ٤ بيضات نحو ١٢ يوماً .

٦٩٦٧ - **جَمَهُورِي** Vin ayant 3 ans d'âge
الجمهوري : نبيذ العنب انت عليه ثلاث سنين .

٦٩٦٨ - **جَمُوح** ، **شَقُوس** Ramingua (F). Not spur-wise, Restive (E).
نعت وصفي يطلق على الخيل الجابحة والبغال الشامسة .

٦٩٦٩ - **جُمِّي** Fève (F). Bean (E).
راجع فول .

٦٩٧٠ - **جُمَيْز*** ، **تَيْن لِرَعُون** Ficus sycomorus (S). Figuier sycomore, F. d'Egypte (F). Sycamore fig, Mulberry fig, Pharaoh's fig (E). Agyptische sycamore, Pharaofeige (D). Sicomoro, Seccomoro, Fico d'Egitto (I).
شجرة مشرة من التوتيات . مهدا بلاد النوبة ومنها انتشرت




جمهوري وعش




جَمِيم



جَمِيمِيَّة



جَمِيمِيَّة



جَمِيمِيَّة

٦٩٩٠ - جِنَادَة *
Gennada (S).

Gennada (F). Gennada (E).

جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة اللافيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد تطول نحو ١٠ سم . تتميز بقصر متناكها المقطومة ، باستطالة اذيالها وباستحالة الزوج الثالث من ملاسها الفككية الى مساوط || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

٦٩٩١ - جُنَّار
Platane d'Orient (F).

Oriental plane tree (E). اطلبه .

٦٩٩٢ - جُنَّارَة
Artichaut (F).

الجنارة نبات زراعي يعرف بالارضي شوكي ، اطلبه .

٦٩٩٣ - جِنَاسَة ، عَكَا فَة
Homogamie (F).

Homogamy (E).

هي الاختصاب بين عناصر وراثية من اصل واحد . وهي غذائياً تجانس الازهار في النوع الواحد فتكون اما ذكرية او انثوية او خنثوية . وهي شوزيباً ادراك اسدية الزهرة ومدقتها او مدقاتها في آن واحد .

٦٩٩٤ - جَنَافَة رَدَغَة ، جَنَافَة حَمْرَاء

Kinosternum subrubrum (S).

Cinosterne rougeâtre, C. bourbeux (F).

نوع من الجنافة ، سلحفاة من فصيلة الجنافيات . موطنها فسيح الارعاء ، يمتد من امريكا الجنوبية الى الشمالية || جسمها متوسط القد ، يطول من ٣٥ الى ٤٠ سم . ذيلها بيضي الشوزن ، معتدل الاحديداب ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . لونه الى الحمرة الجوزية . زعنفا مفصلي المقدم والمؤخر ، يتألف من ١١ صفيحة . رأسها معتدل الهرم ، شارف الفك الاعلى . عنقها معتدل الطول والغلاظة . ذنها قصير قوائمها نشيطة || مرتتها المناقع والاغوار وبحاري الماء . قوتها الضفادع والنطاء والثعابين والسماك وجميع انواع الجيف اخصها الرخويات والقشريات والاسماك .

٦٩٩٥ - جَنَافِيَّات
Kinosternidae (S).

Kinosternidés (F). Kinosternidae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها وانواعها المعاصرة متوسطة العدد . اعطائها بعض مناطق ومياه امريكا الجنوبية والشمالية || اجسامها صغيرة القد . ذيلها بيضية الشوزن ، معتدلة الاحديداب . زعنفا منبسطة عند الاناث ، مقعرة عند الذكور ، مفصلية المقدم والمؤخر عند الشقين مما يسمح بايصادها وإخفاء الرأس والذنب || وتتميز ذكور هذه الفصيلة بقوائمها الخلفية المجهزة بكتل من السنف المدبب تمكنها من التشبث بالاناث عند الكرم || اشهر انواعها واكثرها انتشاراً الجنافة الردغة .

٦٩٩٦ - جَنَّاكَة مُزَيَّنَة *
Scopula ornata (S).

Scopule ornée (F). Scopula ornata (E).

حشرة من فصيلة الارفيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الداخلية المتاخمة . فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الصعتر والنعنع والطوقريون ... || جسمها صغير ابيض يطول نحو ١٠ مم . بسطتها تراوح من ٢٨ الى ٣٢ مم . رأسها معتدل الهرم . عيناها صغيرتان .

٦٩٧٨ - جُمَيْمَة *
Acera (S).

Acère (F). Acera (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطاييات . انواعها المعاصرة المعروفة ثلاثة . اعطائها بعض مجادح البحر الابيض المتوسط || اصداؤها صغيرة ، رقيقة ، شفافة ، ملحوفة ، مما يجعلها تبدو كعرياطة . اجسامها مفصصة ، عديدة الفلق . فلقها الجانبية جناحية الانتشار . رؤوسها قليلة الوضوح مطوقة باطر حلقة الشكل ، صغيرة القد . خياشيمها ظهرية ، يمينية ، ملحوفة بالاردية .

٦٩٧٩ - جِن
Inflorescence et fleurs (F).

Inflorescence and flowers (E).

جن النبات : نوره وزهره .

٦٩٨٠ - جِنَاء أَهْمَر
Arbousier commun (F).

Common arbuté (E).

اطلب قطلب شائع .

٦٩٨١ - جِنَاح *
Aile (F). Wing, Pinion (E).

عضو من اعضاء جسم الطير والحشرات يصلح للطيران . وهو في النبات امتداد بعض الاعضاء كما في البذور والسوق المجنحة || ومن اسمائه التخصيبية السقط للطير والروشن للحشرات .

٦٩٨٢ - جِنَاح ، جَدَّادَة
Ptérois (F).

جنس اسماء بحرية سامة من الجلائخ الشائكات الرعائف . انواعه المعروفة قليلة . اجسامها غريبة الاشكال المستهجنة . اثوابها متراكبة الالوان الزاهية . زعانفها الصدرية مستطيلة تمكنها من الطيران فوق سطح الماء . مدة تحليقها تراوح من دقيقة الى ثلاث دقائق ، اطلب جدادة .

٦٩٨٣ - جِنَاح الغُرَاب

جناح الغراب او جناح الغراب الايمن نجم من كوكبة الغراب .

٦٩٨٤ - جِنَاح الفَرَس

جناح الفرس نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم . ويدعى الجنب ، اطلبه .

٦٩٨٥ - جِنَاح اَيْمَن

الجناح الايمن نجم نير من كوكبة نجوم الدجاجة .

٦٩٨٦ - جِنَاح رُومِي
Aunée, Inule (F).

Elecampane (E).

هو الراسن ، اطلبه .

٦٩٨٧ - جِنَاح غَمْدِي
Elytre (F). Elytron (E).

هو مجداف الحشرة الغمدية الجناح ويدعى القند والظهران والروشن الغمدي .


٦٩٨٨ - جِنَاحِي الشَّكْل
Aliforme (F).

Aliform, Wing-shaped (E).

نعت تعريفية يطلق على ما كان شكله كالجناح .

٦٩٨٩ - جِنَاحِيَّة *
Samare (F). Samara (E).


نعت تدريبي يطلق على كل ثمرة يابسة وحيدة البذرة اخذ غلافها الذي لا يتفتح شكل جناح رقيق مستطيل .




جُمَيْمَة



جِنَاح



جِنَاحِيَة



جِنَادَة



جَنَّاكَة مُزَيَّنَة

٧٠٠٧ - جَنْبَدَة البرجَاد Métanotum (F).

Metanotum (E).

هي في الحشرات حلقة البرجاد العلوية .

٧٠٠٨ - جَنْبَدَة البرُجْد Mésonotum (F).

Mesonotum (E).

هي في الحشرات حلقة البرجد العلوية .

٧٠٠٩ - جَنْبَرٌ، جَنْبَارٌ، حَبْرُورٌ، حَبْرِيرٌ

Outardeau (F). Young bustard (E).

هو فرخ الحبارى ج جنابر وحبارير .

٧٠١٠ - جَنْبُورَة Jambosier (F). Rose apple (E).

هي تفاح الورد ، اطلبه .

٧٠١١ - جَنْبُوط Prosopis littoralis (S).

Prosopis des côtes (F).

نوع من الغاف . نبات نجمي معمر من فصيلة القرنيات الفراشية . اعطانه المعروفة تمتد من المريش الى انطاكية ، ينبت في المواقع الصخرية المشرفة على البحر || ساقه فرعاء . اوراقه متعاقبة ، مركبة ، ريشية ، وريقاتها شفعية ، يراوح عددها من ٥ ازاواج الى ١٢ زوجاً . نصالها خلية الصفحات السفلى . ازهاره سنبلية التجميع ، محوري الارتكاز . ازهاره صغيرة ، وردية اللون . ثماره قرون مستطيلة رباعية البزور المبطلطة || تنويره ربيعي .

٧٠١٢ - جَنْثُ * Pivot (F). Tap-root (E).

الجنت من ساق الشجرة ما كان في الارض فوق العروق . وقيل هو العرق المستقيم اي الجذر الوتدي الذي يكون امتداد الساق في التربة . وقيل ايضاً هو اصل الشجرة .

٧٠١٣ - جَنْشُورَة * Dendrophilus (S).

Dendrophile (F). Dendrophilus (E).

جنس طير من الجواثم المتسلقات الرقيقات المناقير . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها اسيوية المهد تتميز بقصر اذنانها المقطومة . اجنحتها لاحقة ذلقة . اثوابها بلقاء . اعناقها وصورها بيض || قوتها الحشرات والبزور البرية . تدثن في الاشجار الفرعاء القليلة الارتفاع . حفنتها من ٥ الى ٦ بيضات ترخها بمنابرة الذكر نحو ١٤ يوماً .

٧٠١٤ - جَنْشُورَة Remblai (F).

Filling up, Embanking (E).

التراب المد للردم .

٧٠١٥ - جَنْشِيَانَة Gentiane (F). Gentian (E).

هي الجنطيانه ، اطلبها .

٧٠١٦ - جَنْشِيَانِيَّات Gentianacées (F).

Gentianaceae (E).

هي فصيلة الجنطيانيات راجعها .

٧٠١٧ - جَنْجَالَة Houblonnière (F). Hop-field (E).

هي زريعة الجنجل اي الارض المزروعة جنجلاً .

٧٠١٨ - جَنْجُر Centinode (F). Armstrong (E).

هو البطباط ، اطلبه .

٧٠١٩ - جَنْجُل Humulus (S).

Houblon (F). Hop (E).

جنس نباتات عشبية عارشة وحيدة المسكن من سبط القتيبات وفصيلة القراصيات . له نوعان الجنجل الشائع والجنجل الياباني .

زبانها خيطيان . جوشنها كثيف اللبدة ، ابيض اللون ، عاجي الموج . بطنها كثيف الحمل والحراشف ، تبني اللون ، كستني الخيد || رواشنها ، عند الشقين ، الى البياض الساطع تملوه ثلاثة خطوط من الزراكش الغبراء . اهدابها الى البياض الثلجي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في اواسط ايار وتبقى حتى اواسط تموز . نمرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد الممكن لطخاً مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الالوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل . ثوبها الى الريدة الغبراء تعلوها رقشة صفراء وبعض النقط السرد . رأسها الى الجؤرة . حيدها وشرجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي بين الفروع التي تلامس التربة ضمن صلجة مبطلطة معتدلة الحبيك .

٦٩٩٧ - جَنْانَة Scutellum

هي الخجفة ، اطلبها .

٦٩٩٨ - جَنْب Algenib (F).

الجنب ، ويدعى جناح الفرس ، نجم نير من كوكبة نجوم الفرس الاعظم .

٦٩٩٩ - جَنْبَاز Maquignon (F).

Horse-dealer, Jobber (E).

هو تاجر الخيل او وسيط بيعها .

٧٠٠٠ - جَنْبَايَة * Genipa (S).

Génipayer (F).

جنس اشجار حرجية من فصيلة القويات . انواعها المعروفة خمسة ، اعطانها تمتد من الهند الى امريكا الوسطى والجنوبية . سوقها منتصبه فرعاء تعلو من ٧ الى ١٢ م . اوراقها متعاقبة ، قصيرة الاعناق ، نصالها اهليلجية او سنانية الشكل . ازهارها محوري او طرفي الارتكاز ، فردي او ضمي التجميع . ازهارها خاسية القعالات بيضاء اللون او صفراء . ثمارها عنبية ، لحمية السودق ، كبيرة الحجم البرتقالة الصغيرة . سودقتها ابيض اللون ، حامز الطعم .

٧٠٠١ - جَنْبَة Arbrisseau (F). Shrubby tree (E).

هي من النبات ما كان اكبر من البجلة واصغر من الشجرة .

٧٠٠٢ - جَنْبَة الدُرّ Symphorina (F).

Snowberry (E).

هي السفورين ، اطلبها .

٧٠٠٣ - جَنْبَة الرباط Viorne (F).

Wayfaring tree (E).

هي الافلوس ، اطلبه .

٧٠٠٤ - جَنْبَة عطيرة Diosme (F). Diosma (E).

هي الديوسمه ، اطلبها .

٧٠٠٥ - جَنْبُخ


الجنبخ : القمل الضخام الواحدة جنبخة .

٧٠٠٦ - جَنْبُد

الجنبد هو زهر الرمان وهو ايضاً الورد الاحمر .



جنباية



جنت



جنترة

٧٠٢٩ - جُنْدُخ *
Decticus (S).

Dectique (F). Decticus (E).
جنس جنادب من القبوطيات . أنواعه عديدة واللونه كذلك يغلب فيها الاسمر الموشم بالبني او المجذع بالحطلي او الموشح بالاخضر . جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٣٢ الى ٤٤ مم . افخاذها من ٣٥ الى ٤٣ مم . اغنماها من ٤٢ الى ٥٥ مم . اسراكها مسننة . مرزاتها مستطيلة منعقفة الى العلاء . تألف المراعي والبور . يكثر وجودها في اواخر الصيف .

٧٠٣٠ - جُنْدُخ

نوع من القراد يركب الفسب وغيره ... ج جنادع . وقال بعضهم : « جنادب اسود له قرنان طويلان وهو الخن الجنادب » .

٧٠٣١ - جُنْدُفَةُ الْكَرْمَةِ ، بَزَّةُ الْكَرْمَةِ *

Procris ampelophaga, Zygaena ampelophaga (S).
Procris de la vigne, Zygène de la vigne (F).
Procris ampelophaga, Zygaena ampelophaga (E).

حشرة من فصيلة البزيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها اقليم الكرم من حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقتها تعيش على خلب الكرمه || جسمها صغير القد يطول نحو ١٠ مم . بسطها نحو ٣١ مم . رأسها معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان . جوشنها كثيف اللبدة ، اطحل اللون ، ازرق الموج . بطنها كثيف الحراشف والخمل ، اطحل اللون ، اخضر الموج || روشناها الاماميان الى الطحلة الزرقاء الموج . روشناها الخلفيان الى الطحلة الخضراء يعلوها تمشيع زيتي يزيدنها سطوعاً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع . تمتع الممكن مباحداً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الادراك الجسموري تطول نحو ١٩ مم . جسمها اهليلجي الشكل ، اسمر اللون تعلوه رقشة صفراء تتوسطها نقط جلوية تمتد من الصدر الى الشرج . قشازها كثيف الحلب القصير ، مبعثر الحلب الطويل . رأسها مستعرض الشكل اسود اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة متأسكة النسيج تحبكهما السرفة تحت القشور او بين شقوق اللحاء .

٧٠٣٢ - جَنْدَل

الجندل والجندال : الحجارة الصماء .

٧٠٣٣ - جَنْدَم ، كَنْدَم ، غَرْيَيْيَّة

Garcinia (S). Garcinie (F).
جنس اشجار برية وزراعية من الكلوزيات انواعه نحو ١٥٠ جميعها من اشجار المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية . لحاء سوتها غنية بالمصارة الصمغية الصفراء اللون || اوراقها منعقة ، متقابلة ، نصلها اهليلجي الشكل ، لسن الزام الاخير ، مدبب الطرف || ازهارها خشوية ، رباعية او خماسية الفصل المتصالبة ، رباعية او خماسية البتلات المتعاطلة . مبايضها عديدة الغريفات . ثمارها مأكولة عديدة الاشكال والالوان || اشهر واعرف انواعه الزراعية ما يتبع .

٧٠٣٤ - جَنْدَم أَصَام

Garcinia atroviridis (S).
Garcinie de l'Assam (F).
نوع من الجندم . ثمرته كبيرة القد تعلو نحو ١٢ م .

٧٠٢٠ - جُنَجُل شائع * ، حَشِيشَةُ الدِينَار

Humulus lupulus (S). Houbion commun (F). Common hop, Bine (E). Echter hopfen (D). Luppulo, Maschio, Volticella (I).

نوع من الجنجل المعمر ، عديد الضروب ، ساقه ليفية مضلعة مدادة عارشة تطول نحو ٨ امتار . اوراقه متقابلة منعقة مفصصة نصلها جامد النسيج مسنن الخافة . وهو من النباتات الزراعية الصناعية . مخاريط ازهاره تستعمل في تعطير البيرا .

٧٠٢١ - جُنَجُل يَابَانِي

Humulus japonicus (S). Houbion du japon (F). Japanese hop (E).

نوع من الجنجل الزراعي التزييني الخولي . ضروبه عديدة سوقها زباه نحيلة عارشة تطول نحو ٦ امتار . اوراقها متقابلة ، منعقة ، خماسية او سباعية التفصيص . نصلها لسن الشكل مدبب الزام الاخير . مخاريطها الزهرية صغيرة القد .

٧٠٢٢ - جَنْجَن ، جُنْجُن ، جِنْجِن ، جِنْجِنَة

واحد الجنانجن وهي عظام الصدر .

٧٠٢٣ - جُنْحَة

Délit (F). Misdemeanour (E).
فعل غير مشروع توفرت فيه نية الاجرام وتقرر له عقوبة قانونية .

٧٠٢٤ - جَنْدَاح *

Solandre (F).
جنس نباتات جنبيه معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، مهدا البلاد الحارة || جميعها جنبات سرعية الفروع . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، منعقة ، اهليلجية . فصاها سمكة الصفحة ، كثيفة الزغب ، لزجة || ازهارها قمية الشكل ، كبيرة ، مستطيلة الانبوب ، متعجة البتلات الملحومة . ثمارها جراء تغلف بعض البزور || عصارة اوراقها جعالية المادة ، شديدة الوقع .

٧٠٢٥ - جَنْدَاعَة ، أَبُو مَقْطَم

Onychoteuthis gigantea (S). Calmar géant, Calmar à griffes (F). Sleeve-fish (E).

نوع من الطردوس . حيوان بحري من فصيلة الطردوسيات . موطنه بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمه كبير القد يطول نحو ١٢ متراً . ثمانية من جرامزه معتدلة الطول متساوية القد واثنان مستطيلتان . جميعها مسلحة بالحاجم والمقاطم الحادة . قوتها الاسماك والقشريات ولا تعف ، عند الاستطاعة ، عن صيادي اللؤلؤ .

٧٠٢٦ - جَنْدُوب

Sauterelle, Locuste (F).
Locust (E).
اسم شامل . يطلق على مختلف انواع القبايط والجراد .

٧٠٢٧ - جُنْدَبَادَسْتَر ، بِيدَسْتَر ، سَكَلَاتِي ،

فَاحِشَة ، قَسْطُورَة ، قَسْطُورِيَوْم

قَسْطُورِيُون

Castoreum (F).

Castoreum (E).

مادة شمعية دسمة عرقية مرة الطعم صفراء اللون مفراء الموج طيبة تستخرج من الحارود أي البادستر الذي يفرزها ويجمعها في جرابين صغيرين مركزهما بين الفخذين تحت الخصيتين في الذكر وتحت الثغر في الانثى .

٧٠٢٨ - جَنْدَح

Ajone nain (F). Dwarf furze (E).


هو الوزال ، اطلبه .



جنجل شائع



جنداح




جندخ



جندقة الكرمه



جندم منغستان



جنزارة



جنسن



جنصينة



جنطاس

التبسيط ، يطول نحو ٢٥ سم. رأسها خدروني الشكل ، قصير الحطم ، صغير الشدق ، عيناها صغيرتان ، ماصحتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ناشرة المؤخر . زعنفتها الذيلية فارقة هلالية الشكل . ظهرها والقسم الاعلى من جانبيها الى الحمرة الارجوانية ، القسم الاسفل من جانبيها وبطنها الى البرتقالي || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٠٤١ - جنس (F). Genus (E).
هو في التصنيف مجموعة انواع حيوانية او نباتية تتصف بصفات مماثلة او مشتركة . والجنس يأتي تحت الفصيلة وفوق النوع.

٧٠٤٢ - جنسن *
Panax ginseng (S).
Ginseng, Panax (F). Asiatic ginseng (E). Gensang (D). Ginseng (I).
نبات زراعي طبي معمر من الفصيلة البلايية . متبته المناطق الحارة . اوراقه متعاقبة مركبة . ازهاره عشكولية التجميع جميلة الشكل . جذوره طيبة جزيلة النفع تشفي من جميع العلل على حد قول الصينيين .

٧٠٤٣ - جنسي
Générique (F). Generic (E).
ما هو تابع للجنس .

٧٠٤٤ - جنصينة *
Janthina (S).
Janthine (F). Janthina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجنصينيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها يمنية مفترسة . تجوب بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداؤها رقيقة بنفسجية اللون زرقاء المواجه تعوم على سطح الماء وتستقر ما طاب لها من الوقت بواسطة طوافات اهليجية الشكل رقيقة يفرزها الجسم ويفصلها عند الحاجة || اعرف انواعها الجنصينة الثنائية اللون (J. bicolor) المنتشرة في البحر الابيض المتوسط .

٧٠٤٥ - جنصينيات
Janthinidae (S).
Janthinidés (F). Janthinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الحياشيم المشطية . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها يمنية مفترسة اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . ملجئها الحياتي جماعي ، اسرابها وافرة العدد الذي يناهز الملايين || اصداؤها رقيقة بنفسجية اللون او زرقاء ، حلونية القسم المحلزن ، مستديرة التجويف الفوهي . اجسامها صغيرة . رؤوسها ضخمة خطمية الشكل ، ثنائية اللوامس المستطيلة المعبونة || اعرف اجناسها واشهرها الجنصينة والركلوزة .

٧٠٤٦ - جنطاس *
Janthoenas (S).
Janthoenas (F).

جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه المعروفة سبعة ، اعطائها تمتد من جزر الزابج الى سائر جزر المحيط الهادي || اجسامها تشبه الحيدران . طولها يراوح من ٣٣ الى ٣٧ سم . اثارها الى الخططي الاسنح يعلوه مواج من الاخضر الى الارجواني . رؤوسها طحلاء اللون او سمراء . صدورها الى البياض التني . اذانها كبيرة ، مقطوعة الاطراف || ملجئها الحياتي جماعي . سرها يمد من ٤٠ الى ٨٠ زوجاً . قوتها البزور والحبوب والثمار الناضجة || تدثن في تجاويف الاشجار . تحضن اربع مرات في الحول . حضنتها بيضتان . الترخيم تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

ثمرته مستديرة صفراء اللون . حصوصها شفافة ، حامزة الطعم ، ذكية العرف تربب || يستخرج من بزورها دهن الجندم .

٧٠٣٥ - جندم بنطامي
Garcinia benthami (S).
Garcinie bentham (F).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد . ثمرته اجاصية الشكل قطر قاعدتها نحو ٤ سم . لونها الى الصفار البرتقالي . حصوصها ضخمة قليلة العدد بيضاء اللون مستحبة الطعم والعرف .

٧٠٣٦ - جندم حلو
Garcinia dulcis (S).
Garcinie doux (F).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد . ثمرته تنحاية الشكل والحجم ، ذهبية اللون . حصوصها كثيرة العدد ، مأكولة ، حلوة المذاق ، فواحة العرف اللذي .

٧٠٣٧ - جندم ستغفورا
Garcinia hombroniana (S).
Garcinie de Singapour (F).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد ترغب في الاثرية الرملية الساحلية القريبة من البحر . ثمرته حمراء اللون كروية الشكل بحجم التفاحة . حصوصها تقارب حصوص المنستان شكلاً ولوناً وطعماً وعرفاً .

٧٠٣٨ - جندم منغستان * ، جوز جندم ، كوز كندم ، زهرة الحجر

Garcinia mangostana (S).
Garcinie mangostan, Mangoustanier (F).
Mangosteen tree (E). Mangostanbaum (D).
Mangostana, Lauro di giava (I).

نوع من الجندم . شجرته تعلو من ٥ الى ١٢ م . ساقها منتصب . اغصانها فارشة ، قنبا فضفاضة . اوراقها جلدية النصل عابقة الخضار . ازهارها رباعية الفصل والبتلات . ثمارها كروية الشكل بحجم البرتقالة المتوسطة . والثمرة مكونة من بعض البزور تحيط بها خمسة او ستة حصوص جامدة الب اللب الابيض اللون المأكول ، تغلفها قشرة جلدية سميكة ملساء البشرة لونها احمر خمرى . لها لذيذ الطعم ، ذكي العرف ، فاخر الصنف . يستخرج من بزور ثمارها دهن الجندم الذي يستعمل الزيت .

٧٠٣٩ - جندم هندي ، فرقران
Garcinia Indica, G. morella (S).
Garcinie de l'Inde, Brindonnier, Guttier, Moreiller (F).
Gamboge tree (E). Guttabaum, Malergarcinie (D).
Garcinia morella, Mangostana morella (I).

نوع من الجندم . شجرته متوسطة القد تعلو نحو ٧ امتار ساقها غليظة يستخرج منها بالحز عصارة صمغية شفافة ، تصفر بعد جفافها ، تستعمل في عدة صناعات || ثمارها كروية ، كبيرة الحجم ، حمراء اللون ، مأكولة اللباب وتربب . بزورها لوزية ، دهنية المادة يستخرج منها زيت صناعي شائع الاستعمال .

٧٠٤٠ - جنزارة *
Clepticus genizarra (S).
Cleptique rougeâtre (F).

سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الكيديات موطنها شامع الاطراف تمتد من المحيط الهندي الى الهادي . قائل الاغوار القريبة من المجادح . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد || جسها اهليجي الشكل ، معتدل

الزغطة التي تنشأ من اتحاد غامتين تحمل كل منها عاملاً خاصاً بالصفة فإن كانا عاملاً الزغطة لصفة خاصة متماثلين دعي الفرد الناشئ جنساً اي متماثلاً أو أسيراً وان اختلفا فهو هجين أو أشيب .

٧٠٦١ - جنيس مُشَالِل Synanceia verrucosa (S).
Synancée verruqueuse, Synancie verruqueuse (F).
سمكة بحرية من الجلائخ . اعطانها البحر الاحمر وبعض مناطق المحيط الهندي . جسمها مستهجن الشكل كثير النتوءات والشعول . رأسها افطس المقدم . عيناها صغيرتان ، رفيعة الارتكاز . زعنفتها الظهرية كبيرة قاطبة ، حادة المناخس الصلبة السامة . سمها شديد الفعالية يقضي على الانسان ان اصابه باقل من ساعتين .

٧٠٦٢ - جنيس مُرْعَس Synanceia horrida (S).
Synancée horrible, Synancie horrible (F).
سمكة بحرية من الجلائخ . اعطانها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي . جسمها غريب الشكل . رأسها افطس عادم السهف . عيناها تحتلان قبة الرأس الناضرة . ظهرها جالس الخط تملوه زعنفة قاطبة مركبة من ١٨ متخساً صدفية المادة . بطنها جراحي الشكل يلحفه من اليمين واليسار صدفتان كبيرتان || لحمها سام في بعض فصول السنة . ذلك عندما يكون مرتعها نومي المرجان .

٧٠٦٣ - جنيسْتَه Genêt (F).
جنبة معمرة من فصيلة القرنيات الفراشية مشهورة باسم شيزاء ، اطلبها .

٧٠٦٤ - جنيسِك Harpa (S).
Harpe (F). Harpa (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الجنيكيات . انواعها المعاصرة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي والمحيط الهادي || اصداقها مطلية جميلة الياكل والالوان الزاهية . اجسامها كبيرة مستطيلة . رؤوسها صغيرة مبطلة ثنائية اللواس المعبونة المخروطية الشكل الدقيقة الاطراف . اعظامها انبوية مستطيلة ، ملونة ، مجذعة كاللواس . اريدتها فضفاضة كبيرة وارجلها كذلك || اشهر انواعه واندرها الجنيك النبيل « Harpe noble » .

٧٠٦٥ - جنيسِيَّات Harpidae (S).
Harpidés (F). Harpidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة اعطانها بعض مناطق المحيط الهندي والهادي || اصداقها شبه اهليلجية الشكل ، بطنية ، مضلعة ، ناشرة الضلوع القاطبة المنتهية بقبة محزنة ، محززة ، مدببة الطرف || اعرف اجناسها واشهرها الجنيك .

٧٠٦٦ - جنيسِن Foetus
الولد ما دام في رحم امه .

٧٠٦٧ - جنيسِنَة Jardin fruitier, Verger (F).
Fruit-garden (E).
هي كل جنة صغيرة خصصت للاشجار المثمرة .

٧٠٤٧ - جنطِيَانَه Gentiane (F). Gentian (E).
هي الكوشاد ، اطلبه .

٧٠٤٨ - جنطِيَانِيَّات Gentianaceae (S).
Gentianacées (F). Gentianaceae (E).
الجنطيانيات والجنشيانيات والكوشاديات اسماء ثلاثة لفصيلة نباتية واحدة من ذوات الفلقتين . اطلب كوشاديات .

٧٠٤٩ - جنطِل * ، جُفلاس Gagata (S).
Gagate (F). Gagata (E).
جنطل هو الاسم الهندي وجفلاس الاسم الهندوسي . سمكة نهريّة من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريّات . موطنها جميع انهر الهند || جسمها سناني الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول نحو ٣٣ سم . ثوبها الى الشبهة المتأوجة بالطحلة . زعانفها الى السمرة القائمة . خطمها افطس الشكل يحمل ثمان عذبات . زعنفتها الظهرية الاولى شرعية الشكل ، مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٠٥٠ - جنُف Taluter (F). To slope (E).
جعل الحافة منحدره .

٧٠٥١ - جنُفلة Cincle plongeur (F). Dipper (E).
طائر صغير القد يألف المياه يعرف بالدنفلة ، اطلبها .

٧٠٥٢ - جنُهيّ Bambou (F). Bamboo (E).
هو الخيزران ، اطلبه .

٧٠٥٣ - جنُوب ، قِبْلِيَّة Vent du sud (F).
الجنوب او القبليّة : ربح مهبها القبلة . South wind (E).

٧٠٥٤ - جنُوبيّ ، قِبْلِيّ Mériidional (F).
Meridional, Southern (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو تابع او مختص بالجنوب .

٧٠٥٥ - جنُوبيّ Austral (F). Austral (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو خاص بالجنوب القطبي .

٧٠٥٦ - جنُور Aire (F). Area (E).
الجنور : مداس الخنطة والشعير (القاموس) .

٧٠٥٧ - جنّى Cueillir (F). To gather (E).
جنّى وجنّى الثمرة : تناولها من الشجرة . وأجنّى الشجر : أدرك . والجنّى : ما يجنى من الشجر ما دام غضاً . والجنّى : ثمر جنّى من ساعته . والجنّى : ما يجنى من الثمار .

٧٠٥٨ - جنّيسَة Sous-arbrisseau (F).
Herbaceous plant (E).
هو كل نبات يكون بين البجلة والجنبة .

٧٠٥٩ - جنّيسِيّ Sous-frutescent,
Suffrutescent (F). Suffrutescent (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات كيانه كيان الجنبية او شكله شكلها . م . جنيبية .

٧٠٦٠ - جنيس ، جنيس الرُغْطَة ، أسيل Homozygote
الجنيس حيوانياً او نباتياً هو المتماثل العوامل الوراثية وذلك لان عامل الصفة الوراثية يوجد دائماً مزدوجاً في



جنطل



جنيس مرعس



جنيك

٧٠٦٨ - جَنِينِي

Embryonnaire (F).

Embryonic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالجنين ، راجع مضني .

٧٠٦٩ - جَنِينُوس * ، بُولَة

Johnius (S).

Johnius (F), Johnius (E).

بولة هو الاسم الهندي . جنس اسماك نهريّة من شائكات الزعانف وفصيلة البهاريات . انواعه المعروفة عديدة ، جميعها من اسماك مياه البلاد الحارة الاسيوية والافريقية . تألف الانهر ومصباتها || اجسامها متدلة القذ ، تغول من ٢٧ الى ٤٢ سم . تتميز باخطامها الفطسة وبعيونها الكبيرة الجاحظة . جميعها ثنائية الزعانف الظهرية ، مستديرة الذيلية . اثوابها متداخلة الشبهة والخضار ، تعبق في الظهور وتغبر في البطن ومنها المنمشة بالاسمر والفضية البطن || لحومها متفاوتة التصنيف والجودة ، جميعها مأكولة .

٧٠٧٠ - جَهَارَة ، اَعْصَام

Morphologie externe, Phytographie (F). External morphology, Phytography (E).

هي تعريف وتحلية الشكل الخارجي الواقعي في الحيوان والنبات . اما درس التركيب الداخلي فيسمى شوزبة وقائفة .

٧٠٧١ - جِهَاز التَّنَفُّس

Appareil respiratoire (F). Respiratory system (E).

الجهاز التنفسي هو مجموعة الاعضاء المختصة بعملية التنفس القائمة على اخذ الاكسجين اللازم للجسم من افواه واخراج ثاني اكسيد الكربون وبخار الماء . الغاية منها احراق المواد السكرية للحصول على الطاقة العملية . فاذا نفذت المواد السكرية من الجسم اتحد الاكسجين مع المواد الدهنية وعند نفاذها يتحد مع المواد الزلالية فيبتدئ بالمدخنة وينتهي الى المكوّنة للخلايا || اما اعضاء جهاز التنفس فهي : الانف والبلعوم والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتان . والجهاز التنفسي قد يكون على اربعة اشكال ، تحدبها ما يلي : ١ - التنفس الرئوي الذي تتميز به الحيوانات الثديية والطيور والزواحف . ٢ - التنفس الفلصي الذي تتميز به الحيوانات المائية كالاسماك وغيرها . ٣ - التنفس القصبي الذي تتميز به الحشرات . ٤ - التنفس الجلدي الذي تتميز به الشعاعيات وما شاكلها .

٧٠٧٢ - جِهَاز الهَضْم

Appareil digestif (F).

Digestive organs (E).

الجهاز الهضمي هو الجهاز المختص بتقطيع الطعام ومضغه وبلعه ومزجه بمختلف العصارات التي تذيب منه ما يتمكن الجسم من امتصاصه . اما ما تبقى وهو الجزء الغير مهضوم فيخرج من الشرج ويعرف بالبراز || يقسم الجهاز الهضمي تبعاً لوظائف اجزائه الى قسمين : الاول يشمل القناة الهضمية التي تبتدئ بالفم وتنتهي بالاسم . وهي مؤلفة من الفم والبلعوم والمريء والمعدة والامعاء الدقيقة والامعاء الغليظة والشرج . اما الثاني فيتألف من ملحقات القناة الهضمية وهي الاعضاء التي تفرز السوائل الهاضمة كالغدد اللعابية والكبد والمقعد (البشكرياس) .

٧٠٧٣ - جِهَاز جِذْرِي

Système racinaire (F).

Radicular system (E).

الجهاز الجذري هو نوع وشكل الجذور التي تميز النباتات عن بعضها بعض .

٧٠٧٤ - جِهَاز دَوْرِي

Appareil circulaire (F).

Circulatory system (E).

الجهاز الدوري هو الجهاز المختص بتوزيع الدم على سائر اجزاء الجسم لذلك فهو جهاز وعائي مقفل ينقل الدم من القلب ويعيده اليه . يتألف من القلب والاوردة الدموية .

٧٠٧٥ - جِهَاز عَصْبِي

Système nerveux (F).

Nervous system (E).

الجهاز العصبي هو الذي يتحكم بتصرفات الجسم ويتسلط على الادراك والاحساس والحركة || يتألف الجهاز العصبي من قسمين : الجهاز العصبي المركزي الذي يشمل المخ والنخاع الشوكي . والجهاز العصبي الطرفي الذي يشمل الاعصاب للدماغية والشوكية .

٧٠٧٦ - جِهَاز قَفْزِي

Appareil saltatoire (F).

Saltatory apparatus (E).

الجهاز القفزي عند الحشرات هو العضو او الاعضاء المختصة بهذه الحركة .

٧٠٧٧ - جِهَاض

Arac, Méruak (F).

Tooth-brush tree (E).

الجهاض هو شجر الاراك وقيل ثمره ما دام اخضر .

٧٠٧٨ - جِهَام

الجهم : السحاب لا ماء فيه .

٧٠٧٩ - جَهْبَر

Ourse (F), She-bear (E).

هي انثى الدب .

٧٠٨٠ - جَهَبَل *

Tragelaphus (S).

Tragélaphe (F), Tragelaph (E).

جنس من الظباء . انواعه ٦ موطنها افريقية . جميعها كبيرة القذ ، قرونها لولبية . اثوابها الى الشبهة الغبراء يعلوها تحطيط ابيض وشبهها هذه تنحرف الى الجؤرة مع العمر . ذكورها اصبق لوناً من اناثها || تعيش جماعات ، اجلها نحو ٤٠ راسه نيزب واحد وشادنان او ثلاثة || اما انواعه فهي العلب والقرمود والقنمار والقينس والناخس واليرع . (اطلبها في مواضعها) .

٧٠٨١ - جِهَة ، طَرَّة

Face

ظاهر الشيء او صفح سطحه او هيئته او جانبه .

٧٠٨٢ - جُهْدِيَّة

Bioénergétique (F).

Bioenergetic (E).

الجهدية فرع من الفيزيولوجية يبحث في تحويل الجهد في الاجسام الحية .

٧٠٨٣ - جَهْرَاء ، جَهْرَاء

Découvert (F).

Uncovered (E).


ارض جهراء : عراء لا يسترها شيء .

٧٠٨٤ - جَهْرَل *

Hemitragus, Jharals (S).

Hémitrague, Jharal (F).

جنس حيوانات عاشبة مجترة من سبط المخرات وفصيلة الغنميات . انواعه المعروفة ثلاثة ، اثنان موطنها الهند وواحد موطن الجزيرة العربية . ملجئها الحياتي جماعي . آجالها كثيرة العدد . الذكور لا تنضم الى الاناث الا في زمن الدر والسفاد وذلك في اواخر فصل الحريف وتبقى معها حتى اوائل الربيع . قوتها الاعشاب والبلوط || اجسام ذكورها تغول من ١٣٠ الى ١٥٠ سم . وترتفع من ٨٠



جنيوس



جهيل



جهرل

٧٠٩٣ - جَهْلُولُ الرَّمَالِ * Tringa arenaria (S).

Bécasseau sanderling, Sanderling des sables (F).

نوع من الجهلول طوله من ١٥ الى ١٦ سم. ثوبه الصيفي اسود منق بالابيض والاصهب يكثر البياض في بطنه. ثوبه الشتوي ارمي الظهر، ابيض البطن والصدر || يعيش اسراباً كبيرة العدد. يألف الشواطئ الرملية البحرية. قوته القشريات والرخويات يلتقطها بين مد الامواج وجزرها.

٧٠٩٤ - جَهْلُولُ الشَّرْقِ Bécasseau cocorli (F).

طائر من الهساس مشهور باسم هساس جبلي، اطلبه.

٧٠٩٥ - جَهْلُولُ الشَّوْاطِي Tringa maritima (S).

Bécasseau cinde, B. maritime, Brunette (F).

نوع من الجهلول متوسط القد طوله نحو ٢٠ سم. ثوبه متراكب الالوان المنمقة المرقطة يعبق في الصيف ويفتح في الشتاء || اسرابه قليلة العدد. يعيش قرب الشواطئ والمناقع والاهار والبحيرات. قوته الديدان والرخويات والقشريات.

٧٠٩٦ - جَهْلُولُ الْقُطْبِ Tringa canutus (S).

Bécasseau canut, Maubèche (F).

اكبر انواع الجهلول واضخمها جثة طوله نحو ٢٥ سم. ثوبه الصيفي ابلق الظهر يعلوه توشيم اصهب. ثوبه الشتوي رمادي اللون تعلوه رقشة خفيفة اما بطنه في كلا الشويين فالى البياض الاغبر || يعيش اسراباً متوسطة العدد. يألف المناقع وضفاف الانهر والبحيرات. قوته الخلزون والديدان والرخويات.

٧٠٩٧ - جَهْلُولُ صَغِير Tringa minula (S).

Bécasseau minule (F).

نوع من الجهلول صغير القد طوله نحو ١٣ سم. ثوبه الصيفي الى السواد المنق والمرقط بالابيض والاصهب. صدره وبطنه الى البياض الزاهي. اباهره وقوامه ببيض الحنار. ثوبه الشتوي لا سواد فيه. منقاره وارجله سود. اسرابه متوسطة العدد. يألف مجاري الماء والشواطئ. قوته الديدان والحشرات على اختلافها.

٧٠٩٨ - جَهْلُولُ مَنَجَلِي Tringa platyrhynchus (S).

Bécasseau platyrhynque (F).

نوع من الجهلول متوسط القد طوله نحو ١٧ سم. منقاره مشوي الشكل يحوب امريكه الشمالية واروبه. اسرابه متوسطة العدد. يألف المناقع ومجاري الماء. قوته الديدان والرخويات والحشرات والفراش.

٧٠٩٩ - جَهْنَمِيَّة Bougainvillier (F).

Bougainvillia (E).

٧١٠٠ - جَهْيَرَّة Hypécoum (F).

Horned cumin (E).

٧١٠١ - جَهْيَرَّة Ourson (F).

جرو الدب والجلس أثناء.

٧١٠٢ - جَوَّ Atmosphère (F).

Atmosphere (E).

هو الطبقة الهوائية التي تغلف سطح الكرة الارضية.

الى ١٠٠ سم. قرونها مصمتة، مخددة، حيداء تطول من ٣٠ الى ٣٨ سم. اذناها تطول من ٦ الى ٨ سم. رؤوسها مستطيلة. اعناقها وصدرها ومناكبها وافرة الشعر المستطيل. اثوابها الى السرة الختلية يعلوها موج جؤوي. رؤوسها واثاج ظهورها اشد سمرة من سائر الاقسام || اناثها اصغر قدماً من ذكورها واقصر قرناً وضروعها رباعية الاختلاف. محبلها يستمر نحو ١٧٥ يوماً تضع في تمامه جدياً واحداً تقطعه بعمر اربعة اشهر. اما انواعه الثلاثة فهي:

٧٠٨٥ - جَهْرَلُ الْجَزِيرَةِ ، تَعَار

Hemitragus jakarl (S).

Hémitrage de l'Arabie (F).

٧٠٨٦ - جَهْرَلُ جَنُوبِيَّ الْهِنْد

Hemitragus hylocrius (S).

Hémitrage du Sud de l'Inde (F).

٧٠٨٧ - جَهْرَلُ حَمَلَايَا

Hemitragus jemlaicus (S).

Hémitrage de l'Himalaya (F).

٧٠٨٨ - جَهْرُنْ Johrenia (S).

Johrénie (F).

جنس نباتات عشبية برية محولة أو معمرة من فصيلة الخيميات. انواعه المعروفة ثلاثة منبتها جرود لبنان والمناطق السورية المجاورة || سوقها منتصبه فرعاء مألسة اللحاء. اوراقها جذعية ريشية التركيب. ازهارها صيواني التجميع، طرفي الارتكاز. ازهارها صغيرة، صفراء اللون.

٧٠٨٩ - جَهْرُنْ أَتْلِي Johrenia juncea (S).

Johrénie joncée (F).

نوع من الجهرن الممر. ساقه منتصبه رفيعة فرعاء. ازهاره صيواني ثنائي الاشعة اللامتساوية. تنويره صيفي. منبته يمتد من منطقة بعلبك الى جبل الشيخ.

٧٠٩٠ - جَهْرُنْ فُطْرِي Johrenia fungosa (S).

Johrénie longueuse (F).

نوع من الجهرن المحول. ساقه اسطوانية منتصبه قليلة الفروع. ازهاره صيواني سباعي الاشعة اللامتساوية. ثماره بيضية الشكل، فطرية الحافة. تنويره صيفي. منبته الجرود والبقاع.

٧٠٩١ - جَهْرُنْ مُنَشَقَّب Johrenia dichotoma (S).


Johrénie divariquée (F).

نوع من الجهرن المحول. ساقه منتصبه فرعاء. ازهاره صيواني خماسي او سباعي الاشعة المتساوية. تنويره صيفي. يكثر وجوده في الجبل الشرقي وجبل الشيخ.


٧٠٩٢ - جَهْلُول Tringa (S).

Limicole, Bécasseau (F).


جنس طير من عمارة الكنسيات. انواعه ١٢ جميعها من القواطع التي تحوب البلاد الباردة والمعتدلة. اثوابها مرقطة تتبدل صيفاً وشتاء. قوته الخلزون والرخويات والقشريات والديدان. يعيش قرب الماء. يذبح عشه في الرمل. افصوصه بيضي الشكل متوسط العمق. الانثى تبيض من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وحدها من ١٥ الى ١٧ يوماً. اعرف واشهر انواعه ما يلي.




جهلول الرمال




جهلول الشواطئ



جهلول القطب



جهلول صغير



جهلول منجلي

اما فئة جوارح الليل فتشمل قسماً واحداً يتألف من فصيلة واحدة وهو البوميات .

٧١١٠ - جَوَارِحُ اللَّيْلِ ، كَوَاسِرُ اللَّيْلِ

Rapaces nocturnes (F). Nocturnal rapacious (E).

فئة من رتبة الجوارح تشمل قسم اليوم وفصيلته الوحيدة العديدة الانواع .

٧١١١ - جَوَارِحُ الْمَالِ

الاناث التي تلد فتكثر المال كالفرس والناقة واللاتان والبقرة ... (اللسان) .

٧١١٢ - جَوَارِحُ النَّهَارِ ، كَوَاسِرُ النَّهَارِ

Rapaces diurnes (F). Diurnal rapacious (E).

فئة من رتبة الجوارح تشمل كل من قسمي الصقور والنسور مع ما يتبعها من فصائل وعمارات واجناس وانواع .

٧١١٣ - جَوَاسُ *

Cyclommatus (S). Cyclommate (F). Cyclommatus (E).

الذكر جواس والانثى جواسة . جنس خنافس من فصيلة المنظوبيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة متوسطة العدد اعطائها بعض مناطق الاقاليم الحارة الممتدة من العراق الى الهند والهند الصينية || خنافسها ويرقاتها دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة || اجسامها متباينة القد والشكل بين الذكر والانثى . اطوال ذكورها تراوح من ٢٤ الى ٣٢ سم . اما اناثها فن ١٨ الى ٢٢ سم . ذكورها مستلظة الرؤوس الكبيرة . عظيمة التأثير مستطيلة الزباني المرفقية . الدرقية الاطراف . اناثها مفلطحة الكواهل والبطون صغيرة التأثير والزباني . عيونها كبيرة ، جاحظة ، عند الشقين . اغمارها صلبة . قوائمها نشطة . فثايب اناثها مسنة شائكة .

اشهر انواعه جواس الهند المعروف ايضاً بجواس ألبرسي Cyclommatus Albersi (S).

٧١١٤ - جَوَافِ

ضرب من السمك وليس من جيده (القاموس) .

٧١١٥ - جَوَافَة

الجوافة ضرب من السمك وليس من جيده . ج جواف وجوي . (اللسان) .

٧١١٦ - جَوَانَة * ، خَوَي

Rostratula (S). Rhynchée, Râle-bécasse (F). Painted snipe (E).

جنس طير من دجاجيات الارض ، يدعى في مصر بكاشينة مزوقة . انواعه المعروفة اربعة . اعطائها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية تجوؤها صيفاً وشتاء في طلب الرزق . جميعها صغيرة القد ، طويلة الساق ، مستطيلة المناقير الخالسة ، قصيرة الاذنان الذلقة . اناثها جميلة الالوان الزاهية المنسجمة بين الاصهب والاطحل والاصفر والاخضر والابيض . عيونها مطوقة ومكحلة بالاصفر || اناثها اكبر قدماً من ذكورها وازهى خضاباً . ومن ميزات ان الاناث تقاثل لامتلاك الذكور || تألف المناقع وزراعات الارز . تدن في الادغال البدة القريبة من الماء . الانثى تضع من ٥ الى ٦ بيضات يحضنها الذكر || تعتبر من الطرائد الفاخرة اللحم .

Météorologique (F).

Meteorological (E).

مختص بيلم الحوادث الجوية اي الجويات .

Aérométrie (F).

Aerometry (E).

الجواء علم يبحث في خواص الهواء الفيزيائية وفي نتائجها الميكانيكية .

٧١٠٤ - جَوَّاب *

Cetorhinus maximus (S). Pèlerin, Requin-Pèlerin (F). Basking-shark (E).

حيوان بحري ولود من فصيلة الجوايات . اعطانه معظم بحار العالم بجوئها من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب . مسرحة يمي كثير البعد عن المياه الاقليمية . قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والرخويات . ملجئه الحياتي جماعي || جسمه كبير القد ، وشعي الشكل ، يطول نحو ١٤ متراً ، ويزن عدة اطنان . ثوبه الى الكهبة تشتد سمرة عند الظهر ويغبر عند البطن . رأسه شبه مخروطي الشكل . عظمه ذلق شارف . له لاطي* . شدقه كبير وعريض . اسنانه متراسة ، صغيرة ، مخروطية الشكل لا تصلح للاقتراس . يتميز باستطالة فلولجه الخيشومية وبكبر زعنفته الظهرية الخلفية || الانثى قليلة النثر ، تضع في فصل الصيف نحو ٢٥ مجراً .

٧١٠٥ - جَوَّائِيَّات *

Cetorhinidae (S). Cétorhinidés (F). Cetorhinidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية ولودة من رتبة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها معظم بحار العالم اخصها البحار القطبية || اجسامها وشعية ، كبيرة ، ضخمة ، تطول من ١٢ الى ١٥ متراً . اناثها الى الكهبة تشتد سمرتها عند الظهر وتخف عند البطن . رؤوسها شبه مخروطية . اعظامها ذلقة ، شارفة . اشدقها كبيرة ، رجة . اسنانها كثيرة ، صغيرة متراسة || تتميز باستطالة فلولجها الخيشومية التي تطوق علاط العنق حتى النحر ، وبطول اهداب الاقواس الخيشومية الداخلية || اناثها اكبر جرمًا من ذكورها . نتائجها محول وقد يراوح عدده من ٢٣ الى ٢٥ مجراً . اشهر انواعها الجوّاب .

Passereaux (F).

Sparrow, Passeres (E).

رتبة من الطير تشمل بعض الرتيبات والعديد من الفصائل . اشهر فصائلها : الدخليات والزرزوريات والسبديات والشحوروريات والغرايات والقهريرات .

Cheval de selle (F).

Saddle-horse (E).

هو فرس الركوب . ج جياد واجياد .

Jardinier (F). Gardener (E).

هو البستاني المختص بالاعمال الزراعية .


٧١٠٩ - جَوَارِحُ ، كَوَاسِرُ ، سِبَاعُ الطَّيْرِ

Rapaces, Oiseaux de proie (F). Rapacious, R. birds (E).


رتبة من الطير عديدة الفصائل والانواع . مختلفة الاحجام والاشكال والاثواب . جميعها من اللواحم || تقسم الجوارح الى فئتين فئة جوارح النهار وفئة جوارح الليل . وجوارح النهار تقسم الى قسمين قسم الصقور وقسم النسور . قسم الصقور يشمل ثلاث فصائل : الصقريات والاشبوريات والقمقييات . وقسم النسور يشمل ايضاً ثلاث فصائل : النسريات والبلحيات والزماحيات .



جَوَّاب



جَوَّاس (ذكر)



جَوَّاسَة (انثى)



جَوَانَة

٧١٢٧ - جَوْنَلْ أَصْفَر

Epidendrum vitellinum (S).

Epidendre jaune d'oeuf (F).

نوع من الجونل . نبات تزييني ثارب . مهدد المكسيك . ساقه شبه دوفصية . أوراقه سنائية النصال ، متعاقبة متراكبة لونها الى الخضار البحري ، تطول نحو ٢٠ سم . شراخه يعلو من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره ارجوانية اللون تعلوها مشحة برتقالية . شفيفاتها الى الصفار العابق || تنويره خريفي .

٧١٢٨ - جَوْنَلْ الضَّفَادِع

Epidendrum raniferum (S).

Epidendre porte-grenouilles (F).

نوع من الجونل . نبات تزييني ثارب . مهدد المكسيك . ساقه دوفصية . أوراقه سنائية النصل ، مزدوجة التصفيف ، تطول نحو ٢٠ سم . شراخه يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهاره عنقودي التجميع ، مستطيل الشكل . ازهاره الى الخضار الاليس تعلوه رقشة جؤوية || تنويره خريفي .

٧١٢٩ - جَوْنَمَة

Rachée (F).

الجؤمة الارومة الفرعاء اي جذع الشجرة المقطوعة مسح التربة وقد انتش فسائل جديدة .

٧١٣٠ - جَوْن * ، جَاسَكْت ، يَاسْفَتُوس

Hyacinthus (S). Jacinthe, Hyacinthe (F). Hyacinth (E). Hyazinthe, Märzblume (D). Giacinto (I).

جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزنبقيات . ازهارها ذكية العرف ، عنقودية التجميع ، قعية او جرسية الشكل ، هامة الارتكاز تقوم على شراخ غليظ امرط . اوراقها قرصية الانتشاب ضيقة مستطيلة || انواعه قليلة اعرفها الاربعة التالية اما ضروبه واصرامه فكثيرة .

٧١٣١ - جَوْن المَرُوج

Endymion (F).

هو العنصول ، اطلبه .

٧١٣٢ - جَوْن جَمْسِي

Hyacinthus amethystinus (S). Jacinthe amethyste (F).

نوع من الجون البري يكثر في الاربة الكلسية لانه من نباتاتها الطوعية . أوراقه ضيقة مستطيلة طولها من ١٠ الى ٢٠ سم . عرضها من ٤ الى ٧ سم . عددها من ٦ الى ٨ . شراخه الزهري يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره زرقاء اللون متدلية عددها يراوح من ٤ الى ١٢ .

٧١٣٣ - جَوْن رُومَانِي

Hyacinthus romanus (S). Jacinthe de Belleval (F).

نوع من الجون البري . أوراقه اربع او خمس شديدة الخضار طولها من ٤٠ الى ٥٠ سم ، عرضها من ٨ الى ١٨ سم . شراخه الزهري يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ازهاره عادمة العرف كثيرة العدد لونها الى الابيض يعلو توشم اخضر ومشحة بنفسجية داخلية .

٧١٣٤ - جَوْن شَرْقِي ، قَسْطَلْ الارض ، مَكْحَلَة

Hyacinthus orientalis (S).

Jacinthe orientale, J. commune (F). Common Hyacinth (E).

اعرف واشهر انواع الجون واذكاه عيراً . ضروبه اربعة اما اصرامه فكثيرة العدد || اوراقه جميلة الخضار

Interligne (F).

Space-line, Interlining (E).

هي المسافة القائمة بين خطين من الزرع او من الاشجار ج جوبات وجوب .

٧١١٩ - جَوْبَة

Trou de plantation (F).

الحفرة احتفرت وجهزت لاقتبال الغرة . ولا يقال جياب او جوائب الا للحفر المتتابعة المتساوية الخطوط .

٧١٢٠ - جَوْبِيَة * ، قَارَجِيل شِلِي

Jubaea spectabilis (S). Jubée, Cocotier du Chili, Lilla (F). Coquito-palm (E). Coquitopalme (D). Palma del miele (I).

شجرة من النخلات وحيدة الجنس والنوع . مهدا بلاد الشيلي . ساقها منتصبية ، مستقيمة ، تعلو نحو ١٥ م . جذعها مستدق السنع والطرف ، غليظ الوسط حيث يبلغ قطره نحو المتر . سعفها كسيف النخيل . جريدتها تطول نحو اربعة امتار . ازهارها عشكولي التجميع . ثمارها جوزية الشكل . كبيرة القد ، لها آحي التركيب مأكول . ويستخرج من ساقها عند حزها عصارة سكرية دسمة تدعى عسل الجوبية .

٧١٢١ - جُوت * ، جُوتَة ، قَنَب كَلْكُوتَة

Corchorus capsularis (S). Jute, Corette textile, Chanvre de Calcutta (F). Jute plant, Gunny-bag (E). Jutepflanze, Indischer flacks (D). Corcoro siliquaso (I).

نبات عشبي زراعي صناعي حولي من فصيلة الزنبقيات . ساقه ليفية . منتصبية . أوراقه معنقة ، متعاقبة ، بيضوية القاعدة ، سنائية الطرف ، خشنة النصل المسن الحافة . تكثر زراعته في الهند حيث يستعملون لحاء سوقه في صناعة الاكياس والحبال .

٧١٢٢ - جُوت مَنَشُورِيَة

هو ابو تيلون ابن سينا ، اطلبه .

٧١٢٣ - جُوتَة

Rouille (F). Rust (E).

الجوة : صدأ الحديد .

٧١٢٤ - جُوت

Caillette (F). Rennet (E).

الجوت والجوتاء : القبة اي كرش الشاة . (القاموس) .

٧١٢٥ - جَوْنَلْ *

Epidendrum (S).

Epidendre (F). Epidendrum (E).

جنس نباتات برية وتزيينية أمعية او قاربة من فصيلة السحليات . انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ معظمها من نبات امريكة الوسطى || سوقها جذمورية او دوفصية . اوراقها متراكبة ، لحمية مستطيلة . ازهارها فواحة العرف المستحب سنبلية التجميع او عنقودية ، ترتكز على شراخ دقيقة جامدة الالياف . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

٧١٢٦ - جَوْنَلْ أَدَهَس

Epidendrum erubescens (S).

Epidendre rougissant (F).


نوع من الجونل . نبات تزييني ثارب . مهدد المكسيك . ساقه جذمورية اوراقه سنائية ، متعاقبة ، متراكبة تطول نحو ٢٥ سم . شراخه يعلو من ٥٠ الى ٨٠ سم . ازهاره عشكولي التجميع . ازهاره متوسطة القد لونها الى البنفسجي . شفيفاتها صفير القواعد ، حر الاطراف || تنويره خريفي .




جوبية



جوت



جَوْنَلْ



جَوْن

عديدة تألف المناطق المعتدلة . تسرح على وجه الماء .
اجسامها سوداء اللون ، نحيلة . أرجلها دقيقة مستطيلة .

٧١٤٦ - جَوَزْسُ الْمَنَاقِيعِ (S). *Gerris paludum*
(F). *Gerris des mares*

حشرة قانصة من فصيلة شابران الماء ورثة مختلفات
الاجنحة . جسمها متوسط الحجم يطول نحو ١٥ مم . رأسها
شبه مخروطي الشوزن . خطمها صغير وقصير . عيناها
كبيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلتان ، اسمران .
كوسلها مكظف الاطراف . حجفتها صغيرة . ظهرانها لا
يلحف كامل الجسم . سكتها البطنية السادسة مجهزة
بمنخسین يشرفان على الجهاز التناسلي . قوائمها مستطيلة
باستثناء الزوج الامامي || ثوبها الى السمرة السوداء . بطنها
مطوق بخنار تبني اللون ، اسود القواصل السكمية . قوائمها
الى السمرة يشوبها خضاب اصفر || تعيش من قنصها على
سطح الماء . تلقي الاثني جراب مكنها على سطح الماء بين
الاعشاب فيلصق باسداها ويستقر حتى التقف .

٧١٤٧ - جَوَزْسُ فِضِّي (S). *Gerris argentata*
(F). *Gerris argenté*

حشرة قانصة من فصيلة شابران الماء ورثة مختلفات
الاجنحة . جسمها صغير يطول من ٧ الى ٩ مم . رأسها
شبه انبوي الشوزن . خطمها صغير . عيناها جانبيتان
كبيرتان ، ناشزتان . زباناها مستطيلتان اسمران . كوسلها
مجنبي الشكل . ظهرانها لاحف . قوائمها مستطيلة باستثناء
الزوج الامامي || ثوبها العلوي الى السمرة المتماوجة .
بطنها فضي اللون || تعيش من قنصها على سطح الماء .

٧١٤٨ - جَوَزْق (F). *Autruche mâle*
(E). *Ostrich male* هو الظلم ، الذكر من النعام .

٧١٤٩ - جَوَزِي (F). *Rose bifère* (E). *Damask rose*
هو الورد الجوري ، اطلبه .

٧١٥٠ - جَوَزِي (F). *Jurassique* (E). *Jurassic*

نمت تعريفي يطلق على الحقبة الثانية من الاباج الاوسط .
فيقال العصر الجوري والاراضي الجورية || تتميز هذه
الحقبة ببدء استتباب المناطق المناخية ، وبازدهار بعض
الفقاريات كالاسماك والضفادع والزحافات ، وبوجود اول
طائر معروف حتى الآن ويدعى « اريخيس » ، وبظهور
بعض الصنوبريات والسيكاسيات واول نباتات من
مزوجات الفلقة .

٧١٥١ - جَوَز (S). *Juglans* (F). *Noyer* (E).
Walnut-tree

جلس اشجار كبيرة القد دائمة مشرة من فصيلة الجوزيات .
مهدا الشرق الادنى والهند . انواعها محدودة اما ضروبها
فعديدة . اوراقها مركبة عابلة . ازهارها قدية . ثمارها
جوزية الشكل ، قرفية الغلاف الخارجي ، خشبية
القشرة الداخلية ، مأكولة اللب . اخشابها فاشرة
الصنف . قشورها صباغية . اوراقها طيبة تستعمل في
بعض العلاجات || اشهر انواعه الجوز العادي
والاربد ثم جوز الصخور والاسود وسيبولك ومنشوريه .

٧١٥٢ - جَوَزْ أَرْقَم (F). *Conopode à tige nue*
(E). *Arnut* هو الاكثار الاجرد ، اطلبه .

الزاهي يراوح عددها من ٤ الى ٨ طولها من ٢٠ الى
٣٥ سم . عرضها من ١٠ الى ١٥ مم . شراخه الزهري
يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ازهاره مختلفة الالوان يراوح
عددها من ٥ الى ١٥ || اما ضروبه الاربعة فهي :

الجوْنَن الباريْزي *Jacinthe parisienne*
الجوْنَن الروماني *Jacinthe romaine*
الجوْنَن المبكر *Jacinthe précoce*
الجوْنَن الهولندي *Jacinthe de Hollande*

٧١٣٥ - جَوْنَن لَازوردِي (S). *Hyacinthus azureus*
(F). *Jacinthe azurée*

نوع من الجوْنَن البري مهدا الشرق الادنى . اوراقه بحرية
الخضار طولها من ٨ الى ١٥ سم . عرضها من ١٠
الى ١٦ مم . عددها من ٥ الى ٦ . شراخه الزهري
يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . ازهاره متدية كثيفة التجميع
عابقة الازرقاق .

٧١٣٦ - جَوْجُوْ ، قَصَّ (S). *Sternum*
عظام قفص صدر الطائر .

٧١٣٧ - جَوْجُشِيَّات (F). *Carinata* (E). *Carinates*
شعبة من الطير تشمل اكثر من ٢٠ رتبة اشهرها الجوارح
والجوائم والدجاجيات والحماميات والوزيات .

٧١٣٨ - جَوَّح (S). نوع من البطيخ وقيل البطيخ الشامي . الواحدة جوحة .

٧١٣٩ - جَوَّحَل (F). *Chimère* (E). *Chimera*
الجوحل خيال او وهم باطل لا يمت الى الواقع او الحقيقة
بشيء .

٧١٤٠ - جَوَّحَلِي (F). *Chimérique* (E). *Visionary, Fanciful*
نمت تعريفي يطلق على الاسترسال في الجوحة .

٧١٤١ - جَوْد (F). *Pluie abondante* (E). *Abundant rain*
هو المطر الغزير . والتجاويد : الامطار الجيدة النافعة .

٧١٤٢ - جَوْدَار (F). *Seigle* (E). *Rye*
هو الشيلم ، اطلبه .

٧١٤٣ - جَوْدَر (F). *Veau sauvage* (E). *Savage calf*
الجودر والجودور : ولد البقرة الوحشية . ج جوادر وجآذر
قال علي بن اسحق الزاهي :

ويبيض بألحاظ العين كأنما
هززن سيفاً واستلن خناجرا
تصدين لي يوماً بمنعرج اللوى
فقدن قلبي بالتصبر غادرا
سفرن بدوراً وانتقبن اهله
وسن غصوناً والتفتن جآذرا

٧١٤٤ - جَوْر (F). *Gaur, Boeuf gaur* (E). *Indian urus*
هو الغور نوع من ابقار الوحش .

٧١٤٥ - جَوَزْسُ * (F). *Gerris*
جنس حشرات مفترسة من فصيلة شابران الماء انواعه



جورس

أريتها. ولها من الثوبل العطرية المستحبة. دهنها منه شديد الفاعلية ومضاد للرياح || ومنهم من أكل الباب لأغراض جنسية لأنه ينشط الياء غير أن أدمان استعماله يؤدي إلى اضطرابات عصبية خطيرة العواقب.

٧١٦١ - جوز القمي*
Vomiquier (F).
هو السريكنوس، اطلبه. Nux vomica tree (E).

٧١٦٢ - جوز الهند
Cocotier commun (F).
هو النارجيل المعروف، اطلبه. Cocoa-nut palm (E).

٧١٦٣ - جوز بوا*
Muscadier (F).
هو جوز الطيب. Nutmeg tree (E).

٧١٦٤ - جوز جندم
Mangoustancier (F).
Mangosteen tree (E).
شجرة مشمرة من الكلوزيات، اطلب جندم منغستان.

٧١٦٥ - جوز سيبولد
Juglans sieboldiana (S).
Noyer de Siebold (F).
نوع من الجوز مهدد اليان. شجرته تعلو من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أوراقه مركبة وريقاتها زباء النصل على صفحتها السفلى. ثماره كروية الشكل زغبية القرفة عتيديسة التجميع.

٧١٦٦ - جوز عادي*
Juglans regia (S).
Noyer commun (F). Walnut tree (E). Echte wallnuss, Wallnusse (D). Noce (I).
هو أشهر أنواع الجوز وأهمها زراعة. فروبه عديدة جميعها مأكولة الثمار. أشجاره تعلو من ١٢ إلى ٢٤ م. أوراقه مركبة سباعية أو تساعية الوريقات البيضية الشكل المدببة الطرف. نصلها جلدي. امرد البشرة تفوح منه رائحة خاصة تأخذ بالآلاف دون أن ينفر منها. ثماره اللينة الباب المستحب العلم. قشورها الخشبية غليظة مخددة. قرفها الخارجية سميكة، ملساء البشرة، سريعة التفكك || أخشابها جوزية اللون فاخرة الصنف.

٧١٦٧ - جوز كندم
Mangouste (F).
Mangosteen (E).
هو ثمرة جندم منغستان ويدعى الجندم والكندم.

٧١٦٨ - جوز لرتة
Chicote (F). Nicker tree (E).
هو الهندق الهندي، اطلبه.

٧١٦٩ - جوز مائل* ، بقم
Datura metel (S).
Stramoine métel, Métel, Datura métel (F). Metel, Downy thorn-apple (E). Weichhaarige stechapfel (D). Metel, Mela spinosa, Noce metella (I).
نوع من الداتورة وفصيلة الباذنجانيات. وهو نبات جنيني، طبي، سام معمر. ساقه زباء متصبية، مخشوشبة، تعلو نحو المتر. أوراقه معنقة، متقابلة، مفصصة، مفرضة، زغبية النصل. أزهاره كبيرة القد بيضاء اللون فواحة العرف. ثماره جراء متدلية هدية البشرة || أوراقه وثماره سامة يستخرج منها بعض العناصر الطبية النافعة.

٧١٧٠ - جوز مرآني، جوز مجنح
Ptérocaryer (F). Pterocarya (E).
هو العرتون، اطلبه.

٧١٧١ - جوز منشورية
Juglans mandschurica (S).
Noyer de Mandchourie (F).
نوع من الجوز مهدد منشورية وآسية الشرقية. شجرته تعلو

٧١٥٢ - جوز أرمانيوس
Linaire commune (F).
هو الليناريه العادية، اطلبها. Toad-flax (E).

٧١٥٤ - جوز أرمند*
Juglans cinerea (S).
Noyer cendré, N. à beurre (F). Butter-nut (E). Butter wallnuss (D). Noce cenerino (I).
نوع من الجوز مهدد البلاد الأمريكية. شجرته تعلو من ١٨ إلى ٣٥ م. أوراقه مركبة وريقاته من ١١ إلى ١٥ نصلها أزغب البشرة على صفحيه. ثماره مأكولة الباب المستحب العلم، بيضية الشكل، زباء القرفة، دقيقة القشرة الخشبية.

٧١٥٥ - جوز أسود
Juglans nigra (S).
Noyer noir (F). Black-nut (E).
نوع من الجوز مهدد البلاد الأمريكية. شجرته كبيرة القدر تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أوراقه مركبة، وريقاتها من ١٥ إلى ١٧، نصلها امرد الصفحة العليا، أزغب السفلى مسنن الحافة، ضعيف الرائحة الخاصة. ثماره مأكولة، شبه مستديرة، قرفها لاصقة تتفكك بعد يباسها التام، قشرتها الخشبية جامدة. لبها للذ الطعم. خشبه شديد السمرة فاخر الصنف.

٧١٥٦ - جوز الأفمي
Noix de serpent (F).
جوز الأفمي نبات طبي يدعى فقيلة، اطلبها.

٧١٥٧ - جوز البر
Orpin paniculé (F).
Purslane leaved stonecrop (E).
هو حي العالم العشكولي، اطلبه.

٧١٥٨ - جوز الصخور
Juglans rupestris (S).
Noyer des rochers (F).
نوع من الجوز مهدد البلاد الأمريكية. شجرته تعلو من ٧ إلى ١٥ م. أوراقه مركبة، وريقاتها من ١٥ إلى ٢٥، نصلها لسن الشكل، أزغب الصفحة السفلى || ثماره صغيرة القد بيضية الشكل.

٧١٥٩ - جوز الشراك
Amome graines de paradis (F).
هو الحال الجوزي، اطلبه. Black-amomum (E).

٧١٦٠ - جوز الطيب* ، جوز بوا* ، تسباسة
الطيب ، ضبر
Myristica fragrans (S).
Muscadier commun (F). Nutmeg tree (E). Muskatnussbaum (D). Miristica, Noce moscata (I).

نوع من السباسة مهدد البلاد الاستوائية. أشجاره هرمية الشكل تعلو نحو ١٠ أمتار. أوراقها عروية، بسيطة، كاملة، متعاقبة، معنقة، أهليلجية، نصلها بارز العروق المشطية الارتكاز. أزهارها عادية ثنائية المسكن. ثمارها شبه كروية الشكل لحمية القشور الصفرة اللون كالشمس، قطرها نحو ٥ سم. || قشرة الشرة تنفلق عند الإدراك عن جوزة خشبية الغلاف سمراء اللون يلحمها أريل مفرض لونه إلى الحمرة البرتقالية غني بالمواد العطرية يحوي نحو ٨٪ من الإدهان العطرية و ٢٤٪ من الراتج الجامدة و ٣٪ من السكر والمصارة اللابية. أما لباب الجوزة الموجود ضمن الغلاف الخشبي وهو إلى القهوة المضلعة بعروق جزوية. يحوي نحو ٢٥٪ من المواد الدهنية المعروفة بدهن جوز الطيب و ٣٪ من الإدهان الطيارة و ٥٪ من النشا والحمض السباسي.



جوز أرمند




جوز الطيب




جوز عادي




جوز مائل



جوزة



جوزة هندية




جوزق



جوزيت الشيلي



جوساني



جوسيا

البثلات المقعرة || يزدهج للتزيين ازهاره يستمر من تموز الى تشرين .

٧١٨٢ - جَوْشَن Thorax
الجوشن هو صدر الحشرة وفيه توجد الاغداد والرواشن والارجل الامامية والوسطى والخلفية .

٧١٨٣ - جَوْشُوش Bréchet (F). Breast-bone (E).
هو صدر الطائر .

٧١٨٤ - جَوْف بُنِّي Coeur brun (F).
Core flush (E).

عارض يصيب ثمار التفاح المحفوظة في البراد . مظهره خضاب بني يركب جوف الثمرة قرب محيط بزورها فيعطب الداخل دون ان يمتد الى الطبقة السطحية والخارج . يقال ان اسبابه الرئيسية تعود الى ارتفاع نسبة الغاز الكربوني في غرفة التبريد والى حفظ الثمار في درجة منخفضة تقارب الصفر .

٧١٨٥ - جَوْف مَائِي Water core (E).
عارض يصيب ثمار التفاح قرب ادراكها فيغشيها ببقع فسحة لاقياسية الشكل والقذ تعلو البشرة من جهة معرض الشمس يقابلها من الداخل ، خاصة قرب وسط الثمرة ، جيوب قاسية صلبة لا لون لها تبدو كالماء || اسبابه المقدرة وطأة اشعة الشمس والحرارة ثم انفلاق بعض الخلايا التي تصبح كالجيوب .

٧١٨٦ - جَوْفِي Phréatique (F).
Underground water level (E).
نمت تعريفي يطلق ، في علم الجيولوجية ، على كل جيب مائي ديماسي الموقع .

٧١٨٧ - جَوْقَلَة Aéroportage (F).
الجوقلة النقل بطريق الجو .

٧١٨٨ - جَوْقَلِي ، مُجَوْقَل Aéroporté (F).
Airborne (E).
نمت تعريفي يطلق على ما ينقل بطريق الجو . يريد جوقلي . جيوش مجوقلة .

٧١٨٩ - جَوْكِي ، قَبَّاس ، مُقَاوِس Jockey
هو الذي يركب الفرس ويرسله في حلبة اسباق .

٧١٩٠ - جَوْو Paroi, Cloison (F).
Coat, Dissepiment (E).
الجلو والجلال ج أجوال . هو الحاجز الحجروي او الخليوي .

٧١٩١ - جَوَلَق Landier (F). Furzè (E).
هو الوزال ، اطلبه .

٧١٩٢ - جُولِيَانَا Hesperis (S). Julienne (F).
جنس نباتات عشبية زهرية من فصيلة الصليبيات اوراقها متعاقبة . ازهارها عنقودي . ازهارها لاقنابية ، عطرية العرف || اشهر انواعه وأعرفها ما يتبع .

من ١٥ الى ٢٥ م . اوراقه مركبة وريقاتها من ٩ الى ١٩ نصلها مستطيل الشكل ، مدبب الطرف المسن ، ازغب الضلع . ثماره مأكولة اللباب .

٧١٧٢ - جَوَزَاء Orion (F).
الجوزاء كوكبة نجوم جنوبية الموقع تسمى ايضاً الجبار ، اطلبه .

٧١٧٣ - جَوَزَات liôts de liber (F).
غدد في اللحم فرق الشكير .

٧١٧٤ - جَوَزَة Noix (F). Walnut, Nut (E).
هي ثمرة الجوز وتطلق على كل ثمرة تشبه الجوز .

٧١٧٥ - جَوَزَة هِنْدِيَّة Noix de Coco (F).
Cocoa-nut (E).
الجوزة الهندية وجوزة الهند جمعها جوز هندي هي ثمار النارجيل .

٧١٧٦ - جَوَزَق Noix de coton (F).
Juz'ah (القاموس) . Nut of cotton (E).

٧١٧٧ - جَوَزَل Pigeonneau (F).
Young pigeon, Squab (E).
فرخ الحمام قبل وبعد نبات ريشه .

٧١٧٨ - جَوَزِيَّات Juglandaceae (S).
Juglandacées (F). Juglandaceae (E).
هي الفصيلة الجوزية من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات . اجناسها خمسة . ازهارها بحبيحة ، الذكورية منها قدية الشكل متدلية والانثوية سنابل منتصبه محاح .

٧١٧٩ - جَوَزِيَّت الشيلي * Geositta cunicularia (S). Géositte du Chili (F).
طائر من فصيلة الفرناريات . موطنه بلاد الشيلي . يألف الغابات ولا يخشى الاقتراب من حدائق الاماكن الآهلة || جسمه قريب الشبه بالفرنار . طوله نحو ١٤ سم . ثوبه الى الصحرة الموشحة بالاسمر . زوره عاجي اللون . صدره وبعطنه الى الشقحة المرقوشة بالاسمر . حدقة عينه عسلية اللون || قوته الحشرات الصغيرة والنمل والبزور || وكنته افصوص يخلده في التربة قرب جذوع الاشجار . الانثى تضع من بيضتين الى اربع بيضات تحضنها بمنوبة الذكر نحو اسبوعين .

٧١٨٠ - جَوَسَانِي * Bovista (S). Boviste (F).
جنس فطور كروية الشكل من فصيلة الفقعيات . انواعه عديدة تعيش على المواد العضوية المنحللة في التربة . اشهرها واعمها الجوساني الرصاصي وهو من الفطور المأكولة . والجوساني الجبار الذي يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . وهو مأكول ايضاً شرط ان يجنى قبل تمام ادراكه .

٧١٨١ - جَوَسِيَّة * ، طَبِيحَا Jussiea (S). Jussiea (F). Primrose-willow (E).
Jusslene (D). Jussiea (I).
نبات عشبي لبي معبر وحيد الجنس والنوع ، قليل الضروب من فصيلة الاخدرديات . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقه زباء اللحم . اوراقه مترادفة ، اهليلجية ، لسنة . ازهاره صفراء اللون ، كبيرة القذ ، خماسية

٧٢٠٠ - جُونِسَة
Banaste (F).
سل متوسط القد مضفور بالقصب او بالقصبان الدقيقة يستعمل في نقل الثمار وبعض الخضار وما اشبه .

٧٢٠١ - جُونِي
Syrhapte (F). Black-bellied (E).
هو النصف ، اطلبه .

٧٢٠٢ - جُونِيَّات ، غَضَفِيَّات
Pteroclidæ (S). Pteroclidés (F). Pteroclidæ (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تتميز بحال خلقها وزخرفة ألوانها وانسجام شكلها وصغر رأسها وقصر منقارها واستطالة قوائم سقطها . وهي شديدة الطيران تقيم في الفيافي والاحراج || انواعها عديدة تجتمع الى جنسين النصف والقطا .

٧٢٠٣ - جُونِيَّة
Ganga oriental (F).
Imperial sandgrouse (E).
طائر من القطا يعرف بالقطة الشرقية .

٧٢٠٤ - جَوْهَر خَام
Principe brut (F).
Rough principle (E).
هو الجوهر المميز الموجود في مادة معينة .

٧٢٠٥ - جَوْهَر فَعَال
Principe actif (F).
Energetic principle, Active principle (E).
هو الجوهر العنصري المميز الموجود في الجوهر الخام .

٧٢٠٦ - جَوْهَر مُنَهَضِم
Principe digestible (F).
Digestible principle (E).
هو الجوهر القابل الانهضام من اصل الجوهر الخام .

٧٢٠٧ - جَوْهَرَة
Perle (F). Perla (E).
هي اللؤلؤة . ج جواهر .

٧٢٠٨ - جَوْهَرِيّ ، خَاصّ ، ذَاتِي
Intrinsèque (F). Intrinsic (E).

٧٢٠٩ - جَوْهَل ٥ ، عَدَاء الشَط ٥
Actodroma (S). Actodrome (F). Actodroma (E).
جنس طير من طوال الساق وفصيلة الكنتسيات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ٢٢ سم . رؤوسها صغيرة . مناقبها مستطيلة ، دقيقة ، جالسة . قوائمها نحيلة . اذنانها قصيرة . اجنحتها لاحفة || يكثر وجودها على الشواطئ حيث تتمتع بالحشرات وما يلفظه البحر من رخويات وقشريات || أشهر انواعه الجوهرل القزم او عداء الشط القزم (Octodroma minuta) الذي يطول نحو ١٥ سم . والذي يمضي فصل الشتاء على شواطئ البحر الاحمر .

٧٢١٠ - جَوِيَّات
Météorologie (F).
Meteorology (E).
هي الاحداث الجوية .

٧٢١١ - جَوِيْسَة ، أُسْبِرُولَة
Asperula (S).
Aspérule (F). Woodruff (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من سبط الجويسيات وفصيلة الفويات . انواعه عديدة معظمها اعشاب معمرة قرعاه السوق المفصلة . اوراقها صغيرة ، متقابلة ، مدببة الطرف ، جامدة النصل . ازهارها هامي الارتكاز ،

٧١٩٣ - جُولِيَّانَا حَزِينَة
Hesperis tristis (S).
Julienne triste (F).
نوع من الجوليانا وهي عشبة زراعية تزيينية محولة او معمرة نسبة الى موقع زراعتها . تعلو من ٣٥ الى ٦٠ سم . اوراقها الجذعية السفلى معتقة اما العليا فحاضنة وبسنة الحافة || ازهارها متدلية ، ضيقة البتلات ، فستقية اللون يعلوها تخديج بنفسجي || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٧١٩٤ - جُولِيَّانَا شَرْقِيَّة
Hesperis violacea (S).
Julienne d'Orient (F).
نوع من الجوليانا وهي عشبة زراعية تزيينية حولية ومحولة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ساقها زغبية . اوراقها حاضنة ، مسنة ، خلية النصل . ازهارها كبيرة القد ، كثيرة العدد لونها الى البنفسجي الزاهي يعلوها تخديج احمر . ازهارها ربيعي .

٧١٩٥ - جُولِيَّانَا نِسَائِيَّة * ، زَهْرَة الْمَسَاء الجميلة
Hesperis matronalis (S). Julienne des dames, J. des jardins, Girarde, Cassolette (F). Queen's gilliflower, Sweet rocket (E). Matronenviole, Nachtviole (D). Esperide del giardino, Giuliana, Girarda (I).
نوع من الجوليانا وهو نبات عشبي زراعي تزييني معمر يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه معتقة مستطيلة ، سنائية النصل ، مسنة الحافة . ازهاره كبيرة القد ، زرقاء او بنفسجية اللون ، يتضرع اريجها العطر الاخاذ عند المساء || ضروبه عديدة ، منها المكبس والابيض والاحمر والليلكي ... ازهاره يستمر من ايار الى ايلول .

٧١٩٦ - جُومِيْس ٥
Geomys (S). Géomys,
Gauphre à poches (F). Pocket gopher, Pouched rat (E). Taschenratte, Gopher (D).
جنس حيوانات لبونة قاضمة جاسة من فصيلة الجوميسيات . انواعه نحو ٣٠ جميعها صغيرة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . اذنانها من ٦ الى ٨ سم . رؤوسها غليظة . مناقبها مقطوعة . عيونها خرزوية . اذنانها لا قوفية . جرائزها قصيرة . اصابعها طويلة . اطافيرها كبيرة مقوسة حادة || اناثها تحمل ستة اطفال وتضع من ٤ الى ٦ ادراص . اجحارها فسيحة الجوانب تقيمها في الحوم تحت جذور الاشجار على اعناق تراوح بين ١٢٠ و ١٧٠ سم . انفاقها طويلة متعرجة . قوتها المواد النباتية على اختلافها .

٧١٩٧ - جُومِيْسِيَّات ٥
Geomyidae (S).
Géomyidés (F). Geomyidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة قاضمة جاسة من رتبة قردنيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها سبعة . انواعها ٨٢ تتميز بحبوبها الخدية التي تجمع فيها القوت . اجسامها اسطوانية الشكل صغيرة القد . موطنها البلاد الامريكية قوتها الجذور والاعشاب وجميع المواد النباتية .

٧١٩٨ - جُون
الجون : النبات يضرب الى السواد من خضرته .


٧١٩٩ - جُونَة
Disque du soleil couchant (F).
قرص الشمس عند المغيب .



جوليانا نسائية



جومييس



جَوْهَل



جويسة الصباغين




جويسة برية



جويسة عطرة



جيترة متوجة



جيترة معبونة

٧٢٢٢ - جَيْتَب الرُّكْمَةِ °
Poche copulatrice (F).
Copulatory saccus (E).

٧٢٢٣ - جَيْبُون
Gibbon
هو الجبون ، راجعه .

٧٢٢٤ - جِيَّة
Eau stagnante (F).
Stagnant-water (E).

هو الماء الآسن . ومن ثعلب : « الماء المستنقع في الموضع » .

٧٢٢٥ - جَيْتَرَةٌ
Blennius (S).
Blennie (F). Blenny (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الجيتريّات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها معظم بحار العالم اخصها المحيط الاطلسي والهادي والبحر الابيض المتوسط . تألف معاشب الجراح والتفاف || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ الى ٦٠ سم . رؤوسها مستغلفة ، مقطوعة الخاطم ، محدبة الاطراف ، يعلوها في جباهها او فوق عيونها لوامس متفاوتة الاشكال والاحجام || اثنائها ملونة . ذكورها اكثر خصاباً من اناثها . حراشفها شديدة الصغر يعلوها مادة لزجة || زعانفها الظهرية كبيرة ، شبه شراعية الشكل ، مستطيلة الشع الغضروفية اللينة || اناثها تلصق السرة في سقوف انفاق الخورم وتحميه بمنابرة ذكورها حتى التفك || اشهر انواعها الجيترة المتوجة والمعبونة والهلولة .

٧٢٢٦ - جَيْتَرَةٌ مُتَوَجَّةٌ °

Blennius gattorugine (S).
Blennie gattorugine (F). Gattorugine (E).

نوع من الجيترة . اعطانها نقاف ومجادح البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم . رأسها صغير الجرم ، قصير الخطم . عيناها كبيرتان رفيعتان الارتكاز . لوامسها كبيرة متشعبة منها اثنتان فوق الحاجبين واثنتان على القفن || ثوبها الى السرة يعلوها تجلجج جزوي يمتد من الظهر الى الاطليين . زعانفها صفراء اللون . الذكر ازهى ثوباً من الانثى واميز قداً منها || زعنفتها الظهرية وحيدة مستطيلة مجذعة بالجزوي . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٢٢٧ - جَيْتَرَةٌ مَعْبُونَةٌ °

Blennius ocellaris (S).
Blennie ocellée (F). Ocellate blenny (E).

نوع من الجيترة . اعطانها نقاف ومجادح البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه اهليلجي الشكل يطول نحو ٢٢ سم . رأسها مستضخم الجرم مقطوم الخطم . عيناها كبيرتان ، جاحظتان ، رفيعتان الارتكاز . لامستها منشعبتان الاطراف ، منتصبتان فوق العينين . ثوبها الى الخفصار الزيتي يعلوه تبقيج لاقياسي التدوير ازرق اللون عند الذكر ، اخضره عند الانثى || زعانفها ملونة . الظهرية الاولى كبيرة القد شراعية الشكل مستطيلة اسلاك الشع ، يعلوها زئمة كبيرة شديدة الزرقة مطوقة بالابيض . زعنفتها الصدرية مروحية الشكل منحنية الشع . زعنفتها الذيلية مستديرة الطرف . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٢٢٨ - جَيْتَرِيَّات
Blennidae (S).
Blenniidae (F). Blenniidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزعانف . اجناسها

عنقودي التجميع . ازهارها تويحية البتلات ، رباعية الاسدية ، ثنائية الميسم || اشهر انواعها ما يتبع .

٧٢١٢ - جُوَيْسَةُ الصَّبَاغِينَ * ، أُسْبُرُولَةُ صِبَاغِيَّةٌ
Asperula tinctoria (S). Aspérule tinctoriale. Petite garance, Rougeole (F). Three lobed woodruff (E). Färbarmeier, Weiss meyerkraut (D). Asprella dei tintori, Stellina dei tintori (I).

نبات عشبي بري معمر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه خيطية مرطاة النصل . ازهاره وردية . جعثنته صفراء اللون صباغية || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٧٢١٣ - جُوَيْسَةُ بَرِّيَّةٌ * ، أُسْبُرُولَةُ بَرِّيَّةٌ

Asperula arvensis (S). Aspérule des champs (F). Field woodruff, Quinsy wort (E). Ackermeir, Bräunwurz (D). Asperula dei campi, Stellina ruvida (I). نبات عشبي بري حولي يكثر في الاراضي البور . ترعاه الماشية . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقه مسنة الحافة . ازهاره عطرية لونها الى الزرقة الجميلة .

٧٢١٤ - جُوَيْسَةُ عَطِرَةٍ * ، أُسْبُرُولَةُ عِطْرِيَّةٌ

Asperula odorata (S). Aspérule odorante, Reine des bois, Petit Muguet (F). Sweet woodruff, Sweet grass, Muguet (E). Mariengrass, Meierkraut, Waldmeir (D). Asperula odorosa, Raspello odoroso, Piccolo mughetto (I).

نبات عشبي معمر يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه مستطيلة سنانية الزام الاخير . ازهاره بيض عطرية . يكثر في المراعي وفي الاراضي البور . ترعاه الماشية بشهية ويكسب الحليب بعض عرقه المستحب . جعثنته وسوقه تحتفظ ، بعد تجفيفها ، بعرفها العطري || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٧٢١٥ - جُوَيْسِيَّات
Asperulées (F). Asperula (E). سبط من فصيلة الفويات .

٧٢١٦ - جَوِيل

الجويل ما سفرته الريح من حطام النبات وسواقط ورق الشجر .

٧٢١٧ - جِيَاد ، خَيْل الرُّكُوب

Chevaux de selle (F). Saddle-horses (E). هي الخيل المعدة لحمل ونقل فرسانها بسرعة . لذلك يجب ان تكون خفيفة ، نشيطة ، قوية العضلات لتتمكن من السير السريع المستمر .

٧٢١٨ - جِيَاد الرِّهَان ، خَيْل الرِّهَان

Chevaux de course (F). Race-horses (E). هي الخيل التي صار تحضيرها وتضميمها للمباراة في ميدان السباق .

٧٢١٩ - جِيَال

Hyène (F). Hyena (E). هو الفص . يقال انبش من جيال .

٧٢٢٠ - جِيَال °

Ambulatoire (F). Ambulatory (E). نعمت تريفني يطلق على ما هو متعلق بالمشي كقولك جرامز جياالة اي انها معدة للمشي .

٧٢٢١ - جَيْبُ التَّام

Cosinus (F). Cosine (E).

٧٢٢٣ - جَيْتُحْلِيٌّ ° Mégalithique (F).

Megalithic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل بناء شيد بالحجارة الضخمة في زمن ما قبل التاريخ .

٧٢٢٤ - جَيْدٌ ، رَقَبَةٌ ، عُنُقٌ Cou (F). Neck (E).

٧٢٢٥ - جَيْدٌ آر

الجيدار : نبات ورقه كورق السنديان له حب احمر يسمى بالقرمز .

٧٢٢٦ - جَيْدَلٌ Pénis des cétacés (F).

Penis of Cetacean (E).

الجيدل قضيب ذكور الحوتيات .

٧٢٣٧ - جَيْدَرَةٌ ° Hexanchus griseus (S).

Hexanche gris. Griset (F). Hexanchus griseus (E).

سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة الجيدريات ورتبة الاشلاق . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والبحر الابيض المتوسط . مرتعها يمي . اخلاقتها شرسة لا تعف عن سمكة تستطيع اليها سبيلاً || جسمها وشعي الشكل يطول نحو ستة امتار . رأسها شبه مخروطي الشوزن . اعكامها الخيشومية فلولج سداسية الازواج . زعنفتها الظهرية قريبة من الرأس . زعنفتها الذيلية مستطيلة ومقطوعة الطرف || ثوبها الى الكهبة يسر عند الظهر ويغير عند البطن . تتميز بكثرة النثار . الانثى تضع مرة في العام نحو ٧٠ مجراً طول المجر نحو ٦٠ سم .

٧٢٣٨ - جَيْدَرِيَّاتٌ ° Notidanidae (S).

Notidanidés (F). Notidanidae (E).

فصيلة اسمك ولودة من رتبة الاشلاق . اعطانها بعض بحار العالم اخصها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من الاسماك اليمية التي تهتم عن المجاذج والشطوط || اجسامها مستطيلة وشعية الشكل وحيدة الزعنفة الظهرية . افواهها سفلية الارتكاز . فلولجها الخيشومية سداسية او سباعية الازواج . شوار ذكورها ثنائي الجيدل يحتل مركز الزعنفة الخشوية || اعرف اجناسها واشهرها الجيدرة والرساع .

٧٢٣٩ - جَيْسُرٌ Chaux (F). Lime (E).

هو الكلس ، اطلبه .

٧٢٤٠ - جَيْسُرَادِيَّةٌ جَيْسُرَادِيَّةٌ

Gerardia (S). Gerardie (F). Gerardia, False foxglove (E). Gerardie (D). Gerardia (I).

جنس نباتات عشبية زيبية من فصيلة الخنازريات . انواعها قليلة مهددا البلاد الامريكية . جميعها اعشاب صغيرة القد، فروعها السوق، متقابلة الاوراق الرخية الصغيرة . ازهارها جميلة الشكل ، تاجية الارتكاز ، حراء اللون او صفراء || ازهارها يستمر في فصلي الربيع والصيف .

٧٢٤١ - جَيْسُرَانِيُومٌ Geranium

هو الغرنوق نبات عشبي عطر .

٧٢٤٢ - جَيْسُرَةٌ ° Jaera (S). Jaera (F). Jaera (E).

جنس دويبات مائية من القشريات العليا متساويات الارجل وفصيلة الدبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض اسقاع البلاد الباردة . تعيش في المياه العذبة القليلة الغور . ملجئها الحيائي جماعي || اجسامها،

وانواعها المعروفة نحو ٧٠ . اعطانها معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة . مسرحها مجاذج النفاق حيث تكثر النباتات البحرية والحيات || اجسامها لاقبسية الحجم منها الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومنها الفلساء والعريضة والقليلة السنف . رؤوسها كبيرة مستغلظة . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة الاطراف . اسنانها حادة قوية || اشهر اجناسها الجيتر والطرطوب والناشة وفراشة البحر والعريك ...

٧٢٢٩ - جَيْتُومٌ بَشِيرٌ °

Geotomus punctulatus (S).

Géotome ponctué (F).

حشرة من السدنوس وفصيلة الفاسياتيات . مرتعها السواحل والشطوط البحرية || جسمها مفلطح ، شبه بيضي الشوزن ، صغير القد ، يطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى الجؤوة يعبق في الرأس والصدر والخجفة ويهت في حنجب الظهران . بطنها الى الخنطي . رأسها شبه مكور الشكل ، قليل التنوع . عينها صغيرتان ، بارزتان . زبانها اسمران . كوسلها بشير الجائنين ، مالمس الوسط وحجفتها كذلك . قشرانها شفاف . ظنايبها الامامية سوطية الاطراف ، شائكة الهلب . الافخاذ الخلفية عند الذكور عادة الهلب || رائحتها كريهة .

٧٢٢٠ - جَيْشَلٌ شَرِيدٌ °

Formicivora domicella (S).

Fourmiller domicelle (F).

طائر من فصيلة الجيشتيات لاقفات النمل الجواثم . موطنه البرازيل والبلاد المجاورة . يألف الادغال والغابات || جسمه معتدل القد يطول عند الذكر نحو ٢٠ سم . ويطول عند الانثى نحو ١٧ سم . ثوب الذكر الى السواد الاسم اللامع باستثناء لوحاف الاجنحة ولحاظ القوادم فانها بيضاء اللون . حدقة العين الى الحمرة الياقوتية . المنقاد متوسط الحجم ، مستدق الطرف . الرسغان والاصابع الى السمرة . ثوب الانثى الى الطحلة السمراء يعلوها في صدرها بعض التوشيم الاسود || طيرانه قصير الشوط . يتنقل على الارض بخفة ويعدر بسرعة . قوته النمل قبل كل شيء ثم الحشرات الصغيرة والديدان وبعض البذور || يدثن عشه في الدغل على ارتفاع متر او مترين عن سطح الارض . الانثى تبيض مرتين في الحول وتضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٧٢٢١ - جَيْشَلِيَّاتٌ ° Formicariidae (S).

Formicaridés, Myothéridés (F). Formicariidae (E).


فصيلة طير من لاقفات النمل الجواثم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية . تألف الغابات الكثيفة الاشجار حيث تكثر الرطوبة وترتفع الحرارة . ملجئها الحيائي جماعي . جماعتها متفاوتة العدد . قوتها الحشرات واخصها النمل || تتنقل على الارض بخفة اما طيرانها فقليل وبطيء || اعرف اجناسها واشهرها الجيشل والموآق .

٧٢٢٢ - جَيْتُحَلٌ ° Mégalithe (F). Megallith (E).


حجر ضخيم كبير قائم او ممدد يعود الى عصور ما قبل التاريخ .



جيشل شريد



جيدرة




حاصود




حاضن



ورقة حاضنة



حاضنة آلية



حاقول سمّان

٧٣٣٧ - حافريّة - Calceolaira (F). Calceolaria (E).
اطلب مرموزة .

٧٣٣٨ - حافيز - Mobile, Motif (F).
Mobile, Moving (E).
راجع باعث .

٧٣٣٩ - حافيطه نباتيّة - Herbiar (F).
Herbarium (E).
اضبارة خاصة تحفظ فيها الاعشاب بعد تجفيفها .

٧٣٤٠ - حاقّل - باع الزرع في سنبله . حاقله : باعه الزرع في سنبله
والحاقلة : بيع الزرع قبل بدو صلاحه .

٧٣٤١ - حاقُول - الحاقول : سمك اخضر طويل (اللسان) .

٧٣٤٢ - حاقُول سمّان* ، سمّان ٥ - Pomacentrus symmanus (S). Pomacentre
symman (F). Pomacentrus symmanus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الفرغيات ورتبة شائكات
الزعانف . اعطائها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط
اخصها المناطق الشرقية . تعتبر من اسماك الثقاف || جسمها
بيضي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم
نوبها الى الريدة الزرقاء الموج تعلوها مشحة سمراء في الرأس
والظهر . ويملأها ببقيع فحيمي عند الذكر ، اصفر عند
الانثى . زعانفها الى الريدة البحرية السمراء . رأسها يرمي
الشكل ، قصير الخطم ، صغير الشدق . فكها الاسفل
يتقدم الاعلى . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متحركة . عينها
صغيرتان ، مائحتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة .
زعنفتها الذيلية مستضخمة ، فارقة || لحمها متوسط الصنف
مأكول .

٧٣٤٣ - حاكف - Désactif (F). Disactive (E).
الحاكف من استرخى في عمله .

٧٣٤٤ - حاكيل ٥ ، دافيه ٥ - Exotique (F).
Exotic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل غريب من الحيوان والطيور .
ج حواكل وحكل . والحواكل والحكل العجم من البهائم
والطيور .

٧٣٤٥ - حَال - Traîneau de battage (F).
Drag-net (E).
هو النورج .

٧٣٤٦ - حَالِب - Urètre (F). Urethra (E).
هو قناة بين المثانة وفتحة الاحليل يخرج منها البول لذلك
يدعى مجرى البول .

٧٣٤٧ - حَالِب الشلخ - Canal déférent (F).
Canal deferent, Vas deferens (E).

هو قناة نقل الوداف تخصيصه ما يلي : حالب الشلخ
في الحيوان عامة والصوك في الخيل والعصب في الابل والذين
في الابقار والذفر في النعم والماعز والكواض في الطير
والركبة في الحشرات . وهما حالبان او اسهران .

٧٣٤٨ - حَالَة ، بَيّان - Etat (F). Case (E).
هي جماع الصفات القانونية العالقة بالانسان والتي يقيم
القانون المدني لها وزناً .

٧٣٣٣ - حاصد، حَصَاد - Faucheur (F). Mower (E).
من حصد الزرع او من كانت مهنته الحصاد .

٧٣٣٤ - حاصيل ، حَصِيلَة ، نَتِيجَة - Résultat (F). Result (E).

٧٣٣٥ - حاصيل ، نَتِيج - Produit (F). Produce (E).
هو كل ما تنتجه الارض من مختلف الزراعات وهو ايضاً
ما تنتجه الصناعات .

٧٣٣٦ - حاصِلَة - Résultante (F). Resulting (E).
الحاصلة هي القوة الصادرة عن فعل قوى شتى .

٧٣٣٧ - حاصود* ، مِقْصَب ، مَحْش - Faux (F). Scythe (E).
آداة اكبر من المنجل تستعمل لحصد الزرع وحش الكلا .

٧٣٣٨ - حاضين* ، رَاحِم - Poule couveuse (F).
Brooding-hen (E).
هي الدجاجة الرقواء التي تحضن بيضها .

٧٣٣٩ - حاضِنة* - Auriculée (F). Auriculate (E).
نعت تعريفي يطلق على الورقة اللاطئة التي تحضن اذنينها
الساق .

٧٣٣٠ - حاضِنة* - Couveuse, Incubateur (F).
Incubator (E).

هي آلة حضن البيض الصناعية . اشكالها واحجامها
عديدة أما المطلوب منها ثابت لا يتبدل وهو تأمين الحرارة
اللازمة في مختلف مواقع ومراحل حضنها بمعدل يراوح
من ٣٩ الى ٤١ درجة سغ . ثم تأمين الرطوبة اللازمة
وتمكن انقلاب البيض . وكل هذا في بيئة لا
يعتورها فساد الهواء .

٧٣٣١ - حَالَة البَلَوْرَة - Epipleure (F).
Epipleuron (E).

هي في الحشرات الغمدية الجناح حافة الغمد الخارجية
المنحرفة الى اسفل .

٧٣٣٢ - حَافِر - Sabot (F). Hoof (E).
هو ظفر الخيليات الذي يغطي آخر سلامى الاصابع .

٧٣٣٣ - حَافِر المَهْر - Hermodactyle (F).
Finger of hermes (E).
هو الشقليل ، اطلبه .

٧٣٣٤ - حَافِرَات ، مُنْجَحِرَات - Orycteropidae (S). Oryctéropidés (F). Oryctero-
pidae (E).

فصيلة حيوانات من رتبة الدرد اشهر اجناسها الحفار او
خنزير الارض .

٧٣٣٥ - حَافِرِيّ ، ذُو حَافِر - Solipède (F).
Soliped (E).
هو كل حيوان له لمصبع واحدة تدعى الحافر . كالفرس .

٧٣٣٦ - حَافِرِيَّات - Ongulés (F).
Hoofed, Ungulate (E).

الحافريات شعبة تشمل رتب مفردات الاصابع ومزدوجات
الاصابع والخرطوميات . اي انها تشمل ما نسميه ذوات
المف والمف وذوات الغلف .

٧٣٦٠ - حَامُض آزُونِي ، حَامُض آزُونِيك ،
حَامُض نَيْتْرِيكِي

Acide azotique, A. nitrique (F). Azotic acid, Nitric acid (E).

سائل حامضي كثير الاستعمال الصناعي يحصل من مزجه بالصودا أو البوتاس نترات الصودا أو نترات البوتاس وهما سادان كياويان شهيران .

٧٣٦١ - حَامُض أُسْكُرْبِيك ، حَامُض
أُسْكُرْبُوطِي ، حَامُض نَيْسَرِينِي

Acide ascorbique (F). Acid ascorbic (E).

من الفيتامين « ث » مضاد للحفر . يوجد في بعض الثمار اخصها النسرين والكشمش والليمون والبرتقال والفراز (الفراوله) الخ .

٧٣٦٢ - حَامُض إَشْنِي ،
Orsellic acid (E).

بلورات ابرية عادمة اللون والرائحة ، مرة الطعم توجد في الاشنة وفي معظم الشحميات .

٧٣٦٣ - حَامُض أَفْخُونِي (F) Anthemic acid (E).

حامض يستخرج من زهر الاقحوان الشريف اي البابونج .

٧٣٦٤ - حَامُض الْبُورِيك ، حَامُض بُورِيك
Acide borique (F). Acid boric (E).

جسم متبلور يستخرج من البورق .

٧٣٦٥ - حَامُض الْفِينِيك ، حَامُض فِينِيك
Acide phénique (F). Carbollic acid (E).

جسم متبلور ابري التركيب حريف قوي الرائحة يستعمل كطهر ومضاد للطفيليات .

٧٣٦٦ - حَامُض الْفُسْفُور ، حَامُض فُسْفُورِي
حَامُض فُسْفُورِيك

Acide phosphorique (F). Acid phosphoric (E).

من اغذية النبات الرئيسية .

٧٣٦٧ - حَامُض الْكِبْرِيْت ، حَامُض السُلْفُور
Acide sulfureux (F). Sulphur acid (E).

من الغازات الخافقة . يستعمل في مكافحة بعض الامراض الفطرية وفي بعض الصناعات .

٧٣٦٨ - حَامُض أَنْجِدَانِي (F). Ferulic acid (E).

بلوراته ابرية عادمة اللون والطعم والرائحة . يستخرج من الانجذان . تأكسده أو اكسدته تعطي الحامض الويلي .

٧٣٦٩ - حَامُض أَنْجِيلِيك

Acide anigélique, A. tigilique (F). Acid angelic (E).

بلورات ابرية عادمة اللون والرائحة . يوجد في جنود حشيشة الملاك والسنبيل .

٧٣٧٠ - حَامُض إَهْلِيلِجِي ، حَامُض كَابِلِي
Acide chebulinique (F). Acid chebulic (E).

بلورات صميقة متناهية الدقة عادمة اللون . جزءها ينوب في ١٥٠٠ جزء من الماء البارد وفي ١١٠ جزء من الاثير || يوجد في الاهليلج .

٧٣٤٩ - حَالِق * ، عَطْفَه (F). Tendril (E).

ورقة تحول نصلها الى ضلع ليفي التركيب اسطواناني الشكل مستطيل يمكن النبات من التسلق والتعلق كما في الكرمة .

٧٣٥٠ - حَالِق الشَّعْر
Bryone blanche (F). White bryony (E).

اطلب فاشرا بيضاء .

٧٣٥١ - حَالُوش * ، مَالُوش ، حَرَّائَة ، كَلْب
الْمِي

Gryllotalpa vulgaris (S). Courtillière, Taupe-grillon (F). Mole cricket (E). Maulwurfsgrille (D).

حشرة مؤذية من فصيلة الجدديات تحفر في التراب الرطب دهاليز سطحية افقية وتقتضي على كل نبات في او لين يتعرض طريقها كما لا تعف عن بعض البذور اخصها البقلة والقرعية . تكافح باستعمال فليوسيليكات الباريوم وغيره من الحواشير الفعالة .

٧٣٥٢ - حَالُوط (F).

Root-rot, Honeyagaric (E). Hallimasch (D).

وصم فطري شديد الاذى يعثري ارومة وجذور الاشجار . سببه فطور مجهرية مختلفة اخصها الطريم والروزليك (اطلبيها) .

٧٣٥٣ - حَالُوم (F).

هو الشنجار المخزني ، اطلبه . Common gromwell (E).

٧٣٥٤ - حَالِيَة *

Aepysurus (S). Aepysure (F). Aepysurus (E).

جنس حيات سامة ، خبيثة من اماميات الاخايد وفصيلة الهيدروفيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل . رؤوسها صغيرة ، ذمية . اذناها مبطة . اثوابها الى الخصار البحري المتفاوت الماحات يملوه تجذيع متعرض متباين الزخرفة والالوان ، يكثر فيه الاسود والاخضر الاليس .

٧٣٥٥ - حَالِيَة

يقال لحيمة حالية اي وارقة مشمرة واذا تنأثر ورقها قيل تعطلت (اللسان) .

٧٣٥٦ - حَام ، وَاَقِي (F).

Prophylactic (E). نعت تعريفي يطلق على التدابير ووسائل الخطة الواجب اتخاذها للوقاية من الآفة المحتملة او لمعالجتها في حال وجودها .

٧٣٥٧ - حَام (F).

راجع حات .

٧٣٥٨ - حَامِيَة (F). Sugared, Sugary (E).

الحامات هو الثمر الشديد الحلاوة وقد عم استعمالها على جميع الثمار الشديدة الحلاوة .

٧٣٥٩ - حَامُض ، حَامِض (F). Acid (E).

الحوامض اجسام مركبة تقع على ثلاثة اشكال . الشكل الاول هو الحوامض المركبة من جسمين بسيطين احدهما الهيدروجين . والشكل الثاني هو الحوامض المركبة من ثلاثة اجسام اثنان منها الاكسيجن والهيدروجين . والشكل الثالث هو الحوامض العضوية المركبة من الكربون والاكسيجن والهيدروجين .



حالق



حالوش



حالة

٧٣٨٤ - حامض خَشَخَاشِي

Acide méconique (F). Acid meconic (E).
بلورات صفيحية عادية اللون والرائحة توجد في حبوب
الخشخاش .

٧٣٨٥ - حامض خَلَنَجِي ، حامض صَقَصَاي

Acide salicylique (F). Acid salicylic (E).
بلورات إبرية الشكل عادية اللون براقة توجد في عصارة
الخلنج والصفصاف وفي جذور البنفسج وازهار العراوة .

٧٣٨٦ - حامض خَلِّي ، حامض خَلِيك

Acide acétique (F). Acid acetic (E).
هو عنصر الحل الاماسي .

٧٣٨٧ - حامض خَيْلِي ، حامض هَيْبُورِيك

Acide hippurique (F). Acid hippuric, Hippuric acid (E).
حامض عضوي يكثر في بول الخيل ويوجد في بول اكثر
الحيوانات من آكلات العشب .

٧٣٨٨ - حامض دُبَالِي ، حامض هُومِيك

Acide humique (F). Acid humic (E).
حامض عضوي ومعدني له شأن كبير في اخصاب التربة .

٧٣٨٩ - حامض دَبْغِي ، حامض عَطْنِي ،
حامض عَقْصِي ، حامض تَنِيك

Acide tannique (F). Acid tannic (E).
حامض عضوي يستخرج من لحاء العفص وورق الساق
وغيرهما . يستعمل في الدباغة .

٧٣٩٠ - حامض دَرِّيْسِي

Acide derrique (F). Acid derric (E).
واحد من عصري ذرة الروتينون .

٧٣٩١ - حامض دُهْنِي ، حامض دُهْنِيك
حامض زَيْتِي

Acide oléique, A. élaique (F). Acid oleic (E).
حامض عادم اللون يوجد في المواد الدهنية الزيتية .

٧٣٩٢ - حامض رُمَّانِي

Acide ellagique (F). Acid ellagic (E).
بلورات دقيقة صفراء اللون عادية الرائحة والطعم قليلة
الذوبان في الماء . يستخرج من جذور الرمان وعرق
الانجبار . ومن العفص ومن ثمار الاهليلج والفوفل .

٧٣٩٣ - حامض زَهْرِي

Acide primulique (F). Acid primulic (E).
بلورات إبرية الشكل توجد في جذور وجذامير زهر
الربيع .

٧٣٩٤ - حامض تَمْنِي ، حامض تَمْنِيك ،
حامض زَيْدِيك

Acide butyrique (F). Acid butyric (E).
حامض لا لون له يوجد في السمن وفي بعض المواد الدهنية .

٧٣٩٥ - حامض سيانيدريك

Acide cyanhydrique (F). Cyanhydric acid (E).
سائل عادم اللون ، كثير الميوعة ، رائحته رائحة اللوز
المر . يذوب في الماء والكحول . يوجد في اكثر من مئتي
نوع نبات تنتمي الى ٥٠ فصيلة اشهرها الورديات
والقرنيات . يكثر في اللوز المر وفي معظم بذور الباز

٧٣٧١ - حامض بَسْبَاسِي

Acide myristique (F). Acid myristic (E).
حامض يستخرج من نبات البسباس .

٧٣٧٢ - حامض بَنْزَوِيك

Acide benzoïque (F). Acid benzoic (E).
بلورات إبرية او صفيحية عادية اللون . يوجد في الجوينة
والنجيل العطر ودم الاخوين والمليحة . وفي جذامير عود
الوج وفي بذور المضاخ .

٧٣٧٣ - حامض بُنِّي

Acide caféique (F). Acid caffeic (E).
بلورات صفيحية صفراء اللون براقة عادية الرائحة قليلة
الذوبان في الماء . يستخرج من البن .

٧٣٧٤ - حامض بُولِي ، حامض بُولِيك

Acide urique (F). Acid uric (E).
حامض ازوتي يوجد في البول .

٧٣٧٥ - حامض بِيْشِي ، حامض أَكُونِيْتِيك

Acide aconitique (F). Acid aconitic (E).
بلورات عادية اللون والرائحة . تركيبه الحامض
الليموني ينقصه ذرة ماء . يوجد في سوق وابوراق الاكونيت
والادونيس والمائق والذرة والسلق وقصب السكر .

٧٣٧٦ - حامض بِيكْرِيك

Acide plorique (F). Acid ploric (E).
من الحوامض المطهرة المستعملة في معالجة الحروق وفي
الصباغات الصفراء اللون .

٧٣٧٧ - حامض تَرْتَرِي ، حامض طَرَطَرِيك

Acide tartrique (F). Acid tartaric (E).
حامض عضوي ينشأ في الثمار لاسيا العنب .

٧٣٧٨ - حامض تَفَّاحِي ، حامض تَفَّاحِيك

Acide malique (F). Acid malic (E).
من الحوامض العضوية الموجودة في اكثر الثمار اخصها
التفاح .

٧٣٧٩ - حامض تَنْبُوِي

Acide abiétique (F). Abietic acid (E).
يستخرج من التنوب ويكثر وجوده في صمغ البطم .

٧٣٨٠ - حامض تُحَاصِي ، حامض أَفْصَلِيك

Acide oxalique (F). Acid oxalic (E).
من الحوامض العضوية الموجودة في الحماض وغيره من
النباتات البقلية .

٧٣٨١ - حامض حَنْدَقُوِي

Acide méilotique (F). Acid melilotic (E).
حامض عطري بلوري التركيب يوجد في الحندقوق .

٧٣٨٢ - حامض خِرْبِيْقِي

Acide vératrique (F). Acid veratric (E).
حامض يستخرج من الخربق حيث يوجد بشكل املاح .

٧٣٨٣ - حامض خَرْدَلِي

Acide érucique (F). Acid erucic (E).
بلورات متراصة توجد في ادهان بعض البذور اخصها
بذور الخردل والسليج واللفت والبنج .

٧٤٠٧ - حامض فوليكسي
Acide folique (F). Folic acid (E).

الحامض الفوليكي فيتامين من فئة ب يوجد في الاوراق الخضراء اخصها البقول وفي السج الحيوانية . يعتبر مفيداً لانه يحث على تكوين الكريات الحمر واليحمور وينشط نوبة الخلايا والبكتيريا .

٧٤٠٨ - حامض فوقحائي

Acide chrysanthémique (F). Acid chrysanthemic (E). بلورات مشوشة متناهية الدقة توجد في رؤيسات القوقحان الزهرية .

٧٤٠٩ - حامض كبريتي ، حامض سلفوري
حامض سلفوريك ، حامض كبريتيك

Acide sulfurique, Huile de vitriol (F). Sulphuric acid (E). سائل زيتي الانبعاث عادم اللون والرائحة يستعمل في صناعة سلفات الامونيالك والسورفسفات .

٧٤١٠ - حامض كتاني
Acide linique (F). Linic acid (E).

حامض يستخرج من زيت الكتان .

٧٤١١ - حامض كربوني ، حامض الكربون ،
حامض فحمي ، حامض كربونيك ،
غاز كربونيك ، غاز الكربون

Acide carbonique, Anhydride carbonique (F). Carbonic Acid (E). الحامض الكربوني غاز يوجد في الهواء يأتيه من تنفس الاحياء والاختبارات وغيرها ويعود من الهواء الى النبات بفعل الخصب .

٧٤١٢ - حامض كلوريديك ، حامض

Acide chlorhydrique (F). Acid hydrochloric (E). هيدروكلوريك
حامض حريف محرق كويه الرائحة يستعمل في عدة صناعات .

٧٤١٣ - حامض كوميريك

Acide coumarique (F). Acid coumaric (E). بلورات ابرية عادمة اللون . يستخرج من الخندقوق الخزني ومن الجويسة العطرة والتجبل العطر .

٧٤١٤ - حامض لبني ، حامض لبنيك .

Acide lactique (F). Acid lactic (E). من الحوامض المطهرة يحصل من تخمر اللبن .

٧٤١٥ - حامض ليموني ، حامض الليمون ،

حامض ليمونيك ، حامض سثريك
Acide citrique (F). Acid citric (E). حامض عضوي يكثر وجوده في ثمار الحمضيات كالبرتقال والليمون الحامض ، الخ ...

٧٤١٦ - حامض ملتوني

Acide maltonique, A. gluconique (F). Acid maltonic (E). حامض خامي التركيب الكربوني يحصل من اكسدت السكاكر بالفطور الهبوية .

اللوزية وفي ورق الدراق والكرز الغاري وفي سوق وحبوب الفاصوليا ، الخ .

٧٣٩٦ - حامض سيانيك
Acide cyanique (F). Cyanic acid (E).

سائل عديم اللون ، نافع ، زرق الرائحة المثيرة ، يستحيل بسرعة في الهواء الطلق الى مسحوق ابيض عادم الفاعلية والذوبان .

٧٣٩٧ - حامض شاهترجي

Acide fumarique (F). Acid fumaric (E). تركيبه الحامض التفاحي ينقصه ذرة ماء . يستخرج من الشاهترج الخزني ومن القبرية والماميا الصفراء وخرز الصخور ويختلف الفطور .

٧٣٩٨ - حامض شقاري
Acide anémone (F). Acid anemonie (E).

حامض عضوي يكثر في نبات الشقار .

٧٣٩٩ - حامض شمعي
Acide cérotique (F). Cerotic acid (E).

الحامض الشمعي يستخرج من الشمع العسل .

٧٤٠٠ - حامض طقسوي

Acide proplonique (F). Acid propionic (E). سائل عديم اللون نافذ الرائحة الخاصة . يوجد في ازهار الطقسوس والكالية وفي ثمار الجينكو وفي النيدمان والسولوس .

٧٤٠١ - حامض عفص ، حامض عفصيك

Acide gallique (F). Acid gallic (E). حامض عضوي يوجد في لحاء واوراق بعض النباتات اخصها العفص .

٧٤٠٢ - حامض عنبيري
Acide succinique (F). Succinic acid (E).

يوجد في العنبر وفي بعض انواع اللينيت وفي راتنج الصنوبر وفي عصارة بعض النباتات اخصها خص السم والابست . يستحضر من تقطير العنبر ومن تخمير الحامض التفاحي .

٧٤٠٣ - حامض غاريقوني ، حامض اغارييسيك

Acide agaricique (F). Agaricic acid (E). بلورات صفحية فضية اللون . يوجد في الغاريقون الابيض .

٧٤٠٤ - حامض غبيري ، حامض صربي

Acide sorbique (F). Sorbic acid (E). بلورات لرجية متشربة الرطوبة توجد في ثمار النيراء اي الصريرة .

٧٤٠٥ - حامض غلوتاميك

Acide glutamique (F). Glutamic acid (E). بلورات شعاعية توجد في ارشام القرع والبيقية وفي دبس الشولدر . تذوب في الماء الساخن ولا تذوب في الكحول .

٧٤٠٦ - حامض غليكولي

Acide glycolique (F). Glycolic acid (E). بلورات عادمة اللون توجد في الحصرم واوراق الكرمة وفي البندورة وقصب السكر .

٧٤٢١ - حَامِلَاتُ الْقَوَائِمِ ° Notopodes (F).

Notopodea (E).

فئة من القشريات عشاريات الارجل قصيرات الذيل . فصائلها واجناسها وانواعها عديدة ، جميعها صنيرة القد . اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || تتميز بكثافة هلب ظهورها وبقوامها الخلفية الظهرية الارتكاز حيث تبدو كأنها محمولة .

٧٤٢٢ - حَامِلَةٌ Frugifère (F).

Frugiferous, Fruit-bearing (E).

نمت تعريفي يطلق على كل شجرة مثمرة تملؤها الثمار .

٧٤٢٣ - حَامُولُ Orobanche (F). Broom-rape (E).

هو الجعجيل ، اطلبه .

٧٤٢٤ - حَامُولُ الْمَاءِ * ، بَشْتُ الْقِرْدِ

Ceratophyllum submersum (S). Ceratophylle, Cornifle (F). Horn-weed, Morass-weed (E). Glatte igellock, Hornblatt (D). Coda di cavallo, Coda di volpe, Pertro (I).

نبات عشبي مائي معمر من فصيلة الفلقليات . ازهاره صغيرة خضراء اللون . ثمرته كروية جلدية محببة تحمل من جهة استطالتها شوكة حادة قوية .

٧٤٢٥ - حَامِيَّة Mamelle (F).

ها حاميان يتركب منها حافر الخيليات .

٧٤٢٦ - حَاوُورُ Bassin couvert (F).

Covered basin (E).

هو الخوض المسقوف تجمع فيه المياه وتوزع .

٧٤٢٧ - حَالِدٌ Unilatéral (F). Unilateral (E).

نمت تعريفي يطلق على كل جزء من النبات يقع في طرف واحد . المحمليات تحمل ازهاراً حائدة .

٧٤٢٨ - حَائِشٌ Rabatteur (F). Beater (E).

مطارد الصيد الى مكان معين .

٧٤٢٩ - حَائِشٌ ، حَائِطٌ Jardin (F). Garden (E).

الحائش والحائط : المجتمع من الشجر لخلأ كان او غيره .

٧٤٤٠ - حَائِطٌ ، جِدَارٌ ، سُورٌ Mur (F). Wall (E).

الجدار المبني وهو :

حائط خاص Mur privatif (F). Privative wall (E).

او حائط مشترك Mur mitoyen (F). Partition wall (E).

٧٤٤١ - حَائِيُوتٌ ° ، حَائِيُوشٌ ° Ophiophage (F).

Ophiophagous (E).

آكل الحيات .

٧٤٤٢ - حَبُّ الْبَلَاذِرِ Noix de cajou (F).

هو الكاجو ، اطلبه .

٧٤٤٣ - حَبُّ الزُّلْمِ * ، حَبُّ الْعَرِيزِ ، زُلْمٌ ،

سُعْدٌ مَأْكُولٌ Cyperus esculentus (S).

Souchet comestible, Amande de terre (F). Earth almond, Edible cyperus (E). Erdmandel, Erdmandelcypergras (D). Ciperu comestibile (I).

نوع من السعد وهو نبات عشقوي عشبي زراعي . ساقه تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه سنانية مستطيلة .

٧٤١٧ - حَامُضٌ مِمْرَانِي Acide chélidonique (F).

Acid celandic (E).

بلورات عادمة اللون والطعم والرائحة . يستخرج من الممران وعروق الصباغين ومن جذامير الخربوق الابيض .

٧٤١٨ - حَامُضٌ قَنِّي ، حَامُضٌ سِينَمِيك

Acide cinnamique (F). Acid cinnamic (E).

بلورات موشورة معينة او ابرية دقيقة . يستخرج من اوراق العيونون والقلونه .

٧٤١٩ - حَامُضٌ تَغْلِي Acide palmitique (F).

Acid palmitic, Palmic acid (E).

بلورات ابرية الشكل توجد في ثمار نخل الدهن .

٧٤٢٠ - حَامُضٌ تَغْلِي ، حَامُضٌ فَرْمِيك

Acide formique (F). Formic acid (E).

حامض عضوي يكثر وجوده في النمل .

٧٤٢١ - حَامُضٌ نُوَوِيْنِي ، حَامُضٌ نُوكَلَايِك

Acide nucléique (F). Nucleic acid (E).

حامض مركب من اربعة اجزاء او اضااف الاربعة يشتمل على عدة عناصر اشهرها الحامض الفسفوري مع السكر والبروتين .

٧٤٢٢ - حَامُضٌ نَيْتْرِيكي Acide nitrique (F).

Acid nitric (E).

هو الحامض الازوتي ، اطلبه .

٧٤٢٣ - حَامُضٌ نَيْكُوتِينِي ، حَامُضٌ نَيْكُوتِيَانِي

Acide nicotinique, A. nicotianique (F). Acid nicotinic, A. nicotianic (E).

بلورات ابرية او موشورة توجد في اوراق التبوغ . تذوب في الكحول والماء الساخن .

٧٤٢٤ - حَامُضٌ هَلِيُونِي

Acide aspartique (F). Aspartic acid (E).

حامض اميني يوجد في نوامي الهليون وفي لساس القرع واللوبياء والفاصوليا .

٧٤٢٥ - حَامِضِي Acidifère (F).

Acidiferous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل ما احتوى على حوامض .

٧٤٢٦ - حَامِكَةٌ ° Entomophage (F).

Entomophagous (E).

الحامكات هي الدويبات والحشرات النافعة التي تقتل الحوام والحشرات الضارة .

٧٤٢٧ - حَامِلٌ Fécondée, Pleine (F).

نمت تعريفي يطلق على انثى الحيوان البينة القاح .

٧٤٢٨ - حَامِلٌ Porteur, Au porteur (F).

Bearer (E).

هو من حرد السند التجاري لصالحه او نقل اليه عن طريق التظهير ويقال الى الحامل اي الى من بيده سند لحامله .


٧٤٢٩ - حَامِلُ السَمَةِ Style

هو قلم السمة جزء من المدقة مستقيم اجوف يصل المبيض بالسمة .

٧٤٣٠ - حَامِلُ السِّنْدِ Obligataire (F).

Bond-holder (E).

هو الذي يملك حقاً ناشئاً من سند قابل للتحويل .



حامول الماء



حب الزلم

٧٤٥٩ - حَبَّاجِيَّة ٥
Exochorda (S).
Exochorde (F). Exochorda (E).
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الورديات .
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى الصين . سوقها ترتفع
من مترين الى اربعة امتار . اوراقها متعاقبة معنقة اهليلجية
النصل . ازهارها عنقودية التجميع ، كبيرة القد ، خماسية
الاشعبة الجناحية الشكل ، مستديرة البتلات ، كثيرة
الاسدية التي يراوح عددها من ١٥ الى ٢٥ || انواعها
المعروفة سبعة ، أشهرها التالية :

٧٤٦٠ - حَبَّاجِيَّة جِيرَالْد ٥
Exochorda giraldi (S).
Exochorde de Giralde (F).
نوع الحباجة التزيينية . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة
امتار . اوراقها معنقة . اعناق الاوراق الى الحمرة . نصالها
ارجوانية اللون في اول عهدها ثم خضراء . ازهارها كبيرة
القد ، عطرية العرف . عدد اسديتها ٢٥ || تنويرها يستمر
من نيسان الى ايار .

٧٤٦١ - حَبَّاجِيَّة عُنُقُودِيَّة ٥
Exochorda racemosa (S).
Exochorde en grappes (F).
نوع من الحباجة . ساقها تعلو من مترين الى ثلاثة امتار .
اوراقها كاملة ، منشارية الزام الاخير ، تطول نحو ٥ سم .
وتعرض نحو ٢ سم . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم .
عدد البديتها ١٥ || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٧٤٦٢ - حَبَّاجِيَّة كُرُورَاكُوف ٥
Exochorda korolkowii (S).
Exochorde de Korolkow (F).
نوع من الحباجة التزيينية . ساقها تعلو نحو اربعة امتار .
اوراقها معنقة اذينية . اذيناتها مستديرة الاطراف . نصالها
تطول نحو ٩ سم . وتعرض نحو ٣ سم . لونها الى الخضار
العابق . ازهارها معتدلة التجميع ، عادية العرف ، قطرها
نحو ٣ سم . عدد اسديتها ٢٠ || تنويرها يستمر طوال
شهر ايار .

٧٤٦٣ - حَبَّاجِيَّة مِنْشَارِيَّة الْوَرَق ٥
Exochorda serratifolia (S).
Exochorde à feuilles serrulées (F).
نوع من الحباجة التزيينية . ساقها تعلو من متر الى مترين .
اوراقها معنقة . نصالها منشارية الختار لونها الى الخضار
الزيتي الموج . ازهارها كبيرة القد ، عادية العرف ، قطرها
نحو ٦ سم . عدد اسديتها ٣٠ || تنويرها يستمر من ايار
الى حزيران .

٧٤٦٤ - حَبَّاجِير ٥
Outarde mâle (F). He-bustard (E).
الحباجير والحبارج والحيجر والحبرج جميعها تدل على
ذكر الحباجير .

٧٤٦٥ - حَبَّاح *
Isopyrum (S).
Isopyre (F). Isopyrum (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الشقيقيات .
انواعها المعروفة قليلة العدد منتبتا معظم مناطق البلاد المعتدلة
الحرازة من العالم القديم || سوقها نحيلة تعلو من ٩٠ الى
١٢٠ سم . اوراقها معنقة ، مستطيلة الزناد ، مفروضة
النصال الثلاثية الفلق . ازهارها فردي ، ابطي الارتكاز
وهامي . ازهارها صغيرة خماسية البتلات ، بيضاء اللون ||
تنويرها ربيعي .

نصلها جميل اللون الزاهي . جذورها مدادة . عساقله صغيرة
القد بيضية الشكل ، مفلطة ، مأكولة ، دسمة ،
مستحبة الطعم || يرغب في المواقع الحارة والاثربة الرطبة .

٧٤٤٤ - حَبَّ السَّلَاطِين (F).
Croton cathartique (F).
هو كروتين الزيت ، اطلبه .
Croton-oil plant (E).

٧٤٤٥ - حَبَّ السَّنْبُل
Guilmauve jaune (F).
راجع أبو تيلون أسرح .
Lantern flower (E).

٧٤٤٦ - حَبَّ الْعَرُوس
Poivrier cubàbe (F).
هو فلفل كبابه ، اطلبه .
Cubeb pepper (E).

٧٤٤٧ - حَبَّ الْعَزِير
هو حب الزلم .

٧٤٤٨ - حَبَّ الْعَصَافِير
Alpiste (F).
هو الفلاريس نبات عشبي علوي من النجيليات .
Canary grass (E).

٧٤٤٩ - حَبَّ الْفَقْد
Agneau chaste (F).
هو الارثد ، اطلبه .
Agnus castus (E).

٧٤٥٠ - حَبَّ الْقَلْب
Grémil officinal (F).
هو الشنجار الحزني ، اطلبه .
Common gromwell (E).

٧٤٥١ - حَبَّ الْمِسْك * عَنَبَرَبُول ، حَيْطَمِي مِسْكِي
Abelmoschus moschatus, Hibiscus abelmoschus,
Bamia abelmoschus (S). Abelmosch, Ambrette,
Graine musquée, Ketmie musquée (F). Abelmusk,
Musk okra, Musk mallow (E). Abelmusk, Bismelbisch,
Bisamstrauch (D). Abelmusco, Ambretta,
Ibisco muschiato (I).
نبات زراعي صناعي حولي ومحول من فصيلة الحباقيات .
مهدد البلاد الاسيوية والافريقية الحارة . ساقه منتصبه
عفية زباء اللحاء تعلو من ٦٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه
متعاقبة ، كبيرة القد ، عريضة ، خماسية او سباعية
الفصوص . ازهاره كبيرة فارشة ، لونها الى الصفار
الكبريتي . ثماره قرون اسطوانية مضطعة ، ذلقة الزام
الاخير ، تحضن حبوب كروية الشكل ، عرفها عرف
المسك تستعمل في الصناعات العطرية .

٧٤٥٢ - حَبَّ الْمَلُولُ
Médiciner cathartique (F).
هو دند الملوك ، اطلبه .
Spurge nettle (E).

٧٤٥٣ - حَبَّ الْمَلُولُ
Catapuce (F).
هو قريبون لسيرس ، اطلبه .
Caper-spurge (E).

٧٤٥٤ - حَبَّ النَّيْل
Ipomée du Nil (F).
هو جلاب النيل ، اطلبه .
Nil ipomoea (E).

٧٤٥٥ - حَبَّ الْهَال
Amome (F).
هو ثمر الهال حب اسود اللون عطري العرف مستحب
الطعم شائع الاستعمال .

٧٤٥٦ - حَبَّ الْهَال
Ménisperme (F).
هو القمرية ، اطلبها .
Moonseed (E).

٧٤٥٧ - حَبَّاب
Grainier (F). Seedsman (E).
من يبيع الحنطة .

٧٤٥٨ - حَبَّابَة
الحباجة : دويبة سوداء مائية . ج حباب .



حب المسك




حَبَّاح

الشرقية والشمالية . مصيفها الشرق الأدنى وأروبه || تنفر من الاحراج والغابات . قوتها الحشرات والديدان والحبوب ونوامي النبات || الانثى تبيض ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع في افحوص تدثنه في التربة بين الاعشاب .

٧٤٧٧ - حَبَّارَى مُتَوَجَّة ، حَبْرُج ، حَبْرَب

Otis houbara, Chlamydotis undulata (S). Outarde houbara, Houbara ondulée (F). Houbara bustard (E).

نوع من الحبارى المتوجة الآبدة في العراق والجزيرة . يكثّر وجودها في الشرق الأدنى وفي افريقية الشمالية . جثتها متوسطة القد طولها نحو ٦٠ سم . تتميز باستطالة عنقها ومنقارها الذي يعادل طول رأسها . ثوبها متراكب الالوان يغلب فيه الابيض الرمادي المشق بالاسود . زمكها ابيض يعلوه حباك اسود ثلاثي الخطوط || قال الجاحظ : « لها خزانة في دبرها لها ابدأ فيها سلاح رقيق فتألج عليها الصقر سلحت عليه فينتف ريشه كله وفي ذلك هلاكه وقد جعل الله تعالى سلاحها سلاحاً لها . قال الشاعر :
«وهم تركوك اسلح من حبارى رأيت صقراً وأشرد من نعام»



حَبَّارَى

٧٤٧٨ - حَبَّارَى مُلْتَحِبَة ، حَبَّارَى كَبِيرَة ، رَعَاد

Otis tarda (S). Outarde barbut, Grande outarde (F). Great bustard (E).

اكبر انواع الحبارى ، طولها نحو ١٠٠ سم . رأسها أطول اللون تعلوه مشحة صهباء . عنقها الى البياض البلوري تكتنفه زرقاء بنفسجية . ظهرها الى الصفرة الصهباء يعلوها حباك اسود . سراقطها بيض ، قوادمها الى الرتبة السمر . زمكها ابيض تعترضه خطوط سود . بطنها الى البياض الاغبر || موطنها الشرق الأدنى وأروبه وافريقية الشمالية . تألف السهول والفيافي . تبتعد عن الاحراج والاماكن الآهلة . قوتها النوامي النباتية والحبوب والحشرات . الانثى تبيض ٣ بيضات تحضنها نحو ٤ اسابيع في افحوص تدثنه في التربة بين الاعشاب الكثيفة .



حَبَّارَى

٧٤٧٩ - حَبَّارَى نُوبِيَّة

Lisotis (S). Outarde de Nubie (F). Nubian bustard (E).

نوع من الحبارى المتوسطة القد موطنها افريقية الشرقية اخصها النوبة والسودان . ثوبها رمادي اللون يعلوه توشيح وتمشيق وحباك معترض .

٧٤٨٠ - حَبَّارَى هِنْدِيَّة

Sypheotis Indica (S). Outarde indienne (F). Indian bustard (E).

نوع من الحبارى الصغيرة القد موطنها الهند والتبت . ثوبها الى البياض الموشم بالاصهب والاسمر .

٧٤٨١ - حَبَّارِيَّات

Otididae (S). Otididés (F). Otididae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل الحبارى وغيرها .

٧٤٨٢ - حَبَّاسَة

Tontinage (F).

هي استعمال الحباسة لتغليف جذور الغراس المقلوعة والمعدة للنقل .

٧٤٨٣ - حَبَّاسَة *

Tontine

حباك من القش او الاسل او القصبان الدقيقة تحضن به جذور الفرس وما عليها من تراب او خز تأميناً على حياتها في اثناء نقلها من مكان الى آخر . ج حباسات .



حَبَّاسَة

٧٤٦٦ - حَبَّاسَة

Lampyre (F).

Glow-worm, Firefly (E).

ويقال له أبو حباب . هو اليراعة ، اطلبها . وفي المثل : اضعف من نار الحباب .

٧٤٦٧ - حَبَّاسَة

Linaire (F). Toad-flax (E).

هو الليناريه ، اطلبها .

٧٤٦٨ - حَبَّاسَة أَحْرَش

Linaire élatine (F).

هو الليناريه الحرشاء ، اطلبها .

٧٤٦٩ - حَبَّاسَة الشَّقُوق

Linaire cymbalaire (F).

هو الليناريه الصناجية ، اطلبها .

٧٤٧٠ - حَبَّاسَة دُجْوِي

Ver-luisant (F).

حشرة تدعى يراعة دجوية ، اطلبها .

٧٤٧١ - حَبَّاسَة شَرْقِيَّة

Luciole oriental (F).

حشرة تدعى يراعة شرقية ، اطلبها .

٧٤٧٢ - حَبَّاسَة مَبْدُول

Linaire commune (F).

هو الليناريه العادية ، اطلبها .

٧٤٧٣ - حَبَّار * ، سَبَّيْدَج ، صَبَّيْدَج

Sepia (S). Selche, Sèche (F). Cuttle-fish, Squid (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات الرأسيات الارجل المزدوجات الخيشوم . انواعه نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار العالم تتميز بذوائبها الرأسية المخجمة الاطراف وبلاقطها المنقبضين المستطيلين المنتهين بكتلتين من الحاجم المرصوفة . اجسامها مفلطحة . زعانفها جانبية . عظمها ظهري اهليلجي الشكل ، كلسي التركيب ، ابيض اللون ، يغلفه جلد الظهر . وهو من الحيوانات المفترسة قوته الاسماك الصغيرة والقشريات . يألف الشطوط الصخرية وينفر من الاعماق واذا شعر بخطر مداهم قذف بسائله الاسود اللون فيمكر الماء حوله ويتمكن من الهرب اشهر انواعه الخذاق ، اطلبه .

٧٤٧٤ - حَبَّارَى * ، حَبْرَاة

Otis (S). Outarde (F). Bustard (E).

جنس طير من فصيلة الحباريات ورتبة طوال الساق . انواعه عديدة معظمها من طيور مناطق البلاد الحارة والمعتدلة . منها الآبدة تعيش جماعات صغيرة ومنها القواطع سربها نحو ١٠٠ زوج . الذكر منها يقود عدة اناث . فرخها يقال له نهار .

٧٤٧٥ - حَبَّارَى سِيْبَرِيَّة

Otis Dybowskii (S).

Outarde de Sibérie (F). Dybowski bustard (E).

نوع من الحبارى القواطع المتوسطة القد . مشتاه الصين الوسطى ، مصيفها من سيبيريا الى الاورال فاليابان .

٧٤٧٦ - حَبَّارَى صَغِيرَة ، حَبْرُور ، صُر

Otis tetrax (S). Outarde canepetière, Petite outarde, Poule de Carthage (F). Little bustard (E).

نوع من الحبارى القواطع ، صغيرة القد ، طولها نحو ٥٤ سم . ثوبها اصفر اللون مشق بالاسود . محاسرها وزورها الى السمرة الرمادية . عنقها مطوق بالابيض . قوادمها الى السمرة العاقية . افيكها ابيض يعلوه حباك اسود . موطنها شاسع الاطراف . مشتاه الهند والجزيرة وافريقية

لها وريقة تعلوها صفرة وتعلو صفرتها غبرة دون ورق الحباري. (اللسان).

٧٤٩٨ - حَبَجَة Plant de vigne (F).
هي جرزونة الكرمة زرعت فشرشت. ج حجاج.

٧٤٩٩ - حَبَحَب Adansonie (F). Baobab (E).
راجع بوباب.

٧٥٠٠ - حَبَرَبَر، حَبَرَقَش Chamelon, Chamelet (F). Young camel (E).
هو الجمل الصغير والانثى حبربرة وحبرقشة.

٧٥٠١ - حُبْرَة Noeud de tige (F).
الحبرة هي العقدة في جذع الشجرة. ج حبر.

٧٥٠٢ - حُبْرُج Outarde houbara (F).
هي الحبارى المتوجه، راجعها. Houbara bustard (E).

٧٥٠٣ - حِبْرُور Canepetière (F).
Little bustard (E).
هي الحبارى الصغيرة، اطلبها. ج حبارير.

٧٥٠٤ - حَبَس Fascinage (F). Fascine-work (E).
حجز يثق الماء واقامة صناعات في وجهه لتحويل مجراه او لغرض آخر.

٧٥٠٥ - حَبَشَقَة ، حَبَشُوقَة ، بَنِيُول Baniulus (S). Baniule (F).
جنس حشرات من كثرات الارجل الشفويات الاحناك. انواعه عديدة اعرفها واضرها الحبشة الرقطاء.

٧٥٠٦ - حَبَشَقَة رَقْطَاء* ، بَنِيُول أَرْقَط Baniulus guttulatus (S). Baniule moucheté, lule des fraises (F). Spotted millipede, Spotted snake-millipede (E). Getüpfelter Tausendfüß, Getupfter Schnurfüssler (D).
حشرة طويلة مستدقة لونها الى البني الاسمر تعلوه نقط حمر. ارجلها كثيرة العدد || اضارها قد تكون جسيمة لانها تلثم البدور عند انتاشها وتقرض الثمار اخضها شمول الشيلك (الفريز).

٧٥٠٧ - حَبَشِيَّات Meleagridae (S).
Dindons, Méléagridés (F). Meleagridae (E).
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات. وحيدة الجنس طيورها كبيرة الجثة، مستطيلة الساق، ملطاة العنق الشعولي الملون. تحمل لحصة تتدل من قاعدة فكها الاعلى ويتوسط جوشن ذكورها لمة من الهلب الغليظ كما انها ترفع ذيلها وتشره كالطاووس.

٧٥٠٨ - حَبَشِيَّة ، حَبَش Meleagris (S).
Dindon (F). Turkey-cock (E).
جنس طير من فصيلة الحبشيات. كبير الجثة، صغير الرأس، قصير المنقار القوي. مستطيل الرسغ والمخالب، مستدير الجناح والذيل، غزير الريش الصلب || مهدد الاصل امريكة الشمالية والجنوبية. انواعه المشهورة اربعة.

٧٤٨٤ - حَبَاط Météorisation (F).
Wind, Flatulence (E).
عارض مظهره انتفاخ في كرش المجترات فيعظم منه ويرم. سبه تجمع غازات تحصل من اختار الكلاء في الكرش.

٧٤٨٥ - حَبَاك ، وَشِيْع Pallssade (F).
Patisade, Paling (E).
هو سياج من نصب او قضبان متشابكة.

٧٤٨٦ - حَبَاك أَدَمِي Pallssade épidermique (F).
Epidermic paling (E).

٧٤٨٧ - حَبَب Grainer (F). To seed (E).
حبب الزرع وأحب انزرع : صار ذا حب.

٧٤٨٨ - حَبَب الثَمَار Prune (F). Bloom (E).
هو الطيسل-مادة عضوية لزجة كذر الفبار تكثف بشرة الثمرة.

٧٤٨٩ - حُبَة ، حُبَة Pèpin de raisin (F).
Grape-stone (E).
هي عجم العنب.

٧٤٩٠ - حُبَة ، بَزْرَة Grain, Graine (F). Seed (E).
هي الكائن الناتج عن انخصاب مبيض الزهرة. تركيبها وأشكالها واحجامها والوانها عديدة جميعها تهدف الى غاية واحدة هي استمرار النسل.

٧٤٩١ - حُبَة Grain (Poids) (F).
Grain, Minute pill (E).
هي مقدار وزن شعيرتين. والحبة ايضاً سدس عشر الدينار.

٧٤٩٢ - حُبَة الحبة اسم يقع على بزور العشب والبقول البرية وما تثار من ورقها فاختلط بها.

٧٤٩٣ - حُبَة البَرَكَة Graine noire (F).
Black cumin (E).
بزرة الشونيز الزراعي وهي صغيرة مستطيلة سوداء اللون مستحبة الطعم والعرف.


٧٤٩٤ - حُبَة حلوة Anis (F). Anise (E).
راجع أنيسون.

٧٤٩٥ - حَبَر ٥ Epomophorus (S).
Epomophore (F).

جنس حيوان من فصيلة الوطواطيات. انواعه ١٢ جميعها افريقية المهد. بشرة الشكل، متوسطة القد، براء او ثعلبية الذنب، مستعرضة الرأس، مستطيلة الفوطية، غليظة الشفاه المتعرجة المنمطة. تحمل في صدورهم تحت ثديها جيتين صغيرتين تكثفها خصلتان من الشعر الاصفر. كما انها بمجهزة بضرفين جانبيين لحزن الهواء يمتدان من البلعوم حتى قاعدة الفخذ || تعيش جماعات قليلة العدد. تألف الاشجار الحرجية الظليلة. قوتها جميع انواع التين والثمار الغزيرة العصير.

٧٤٩٦ - حَبَث Vipère à queue tronquée (F).
حية براء ذات سم قاتل.


٧٤٩٧ - حَبَج الحنج : شجرة سمياء تعمل منها القداح وهي عتيقة المود




حَبَر



حبشة رقطاء



حبشية المكسيك



حبشية داخنة



حبشية مبذولة



حبض



حبق برّي



حبق صغير

٧٥١٤ - حبشيات

Pittosporaceae (S).

Pittosporacées (F). Pittosporaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. أنواعها المعروفة زهاء ٩٠ تنتمي الى تسعة اجناس. مهدها البلاد الحارة. نباتاتها اشجار وجنبات معمرة عطرية. اوراقها كاملة متعاقبة. ازهارها لاقياسية التجميع والارتكاز.

Dystéléologie (F).

٧٥١٥ - حبط

Dysteleology (E).

الحبط علم يبحث في اسباب الاجهاض عند الكائنات الحية مرتكزا على الاعضاء السقيطة.

Ocimum (S). Basilic (F).

٧٥١٦ - حبقي

جنس نباتات عشبية عطرية من فصيلة الشفويات مهدها الهند وقد عمت زراعتها العالم || انواعها عديدة جميعها صغيرة القد فروعها. اوراقها متعاقبة، كاملة، منقطة، لسنة جميلة الخضار. ازهارها سنبل التجميع، ناجي الارتكاز. ازهارها بيض او وردية اللون || اوراقها وازهارها فواحة العرف العطر || اشهر انواعه الاربعة التالية: الحبق الرهباني، الحبق الصغير، الحبق المعروف والحبق الور (اطلها في مواضعها).

Armoise commune (F).

٧٥١٧ - حبقي الراعي

Mugwort (E).

هو الشويلا، اطلها.

٧٥١٨ - حبقي الرهبان، ريحان سلبمان

Ocimum filamentosum (S). Basilic filamenteux, Basilic des moines (F). Holy basil, Monk's basil (E). Heiliges basilienkraut, Mönchsbasilien (D). Basilico filamentosum (I).

نوع من الحبق المعمر يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. فروعه وانثائه كثيفة. اوراقه لسنة، مدببة، زاوية الخضار، ذكية العرف || منافعه الصحية معروفة ويقال ان عصارتها تقطع الرعاف ويزره يفيد عسر البول واذا سحق ووضع على كسرة الزنبور والعقرب أبرأها.

Amaraque (F).

٧٥١٩ - حبقي الشيوخ

Amaracus (E).

هو المرور، اطله.

Menthe aquatique (F).

٧٥٢٠ - حبقي الماء

Water mint (E).

هو ننع الماء، اطله.

٧٥٢١ - حبقي برّي

Calamintha clinopodium (S). Clinopode, Grand basilic sauvage, Roulette (F). Field wild-basil, Horse thyme (E). Gemeiner wirbeldost, Wilde basilic (D). Basilico salvatico grande (I).

عشبة برية معمرة من فصيلة الشفويات. اوراقها بيضية مدببة القمة، زباء النصل الخشن الملمس. ازهارها ابطية وهامية الارتكاز، وردية اللون.

Melisse officinale (F).

٧٥٢٢ - حبقي ترنجاني

Lemon-balm (E).

هو الترنجان، اطله.

٧٥٢٣ - حبقي صغير، حبقي كرماني، شاهسفرم

Ocimum minimum (S). Basilic fin, Petit basilic (F). Bush basil, Small leaved basil (E). Kleines basilienkraut (D). Basilico a foglie piccole (I).

نوع من الحبق وهو نبات عشبي حولي صغير القد

٧٥٠٩ - حبشية المكسيك*

Meleagris mexicana (S). Dindon du Mexique (F).

نوع من الحبش موطنه بلاد المكسيك. كبير الجثة بسطته نحو ٢٠٠ سم. ثوبه الى السمرة السفعاء يملوه تأذير وتوشيم. ذيله منقط بالابيض. اباهره مؤذرة بالاسود والابيض. عنقه املط، جثري اللون، رعته خرية، رسفه الى الاحمر الاصفر الموج || مجنحه الاشجار القليلة الارتفاع. انثاء تبيض نحو ١٨ بيضة تحضنها وحدها في انحوص ترصعه بالورق اليابس.

٧٥١٠ - حبشية داخنة*، ديك حبشي، ديك رومي

Meleagris domestica (S).

Dindon domestique (F).

نوع من الحبش يقال انه تحدر من حبشية المكسيك. ضرابه وسلالاته عديدة. فوارقها سرعة النمو والقذ والثوب ولون الرعشة والعنق والرسغ. وهي اليفة انيسة تعيش طعاما كبيرة تسرح كالغنم. جميعها كبيرة الجثة وزنها يراوح من ٦ الى ١٢ كيلو. بسطتها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. لحمها لذيد الطعم مرغوب فيه || الانثى تبيض من ٢٠ الى ٣٦ بيضة تحضنها نحو اربعة اسابيع.

٧٥١١ - حبشية فلساء

Meleagris ocellata (S).

Dindon ocellé (F).

نوع من الحبش موطنه غواتيمالا وهندورس ويوقطان. بسطته نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى السمرة يعلوه خضار مذهب. ذيله الفلوسي التوشيم الاسود المذهب. عنقه املط اصفر اللون. رعته الى الصفار الخطي. رسفه ومخالبه صفر || مجنحه الاشجار القليلة الارتفاع.

٧٥١٢ - حبشية مبذولة*

Meleagris gallopavo (S). Dindon vulgaire, D. sauvage d'Amérique (F).

نوع من الحبش موطنه امريكا الشمالية من كندا الى تكساس وفلوريدا. يألف الاحراج والغياض والمناقع ومجاري الماء. قوته الحبوب والثمار والبلوط والكستنا والحشرات || وهو كبير الجثة بسطته نحو ١٥٠ سم. ثوبه الى الثمرة السفعاء يملوه تأذير وتوشيم. عنقه املط ازرق اللون. رعته ورسفه ومخالبه الى الحمرة || مجنحه الاشجار المنبسطة الاغصان القليلة الارتفاع || انثاء تدن في الارض، ترصع افحوصها بالورق اليابس. تبيض نحو ٢٠ بيضة تحضنها وحدها نحو اربعة اسابيع.

٧٥١٣ - حبض، علاك

Pittosporum (S).

Pittosporum (F). Pittosporum, Cheese weed (E).

Telesaholz (D). Pittosporo (I).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الحبشيات. انواعه نحو ٥٠ بعضها عروية وبعضها عابل الاوراق. اوراقها كاملة متعاقبة، احليلجية النصل، بارزة المروق والشرابين. ازهارها فردي او عشكولي التجميع، محوري الارتكاز. ازهارها جميلة الشكل متعددة الالوان، عطرية العرف || اشهر انواعه الزراعية التزيينية:

Pittosporum fulvum (S).

حبض امغر

Pittosporum rous (F).

Pittosporum chinensis (S).

حبض صيني

Pittosporum de Chine (E).

Pittosporum coriolum (S).

حبض قاس

Pittosporum coriace (F).

Pittosporum undulatum (S).

حبض متموج

Pittosporum undulé (F).

حبيوة البر و


الى الريدة الصهباء المختلفة الموج رؤوسها صغيرة قصيرة، فراطيسها ذلقة مقطوعة || موطنها الشرق وبعض جزر المحيط الهادي. تألف الاشجار الظليلة الفارشة. تعيش جماعات قليلة العدد. مسرحها من التمسق الى الفجر. قوتها الثمار على اختلاف انواعها.

٧٥٥٢ - حَبْشُوشْ أَشْرَفْ ، أَشْرَفْ أَبْتَر

Nesonycteris truncatus (S).

Nesonycteris tronqué (F).

حيوان ليون ثامر ضار من فصيلة الطوطيات. جسمه صغير القد، عادم الذنب، يطول نحو ٧٠ سم. وبسطه ٢٤٠ سم. ثوبه الى الريدة الصهباء الخطية الموج. رأسه صغير الجرم، مستعرض الففن، ذلق الفرطسة المقطوعة الطرف. اذناه صغيرتان، مستعرضتا القاعدة، مديتا الطرف. عيناه صغيرتان. فقه واسع الشدق يحمل ٣٤ سنًا. لسانه مطاط || يألف في الصيف الاشجار الظليلة والكهوف الجنوبية المعرض ويألف في الشتاء المغاور والكهوف الشمالية المعرض || يعيش جماعات قليلة العدد. يحبل الانثى يستمر نحو ٣٨ يوماً تقصع عند تمامه جرواً واحداً يبصر ويسمع ويكتسي بعد الوضع بعشرة ايام ويتعلق بصدر امه بدون انقطاع حتى الفطام، اي نحو سبعة اسابيع || بياته الشتوي يستمر من ١٢ الى ١٤ اسبوعاً. مسرحه دجوي قوته الثمار الياض || يعتبر من الحيوانات الضارة.



حَبْوَة كَاكَنْجِيَة

٧٥٥٣ - حَبُوط ، سُقُوطُ الْحَقِّ

Déchéance (F).

Forfeiture (E).

هو ان يضيق رب الحق حقه لانه لم ينفذ الشروط المفروضة قانوناً.

٧٥٥٤ - حَبِينَة

Granule (F).

هي الحبة الصغيرة القد.

٧٥٥٥ - حَبِينَسَة

Enclave (F).

الحبسة او المكتنفة كل ارض لا طريق لها. والقانون يعطي صاحبها حق المرور.

٧٥٥٦ - حَبَشِشْ

Pintade (F). Guinea-fowl (E).

هو الفرغر، اطلبه.

٧٥٥٧ - حَبِينَة ٥

Chorda (S).

Chorde (F). Chorda (E).

جنس نباتات بحرية من الخثيات السر. انواعه المعروفة خمسة. اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || كلاهما منشعبة. سوقها خيطية ضمية التجميع تطول بعض الامتار.

٧٥٥٨ - حَبِينْ

Oléandre (F). Oleander (E).

الحين هو الدفلى المبدولة.

٧٥٥٩ - حَبِينَة *، أَمَّ حَبِينْ

Agama stellio (S). Stellion (F). Stellion (E).

حيوان بيوض من العظاء وفصيلة الحرذونيات شارفات الاسنان، مكتسيات اللسة، رباعيات القوائم، خامسيات الاصابع || جسمها مستقيح الهيئة يطول نحو ٣٥ سم. رأسها شبه بيضي الشكل. عيناه جانبيتان تلحفها اجفان شفافة ثابتة. اذناها خافتا الغشاء الصيواني. تسليها يشتمل على قواطع وانياب واضراس. طيات عنقها مسننة

اوراقه مستطيلة سنانية مديية. ازهاره صفير تتوسطها خمس بقع سمر. مآبرها حر. تويجاتها مسننة، ازانادها قصيرة. ثماره كروية الشكل حمراء اللون مأكولة. يزرع لثماره.

٧٥٤٧ - حَبْوَة زَبَاء ، كَاكَنْجْ أَصْفَر

Physalis pubescens, Ph. barbadensis (S). Coqueret pubescent, C. comestible, Alkékenge jaune (F).

نبات عشبي حولي ازغب، سوقه مسطحة تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه بيضيه ذلقة الزام الاخير المديب. ازهاره صفير، ثماره برتقالية اللون || يزرع لثماره المأكولة.

٧٥٤٨ - حَبْوَة فِيلَادَلْفِيَة

Physalis philadelphica (F). Coqueret de Philadelphie (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. ازهاره صغيرة الحجم، ازانادها متوسطة القد تطول نحو ٢ سم. تويجاتها مسننة ضيقة الزوايا. بتلاتها الى اليباض الاخير. مآبرها الى الزرقة البنفسجية || تزرع لثمارها المأكولة.

٧٥٤٩ - حَبْوَة كَاكَنْجِيَة *، كَاكَنْجْ ، كَرَزُ الْقُدْسْ ، آشَاشُ الْقَاضِي

Physalis alkekengi (S). Coqueret alkekengi, Cerise des Juifs, Alkekengi (F). Alkekeng, Bladder herb, Wintercherry (E). Deutsche schlutte, Lampionpflanze (D). Alcachengi, Chichingero, Palloncini (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الباذنجانيات يعلو من ٢٥ الى ٦٠ سم. اوراقه معنقة متعاقبة. ازهاره صغيرة ابطية بيضاء اللون ملطخة. ثماره لوية ارجوانية مأكولة حامزه رطبة مدرة للبول || ازهاره يستمر من ايار الى تشرين.

٧٥٥٠ - حَبْوَرَة *، Labrus julis, Coris julis (S).

Labre girelle (F). Coris julis (E).


سمكة بحرية بيوض من فصيلة الكيديميات ورتبة شائكات الزعانف. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. تعتبر من اسماك حشاش المجادح والنقاف. قوتها البلاعيط والرخويات والنبوت البحرية || جسمها اهليلجي الشكل معتدل التبيط، يطول من ١٧ الى ٢٥ سم. ثوبها جميل الالوان الزاهية يتميز بالوكاب المتباين التخضيب بين الشقين. ظهرها الى الخضار الالس. القسم العلوي من جانبيها الى الوردي يطوقه حثار منشاري الخط. ازرق اللون. القسم السفلي من جانبيها الى الخضار البحري الفاتح يعلوه تجذيع معترض حنطي. بطنها الى البياض الاخير الاطحل الموج. الانثى افتح ثوباً من الذكر والاخضر الالس في الظهر يتحول الى اخضر زيتي، والاازرق يتحول الى اسمر والاسمر الى اصفر. رأسها مخروطي الشكل. فكها متعادلان. شدقها قليل الانفراج. اسنانها صغيرة وحيدة الصنف. عينها مستديرتان، معتدلتا النشوز. زعانفها ملونة. الظهرية واحدة مستطيلة. الذيلية محدبة الطرف، خضراء اللون، صفراء الموج، يطوقها حثار ازرق عند الذكر واسمر عند الانثى || لحمها متوسط الصنف مأكول.

٧٥٥١ - حَبْشُوشْ ٥: أَشْرَفْ

Nesonycteris (S).

Nesonycteris (F).

جنس حيوان من فصيلة الطوطيات. انواعه المعروفة اربعة جميعها براء، صغيرة القد، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. وبسطها من ٢٤ الى ٢٨ سم، اثنائها



حَبْوَرَة



حَبِينَة

٧٥٧١ - حِثْنُ الْأَرْجَاعِ

Coefficient de restitution (F). Restitution coefficient (E).

٧٥٧٢ - حُثَّ الحث هو الرمل اليابس الخشن (مقاييس اللغة).

٧٥٧٣ - حُثَاة Epicarpe (F). Epicarp (E). الحثاة هي قشرة الثمرة الخارجية تلحفها البشرة وتلحف السوّدق . ج حث .

٧٥٧٤ - حُثَالَة Déchet (F). Waste (E). الرديء الذي لا يصلح للاستعمال من كل شيء وهو النفاية والنفل وما أشبه .

٧٥٧٥ - حُثْر الحثر هو حب العنقود اذا تبين وهو ثمر الاراك . والحثر من العنب : ما لم يوقع وهو حامض صلب .

٧٥٧٦ - حُثْرُب الحثرب : بقلة كالايهقان صفراء غبراء تنبسط على الارض . تعجب المال . (اللسان) . والحثرب : الماء الكدر .

٧٥٧٧ - حُثْرَة حثرة الكرم هي زمرته بعد الاكاخ .

٧٥٧٨ - حُثْمَة Clairière (F). Clearing, Glade (E). الحثمة البقعة الجرداء في غابة . ج حثام .

٧٥٧٩ - حُثْوَاء الحثواء : الارض الكثيرة التراب .

٧٥٨٠ - حُثَيْلَة Osteomeles (S). Ostéomèle (F). Osteomeles (E). شجيرة برية وتزيينية من فصيلة الورديات . مهدا يمتد من الشرق الادلى الى الاقصى . ساقها فضاء تعلو من متر الى مترين . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، مركبة ، وقرية العدد الذي يراوح من ١٣ الى ١٩ ، وريقاتها سنائية النصل تطول من ١ الى ٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٨ مم . ازهارها بيضاء اللون ، عذقية التجميع ، محورية الارتكاز . تزرع في الحدائق . تنويرها ربيعي .

٧٥٨١ - حُجَّاج Ogive (F). Ogive, Ogee (E). الحججاج قوس مشوتر التركيب يسند القبة ويؤمن تشييدها ويقوي متانتها .

٧٥٨٢ - حُجَّاج الْعَيْن Orbite (F). Orbit, Socket (E). هي نفرة العين وتدعى وقب ، اطلبه .

٧٥٨٣ - حُجَّاجِيّ Ogival (F). Ogival (E). نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالحجاج . يقال هندسة حجاجية وتزويق حجاجي .

٧٥٨٤ - حُجَّارَة ، رِقَاجَة Lithologie (F). Lithology (E). علم الحجارة وتركيبها .

الحراشف الشائكة . ظهرها ناشف الجلد الخشن . ثوبها الى الطحلة الرمادية تعلوها نمشة غبراء . تتميز بالشوذة اي انها تمانن البيئة التي تعيش فيها || تألف الوعر والبراري والمواقع الكثيرة الحجارة . تعيش ذكراً وانثى من اواسط الربيع الى اواخر الخريف حيث يفترقان || بيئاتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . تشرح في النهار نشاطها يزداد مع نشاط اشعة الشمس || قوتها الحشرات والجنس ادب والمقارب والمناكب || تعتبر من الزحافات المفيدة النافعة .

٧٥٦٠ - حُتَّ Erosion الحت والانحسار هو تفكيك ذرات التربة وانجرافها بفعل الامطار او الماء .

٧٥٦١ - حُتَات الحتات : من امراض الابل ان يأخذ البعير هلس فيتغير لحمه وطرفه ولونه ويشمط شعره .

٧٥٦٢ - حُتَار Bord (F). Margin (E). الحتار من كل شيء حرقه وكفاه .

٧٥٦٣ - حُتَارِي ، هَامِشِيّ Marginal (F).

٧٥٦٤ - حُثْرَة Tétée (F). Suck (E). ما يمتص الرضيع من حليب على دفعة واحدة .

٧٥٦٥ - حُثْرَشَة الحثرشة : صوت اكل الجراد ودود القز .

٧٥٦٦ - حُثْرَشَة * Odontostomus balbo (S). Odontostome (F). Odontostomus (E). سمكة بحرية بيوض وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الدوسميات ورتبة مفتوحات المشاة . اعطائها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها شبه وشعي الشوزن يطول من ١٢ الى ١٨ سم . حراشفها دقيقة ، شديدة الصغر . ثوبها الى الطحلة الصفراء المواج تسمر عند الظهر . ويملوها في جالبيها نكت دقيقة سوداء اللون || رأسها مستضخم الجرم ، قصير الخطم المستدير ، كبير الشدق الفاجر الرحب . فكها السفلي يتقدم العلوي نحو ٢ مم . اسنانها مستطيلة ، محجنة ، متباينة الاحجام . زعانفها لينة . زعنفتها الظهرية الثانية جدعة منحنية الشكل . زعنفتها الذيلية مقعرة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٥٦٧ - حُتَّك Autruchons (F). الحتلك صغار النعام اي رئالها . Young ostrich (E).

٧٥٦٨ - حُتْمِيَّة Déterminisme (F). Determinism (E). الحتمية مجموعة العوامل اللازمة لظاهرة ما . وهي ايضاً مذهب يدين بالمقدّر اذ يقول ان كل ما يحصل في العالم بما فيه الاعمال البشرية والحيوانية . هي النتيجة المحتومة لمنشع سالف .

٧٥٦٩ - حُثْن Coefficient ويدعى المعامل او المسمى هو العدد الذي تضرب به المعادلات واشباهها .

٧٥٧٠ - حُثْنُ الْأَحْتِكَالِ Coefficient de friction (F). Friction coefficient (E).



حثرشة

٧٥٩٤ - حَجَر آيْمَان Calcedoine (F).

يشب ابيض تملوه ماجة زرقاء . Chalcedony (E).

٧٥٩٥ - حَجَرُون

دوية طويلة القوائم اعظم من النمل (السان) .

٧٥٩٦ - حَجَرَوِيّ، سَيْتُولُوجِي Cytologique (F).

Cytologic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحجيرات .

٧٥٩٧ - حَجَرِيّ الشَكْل Lichoïde (F).

نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالحجر .

٧٥٩٨ - حَجَز Saisie (F).

Seizure, Attachement (E).

الحجز هو ان يوضع حث يد السلطة من اي نوع كانت قضائية ، ادارية ، خاصة او عامة ، مال منقول او ثابت وذلك لمنع مالكة او الحائز عليه من التصرف او الانتفاع به || والحجز قد يكون ارباني او تنفيذي وعقاري واستردادي الخ .

٧٥٩٩ - حَجَز الثَمَار

Saisie de fruits pendants (F). Distress of fruits (E).

هو حجز الثمار العالقة بأشجارها وهو حجز لا يجوز توقيعه الا في الاسابيع الستة التي يتم فيها الادراك والنضج حتى يمكن بيعها بالمزاد فور جنيها .

٧٦٠٠ - حَجَز المَزْرُوعَات Saisie brandon (F).

Execution on growing crops (E).

هو حجز الزروع القائمة على سوقها ولا يجوز توقيع هذا الحجز الا في الاسابيع الستة التي يتم فيها النضج .

٧٦٠١ - حَجَفَة ، جِنَانَة

Ecusson, Scutellum (F). Scutellum (E).

الجزء المثلث الزوايا الظاهر من جنبة البرجد عند انتشاب الغمدين في وسط الكوسل .

٧٦٠٢ - حَجَقِيّ Scutellé (F). Scutellate (E).

نعت يطلق على ما كان شكله كالحجقة .

٧٦٠٣ - حَجَقِيَّات الخِيَاشِيم

Aspidobranches, Scutibranches (F).

Aspidobranchial, Scutibranchial (E).

فئة من الرخويات مديات الارجل تتميز بخياشيمها الثنائية الصفائح المتراكبة الحجفية الشكل كأنها مدرعة || اشهر فصائل هذه الفئة الصديقيات وآذان البحر

٧٦٠٤ - حَجَل Perdrix (F). Partridge (E).

جنس طير أبدة من عمارة الحجلليات وفصيلة الطيوريات اسم جمعه حجلي وحجلان . انشاء تدعى حجلة وسلكة وسركة والفرخ سلكاً || انواعه ثمانية منتشرة من الشرق حتى اوروبا وافريقية . جميعها ربة الجفة ، صغيرة الرأس والمنقار ، مستديرة السقط والافنيك . تعيش اسراب صغيرة براوح عددها من ٦ الى ١٢ زوجاً || قوتها الاعشاب والحبوب والثمار والحشرات || تدثر عشها على الارض فتخفيه بين الاعشاب او في ظل الصخور الشارفة . انشاء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها نحو ١٨ يوماً . اما الذكر فيبقى قرب انشاء لا يتركها الا في طلب القوت || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٧٥٨٥ - حَجَافَة مَآوِي

Dermatemys mawy (S). Dermatémys mawy (F).

سلحفاة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحجاقيات . اعطانها بحيرات ومناقع واغوار امريكة الجنوبية والوسطى || جسمها كبير القد . ذبلها بيضي الشوزن ، قليل الاحديداب . يطول نحو ٦٠ سم . زعفها كبير ، فضفاض ، منبسط الصفحة ، مقوس المقدم ، محوف المؤخر . رأسها معتدل الجرم . عنقها متوسط الطول . ذنبها قصير . قوائمها نشيطة || قوتها النباتات المائية . لحمها مأكول .

٧٥٨٦ - حَجَافِيَّات Dermatemydidae (S).

Dermatemydidae (E). Dermatemydidae (F).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها المعاصرة ثلاثة ، اما انواعها فخمسة . اعطانها بحيرات ومناقع امريكة الجنوبية والوسطى || اجسامها متباينة الحجم . اذبالها بيضية الشوزن قليلة الاحديداب ، عادمة الاكطار . مستديرة الجوانب . زعافها منبسطة ، مقوسة المقدم ، محوفة المؤخر || اشهر انواعها حجافة مآوي وضواجة شرسة وكلوديوس منكمشة .

٧٥٨٧ - حَجَبَة

الحجبة : حرف الورك المشرف على الحاصرة .

٧٥٨٨ - حَجَر Jument poulinière (F).

Brood-mare (E).

الانثى من الخيل تتخذ للنسل . ج احجار وحجور .

٧٥٨٩ - حَجَر Pierre (F). Stone (E).

جسم جامد طبيعي مختلف التركيب والصلابة والنقل النوعي . اعم ضروره واشيعها الحجر الجيري الذي يستعمل في البناء وهو على اشكال ثم الرمل والرخام والاميل الى آخره .

٧٥٩٠ - حَجَر التُوتِيَا ، حَجَر سَلِيمَانِي

Calamine

هو سيليكات الزنك الطبيعية . مادة معدنية حجرية الشكل تحوي نحو ٢٥,٥٠٪ من السيليس و ٦٧٪ من اكسيد الزنك و ٧,٥٠٪ من الماء || بلوراته قطبية التخديد ، لامعة الصلابة . ثقله النوعي ٣,٥ وصلابته ٥ .

٧٥٩١ - حَجَر الدَّم ، شَادَنَج ، هَمَتِيْت

Hématite (F). Haematite (E).

هو الهمتيت معدن حديدي ادبس اللون ، اطلبه . وقد دعي حجر الدم او الشادنج لانه كان يستعمل في الطب القديم لحبس الدم . وقد قال فيه الانطاكى : « اجوده الرزين الاحمر المعرق الشبيه بالعدس . تبقى قوته الى خمسة وعشرين سنة وهو يابس في الثانية والثالثة حار في الاولى ان لم يغسل فان غسل فبارد . يذهب خشونة الاجفان ويحد البصر ويدمل القروح والجراحات المزمنة ويحبس الدم من اي موضع كان » .

٧٥٩٢ - حَجَر عَقْد Vousseau, Voussoir (F).

Wedge-shaped, Arch-stone (E).

كل حجر من حجارة المقد .


٧٥٩٣ - حَجَر مَقْصُوب Pierre de taille (F).

Freestone (E).

٧٦٠٥ - حَجَلْ أَخَر *

Perdix rubra, Alectoris rufa (S). *Perdrix rouge* (F). *Red-legged partridge* (E).

طائر من الحجل كبير القد طوله من ٣٠ الى ٣٢ سم. ثوبه الى الجؤوة الربداء يعلوه موج اصفر وتأذير جانبي. حلقه وعنقه تغمهما قلادة من الدر الاسود. منقاره ورجلاه الى الجؤوة الصهباء || موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية.



حجل احمر

٧٦٠٦ - حَجَلْ أَرَبْد

Perdrix grise (F).


Common partridge (E).

هو القبيج ، اطلبه .

٧٦٠٧ - حَجَلْ الْمَغْرِب

Perdix petrosa, Alectoris barbara (S). *Perdrix de roche, Gamba* (F). *Barbary partridge* (E).

طائر من الحجل طوله نحو ٣٠ سم. ثوبه الى الجؤوة المؤذرة والموشة والموشة. احمر المنقار والرجلين ، اسمر العنق والحلق || موطنه افريقية الشمالية وجزر المتوسط. ضروبه اربعة او خمسة منها المراكشي والمغربي والتونسي والكناري .



حجل تهامي

٧٦٠٨ - حَجَلْ مُهَامِي * ، قُهْنِي ، قُهْنِيَة

Perdix robusta, Caccabis robusta (S). *Perdrix robuste* (F). *Sand partridge* (E).

طائر من الحجل متوسط القد طوله نحو ٢٦ سم. ثوبه الى الربداء الغبراء يعلوه تأذير وتوشيم. اصفر المنقار والرجلين || موطنه الجزيرة العربية وفلسطين وحوض البحر الاحمر.

٧٦٠٩ - حَجَلْ رُومِي * ، مُشَار ، يَعْقُوب

Perdix graeca, Alectoris graeca saxatilis (S). *Perdrix grecque, Bartavelle* (F). *Greater red legs* (E).

طائر من الحجل كبير القد طوله من ٣٢ الى ٣٥ سم. ثوبه الى الربداء الرصاصية يعلوه موج احمر وتأذير جانبي مستعرض. عنقه ابيض اللون ، اسود الاطار ، منقاره احمر ورجلاه كذلك || موطنه الشرق الاوسط من ايران حتى اروبه .




حجل رومي

٧٦١٠ - حَجَلْ شُقَر * ، قُصَيْطَة

Perdix chukar (S). *Perdrix chukar* (F). *Chukar partridge* (E).

طائر من الحجل متوسط القد . طوله نحو ٢٧ سم. ثوبه الى الربداء الخضراء يعلوه موج اصفر وتأذير وتوشيم. اسمر المنقار والرجلين . مستطيل القلادة الحمراء || موطنه الشرق الاوسط من العجم حتى اليونان .



حجل شقر

٧٦١١ - حَجَلْ عِرَاقِي


Starne (F).

هو القبيج اي الحجل الاربد ، اطلبه .

٧٦١٢ - حَجَلِيَّات

Perdicians (F).

عمارة طير من فصيلة الطيهوجيات تتميز بامتداد المنطقة الريشية على كامل رأسها حيث تكسوه حتى المنقار ويخلو ارساغها ويخالها من الريش || اجناسها سبعة الحجلان والداريج والزلول والساني والقبيج والقول والكولان .



حجبار

٧٦١٣ - حُجْبَار *

Greenovia aurea (S).

Greenovle dorée (F).

بجلة صغيرة معمرة من فصيلة المخلدات . منبتها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط ، اغصنها الجزر . ساقها منتصب ،

جرداء ، تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها تطول نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣ سم. نصالها معتدلة الشخانة ، بحرية الخضار يطوقها حنار ابيض غصروفي المادة . شراخها الزهري ينتهي بعشكول خلي اللحاء قطره نحو ٢٠ سم. ازهارها صغيرة صفراء اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار .

٧٦١٤ - حَجَنَة

Pampre (F). *Vine-branch* (E).

القضيبي القصير الذي يحمل عنقود العنب . ج حجج .

٧٦١٥ - حُجْنَة ٥

Réserve (F). *Reserve* (E).

هي ما تحتزنه الاشجار من مواد غذائية تنفقها عند الانطلاق الحولي والامطار .

٧٦١٦ - حُجْبِيَجَة

Hirondelle (F). *Swallow* (E).

هي الخطاف ، اطلبه .

٧٦١٧ - حُجْبِيْرَة

Cellule animale (F).

Animal cell (E).

اطلب خلية .

٧٦١٨ - حُجْبِيْرِي ، حَلِيْوِي

Cellulaire (F). *Cellular* (E).

كل ما يمت بالحجيرة او الخلية .

٧٦١٩ - حُجْبِيْفَة ٥

Dipelta (S).

Dipelte (F). *Dipelta* (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الترس الصغير المزدوج » جنس نباتات شجرية يرية وتزيينية من فصيلة الخنانيات . مهدها يمتد من الشرق الادنى الى الاقصى . سوقها تملو من متر الى خمسة امتار . اوراقها متقابلة ، عابلة . ازهارها محورية الارتكاز ، كبيرة القد ، فردية او ثنائية || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٧٦٢٠ - حُجْبِيْفَة بَطْنِيَة ٥

Dipelta ventricosa (S). *Dipelte ventrue* (F).

نوع من الحجيفة التزيينية . ساقها تملو من متر الى اربعة امتار . اوراقها شبه قلبية الشكل ، مستديرة القواعد . نصالها مسننة الختار . ازهارها كبيرة ، فردية ، تتميز بتوحياتها الرافضة القواعد وبقناباتها الترسية الشكل . لونها الى البياض الليلكي الموج || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٧٦٢١ - حُجْبِيْفَة مُزْهَرَة ٥ *

Dipelta floribonda (S). *Dipelte florifère* (F).

نوع من الحجيفة التزيينية . ساقها تملو من مترين الى خمسة امتار . اوراقها شبه سنائية الشكل تطول من ٨ الى ١٢ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصالها خلية الصفحات السفلى . ازهارها ثنائية كثيرة العدد ، كبيرة القد ، ليلكية اللون مبقجة بالاصفر || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار

٧٦٢٢ - حُجْبِيْلَاء

الحجيلاء : الماء الذي لا تصيبه الشمس .

٧٦٢٣ - حُجْبِيْنَة ٥

Cyrtanthus (S).

Cyrtanthe (F). *Cyrtanthus* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة الارجسيات . مهدها بعض مناطق افريقية الجنوبية . شراخها جوفاء . اوراقها ضيقة النصال القدية الشكل . ازهارها ملونة ،

الحداة والزرق والخنكران والصدصع والنضفة والقطامي . جميعها متوسطة الجثة الهيفاء . سواقطها كبيرة مستطيلة . اذناها فارقة . مناسرها بحجة شديدة الانعقاد ، حادة البهرة . ارساغها قصيرة وغلظتها || اعطانها العالم . تطير بحفة ولباقة ، تخلق وتحوم بقليل من التصفيق || قوتها القواضم والزواحف والعصافير والاسماك والخشرات . تعيش ازواجاً . تدن في صدوع الصخور وفي الخرائب الدائرة والاشجار الباسقة وعلى الحضيض . تنبي وكناتها بالقضبان وتحببها وتلفها بالافنان والاعشاب . اناثها تبيض من رفنة الى خمس رفنات تحضنها بمنابرة الذكور .

٧٦٣٣ - حَدَّاءَةٌ * ، بَرَكِيل

Xenopeltis unicolor (S).

Xénopelte, *Xénopeltis* (F). *Xenopeltis* (E).

حية بيوض وحيدة . الجنس والنوع من فصيلة الحدايات عادات السموم . جسمها نحس الجرم يطول نحو ١٢٠ سم . ثوبها الى الصبهة الخنطية يعلوها موج جزوي وشبه تقيج جانبي يمتد من الشدين الى طرفي الذنب . مدنها الى السمرة . رأسها اسفني الشكل . عينها صغيرتان جاسفتان . شدقها مستعرض الملاق . عدد اسنانها ٦٨ منها ٣٤ سنًا في كل فك || تألف المواقع التي تكثر فيها الاتربة القليلة الاندماج لانها تغور فيها . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر || تبلغ كامل نموها بعمر ١٤ او ١٥ سنة وتعيش من ١١٠ الى ١٢٠ سنة . تسافد بعمر ٦ سنوات . تسرح في النهار وفي الليل . قوتها الجرذ والفئران والعطاء والمكابر والثعابين والصفادع ... || اخلاقها سلسة . تتخاشى الانسان واذا ضربه تضره بلذنها . ضربتها مؤذية لانها تقرص المكان الذي تصيبه وقد تفعل فيه فعل السوط || تعتبر من الحيات النافعة .

٧٦٣٤ - حَدَّاءَاتٌ ٥

Xenopeltidae (S).

Xénopeltidés (F). *Xenopeltidae* (E).

فصيلة حيات بيوضة من عادات السموم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها تمتد من الشرق الادنى الى الهند وماليزية . تألف المناطق الحارة . تسرح في الليل وفي النهار . قوتها الفأر والجرذ والعطاء والصفادع والثعابين || اجسامها نحسة مستغلظة تطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . رؤوسها اسفنية الشكل . عينها صغيرة . اشداقها مستعرضة الملاق . فكوكها مسننة . حراشفها معيئة ، قزاحية . دعايلها كبيرة . ذيايلها صغيرة . || اشهر انواعها الحداة .

٧٦٣٥ - حَدَّاءَةٌ

Hache (F). *Axe*, *Hachet* (E).

الحداة : الفأس ذات الرأسين ج حذاء .

٧٦٣٦ - حَدَّاءَةٌ

Milvus (S). *Milan* (F). *Kite* (E).

كنيتها ابو الخطاف وابو الصلت . جنس طير من عمارة الحداة وفصيلة الصقريات . انواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة والمعتدلة . اخلاقها شرسة . اجسامها رشيفة . سواقطها مستطيلة . اذناها فارقة . ارساغها قصيرة || وعلى سبيل الفكاهة نورد ما جاء في الدميري عن ابن وحشية وابن زهر وبعض رواة الاخبار . قال : « الحداة كانت من جوارح سليمان . والسبب في صياحها عند سفادها ان زوجها قد جحد ولدها منه فقالت يا لبي الله قد سفدني حتى اذا حضت يضي وخرج منه ولدي جمحني فقال سليمان للذكر ما تقول فقال يا نبي الله انها تحوم البراري ولا تمتنع من الطير فلا ادري اهو

جميعية التركيب ، محضونة بزواج او بزواجين من الشرايف الخضر || تزرع للزينة ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج الوافرة المواد الغذائية || انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

٧٦٣٤ - حُجَيْتَةُ حَمْرَاء * ٥

Cyrtanthus

sanguineus (S). *Cyrtanthe rouge-sang* (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفضية سبروتية . اوراقها قليلة العدد ، من ٣ الى ٤ ، لونها الى الخضار الاليس ، نصلها قدي الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . ويعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . ازهارها حمراء اللون سفعية الموج || تنويرها يستمر طوال شهر آب .

٧٦٣٥ - حُجَيْتَةُ ضَيْقَةُ الْوَرَقِ ٥

Cyrtanthus angustifolia (S).

Cyrtanthe à feuilles étroites (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفضية سبروتية . اوراقها خيطية قليلة العدد الذي يراوح من ٢ الى ٣ . لونها الى الخضار الجميل . تظهر مع الازهار وتطول من ١٥ الى ٣٥ سم . شراخها يرتفع من ٣٠ الى ٤٠ سم . ازهارها عادية العرف ، حمراء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . امانها ٤ سم . تنويرها خريف .

٧٦٣٦ - حُجَيْتَةُ عَطْرَةٍ ٥

Cyrtanthus odoratus (S). *Cyrtanthe odorant* (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفضية خادحة . اوراقها ضيقة النصال ، قدية الشكل تطول نحو ٣٠ سم . لونها الى الخضار الزاهي . شراخها يرتفع نحو ٢٥ سم . ازهارها فواحة العرف المستحب ، مستطيلة الشكل ، صغيرة البتلات الضيقة || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

٧٦٣٧ - حُجَيْتَةُ عَوْجَاء ٥

Cyrtanthus obliquus (S). *Cyrtanthe oblique* (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفضية سبروتية . اوراقها سنائية الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ سم . نصالها صلبة ، محددة انسطوح المعوجة ، لونها الى الخضار الاطلح . تظهر بعد الازهار . شراخها يرتفع من ٣٠ الى ٦٠ سم . ازهارها كبيرة القد ، تطول من ٥ الى ٨ سم . لونها الى الخضار المشع بالبرتقالي . شرايفها اربعة متمطقة نحو الخارج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران

٧٦٣٨ - حُجَيْتَةُ وَحِيدَةِ الزَّهْرَةِ

Cyrtanthus uniflorus (S). *Cyrtanthe uniflore* (F).

نوع من الحجينة . عشبة دوفضية سبروتية . اوراقها قليلة العدد ، من ٢ الى ٣ ، بحرية الخضار ، قدية الشكل ، تطول نحو ١٥ سم . شراخها يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . زهرتها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . || تنويرها في كانون الاول .

٧٦٣٩ - حَدَّ

Limite (F). *Limit* (E).

هو الحاجز بين الشيئين وهو منتهى الشيء

٧٦٣٠ - حَدَّ أدْنَى

Minimum


٧٦٣١ - حَدَّ أَعْلَى

Maximum


٧٦٣٢ - حَدَّاءٌ

Milans, *Milvjens* (F). *Milvus* (E).

عمارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ستة اجناس .



حُجَيْتَةُ مَزْهَرَة



حجينة حمراء



حدّاءة

نحو ٢٠ جميعها افريقية المهد. تألف الفياقي والبراري والقيمان. قوتها الحشرات ويرقاتها تسمى اليها قفراً وتنقب التراب والرمال في طلبها || اجسامها صغيرة. تتميز باستطالة جرامها الخلفية وبمصر الامامية. رؤوسها غليظة انوفها خنابية مستطيلة. عيونها جاحظة. اذانها ملعقية، منتصبة. اعناقها قصيرة. اذانها مستطيلة. اثوابها تمانن المواقع التي تعيش فيها || جنسها الحداد والدواك.

٧٦٤٦ - حُدَّالٌ * Malvastrum (S).

Malvastre, Mauve bâtarde (F). False mallow (E). Scheinmalve (D). Malvastra, Falsa malva (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الحجازيات. انواعه عديدة واسعة الانتشار، معظمها بري وبعضها زراعي زريحي. اوراقها معنقة، متعاقبة، مفصصة النصل. ازهارها لاقياسي التجميع والارتكاز. ازهارها مختلفة الالوان مستعرضة البتلات || اشهر انواعه الخمسة التالية.

٧٦٤٧ - حُدَّالٌ افريقي

Malvastrum hypomadarum (S). Malvastre calvescent (F).

جنية معمرة تملو نحو ٣ امتار. ساقها ليفية فرعاء متشعبة. اوراقها لاقياسية الشكل يغلب فيها التفصيص الثلاثي فصلها ازغب البشرة مسنن الحافة. ازهارها ابطية الارتكاز. قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها مستعرضة لونها الى الالبيض يملوها في وسطها مشعة وردية || ازهاره يستمر طوال فصل الحريف.

٧٦٤٨ - حُدَّالٌ الرأس Malvastrum capensis (S).

Malvastre du Cap (F).

جنية معمرة ليفية الساق الخنطية اللون تملو من مترين الى ثلاثة امتار. مهدا رأس الرجاء الصالح. اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص. ازهارها ابطية الارتكاز لونها الى الاحمر العقيقي || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

٧٦٤٩ - حُدَّالٌ جَرَسِي

Malvastrum campanulatum (S). Malvastre campanulé (F).

عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كبيرة القد، لاقياسية التفصيص، ملساء البشرة. ازهارها جميلة الشكل الجرسى، ارجوانية اللون || ازهاره يستمر طوال فصل الحريف.

٧٦٥٠ - حُدَّالٌ جُوْوي

Malvastrum lateritium (S). Malvastre rouge brique (F).

عشبة معمرة تملو نحو ١٥ سم. ساقها منبسطة متشعبة زباء اللحم. اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص الخروطي الشكل، زباء النصل الخليلي الملمس، الغضي الموج. ازهارها فردية مستطيلة الزناد جووية اللون || ازهاره يستمر طوال الحريف.

٧٦٥١ - حُدَّالٌ خَمْرِي

Malvastrum coccineum (S). Malvastre carmin (F).

عشبة معمرة تملو نحو ٢٥ سم. ساقها منبسطة متشعبة. اوراقها مستعرضة ثلاثية او خماسية التفصيص، فصلها مسنن الحافة ازغب البشرة الخملية الفضية الموج. ازهارها خرية اللون، سفعاء الموج، سفلية التجميع، تاجية الارتكاز || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

مني او من غيري قال فامر سليمان باحضار الولد فوجده شبه والده فالخقه به ثم قال لها لا تمكنيه ابداً حتى تشهدني عليه ذلك الطير لثلا يحمد بعدها فصارت اذا سفدها صاحت وقالت يا طيور اشهدوا فانه سفدني. || اعرف واشهر انواعها ما يلي.

٧٦٣٧ - حِدَاةٌ حَمْرَاءُ * حِدَاةٌ شَالِغَةٌ، آصِي

Milvus milvus, M. icinus (S). Milan royal (F). Red kite, Glede (E).

اختشها واكبرها جثة وجناحاً. طولها نحو ٦٥ سم. وبسطها نحو ١٧٥. ثوبها الى الريدة السفعاء يملوه توشيم وتمشيق وحباك. رأسها وعنقها الى البياض الاغبر تعلوه نمشة سمراء. منقارها اسمر، عينها ورجلاها ومخالبها صفر || وهي من ارباب الشرق الادنى وقواطع اروبها.

٧٦٣٨ - حِدَاةٌ سَوْدَاءُ *

Milvus niger, M. migrans (S). Milan noir (F). Black kite (E).

نوع من الحدأة وهي اصغر قدماً من الحمراء واعبق ثوباً وابهم توشيماً وتمشيقاً. منقارها وعينها وحباك زمكها سود. رجلاها ومخالبها صفر. موطنها الشرق الادنى والمناطق الاروبية الدافئة وشمال افريقية.

٧٦٣٩ - حِدَاةٌ شَرْقِيَّةٌ *، اِبْنُ آصِي

Milvus korschun (S). Milan d'Orient (F). Korschun kite (E).

نوع من الحدأة متوسطة القد، هيفاء الجسم ثوبها الى الريدة المشقة العابقة الظهر الباهتة البطن || موطنها الشرق وهي من طيور القواطع.

٧٦٤٠ - حِدَاةٌ مِصْرِيَّةٌ * Milvus aegyptius (S).

Milan égyptien, M. parasite (F). Egyptian kite (E). قريبة الشبه من الحدأة السوداء. ثوبها يرتكز على الصهبة الرمضاء. منقارها اصفر اللون. زمكها فاروق منفرج الانشعاب || موطنها مصر والصوبال والخبشة والجزيرة.

٧٦٤١ - حُدَّادٌ * Macroscelides (S).

Macroscélide (F). Macroscelides (E).

جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسة من فصيلة الحداديات. انواعه المعروفة نحو ١٢ منتشرة في معظم المناطق الافريقية. تألف الفياقي والبراري القاحلة. قوتها الحشرات واساريعها. عدوها قنزر مستمر || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٤ سم. يضاف اليها طول الخنابة من ١ الى ٢ سم. وطول الذنب من ١٠ الى ١٢ سم. اثوابها تراوح من الصهبة الى الشقمة والشقمة السمراء. بطونها وصدورها تبنية اللون او عاجية دنسة || اناثها عشارية الاطباء.

اعرف انواعها واشهرها :

٧٦٤٢ - حُدَّادٌ اشْفَحٌ * Macroscelides

rufescens (S). Macroscélide roussâtre (F).

٧٦٤٣ - حُدَّادٌ الجَزَالِرُ * Macroscelides

rozeti (S). Macroscélide d'Algérie (F).

٧٦٤٤ - حُدَّادٌ الكَفَرُ * Macroscelides typus (S).

Macroscélide de la Cafrerie (F).

٧٦٤٥ - حُدَّادٌ بَيَّاتٌ * Macroscelidæ

Macroscélidæ (F). Macroscelidæ (E).

فصيلة حيوانات لبونة حاشرة جاسة. اجناسها وانواعها



حِدَاةٌ حَمْرَاءُ



حِدَاةٌ سَوْدَاءُ



حِدَاةٌ شَرْقِيَّةٌ



حِدَاةٌ مِصْرِيَّةٌ



حُدَّادٌ



حُدَّالٌ

٧٦٥٢ - حَدَب ، مُحَدَّب ، أَحَدَب

Convexe (F), Convex (E).

٧٦٥٣ - حَدَابَة ، تَحَدَّب ، إِحْدِيدَاب

Convexité (F), Convexity (E).

٧٦٥٤ - حَدَث

Evénement (F).

اطلب حادث .

٧٦٥٥ - حَدَث

Phénomène (F), Phenomenon (E).

اطلب ظاهرة ومذنب .

٧٦٥٦ - حَدَج

Coloquinte officinale (F).

Colocynth (E). هو الحنظل ، الواحدة حدجة .

٧٦٥٧ - حَدَجَة

الحدجة : طائر يشبه القطا (القاموس) .

٧٦٥٨ - حُدُودُه

Nannosciurus (S).

Nannosciure (F).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة السنجاييات .
أنواع ستة موطنها البلاد الآسيوية والأفريقية . أجسامها
صغيرة نحيلة مسطيلة طولها من ٦ إلى ١٠ سم . وأذناها
من ٥ إلى ٨ سم . أنوارها إلى الصبغة الزيتونية البيضاء
المواج || يألف الغابات . يسرح في النهار . يتسلق
بخطه . قوته الثمار والبزور والقشور . بجمه وكن يربيه في
صدع الشجرة . أثناء تضع من ٣ إلى ٤ ادراص تبصر
وتكتسي بعد وضعها بأسبوع .

٧٦٥٩ - حَدَد

حدد الزرع وكل نبات اذا تأخر خروجه من قلة المطر
أو الري ثم خرج سقيماً ناشفاً ولم يشعب .

٧٦٦٠ - حَدَد

Serran (F).

الحدد سمكة بحرية تدعى صرّان ، اطلبها .

٧٦٦١ - حَدَد مُسَبَّج

Serran maculé (F).

هو الصران المسبج ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٧٦٦٢ - حَدَد مُزَخَرَف

Serran écriture (F).

هو الصران الكاتب ، سمكة بحرية ، اطلبه .

٧٦٦٣ - حَدَس

Pronostic (F), Prognostic (E).

تقدير ما يجوز حدوثه في المستقبل .

٧٦٦٤ - حَدَق * حَدَقِي

Mélongène, Morelle inerme (F).

فئة من الباذنجان . أنواعه عديدة تتميز بخلوها من الشوك
وبانتصاب سوقها للاعارضة || اعرف أنواعه ما يتبع .

٧٦٦٥ - حَدَقِي الْأَرَجَنْثِين

Solanium rantonneti (S), Morelle de Rantonnet (F).

نوع من الحدق البري والتزييني مهده الأرجنتين .
والبراغوي . ضروبه قليلة جميعها معمرة تعلو من ١٠٠
إلى ٢٠٠ سم . أوراقها سنانية النصل مسنة الحافة
أزهارها بنفسجية أو زرق . ثمارها عنبية الشكل ، حراء
اللون .

٧٦٦٦ - حَدَقِي الْبَرَازِيل

Solanium capsicastrum (S), Morelle piment bâ-
tard (F).

نوع من الحدق البري والتزييني . مهده البرازيل .
ضروبه المشهورة أربعة جميعها معمرة صغيرة القد تعلو
من ٢٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها بيضبة أهليلجية زهاء
النصل . أزهارها بيض . ثمارها عنبية كروية برتقالية
أو أرجوانية اللون .

٧٦٦٧ - حَدَقِي سَلَقِي الْوَرَق

Solanium betaceum, Cyphomandra betacea (S), Mo-
relle à feuilles de bette (F).

نوع من الحدق الزراعي . يعلو نحو ٥ أمتار . أوراقه
كبيرة القد تبدو خرية ثم تنحرف إلى الجؤرة وتنتهي
بالأخضر الأطول . أزهاره عناقيد متدلية . أزهاره
حمر . ثماره عنبية كبيرة الحجم حمراء اللون مأكولة ، طعمها
كطعم البندورة .

٧٦٦٨ - حَدَقِي قَطِي

Solanium crispum (S).

Morelle crépus (F).

نوع من الحدق البري والزراعي التزييني . مهده بلاد
الشيبي يعلو نحو أربعة أمتار . أوراقه قليلة القاعدة .
بيضبة الزام الثاني والثالث ، ذلقة الزام الأخير . متموجة
النصل القطي الحافة . أزهاره صغيرة بأعنة اللون ، بتلاتها
إلى البياض الأخير يقطبها خط بنفسجي . ثماره صفراء
اللون ، عنبية الشكل بحجم الحمص .

٧٦٦٩ - حَدَقِي مَادِيرَا

Solanium pseudocapsicum (S), Morelle faux-piment,
Orange de savetier (F).

نوع من الحدق البري والتزييني . يعلو من ١٠٠ إلى
١٥٠ سم . أوراقه سنانية مسنة . أزهاره بيض . ثماره
أرجوانية اللون ، كروية الشكل ، كروية القد . لها
أسفنجي ناشف ، بزورها سود صغيرة وكثيرة العدد .
يمكن استعمالها كطعم للضروب العادية المأكولة الثمار
لكنها تخطئ المواقع الباردة .

٧٦٧٠ - حَدَقَة

Iris

الحدقة هي قزحية العين أي غشاء العين الملون .

٧٦٧١ - حَدَل

Roulage (F), Rolling (E).

راجع تحديل .

٧٦٧٢ - حَدَوَاء

Vent du Nord (F).

North-wind (E).

هي ريح الشمال لأنها تحمل السحاب أي تسوقه .

٧٦٧٣ - حَدَوَائِيَّة ه

Holarctique (F).

Holarctic (E).

نعت تعريفي يطلق حل كامل المنطقة الشمالية بما فيها
القطبية من العالمين القديم والجديد .

٧٦٧٤ - حَدَوُر

Plan Incliné (F), Inclined plane (E).

٧٦٧٥ - حَدِيد

Fer (F), Iron (E).

عنصر كثير الانتشار في باطن الأرض وظاهرها . يندر
وجوده منفرداً في الطبيعة . خاماته أكاسيد وكربونات .
رمزه (ح) . وزنه الذري ٥٥,٨٤ تكافؤه ٢ أو ٣
وهو بوجه عام رمادي اللون ، فني الموج قابل للطرق



حدق

٧٦٨٦ - حَذَف

غمّ سود صغار مهدا الحجاز. الواحدة حذفة.

Sarcelle (F). Teal (E).

جنس طيور مائية من فصيلة البطيات. انواعه خمسة جميعها من القواطع، صغيرة القد، رشيقة القوام، سريعة الحركة. اسرابها كثيرة العدد. طيرانها خال من كل نظام وترتيب. قوتها الاعشاب المائية والحشرات. والرخويات. تتألف المناقع وشواطئ الأنهر والبحيرات. أشهرها ما يلي.

٧٦٨٨ - حَذَف جَمِيل *، مَنِيَّة

Anas angustirostris (S). Sarcelle marbrée (F). Marbel teal (E).

نوع من الحذف كبير الجثة طوله نحو ٤٠ سم. ثوبه الى الرعدة الصهباء. سواقطه مشقة بالابيض. حياك قوادمها اسمر. صدره عابق الصهبة. بطنه ينحرف نحو الالبيض. رقشة صدره وتوشم بطنه الى السمرة الخطية. حنار عينه اسود. منقاره ازرق رصاصي.

٧٦٨٩ - حَذَف شَتَوِي *، شَرَشِير شَتَوِي

Anas crecca, Querquedula crecca (S). Sarcelle sarcelline, S. d'hiver (F).

نوع من الحذف متوسط القد طوله نحو ٣٢ سم. رأسه وعنقه الى الصهبة الكستنية. يمتد من عينه الى قفنه خط اخضر اللبج ابيض الجوانب. ظهره مشق ومؤذر. صدره الى البياض الجذوي يعلوه توشم اسود. بطنه الى البياض الاصفر. جوانحه الى السمرة الرمضاء يعلوها توشم اخضر وتمشيق اسود ورقشة بيضاء. منقاره اسود. ارجله رمادية. الانثى اقل تدويقا من الذكر. يدشن عشه في المناقع بين الاعشاب الكثيفة. انثاه تبيض نحو ١٢ بيضة تحضنها وحدها اربعة اسابيع.

٧٦٩٠ - حَذَف صَيْفِي *، شَرَشِير صَيْفِي، كَرَكَج

Anas querquedula, Querquedula ciria (S). Sarcelle commune, S. d'été (F). Garganey (E).

نوع من الحذف كبير الجثة طوله نحو ٣٨ سم. ثوبه متراكب الالوان الزاهية. رأسه الى الصهبة السمر. محاسره ببيض. بياضها ينتهي عند القفن. ظهره وجوانبه الى الصهبة الجذوية المرقشة بالابيض. عنقه وصدره وبطنه موشحة بالاسود. حياك قوادمه ببيض، منقاره اسود. ارجله رمادية. انثاه اقل تدويقا من ذكوره. يدشن عشه على ضفاف الأنهر والبحيرات بين الاعشاب الكثيفة القريبة من الماء.

Prosternum

٧٦٩١ - حَذَف قَارِ

هو في الحشرات الجزء الوسطي الجانبي من مقدم الجوشن.

٧٦٩٢ - حَذَفَة

Limbe (F). Limb (E).

حذف الزرع: ورقه.

٧٦٩٣ - حَذَفُور البرجد

Méasternum (F).

Metasternum (E).

هو في الحشرات الجزء الوسطي من حلقة البرجد السفلى.

٧٦٩٤ - حَذَفُور البرجد

Mésosternum (F).

Mesosternum (E).

هو في الحشرات الجزء الوسطي من حلقة البرجد السفلى.

والسحب. ينصهر في ١٥٣٠° سغ. ويغلي في ٢٤٥٠° سغ. ينجذب نحو المغناطيس ويصدأ في الهواء الرطب. أشهر انواعه الصناعية المستخدمة: الحديد الزهر والحديد اللين والحديد النقي والحديد الصلب (الفولاذ).

Jardin d'agrément (F).

Pleasure-garden (E).

الحديقة، بوجه عام، هي كل ارض صار ترتيبها وغرس نباتاتها بعناية وذوق فجاءت مخطا يهيج النظر ويشرح القلب. والحديقة، بوجه خاص، تستعمل للتعبير عن الغاية التي وضعت من اجلها. لذلك فقد تكون:

Jardin de fleurs (F).

Flowers-garden (E).

كل حديقة. رتبت خصيصا لزراعة الازهار وتربيتها.

٧٦٧٧ - حَذَفِيَّة أَزْهَار

Jardin d'acclimatation (F). Acclimatization-garden (E).

كل حديقة خصصت للاعتناء بحياة الحيوانات والنباتات خارج اقاليمها الطولية.

Jardin d'essais (F).

Experiment-garden (E).

كل حديقة تجري فيها التجارب والاختبارات الزراعية المختلفة الاهداف.

٧٦٧٨ - حَذَفِيَّة تَبْلِيد

Jardin zoologique (F). Zoologic-garden (E).

هي التي تجمع وتربي ضمن اقسامها ومزاربها واقفاصها مختلف انواع الحيوانات.

٧٦٧٩ - حَذَفِيَّة تَجَارِب

Fougerale (F).

Fern-patch, Fernery (E).

هي التي خصصت لزراعة وتربية السراخس.

٧٦٨٠ - حَذَفِيَّة حَيَوَان

Jardin botanique (F).

Botanical-garden (E).

هي التي خصصت بتربية النبات وتاصيله والحفاظ على سلامة اصرامه وضروبه.

٧٦٨١ - حَذَفِيَّة سَرَخَس

٧٦٨٢ - حَذَفِيَّة نَبَات

٧٦٨٣ - حَذَال *، نَمَلَة فِرْعَوْن

Monomorium pharaonis (S).

Fourmi de Pharaon, F. des pharaons (F).

Pharaoh's ant (E). Pharaohmeise (D).

نملة عكاظية صغيرة القد، دقيقة الجسم، تطول نحو ٢ مم. ثوبها الى الشبهة الصنابية. رأسها وبطنها اعقب خضابا من صدرها وجرامزها. المهتجة منها تطول نحو ٥ مم. أشهرها البلاد الحارة وقد انتشرت في معظم اصقاع العالم باستثناء المناطق الباردة. وهي تقيم زبانا في اي صدع كان، ان داخل المنازل أو خارجها وفي تخاريب الاخشاب المصنوعة وغير المصنوعة. قوتها جميع المواد الغذائية.

٧٦٨٤ - حَذَال


عصارة الثمرة اذا كانت حمراء اللون.

٧٦٨٥ - حَذَر


Estimation des récoltes (F).

Estimation of crops (E).


الحذر هو تقدير غلات الزروع.




حَذَال



حذف جميل



حذف شتوي



حذف صيفي

٧٦٩٥ - حَذَل

الحذل والحذالة : صمغ احمر تفرزه بعض الاشجار عقب
وصم يصيبها .

٧٦٩٦ - حَذَلُوم*

Damaliscus (S).

Damalisque (F). Hartebeest (E).

جنس ابقار وحشية قريبة الشبه من الثيتل لكنها اصغر
جثة واقصر رأساً وارفع ساركاً واخفض كفلاً . قرونها
كثيرة الحيد قليلة الاحديداد . اثوابها الى الصهبة يملوها
قتم وتوشيح || انواعه اربعة تلي .

٧٦٩٧ - حَذَلُومُ أُخَرَّ

Damaliscus albifrons (S).

Damalisque à front blanc, Blesbok (F). Blesbok (E).

نوع من الحذلوم صغير القد يعلو نحو ٩٧ سم . ثوبه
الى الصهبة المغراء . جبهته غراء ، قرونها قصيرة || اجله
من ١٠٠ الى ٣٠٠ . يالف الغابات المشبة والمراعي
الخصبه يكثر في بلاد الترنسفال واورنج .

٧٦٩٨ - حَذَلُومُ البُحْبِرَةِ ، حَذَلُومُ تَسَّابِي

Damaliscus sassaby, D. lunatus (S). Damalisque sas-

saby (F). Sassaby hartebeest (E).

اسرع انواع الحذلوم واقتنحها لوناً واكبرها قدماً ، يعلو
نحو ١٢٥ سم . موطنه افريقية الجنوبية . يالف الخضاب
والسهول المشبة ينشر من الغابات الكثيفة . اجله من
٨ الى ١٥ زوجاً .

٧٦٩٩ - حَذَلُومُ السِّنْفَال

Damaliscus senegalensis, D. korrigum (S). Damas-

lique du Sénégal, Korrigum (F). Senegal har-

tebeest (E).

نوع من الحذلوم متوسط القد يعلو نحو ١٠٥ سم . ثوبه
اصهب حنطي وهو قصير الرأس ، مستطيل القرن الاخير
المستقيم ، ابيض السيلة . موطنه السنغال ومغربي . اجله
يرواح من ٥٠ الى ١٥٠ نفر .

٧٧٠٠ - حَذَلُومُ قَانَا

Damaliscus hunteri (S). Damalisque de Hunter,

Herota (F). Hunter hartebeest, Herota (E).

نوع من الحذلوم . موطنه ضفاف نهر قانا . يعلو نحو
١٢٠ سم . ثوبه الى الصهبة الخطية يعلوها قتم عند الساعد
والحارك والكفل . جبهته غراء ، قرناه مستطيلان احيدان .
اجله يراوح من ١٥ الى ٢٥ زوجاً ، يالف الاسراج المبهثرة
الاشجار الكثيرة المشب .

٧٧٠١ - حَذَنَة

Oreille d'insecte (F).

Ear of insect (E).

الحذنة هي اذن الحشرة . وهما حذنتان مركزهما في الحشرات ،
عند وجودهما ، لاقياسي وقد يختلف الشكل والحجم والتركيب
مع الفصائل والاجناس . فالجرادة مثلاً تحملها كطبلتين
على جانبي حلقها البطنية الاولى في حين ان البعوض
يستغنى عن الحذنة بالقرن الاستشعاري اي الزبان
الذي يمكنه من كل ذبذبة .

٧٧٠٢ - حَكْلُو

Ferrure (F). Shoeing (E).

راجع لانعال .

٧٧٠٣ - حَرَّ

Falco lanarius (S).

Faucon lanier, Laneret (F). Lanner (E).

طائر من الصقور . وهو اصغر جثة من الشاهين والشرق ،

انمر الريش ، اصقع الرأس ، اسقع الظهر ، اغبر
البطن ، عظيم المنكين || يكثر في الشرق الادنى .

٧٧٠٤ - حَرَّا

Pondoir de la tourterelle (F).

هو موضع بيض اليامة .

Celastracées (F).

Celastraceae (E).

٧٧٠٥ - حِرَابِيَّات

هي القاتيات فصيلة نباتية من ذوات انفلتين .

٧٧٠٦ - حِرَابِيَّةٌ* ، سِلَاسْتَرُومُس

Celastrus (S). Célastre (F). Celastrus, Waxwork

shrub (E). Echter baumwürger (D). Celastro (I).

جنس شجيرات وجنبات برية وزراعية تزيينية من فصيلة
القاتيات . انواعه نحو ١٣٠ . جميعها من نباتات المناطق
الحارة والمعتدلة . سوقها منتصبه او عارشة . اوراقها
متعاقبة . ازهارها خضر . ثمارها حمر . اخشابها صلبة
كانوا يستعملونها في صناعة الخراب || اعرفها واشهرها يلي .

٧٧٠٧ - حِرَابِيَّةٌ أُورِيكْسَا

Celastrus orixa,

Othra orixa (S). Célastre orixa (F).

شجيرة منتصبه الساق تعلو نحو ٢٥٠ سم . اوراقها
اهليلجية . نصلها املس الصفحة العليا ، ازغب السفلى ،
بشرته مرقوشة بالغدد . ازهارها رباعية التركيب ، خضراء
اللون . خشبها ناعم الرقة شديد الصلابة || ازهارها
يستمر من نيسان الى ايار .

٧٧٠٨ - حِرَابِيَّةٌ خَانِيقَة

Celastrus scandens (S).

Célastre bourreau des arbres (F).

جنية عارشة ملتفة تطول من ١٠ الى ١٥ م . فروعها
عديدة مستطيلة وكثيرة الالتفاف . اوراقها اهليلجية
مدببة طولها نحو ١٠ سم . وعرضها ٥ . ازهارها تاجي
ومحوري . ازهارها الى الخضار الاصفر . بتلاتها مسنة
الحافة . ثمارها حقية ثلاثية الفلق ، برتقالية اللون .

٧٧٠٩ - حِرَابِيَّةٌ مُلْتَفَّة

Celastrus orbiculata (S). Célastre orbiculaire (F).

جنية عارشة ملتفة تعلو نحو ٥ امتار . اوراقها عروية بيضية
مسنة الحافة ، طولها من ٨ الى ١١ سم . وعرضها من
٦ الى ٨ . ازهارها خماسية التركيب ، محورية الارتكاز .
مهددا الصين واليابان . ازهارها يستمر من آب الى
تشرين الثاني .

٧٧١٠ - حَرَايِش

هو الخربط العربي ، اطلبه .

Laboureur (F).

٧٧١١ - حَرَاث

Husbandman, Ploughman (E).

هو الذي يحرق التربة .

٧٧١٢ - حَرَائَة

Courtilière (F). Mole-cricket (E).

هي الخالوش ، اطلبه .

Labourage (F).

٧٧١٣ - حَرَائَة ، حَرَث

Tillage, Ploughing (E).

هي العمل في التربة كريباً كان او غرساً .

Ranchage (F).

٧٧١٤ - حَرَائَة شَقِي

Sylviculture (F).


٧٧١٥ - حِرَاة

Sylviculture, Forestry (E).

علم من علوم الزراعة يبحث في كل ما له صلة بالاحراج
والتحريج والاستثمار والعناية .



حذلوم



حر



حراية

٧٧٣٠ - حُرْبَاءٌ مَدْعَسُكْر
Caméléon bifide (F). Bifid chameleon (E).

٧٧٣١ - حُرْبَاوِيَّاتٌ ، حُرْبَايَاتٌ
Chamaeleonidae (S). Caméléonidés, Chamaéléonidés (F). Chamaeleonidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من رتبة العقلايات اللوديات
اللسنة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد جميعها متوسطة
القد او صغيرة . رؤوسها هرمية الشكل . السننبا مستطيلة
اختاذة . قوتها الحشرات والهوم .

٧٧٣٢ - حَرْبَةٌ
Spadice (F). Spadix (E).
الحربة : الطلعة اذا كانت بقشرها ويقال لقشرها اذا
نزع القيقاة . ج حرب || ويقال احرب النخل اذا
بدت حربه . وحربه اذا اطعمه الحرب .

٧٧٣٣ - حَرْبَةٌ هي دافع الصاعقة ، اطلبه .

٧٧٣٤ - حُرْبُثُ
Astragale annulaire
الحربث نبت مبسوط له ورق طوال رفاق طيب الرائحة
يزيل بخر الفم وينفع من القولنج وسوء الهضم . واذا
اكلته الغنم طاب لحمها ولبنها || راجع اسطراغالوس حلقى .

٧٧٣٥ - حَرْبِصٌ
Irriguer (F). To irrigate (E).
حربص الارض : ارسل فيها الماء .

٧٧٣٦ - حُرْبُطٌ* ، حَشِيْشَةُ الدَّاحِيسِ
Paronichia (S). Paronique, Paronyque (F). Paronichia (E). Paronychie, Nagelkraut (D). Paronichia (I).
جنس نباتات عشبية رية طيبة من فصيلة القرنفليات .
مهدا حوض البحر المتوسط . انواعها تسعة منها الحولية
والمعمرة . جميعها صغيرة القد . اوراقها متقابلة لسنة
حرفية النصل . حراشفها فضية اللون . ازهارها صغيرة ،
خماسية التركيب ، مختلفة الالوان || يقال انها من
انفع علاجات الداحوس . اشهر انواعها التالية .

٧٧٣٧ - حُرْبُطُ البَادِيَةِ ، رُحَيْمَةٌ
P. desertorum (S). Paronique du désert (F). Desert paronichia (E).

٧٧٣٨ - حُرْبُطُ سَيْنَا
P. sinica (S).
Paronique de Sinaï (F). Sinica paronichia (E).

٧٧٣٩ - حُرْبُطُ صَعْتَرِيّ
P. serpyllifolia (S).
Paronique à feuilles de serpolet (F). Thyme leaved nailwort (E).

٧٧٤٠ - حُرْبُطُ عَرَبِيّ ، حَرَابِيْثُ
P. arabica (S). Paronique de l'Arabie (F). Arabica paronichia (E).

٧٧٤١ - حُرْبُطُ فَضِيّ
P. argentea (S).
Paronique argenté (F).

٧٧٤٢ - حُرْبُطُ كُرْدِيّ
P. kurdica (S).
Paronique kurda (F).

٧٧٤٣ - حُرْبُطُ مُتْرَاكِبِ
P. imbricata (S).
Paronique imbriqué (F).

٧٧٤٤ - حَرَبِيْقُ
Mercuriale (F). French mercury (E).
هو الحبوب نبات طبي ، اطلبه .

٧٧١٦ - حَرَارَةٌ
Température (F).
Température (E).
هي درجة حرارة الهواء .

٧٧١٧ - حَرَارَةٌ دُنْيَا
Température minima (F).
هي نهاية الحرارة الدنيا .

٧٧١٨ - حَرَارَةٌ دُنْيَا مُطْلَقَةٌ
Température minima absolue (F).
هي نهاية الحرارة الدنيا المطلقة .

٧٧١٩ - حَرَارَةٌ قُصْوَى
Température maxima (F).
هي نهاية الحرارة القصوى .

٧٧٢٠ - حَرَارَةٌ قُصْوَى مُطْلَقَةٌ
Température maxima absolue (F).
هي نهاية الحرارة القصوى المطلقة .

٧٧٢١ - حَرَارَةٌ وَسْطَى
Température moyenne (F).
هي متوسط النهايتين الدنيا والقصوى .

٧٧٢٢ - حَرَارِيّ ، مَسْعَرِيّ
Calorique, Thermique (F). Caloric, Thermic (E).

٧٧٢٣ - حِرَاقٌ حِرَاقٌ ، حِرَاقٌ
Spadice (F). Spadix (E).
الكش الذي يجب به النخل والمعني به الشمراخ الزهري الذي
يؤخذ من النخلة الفحل فيدس في طلمة النخلة الاثني .

٧٧٢٤ - حَرَّاقَةٌ
Fumeron (F).
Smoky charcoal (E).
الحرقاة كل فحمة لم يكتمل تفحمها فتتمنع الانسجام
المفروض بلهيبها ودخانها .

٧٧٢٥ - حَرَّالُ
اسم تعريفي يطلق على شح صيد البحر . وقولك ايام الحراك
اي ايام قلة صيد البحر (التاج) .

٧٧٢٦ - حَرْبَاءُ
Caméléon, chaméléon (F).
Chameleon (E).

الحرباء كوكبة نجوم جنوبية الموقع . كواكبها متباينة
الالوان بما دعا الى تسميتها بالحرباء || عدد نجومها سبعة
جميعها من المرتبة الخامسة .

٧٧٢٧ - حُرْبَاءُ* ، حُرْبَايَةٌ ، بَرَبْحَتِي
Chamaeleo (S). Caméléon (F). Chameleon (E).
جنس عطاء من فصيلة الحرباويات انواعه نحو ٣٠ تكثر
في المناطق الحارة والمعتدلة من العالم القديم || وهو حيوان
بطيء النهضة عجيب الخلقة ، راسه مصلع الزوايا ، ظهره
مستطيل السنام . عيناها تدوران من كل جهة . يتلون
بلون الشجرة التي يكون عليها . يصطاد الذباب والهوم
بلسانه الدقيق المستطيل . وهو من العطاء التي تستقبل
الشمس وتدرر معها || كنيته ابو جفادب ، ابو الزنديق
ابو الشقيق ، ابو قادم وجل اليهود . انشاء تدعى
حرباءة || اشهر انواعه واعها التابعة .

٧٧٢٨ - حُرْبَاءُ السِّنِّيْغَالِ
Caméléon du Sénégal (F). Sénégal chameleon (E).

٧٧٢٩ - حُرْبَاءُ مُبْتَدَلَةٌ
Caméléon vulgaire (F). Common chameleon (E).



حرباء



حربط

عشكولي التجميع ، ابطي الارتكاز. ازهارها صغيرة
القد مستطيلة البتلات زباء النصل || اوراقها طيبة
رستعمل في غش السنى الحجازي .

٧٧٥٦ - حَرْبِيشَة Nuée de sauterelles (F).

الحرجلة القطعة من الجراد سر بها يغشي السماء .

٧٧٥٧ - حَرْبِيشَان ضرب من الجراد .

٧٧٥٨ - حَرْبِيشِي ، غَابِيِي Sylvicole (F).
Sylvan, woodland (E).

نعت تعريفي يستعمل للدلالة على الاشياء والاعمال الخاصة
بالاحراج والتحريج .

٧٧٥٩ - حَرْبِيشِيل * Pucrasle (F).

طائر من التندرجيات اعطانه جبال آسية الوسطى . طوله
نحو ٨٠ سم. ثوبه يرتكز على الصهبة المابتة تعلوها نمشة
مراء ورقشة وتسنيج يتراكب فيها الابيض والاسود والاحمر .
رأسه وزوره وقفته الى السواد اللامع . يتميز الذكر بثلاث
زوائد ريشية قرنية الشكل تعلو الرأس عند صدغيه وقفته ||
قوته البزور والمحبوب والاعشاب والنواصي النباتية وبمض
الحشرات والديدان || يألف الحراج والغابات القريبة من
مجارى الماء . مجتمه الاغصان الافقية الارتكاز || يدثن
في التربة . افعمومه صاجي الشكل . انشاء تحضن نحو ١٦
بيضة قرخيمها يستمر نحو اربعة اسابيع .

٧٧٦٠ - حَرْبِيش Graines de cirée (F).
Seed of circaea (E).

الحردب : حب المشرق .

٧٧٦١ - حَرْبِيشَة

الحردة : مبر الخيل والابل والنم .

٧٧٦٢ - حَرْبِيشِي ، هَرْبِيشِي Toiture en roseaux (F).
الحراشي ما يلقى على غشب السقف من اطنان القصب
للوقاية من حر الشمس . اطلب هردى .

٧٧٦٣ - حَرْبِيشُون * ، حَرْبِيشُون ، حَرْبِيشُون ،
أم حَبِين ، حَبِينَة ، قاضي الجبَل
Agama (S). Agame (F). Agama, judge of the
desert (E).

جنس عطاء من فصيلة الحردونيات . انواعه عديدة تتميز
بقباجة اشكالها . موطنها البلاد الحارة والاستوائية .
قوتها الحشرات والحوام .

٧٧٦٤ - حَرْبِيشُونِيَّات ، بَنَات حَبِين

Agamidae (S). Agamidés (F). Agamidae (E).
فصيلة حيوانات زحانة من رتبة النظائيات اللحيات
الالسة . اجناسها ٣٠ وانواعها ٣٠٠ . اعرفها واكثرها
انتشاراً الحردون والضب والمضبوط .

٧٧٦٥ - حَرْبِيشَان ، حَرْبِيشَان ضرب من الجراد .

٧٧٦٦ - حَرْبِيشَان Angle (F). Angle (E).

الحرم الزاوية .

٧٧٦٧ - حَرْبِيشَانِيِي Angulaire (F). Angular (E).

ذو زاوية . ويقال محرم .

٧٧٤٥ - حَرْبِيش Céraste (F).

Ceraste, Horned viper (E).

هي القرعاء حية كالافعى ذات قرنين .

٧٧٤٦ - حَرْبِيش ، حَرْبِيشَة ، كَرْبِيش ، كَرْبِيش

Labour, Labourage (F). Ploughing, Tillage (E).

هو شق التربة وقلبها لتفكيك ذراتها المتاسكة . وقد يتم
اما آلياً بواسطة التراكاتور او حيوانياً بواسطة الفدان .
وهو يأتي على اشكال مختلفة توجبها حالة التربة وما عليها
من نبات او ما سيقوم عليها من زراعات . لذلك فالحرثة
قد تكون سطحية او عميقة او متصالبة الخ .

٧٧٤٧ - حَرْبِيشَان * ، أَوْزْ مُسْتَح

Plectropterus (S). Plectroptère, Oie à
épérons (F). Plectropterus (E).

جنس طير من كفيات القدم وفصيلة الوزيات . انواعه
المعروفة ستة جميعها كبيرة القد . اجسامها تطول من ٨٠
الى ١٠٥ سم . اجنحتها كبيرة تنبسط نحو ٢٠٠ سم . وهي
مجهزة التسوع بمناخس حادة . اعناقها مستطيلة . منائدها
كبيرة وقوية تجلل قواعدها الخاص زفدية المادة . اذنانها
قصيرة قوائمها رفيعة . االبها مبلقة يكثر فيها الاسود
الاخضر الموج والابيض || جميعها من الضوارب . تألف
الاهوار ومجارى الانهار . قوتها الاعشاب .

اشهر انواعها الاربعة التالية :

٧٧٤٨ - حَرْبِيشَانِيِي

P. de Gambie, Oie de Guinée (F).

٧٧٤٩ - حَرْبِيشَانِيِي

P. de Siam, Oie de Siam (F).

٧٧٥٠ - حَرْبِيشَانِيِي

P. de Chine, Oie de Chine (F).

٧٧٥١ - حَرْبِيشَانِيِي

P. de Madagascar, Oie de Madagascar

٧٧٥٢ - حَرْبِيشَان ، حَرْبِيشَة Forêt, Bols (F).

Forest, Wood (E).

هي كل ارض نمت وكثرت فيها الاشجار البرية اكانت
من صنع الطبيعة او الانسان || وفي التخصيص يقال :
حرجة من شجر ونوطة من طلع وعيص من سدر وأيكة
من اثل وفرش من عرفت ووهط من عسر وغال من سلم
وسليل من سمر وقصيحة من رمث وسحرمة من غضا .

٧٧٥٣ - حَرْبِيش Boiser (F). To afforest (E).

اقام حرجة في موقع خال من الاشجار او كانت فيه
حرجة طبيعية زالت معالمها منذ امد بعيد .

٧٧٥٤ - حَرْبِيشَان Vent (violent et froid) (F).

Wind (violent and cold) (E).

هي الريح الباردة الشديدة المهبوب .

٧٧٥٥ - حَرْبِيشَانِيِي Solenostemma argel (S).

Solénostemme argel, Argel, Argélie, Arguel (F).
Arghel, Argel (E). Arghelsenna (D). Solenos-
temma (I).

جنبة معمرة من فصيلة الصقلابيات وحيدة الجنس والنوع .
موطنها التوبة ومصر العليا وجزيرة العرب . تعلو من ٥٠
الى ١٠٠ سم . اوراقها منقطة بيضية متقابلة . ازهارها



حَرْبِيشَان



حَرْبِيش



حَرْبِيش



حَرْبِيش

والمنجوليات والقوبيات والكرنبيات والبشوريات
والحرمديات والهوليات والفسيقيات واللقينيات .

٧٧٨٠ - حَرْشُون

الحرشون : ضرب من السمك . ج حراشين (اللسان) .

٧٧٨١ - حَرْشُونَة °

Phycis (S). Phycis, Merlus (F). Phycis, Merlus (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الغادسيات . انواعه المعروفة سبعة جميعها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها سنانية الشكل ، متوسطة القد . زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة . زعانفها الخوضية وداجية الارتكاز ، خيطية الشكل ، مستطيلة . عذباتها فكية الارتكاز متفاوتة الحجم والعدد الذي يراوح من ١ الى ٦ وذلك بالنسبة الى النوع || اثوابها تختلف مع الانواع وتراوح من الرتبة الفاتحة الى الطحلة الرصاصية يعلوها موج امفر || اشهر انواعها حرشونة المتوسط .

٧٧٨٢ - حَرْشُونَة الْمُتَوَسِّط °

Phycis mediterraneus (S).

Phycis de la Méditerranée, Merlus barbu, Mustelle, (F). Lesser hake (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الغادسيات . اعطانها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة واخصها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك الاغواط || جسمها شبه سناني الشكل يطول من ٤٥ الى ٦٠ سم . ثوبها الى الرتبة تعلوه ماجة تختلف مع فصول السنة . اذكاها خضاب الربيع . رأسها امفر اللون . ثيج ظهرها شديد السمرة . القسم العلوي من جانبها كستني الموج . بطنها عادم السمرة . زعانفها الصدرية الى الحمرة القرمزية . زعنفتها الذيلية مطوقة بحزام اسود . رأسها مستطيل الشكل ، قصير الخطم . شدتها معتدل الانفراج . فكها العلوي يتقدم السفلي . اسنانها صغيرة ، متراسة . عذباتها صغيرة ، فكية الارتكاز . عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ناشرتان . زعانفها الظهرية اثنتان . الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٧٨٣ - حَرْض * ، قَلْبِي ، شَوْك أَهْر ، أَشْنَان

Salsola kali (S). Soude, Kali (F).

Saltwort, Kali (E). Sodapflanze, Kalisalzkrout (D). Soda, Erba cali, Cali (I).

نبات عشبي بري من فصيلة السرمقيات يكثر وجوده قرب الشواطىء البحرية والمناطق المالحة . اوراقه متعاقبة ، ازهاره فردية محورية . كانوا يزرعونه ويستخرجون منه الصودا بعد الحريق والتميد .

٧٧٨٤ - حَرْضُون

Agama stellio نوع من الحراذين يدعى حردون الصخر لانه يعيش بين الصخور ويكثر من الاقامة عليها مستلقياً اشعة الشمس .

٧٧٨٥ - حَرْضِي ، قَلْوِي

Alcalin (F). Alkaline (E). نعت تعريفي يطلق على المواد التي تتحلل بخواص القلي .

٧٧٨٦ - حَرْطَاب °

Hygrothermographe (F). Hygrothermograph (E). جهاز يسجل تلقائياً وباستمرار درجة الحرارة الموقعية والرطوبة النسبية في خط بياني واحد .

٧٧٨٧ - حَرْف

هو الرشاد ، اطلبه .

٧٧٦٨ - حَرْشَاء

Moutarde des champs (F). هي الحردل البري ، اطلبه .

٧٧٦٩ - حَرْشَافِي °

Squamiforme (F). ما كان شكله كالحرشف .

٧٧٧٠ - حَرْشَة ، حَشُونَة

Rugosité (F). Rugosity (E).

٧٧٧١ - حَرْشَف

Ecaille (F). Scale (E). هو كل ورقة بسيطة الوثل والشكل ، صغيرة القد ، متراكبة الارتكاز كما في الجمفيل . ج حراشف . ويقال ورقة حرشفية .

٧٧٧٢ - حَرْشَف

Ecaille de poisson (F). Scale of a fish (E). الحرشف : قلوب السمك .

٧٧٧٣ - حَرْشَف ، هَيْشَر ، قَرْدُون

Cynara (S). Cardon (F). Cardoon (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . انواعه عديدة جميعها كبيرة الاوراق المفروضة القليلة الشوك . ازهارها مركبة قرصية حرشفية مدبية العقصة الشائكة ، بنفسجية او زرقاء اللون ، تحتها لحمي مأكول . قيل انه ينفع من داء الثعلب طلاء وماؤه يقتل القمل اذ غسل به الرأس ويذهب الحدار .

٧٧٧٤ - حَرْشَف بُرِّي

Chardon Marie (F). Milk thistle (E). هو الكميبي ، اطلبه .

٧٧٧٥ - حَرْشَف سُورِي * ، هَيْشَر سُورِي

Cynara syriaca (S). Cardon de Syrie (F). Syrian cardoon (E).

نوع من الحرشف المحول يعلو من ٣٠ الى ٩٠ سم . ساقه غليظة مضلعة . اوراقه شائكة الحافة ، نصلها املس الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، زغبه اطحل اللون . رؤيساته كبيرة القد لونها الى الحمرة . حراشفها مستطيلة مدبية شائكة .

٧٧٧٦ - حَرْشَف مَبْدُول * ، هَيْشَر مَبْدُول

Cynara cardunculus (S). Cardon commun, Artichaut carde (F). Cardoon, Prickly artichoke (E). Kardon, Spanische artischoke (D). Cardone, Cardo spinosa (I).

نوع من الحرشف وهو نبات عشبي معمّر عديد الضروب معظمها بري وبعضها زراعي كالارضي شوكي . ساقه تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه مفروضة عسامة الشوك او قليته . حراشف رؤيساته مدبية شائكة .

٧٧٧٧ - حَرْشَقَة

Ecailage (F). Scaling (E). انزع الحراشف .


٧٧٧٨ - حَرْشُفِي ، سَهْفِي ، قَلْسِي

Ecailleux, Squameux (F). Scaly, Squamous (E). نعت تعريفي وصفي يطلق على كل عضو تكسوه الحراشف .


٧٧٧٩ - حَرْشُفِيَّاتُ الْأَجْنَحَة

Lepidoptera (S). Lépidoptères (F). Lepidoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة سدنيات الجناح فصائلها واجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠٠٠٠ || اشهر فصائلها الفراشيات والارفيات والقزليات والقنميات والناريات والقائلات



حَرْشَف سُورِي




حَرْشَف مَبْدُول




حَرْشُونَة الْمُتَوَسِّط




حَرْض



حرف الحقل



حرف السطوح



حرف الماء



حرف بري



حرف



حرفس

الزهري يعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهاره بيض، عرفها غسقي مستحب الرائحة || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني.

٧٧٩٥ - حَرْق غَيْثِيَّة ، دَنْق السُّودَان

Sansevieria guineensis (S). Sansevière de Guinée (F). نوع من الحرق. اوراقه عصفية الشكل منبسطة، طولها من ٣٠ الى ٨٠ سم. نصلها باهت الخضار معصب، عصائبه عابقة لامعة || شراخه الزهري يعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. ازهاره ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني.

٧٧٩٦ - حَرْقِيْد الحَرْقِد : اصل اللسان . ج حراقِد .

Pomme d'Adam (F). Adam's apple (E).

الحرقدة هي عقدة الخنجر وتدعى جوزة العنق وخزرة الرقبة.

٧٧٩٨ - حَرْقُس * CEdipoda (S). CEdipode (F).

جنس جنادب من القبوطيات. انواعه عديدة معظمها صغير القد وبعضها متوسط. ذكورها اصغر حجماً من اناثها طولها يراوح من ١٤ الى ٢٢ مم. اما الاناث فتطول من ٢٠ الى ٣٠ مم. اثوابها الى الصلبة الخطية يعلوها تمثيق عابق وتوشيح اسمر. رواشها السفلى جليلة الالوان الزاهية اللامعة || وهو يألف البور والزرورع على السواء. قوته الاعشاب على اختلافها. يكثر وجوده من حزيران الى ايلول.

٧٧٩٩ - حَرْقُفَة Hanche (F). Hip (F).

هي رأس الورك. ج حراقف.

٧٨٠٠ - حَرْقُفِي Coxal (F). Coxal, Iliac (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحرقف.

٧٨٠١ - حَرْقُوس

الحرقوس والحرقص «دويبة كالبرغوث صغير ارقط بحمرة او صفرة ولونه الغالب عليه السواد. وقال الزمخشري انها دويبة اكبر من البرغوث وعصها اشد من عضه وقال ابن سيده الحرقوس دويبة لها حمة كحمة الزنبور تلدغ بها» (الملاحظ).

٧٨٠٢ - حَرْقُوفَة Coxopodite (F).

Coxopodit (E). الفصلة الاولى من الزائدة المتصلة بالتجويف الصدري او البطن عند القشريات.

٧٨٠٣ - حَرْكَة Mouvement (F). Movement (E).

علم يبحث في نظم انتقال الاجسام وهو يشمل درس القوى المسببة والعلاقات الزمنية والمكانية.

٧٨٠٤ - حَرْكَة مَقْلَاعِيَّة Circumduction

هي حركة الدورة المحورية او الحركة الاستدارية حول المركز.

٧٨٠٥ - حَرْفَة Rut

هي شهوة البضاع عند اناث الدواجن اللبونة. والاثني بهذه الحالة تدعى حرمى. ج حرام وحرامى.

٧٧٨٨ - حُرْف الحَقْل * ، صِنَاب المَاء

Cardamina pratensis (S). Cardamine des prés, Cresson des prés (F). Cuckoo flower, Meadow bittercress (E). Kukucksblume, Weisenschaumkraut (D). Cardamina, Billeri, Crescione dei prati (I).

نبات عشبي بري معم من الصناب وفصيلة الصليبيات. ينبت قرب الماء وفي الاماكن الرطبة. اوراقه متعاقبة مركبة. ازهاره هامية بيض. اوراقه وبزوره حريفة نافطة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية.

٧٧٨٩ - حُرْف السُّطُوح * ، حَرْدَل فَاَرْسِي ، صِنَاب بَرِّي

Lepidium campestre, Thlaspi campestre (S). Cresson des champs, Bourse de Judas (F). Field cress, Wild bastard cress (E). Feldkresse, Wildknow-lauch (D). Lepidlo salvatico, Erba storna, Mostarda salvatica (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات. يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور. اوراقه مركبة حريفة الطعم ازهاره هامية بيضاء اللون، بزوره نافطة.

٧٧٩٠ - حُرْف المَاء * ، رَشَاد بَرِّي

Senebiera coronopus, Cochlearia coronopus (S). Senebière, Cresson de rivière, Corne de cerf (F). Buck's horn, Swine's cress, Wart-cress (E). Echter krähennuss, Schweinekress (D). Ambrosia salvatica, Lappoline, Corno di cervo (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات يكثر في الاماكن الرطبة وعلى ضفاف الانهر.

٧٧٩١ - حُرْف بَرِّي * Chamaelina silvestris (S).

Roquette sauvage (F). Wild rocket (E). Wilder roquette (D). Ruc salvatica (I).

نوع من الجرجير البري وهو نبات عشبي حولي ضيق الاوراق المتعاقبة المستطيلة المفروضة الحادة الطعم الحريف. ازهاره بيض.

٧٧٩٢ - حَرْق * ، دَنْق Sansevieria (S).

Sansevière (F). African hemp, Bowstring hemp (E). Afrikanischer hanf (D). Sanseverina (I).

جنس نباتات نجمية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعه ١٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة. سوقها جذمورية مدادة. اوراقها سميكة، صلبة، مستطيلة، متراكبة كالوراق الباهرة. ازهارها عنقودي، هامي، متراص الزهر يرتكز على شراخ قرصي الاصل. ازهارها جليلة مختلفة الالوان || اشهر انواعه التريينية ما يلي.

٧٧٩٣ - حَرْق أُسْطُوَائِي ، دَنْق أُسْطُوَائِي

Sansevieria cylindrica (S). Sansevière cylindrique (F). نوع من الحرق. اوراقه اسطوانية الشكل طولها نحو المتر مدببة العقصة، نصلها الى الخضار البحري يعلوه توشيح مائج || شراخه الزهري يعلو نحو ٣٠ سم. ازهاره وردية اللون. الياف اوراقه متينة تستعمل في صناعة الخصر والحبال || ازهاره يستمر من حزيران الى تشرين الثاني.

٧٧٩٤ - حَرْق سَرْكْدِيْب ، دَنْق سَرْكْدِيْب

Sansevieria zeylanica (S). Sansevière de Ceylan (F). نوع من الحرق. اوراقه عصفية الشكل مرتفعة الجوانب طولها من ٣٠ الى ٩٠ سم. نصلها الى الخضار البحري يعلوه تمصيب عريض جميل الخضار الزاهي || شراخه

٧٨١٤ - حُرْمَلَة - *Sarcostemma viminale* (S).
Sarcostemma (F). *Sarcostemma* (E). *Fleische kranz* (D). *Sarcostemma* (I).
 جنبة طبية برية معمرة صغيرة القد فرعاء دقيقة الافنان من فصيلة الصقلابيات . منبها البلاد الحارة . يستخرج من ساقها عصارة لبنية لزجة كانت تستعمل لتسهيل المعدة ولتطهير الامعاء .

٧٨١٥ - حُرْمُوس ، بُوطُس - *Bothus* (S).
Bothe (F). *Brill* (E).
 جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الحرموسيات . اعطانها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || انواعها المعروفة ثلاثة . اجسامها بيضية الشكل ، مبطلة الجرم ، مألسة القشار . صفحاتها اليمنى غبراء اللون ، سمراء النقط المتساوية التوزيع صفحاتها اليسرى سمراء اللون ، متباينة الرقشة || عيونها متقاربة ناشزة . زعانفها الظهرية والشرجية تمتد حتى قاعدة الذيل || لحونها جيدة الصنف مرغوب فيها .
 اشهر انواعها ، حرموسة المتوسط .

٧٨١٦ - حُرْمُوسَة الْمُتَوَسِّط * ، بُوطُس الْمُتَوَسِّط
Bothus rhombus, *Scophthalmus rhombus* (S).
Bothe de la Méditerranée, *Barbue* (F). *Peart*, *Lug-aleaf* (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الحرموسيات ورتبة الملساوات . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال || مسرحها اساطم النفاق . قوتها الاسماك الصغيرة والديدان || جسمها شبه بيضي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٨٠ سم . ويعرض نحو ٥٥ سم . تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن مما يجعل عينيها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تتحل به اسماك فصيلة جانبيات العموم . ثوبها في الصفحة اليسرى الى الغبرة تملوها رقشة يتراكب فيها الاسمر والاصفر والاحمر تمتد الى الرأس والزعانف . صفحتها اليمنى بيضاء اللون ، سمراء النقط المتجانسة المتساوية التوزيع || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٧٨١٧ - حُرْمُوسِيَّات ٥ - *Bothidae* (S).
Bothidés (F). *Bothidae* (E).
 فصيلة اسماك بحرية من الملساوات . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعطانها بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مسرحها الاساطم البحرية || اسماكها تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن مما يجعل عيونها في الصفحة اليسرى من الرأس اي عكس ما تتحل به اسماك فصيلة جانبيات العموم .
 اشهر اجناسها الحرموس وسمك الترس .

٧٨١٨ - حَرَّة * - *Diploaxis harra* (S). *Diploaxis* (F).
Stink-weed (E). *Rampe*, *Stinkrampe* (D). *Diploaxis* (I).
 عشبة برية حولية طبية من فصيلة الصليبيات . اعطانها مختلف مناطق حوض البحر المتوسط . اوراقها حريفة ، ازهارها صفراء اللون .

٧٨١٩ - حَرُور - *Vent chaud de la nuit*
 الريح الحارة بالليل .

٧٨٠٦ - حُرْمَةُ الْمَنْزِل (F). *Inviolabilité du domicile* (F). *Inviolability of domicile* (E).
 حق مكتسب لكل فرد يمكنه من وصد باب منزله في وجه اي شخص كان الا بامر خاص من النيابة العامة .

٧٨٠٧ - حُرْمِدَة أَكَّارَة ٥ - *Arctia villica* (S).
Arctia fermière, *Ecaïlle fermière* (F).
 حشرة من فصيلة الحرمديات فراشها متوسطة القد سمراء الرأس والصدر ، حنطية البطن . مبقجة الرواشن تظهر من حزيران الى تموز . يرقها مستندقة الشكل ، سمراء اللون . كثيفة الملب الحنطي . تركب النباتات العشبية من اي نوع كانت . قوتها الاوراق الفتية . خادرتها تبيت ضمن صلجة جوزية اللون ، خاوية الجباك .

٧٨٠٨ - حُرْمِدَة سَمُورِيَّة ٥ - *Arctia caja* (S).
Arctia caja, *Ecaïlle martre* (F). *Arctia caja* (E). *Brauner Bär* (D).
 حشرة من فصيلة الحرمديات فراشها متوسطة القد ، حنطية الرأس والصدر ، برتقالية الجسم ، مجزعة الرواشن الامامية مبقجة الخلفية . يرقها كثيفة الملب ، ثوبها الى السمرة الزيتونية . قوتها الاوراق الفتية . اخصها خلب الكرم . جيلها الحولي واحد . خادرتها تبيت ضمن صلجة خاوية الجباك ، غبراء اللون .

٧٨٠٩ - حُرْمِدِيَّات ٥ - *Arctiidae* (S).
Arctiids (F). *Tiger moths* (E). *Bärenspinner* (D).
 فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة زهاء ٥٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . فراشاتها قصيرة القد ملونة الرواشن . يرقها هلبية الجسم . خادراتها صلجية البيات . جميعها وحيدة الجيل الحولي .

٧٨١٠ - حَرْمَسَة - *Ecobuage* (F). *Burning* (E).
 هي حرق اعشاب الحقل لتسهيل زراعته .

٧٨١١ - حَرْمَل * ، غَلَقَة الذئب - *Peganum harmala* (S). *Pégane*, *Harmale* (F). *Harmal Wild rue*, *Syrian rue* (E). *Gemine syrischer aute*, *Wild raute* (D). *Ruta della Siria*, *Ruta salvatica* (I).
 جنس نباتات عشبية طبية برية مدادة من فصيلة السذابيات . انواعه المعروفة قليلة جميعها من نباتات المناطق الحارة الرملية القاحلة || اوراقه معنقة متعاقبة نصلها مفروض الصفحة المزجة ، مستطيل الزناد . ازهاره فردية التجميع يكثر فيها اللون الابيض . وهو نبات كرية الرائحة بزوره طبية مرة الطعم طامجة وطاردة للدود تحوي عنصرين شبه قلويين : الحرملين والحرمين *Harmaline et Harminc* .

٧٨١٢ - حَرْمَل أَيْض * ، ثُوم ذَهَبِي - *Allium moly* (S). *Ail doré*, *Moly* (F). *Moly*, *Yellow garlic* (E). *Goldlauch*, *Gelbes moly* (D). *Molio*, *Aglio dorato* (I).
 نوع من الثوم البري والزييني . اوراقه دقيقة مستطيلة . نورته مظلية القالب ترتكز على شمراخ اجوف مستدق . ازهاره ذهبية اللون جميلة الشكل يراوح عددها من ٣٠ الى ٤٠ زهرة .

٧٨١٣ - حَرْمَل الْجَبَل - *Rue de montagne* (F).
Mountain rue (E).
 هو سذاب البر ، اطلبه .




حرمدة اكارة



حرمدة سمورية



حرمل



حرمل ابيض



حرموسة المتوسط




حرة



حريت



حريش البحر



حريشة (زهرة وورقة)



حزاز الصخر

البلايات . مهدا بعض المناطق الاستوائية الافريقية والاسيوية || ساقها مشوكة فرعاء تطول من ٥ الى ٦ أمتار . اشواكها كبيرة محجنة كاشواك الورد . أوراقها معنقة ، كبيرة ، قلبية الشكل . نصالها مالسة ، لماعة ، شديدة الخضار الاليس . ازهارها كبيرة ، انبوية التويج الذي يطول نحو ١٥ سم . قطرها من ١٢ الى ١٥ سم . تنفجر في الليل وتنطبق في النهار . لونها الى البياض العاجي || عرفها فواح مستحب || تنويرها يستمر طوال شهري تموز وآب .

٧٨٣٤ - حَرِيْفُ الْأُمُونِيَاك ، حَرِيْفُ النَّشَادِر ،
Crud Ammoniac

مسحوق اسود اللون مصدرة رواسب صناعة غاز الانارة . وهو سماد ازوتي يحوي من ٢ الى ١٢ ٪ من الازوت الامونيائي . غير انه كثير السموم التي تقضي على النبات لذلك يحسن نثره على التربة قبل زراعتها بأية او عشرة اسابيع || استعمله ينظف التربة من جميع الاعشاب .

٧٨٣٥ - حَرِيْقِي ، Ortie (F). Scinging nettle (E).
هو القراص ، اطلبه .

٧٨٣٦ - حُرْمَلَة
« شجرة مثل الرمان الصغيرة تنشق عن الين قطن فتحشى به الخاد فتكون ناعمة جداً وخفيفة (اللسان) .

٧٨٣٧ - حَزْز Entaille (F). Notch (E).
الحز هو الجرح المصطنع في لحاء الشجر وقد يكون تحت الفصن او فوقه وقبل البرعمة او بعدها وذلك للحد من نشاط العضو اذا استبقه ولزيادة نموه اذا لحقه .

٧٨٣٨ - حَزَا Aneth (F). Dill (E).
هو الشبث ، اطلبه .

٧٨٣٩ - حَزَاة
نبت بالبادية يشبه الكرفس الا انه اعرض ورقاً منه . (اللسان) .

٧٨٤٠ - حَزَار Serin des Canaries (F). Canary (E).
اطلب كنار .

٧٨٤١ - حَزَاز ، كَشَاة الْعَجُوز Muscus (S).
Lichen (F).
جنس نباتات دنيا من الاشنيات تعيش في الاماكن الرطبة الظليلة على الصخور والحجارة وقشور الشجر ...

٧٨٤٢ - حَزَاز الصَّخْر * ، شَيْبَة الْعَجُوز Usnea barbata (S). Lichen fleuri, Usnée barbu (F).
Flowering moss, Necklace moss, Tree hair (E). Gemeine bartflechte, Baumbart (D). Lichen fiorito (I).
نوع من الحزاز ينمو على الصخور والاشجار .

٧٨٤٣ - حَزَاة Dartre (F). Scurf (E).
هي القوبه مرض جلدي يسقط الشعر .

٧٨٤٤ - حَزَازِيّ Lichéneux (F). Lichenous (E).
نعت وصفي يطلق على ما هو شبيه بالحزاز .

٧٨٤٥ - حَزَازِيَّات Ulvaceae (S).
Ulvacées (F). Ulvaceae (E).
فصيلة نباتية من مرتبة الخفيات الخضراء ورتبة الالغ

٧٨٢٠ - حَرِيْت * ، حَرِيْد

Searus harid (S). Scare harid, Girelle (F). Searus harid, Parrot-fish (E).

سمكة بحرية من بنات مصفار طولها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ سم . اعطانها بحار البلاد المعتدلة . يكثر وجودها في البحر المتوسط . ثوبها متراكب الالوان الزاهية . يقال ان لحمها سام في بعض فصول السنة وذلك عندما ترعى نواصي المرجان .

٧٨٢١ - حُرِيَّة التَّبادُل Libre échange (F).
Free trade (E).

اسلوب او نظام اقتصادي مؤداه ازالة المكوس الجمركية واطلاق حرية التجارة .

٧٨٢٢ - حَرِير ، إِسْرِيْسَم Soie (F). Silk (E).
هو الخيط الذي ينسجه دود القز .

٧٨٢٣ - حَرِير خَتَام Soie grège (F). Raw of silk (E).
هو الحرير المحلول من الصلجة .

٧٨٢٤ - حَرِير صِنَاعِي Soie artificielle (F).
Artificial silk (E).
هو الحرير المستخرج من الالياف والخشب .

٧٨٢٥ - حَرِير طَبِيعِي Soie naturelle (F).
Natural silk (E).
هو الحرير الناجم عن فيالج دود القز ويسمى حرير القز .

٧٨٢٦ - حَرِير نَبَاتِي Soie végétale (F).
Vegetable silk (E).
هو الحرير المصنوع من ثيل بعض النباتات .

٧٨٢٧ - حَرِيرَة Calorie
الحريرة او السعرة هي الوحدة الحرارية .

٧٨٢٨ - حَرِيرِيَّة Sérícigène (F). Sericigenous (E).
هي كل فراشة يفرز اسروعها حريراً كدود القز .

٧٨٢٩ - حَرِيْسَة ، زَرِيْبَة الطَّيْر Parquet d'élevage (F). Stock-still (E).
مكان موشع عليه تربي فيه الطيور الداجنة كالدجاج والبط .. ج حرائس . راجع مدجنة .

٧٨٣٠ - حَرِيْش Scolopendre (F). Scolopendra (E).
دويبة مبدولة مشهورة بام اربع واربعين .

٧٨٣١ - حَرِيْش من اسماء الكركدن .

٧٨٣٢ - حَرِيْش الْبَحْر * ، كَرَكْدَنْ الْبَحْر ، قُوقِي Monodon monoceros (S).

Narval, Licorne de mer (F). Narwhal (E).
حيوان بحري لبون وحيد الجنس والنوع من رتبة الحيتان كبير الجثة طوله نحو اربعة امتار . ظهره عديم الزعانف . رأسه مستدير افطس . نبيه العلوي الايسر مستطيل الشكل كالقرن المستقيم ، طوله نحو ٢٠٠ سم . وقطر انتشابه ٢٠ || موطنه البحار القطبية الشمالية .

٧٨٣٣ - حُرِيْشَة * Calonyction aculeatum (S).
Calonyction épineux (F).
جنبه عارشة معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة

٧٨٥٥ - حُرْتَبَلِيَّات Achnaceae (S).
Achnacées (F). Achnaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين العديدة الفعالات أنواعها
المعروفة ١٤٠ مهددا البلاد الحارة . جميعها اشجار
وشجيرات مرطاة . أوراقها بسيطة جلدية متعاقبة . ازهارها
مختلف الارتكاز والتجميع . ازهارها خماسية التركيب
زاهية الالوان .

٧٨٥٦ - حُرُونَة Asperités du sol (F).
Asperity, Roughness (E).
الحزونة غلاظة الارض وشدة خشونتها .

٧٨٥٧ - حُرَيْرَان Juin (F). June (E).
يعرف أيضاً بيونيو . الشهر السادس من السنة الشمسية .
وهو من شهور الربيع . مدته ثلاثون يوماً . في اواخر
العقد الثاني منه يحصل الامتلاء الاكبر فيبلغ النهار
اقصى طوله والليل غاية قصره . وفي العقد الثالث تبتدى
السمائم بالهبوب وهي اسد وخسوف يوماً .

تقويمه الزراعي : اعماله الزراعيه عديدة ، اخصها :
١ - في الزراعات العامة الموسمية : العناية بمزق القطن
وريه ومكافحة حشرات . عزق التبغ وكه وتخليبه .
متابعة اسقاء التبغ الفرجيني والتنيك . متابعة سصاد
الخططة وتكديسها ودراسة قشها للتبن .

٢ - في الاشجار المثمرة : المداومة على مكافحة دودة
الشمر وجميع الحشرات الاخرى التي تتركب الاشجار .
يستحسن مد الاشجار الكثيرة الحمل ببعض الاسمدة
الكماوية السريعة التمثيل . المباشرة بوضع المساند حيث
تدعو الحاجة خوفاً من انمراق الاغصان والافئاد الكثيرة
الحمل . متابعة الاسقاء بدون تحفظ لانسه من الزم
ضروريات ثمار التفاح في هذا الوقت . المباشرة بالتطعيم
الرقعي في اللوزيات .

٣ - في الحمضيات : بدء مكافحة جرب الليمون . العناية
الكلية بالري . تفقد حالة الاشجار لمعرفة حاجتها .
الاوراق الملتفة تتطلب المزيد من البوتاس . والافئان
اليابسة تتطلب السورفسفات . اما الاعبال فيستوجب
المزيد من عنصري البوتاس والسورفسفات . وربما
كانت التربة بحاجة الى بعض الكلس .

٤ - في الموز : المباشرة بتوزيع الاسمدة الكماوية
الكاملة التركيب الغنية بعنصر البوتاس . عزق التربة
وتعشيبها وريها .

٥ - في الكرمة : متابعة استمال الفواطير الفعالة للقضاء
على الارمداد والميلديو حيث تدعو الحاجة .

٦ - في البقول والزهور : متابعة الاعتناء بجميع البقول
والزرايع الخضريه مع مكافحة آفاتهما . تسميد الزهور
وعزقها وريها ومكافحة اوصامها وحشراتهما .

٧٨٥٨ - حَسَّ ، حَصَّ Champelure (F).
Frost-bite (E).
هو استراق الافئان الفتية في الاشجار المثمرة والكرمة
بتأثير الجلد . يقال حس او حص الجليد النبات . احرقه .

٧٨٥٩ - حِسَاب Compte (F). Reckoning (E).
هو البيان التفصيلي بالارقام .

اجناسها وانواعها عديدة تعيش في المياه العذبة والبحرية
وعلى الصخور الرطبة وجذوع الاشجار . مشرتها سوية
الساكة في جميع اجزائها . تكاثرها بوي . بوعها رباعي
الاهداب الاهزازية .

٧٨٤٦ - حِزَام مُشْتَعِل Pyrosphère (F).
Pyrosphere (E).
الحزام المشتعل او الغلاف الارضي المائع ، طبقة من الكرة
الارضية تفصل بين النواة المركزية الثقيلة المعروفة بنواة
الفلز والغلاف السطحي اليابس . راجع سيمه وسيال .

٧٨٤٧ - حَزَّة Quarre
جرح يصطنع في لحاء جذوع الاشجار الصنوبرية لاستحلاب
المادة الراتنجية .

٧٨٤٨ - حَزَم ، وَزَم Engerber (F). To sheaf (E).
جمع الشيء وشده برياط .

٧٨٤٩ - حَزَم خَشَبِيَّة Faisceaux ligneux, F. du bois (F).
Woody bundles (E).
مجموعة انابيب دقيقة مستطيلة مخصصة لنقل النسغ الباهل
الى الاوراق عبر الجذع والاغصان والافئان .

٧٨٥٠ - حَزَم لَحَائِيَّة Faisceaux du liber (F).
Phloem bundles (E).
مجموعة انابيب دقيقة مستطيلة مخصصة لنقل النسغ الكامل .

٧٨٥١ - حَزَم وَعَالِيَّة Faisceaux vasculaires (F).
Vascular bundles (E).
مجموعة انابيب دقيقة مخصصة لنقل النسغ بين اللحاء
والشكير .

٧٨٥٢ - حَزْمِي ، حَزْمِي Fasciculé (F).
Fasciculate (E).
هو ما كان شكله كالحزمة .

٧٨٥٣ - حُرْتَبَل ، عُبُون التَمَر Ochna (S). Ochna, Ochne (F). Ochna (E). Ockna (D).
Ochna (I).
جنس نباتات برية وزينية من فصيلة الحزئليات .
انواعه عديدة جميعها اشجار وشجيرات مرطاة اللحاء . اوراقها
متعاقبة ، كاملة ، اذنية ، لمساء النصل المنشاري الحافة .
ازهارها عتقودي التجميع ابطي وتاجي الارتكاز . ازهارها
زرق او بيض . ثمارها عنبة غير مأكولة .

٧٨٥٤ - حُرْتَبَل المَاء ، حُرْتَبَل النُغِي Myriophyllum spicatum (S). Myriophylle à épi, Vo-
lant d'eau (F). Spiked myriophyllum, Water milfoil
(E). Ahriges tausendblau (D). Millefillo, Millefoglio
spigato (I).
جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة شبه الريشيات .
اوراقها ريشية متعاقبة ، ازهارها سنبل التجميع .
ازهارها صغيرة القد بحيلة الشكل . ثمارها رباعية الفلق
الصلبة القشور || انواعه المعروفة ١٥ منتشرة في جميع
الاصقاع العالمية جميعها من النباتات المائية التي تكثر
في المناطق وتعيش في الاحواض والاكواريوم وتستعمل
في الطب كضادة للالتهابات والاورام .



حزئيل



حزئيل الماء



حسارة



حساس



حساسة



حساسكة



حسب



حُسْرَم

٧٨٦٩ - حَسَاكَة *

Polyacanthus (S).

Polyacanthé (F).

جنس اسماك مثقبة من فصيلة الحساكيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها تمتد من الهند الى ماليزيا تعيش في المناطق والبحيرات || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. رؤوسها كبيرة، مدببة الاخطام صغيرة الاشداق. عيونها ماسحة. تتميز بزعانفها الظهرية والذيلية المجهزة بمناخس ذرية. زعانفها الشرجية تمتد من الخوض الى الذيل. الخوضية صغيرة، تنشب في طرف كل منها حسكة لينة مستطيلة. اثوابها الى الشقحة الفضية الموج تميلوها جدد سمراء خضراء متفاوتة الطول والعرض || لحومها متوسطة الصنف، كثيرة الحسك.

٧٨٧٠ - حَسَاكِيَّات *

Polyacanthidae (S).

Polyacanthidés (F). Polyacanthidae (E).

فصيلة اسماك من شائكات الزعانف البلعونيات التبية. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطانها تمتد من الهند الى جزر الزايج. تألف المناطق والبحيرات والانهر الراكدة المياه || اجسامها متباينة الاشكال والحجوم. تتميز بزعانفها المجهزة بمناخس مستطيلة. اناثها تهريق السر في مواضع معينة بين الاعشاب المائية حيث تقوم الذكور على حراستها الى ان يتم النقف، اي نحو ١٢ يوماً || اشهر اجناسها الحساكة والغورامي.

٧٨٧١ - حَسَب *

Panicum verticillatum, Setaria verticillata (S). Panic rude, Setaire verticillée (F). Burr-grass, Panic grass (E). Wirtelhirse (D). Panico aspro, Panizzo, Fieno stellino (I).

نبات عشبي بري كلابي من فصيلة النجيليات يعلو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اشطاؤه من ٢ الى ٥. سوقه نخيلة، عصفه مستقيم النصل الضيق السناني الشكل. ازهاره سنيلي التجميع، سبلته مستدقة مستطيلة.

٧٨٧٢ - حَسَدَلِيَّات *

Oligoneoptères (F).

Oligoneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة المحنجات اصلاً. تشمل خمس طبقات واحدى عشرة رتبة ونحو ٤٠٠ فصيلة وما لا يقل عن ٥٥٠٠٠٠ جنس ونوع || اما طبقاتها الخمس فهي غديات الجناح وعصبيات الجناح وسدنيات الجناح وعديمات الجناح وغشائيات الجناح || ورتبتها تعرف بنمذية الاجنحة وسادات الاجنحة وشبكيات الاجنحة وشارفات الاجنحة وسادات الاجنحة وجلونيات الاجنحة وحرشغية الاجنحة وغشائية الاجنحة وغشائية الاجنحة المحصورة وذات الجناحين والقذانيات.

٧٨٧٣ - حُسْرَم *

Muar (F). To moult (E).

حسرت الطير: سقط ريشها. ونحسر الطير: اسقط ريشه. وانحسرت الطير: خرجت من الريش العتيق الى الحديث.

٧٨٧٤ - حُسْرَم * ، حُرُور، أَبُوعَيْن، أَبُور

Priacanthus (S). Priacanthé (F).

Catalufa, Bigeye (E).

جنس اسماك من فصيلة الفريخيات. انواعه عديدة جميعها متوسطة القد، مفلطحة الجسم، بارزة العين، كبيرة الزعنفة الظهرية، مستديرة الفم، سوية الثوب، زاهية اللون || اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية.

٧٨٦٠ - حِسَاب

Calcul (F). Calculation (E).

هو الطريقة المثبتة لمعرفة العدد الناتج عن العمل المطلوب. وهو اساس جميع العلوم الرياضية. دراسته ترتكز على القواعد الاربع الاصلية المعروفة بالجمع والطرح والضرب والقسمة.

٧٨٦١ - حِسَاب الاحتمالات

Calcul des probabilités (F). Probability calculus (E).

٧٨٦٢ - حِسَاب التفاضل، حِسَاب التفاضل

Calcul différentiel, Calcul infinitésimal (F). Differential calculus (E).

٧٨٦٣ - حِسَاب المثلثات

Trigonométrie (F).

Trigonometry (E).

٧٨٦٤ - حَسَارَة * ، قُرْدُمَا

Cardamina amara (S). Cresson amer, Cardamine amère (F). Bitter-cress, Large bitter-cress (E). Bitteres schaumkraut, Bittere kresse (D). Crescione amare, Cardamina amara (I).

نبات عشبي بري من الصناب وفصيلة الصليبيات. يستعمل في بعض المستحضرات الطبية ومن الناس من استنطقه وطبا. ج. حَسَار || بزوره طيبة وهي دقيقة مستطيلة صفراء اللون مرة الطعم حريفة تنقي الصدر وتقيد الربو والسعال.

٧٨٦٥ - حُسَّاس * ، هَيْف، هَاكِبَا، قَشَقُوش

Atherina (S). Athérine (F). Silverside, Sand smelt (E).

جنس اسماك صغيرة القد من فصيلة البوريات رتبة العظميات الشائكات الزعانف. انواعها عديدة جميعها دقيقة رقيقة، فضية اللون، مستحبة الطعم. تألف البحار والانهار تعيش قرب الشطوط || واحدتها حساسة وهفة وهازبابة وقشقوشة.

٧٨٦٦ - حُسَّاس المَتَوَسِّط

Athérine de la Méditerranée (F).

سمكة بحرية صغيرة الجرم تدعى القشقوش، احلها.

٧٨٦٧ - حَسَّاسَة * ، مُسْتَحَبَّة ، مُخْتَشِمَة ،

مُخْتَشِمَة ، خَجُولَة

Mimosa pudica (S). Sensitiva pudique, Mimose pudique (F). Sensitiva plant, Humble plant (E). Schamhafte sinnpflanze, Sinnpflanze (D). Erba mimosa, Sensitiva (I).

عشبة معمرة برية وزينية من فصيلة القرنيات. ساقها نخيلة، فروعها دقيقة لونها الى البهوية. تعلق من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها رؤسية وردية أو حمراء اللون || تزرع لغرابتها وفوط حساسيتها. وريقاتها ينطبق بعضها على بعض من اللمس.

٧٨٦٨ - حُسَّاسِيَّات *

Atherinidae (S).

Atherinidés (F). Atherinidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. معظمها من الاسماك اليمية التي لا تقترب من الشطوط الا في بعض فصول السنة || اجسامها صغيرة وشمية الشكل تطول من ١٠ الى ٢٠ سم. تتميز باثوابها الفضية الموج ويعد انتظام زعانفها الظهرية الاولى التي يراوح عدد شعاعها من ٦ الى ٩ || اشهر اجناسها الحساس، القشقوش.

٧٨٨٢ - حُسْل
Nerprun vert (F).
Common buckthorn (E). هو النبق المسهل ، اطلبه .

٧٨٨٣ - حُسْلَكَة
Drupe (F).
Drupe, Stone-fruit (E).
كل ثمرة لحمية ذات نواة كالمشمشة يكون فيها السوذي لحمي التركيب ويكون الغلاف الداخلي الذي يمتلئ بالبزة قاسياً صلباً كما في عجمة المشمش والخوخ والزيتون . والحسلة تدعى أيضاً نووية ، اطلبها .

٧٨٨٤ - حُسْم
Mamelles des carnassiers (F).
Udders of carnivora (E).
الحسْم هي اطاء السباع (ابن الاعرابي، التاج) .

٧٨٨٥ - حُسُون * ، حُسُونِي ، نَقَّار الشوك
Fringilla carduelis (S). Chardonneret (F). Gold-finch siskin (E). Erlenzsig (D).
عصفور غريد من فصيلة الشرشوريات . صغير القد ، طوله نحو ١٥ سم . جميل الالوان الزاهية المتراكبة فيه الاحمر والاصفر والابيض والاسود والازرق والرمادي والاخضر || قوته يزور النباتات البرية اخصها الشوك . يدين عشه في الاشجار الكثيفة الافنان والورق . انقائه تحضن ٥ بيضات من ١٣ الى ١٤ يوماً || يمكن تنبيله مع التففيجي والكعتر والنغر .

٧٨٨٦ - حُسِيَّة
Testicule des oiseaux (F).
Testicle of birds (E).
الغدة التناسلية في ذكور الطير وهما حسيطان تفرزان الكراض .

٧٨٨٧ - حُسِيَّة
Sensualisme (F).
Sensualism (E).
الحسية مذهب فلسفي يقول بان الحس اصل المعرفة .

٧٨٨٨ - حُسَيْف
Bruckenthalia (S).
Bruckenthalie (F).
جنبه معمرة شائكة من فصيلة الخلدنجيات معقودة التعريف العلمي على اسم العلامة « بروكنثال » . مهدا يمتد من الشرق الادنى الى البلقان . ساقها قصيرة فرعاء تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة دقيقة تطول نحو ٥ سم . فصاها مدببة شائكة وبين الورقة والتي تليها يوجد اربع اشواك متتابعة ، غليظة ، ذربة الحمة . ازهارها سنبلية التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها رباعية التركيب ، وردية اللون ، صغيرة القد ، متدية || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٨٨٩ - حُسَيْكَة
Hérisson (F).
Urchin, Hedgehog (E).
هو القنفذ ، اطلبه .

٧٨٩٠ - حُسَيْكَة
Arlata (F).
الحسكة زائدة قرنية التركيب ، صغيرة ، دقيقة ، ذربة ، منفسية الشكل ، تكتنف بعض اعضاء الحشرات .

٧٨٩١ - حُسَيْكَة *
Bidens (S). Bident, Sornet (F).
Black-fellows (E). Nadelkraut (D). Bidente (I).
جنس نباتات جنية برية وتزيينية من فصيلة المركبات . اوراقها متعاقبة مسننة . يزورها حسكية طيبة تستعمل في بعض المستحضرات كحلبة ومعطسة || اشهر انواعه يتبع .

٧٨٧٥ - حُسْرُم شائع * ، حُسْرُور مَبْدُول
Priacanthus hamrur (S). Priacanthus hamrur (F).
Priacanthus hamrur (E).

نوع من الحسرم . سمكة بحرية بيوض . اعطانها تشمل معظم مناطق البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي . تعتبر من اسماك النقاف المتوسطة القور . ملجئها الحياتي شرمي حتى الادراك ثم جماعي || جسمها اهليجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ثوبها الى الحمرة السوية يعلوها موج نحاسي اسفع . زعانفها الى الخطي الاسفع باستثناء الصدريتين فانها الى الحمرة القائمة . رأسها يرمي الشكل ، قصير الخطم الذلق . شدقها قليل الانفراج . فكها متعادلان . اسنانها صغيرة ، ذربة تمتد حتى مؤخر الحنك . عيناها مستديرتان . بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٧٨٧٦ - حُسَف
حسف الزرع : حصده . وحسف التمر : نقاه من الحسافة . والحسافة هي ما تنأثر من التمر الفاسد وبقيته قشوره واقاعه . والحسف هو الشوك وقد خصص بشوك الورق .

٧٨٧٧ - حُسْفَلَة *
Acanthurus (S).
Acanthure (F). Acanthurus (E).
سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف . موطنها يشمل معظم بحار المناطق الحارة || جسمها شبه بيضي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٧ الى ٢٠ سم . رأسها معتدل الحجم ، خطمها محجبي الشكل شدقها شديد الصفر . زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة ، تقابلها الشرجية وتمائلها طولاً . زعنفتها الذيلية معتدلة الحجم ، قليلة التقعر تتميز بمنحسها العلوي والسفلي || ثوبها الى الربة الفضية يعقب في الظهر ويزهو في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .


٧٨٧٨ - حُسَق
Priva (S). Priva (F).
Velvet Bur (E). Sonderähre (D). Priva (I).
جنس نباتات جذمورية عشبية معمرة برية وتزيينية من سبط الليبيات وفصيلة رعي الحمام . جذاميرها مدادة ، سوقها مربعة التضليع تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، بيضية ، نصلها اغبر الصفحة العليا اطحل السفلى . ازهارها سنبلية التجميع ، حمراء اللون . منبها البلاد الحارة . اشهر انواعه :

حسق الشيلي Priva laevis (S). Priva lisse (F).
حسق مسنن Priva dentata (S). Priva dentée (F).


٧٨٧٩ - حُسَك * ، حُسْرُس العَجُوز
Tribulus terrestris (S). Tribule terrestre, Croix de Malte (F). Caltrop, Land caltrop (E). Echter bürzel (D). Tribolo, Caccarello (I).
نبات حشبي بري شائك من فصيلة الفرقديات . اوراقه مركبة متعاقبة . ازهاره فردية ابطية عطرية مستحبة العرف . ثماره قابضة مدرة للبول ومطهرة للمجاري البولية .

٧٨٨٠ - حُسَن
Hysope officinale (F).
Common hyssop (E).
هو الزوفا ، اطلبها .


٧٨٨١ - حُسَل
هو واد الضب حين يخرج من البيضة . ج أحسال وحسول .



حسرم شائع



حُسْفَلَة



حسك



حسون



حسكة

٧٩٠١ - حَشَر Son (F). Bran (E).

هو النخالة المتأثية عن اي دقيق كان .

٧٩٠٢ - حَشَرَة Insecte (F). Insect (E).

الحشرات صف حيوانات صغيرة القد من المفصليات القصصيات التنفس . طوائفها وشعبها وطبقاتها ورتبها وفصائلها واجناسها وانواعها تعد بعض مئات الالوف . منها المجتعة ومنها فاقذات الجناح فالمجتعة تحمل زوجاً او زوجين من الاجنحة . ولها ثلاثة ازواج من القوائم . دورتها الحياتية تجتاز عدة مراحل تدعى التسلخات . معظمها يعيش على المواد النباتية وبعضها مفترس او لاحم . وقد وضعنا في الجدول التصنيفي التابع ، وعلى سبيل المعلومات العامة ، جميع طوائف الحشرات المنقرضة والمعاصرة مع شعبها وطبقاتها ورتبها .

٧٩٠٣ - حَشَرَة التَّيْنِ الشَّنَجَانِيَّة Cochenille du figuier (F).

هي قمية التين ، اطلبها .
٧٩٠٤ - حَشَرَة قَشْرِيَّة Céropaste (F). Ceroplastes (E).

هي القرمزية ، اطلبها .
٧٩٠٥ - حَشَرَة قَشْرِيَّة سَوْدَاء Cochenille noire de l'oranger (F).

هي قرمزية البرتقال السوداء ، اطلبها .
٧٩٠٦ - حَشَرَج Cocotier (F). Coco-tree (E).

الحشرج والحشرج هو النارجيل . الواحدة حشرجة .
٧٩٠٧ - حَشَرِيَّات Insectivores (F). Insectivora (E).

رتبة من الثدييات . اجناسها وانواعها متوسطة العدد تجمعها عشر فصائل تنضم الى ثلاث مراتب ، مرتبة جلديات القوائم ومرتبة الممرغيات ومرتبة عديمات المعرفة || اشهر فصائلها القنفذيات والذبابيات والعلوبينيات والمذاليات واليابيات والكوبنديات || جميعها حاشرة لاحمة . والمائي منها يقتنص الاسماك الصغيرة والغشريات والدعاميص .

٧٩٠٨ - حَشَرِيَّات الصَّدَف Entomostracées (F). Entomostraceae (E).

طائفة حيوانات من القشريات الدنيا .
٧٩٠٩ - حَشَرِيَّة التَّابِير Entomophile (F). Entomophilous (E).

هي البنته التي لا يتم تأبير زهرها الا بواسطة الحشرات التي تنقل الطلع وتوصله الى المياسم .

٧٩١٠ - حَشَف Tarir (F). To drain, To dry up (E).

حشف واحشف وتحشف الصرع : ارفع منه اللبن .

٧٩١١ - حَشَف Exosporium

جنس فطور مجهرية من عمارة اللطحانيات وفصيلة الككتنيات . وليسته سطحية الارتكاز شاربة . جربه الكنديية جذمورية قصيرة . كنانده مؤثرة ، عديدة الخلايا ، مخززية الشكل ، مستدقة الطرف || انواعه قليلة اعرفها حشف النخل .

٧٨٩٢ - حُسْبَكَة دَرْيَة Bidens dahlioides (S).

Bident-dahlia (F).
جنبية معمرة دغلة . جذورها درنية ، ساقها زياء تعلو من ١٢٠ الى ١٧٠ سم . لسيناتها وردية اللون او بيض . ازهارها فردية التجميع مستطيلة الزناد الشراخي . ازهارها يستمر طوال الحريف .

٧٨٩٣ - حُسْبَكَة كَبِيرَة الزَهَر Bidens grandiflora (S). Bident à grandes fleurs (F).

جنبية معمرة . ساقها اسطوانية مرطاء تعلو من ١٠٠ الى ١٣٠ سم . اوراقها فردية الانقسام . اقسامها كراوح من ٧ الى ١١ . تصلها مسنن الحافة . ازهارها كبيرة . يزورها ثنائية او رباعية الحسك || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

٧٨٩٤ - حُسْبَكَة كَلْبِيَّة الْوَرَق Bidens ferulaefolia (S). Bident à feuilles de férule (F).

جنبية معمرة . ساقها اسطوانية مرطاء تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها ثنائية الانقسام . لسيناتها صفراء . يزورها ثنائية الحسك || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٨٩٥ - حَسِيلَة Veau (F). Veal (E).

واحدة الحسيل . الحسيل هي اولاد البقر وقيل اولاد البقر الاهل .

٧٨٩٦ - حَش Faucher (F). To mow, To cut down (E).

راجع احش .
٧٨٩٧ - حَشَاد Poudingue

طبقة من الهوم لاقياسية السمك والانتساع مركبة من مختلف انواع الحصى المتلاصقة المتاسكة الصغيرة الاجرام التي تبدو كأنها رصفت بلياط .

٧٨٩٨ - حَشَاة Neritopsis (S).

Neritopside (F). Neritopsis (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحشائيات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق المحيط الهندي || اصداقها صغيرة شبه حقبة الشكل ، دقيقة الاعقاب البلوطية ، بيضاء اللون ، مسنجة او موشمة بالاغبر || اجسامها صغيرة ، افواها هلالية الشكل ، ثنائية اللوامس المميونة . اسقاطها كلسية المادة توحد قووة التجويف .

٧٨٩٩ - حَشَالِيَّات Neritopsidae (S).

Neritopsidés (F). Neritopsidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة المعاصرة قليلة العدد . اعطائها تمتد من المحيط الهندي الى بحار اقيانية وجزر الزابج || اصداقها صغيرة متباينة الاشكال يثلب فيها الشكل الحقي . جميعها بيضاء اللون مسنجة او موشمة او محززة || اعرف اجناسها الحشافة .

٧٩٠٠ - حَشَالِشِي Herbaliste (F).

Herbalist, Dealer in medicinal herbs (E).
الحشائشي هو العارف بالحشائش ومن تعاطى جمعها وتصنيفها وبيع الطبية منها .



حَشَاة

طائفة	Sous-Classe	شعبة	Section	طبقة	Super-Ordre	رتبة	Ordre
فانلات الأجنحة	Aptérygotes	كهدليات	Collemboles			كهدليات	1 Collemboles
		خيفانليات	Protoures			خيفانليات	2 Protoures
		هدليات الأذنان	Thysanoures			لاطئات المتك	3 Entotrophes
						ظاهرات المتك	4 Ectotrophes
مجنحات أصلاً	Ptérygotes	سرنجيات	Paléoptères	عفاكيات	Paléodictyoptères	كولديليات	5 Eupaléodictyoptères
						زوهميات	6 Protohémiptères
						سرماطليات	7 Mégasecoptères
						بافوريات	8 Protéphémères
						جررجيات	9 Plectoptères
						جحليات	10 Méganisoptères
						رعاشات	11 Odonates
		برقانيات	Polynéoptères	وردانيات	Blattoptéroïdes	سرنانيات	12 Dictyoptères
						صونعيات	13 Protoblattoptères
						عففانليات	14 Isoptères
						سلجوجيات	15 Zoraptères
						رنجوسيات	16 Protarthoptères
						لوليات	17 Plécoptères
						إشيكانيات	18 Notoptères
						قصبيات	19 Phasmoptères
						مستقيمة الأجنحة	20 Orthoptères
						جلفيات	21 Embioptères
						سرعانيات	22 Protélytroptères
						جلدية الأجنحة	23 Dermaptères
						غمدية الأجنحة	24 Coleoptères
						سادلات الأجنحة	25 Mégaloptères
						شبكة الأجنحة	26 Rhaphidioptères
						شارقات الأجنحة	27 Planipennes
						سادنات الأجنحة	28 Mécoptères
						جملونيات الأجنحة	29 Trichoptères
						حرفيات الأجنحة	30 Lépidoptères
						ذوات الجناحين	31 Diptères
						فدانيات	32 Aphaniptères
						غشائيات الأجنحة	33 Hyménoptères
						ملتويات الأجنحة	34 Strepsiptères

طائفة	Sous-Classe	شعبة	Section	طبقة	Super-Ordre	رتبة	Ordre
	عُكَّيات	Paranéoptères	قُمَلِيَّات	Psocoptéroïdes	قَهَلِيَّات		35 Psocoptères
					قَلْدِيَّات		36 Mallophages
					قَمَقَامِيَّات		37 Anoploures
			مَدْرِيَّات الجَنَاح	Thysanoptéroïdes	مَدْرِيَّة الأَجْنَحَة		38 Thysanoptères
			يَضَفِيَّات الجَنَاح	Hémiptéroïdes	مُتَجَانِسَات الأَجْنَحَة		39 Homoptères
					مُخْتَلِفَات الأَجْنَحَة		40 Hétéroptères

٧٩١٢ - حَشَف النخل *

Exosporium palmivorum

فطر مجهري يركب سعوف بعض انواع النخل التزييني فيشوبها ويؤذيها || مظهره الخارجي فقط سود تعلو فصل السعفة على صفحتها . تبدو صغيرة مبعثرة ثم تتسع وتنتشر فيبلغ قطرها من ١٠ الى ١٥ مم . وينحرف لونها الى الخنطلي تتوسطه نقطة محورية سوداء وتمتلكه حالة عريضة ، حثارها الداخلى اغبر اللون والخارجي أغمق . يكافح باستعمال سائل بورديو أو بعض السوائل النحاسية .

٧٩١٣ - حَشَفَة

Récif (F). Reef (E).

الصخرة الكبيرة الراكزة في البحر - أو في النهر - ج حشاف .

٧٩١٤ - حَشَفَة

Chaume (F). Stubble (E).

اصلة الزرع تبقى بعد الحصاد . ج حشاف .

٧٩١٥ - حَشَفَة ، كَمَارَة ، مُلْتَوِيَة

Lantana, Camara (S). Lantane, Lantanier, Camara (F). Lantana (E). Wandelblüte (D). Lantana (I).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة رعي الحمام . انواعه نحو ٤٠ معظمها جنبات وشميرات صغيرة القد . اوراقها متقابلة كاملة بسيطة فستقية اللون خشنة الملمس . ازهارها محوري او هامى الارتكاز ، عشكولي التجميع . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان فيها الالبيض والاصفر والليلكي والاحمر والبرتقالي والبنفسجي والازرق || اكثر انواعه برية وزيينية وبعضها طيبى يستعمل ضد الحيات والامراض الرئوية || اشهر انواعه الزينية ما يلي .

٧٩١٦ - حَشَفَة الدَمِيك ، كَمَارَة الدَمِيك

Lantana nivea (S). Lantane à fleurs blanches, Camara neigeux (F).

جنبه معمرة تعلو من مترين الى اربعة امتار . ساقها وفروعها رباعية التضليع شائكة . اوراقها جميلة الخضار الزاهي ، بيضيه الشكل ، ذلقة الزام الاخير . ازهارها رئيسية كروية ، لونها بياض الثلج || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٧٩١٧ - حَشَفَة ثَلَالِيَّة الْوَرَق ، كَمَارَة ثَلَالِيَّة الْوَرَق

Lantana trifolia (S).

Lantane trifolié, Camara trifolié (F).

جنبه معمرة تعلو نحو المتر . فروعها سداسية التضليع ، محاليق ازهارها رباعية . اوراقها بيضيه لسنة مدية غبراء الصفحة السفلى . ازهارها سلبية التجميع ليلكية اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٧٩١٨ - حَشَفَة سِلَو ، كَمَارَة سِلَو

Lantana sellowiana (S). Lantane de Sellow, Camara de Sellow (F).

جنبه حولية تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها اسطوانية . فروعها نحيلة متدلية . اوراقها بيضيه . ازهارها بنفسجية رئيسية نصف كروية || ازهارها صبي .

٧٩١٩ - حَشَفَة عَطْرَة ، كَمَارَة شَائِعَة

Lantana camara (S). Lantane odorant, Camara commun (F).

جنبه معمرة تعلو من متر الى مترين . اوراقها مستطيلة ازهارها سنابل هرمية الشكل تبدو ذهبية اللون ثم برتقالية وتنتهي بالارجواني || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٧٩٢٠ - حَشَفَة قِنَابِيَّة ، كَمَارَة قِنَابِيَّة

Lantana involucrata (S). Lantane involucré, Camara involuqué, Lantane à collerette (F).

جنبه معمرة تعلو نحو المتر . ساقها وفروعها مضلعة . اوراقها شبه بيضيه طولها نحو ٣ سم . ازهارها عطرية ، صفراء اللون ، رئيسية التجميع الكروي الشكل يحيط بها قناب ليلكي || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

٧٩٢١ - حَشَك

حشك البقرة والنعجة والناقة : ترك حلها حتى يجتمع لبنها .

٧٩٢٢ - حَشَلْبَة

Culture de fausses perles (F).

الحشلبة تربية اللؤلؤ الصناعية .

٧٩٢٣ - حَشِيب *

Pertusaire (F).

جنس حزاز يعيش على الصخور وعلى لحاء سوق الاشجار واغصانها فيجلبها بغشاء رمادي اللون تعلوه بشور عديمة الشكل قائمة .

٧٩٢٤ - حَشِيش


Herbes (F). Herbs (E).

جاء في المختص ان الحشيش هو المشب الاخضر واليابس . ومنهم من قال ان الحشيش هو المشب اليابس . ولما كان في المرف الحالي هو المشب الاخضر او الكلاء الاخضر لذلك فانا نعتد الكلمة الشائعة بمعناها الحالي كالدلالة على المشب الاخضر .


٧٩٢٥ - حَشِيش الْفُرس

Sorgho d'Alap (F).

هو الدرة الحلبية ، اطلها . Aleppo millet grass (E).



حشَف النخل



حشيب

٧٩٣٨ - حشيشة البساط
Mollugne (F).
Mollugo (E). هي المنيرة ، اطلبها .

٧٩٣٩ - حشيشة البلور
Ficoïde cristalline (F).
Diamond ficoïdes (E). هي الظهيرة البلورية ، اطلبها .

٧٩٤٠ - حشيشة التتئين*
Draconitium (S).
Draconte (F). Dragon's-wort (E). Drackenwurz (D).
Dragonzia (I).

جنس نباتات جذمورية عشوية معمرة من فصيلة
الفلقاسيات . انواعه ثلاثة . اوراقها معتقة ، غدية
المعاليق المستطيلة ، كبيرة النصل المفصص ، المخرم ،
الزاهي الخضار || ضبته مفلقة بكافور ذرب القمة
المديبة ، لونه الى الزرق البنفسجية . انواعه ثلاثة تزرع
للزينة وتكاثر بالبلور والمساقل .

٧٩٤١ - حشيشة الثوم* ، ألياريا

Alliaria officinalis, Sisymbrium allaria (S). Alliaire,
A. officinale, Herbe à l'ail, H. aux jullenne (F).
Garlic-wort, Sauce-alone (E). Gemeines knoblauch-
kraut (D). Alliaria, Erba alliaria (I).

نبات عشبي طبي بري من فصيلة الصليبيات . اوراقه
تحمل رائحة الثوم . يكثر في الاماكن الصخرية الظليلة .
اوراقه متعاقبة معتقة رحيمة النصل مفروسة الخافة . ازهاره
عنقودي التجميع تاجي الارتكاز . ازهاره بيض . بزوره
صغيرة طعمها لاذع كالحردل كانت تستعمل كضادة
للربو . عصارة النبات حامزة وتفيد القروح الخبيثة .
اوراقه مضادة للحفر ومنقية للدم ومدرية للبول .

٧٩٤٢ - حشيشة الجاموس

Buchloë dactyloides (S). Herbe aux blons (F). Buffa-
lo grass (E). Buffalo gras (D). Erba di blonte (I).
عشبة حولية برية مرعوية من فصيلة النجيليات تكثر
في المناطق وعلى ضفاف الانهر .

٧٩٤٣ - حشيشة الجرح

Anthyllide vulnérable (F). Kidney-vetch (E).
هي اللوتيا النافعة ، اطلبها .

٧٩٤٤ - حشيشة الجميل
Calochorte (F).
Hair-bell (E). هي الكارفة ، اطلبها .

٧٩٤٥ - حشيشة الحجل
Fritillaire (F).
Fritillary (E). هي العرار من النباتات الزنبقية ، اطلبها .

٧٩٤٦ - حشيشة الحصف* ، ملاح دودي

Reaumuria vermiculata (S).
Réaumurie vermiculée, Réaumure vermiculé (F).
نوع من الملاح . بحلة معمرة مخشوشة برية طيبة . منبتها
بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || ساقها
دقيقة فرعاء تملو نحو ١٦٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
متقاربة ، غطية النصال الصغيرة القند البحرية اللون .
ازهارها خاسية التركيب ، بيضاء اللون || اوراقها وازهارها
وثمارها طيبة تقضي على الحصف .

٧٩٤٧ - حشيشة الحفر* ، أريسيموم طبي ،
خبيثة

Erysimum barbarea, E. cheiranthoides (S). Vélar
officinal, Herbe aux chantres, Barbarée, Tor-

٧٩٢٦ - حشيش سكران
Coqueret du Pérou (F).
Cape gooseberry (E). هو حبة البيرو ، اطلبها .

٧٩٢٧ - حشيشة الابرة
Erodion cleutin (F).
Pick-needle (E). هي ابرة العجوز ، اطلبها .

٧٩٢٨ - حشيشة الأسنان
Dentelaire (F).
Toothwort (E). هي الرصاصية ، اطلبها .

٧٩٢٩ - حشيشة آلاغ ، حشيشة النجم ،
نجم لامع

Aletris (S). Alétris (F).
Calic-root, Star grass, Ague grass (E). Fieberwurz,
Mehlblume (D). Aletris (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الزنبقيات . جذورها
جذمورية . اوراقها قرصية مستطيلة ثلاثية العروق . ازهارها
عنقودي يرتكز على شراخ منتصب موري . ازهارها
انبوبية الشكل || مسحوق جذاميرها مر المذاق ينفع
الاستسقاء ويدخل في تركيب عدة عقاقير مفيدة || اشهر
انواعه ما يتبع .

٧٩٣٠ - حشيشة آلاغ الرمداء

Aletris farinosa (S). Alétris farineuse, A. vrale (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٥ الى ٦٠ سم . ازهارها كبيرة
القد ، خلية النصل ، لونها الى الابيض الرمادي . ازهارها
يستمر من ايار الى تموز .

٧٩٣١ - حشيشة آلاغ المذهب

Aletris aurea (S). Alétris dorée (F).
عشبة معمرة تعلو من ٤٠ الى ٧٥ سم . ازهارها صغيرة
القد خلية النصل لونها الى الذهبي اللامع || ازهارها
يستمر من حزيران الى آب .

٧٩٣٢ - حشيشة الأفاعي
Aparine (F).
Cleavers (E). هي الفاليون الابيض ، اطلبها .

٧٩٣٣ - حشيشة الأفعى
Vipérine commune (F).
Viper's bugloss (E). هي الاخيون المعروف ، اطلبها .

٧٩٣٤ - حشيشة الأوجاع
Verveine officinale (F).
Holy-herb (E). اطلب رعي الحمام المخزفي .

٧٩٣٥ - حشيشة البراغيت
Herbe aux puces (F).
Flea-wort (E). اطلب بزق قطلونا .

٧٩٣٦ - حشيشة البروص
Cérinthe petite (F).
Small honey-wort (E). هي لسان العصفور الصغير ، اطلبها .

٧٩٣٧ - حشيشة البركة*

Asprella (S). Asprèle, Asprelle (F). Marsh grass (E).
Reisquecke (D). Asprella (I).

جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة النجيليات . انواعه
قليلة قريبة الشبه من الشعير . منها البرية والزراعية .
تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها كثيفة التجميع ،
عصفية الشكل ، مقوسة . ازهارها سنابل متصببة . سبيلاتها
ثنائية الحسك ، ازهارها خفيفة مبهمة .



حشيشة البركة



حشيشة التتئين



حشيشة الثوم



حشيشة الحصف



حشيشة الحفر




حشيشة الحليب



حشيشة الخفاف



حشيشة الدهن



حشيشة اللود



حشيشة الدُّبَاب



حشيشة الرمد

يكثر في الاماكن الرطبة . اوراقه مركبة متعاقبة . ازهاره هامة صفراء اللون || اوراقه مرة لا تخلو من المنافع الصحية . نقيعه مر المذاق طارد للديدان .

٧٩٥٧ - حَشِيشَةُ الدُّبَابِ *
Houblon (F).
Common hop (E).
هي الجنجل ، اطلبه .

٧٩٥٨ - حَشِيشَةُ الدُّبَابِ * ، سِيلَانِ نَجْمِي ،
عَلَوَكْ عَدِيمِ السَّاقِ

Silene acaulis (S). Silène acaule (F). Dwarf catchfly, Moss-campion (E). Moosleimkraut (D). Silene spumante, S. intaccata (I).

نبات عشبي نجمي معمر من فصيلة القرنفلية . ينبت برياً في اكثر الاراضي القاحلة . يعلو نحو ١٠ سم . اوراقه جميلة الخضار الزاهي ، مستطيلة الشكل ، طولها من ١ الى ٢ سم . ازهاره وردية او حمراء اللون || يعتبر من النباتات اليخضورية غير انه يخشى تكرار الحش .

٧٩٥٩ - حَشِيشَةُ الدَّهَبِ
Cétérac (F).
Scaly spleenwort (E).

هي الشراق الحرفي نبات من السرخس .

٧٩٦٠ - حَشِيشَةُ الرَّمَالِ
Ammophila (S).
Ammophile, Gourbet, Roseau des sables (F). Bant grass, Marram grass, Mat weed (E). Echter sandhalm (D). Sparto pungens (I).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة النجيلية . انواعه عديدة جميعها جذمورية الجذور المدادة . سوقها قصية منتصبة . اوراقها عصفية الشكل . ازهارها عنقودي هامي . تنبت في الاتربة الرملية وقد يحسن غرسها في كتيبان الرمال لانها تثبتها .

٧٩٦١ - حَشِيشَةُ الرَّمَدِ *

Sauvagesia erecta (S). Sauvagesie dressée (F).
نبات جنبي بري طبي معمر من فصيلة البنفسجيات منبته بعض اصقاع افريقية الشالية || ساقها منتصبة زباء اللحم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، معنقة ، سنانية النصل الكثيف العروق ، الجميل الخضار الزيتي . ازهارها فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، مستطيلة الزناد ، خسية البتلات المفروسة ، فواحة العرف المستعب . ثمارها كعابر تغلف العديد من البزور الصغيرة || اوراقها وازهارها وبزورها تقضي على الرمد وتفيد الصدر .

٧٩٦٢ - حَشِيشَةُ الرَّمَلِ

Arenaria serpyllifolia (S). Arenaire, Sabline serpylllette (F). Chickweed, Sandweed, Thyme leaved sandwort (E). Quendel-sandkraut (D). Erba pondina, Renalioia del muri (I).

نوع من الارناريه وهو نبات عشبي بري معمر من القرنفلية . يعيش في الاتربة الرملية . يعلو من ٥ الى ١٥ سم . اوراقه صغيرة متعاقبة جلدية النصل اللسن المدبب . ازهاره صغيرة حمراء اللون .

٧٩٦٣ - حَشِيشَةُ الرِّقَّةِ
Pulmonaria (S).
Pulmonaire (F). Lung-wort (E). Lungenkraut (D). Pulmonaria (I).

جنس اعشاب معمرة من فصيلة/الحشيمية . انواعه نحو ١٥ منها البرية الطبية والزراعية التزيينية . جميعها اعشاب ليفية الجذور ، لحمية السوق الغليظة الزباء . اوراقها متعاقبة حاشية . نصلها رمحي للشكل ، ازغب

telle (F). Treacle mustard, Treacle worm-seed (E). Acker schöterich, Hederich (D). Erisimo (I).

نوع من الاريسيموم وهو نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الصليبيات . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه كاملة . ازهاره قليلة العرف لونها الى الصفار المذهب . يستعمل كضاد لداء الحفر .

٧٩٤٨ - حَشِيشَةُ الْحَلَمَةِ
Mouron des champs (F).
Poorman's weather-glass (E).
هي الزغليلية ، اطلبها .

٧٩٤٩ - حَشِيشَةُ الْحَلِيبِ *

Pedilanthus tithymaloides (S). Pédilanthé tithymaloïde (F). Red bird-cactus, Slipper flower (E). Pantoffelstrauch (D). Pedilacchiosa (I).

جنية برية من فصيلة الخنازيريات . اوراقها معنقة متعاقبة نصلها اهليلجي الشكل لحمي الصفحة . ازهارها تاجية الارتكاز ، نورية التجميع ، حمراء اللون . يستخرج منها عصارة لبنة لزجة كاوية تدمل البثرة من اللسن . تستعمل في بعض المستحضرات الطبية اعصها المسهلة .

٧٩٥٠ - حَشِيشَةُ الْحَمَى
Pyrèthre (F).
Pyrethrum (E).
هي الغريب ، اطلبه .

٧٩٥١ - حَشِيشَةُ الْخُطَّافِ * ، عَشْبَةُ الْبَوَاسِيرِ
Ficaria ranunculoïdes (S). Ficaire, Herbe aux hémorroïdes, Petite éclaire, Petite chélideine (F). Ficary, Pile-wort (E). Scharbockshahenfuss (D). Ficarla, Erba delle emorroidi (I).

عشبة برية صغيرة القد معمرة من فصيلة الشقيقيات يكثر وجودها في الاماكن الظليلة الرطبة . اوراقها كفية ، شبه مفصصة ، طويلة الزناد . ازهارها فردية صفراء اللون . جذورها غليظة قصيرة نقيعها مضاد للبواسير . اوراقها تفيد السلعة .

٧٩٥٢ - حَشِيشَةُ الْخَنَازِيرِ

Scrofulaire aquatique (F). Water betony (E).
هي خنازيرية المنافع ، اطلبها .

٧٩٥٣ - حَشِيشَةُ الدَّاحِيسِ
Paronique (F).
Paronichia (E).
هي الحريط ، اطلبه .

٧٩٥٤ - حَشِيشَةُ الدُّبِ
Anthyllide vulnérable (F).
Wound-wort (E).
اطلب لوتيا نافعة .


٧٩٥٥ - حَشِيشَةُ الدُّهْنِ * ، حَشِيشَةُ النَّجَّارِينَ
Pinguicula vulgaris (S). Grassette (F). Butter plant, B. wort (E). Butterkraut, Blauesfettkraut (D). Pinguicola, Erba da taglio (I).

عشبة نجمية معمرة من فصيلة الدهنيات . منبها المنافع . اوراقها قرصية لحمية متراكبة . ازهارها جميلة الشكل ، مهازية التويج ، فردية التجميع ، متتابعة الرصف ، مركزة على شمراخ منتصب دقيق || ازهارها واوراقها داملة للجروح ويستخرج منها صباغ اصفر ذو شأن وقيمة .

٧٩٥٦ - حَشِيشَةُ الدُّودِ * ، حَشِيشَةُ الشَّفَاءِ ،
حَشِيشَةُ الْمُلُوكِ

Tanacetum vulgare (S). Tanaisie vulgaire, Barbotine Herbe amère (F). Common tansy, Buttons (E). Rainfarnwucherbflume, Reinföhren (D). Tanaisia comune, Tanacetum, Aniceto (I).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات الشعاعية الزهر .




حشيشة القرعان



حشيشة القزاز



حشيشة القمر الحولية



حشيشة القمر المعمرة



حشيشة القمل الحرجية



حشيشة القنفذ

٧٩٩٩ - حشيشة القمل
Pedicularis (S).
Pédiculaire (F). Lousewort (E).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخنازيريات.
أنواعه نحو ١٠٠ أوراقها مركبة متعاقبة. أزهارها
عنفودي. التجميع هامي الارتكاز. أزهارها كبيرة القد.
واسم حشيشة القمل يطلق على نباتات مختلفة انحصارها
السفديل، اطلبه.

٧٩٩٥ - حشيشة القمل الحرجية*
Pedicularis sylvestris (S). Pédiculaire des bois (F).
Red-rattle (E).
نوع من حشيشة القمل يكثر وجوده في الأحراج والغابات
الظليلة الرطبة. يعلو نحو ٤٠ سم. أزهاره بيضاء اللون.

٧٩٩٦ - حشيشة القمل المنقعية
Pedicularis sylvatica (S). Pédiculaire des marais,
Herbe aux poux (F). Lousewort, Red rattle, Wood-
batony (E). Waldläusekraut (D). Pediculaire, Pidoc-
chiosa (I).
نبات طبي قابض يكثر وجوده في المناطق والمراعي والأراضي
الرطبة. يعلو نحو ٦٠ سم. أزهاره وردية اللون. تجتنب
الماشية لانه يؤذيها.

٧٩٩٧ - حشيشة القناويل
Gnaveille (F).
Annual knawel (E).
هي السليرنوس، اطلبه.

٧٩٩٨ - حشيشة القنفذ*
Erinacea pungens (S). Erinacée piquante (F). Hed-
gehog plant (E). Igelwollblume (D). Erinacea (I).
جنية برية من فصيلة القرنيات الفراشية تتميز بكثرة
شوكها اللين المستطيل الاطحل اللون.

٧٩٩٩ - حشيشة القنوة
Lunaria annua (S).
Lunaire annuelle, Médaille... (F).
نبات عشبي بري من فصيلة الصليبيات، يدعى أيضاً
حشيشة القمر الحولية، اطلبها.

٦٥٩٩ - حشيشة الكتب
Marrube blanc (F).
Common white horehound (E).
هي الفراسيون الابيض، اطلبه.

٨٠٠١ - حشيشة الكيف
Chanvre indien (F).
Indian hemp (E).
هي القنب الهندي، اطلبه.

٨٠٠٢ - حشيشة اللبن
Herbe à lait (F).
Milk-wort (E).
هي البرلوغان، اطلبه.

٨٠٠٣ - حشيشة اللجأة
Alysse blanche (F).
Hoary madwort (E).
هي الاليسم الحقيقي، اطلبه.

٨٠٠٤ - حشيشة الليمون
Andropogon citratus (S). Herbe citron (F). Lemon
grass (E). Citrongrass (D). Erba di limone (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة النجيليات. أوراقه
عصفية النصل، ليمونية الرائحة، ذكية العرف، تستعمل
استعمال الشاي.

٨٠٠٥ - حشيشة المعزى
Podagraire (F).
Goat-weed (E).
هي رجل المعزى، اطلبها.

٧٩٨٥ - حشيشة الفتق
Herniaire (F).
Turk's herb (E).
هي النومان، اطلبه.

٧٩٨٦ - حشيشة الفقراء
Herbe au pauvre homme (F). Poor-man's herb (E).
هي الفراسيوله المخزنية، عشبة طيبة.

٧٩٨٧ - حشيشة القرعان*، قبة مخزنية
Petasites officinalis (S). Pétasite officinal, Herbe
aux teigneux (F). Bog rhubarb, Butter-bur (E).
Echte pestwurz (D). Erba del tignosi (I).
نبات عشبي طبي بري معمر كريحه الرائحة من فصيلة
المركبات. جذوره جذمورية مدادة. أوراقه جلدية
كبيرة فارشة طويلاً نحو المتر وعرضها ٦٠ سم. أزهاره
مبكارة تظهر قبل الاوراق وهي حمراء اللون يجمعها شراخ
غليظ منتصب يعلو نحو المتر.

٧٩٨٨ - حشيشة القط
Herbe aux chats (F).
Cat's valerian (E).
هي الناردن المخزني، اطلبه.

٧٩٨٩ - حشيشة القززال*
Stellaria media (S).
Stellaire, Morgeline, Mouron des oiseaux (F).
Common chickweed (E). Vogelmiere (D). Stel-
laria, Paperina, Gallinella (I).
عشبة برية غضة كثيرة الانتشار من فصيلة القرنفليات
وسبط القلقليات. ساقها فروعاً زغبية منتصبه. أوراقها
معنقة، زبدياً طويلة منقعة. نصلها ازغب يضي الشكل
لسن الزام الاخضر. أزهارها خماسية التركيب، صغيرة القد،
بيضاء اللون. سبالتها عفاية مستطيلة، بتلاتها ثنائية الشعبة،
قصيرة. اسديتها مندعمة تحت المبيض. اقلامها ثلاثية.
ترغب في المواقع المعتدلة الرطوبة تكثر على جوانب
الطرقات وبين حجارة الجلول.

٧٩٩٠ - حشيشة القلب
Millepertuis perforé (F).
Perfoliate St. John's wort (E).
هي الهيوفاريقون المعروف، اطلبه.

٧٩٩١ - حشيشة القمر، قمرية
Lunaria (S).
Lunaire (F).
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة الصليبيات.
أنواعه عديدة منها البرية والزرينية. أزهارها عنقودي
التجميع. أزهارها كبيرة القد || أشهر أنواعه الزراعية يتبع.

٧٩٩٢ - حشيشة القمر الحولية*، قمرية حولية
Lunaria annua (S). Lunaire annuelle, Monnoyère,
Monnaie du pape, Herbe aux écus, Médaille (F).
Honesty, Moonwort (E). Mondviole, Stumpfes,
Silberblatt (D). Lunaria, Argentina, Monete del
Papa (I).
عشبة زينة حولية وحولية تملو من ٣٠ الى ١٠٠ سم.
أوراقها بسيطة كبيرة القد قلبية الشكل مسننة أخافة.
أزهارها بنفسجية أو بيضاء اللون. عرفها ليلي الاربج
العطري.

٧٩٩٣ - حشيشة القمر المعمرة*، قمرية
Lunaria rediviva (S).
Lunaire vivace (F).
عشبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٣٠ سم. أوراقها معنقة
متعاقبة، نصلها زاهي الخضار الاصفر. أزهارها فواحة
العرف العطري المستحب، لوها الى الزرقة الموشحة بالابيض.

٨٠١٦ - حَشِيشَةُ الْوَحْلِ *

Limosella (S). Limoselle (F). Mud-wort (E). Sumpf-kraut, Winziger schlammiling (D). Limosella (I).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الخنازيريات يكثر وجودها في المناطق. أوراقها دوارة الارتكاز مستطيلة. أزهارها صغيرة القد، فردية التجميع، بيضاء اللون أو وردية.

٨٠١٧ - حَشِيشَةُ ذَاتِ الْجَنْبِ

Asclépiade tubéreuse (F). Butterfly weed (E).
هي الصقلاب العسقلي، اطلبه.

٨٠١٨ - حَشِيشَةُ مُبَارَكَةٍ

Benoîte (F).
Herb-bennet (E).
هي الجيوم المبارك، اطلبه.

٨٠١٩ - حَشِيشَةُ مَهْبُولَةٍ

Liseron à feuilles de guimauve (F). Mallow bindweed (E).
هي البلاب الخيزري الورقي، اطلبه.

٨٠٢٠ - حَشِيشِيَّةٌ، عَشْبِيَّةٌ

Herbacé (F).
Herbaceous (E).
نعت تعريفي وصفي يطلق على كل نبات لين النسج، ساقه دون الليفة صلبة.

٨٠٢١ - حَشِيفٌ

Culmigène (F).
Culmigenous (E).
نعت تعريفي يطلق على الفطور والجراثيم التي تعيش وتنمو على الجذام.

٨٠٢٢ - حَشِيفَةٌ

Clitellum (F). Clitellum (E).
الحشيفة حزام غدي الشكل يطوق بعض فتوح الحراطين في زمن التعاظم.

٨٠٢٣ - حَشِينٌ

Brume sèche (F).
Dry fog (E).
الحشين الضباب الناضف.

٨٠٢٤ - حَشِينَةٌ

Stylops (F). Stylops (E).
حشرة من الحشنيات تمتع مكنها في بطون هدييات الاذنان فينقف المكن عن يرقات تعيش طفيلية الى ان تتم انسلخاتها وتتحول الى سحرة كاملة.

٨٠٢٥ - حَشِينِيَّاتٌ

Stylopidés (F).
Stylopidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة ملتويات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اشهرها الحشينة.

٨٠٢٦ - حَصَا الْبَانِ

Romarin (F).
Common rosemary (E).
هو اكليل الجبل نبات عطري من الشفويات.

٨٠٢٧ - حَصَاةٌ، حَصْبَةٌ

Caillou, Galet (F).
Pebble, Small stone, Flint (E).
الحصى صغار الحجارة. يقال ارض محصاة وحصىة وحصىة اي كثيرة الحصى.

٨٠٢٨ - حِصَادٌ، حِزَاكٌ، حَصِيدٌ، حَصِيدَةٌ

Moisson (F). Harvest (E).
هو قطع الزرع الذي استحصد وهو ايضاً اوان قطعه.

٨٠٠٦ - حَشِيشَةُ الْمَلَاعِقِ *، مِلْعَقِيَّةٌ

Cochlearia officinalis (S). Cochléaria officinal, Herbe aux cuillers (F). Scurvy-grass, Spoon-wort (E). Echte löffelkraut (D). Coclearia, Erba a cucchlaino (I).

عشبة طيبة حولية من فصيلة الصليبيات تنبت برية في الاماكن الرطبة وتزرع لفوائدها الطبية العديدة. أوراقها ملعقية الشكل متعاقبة. أزهارها هامة الارتكاز، عنقودية التجميع، بيضاء اللون. أوراقها حاملة الطعم، لاسعة، تعتبر من افنع الادوية المضادة للحفر وتستعمل ايضاً كمحرضة ومنشطة ومنظفة للدم ومدررة للبول.

٨٠٠٧ - حَشِيشَةُ الْمَلَاكِ *

Archangelica officinalis, Angelica officinalis, Angelica archangelica, Selinum angelica (S). Archangélique, Angélique, A. officinale, Herbe aux anges (F). Archangel, Angelica (E). Angelika, Echte engelwurz (D). Angelica, Archangelica, Angelica domestica (I).

نبات بقلي بري وذراعي من فصيلة الخيميات يعد من الافاوية ومن النباتات الطبية. منه ضروب برية تكثر في الاراضي الجبلية. يستخرج من جذورها مواد طبية مضادة لمرض الهضم. ومنه ضروب زراعية عطرية، وأوراقها مأكولة ويستحضر منها بعض المشروبات النافعة المقيمة.

٨٠٠٨ - حَشِيشَةُ الْمَلَكَةِ

Tanaisie balsamite (F).
Tansy (E).
هي إهلال قسطاً، اطلبه.

٨٠٠٩ - حَشِيشَةُ الْمُلُوكِ

Tanaisie vulgaire (F).
Common tansy (E).
هي حشيشة الدود، اطلبها.

٨٠١٠ - حَشِيشَةُ الْمِنْشَارِ *

Biserrula pelecinus (S). Biserrule, Bissérute, Pélé-cine, Double scie (F). Hatchet vetch (E). Sägekraut (D). Pelecino (I).

نبات عشبي بري مرعوي صغير القد نحيل الساق من فصيلة القرنيات الفراضية يكثر في المراعي الطبيعية وفي الارض البور. أوراقه منشارية الحافة ثنائية التسنين.

٨٠١١ - حَشِيشَةُ التَّنَاقِ *

Spilanthus oleracea (S). Spilanthus oleracé, Cresson de Para (F). Spilanthus, Para cress (E). Parakesse, Husarenknopf (D). Spilanto, Crescione di Para, Salivaria (I).

عشبة برية طيبة من فصيلة المركبات منبتها البلاد الحارة. يستخرج منها دهن عصري قوي الرائحة حريف الطعم يستعمل في طب الاسنان لتسكين الالم.

٨٠١٢ - حَشِيشَةُ التَّجَارِينِ

Grassette (F).
Butter-wort (E).
هي حشيشة الدهن، اطلبها.

٨٠١٣ - حَشِيشَةُ النَّحْلِ

Méliste officinale (F).
Lemon-balm (E).
راجع زنجبان.

٨٠١٤ - حَشِيشَةُ النَّزَفِ

Aspilula latifolia (S).
Aspilula, Plante à l'hémorragie (F).

نبات عشبي بري من فصيلة المركبات. منبته جميع الاصقاع الحارة. أوراقه متعاقبة لها بعض المنافع الطبية اخصها نزف الدم الذي تقضي عليه.

٨٠١٥ - حَشِيشَةُ الْمَرِّ

Népète cataire (F).
Catmint (E).
هي قوطم المر، اطلبه.



حَشِيشَةُ الْمَلَاعِقِ



حَشِيشَةُ الْمَلَاكِ



حَشِيشَةُ الْمِنْشَارِ



حَشِيشَةُ التَّنَاقِ



حَشِيشَةُ الْوَحْلِ

٨٠٤١ - حَصَب Paver (F). To pave (E).
حصب المكان : رصفه بالحصى.

٨٠٤٢ - حَصَب، كَدَم Macadamiser (F).
To macadamize (E).
طريقة خاصة لتعبيد الطرقات ترتكز على رصف الحصى.
الحادة الزوايا وحدها لتخديم انكماشها واندماجها.

٨٠٤٤ - حَصْبَةُ الْخِنْزِير، حُمْرَةُ الْخِنْزِير
Rouget, Rougeole du porc, Erysipèle charbon-
neux (F). Measles (E).
مرض جرثومي يصيب الخنازير. مظهره الخارجي يقع
حمر تيلو على الاذن فالصدر فالبطن.

٨٠٤٥ - حِصَّة Cote, Part (F). Quota, Share (E).
هي النصيب العائد من ذمة مالية.

٨٠٤٦ - حِصَّة، سَهْم، نَصِيب، عِصَّة
Lot (F). Lot, Portion (E).

٨٠٤٧ - حِصَّة الرَّبْح Dividende (F). Dividend (E).
هي الربحة، اطلبها.

٨٠٤٨ - حِصَّة الشَّرَاكَةِ Mise sociale (F).
Share of capital (E).
هي ما يتوجب على الشريك تقديمه الى الشركة من نقود
او اموال معينة بالذات او معنوية.

٨٠٤٩ - حِصَّة المِشَارَكَةِ Apport en société
هي المال الذي يقدمه الشريك الى الشركة.

٨٠٥٠ - حَصْر Monopole (F). Monopoly (E).
راجع احتكار.

٨٠٥١ - حَصْرُ الْأَجُور Blocage des salaires (F).
Wage freeze (E).

٨٠٥٢ - حَصْرُ الْأَسْغَار Blocage des prix (F).
Price freeze (E).

٨٠٥٣ - حَصْرُ الرِّسَالِيل Blocage des capitaux (F).
Capital freeze (E).

٨٠٥٤ - حَصْرِيَّة
الحصرية والحصرمة : الشج. يقال في الماشية اصابها
الحصرية اذا شج فنتاجها. وفي الزروع اذا شجت
محاصيلها.

٨٠٥٥ - حَصْرَم Verjus (F). Verjuice (E).
الحصرم : أول العنب ما دام أخضر حامضاً.

٨٠٥٦ - حَصْفَة Pelte (F). Pelt (E).
تريس هلالى الشكل ليني او خشبي التركيب يعلو بعض
الاعضاء النباتية او يؤلف جزءاً منها كما هو الحال في
بعض اجناس الصنوبريات.

٨٠٥٧ - حَصْفِي Pelté (F). Peltate (E).
صفة او تمتد كل ما هو شبيه بالحصف.

٨٠٥٨ - حِصْلَاب Géologue (F). Geologist (E).
عالم بالارض وبركباتها.

٨٠٢٩ - حَصَاد Faucheur (F). Mower, Reaper (E).
هو الذي يحصد الزرع.

٨٠٣٠ - حَصَادَة *، مَحْصَد، مَحْصَدَة
Moissonneuse (F). Reaping-machine (E).
آلة تحصد الزرع انواعها عديدة منها البسيطة التي تحصد
الزرع وتلقيه ومنها الرابطة (Moissonneuse-lieuse) التي
تربط الزرع بعد حصده وجمعه غبوطاً.

٨٠٣١ - حَصَادَة دَارِسَة *، مَحْصَد دَارِس
Moissonneuse-batteuse (F). Reaper and threshing-
machine (E).
آلة تحصد الزرع وتدرسه فتفصل الحب عن القش وتدفع
به الى الاكياس وتلقي القش على الارض.

٨٠٣٢ - حِصَاصَة
الحصاصة : ما يبقى في الكرم بعد قطفه.

٨٠٣٣ - حِصَاف Phrénologiste.
Phrénologue (F). Phrenologist (E).
الحصاف من كان اختصاصه الحصافة.

٨٠٣٤ - حِصَافَة Phrénologie (F).
Phrenology (E).
الحصافة علم فراسة سليقة الانسان وقواه العقلية استناداً
الى حفته.

٨٠٣٥ - حِصَافِي Phrénologique (F).
Phrenological (E).
نعت تعريفى يطلق على كل ما له علاقة بالحصافة اي
بفراسة الدماغ.

٨٠٣٦ - حِصَان * Etalon (F). Stallion (E).
الذكر من الخيول العراب البالغ الصالح للزور.

٨٠٣٧ - حِصَان إِبْلِيس، حِصَان الْعَبَّاس
Mante religieuse (F). Praying mantis (E).
هو السرعوفة، اطلبها.


٨٠٣٨ - حِصَان الْبَحْر * Hippocampus (S).
Hippocampe, Cheval marin (F). Hippocamp,
Sea-horse (E).

جنس اسماك عجيبة الشكل من فصيلة زمارات البحر.
انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها صغيرة القد تعيش على
الاعشاب البحرية في بحار المناطق الاستوائية والمعتدلة.


٨٠٣٩ - حِصَان الْجَر Cheval de trait (F).
Carriage-horse (E).
هو من الخيل الصالح لجر العربات والاثقال.

٨٠٤٠ - حِصَان بُخَارِي Cheval-vapeur (F).
Horse-power (E).
وحدة اصطلاحية متفق عليها لتقدير قوة المحركات وهي
القوة اللازمة لرفع ٧٥ كيلو على علو متر واحد في
ثانية واحدة.


٨٠٤١ - حِصَانَة، مَنَاعَة Immunité (F).
Immunity (E).
قوة في الجسم تدفع عنه الامراض. وقد تكون طبيعية
وتدعى مناعة او تكون اصطناعية بواسطة التلقيح وتدعى
حصانة.



حصادة



حصادة دارسة



حصان



حصان البحر

٨٠٧٢ - حَضَار ، نَيْر قِنْطُورُس

Rigel Kentaurus

الحضار ، ويدعى نير قنطورس ورجل قنطورس ، نجم من كوكبة قنطورس مركزه على حافر اليد اليمنى . يعتبر اقرب نجم من الارض اذ يبعد عنها نحو ٤٠٠ ٣٣ مليار كيلومتر .

٨٠٧٣ - حَضَال * Loranthus (S), Loranthe (F).

Loranthus (E), Riemenblume (D), Loranto (I).

جنس نباتات طفيلية معمرة من فصيلة العنبيات . انواعه المعروفة زهاء ١٠٠ معظمها يألف البلاد الحارة . منها نوع يركب الاشجار المشجرة في البلاد المعتدلة الحرارة يدعى بنتومه . ومنها الشيقر والعنم والخزطان والعصار . وكان القدماء يقدسون الحضال ويعتبرونه رمزاً للخلود لانه دائم الخضرة وكانوا يجنونه في مهرجانات يحيونها كل عام . وكان يستعمل في علاج الصرع والسفلس وهو يستعمل الآن ضد ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين . ويستخرج من ثماره مادة رائحة مقيدة .

٨٠٧٤ - حَضَالِيَّات Loranthees, Viscées (F).

Loranthaceae (E).

سبط من فصيلة العنبيات (الدبقيات) . انواعه نحو ٣٠٠ جميعها نباتات طفيلية تلتصق قوتها بواسطة براشغها للماصة التي تثبتها في فروع واغصان الاشجار العائلة . اوراقها بسيطة جلدية متقابلة . ازهارها قياسية خشوية .

٨٠٧٥ - حَضْب ، حَضْب Serpent mâle (F).

He snake (E).

كل ذكر من الحيات حضب . وقيل هو الذكر الضخم وقيل ضرب من الحيات .

٨٠٧٦ - حَضْبِيَّات Ilysiidae (S).

Ilysiidés (F), Ilysiidae (E).

فصيلة حيات سرلودة عديدة الاذى . اجناسها المعروفة ثلاثة وانواعها نحو ١٧ منتشرة في معظم البلاد الحارة والاستوائية . اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، تقطوع من ٨٠ الى ١٠٠ سم . رؤوسها صغيرة ، عديمة الاعناق ، مستديرة الاخطام . عيونها ماسحة . فكوكها مسننة . اذنانها قصيرة ، مستدقة الاطراف . اثوابها لماعة يكثر فيها الاسود والاسود المطوق بالاحمر . قوتها الحشرات والديدان والعظام والفأر .

٨٠٧٧ - حَضْحَض * Sherardia (S).

Shérardie (F), Sherardia (E).

جنس نباتات عشبية حولية مرعوية من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . يكثر وجودها في الاراضي المهملية والمذحاة . سوقها متشعبة فرعاء . اوراقها ضيقة صغيرة . ازهارها صيواني التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها زرقاء اللون .

٨٠٧٨ - حَضْض ، حُطْط ، حُطْط

Suc amer des arbres (F), Bitter juice of trees (E).

الحضض والحطط : عصارة الشجر المرة .

٨٠٧٩ - حُضْض ، عُرْقَد ، أَطَد

Lycium (S), Lyciet (F), Boxthorn (E), Bocksdorn (D), Liclo, Agnatoli (I).

جنس نباتات معمرة من الفصيلة الباذنجانية . انواعه نحو

٨٠٥٩ - حَصْبَة Géologie (F), Geology (E).

هي الجيولوجية علم الارض ومركباتها .

٨٠٦٠ - حَصْبِيّ ، جِيُولُوجِيّ Géologique (F).

Geological (E).

مختص بعلم الارض ومركباتها .

٨٠٦١ - حَصْلَة Pédologie (F), Pedology (E).

هي درس الآتربة الارضية وهي تقسم الى شقين الشق العلمي البحث الذي يبحث في تكوين الآتربة وتطوراتها مع الزمن تحت تأثير العوامل الخارجية . والشق العملي الذي يبحث في ما وصلت اليه هذه التطورات وكيفية استثمارها الزراعي .

٨٠٦٢ - حَصَى المَثَانَة Gravelle (F), Gravel (E).

هي رمل المثانة ، اطلبه .

٨٠٦٣ - حُصْبَة Géode (F).

Geode, Druse (E).

قطعة من الصوان كلوية الشكل ، صغيرة الحجم ، مجوفة مرصوفة الداخل بالبلور الصخري .

٨٠٦٤ - حُصْبَة Cystolithe (F), Cystolith (E).

الحصية ركيمة من كربونات الكالسيوم تتكون في بعض خلايا الانسجة النباتية احصها في اوراق الانجريات والاقنشيات .

٨٠٦٥ - حَصِيد ، حَصِيدَة Moisson (F).

Harvest (E).

هو الحصاد ، اطلبه .

٨٠٦٦ - حُصَيْصَة

الحصيصة من الفرس ما فرق الاشعر مما اطاف بالخافر .

٨٠٦٧ - حَصِيْفَة Crémaster (F).

Cremaster (E).

الحصيفة العضلة المنوط بها رفع الحصية او التليسة .

٨٠٦٨ - حَصِيل * Pacourinapxis (S).

Pacourine (F).

جنس نباتات عشبية مائية من فصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها البلاد الحارة . تعيش على ضفاف مجاري الماء . سوقها اسطوانية منتصبة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، سنانية النصال . ازهارها رؤسي التجميع ، محوري الارتكاز . ازهارها ارجوانية اللون صغيرة القد ، مستطيلة الشكل .

٨٠٦٩ - حَصِيلَة Produit net (F), Clear product (E).

الحصيلة هي الدخل الصافي . ج حصائل .

٨٠٧٠ - حَصِيم Petit cailloux (F), Flint-stones (E).


الحصيم : صغار الحصى .

٨٠٧١ - حَصِيمَة Tubercule (F), Tubercle (E).

هي الدرة البصلية المخلية الشكل وكل بصلة فصية او درية القرص كسا في بعض انواع التريجن والثوم وما أشبه . ج حصام .



حَصِيل



حَضَال



حُضْض



حُضَضُ أُرُوبِي

٨٠٨٧ - حُضَضُ صِينِي ، عُرْقُدُ صِينِي

Lycium chinense (S). Lyciet de Chine (F).
جنبه من الحُضَضُ تعلو من متر إلى ثلاثة أمتار ساقها وفروعها قليلة الشوك . أوراقها بيضيه مستطيلة . أزهارها بنفسجية زاهية . أزهارها يستمر من نيسان إلى تشرين .

٨٠٨٨ - حَضَن Couver (F). To incubate (E).

٨٠٨٩ - حَضَن ، حَضَانَة ، تَرْحِيم Incubation
هو نمو جنين البيض بالحرارة وقد يكون طبعياً أو صناعياً .

٨٠٩٠ - حَضَن صِنَاعِيّ Incubation artificielle (F).
Artificial incubation (E).
يدعى هكذا عندما تكون الحضنة آلية بواسطة محضنة .

٨٠٩١ - حَضَن طَبِيعِيّ Incubation naturelle (F).
Natural incubation (E).

يدعى هكذا عندما تكون الأنثى هي الحاضن كما في الدجاج أو الأنثى والذكر كما في معظم الطير أو حرارة الطبيعة كما في الزحافات والحشرات .

٨٠٩٢ - حَضْنَة Couvain (F). Eggs of bees (F).
هي جماع عُمَيّ ورصع النحل في القرص الواحد أو في جميع أقراص القفير .

٨٠٩٣ - حَضْنَة Couvée (F).
Nest of eggs, Brood covey (E).
جماع البيض المحضون في آن واحد . وتطلق أيضاً على جميع المبيضات المتأخرة عن حضنة واحدة .

٨٠٩٤ - حَضِيض Sol (F). Ground, Soil (E).
هو التربة الموطوءة بها كان نوعها .

٨٠٩٥ - حَضِينَة * Auricula (S).
Auricule (F). Auricula (E).
جنس حيوانات برية من الرخويات معديات الأرجل وفصيلة الحَضِينِيَّات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض أصقاع البلاد الحارة وأخصها الهند . تسرح بين الأعشاب وتحت الطحالب في المواقع الرطبة || أصدافها أهليلجية مستطيلة قليلة اللوحة الطرية مدببة الاعقاب .

٨٠٩٦ - حَضِينِيَّات Auriculidae (S).
Auriculidés (F). Auriculidae (E).
فصيلة من الرخويات معديات الأرجل رئوية . أجناسها وأنواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والاستوائية . بعضها بحري وبعضها قاذب وبعضها بري . اعرف أجناسها وأشهرها الحَضِينَة والملمبوس والكسدولة والكريكة .

٨٠٩٧ - حَطَّاب Rabattage (F). Cutting down (E).
هو قطع أغصان وفروع الأشجار الهرمة لتجديد نشاط طاقتها الحيوية .

٨٠٩٨ - حَطَب Bois (F). Wood (E).
ما اعد من الشجر شرباً للنار .

٨٠٩٩ - حَطَب أَتَمَر Tamaris à manne (F).
Manna tree (E).
هو أثل المن ، اطلبه .

٨١٠٠ - حَطَم الحطم : داء في قوائم الدابة .

٦٠ جميعها شجيرات وجنيات برية وتزيينية منبها البلاد الحارة . أوراقها كاملة متعاقبة صغيرة القد . أزهارها ابطية الارتكاز ، فردية التعجيج فيها البنفسجي والاحمر والاصفر والابيض . ثمارها عنبية || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

٨٠٨٠ - حُضَضُ أُرُوبِي * ، عُرْقُدُ أُرُوبِي

Lycium europaeum (S). Lyciet d'Europe, Ollnet, Jasmin bâlard, Couronne du Christ (F).

جنبه من الحُضَضُ تعلو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ساقها شائكة . أوراقها ملوقة مستطيلة ، نصلها ناعم البشرة قليل الزغب . أزهارها بنفسجية اللون صغيرة القد . ثمارها الى الحمرة العابقة || أزهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٨٠٨١ - حُضَضُ إِفْرِيقِي * ، عُرْقُدُ إِفْرِيقِي

Lycium afrum (S). Lyciet d'Afrique, Jasmin d'Afrique (F).

جنبه من الحُضَضُ تعلو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم . أوراقها طحلاء النصل الضيق . أزهارها بنفسجية زاهية عطرية العرف . مذاقها زبء الاقلام . ثمارها كرزية الشكل لوّنها الى البنفسجي العابق || أزهارها يستمر من نيسان الى حزيران .

٨٠٨٢ - حُضَضُ الْجَزِيرَة ، عُرْقُدُ الْجَزِيرَة ، خَوْلَان

Lycium arabicum (S).

Lyciet d'Arable (F).

جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو المتر . ساقها منتصبه قليلة الشوك . فروعها متدلية الاطراف . أوراقها ملوقة جامدة النصل . أزهارها صغيرة القد لوّنها الى البياض الوردي يعلوه توشيح اصفر . أزهارها يستمر من ايار الى آب .

٨٠٨٣ - حُضَضُ بَرْبَرِي ، عُرْقُدُ بَرْبَرِي

Lycium barbarum (S). Lyciet de Barbarie (E).

شجيرة من الحُضَضُ تعلو من ٣ الى ٤ أمتار . ساقها مرطاء . أوراقها بحرية اللون مستطيلة النصل . أزهارها وردية موشحة بالبنفسجي . ثمارها صفر كرزية القد . أزهارها يستمر من ايار الى آب .

٨٠٨٤ - حُضَضُ رُوسِي ، عُرْقُدُ رُوسِي

Lycium ruthenicum (S). Lyciet de Russie (F).

جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها مستطيلة ، ضيقة ، شبه خيطية . أزهارها وردية كثيرة القد . ثمارها سود بحجم الحمص || أزهارها يستمر من ايار الى تموز .

٨٠٨٥ - حُضَضُ شَاحِب * ، عُرْقُدُ شَاحِب

Lycium pallidum (S). Lyciet pâle (F).

جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو المتر . ساقها مرطاء . أوراقها ملوقة جامدة النصل . أزهارها متوسطة القد لوّنها الى البياض الاخضر يعلوه توشيح وردي اصفر || أزهارها يستمر من ٣٠ الى ٤٠ يوماً ابتداء من اوائل حزيران .

٨٠٨٦ - حُضَضُ شِيلِي ، عُرْقُدُ شِيلِي

Lycium chilense (S). Lyciet de Chile (F).


جنبه من الحُضَضُ تعلو نحو ٢٠٠ سم . ساقها وفروعها منتصبه . مبهمة الشوك القليل . أوراقها ملوقة زبء النصل . أزهارها صفر من الخارج ببيض من الداخل . ثمارها كالحمص ذعية اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف .



حُضَضُ إِفْرِيقِي



حُضَضُ شَاحِب



حَضِينَة

الخططي . مذهبها الى الزرق الكدرام . ثوبها في زمن فتوتها يميل الى الجؤرة . حراشفها معينة ، عادمة الحزونة ، ملساء السطح ، مما دعى الى تسميتها بصفتها المميزة : ملساء || رأسها متوسط الحجم . عينها بلون النار . شدقاها الى الزرق العابقة . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى || تألف اطراف الغابات وتفضل الاراضي الرملية . قوتها الحشرات والخراطين والعقارب والضفادع والعفاء ... || تسرح في النهار وفي اوائل الليل || تعتبر من الحيات النافعة .

٨١١١ - حَفَّات مَطَوَّق * ، مَطَوَّقَة

Coluber torquatus, Natrix natrix (S).
Couleuvre à collier, Serpent à collier, S. nageur (F).
Common snake, Grass snake (E).

حية بيوض من الاحناش عادات الاغاييد محتبسات السموم . جسمها متوسط الشخانة يطول من ١٤٠ الى ٢٠٠ سم . ثوبها قبل الخمس سنوات الى الطحلة الرمداء تعلوها رقشة صفراء غبراء . وبعد ٥ سنوات الى الطحلة الرمداء العابقة يعلوها تبقيع اسمر منسوب الشكل والحجم ، وتحزيز اسود معترض . مذهبها مزيج من الابيض والازرق والاسود . تتميز بقلادة حنطية اللون صفراء المواج نصفية الطوق تكتنف القفن والعتق || رأسها متوسط القد ، مبسط كراس الارقم . شدقها رحب . عدد اسنانها ٥٠ ، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى || تألف الغابات والحدائق والمناقع وضفاف مجاري الماء . قوتها الحشرات والضفادع والاسماك والعفاء ... وتتميز بميلها الى الخليب الذي ترتشفه بشراهة || تسرح في النهار وفي القسم الاول من الليل || تعتبر من الحيات النافعة .

٨١١٢ - حَفَّاد - Néoténique (F). Neotenic (E).

نعت تعريفي يطلق على البرقة الكاملة الشوار الشقي . وهي حالة بعض ذكور واثان الارضة والعقيفان . الغاية منها تأمين استمرار النسل في حال موت الملك او الملكة قبل زمن الافراق او بعده .

٨١١٣ - حَفَّار الرزّ الشرقي ، حَفَّار القصب

Chilo des roseaux (F).
فراشة من الناريات يرقها تحفر سوق الرز والقصب . اطلب شيلو القصب .

٨١١٤ - حَفَّار الساق - Cossus gâte-bois (F).

Goat-moth (E). Weidenbohrer (D).
هو قتع الساق ، حشرة من حرشفيات الاجنحة ، اطلبه .

٨١١٥ - حَفَّارَة - Paléozoologie (F).

Paleozoology (E).
الحفارة علم التاريخ الطبيعي العائد الى الاحاير الحيوانية ومتحجراتها .

٨١١٦ - حَفَّارَة * - Sparus haffara, Sargus

vetula (S). Sargue vieille, Spare haffara (F).
Sar, Sargus, Haffara (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك المياه الاقليمية . مسرحها معايش الثقاف والحجاج . || جسمها اهليلجي للشوزن ، مقلطح الجرم ، يطول من ٢٠ الى

٨١٠١ - حُطَّاب ، حُطَّابَة ، شُنْتَرَة - Palmure (F).

الحطاب والحطبة غشاء جلدي يحيط بكامل اصابع الطير او بجزء منها وقد يوصلها ببعضها كما في كفيات القدم .

٨١٠٢ - حَفَّاة - قملة كبيرة القد ، ج حنطى .

٨١٠٣ - حَفَّار - Parcage (F). Folding, Penning (E).

هو حجز المواشي في الحظائر وقد تحظر الماعز والضأن في الاراضي الزراعية لتسمها .

٨١٠٤ - حَفَّظ - هو الخفض عصارة الشجر المرة .

٨١٠٥ - حَفَّابَة ، زَرْبَة ، صَبْرَة - Bercall (F). Fold, Sheepfold (E).

موضع يحاط عليه لتأوي اليه الغنم والماعز وسائر الماشية .

٨١٠٦ - حَفَّ * - Agriopus (S).

Agriope (F). Agriopus (E).

سمكة بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الطريخيات موطنها يتأخم القارة الافريقية من جميع جهاتها || جسمها شبه مخروطي الشكل ، معتدل التبطيط ، يطول من ٤٥ الى ٥٥ سم . ثوبها الى الخضار البحري الاسمر يعلوه تبقيع احمر . رأسها معتدل الجرم ، مقعر الحطم ، صغير الشدق عينها كبيرتان ، ناشزتان . تتميز بزعنفتها الظهرية الكبيرة ، الرفيعة ، القاطبة ، التي تمتد من قة الرأس الى قاعدة الذيل . مقدسها رفيع المناخس الحادة || لحمها كاعن الصنف غير مرغوب فيه .

٨١٠٧ - حَفَّاء - Typhace (F). Reed-mace (E).

هو البوط ، اطلبه .

٨١٠٨ - حَفَّات ، حَفَّث ، حَفَّش ، حَفَّش - Coluber (S). Couleuvre (F). Coluber (E).

جنس حيات من فصيلة الثعابين يشمل بعض الانواع غير السامة جميعها اكبر قدماً من الارقم . ج حفايث وحفايث . اطلب حنش .

٨١٠٩ - حَفَّات اَمْعَر * - Coronella girondica (S).


Couleuvre girondine (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاغاييد محتبسات السموم . جسمها متوسط الشخانة يطول نحو ٦٠ سم . ثوبها الى الخططي الامعر الاسمر المواج يعلوه ترقين متواتر اسود اللون يمتد من العتق الى طرف الذنب . مذهبها الى المغرة الزاهرة يحوقها خطان جانبيين من الترقين الاسود || رأسها لوزي الشكل ، صغير القد . شدقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ ، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى . عتقها شديدة القصر || تسرح في الليل وفي النهار . تألف البراري . قوتها العفاء والوزغ والفار والحشرات || تعتبر من الحيات النافعة .


٨١١٠ - حَفَّات اَمْلَس * ، مَلْسَة - Coronella austriaca (S).

Couleuvre lisse, Lisse (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاغاييد محتبسات السموم . جسمها يطول نحو ٧٠ سم . ثوبها عند اكتمال نموها اي بعمر ١٥ سنة يكون الى الزرق الصهباء المواج وتزداد صهته ويخف ازرقاقه مع اقترابه من البطن . ويعلو ثوبها من العتق الى الذنب خطان قاطبان من التمشيش



حَفَّ



حَفَّات اَمْعَر



حَفَّات اَمْلَس



حَفَّات مَطَوَّق



حَفَّارَة


٨١٢٤ - حَفَتْ أَشْقَر* ، أَلَف مُشَرَّط ،

Elaphe scalaris (S).

مُشَرَّطَة

Couleuvre à échelons (F).

اسمها العلمي من الفينيقي أو العربي لأنها تنتصب كالآلف.
حية بيوض من الاحناش عادات الاخايد محتبسات السموم . جسمها معتدل الشخانة ، مزواني المقطع ، ثلاثي الاضلع ، يطول نحو ١٢٠ سم. ثوبها الى الشقرة الصنابية الموج يعلوها من القفن الى طرف الذنب ثلاثة خطوط متقاربة جزئية . رأسها لوزي الشكل . شدقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى . تحسر قشارها من مرتين الى ثلاث مرات في العام . تبلغ كامل حجمها بعمر ١٤ سنة وتعيش نحو ١١٠ سنوات || تألف المروج والادغال والبراري . تسرح في النهار وفي اوائل الليل . قوتها الحشرات والدويبات والورغ والعطاء والفئران . بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر || اخلاقها شرسة كاخلاق الافاعي . سريعة الغيظ تنتصب انتصاب الاملج وتعض كل شيء تتوقع منه الاساءة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٢٤ بيضة مجموعة في سبحين تخفيها في جمر مهجور او في نفق تحلده في الجثالة || تعتبر من الحيات النافعة .



حَفَتْ أَشْقَر


٨١٢٥ - حَفَتْ طَوِيل* ، حَفَتْ حَنْطِي* ،

Elaphe longissima (S).

أَلَف المُرُوج

Couleuvre d'Esculape (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاخايد محتبسات السموم . جسمها معتدل الشخانة يطول من ١٥٠ الى ١٦٠ سم. ثوبها الى الصهبة الخطية العنابية الموج يعلوها ترقين متواتر اسمر يمتد من العنق الى طرف الذنب . رأسها مستنقذ ، شدقها معتدل الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ . عينها صغيرتان حنقها معتدلة الطول || تبلغ كامل حجمها بعمر ١٦ سنة وتعيش نحو ١٢٥ سنة . الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ٢٠ الى ٣٠ بيضة مجموعة في سبحين تخفيها في نفق تحلده في الجثالة || تألف المروج والحدائق وتدخل البيوت الارضية بطعامينة تسرح في النهار وفي الليل . قوتها الحشرات والعطاء والدثام والفئران والجردان والضفادع والمصافير ... || بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر . اخلاقها هنية ، رضية || تعتبر من الحيات النافعة .



حَفَتْ طَوِيل

٨١٢٦ - حَفَرَة

الحفرة : نبات سرعوي . ج حفرى .

٨١٢٧ - حَفَرَة

Cratoxyle, Cratoxylon (F).

جنس نباتات برية معمرة من فصيلة الداذيات انواعه نحو ١٢ منبتها المناطق الاستوائية .

٨١٢٨ - حَفَرَات

Chétopodes (F).

Chetopoda (E).

طائفة من الديدان الحلقيات عديدة الفصائل والاجناس والانواع .

٨١٢٩ - حَفَرَات

Déblais (F). Clearings (E).

هي البوثر ، اطلبه .

٢٠ سم. ثوبها الى الصهبة الفضية يعبق في الظهر ويبيض في البطن ويعلوها في جانبيها تسنج قاطب اصفر اللون ، اسمر الموج . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخطم المستدير الطرف . شدقها معتدل الانفراج . فكاهما متعادلان اسنانها نظامية الترتيب فيها الثنايا والاضراس والطواحين . عينها مستديرتان ، ناشرتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

٨١١٧ - حَفَاصَة

Pelomedusa (S).

Péroméduse (F). Pelomedusa (E).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الحفاسيات . انواعها المعروفة ثلاثة . اعطانها المناطق الاستوائية والحارة من البلاد الافريقية ومدغسقر والهند والهند الصينية . تألف الانهر والبحيرات والمناقع || اجسامها متوسطة القد تطول من ٤٥ الى ٧٠ سم. ذباها قليلة الاحديداد ، بيضيه الشوزن . زعافها منبسطة ، ملحوفة بحتر الذيل . رؤوسها مكردمة . اعناقها معتدلة الطول والغلاظة . اذناها قصيرة . قوائمها شديدة النشاط .

٨١١٨ - حَفَاصِيَّات

Pelomedusidae (S).

Péromédusidés (F). Pelomedusidae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها المعروفة ثلاثة ، اما انواعها فنحو ١٦ . اعطانها مياه معظم المناطق الاستوائية والحارة . تألف الانهار والبحيرات والندران والمناقع . قوتها كل ما تستطيع اقتراسه من اسماك وعطاء وضمفادع ورغويات وثعابين وجيف مغمورة بالماء وثباتات مائية || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . ذباها قليلة الاحديداد ، بيضيه الشوزن . زعافها منبسطة ، مفصلي الاطراف الامامية . رؤوسها مكردمة . اعناقها قاصحة تنقبض تحت الذبال . اذناها قصيرة . قوائمها خماسية الاصابع والمخالب الذرية || اما اجناسها الثلاثة فهي الحفاصة والفهر والطفاشة .

٨١١٩ - حَفَاطَة

Appertisation (F).

Appertising (E).

فن حفظ الاطعمة بتعليها وتعقيمها . وهي من اختراع ابرت (Appert) الفرنسي الذي توفي عام ١٨٤١ بعد ان وهب البشرية فن حفظ المواد الحيوانية والنباتية .

٨١٢٠ - حَفَالَة

الحفالة ما يسقط من قشر الشعر والارز والتمر وكل ذي قشارة اذا نقي . وفي الحديث : « وتبقى حفالة كحفالة التمر . »

٨١٢١ - حَفَّان

Plumes d'autruche (F).

Feathers of ostrich (E).

هو ريش النعام الناعم الرهل .

٨١٢٢ - حَفِث ، حَفَّات

Couleuvre (F).

Coluber (E).

الحفث حية من الثعابين غير السامة راجع حفاث .

٨١٢٣ - حَفِث ، حَفِثَة

Feuillet (F).

Third stomach of ruminants (E).

هنة ذات اطباق توجد في اسفل كرش البقر والشاء والايل ونحوها . وتعرف ايضاً بذات الطرائق . ج احفاث .

٨١٤٢ - حَقُّ حَفِيْضَةٍ *
Ruche (F). Bee-hive (E).

خلية تعمل فيها النحل .

٨١٤٣ - حَقُّ
Capsule (F). Capsule, Pod (E).

هو الجرو ، اطلبه .

٨١٤٤ - حَقُّ
Droit (F). Right (E).

الحق بمعناه الموضوعي يدل على جماع القواعد الملزمة للانسان في حياته الاجتماعية . والحق بمعناه الذاتي صفة تعتبر ميزة يملكها المرء ويلزم بها غيره على العمل او عدم العمل .

٨١٤٥ - حَقُّ اِحْتِيَالِي
Droit éventuel (F).

هو حق متوقع يتم عند ابرام العقد . كالايجاب في البيع فانه لا يتم الا بالقبول .

٨١٤٦ - حَقُّ اِرْتِفَاقِ السَّلْمِ
Servitude d'échelage (F).

ويقال له ايضاً حق مرتفق السلم وهو حق ارتفاق عيني يتحول صاحبه وضع سلم على ملك الغير لاجل البناء او لاجل اصلاح جدار او ارتفاق السلم غير مرتفقها لان الاول هو الحق والثاني هو قطعة الارض التي توضع عليها لاستعمال هذا الحق .

٨١٤٧ - حَقُّ اِرْتِفَاقِ المَتَاعِ
Servitude d'égoût (F).

حق ارتفاق المتاعب او الميازيب او المزاريب هو حق ارتفاق اتفاقي يقبل به صاحب عقار ان تسيل مياه المطر من سطوح بجاره الى عقاره .

٨١٤٨ - حَقُّ اِرْتِفَاقِ المَتَطْلِ
Servitude de vue (F).

حق قانوني يلتزم به صاحب عقار ان لا يفتح على عقار جاره مطات او كوى مباشرة او منحرفة الا اذا راعى الابدان التي تقرضها القانون . وهو حق اتفاقي اذا راضيا على ان تكون الابعاد اقصر من التي حددها القانون .

٨١٤٩ - حَقُّ الارْتِكَازِ
Servitude d'appui (F).

هو حق ارتفاق قانوني فحواه ان من يملك ارضاً بجوار نهر لا يصلح للاستراحة يجب عليه ان يسمح لمن يملك ارضاً على الضفة المواجهة لارضه ان يقيم خزاناً على النهر يرتكز جداره على ارضه لتجري منه المياه في اقنية الري وذلك مقابل مبلغ يتفقان عليه .

٨١٥٠ - حَقُّ الارْهَاءِ
Servitude de vaine pâture (F).

هو في بعض البلاد حق لاهل القرى او احدى القرى مؤداة ان يرسلوا قطعانهم لترعى في اراضي قرية اخرى بعد حصاد الزرع وقبل الزراعة الجديدة . ولا يسرى هذا الحق على الاراضي المسورة ولا على المروج الاصطناعية .

٨١٥١ - حَقُّ الاستِعْمَالِ
Droit d'usage (F).

حق استعمال الاشياء التي يملكها الغير كاختطاف الثمار الضرورية وهو حق لا يقبل الحوالة ولا الهجز .

٨١٥٢ - حَقُّ الاغْتِرَافِ
Servitude de passage (F).

هو الذي يباح به لصاحب عقار ان يفتقر المياه من يمر بجاره لاجل لوازم منزله وحديقته وبزهرته .

٨١٣٠ - حَقُّش
Acipenser (S).

Esturgeon (F). Sturgeon (E).

جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة الحفشيات انواعه المعروفة ٢٠ جميعها غضروفية كبيرة القد ، مردنية الشكل ، مخروطية الخطم لها ذبائبان عند منتصف الفك الاسفل . وهي عادمة الاسنان . مجنحة الحراشف الظهرية العظمية التركيب . لحمها مأكول ويستخرج منها الخبياري اي الصعتر وغراء السمك || اشهر انواعه ما يلي .

٨١٣١ - حَقُّش المَائي
Acipenser ruthenus (S).

Sterlet (F).

نوع من الحفش يكثر في المياه الالمانية وهو اصغر جثة من حفش المتوسط . يستخرج منه الصعتر والغراء .

٨١٣٢ - حَقُّش المَتَوَسِّطِ *
Acipenser sturio (S).

Esturgeon commun (F). Common sturgeon (E).

نوع من الحفش اعطاه البحر المتوسط والانهار التي تصب فيه . جثته تطول من ٥ الى ٦ امتار سروته يعرف بالخبياري الاحمر ويستخرج من مثانته غراء السمك المشهور .

٨١٣٣ - حَقُّش رُوسِي *
Acipenser ichtyocolla (S).

Belouga

نوع من الحفش اعطاه تشمل بحر ازوف وبحر قزوين والبحر الاسود والدانوب وهو اصغر جثة من حفش المتوسط طوله يراوح من ٤ الى ٥ امتار . سروته يعرف بالخبياري الاسود وهو افخر اصناف الخبيار .

٨١٣٤ - حَفْشِيَّات
Acipenseridae (S).

Acipenseridées (F). Acipenseridae (E).

فصيلة اسماك بحرية ونهرية تنتمي الى اللامعات . اجناسها وانواعها عديدة اشهرها واعرفها الحفش .

٨١٣٥ - حَقْص
الحفص : عجم النبق والزعور ونحوهما .

٨١٣٦ - حَقْص
Aigrin, Egrain (F).

الاحفاس كالشري هي النصب الناجمة عن العجم والنوى .

٨١٣٧ - حَقْل
حقل البقرة والذرة والشاة : ترك حطبها اياماً ليجتمع اللبن في ضرعها فيفتر المشتري .

٨١٣٨ - حَقُول
شجر مثل شجر الزمان في القدر ثمره كاجاصة صغيرة فيه مرارة يؤكل وله عجة غير صلبة (اللسان) .

٨١٣٩ - حَقْفِي
Arrachage (F). Pulling up (E).

الحني والاحتفاء هو استخراج النبات من التراب .

٨١٤٠ - حَقِيرَة
Fossile (F). Fossil (E).

هي البقايا المنصوبة المتحجرة ، في مختلف الطبقات الارضية ، المائدة الى اي مخلوق كان عاش في الاسحقاب النابرة . ج احافير .

٨١٤١ - حَقِيرِي
Paléozoïque (F). Palaeozoic (E).


نعت تعريفي يطلق على اقدم الاحقاب الجيولوجية التي عثر فيها على احافير او متحجرات حيوانية .



حفش المتوسط



حفش روسي



حفيضة

الساف الاول من سلم الرصف الارضي الطبيعي وهي تأتي تحت الحقبة الثانوية. راجع اياج أولي .

٨١٦٦ - **حِقْبَةُ ثَالِثِيَّة** (F). Ere tertiaire

(E). Tertiary era

من الاحقاب الحصلية مركزها فوق الثانوية وتحت الرابعة. راجع اياج ثاني .

٨١٦٧ - **حِقْبَةُ ثَانَوِيَّة** (F). Ere secondaire

(E). Secondary era

من الاحقاب الحصلية مركزها بين الحقبة الاولى والثالثة. تتميز بظهور اللبونات والطيور والانتشار الزحافات. راجع اياج ثانوي .

٨١٦٨ - **حِقْبَةُ رَابِعِيَّة**

(F). Ere quaternaire, Pléistocène (E). Quaternary era, Pleistocene

من الاحقاب الحصلية مركزها الساف الاخير من سلم الرصف الارضي لذلك فهي تأتي فوق الحقبة الثالثة. راجع اياج رابعي .

٨١٦٩ - **حُقَّة** (F). Scrobe

هما نقرتان في مقدم رأس الحشرة ترتكز عليهما الزباني .

٨١٧٠ - **حِقْط** (F). Sterne de Bergi (E). Swift tern

هو الحشرة السريعة ، اطلبها .

٨١٧١ - **حَقْطَبَة** (F). Cri du pterniste

اخقطة : صياح الحيقطان .

٨١٧٢ - **حَقْل ، حَقْلَة ، حَبْط** (F). Champ

(E). Ground

الحقل كلمة شائعة الاستعمال تعني التربة المزروعة. ج حقول. اما النبط لاصرية. ج غيطان || والحقله تستعمل للتخصيص فتقول حقله بندورة وحقله بطيخ . الخ

٨١٧٣ - **حَقْلُ اخْتِبَارَات**

(F). Champ d'expériences (E). Ground of experiments

ارض خصصت لاجراء الاختبارات الزراعية على اختلاف انواعها .

٨١٧٤ - **حَقْلُ تَجَارِب** (F). Champ d'essais

(E). Ground of essays

ارض خصصت لاجراء التجارب الزراعية المختلفة .

٨١٧٥ - **حَقْلِي ، رِيْفِي** (F). Champêtre

(E). Rural, Sylvan

نعت تمريني يطلق على كل ما له علاقة بالريف والحقل .

٨١٧٦ - **حَقْم** (F). Attagis

جلس طير من فصيلة التنبقيات . انواعه ثلاثة . شكله بين الحمام والحجل والحياري. جميعها صغيرة القد طولها براوح من ١٨ الى ٢٢ سم. ثوبها الى الصبغة الموشحة والموشمة بالاصفر والاسمر || قوتها الاعشاب والثمار والحبوب والحشرات . تألف الهضاب والسهول البرية . انها تدث في الارض بين الادغال والاعشاب ، تبيض من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع .

٨١٧٧ - **حَقْن** (F). Injection

هو ادخال سائل بالضغط في بعض نسيج الجسم .

٨١٥٣ - **حَقَّ الانْتِفَاع** (F). Usufruit (E). Usufruct

حق يبيع لصاحبه الانتفاع بملك الغير دون ان يغير من وضعه او يمس جوهره .

٨١٥٤ - **حَقَّ التَشْدِيد** (F). Servitude d'élagage

هو حق ارتفاع نحوه ان يكون على صاحب عقار مجاور ان يقطع اغصان الشجر التي تمتد من عقاره الى عقار جاره .

٨١٥٥ - **حَقَّ الرَفْض ، فَيْتو** (F). Veto

نظام يبيع لاحدى السلطات المختصة رفض الموافقة او المعارضة في قيام عمل ما || وحق الرفض يستعمل في الصيغ التالية : الرفض المطلق والرفض التشريعي والرفض الشبي والرفض المحدود .

٨١٥٦ - **حَقَّ الشَفْة** (F). Servitude d'abreufrage

هو ارتفاع الشفة ، اطلبه .

٨١٥٧ - **حَقَّ الشَفْعة** (F). Droit de préemption

هو الحق في تملك العقار المبيع على المشتري بالثمن الذي دفعه والرسوم والمصاريف. فرض الشفعة منع الضرر وهي لا تجوز الا في العقار . والذين لم هذا الحق اربعة : مالك الرقة والشريك بالمشاع وصاحب حق الانتفاع والجار المالك .

٨١٥٨ - **حَقَّ المَرْعَى**

(F). Servitude de pacage, Servitude de pâturage

هو ان يترك صاحب ارض مواشي غيره رعى في ارضه .

٨١٥٩ - **حَقَّ المُرُور** (F). Servitude de passage

هو ان يسمح صاحب الارض لجاره بالمرور في ارضه ماشيا او راكبا او مع بهائم الخ... وهو حق ارتفاع قانوني اذا كان الجار محصورا او اتفاقي فيما عدا ذلك .

٨١٦٠ - **حَقَّ المَسِيل**

(F). Servitude d'écoulement des eaux

هو حق يلزم صاحب عقار منخفض ان يسمح لصاحب عقار مرتفع ان يسيل منه الماء في عقاره || وهو حق ارتفاع طبيعي لمياه المطر ولكنه قانوني يقتضي تعويضا لصاحب العقار المرتفع به اذا كانت المياه السائلة مياه صرف او تجفيف .

٨١٦١ - **حَقَّ بُوْغِي** (F). Zoosporange

هو وعاء البوغ المهدب المتحرك . (E). Zoosporangium

٨١٦٢ - **حَقَّ مُرُور المِيَاه** (F). Servitude d'aqueduc

هو حق ارتفاع يلزم صاحب عقار ان يحتمل مرور المياه في عقاره الى عقار آخر بواسطة مجرى او قناة الا انه يقتضي تعويضا لصاحب العقار المرتفع به .

٨١٦٣ - **حِقْبَة** (F). Période (E). Period

مدة من الدهر طويلة الامد .

٨١٦٤ - **حِقْبَة الجَلِيد ، حِقْبَة السَقِيْط** ،

(F). Glaciale (E). Ice age

جزء من الاباج الحديث يتميز بوزارة الجليد وكثرة انتشاره .


٨١٦٥ - **حِقْبَة اَوَّلِيَّة** (F). Ere primaire

(E). Primary era

من الاحقاب الحصلية وهي الارضين الاصلية مركزها



حق بوغي



حقم

٨١٨٧ - حك* ، بوضلة ، حكة

Boussole (F). Compass (E).

يقال ان الصليبيين هم اول من استخدم الحك البحري . والحك او البوضلة او الابرة المغنطيسية جهاز يستخدم لتعيين الجهات الاصلية . وهو مركب من ابرة يشير طرفها الممغنط الى الشمال المغنطيسي وهذه الابرة ترتكز على حائق وتتحرك في مستوى افقي حول محور رأسي مثبت في وسط قرص شصدي الانقسام يحوي ٣٢ اتجاهًا .

٨١٨٨ - حكاء الحكاء : ذكر الخناثس .

٨١٨٩ - حكاة* ، حكاة ، حكاة

Mabouya, Mabuia

جنس عفاء من فصيلة السقنقوريات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ . اعطانها البلاد الحارة والاستوائية جميعها صغيرة القد مستطيلة الذنب . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الاسفع الموج . ظهورها خماسية او ثلاثية الخطوط السود القاطبة وبعضها مزقوش بالاسود والاصفر .

٨١٩٠ - حكاة منمشة* ، مبيوة منقطة

Mabuya punctata (S). Mabouya ponctué, Mabuia ponctué (F). Stopped mabuya (E).

حيوان بيوض من العفاء وفصيلة السقنقوريات قابعات الاسنان مكنتيات الالسة ، رباعيات القوائم ، لحاسيات الاصابع . ذكورها اصفر قدأ من افانها || جسمها متوسط القد يطول من ٢٧ الى ٣٠ سم . رأسها مخروطي الشوزن . عينها لوزيتان صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . اذناها غافقتا الغشاء الصيواني . لسانها جزل الطرف ، مشعل الصفحة . عنقها قصيرة وثخينة . ظهرها متتابع الثعالب الدقيقة . بطنها مائل المدب . ذنها مستطيل ، مستدق الطرف . ثوبها الى الخضار الاغبس الاسفع الموج تملوه خسة خطوط قاطبة منمشة بالاسود والاصفر || بيائها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر . الانثى تبيض من ٦ الى ١٢ بيضة تطمرها في التربة على عمق ٤ او ٥ سم . || تألف الاماكن البعيدة عن العمران . تسرح في النهار . جحرها نفق مستطيل تخلده بين جذور النبات او تحت الحجارة || قوتها الحشرات والديدان والعقارب والعناكب والذباب || تعتبر من الزحافات المفيدة .

٨١٩١ - حكاة* ، Progenèse (F). Progenesis (E).

الحكاة مجموعة المناشح التي تحضر نمو الكائن الحي .

٨١٩٢ - حكاشة* ، Sombresox (S).

Sombrosoce (F). Saury (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الحكاشيات . انواعها المعروفة خمسة . اعطانها بحار ورزان البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها سنانية الشكل تطول من ٤٠ الى ١٤٠ سم . وهي قريبة الشبه بالحرمان . رؤوسها اسفينية . مقاطعها ذلقة مستدقة الاطراف الطويلة . اثوابها الى الخضار الاسمر يبق وتشتد سمرة في القسم الاعلى من الجانبين والظهر || لحوبها مأكولة ، متوسطة الصنف . أشهر انواعها حكاشة المتوسط .

٨١٩٣ - حكاشة المتوسط* ، Sombresox

Rondeletti (S). Sombrosoce de Rondelet, S. de la Méditerranée (F). Mediterranean Saury (E).

نوع من الحكاش ، سمكة بحرية بيوض . اعطانها معظم

Rein (F). Kidney (E).

٨١٧٨ - حقو

اطلب كلوة .

٨١٧٩ - حقو متاخمة الطريق العام

Aisances de voirie (F). Easiness of roads (E).

حقو يكتسبها كل من كانت املاكه قائمة على الطريق العام كحق المرور وتصريف المياه . الخ

٨١٨٠ - حقيلة* ، Rosularia (S).

Rosulaire (F). Rosularia (E).

جنس نباتات لحمية معمرة من فصيلة الخلدات . منبتها بعض اقاليم الشرق الادنى . انواعها عديدة جميعها صغيرة القد . اوراقها ضمية التجميع . اوراقها منبسطة ، مسوامة النصل الخلمي الصفحة العليا المشعلة . شماريخها الزهرية نحيلة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها مختلفة الالوان . اعرف انواعها واشهرها التالية .

٨١٨١ - حقيلة باهية* ، Rosularia pallida (S).

Rosulaire pâle (F).

نوع من الحقيلة . منبتها الشرق الادنى . شماريخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها منبسطة ، مقطومة الاطراف ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٨ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون الباهت ، مسنة البتلات المندغمة في زاميا الاول والثاني . تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٨١٨٢ - حقيلة حندقية* ، Rosularia alzoon (S).

Rosulaire alzoon (F).

نوع من الحقيلة . منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى . شماريخها شديد القصر يعلو نحو ٥ سم . اوراقها منبسطة تطول نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، صفراء اللون . بتلاتها مندغمة في ثلثها الاول ، مهذبة الاكطار || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

٨١٨٣ - حقيلة لبنانية* ، Rosularia libanotica (S).

Rosulaire libanaise (F).

نوع من الحقيلة . منبتها جبال لبنان وسورية وفلسطين . شماريخها يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم . اوراقها شبه قلبية الشكل ، تطول نحو ٣ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها حمراء اللون ، كثيرة العدد ، صغيرة القد || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز .

٨١٨٤ - حقيلة مسكنة* ، Rosularia serrata (S).

Rosulaire dentelee (F).


نوع من الحقيلة . منبتها بعض اقاليم الشرق الادنى . شماريخها يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقها صغيرة مسنة الختار ، تسنيها غصروفي المادة . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها حمراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

٨١٨٥ - حقيم

مزخر العين عما يلي الصدغ وهما حقيمان .

٨١٨٦ - حك* ، Boussole (F). Compass, Pixis (E).

الحك كوكبة نجوم جنوبية الموضع مركزها فوق السفينة بالقرب من برج الجدي || عدد نجومها ١٤ .



حك



حكاة



حكاة منمشة

٨٢٠٣ - حَكَمِي، فِيزِي Physique (F).
Physical (E).
نعت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالمادة ..

٨٢٠٤ - حَكُوف Désactivation (F).
Disactivation (E).
الاسترخاء في العمل .

٨٢٠٥ - حَلّ Solution
الحل هو نهاية معضلة علمية او الجواب على مشكلة رياضية او مسألة حسابية ...

٨٢٠٦ - حَلّ Huile de sésame (F). Sesame-oil (E).
الحل هو سليلط السمسم اي دهنه او زيتة ويسمى السرج والشيرج .

٨٢٠٧ - حَلَّاق Eréthisme charnel (F).
Sensual arethlism (E).
الحلاق علة تصيب الانثى فتجعلها لا تشبع من المباشمة .

٨٢٠٨ - حَلَّال ، حَلَّال Scirpus (S). Scirpe (F).
Buirush (E). Simse, Binse (D). Scirpo (I).
جنس نباتات حولية وبحولة ومعيرة من فصيلة السعدنيات .
انواعه نحو ١٠٠ جميعها من نباتات المواقع الرطبة او المنقعية . اوراقها ليفية متينة تستعمل في عدة صناعات .
اشهر انواعها حلال الحصر .

٨٢٠٩ - حَلَّال الحَصْر ، دَيْس الحَصْر Scirpus lacustris, Scirpus acutus (S). Scirpe des lacs,
Jonc des chaisiers, Jonc des tonneliers (F). Pool-rush
Lake club-rush (E). Teichsimes (D). Scirpo degli
stagni, Gincco di padule, Nocco (I).

اشهر انواع الحلال وهو من النباتات المنقعية المعيرة .
اوراقه تستعمل في حياكة وحبك وجدل عدة صناعات قشية . وهو ايضا من النباتات الطيبة الحامزة والمذرة للبول .

٨٢١٠ - حَلَّالَة ، مِرْدَن Dévidoir (F).
Reel, Skein-winder (E).
جهاز خاص بتوضيب الخيوط وجمعها .

٨٢١١ - حَلَّام ، حُلَّان
الجلدي الذي يؤخذ من بطن امه حياً فيذبح لفروته .

٨٢١٢ - حَلَب Traite (F). Milking (E).
هو الاختلاب ، راجعه .

٨٢١٣ - حَلَب الحلب نبت ينبت في القبط بالقيمان وشطآن الاودية ويلزق بالارض حتى يكاد يسوخ وانما يأكله الشاء والظباء ويدبغ به (عن ابي حنيفة) .

٨٢١٤ - حَلَبَاب Latex
عصارة لبنة لزجة تفرزها قني بعض النباتات .

٨٢١٥ - حَلَبَاب الحَس Lactucarium
عصارة لبنة تستخرج من الحس . اخصها الحس الجبار . وهي كثيرة الاستعمال تعتبر من المسكنات وقدر البول .

٨٢١٦ - حَلْبَابِي Laiteux (F). Lacteous (E).
ما كانت ميوخته شبيهة باللبن .

اقاليم البحر الابيض المتوسط . مسرحها المجادح والرزان .
قوتها النباتات البحرية والرخويات تجناس الاسمال والاورحال
في طلبها || جسمها مستطيل الشكل يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم .
حراشغها معتدلة الحجم . ثوبها الى الخضار البحري يعلوه موج فضي وشحة حنطية متفاوتة الماحات
بين الظهر والايطلين والبطن . رأسها مستدق الخطم الطويل .
فكها مستطيلان ، العلوي اقصر من السفلي واضيق منه .
اسنانها شديدة الصغر . منسها ثنائيا الثقوب . عيناها
كبيرتان ناشرتان || زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية
متأخرة الارتكاز . الشرجية تقابل الظهرية ، الذيلية
فاوقة || وتتميز بمجموعة من الزعنفيات المزوانية الشكل
تقوم على الذنب ، ست منها تتمركز بين الظهرية والذيلية
وسبع منها تتمركز بين الشرجية والذيلية || تصاد في الليل
على ضوء الفانوس . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٨١٩٤ - حَكَاشِيَّات Scombrsocioide (S).
Scombrsocioidés (F). Scombrsocioide (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانات . اجناسها قليلة
العدد اشهرها الحكاش والخرمان والقنبرور . مسرحها
الاغواط والمجادح والشطوط || اسماكها تتميز باستطالة
الاغطام والاشداق التي تبدو كالمناقيد . جميعها لاحمة وعاشبة
وتجتاس الوحول في طلب الرخويات || سرها مفشي بالياف
دايقة تمكث من الالتصاق بالنباتات البحرية ، اخصها
الحث ، حق النقف .

٨١٩٥ - حَكَّاك ، حَكَّة ، هَكَم Acariasis (S). Acariose (F). Acariasis, Acarus (E).
مرض جلدي سببه بعض القراد .

٨١٩٦ - حَكْر Hekr
الحكر هو آيجار الى امد طويل يبيع للمستأجر الانتفاع
بالعقار مقابل اجرة سنوية او بالمقاسطة .

٨١٩٧ - حَكْر حَكَم Emphyccéose (F).
Long lease conferring right of mortgage (E).
هو عقد ايجار لمدة لا تقل عن ثمانى عشرة سنة ولا تزيد
على تسع وتسعين لقاء اجرة سنوية ثابتة . وهذا العقد
يحول المستأجر حق الانتفاع العمي المقدور التحويل
والحجز والرهن .


٨١٩٨ - حَكْل الهوام لا صوت لها من اي نوع كانت .

٨١٩٩ - حَكَم Arbitre (F). Arbitrator (E).
هو من تسوى المنازعة على يده .


٨٢٠٠ - حَكَم Jugement (F). Judgement (E).
هو المحرر الذي يشتمل على ما تقرره المحكمة مع ذكر
هيتها .

٨٢٠١ - حَكَم إسْتِنْفَانِي Arrêt (F). Arrest (E).
هو الحكم الصادر عن محكمة استئناف .

٨٢٠٢ - حَكَمَة Anneau nasal (F).
الحكمة حديدة مستديرة يخطم بها أنف الحصان والثور
والبعير وتدعى برة وخطام .



حَكَاشَة الْمُتَوَسِّط



حَكَمَة



حَلَّال الحَصْر

٨٢٢٤ - حَلَبْلَابُ مُخَشَّوْشِب ، أَذُنُ الْأَرْتَب

Bupleurum fruticosum (S). Buplèvre ligneux, Oreille de lièvre (F).

جنية تزيينية تعلو من متر الى مترين . فروصها حمر . أوراقها مستطيلة شبه لاطئة طولها نحو ٨ سم . وعرضها ٢ . نصلها اخضر الصفحة العليلة ، بحري السفلى . عديد المروق والشرايين . ازهارها متتابعة الرصف كثيرة الصفوف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول .

٨٢٢٥ - حَلَبْلَابُ مُسْتَدِيرُ الْوَرَق ، ثاقِب الْوَرَق

Bupleurum rotundifolium (S). Buplèvre à feuilles rondes, Perce-feuille (F). Thorow-wax (E). Hofenohrchen (D). Bupleuro (I).

نبات طبي بري معمر يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقه مستديرة الشكل شبه حاضفة . قابضة للامعاء . يقال انه يفيد الصدر والسعال وانه من اجل المشروبات اذا مزج بالعسل .

٨٢٢٦ - حَلَبُوبُ* ، عَصَا هِرْمِس ، حَرَبِق ، حَشِيْشَةُ الزَنْبَق

Mercurialis (S). Mercuriale (F). Mercury (E). Merkurkraut (D). Mercarella, Mercuriale (I).

جنس نباتات عشبية طيبة برية من فصيلة السوسيات . انواعه خمسة اشهرها الحلوب الحولي الذي يكثر في الاراضي المزروعة والحلوب المعمر الذي يوجد في الوعر والجبال . كانا يستعملان في الطب القديم مدرين للبول والطمث . اما الانواع الاخرى فسامية ومهم من وصفها كطاردة للديدان .

٨٢٢٧ - حَلَبِيْشَا

Esule ronde (F). Purple spurge (E).

هي الفرخ نبات من القريون ، اطلبه .

٨٢٢٨ - حَلَّة

Indigotier (F). Indigo plant (E).

عشبة تعرف بالنيل وهي شاكه تنبت برياً في غلط الارض . قال بعضهم :

٨٢٢٩ - حَلْبِيْت ، حَلْبِيْت

Asa foetida (F).

الحلتيت هو صمغ الانجذان لونه الى الجفوة ، كريبه الرائحة والطعم ، مر المذاق حار لاسع . يستعمل لتسكين القشنجات ومنهم من استعمله استعمال البهارات لانه هاضم ويولد الكثير من الحرارة التي تنفي الجسم عن احتراق هيدرات الكربون . كما يمنع الانتفاخ ويطرد الدود ويدبر الطمث . وهو شائع الاستعمال في الطب البيطري .

٨٢٣٠ - حَلْبِيْث

Férule (F). Ferula (E).

نبات بري طبي يعرف بالانجذان ، اطلبه .

٨٢٣١ - حَلَج

حلج الديك : نشر جناحيه وسمى الى انشاء يسفدها .

٨٢٣٢ - حَلَج

Egrainer, Egraner (F).

To unstring (E).

حلج القطن : نذنه حتى يخلص الحب منه فهو حلج والقطن حلج ومخلوج .

٨٢٣٣ - حَلَج

Egrainage (F). Picking off (E).

هو ندف القطن لاستخلاص حبه .

٨٢١٧ - حَلَبَان*

Rhynchospora (F).

Rhynchospora (E).

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة السعديات انواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في جميع المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || سوقها فرعاء يغلب فيها الامتداد الافقي . أوراقها متعاقبة ، عسقية ، ميزابية النصل . ازهارها سنبل التجميع || يكثر وجودها في المواقع الرطبة . وهي من النباتات الضارة العديمة النفع .

٨٢١٨ - حَلْبَة ، أَعْثُون ، غَارِيْقَا

Trigonella (S). Trigonelle (F). Trigonella (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية علفية من فصيلة القرنيات الفرشية . انواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي ، جميعها قريب الشبه من النفل والحدقوق . والحلبة مقوية للمعدة وللأعصاب تفيد الزلات الصدرية كالسعال وضيق التنفس والربو . اما زيتها فيستعمل بشكل خلاصة طيبة لنمو الثديين وتقوية غددهما . حبا يحوي نحو ٣٠٪ من المواد الزلالية و ٧٪ من المواد الزيتية مما يجعلها تفيد الدرع عند المرضع || ورقها وحبا يحويان ايضاً ، على نسب متفاوتة ، فيتامين ا و ب و ث و د . ومادتين قلويتين الكولين (Choline) والحليين (Trigonelline) . اشهر انواعها الحلبة الرومية والزرقاء والقرنية .

٨٢١٩ - حَلْبَة رُومِيَّة* ، حَلْبَة مَزْرُوعَة ، فَرِيْقَة

Trigonella foenum-graecum (S). Fénugrec, Sene-grain (F). Fenugreek (E). Griechisches bockshorn (D). Trigonella, Fieno greco (I).

نوع من الحلبة الزراعية التي تمتلئها المواشي وتسمن عليها . منافعها الصحية عديدة . أوراقها متعاقبة معنقة مركبة . ازهارها ابطية فردية . ثمارها قرون اسطوانية الشكل مستطيلة تحضن من ٨ الى ١٠ حبات .

٨٢٢٠ - حَلْبَة زَرْقَاء*

Trigonella caerulea (S). Trigonelle bleue, Lotier odorant (F). Sweet trefoil (E). Blauer klee, Käse-teinklee (D). Trifoglio muschiato, Loto odoroso (I).

نوع من الحلبة الزراعية التزيينية . ازهارها فواحة العبير المستحب يستخرج منها بالتقطير دهن ذكي الريح يستعمل في اكثر المستحضرات العطرية .

٨٢٢١ - حَلْبَة قَرْيَّة* ، ذُرَق

Trigonella corniculata (S). Trigonelle cornue, Lotier sauvage, Trèfle sauvage (F). Wild trefoil (E). Wilder klee (D). Trifoglio salvatico (I).

نوع من الحلبة البرية يكثر في المراعي وفي الارض البور تمتلئها الماشية فيسمونها ويحسن درها .

٨٢٢٢ - حَلَبْلَابُ* ، صِلْعُ الْبَقَرَة

Bupleurum (S). Buplèvre (F). Hare's-ear (E).


جنس نباتات عشبية وجنية برية وتزيينية من فصيلة الخيميات . سوقها مرطاء . أوراقها عروية متعاقبة : ازهارها صفر . ازهارها صيواني مركب . اشهر انواعها ما يتبع :


٨٢٢٣ - حَلَبْلَابُ لَيْفِي

Bupleurum frutescens (S).

Buplèvre sous-ligneux (F).

جنية ليفية تزيينية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . فروصها مضلعة الزوايا . أوراقها مخززية جامدة النصل ، خماسية او سباعية المروق . ازهارها متتابعة الرصف || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .





حَلَب



حَلْحَل أَزَب



حَلْحَل جَبِيل



حَلْحَل عَنقُودِي



حَلَزُون

٨٢٤٠ - حَلْحَلَة

Percolation

مقدار الماء الذي يتسرب إلى جوف الأرض في مساحة معينة .

٨٢٤١ - حَلَزُونَة * ، زَنْبَق عَنكَبُوتِي ، نَرْجِس

Pancratium (S).

Pancratier, Pancratie, Pancrace (F). Spider lily, Pancratium, Daffodil (E). Schwefelenlilie, Machtblume (D). Scilla bianca, Pancrazio (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . أنواعه المعروفة ١٢ معظمها بري ، منبتها البلاد الحارة والمعتدلة . أوراقها لاطئة ، قوية النصل . أزهارها كبيرة القند ، بوقية الشكل ، بيضاء اللون ، عطرية العرف . بتلاتها ضيقة ، مستطيلة ، منتصبه ، ترتكز على الإطار التاجي حامل الاسدية || أشهر أنواعه الزيبيلة ما يلي .

٨٢٤٢ - حَلَزُونَة بَحْرِيَّة

Pancratium maritimum (S). Pancratier maritime (F).

نوع من الحلة . أوراقها بحرية النصل تطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض من ١٠ إلى ٢٠ سم . || شراخها يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . يحمل من ٣ إلى ١٥ زهرة تطول من ١٠ إلى ١٥ سم . بتلاتها خيطية مدببة . أطارها التاجي مسنن الحافة || ترغب في الشواطئ البحرية والمواقع القليلة الارتفاع || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول .

٨٢٤٣ - حَلَزُونَة تَجْمِيَّة

Pancratium illyricum (S).

Pancratier étoilé (F).

نوع من الحلة . أوراقها بحرية النصل تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض من ١٥ إلى ٣٠ سم . || شراخها يعلو من ٤٠ إلى ٦٠ سم . يحمل من ٦ إلى ١٥ زهرة تطول من ٦ إلى ٨ سم . بتلاتها مدببة . أطارها التاجي سداسي الانقسام ثنائي التفريض المخززي || أزهارها يستمر من نيسان إلى حزيران .

٨٢٤٤ - حَلَزُون

Helix (S).

Escargot, Colimaçon, Limaçon (F). Helix, Snail (E). Schnecke (D).

ومنهم من دعاه القوقع . جنس حيوانات من الرخويات الممديات التي تعيش في صدفة . أنواعه عديدة جميعها مؤذية قوتها تختلف المواد النباتية . منها أنواع مأكولة تجمع وترعى في هذا السبيل || والحلزون يعيش نحو ٢٠ سنة وهو حيوان خشنوي يحمل الأعضاء الذكرية والانثوية لذلك فهو تارة ذكراً ويفعل فعله في كوم الانثى وتارة أنثى ويفعل فعلها فيبيض بعد الكوم بأسبوعين نحو ٥٠ بيضة . لونها إلى البياض الخزي ، يجعلها بين الصخور وتحت الحجارة وفي التربة فتنتفخ بعد وضعها بنحو ٢٥ يوماً || أشهر أنواعه المأكولة والصالحة للتربية ما يتبع .

٨٢٤٥ - حَلَزُون أَسْوَد الفم

Helix menalostoma (S).

Escargot à bouche noire (F).

نوع من الحلزون متوسط القند مبتدل يكثر في المناطق الحارة . لونه امغر عابق يعلو ناذير حنطي منتظم . صفه من حيث الجودة والطعم يأتي في المرتبة الثالثة .

٨٢٣٤ - حَلْحَل ، بُلْبُوس

Muscari

جنس نباتات بصلية عشية برية وزراعية من فصيلة الزنبقيات . أنواعه نحو ٤٠ جميعها صغيرة القند . أوراقها قرصية ، عصفية الشكل ، لحمية النصل . أزهارها إجمانية أو جملجية الشكل يحملها شراخ اجوف || أشهرها وأغربها الحلال الأزب والجبل والصيني والعنقودي والمسكي والاناصولي .

٨٢٣٥ - حَلْحَل أَزَب * ، بُلْبُوس الكَلْب

بَصَل الدَثَب

Muscari comosum (S). Muscari chevelu, M. à toupet, Vaclet (F). Fair-haired hyacinth, Tassel hyacinth (E). Schopfmusk (D). Muscari, Cipolla canina, Giasinto mostruoso (I).

نوع من الحلال يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقه عصفية طويلاً يراوح من ٣٠ إلى ٤٠ سم . عرضها ٢ سم . نصلها قدي الشكل مسنن الحافة أزهاره عنقود مستطيلة يراوح طويلاً من ١٥ إلى ٣٠ سم . يعلوها ضمة من الأزهار العقيمة البفسجية اللون || أزهاره يستمر من نيسان إلى تموز .

٨٢٣٦ - حَلْحَل أَنَاصُولِي

Muscari aucheri (S).

Muscari d'Aucher, M. d'Anatolie (F).

نوع من الحلال يعلو نحو ١٢ سم . أوراقه عصفية طويلاً من ٥ إلى ٨ سم . وعرضها من ٦ إلى ٨ مم . أزهاره صغيرة القند عنقودية التجميع لا عرف لها . زرقاء اللون أو بيضاء || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان .

٨٢٣٧ - حَلْحَل جَبِيل * ، بَصَل الزَيْز ، قَيْسَامَة

Muscari botryoïdes (S). Muscari botryoïde (F). Grape hyacinth (E). Kleiner musk (D). Muschini, Pentolini (I).

نوع من الحلال يعلو من ١٠ إلى ٣٠ سم . أوراقه عصفية ، منتصبه ، مخددة ، جامدة النصل البحري اللون . أزهاره كثيفة ، عنقودية التجميع ، هرمية الشكل . ضرابه عديدة منها الأزرق والليلكي والايض || أزهاره يستمر من آذار إلى أيار .

٨٢٣٨ - حَلْحَل عَنقُودِي * ، بُلْبُوس أَزْرَق

Muscari racemosum (S). Muscari à grappe (F). Clustered grape hyacinth, Strach hyacinth (E). Grosser musk (D). Muschino, Cipolla di serpe (I).

نوع من الحلال يعلو من ١٥ إلى ٢٥ سم . أوراقه عصفية أفقية الانتشاب ، مثالية الاطراف ، ضيقة النصل عرضه يراوح من ٢ إلى ٣ مم . || أزهاره كبيرة القند زرقاء اللون العابق ، رائحتها رائحة الخوخ الناضج || أزهاره يستمر من آذار إلى أيار .

٨٢٣٩ - حَلْحَل مَسْكِي ، بُلْبُوس مَسْكِي

بَصَل المَسْك

Muscari muscarini, M. moschatum M. macrocarpum (S). Muscari musqué, Jacinthe musquée (F).

نوع من الحلال يعلو من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أوراقه عصفية مستطيلة ضيقة النصل الجليل الخضار الزاهي . أزهاره عنقودي التجميع يفي الشكل . أزهاره أرجوانية ثم تنحرف إلى الصفار الأخضر . عرفها عطري فواح . رائحتها رائحة المسك .

اسلية الشكل . زياہ النصل ، متصبية الزغب الجامد .
عشكوله الزهري باهت اللون الاخضر .

٨٢٥٨ - حَلَفَاء رِيَشِيَّة Stypa pennata (S).
Stype mediterranéenne, Plumet, Herbe aux plu-
mets (F). Feather grass, Stipa (E). Federpfriemgras,
Pfriemengras (D). Sparto pennato, Pennine
paradise (I).

نوع من الحلفاء يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه
مستطيلة الزغب الناعم الكثيف الذي يبدو كالريش .
عشكوله الزهري جميل الشكل سنبلاته تطول من ٤ الى
١٠ سم .

٨٢٥٩ - حَلَفَاء شَعْرَاء Stypa capillata (S).
Stype chevelue (F).

نوع من الحلفاء يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه تطول
من ٨ الى ٣٠ سم. لونها الى الاخضر العابق يعلو موج
ازرق || عشكوله الزهري اشعر السنبلات الحنطية
اللون . ينمو في جميع المناطق المعتدلة المناخ يرغب في
الارربة الفقيرة .

٨٢٦٠ - حَلَفَاء فِضِيَّة Stypa calamagrostis (S).
Stype argentée, Faux calamagrostis (F).
نوع من الحلفاء . يعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم. اوراقه زياہ
النصل دقيقة وقصيرة التسنين . عشكوله الزهري فضي
اللون ينمو في الجبال والارربة الجصية .

٨٢٦١ - حَلَفَاء لَازِبَة Stypa tenacissima (S).
Alfa, Sparte, Stype tenace (F). Alfa grass, Esparto
grass (E). Espartopfriemengras, Spartogras (D).
Stipa, Sparto, Giunco di Spagna (I).
نوع من الحلفاء . يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه
ملساء البشرة . عشكوله الزهري اصفر اللون كثيف
التجميع والرصف يبدو كالسنبل طوله من ١٨ الى ٣٠ سم.
ينمو في الاراضي القاحلة يكثر وجوده في شمالي افريقية
وفي اسبانيا .

٨٢٦٢ - حَلَفَاء مَكَرْدَة Stypa gigantea (S).
Stype géante (F).
نوع من الحلفاء يعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه
تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. عشكوله الزهري بيضي
الشكل يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم. سنبلاته زياہ
البشرة لونها الى الاخضر الزاهي .

٨٢٦٣ - حَلَق ، حُلُقُوم ، حَنْجُرَة Gorge, Gosler (F). Throat, Gullet (E).
هو مساع الطعام والشراب في المريء . ج أحلاق وحلوق
وحلاقيم وحناجر .

٨٢٦٤ - حَلَق الحلق : شجر الكرم يجعل مأواه في العصفر فيكون
اجود من ماء الزمان (اقرب الموارد) .

٨٢٦٥ - حَلَق ، حَيْجَل ، دُورِين Dourine
داء معد يصيب الخيل والحصير سببه دودة ثعبانية من
القيميات تعيش في الدم قوتها الكبرويات الحمر .

٨٢٦٦ - حُلُقُوم هو الحلق ، اطلبه .

٨٢٤٦ - حَلَزُونُ أَشْهَب * Helix aspersa (S).
Escargot chagriné, Cagouille, Huma, Tapada, Petit
gris (F). Common snail, Speckled snail (E). Kel-
lerschnecke (D).

نوع من الحلزون لونه الى الريدة ، متوسط القد ، سريع
النمو يأتي بعد الحلزون الكرعي من حيث جودة الصنف .
يكثر وجوده في الاراضي البور .

٨٢٤٧ - حَلَزُونُ أَطْحَل Helix aperta (S).
Escargot naticoide (F).
حلزون كبير القد ، اطحل اللون يكثر في الاراضي الجبلية
الصخرية . يعتبر من الاصناف الجيدة التي تعادل
الحلزون الكرعي . تربيته سهلة لكنه قليل النتاج .

٨٢٤٨ - حَلَزُونُ بُسْتَانِي Helix hortensis (S).
Escargot des jardins (F). Garden snail (E).
Hainschnecke (D).
نوع من الحلزون متوسط القد . لونه الى الاصفر الليموني
المؤذر بالاسود . يأتي في المرتبة الثالثة من حيث جودة
الصنف لكنه سهل التربية وكثير النتاج .

٨٢٤٩ - حَلَزُونُ كَرْمِي * Helix pomatia (S).
Escargot vigneron, E. de vigne (F). Grapvine
snail (E). Weinbergschnecke (D).
اجود انواع الحلزون والذها طعماً واكبرها قدماً . لونه الى
الصهبة الصفراء تنحرف مع العمر الى البياض . يكثر
في الكروم والمراعي والغابات .

٨٢٥٠ - حَلَزُونُ بَحْرِي Hallotide (F).
Sea-ear, Ear-shell (E).
راجع اذن البحر .

٨٢٥١ - حَلَزُونِي ، لَوْتِسِي Spiral
لمت تعريفي يطلق على ما هو حلزوني الشكل .

٨٢٥٢ - حَلَزُونِيَّات Helicidae (S).
Hélicidés (F). Helicidae (E).
فصيلة حيوانية من الرخويات المعدية الرئوية . اجناسها
وانواعها عديدة تتميز بخشواتها الطليقة وبدروعها الصدفية
المختلفة الاشكال والاحجام والالوان .

٨٢٥٣ - حَلَزُونِيَّاتُ الْبَحْرِ Hallotidés (F).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مشهورة باسم آذان
البحر ، اطلبها .

٨٢٥٤ - حَلَزُونِيَّة Spirille (F). Spirillum (E).
هي المتسجعة ، اطلبها .

٨٢٥٥ - حَلَس Brun-rouge (F). Red brown (E).
الحلس : ما كان لونه بين السرة والحمرة .

٨٢٥٦ - حَلَفَاء * ، حَلَفَة ، حَلَفَة Stypa (S). Stype, Stipe (F). Stypa (E).
الحلفاء جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة
النجيليات . انواعها عديدة . اوراقها مستطيلة خيطية او
اسلية النصل يلتف بعضها على بعض تصلع لصناعة
الحصر والقنف والحبال . اشهر انواعها ما يلي :

٨٢٥٧ - حَلَفَاء أُسْكِيَّة Stypa juncea (S).
Stype jonciforme (F).
نوع من الحلفاء يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه



حلزون أشهب



حلزون اطحل



حلزون كرعي



حلفاء

٨٢٨٢ - حُلُوس * ، حَوْنَس *

Cyclanthera edulis (S).

Cyclanthere comestible (F).

نبات عشبي حولي عارض من فصيلة القرعيات . مهدد بعض مناطق امريكا الجنوبية . ساقه تطول نحو خمسة امتار . حوائقها لامشعبة . اوراقها معتمة ، خماسية او سباعية الفصوص السنانية الشكل . نصالها مسننة الحثار ، مبعثرة الزغب . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون خضراء المواج . ثماره مستطيلة ، شبه بيضبة الشكل لونها الى الخضار البحري ، طعمها كالخيار تؤكل طازجة وتخلل .



حلوة

٨٢٨٣ - حُلُوسِيَا

Adragant (F).

Gum-tragacanth plant (E).

٨٢٨٤ - حُلُوف

Potamochoerus, Choeropotamus (S).

Potamochère, Chéropotame (F). River hog (E).

جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات أنواعه خمسة موطنها البلاد الافريقية ومدغسكر . رؤوسها مخروطية تتميز بمجموعة من التلاليل تعلو فئاطيسها المستطيلة . اذانها منتصبة ذلقة ، جلودها كثيفة الهلب القصير . عفارها تبنية اللون طويلة الهلب تمتد من القف من اخر ثنيج الظهر . اذانها اصغر حجماً من ذكورها وهي تحمل اربعة اظباء بدلاً من ١٤ كما هو في الخنزير . حملها يدوم اربعة اشهر وتضع اربعة خنايص || اعرف انواعه الثلاثة التالية .



حلوس

٨٢٨٥ - حُلُوف اِفْرِيقِي


Potamochoerus africanus, Choeropotamus larvatus (S). Potamochère africain (F).

نوع من الحلوف موطنه افريقية الشرقية والغربية . جسمه كبير القد طوله نحو ١٦٠ سم . علوه ١٠٠ وذنبه ٤٠ سم . ثوبه الى السمرة . عفرته وخصلته حنكه تبنيتان || يألف المناطق والمقاصب والاراضي المزدرة . قوته الجذور والثمار والحبوب . يعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٠٠ .

٨٢٨٦ - حُلُوف غِينِيَّة *

Potamochoerus penicillatus (S). Potamochère de la Guinée, Potamochère à pinceaux (F).

نوع من الحلوف موطنه غينية والسنغال والكنغو ... جسمه كبير القد طوله نحو ١٨٠ سم . علوه ١٢٠ وذنبه ٤٠ ثوبه الى الصهبة عفرته وخصل حنكه واذنائه وذنبه الى البياض || يألف المناطق وضفاف الانهر والاحراج الرطبة . قوته الجذور والثمار والحبوب . يعيش جماعات كبيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ٢٠٠ .



حلوف غينية

٨٢٨٧ - حُلُوف مَدَغَسْكَر *

Potamochoerus Edwardsii (S). Potamochère d'Edwards (F).

نوع من الحلوف موطنه مدغسكر . جسمه متوسط القد طوله نحو ١٢٠ سم . علوه ٨٠ وذنبه ٣٠ . ثوبه مختلف الالوان ، ظهره قرني ، عفرته بيضاء . بطنه اسمر . محسراه وقوائمه سود ، اذناه خالية من الخصل || يعيش جماعات متوسطة العدد قوته الجذور والثمار والحبوب .

٨٢٨٨ - حُلُوق

Cisse (F). Sorrel-vine (E).

هو السلق نبات عارض من الكرميات .

٨٢٨٩ - حُلُول

Dialyse (F). Dialysis (E).

هو الميز تعبير كهاوي قوامه تقريق المواد البلورية

٨٢٩٧ - حُلُقُومِي ، بُلُقُومِي

Pharyngien (F).

Pharyngeal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالحلقوم .

٨٢٩٨ - حُلُقُومِي القَم

Cricostome (F).

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان مستدير القم .

٨٢٩٩ - حُلُقُومِيَّات

Annélidés (F). Annelida (E).

صف من الديدان عديد الفصائل والاجناس والانواع تجمعها بعض الرتب الى طائفتين الحفرديات والعلقيات .

٨٢٧٠ - حُلُقُومِيَّات الأفْوَاه ، مَصَّات

Cyclostome (F). Cyclostomata (E).

رتبة من الاسماك الضروفية وهي اذانها واليها تنسب الجلكيات والحطاطيات .

٨٢٧١ - حُلُقُومِيَّة

Annelide (F). Annelid (E).

مرتبة من رتبة العظائيات فصائلها واجناسها عديدة معظمها يعيش في التربة كالحراطين وما اشبه .

٨٢٧٢ - حُلُكَة * ، حُلُكَاء ، حُلُكِي ، حُلُكَاء ، حُلُكَاة

Chalcide

دويبة شبيهة بالعظاية زرقاء اللون تترك وليس لها ذنب طويل وقوائمها خفيفة تنعوص في الرمل . وهي من فصيلة السقشوريات .

٨٢٧٣ - حُلِّل

Décomposer (F). To decompose (E).

٨٢٧٤ - حُلْم

Tiques (F). Ticks (E).

الحلم هي القردان الصغيرة وقيل الضخمة . واحدها حلمة .

٨٢٧٥ - حُلْمَة

Trayon (F). Dug, Teat (E).

الثلول في وسط الثدي يمتص منه الحليب وهما حلستان في الحيل والغنم والماعز . واربع حللات في البقر وثمان حللات فاكتر في السنوريات .

٨٢٧٦ - حُلْمَة

Lithosperme (F).

هي شجار الحقل ، اطلبه .

٨٢٧٧ - حُلْمُوش

Myrte (F). Myrtle (E).

هو الآس ، اطلبه .

٨٢٧٨ - حُلْمِي

Mamillaire (F). Mamillary (E).

ما كان شكله كالحلقة .

٨٢٧٩ - حُلْمِيَّات

Acarlens (F). Acarina (E).

Acarinen, Milben (D).

هي القراديات رتبة حشرات من صف العنكبوتيات .

٨٢٨٠ - حُلُوبَة ، حُلُوب

Laitière (F).

Milch, Milker (E).

البقرة الحلوبة هي الغزيرة الحليب . يقال بقرة حلوبة وبقر حلوب وحلوبة || ويقال للبقرة الحلوبة : حوارة درور ، غزيرة . ثرة . لبنة . لبون || ويقال للبقرة القليلة الحليب : بكثة . جداء . سهول . الخ .

٨٢٨١ - حُلُوءَة ، مَعْقَد ، بَنَكْرِيَّاس

Pancréas (F). Pancrèas, Sweetbread (E).

غدة كبيرة بجذاء المعدة تفرز في الاساء عصارة دبقه خاصة ضرورية للهضم .



حلوف مدغسكر

Lait en poudre (F).
Powder milk (E).

هو الحليب الجاف المسحوق الذي فصل عنه كل ما يحوي من ماء ومنهم من سماه حليباً مسحوقاً .

Assa foetida (F).

هو صمغ الأنجذان ، اطلب حلتيت .

Spirula (S).

Spirule (F). Spirula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل وفصيلة الحلزريات || أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . بعض أنواعه يعيش على الشواطئ الرملية المنصورة والبعض الآخر يعيش في الأعماق || اصداقها صغيرة ، انبوية الشكل ، داخلية الارتكاز ، وحيدة اللوب ، يغلفها الجسم . رؤوسها شبه مستديرة عيونها جاحظة . جرامزها متفاوتة الطول ، مجهزة بمحاجم دقيقة .

Spirulidae (S).

Spirulidés (F). Spirulidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الأرجل ، مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرامز || اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد ، معظمها من متحجرات الازمنة الغابرة || اعرف اجناسها المعاصرة وأكثرها انتشاراً يدعى حلز .

Halme, Pourpier de mer (F).

هو السريق البحري ، اطلبه .

Papille (F). Papilla (E).

حلمة صغيرة .

Papilliforme (F). Papilliform (E).

ما كان شكله شكل الحلمة .

٨٣٠٦ - حَمَّ* ، حَمِيمَة ، خَصِيَّانَ الْجَمَلِ ،

كَرْنَبُ الْجَمَلِ ، موريكنديا

Moricandia (S). Moricandle (F). Moricandia (E). Feld moricandle (D). Moricandia (I).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الصليبيات . أنواعه المعروفة ستة جميعها برية ملساء متعاقبة الاوراق الكاملة التركيب . ازهارها صغيرة القد ، عريضة ، بنفسجية اللون .

Vase (F). Slime (E).

مزيج من التراب والمواد العضوية والنباتية يرسب في المناطق وبحاري الماء . وهو غني بالازوت .

Basilic velu (F).

هو الحبق الورب ، اطلبه .

٨٣٠٩ - حِمَار* Equus asinus (S). Ano (F). Ass (E).

حيوان داجن من فصيلة الخيليات . ج حير وحر وأحمر . الانثى حمارة وأتان . كنيته كما جاء في الجاحظ : ابو صابر وابو زياد ويقال للحمارة أم محمود وأم تولب وأم جمش وأم نافع وأم وهب || وهو حيوان قنوع نافع يحمل ويحمر . هادئ ، صبور وبطيء في سيره . جبان في خلقه وحروك

من التروية او عزلها بواسطة مصفاة دقيقة المسام تسمح بمرور المواد البلورية الى الماء .

٨٢٩٠ - حُلُولُ الْأَجَل ، إِسْتَحْقَاق

Echéance (F). Falling due (E).

هو التاريخ الذي يصبح فيه الالتزام واجب التنفيذ .

٨٢٩١ - حُلُو مُرّ Douce amère (F). Felon-wort (E).

حلور مر ويدعى حلوه مره هو الثلقان ، اطلبه .

Trypsine (F).

٨٢٩٢ - حُلُون ، تريبسين خيرة تفرزها الحلوة لتحلل المواد البروتينية .

Lallemantia (S).

Lallemantie (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الشفويات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهدا الشرق الاوسط حيث تنبت طويلاً في معظم المناطق الجبلية || سوقها زباء تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها متعاقبة خلية اتصال المنقطة الضيقة الصغيرة . ازهارها سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، زرقاء اللون او بيضاء || الفارق بين الانواع يقوم على شكل اتصال وتسنيها وعلى لون الازهار . اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٨٢٩٤ - حُلِيَاءَ إِبِيرِيَّة

L. iberica (S). L. d'Ibérie (F).

٨٢٩٥ - حُلِيَاءَ بَيْضَاء

L. canesens (S). L. blanchâtre (F).

٨٢٩٦ - حُلِيَاءَ هِلَالِيَّة

L. peltata (S). L. peltée (F).

٨٢٩٧ - حَلِيب ، دَرّ ، لَبَن ، رَسَل ، شِخَاب

Lait (F). Milk (E).


سائل كثيف ابيض اللون جليل القيمة الغذائية تفرزه اثناء وضروع اناث الحيوانات اللبنة || يستعمل على حاله الطبيعية كغذاء كامل التركيب كما يستعمل في صناعة الالبان والاجبان ولاستخراج السن والزبدة . والجداول التالي يبرز ملخص تركيبه مع المقارنة بين مختلف مصادره .

المادة	الحجر	الناقة	الانان	البقرة	العزرة	النعجة
ماء	٨٩,٠٠	٨٩,٢٠	٨٩,٣١	٨٧,٥٠	٨٧,٠٠	٧٩,٩٧
عناصر ازوتية	٢,٦٠	١,٩٢	١,٢٣	٣,٦٥	٣,٩٠	٦,١٨
عناصر دهنية	٢,٤٠	٢,٢٥	٢,١٠	٣,٥٠	٤,٠١	٧,٤٦
لكتوز (سكر الحليب)	٥,٥٠	٦,٢١	٦,٩٢	٤,٦٠	٤,٣٠	٥,٣٧
املاح معدنية	٠,٥٠	٠,٤٨	٠,٤٥	٠,٧٥	٠,٨٠	١,٠٢
الخلاصة الجافة	١١,٢٠	١١,٤٥	١١,٧٠	١٢,٥٠	١٣,٠٠	١٩,٩٧
الثقل النوعي	١٠٣١	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٢	١٠٣٠	١٠٣٨

٨٢٩٨ - حَلِيب مُكثَّف ، حَلِيب مُجَرَّد

Lait condensé, Lait concentré (F). Condensed milk, Concentrated milk (E).

هو الحليب الذي فصل عنه ، بطريقة ما ، جزء من مائه .



طوله نحو ٢٠٠ سم. وارتفاعه ١٣٠. يتميز بثوبه القليل التأذير. لونه الى الصهبة يزداد عبقاً مع اقترابه من الصدر والرأس ويقل عند البطن والكفل. بطنه وذيله وداخل قوائمه الى البياض الاربد.



حمار

٨٣١٨ - حِمَار الشَّبِي Baudet (F), Donkey (E).
هو العير، الحمار الفحل المنتخب الذي يصلح للزور.

٨٣١٩ - حِمَار النُوبَةِ Equus asinus africanus (S).
Ane de Nubie (F).
ضرب من الحمار تنسب اليه سلالات حمار الصومال والحبشة ومصر || اعطاه بوادي النيل الشرقية من مصوع الى كسالة وشلال النيل الخامس.

٨٣٢٠ - حِمَار الوَحْشِ * ، حِمَار وَحْشِي ، أَخْذَر ،
قَرَاء Equus onager (S), Onagre (F).
Onager, Wild ass (E).

جنس حيوانات برية من فصيلة الخيليات. موطنه بلاد ايران والافغان والتركستان وجوارها. يشبه الحمار ولكن في هيئة منسوبة ومنسجمة يقر اللوق امتيازها وتفوقها. يعيش جماعات ويوصف بشدة الغيرة وكثرة الحرص والحذر. قال الجاحظ: «الوان حمار الوحش مختلفة. والاشدرة اطولها عمراً واحسنها شكلاً وهي منسوبة الى اخدر فحل كان لكسرى فتوحش واجتمع بعانات فضرب فيها فالتولد منها يقال له اخدري.»

٨٣٢١ - حِمَار جَنُوبِي Ascellus australis
الحمار الجنوبي نجم نير من كوكبة برج السرطان. ويدعى بها السرطان.

٨٣٢٢ - حِمَار شَمَالِي Ascellus borealis
الحمار الشمالي نجم نير من كوكبة برج السرطان. ويدعى دلتا السرطان.

٨٣٢٣ - حِمَار قَبَان * ، حِمَار البَيْت ، عِبْر قَبَان ،
هَدَبَة Oniscus asellus (S).
Cloporte commun (F), Woodlouse, Sow bug (E).
Mauerasel, Gemeine Mauerasel (D).
حشرة من القشريات صغيرة القند مبدولة تعيش في الاماكن الظليلة الرطبة. يكثر وجودها في المنازل الارضية.

٨٣٢٤ - حِمَارَة ، عَانَة ، أَتَان Anesse (F).
She-ass (E).
انثى الحمار. ج حائر وعانات وأن. ردتها يعاود كل ٢٥ يوماً. يحملها يستقيم ٣٦٠ يوماً. يجوز الزور عليها بعد وضعها بعشرة ايام.

٨٣٢٥ - حِمَارَة Astringence (F), Astringency (E).
حوضه لاذعة فيها حدة رقبض

٨٣٢٦ - حِمَامَس Stenocarpus (S).
Sténocarpe (F), Stenocarpus (E).
جنس نباتات شجرية وجنبية معمرة من فصيلة الفصيات. انواعه المروفة قليلة العدد. موطنها البلاد الحارة || جميعها برية وتزرع للتزيين. اوراقها ايده. ازهارها ملونة جميلة. ثمارها حنابل صغيرة || اعرف انواعها التزيينية الحامس الصفصافي الورق والحامس المقور الورق.

اذا اشتد به الاذى. قامته متوسطة، شكله مستطيل. ظهره قوي، رأسه متناسب مع جسمه، اذناه كبيرتان مستطيلتان، عنقه هريض، جلده سميك، وبره ناعم وقصير، قوائمه قوية تنتهي بخوافر ضيقة الصحن صلبة. ضروبه عديدة أشهرها: حمار الثبت. او حمار العجم وحمار الجزيرة وحمار النوبة وحمار توسكانا وحمار صقلية.

٨٣١٠ - حِمَار أُرُوبِي Equus asinus europæus (S).
Ane d'Europe (F).

سلالة من الحمار يقال انها متحددة من حمار النوبة وحمار ما بين النهرين. يكثر وجودها في بعض بلاد اوروبا كفرنسة واسبانية وإيطالية.

٨٣١١ - حِمَار البَحْرِ Latès du Nil
هو لاطس النيل، اطلبه.

٨٣١٢ - حِمَار البَيْت Cloporte commun (F).
Woodlouse (E).
هو حمار قبان، اطلبه.

٨٣١٣ - حِمَار الزَرْدَة * ، زَرْد ، عَتَّافِي Equus zebra; Hippotigris (S), Zèbre (F), Zebra (E).
جنس حيوانات برية من فصيلة الخيليات. تعتبر من اجمل حيوانات فصيلتها بعد الخيل وهي اعنفها قوة واشدها مراماً واسرعها عدواً || جلودها ناعمة طحلاء اللون مؤذرة بخطوط سود من الجحفة حتى الاطراف || موطنها افريقية الشرقية من الصومال الى القطب. تعيش قطعان قليلة او متوسطة العدد ولكل قطع رئيس يسهر عليه هو نعله الصامد. قوتها الاعشاب. انثاها تحمل ٣٦٠ يوماً. انواعها اربعة اما ضروبها وسلالاتها فعديدة.

٨٣١٤ - حِمَار الزَرْد البُرْشَلِي ، بِيْشَة Hippotigris burchelli (S), Zèbre de Burchell, Pitsché, Bonte quagga (F).

موطنه الاصقاع الافريقية القائمة جنوبي خط الاستواء. ضروبه وسلالاته عديدة. طوله نحو ١٨٥ سم. وارتفاعه ١٢٠. يتميز بشكله القريب من شكل الخيل. ثوبه الى الصهبة الصفراء يعلوه تأذير عريض الخطوط اسود اللون. رأسه يشبه رأس الحصان. اذناه صغيرتان. عرقه كثيف الور المتوسط الطول. بطنه الى البياض التبي يتوسطه خط عابق.


٨٣١٥ - حِمَار الزَرْد الجَبَلِي ، مُو Hippotigris montanus (S), Zèbre de montagne, Daw (F).

موطنه يمتد من صحراء كارو الى حدود القطب. ثوبه الى البياض التبي يعلوه تأذير اسود لامع. قامته ربة، اذناه كبيرتان، عرقه كثيف الشعر القصير. ذيله ذيل الابل.


٨٣١٦ - حِمَار الزَرْد الصُومَالِي Hippotigris grevyi (S).
Zèbre de Grévy, Z. des Somalis (F).

موطنه الصومال وبلاد شوا. طوله نحو ٢٠٠ سم. وارتفاعه ١٢٥. ثوبه الى البياض الاربد يعلوه تأذير جزوي اللون اسود الموج.

٨٣١٧ - حِمَار الزَرْد المُوْطَنْشِي Hippotigris quagga (S), Zèbre couagga (F).
موطنه البلاد الواقعة بين حوض الغال وسلسلة جبال القطب.



حمار الزرد



حمار الوحش



حمار قبان

الوريقات زباء النصل. ازهاره مظلية النجم زرقاء اللون زباء الصفحة الخارجية يحملها شراخ اجوف منتصب يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. || ازهاره يستمر طوال فصل الربيع.

٨٣٣٤ - حماس إسبانيحي
Oseille épinard (F).
Spinach-dock (E). هو حمض الحقل، اطلبه.

٨٣٣٥ - حماس أصفر* ، حماس قرني، حمض
Oxalis corniculata (S). Surelle corniculée, S. jaune, Oxalide corniculée (F) Procumbent oxalis, Yellow wood-sorrel (E). Gehörnter sauerklee, Gelber sauerklee (D). Ossalide corniculata, Erba Iujula (I). نوع من الحمض الحولي والحول. ضروبه عديدة. يكثر في الاماكن الرطبة ويعتبر من النباتات الضارة. يعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. جلوره دقيقة. ساقه مورقة. اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل. ازهاره صفراء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى تشرين.

٨٣٣٦ - حماس الحقل هو حمض الحقل، اطلبه.

٨٣٣٧ - حماس السواقي هو حمض السواقي، اطلبه.

٨٣٣٨ - حماس العيد* ، بقلة حمامضة ،
أقصليس صغير

Oxalis acetosella (S). Surelle petite-oseille, Alleluia, Pain-coucou, Oseille des bois (F). Wood-sorrel, Alleluia, Cuckoo bread (E). Echter sauerklee, Alleluja (D). Ossalide acetosella, Alleluia, Pan cucco (I). نوع من الحمض المعمر المبذول والمتبقل. يستخرج من عصارة اوراقه وضلوعه الحمض الحامضي || يعلو من ٥ الى ١٠ سم. جذاميره حشفية مدادة. اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل. ازهاره بيض يعلوها تمشيق وردي او بنفسجي او احمر او ازرق || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار.

٨٣٣٩ - حماس الماء هو البث، اطلبه.

٨٣٤٠ - حماس أنيق
Oxalis elegans (S).
Surelle élégante (F).

نوع من الحمض المعمر. يعلو نحو ١٥ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات. نصلها بنفسجي الصفحة السفلى تعلوه غديدات صغيرة مبعثرة. ازهاره كبيرة القد، ارجوانية اللون غدية السبلات || ازهاره يستمر طوال شهر تموز.

٨٣٤١ - حماس بنفسجي
Oxalis violacea (S).
Surelle violette (F).

نوع من الحمض المعمر. يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المستعرضة. ازهاره بنفسجية اللون عشكولية التجميع يحملها شراخ اجوف يعلو من ١٠ الى ١٨ سم. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٨٣٤٢ - حماس تساعي الوريقات

Oxalis enneaphylla (S). Surelle à 9 folioles (F). نوع من الحمض المعمر. يعلو نحو ١٠ سم. اوراقه تساعية الوريقات المحروطية الشكل، البحرية اللون. ازهاره زباء، فردية، بيضاء او وردية اللون يعلوها تمشيق احمر. ازهاره يستمر طوال الصيف.

٨٣٢٧ - حماس صُفْصافي الورق
Stenocarpus salignus (S). Sténocarpe à feuilles de saule (F). نوع من الحماس. ساقه فرعاء رفيعة تعلو من مترين الى ثلاثة امتار. اوراقه ابيدة، سنائية النصل كاوراق الصفصاف، تطول من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره صيواني التجميع. ازهاره الى الخضار المشوب بالاصفر.

٨٣٢٨ - حماس مقور الورق*
Stenocarpus sinuatus (S). Sténocarpe sinué (F).

نوع من الحماس. ساقه فرعاء رفيعة تعلو من ٢٠ الى ٣٠ متراً. اوراقه معتقة كبيرة النصل الثانية او الثلاثية او الرباعية الفلق. ازهاره صيواني التجميع، محوري الارتكاز. ازهاره الى الحمرة الارجوانية تطول نحو ٣ سم. تنويره يستمر من حزيران الى تموز.

٨٣٢٩ - حماسة ، بياح أسود
Lutjanus atra (S).
Lutjan noir, Tétragonure, Muge noir (F). Black Mullet (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة السرانيات شائكات الزعانف. اعطانها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط. يكثر وجودها في الخلجان وقرب مصبات الأنهر || جسمها شبه وشي الشكل يطول نحو ٣٥ سم. ثوبها الى السمرة الجذوية يبعق ويسود مع اقترابه من ثيج الظهر. رأسها معتدل الحجم، مخروطي الشكل، معتدل الخطم. فكها كبيران، متساويان. شدقها واسع الانفراج. اسنانها صغيرة، ذوبة. عيناها معتدلتا الحجم والنشوز || زعانفها متباينة الاشكال والاحجام، الظهرية والشرجية لامتساوية التدرج والمناخس زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها اسمر اللون، متوسط الصنف، مأكول.

٨٣٣٠ - حماس
Oxalis (S). Oxalide, Surelle (F).
Oxalis (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الحماسيات انواعه المعروفة لا تقل عن ٢٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية. اوراقها معتقة مركبة متعاقبة منها ثلاثية الوريقات ومنها عديدتها. ازهارها فردي او عشكولي او مظلي التجميع. ازهارها مختلفة الالوان منها الاصفر والابيض والارجواني || اعرف انواعه واشهرها ما يلي.

٨٣٣١ - حماس أجنتح
Oxalis cernua (S).
Surelle penchée (F).

نوع من الحمض المعمر. اوراقه ثلاثية الوريقات. وريقاته ثنائية التفصيص. ازهاره مكبسة، مظلية التجميع صفراء اللون يحملها شراخ اجوف يعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. || ازهاره يستمر من تشرين الثاني الى ايار.

٨٣٣٢ - حماس أرجواني*

Oxalis purpurata, Oxalis anthelmintica (S). Surelle pourpre (F).

نوع من الحمض المعمر. جثته غليظ متشعب. اوراقه رجيية الشكل. نصلها ازغب الصفحة السفلى. ازهاره عشكولية التجميع، ارجوانية او بيضاء اللون، يحملها شراخ يعلو نحو ٢٥ سم. || ازهاره يستمر شهراً واحداً بين تموز وآب.

٨٣٣٣ - حماس أزغب ، حماس زهري

Oxalis lasiopetala, O. floribunda (S). Surelle value (F).

نوع من الحمض المعمر. جثته لين غليظ. اوراقه ثلاثية



حماس مقور الورق



حماس ارجواني



حماس اصفر




حماس العيد




حماض عسقلولي



حماض مفصص



حماط الاجاص



حماط التفاح

٨٣٥١ - حُمَاضِيَّاتُ Oxalidae (S).

Oxalidées (F). Oxalidae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. نباتاتها عشبية صغيرة القد. أوراقها مركبة. أزهارها مجموعة أو فردية، خماسية البتلات، عشارية الاسدية. اجناسها قليلة اما انواعها وضروبها فكثيرة العدد. مهددا جميع الاصقاع العالمية.

٨٣٥٢ - حِمَاطُ، حُطُوطُ Psylla (S). Psylla (F).

Snake-charmer (E).

جنس حشرات مضرة من فصيلة الحماطيات ورتبة متجانسات الاجنحة. انواعه عديدة جميعها صغيرة القد مستطيلة الاجنحة قوية المنك الثاقب. يرقاتها مفلطحة مستعرضة قليلة الحركة بعضها يفرز مواد زيتية تشبه ندف القطن الابيض وبعضها يفرز عصارة عسلية لزجة. جميعها تعيش على اوراق النبات وزعماته ونواحيه فتؤذيها اشد الاذى || انثاها اكبر قدماً من ذكورها. تمتح مكنتها في شقوق اللحاء. اجيالها الحولية تختلف مع الانواع وقد تراوح من الجيل الواحد الى ستة اجيال. اشهر واضر انواعه ما يتبع.

٨٣٥٣ - حِمَاطُ الإِجَاصِ* Psylla pyricola (S).

Psylle du poirier (F). Pear psylla (E). Birnblattfloh, Birnblattsauger (D).

يركب الاجاص فيؤذيها في زعماته ونواحيه واوراقه. يراوح طول الحشرة الكاملة من ٢ مم. ويخط واحد الى ٢ مم. وثمانية خطوط. ثوبها برتقالي اللون يملوه نقط سمر. رأسها عريض. زباناها دقيقة طويلة. سوقها الخلفية لا هليية || اجيالها الحولية تراوح من اربعة الى خمسة. الانثى تعيش نحو ٨٥ يوماً وتبيض نحو ٤٨٠ مكنة. ينقف المكن بعد متعه باسبوع في زمن الصيف وبعد ثلاثة اسابيع في تشرين وبعد اربعة اسابيع في اذار. البرقة تمر باربعة السلاخات. الجيل الكامل من المكنة الى المكنة يستمر من ٣٠ الى ٤٦ يوماً.

٨٣٥٤ - حِمَاطُ الإِجَاصِ الغَلِيظِ Psylla pyrisuga (S).

Gros psylle du poirier (F).

يركب الاجاص فيؤذيها. موطنه فسيح الارعاء يمتد من شمالي اوروبه الى اليابان || الحشرة الكاملة صغيرة القد، طولها يراوح من ٢ مم. وخمسة خطوط الى ٤ مم. || البرقة خضراء اللون ونحوها يسبب التلف الاوراق.

٨٣٥٥ - حِمَاطُ الإِجَاصِ المُدَخِّنِ Psylla pyri (S).

Psylle enfumée du poirier (F).

يركب الاجاص فيؤذيها. موطنه البلاد الباردة. يكثر في روسيا وفنلنده والسويد والناروج. وهو صغير القد طولها نحو ٢ مم. وخمسة خطوط. ثوبه الى البرتقالي الزاهي. اجنحته شفافة يملوها وشاح غبش كالدخان.

٨٣٥٦ - حِمَاطُ البَقَسِ Psylla buxi (S).

Psylle du buis (F).

نوع من الحماط يركب البراعم والزعمات الطرفية فيسبب اتملاصها بعد ان ينطقها بندفه القطني الابيض اللون.

٨٣٥٧ - حِمَاطُ التُّفَاحِ* Psylla mali, P. dubia, P. crataegicola, P. viridissima (S).

Psylle du pommier (F). Apple sucker (E). Apfelblattfloh, Apfelblattsauger (D).

يركب زعمات وبراعم ونواحي واوراق التفاح ولا يعف

٨٣٤٣ - حُمَاضُ حَشِينِ Oxalis hirta (S).

Surelle rude (F).

نوع من الحماض المعمر. يملو من ٨ الى ١٠ سم. عساقله بيضية صغيرة القد، قشورها حشفية حراشفها سود. اوراقه ثلاثية الوريقات الحيطية الشكل الضمية التجميع. ازهاره فردية محورية ليلكية او بنفسجية اللون صفر القاعدة || ازهاره يستمر من شباط الى اذار.

٨٣٤٤ - حُمَاضُ رُبَاعِيَّ الُورِيَقَاتِ Oxalis tetraphylla (S).

Surelle à 4 folioles (F).

نوع من الحماض المعمر يزرع لعساقله المأكولة. يملو من ١٥ الى ٣٥ سم. اوراقه رباعية الوريقات الكبيرة القد العريضة. نصلها ازغب الصفحة السفلى، بحري اللون موشح بخطوط أرجوانية. ازهاره مطلية التجميع متدلية لوها الى البنفسجي الزاهي او الاحمر النحاسي. عساقله كبيرة القد، بيضاء اللون، مأكولة || ازهاره يكون في حزيران.

٨٣٤٥ - حُمَاضُ عُسْقُولِي*، أَقْصَالِيْسُ عُسْقُولِي Oxalis tuberosa, O. crenata (S).

Surelle oca, S. tubéreuse, Oxalide crénelée (F). Oxalis, Oca of Peru (E). Sauerklee (D). Ossalide crenata, Acetosella (I).

نوع من الحماض المعمر الامريكي الاصل يزرع لعساقله المأكولة واوراقه المتبقلة. يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. جذوره عسقلوية. عساقله بيضية الشكل تطول نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٣. ساقه منتصب. اوراقه ثلاثية الوريقات القلبية الشكل، الزباء النصل. ازهاره عشكوية التجميع مشقة بالاحمر || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

٨٣٤٦ - حُمَاضُ مُتَكَوِّنِ Oxalis variabilis (S).

Surelle variable (F).

نوع من الحماض المعمر. يملو من ٨ الى ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المحروطية الشكل. ازهاره كبيرة القد ارجوانية او وردية او بيضاء اللون جميعها صفراء المحور والقاعدة || ازهاره يستمر طوال الصيف.

٨٣٤٧ - حُمَاضُ مُفَصَّصِ* Oxalis lobata (S).

Surelle lobée (F).

نوع من الحماض وهو نبات نجمي معمر. جنثه لحمي غليظ، اوراقه قرصية الانتشاح ثلاثية الوريقات المفصصة. ازهاره صفراء اللون فردية طويلة الزناد. ازهاره يستمر من تشرين الى اذار.

٨٣٤٨ - حُمَاضُ مِلَوَّانِ Oxalis versicolor (S).

Surelle versicolore (F).

نوع من الحماض المعمر يملو من ٨ الى ١٠ سم. اوراقه ثلاثية الوريقات المحروطية الشكل، الضمية التجميع، الثنائية اللند الحمر. ازهاره فردية محورية. لوها الى البياض يحوق اطراف احمر || ازهاره يستمر من شباط الى ايار.

٨٣٤٩ - حُمَاضُ وَرْدِيّ Oxalis rosea (S).

Surelle rose (F).

نوع من الحماض الحولي يملو من ١٥ الى ٣٠ سم. جذوره دقيقة متشعبة. اوراقه ثلاثية الوريقات، وريقاتها قليلة الشكل. ازهاره وردية اللون يملوها تبيج اخضر. ازهاره يستمر طوال فصل الربيع.

٨٣٥٠ - حُمَاضَاتُ Oxalate

ملح الحماض الحماضي.

٨٣٦٤ - حِطَّاط المُرَّان °
Psyllopsis fraxini (S).

Psylle du frêne (F).

يركب اوراق المران فيحصد نصلها ويمج حواشيها التي تبدو صفراء اللون ، جراء العروق || يرقاته تفرز عصارة عسلية حلوة تسبب القضاء على النسيج .

٨٣٦٥ - حِطَّاط المَغْث °
Psylla alni (S).

Psylle de l'aune (F).

يركب زمعات المغث واوراقه الندية فيؤذيها بعد ان يحصد النصل ويمجها .

٨٣٦٦ - حِطَّاط النَّبَق °
Trioza kiefferi (S).

Psylle du nerprun (F).

يركب اوراق النبق وقد يعطها بكاملها بعد ان يمتطى نصلها بغدده المنتصبة المدببة التي يبلغ ارتفاعها عن سطح النصل نحو ١٠ مم . وتجويها على الصفحة السفلى نحو ٥ مم .

٨٣٦٧ - حِطَّاط رُوسِي °
Psylla albiceps (S).

Psylle de Russie (F).

موطنه البلاد الروسية يركب الاشجار المشجرة على اختلاف اجناسها وانواعها .

٨٣٦٨ - حِطَّاطَة
Figulier de Sumatra (F).

الحطاطة هي التين الجبلي . حج حطاط وحائط . والحطاطة هي تين الذرة خاصة .

٨٣٦٩ - حِطَّاطِيَّات ° ، حِطَّاطِيَّات °
Psyllidae, Chermidae (S). Psyllidés, Chermidés (F).

Psyllidae, Jumping plant lice (E). Blattflöhe, Springläuse (D).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة قريبة الشبه بالارقيات والفطريات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد طولها يراوح من ٢ الى ٤ مم . رأسها مستعرض ، عينها كبيرتان مركبتان . زبانها مستدقة مؤلفة من ١٠ فواصل . متكها قوي صلب يشبه تلك القرمزيات . جوشنها كروي الشكل بارز . اجنحتها الامامية اطول من الخلفية . ارجلها قوية اخصها الزوج الاخير الذي يمكنها من القفز . سوقها مستطيلة هليية . ارساغها ثنائية المفاصل .

٨٣٧٠ - حِطَّاق °
Variole (F). Smallpox, Variola (E).

هو جدري البقر ، اطلبه .

٨٣٧١ - حَمَام °
Colombes, Pigeons (F).

Doves, Pigeons (E).

جنس طير من الحماميات . انواعه خمسة اما ضروبه وسلالاته فكثيرة العدد || انواعه الخمسة هي الحمام الداجن واليام والدلم والحيدوان والورشان .

٨٣٧٢ - حَمَام دَاجِن °
Pigeons domestiques (F).

Domestic pigeons (E).

هو الحمام الاهلي على اختلاف ضروبه وسلالاته . يقال انه تحدر من الحيدوان واليام . اشكاله واثوابه عديدة تختلف باختلاف الضروب والسلالات . اشهر ضروبه واعما :

البشوق °
Pigeon nonnain (F). Capuchin (E).

الرومي °
Pigeon romain (F). Runt (E).

عن السفرجل والبندق والاجاص لكنه لا يمتح مكنه الا على التفاح . اما الحشرة الكاملة فوحيدة الجيل الحولي . لونها الى الجؤوة . رأسها مستعرض الشكل مكور المحسر البارز . الذكر يطول نحو ٢,٦ مم . اما الانثى فتبلغ ٣ مم . وتمتج مكنها الذي لا يقل عدده عن المئة في شقوق اللحاء ومكنها هذا يبدر عاجي اللون ثم ينحرف الى الوردي ويستقر على الاحمر . يتقف المكن في اوائل الربيع عن يرقات صغيرة مفلطحة . لونها الى الصفرة يعلوها تخطيط اسمر ، تنجها نحو الزمعات والبراعم الزهرية والورقية فتقتضي عليها .

٨٣٥٨ - حِطَّاط التَّيْن °
Homotoma ficus (S).

Psylle du figulier (F).

موطنه حوض البحر المتوسط . يركب براعم وزمعات واوراق جميع انواع وضروب التين || الحشرة الكاملة طولها نحو ٥ مم . ثوبها اخضر او حنطي . رأسها عريض الشكل : عينها كرويتان بارزتان . زبانها مستدقان تكتنفها زغبة هليية . اجنحتها شفافة ناعرة الاعصاب . جيلها الحولي واحد . اناثها تبيض في اواخر الصيف فتنتج مكنها في شقوق اللحاء . مكنها بيضي الشكل برتقالي اللون . يتقف في اوائل الربيع عن يرقات صغيرة مفلطحة لونها الى الاخضر الزاهي . تعيش على العصارة التي تمتصها من الزمعات وعروق الاوراق .

٨٣٥٩ - حِطَّاط الخَضَار ° ، حِطَّاط الجَزَر °
Trioza viridula (S). Psylle des légumes, P. de la carotte (F).

يركب البقول على اختلافها واخصها الجزر فيوقع بها اشد الاذى . وقد يمتري بعض النباتات التزيينية فيعطب اوراقها ويسبب الى نموها .

٨٣٦٠ - حِطَّاط الخَوْر °
Psylla trimaculata (S).

Psylle du prunier (F).

حشرة امريكية المهد تتركب الخوخ فتؤذيها .

٨٣٦١ - حِطَّاط الزُعْرُور °
Psylla crataegi (S).

Psylle de l'aubépine (F).

يركب الزعرور ولا يعف عن التفاح .


٨٣٦٢ - حِطَّاط الزَيْتُون °
Psylla olivina, Euphyllura olivina (S). Psylle de l'olivier (F).

حشرة مضرّة تتركب الزيتون . موطنها حوض البحر المتوسط . طولها يراوح من ٢ مم . الى ٢ مم . وخمسة خطوط . رأسها مستعرض غليظ . اجنحتها عريضة مستطيلة بارزة العروق . لونها الى الرمادي العابق او الحنطي الزاهي || اناثها تبيض في اوائل الربيع فتنتج مكنها في الاوراق الفتية على صفحة النصل السفلى بجذاء الضلع || يرقاتها تغزو العناقيد الزهرية وتمتطق الازهار بندقها القطني ثم توخرها وتمتص عصارتها .


٨٣٦٣ - حِطَّاط الغَار °
Trioza alacris (S).

Psylle du laurier (F).


يركب جميع اشجار الفصيلة الغارية واخصها الرند . ونخره نصل الاوراق بسبب حصنها والتفافها وفقدان لونها الذي ينحرف الى الاصفر ويستقر على الابيض التبي .



حِطَّاط التَّيْن



حِطَّاط الخَضَار



حِطَّاط الزَيْتُون



حَمَام رُوسِي

٨٣٧٨ - **حماية ، وقاية** Prophylaxie (F).
Prophylaxis (E).
ناحية من الطبابة تبحث في طرق الحيلة الواجبة لفنان
الاحتراز من المرض .

٨٣٧٩ - **حماية** Défends, Défens (F).
Prohibition of cutting (E).
هي منع الماشية من دخول الحرج أو كل أرض مشجرة
وذلك لصيانة الاشجار رحايتها من عبث الحيوان .

٨٣٨٠ - **حماية جمركية** Protectionnisme (F).
Protectionism (E).
مذهب اقتصادي سياسي مؤداه حماية السوق القومية من
المنافسة الاجنبية .

٨٣٨١ - **حبالاس** Myrte (F). Myrtle (E).
هو الآس الجوي ، اطلبه .

٨٣٨٢ - **حمة ، حمة ، منخس** Aiguillon, Dard (F). Sting, Goad (E).
رأس ابرة أو ذنب بعض الحشرات كالنحلة والزنبور
والمعرب .

٨٣٨٣ - **حمة المعرب** حمة المعرب منزل من منازل القمر البانية ، وتدعى الشولة ،
اطلبها .

٨٣٨٤ - **حنجم** Borrage (S). Bourrache (F).
Borage (E).
جنس نباتات عشبية خولية ومعمرة من فصيلة الحمحميات .
تتميز بنحشونة اوراقها الغلبية النصل || انواعه قليلة
اعرفها واشهرها الخنزري والبنفسجي .

٨٣٨٥ - **حنجم بنفسجي ، حنظمة بنفسجية** Borrage laxiflora (S). Bourrache à grappes
lâches (F).
نوع من الحمحم وهو نبات عشبي بري مغمر . ساقه
دقيقة متسلسلة تطول نحو ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة . ازهاره
جرسية الشكل بنفسجية اللون زباء البشرة || ازهاره
يستمر من اذار الى تشرين .

٨٣٨٦ - **حنجم خنزري ، حنظمة خنزرية** Borrage officinalis (S). Bourrache officinale (F).
Common borage, Tale-wort (E). Boretsch, Gurken-
boretsch (D). Borrano, Borrachine, Buglossa
vera (I).
نوع من الحمحم وهو نبات عشبي بري طيب حولي .
يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . ساقه غليظة حلبية . اوراقه
متعاقبة . ازهاره فارشة كالنجوم . قطرها نحو ٢٥ مم .
لونها الى الازرق الزاهي || ازهاره يستمر من نيسان الى
ايلول || اوراقه وازهاره غروية ، مرققة ، مدرة للبول .
نقيعه يفيد نزلات البرد الخفيفة ويطفع الحميات عند
ظهوره .

٨٣٨٧ - **حنمة ، حنجم** Oena capensis (S).
Oena (F). Cape dove (E).
ومن اسمائه يحسوم وأم بليمة . طائر من الحماميات وحيد
الجنس والنوع قريب الشبه بالدبسي الا انه اصغر منه .

Pigeon messenger, الواجل * ، الهادي ، الورق
P. voyageur (F). Carrier pigeon, Homer (E).
السداد ، الهزاز ، المراعيش
P. paon, P. trembleur (F). Fantail (E).
الطائي
Pigeon boulant (F). Pouter (E).
العداد
Pigeon spicifer (F). Spicifer pigeon (E).
القلاب ، القلوب ، المضرب
Pigeon culbutant (F). Tumbler, Roller pigeon (E).
الكوسي
Pigeon tambour (F). Tambourine (E).
المتوج
Pigeon huppé (F). Jacobin (E).
المطوق
Pigeon cravaté (F). Turbit (E).

٨٣٧٣ - **حماما** Amome cardamome (F).
Cardamom (E).
اطلب مال حماما .

٨٣٧٤ - **حمامة** Pigeonne (F). She-pigeon (E).
هي انثى الحمام . قال حميد بن ثور الهلالي :
وما حاج هذا الشوق الا حمامة
دعت ساق حر نزهة وترنما
مطوقة غرام تسجع كلما
دنا الصيف والخال الربيع فانجما
تفتت على غصن عشاء فلم تدع
لنساءحة من نوحها مثلاً
اذا حركته الريح او مال ميلاً
تفتت عليه مائلاً ومقوما
صبيت لها أنى يكون غناؤها
فصيحاً ولم تفر بمنطقها فا
فلم أر مثلي شاقه صوت مثلها
ولا عريباً حاجه صوت أعجا

٨٣٧٥ - **حمامة** la Colombe (F). Columba (E).
الحمامة كوكبة نجوم جنوبية . الموقع قليلة العدد منها نجم
مزدوج ، يحمل الرقم ٣٨٢٣ من جدول هرسكل ، يدعى
« الفاختة » أو « نير الحمامة » .

٨٣٧٦ - **حمامي ، طفح وزدي** Erythème (F).
Erythema (E).
مرض جلدي اسبابه عديدة منها حرارة الشمس واحتكاك
الرحل والنفط والنيار .

٨٣٧٧ - **حماميات** Colombidae (S).
Colombidés, Colombins (F) Colombidae (E).
هي فصيلة الحمام انواعها وضروبها وسلالاتها عديدة تنتمي
الى ١١ جنس وهي الحمام والصلاصيل والقباري والترغل
والقواخت والوردانيات والطورانيات والدباسي والفقمي
والشفانين والقلقانيات || تتميز بانسجام وجمال تكوينها ،
بصغر رأسها ، بضعف منقارها وبقصص عنقها وارجلها .
اجنحتها متوسطة القد ذلقة . افنيكها مستدير الشكل
مؤلف من ١٢ أو ١٤ أو ١٦ ريشة . ارساغها قصيرة
اصابعها اربعة ، ثلاثة منها امامية والرابع خلفي .
موطنها العالم . معظمها من الطيور القواطع . قوتها الحبوب
والمواد النباتية . تعيش اسراباً كبيرة وكل ذكر مع انثاه
لا يفرقها غير الموت . الانثى تبيض بيضتين تحضنها
بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً .



حمام زاجل



حنجم



حنمة

٨٣٩٧ - حُمُرُور Priacantho (F). Catalufa (E).
هو الحُسرَم جنس اسماك بحرية تعيش في بحار المناطق الاستوائية.

٨٣٩٨ - حُمُرُور مَبْدُول Priacantho hamrour (F).
هو الحُسرَم الشائع، سمكة بحرية. اطلبه.

٨٣٩٩ - حُمُرُوش * Platysoma oblongum (S).
Platysome oblong (F). Platysoma oblongum (E).

حشرة نائلة واثجة جاسة من فصيلة المستيريات ورقبة غمديات الاجنحة. تألف الاجراج واخصها اجراج الصنوبر خنافسها ويرقاتها تعيش في التيرب وتحت جذوع الاشجار المقطوعة وتحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمه صغير القد يطول من ٤ الى ٥ سم. ثوبه الى السواد اللامع. رأسه صغير الجرم. فكاه ضليمان. زبانه مرفقيان، دبوسيا الاطراف. عيناه صغيرتان، ماسحتان. ظهرانه يلحف نحو ثلاثة ارباع البطن. غدهاء رباعيتا الحدود القاطية. ارساغه خماسية العقل || الانثى اصفر قدأ من الذكر واهت ثوباً منه || له جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في النهار. تساقط في آب || اليرقة عند كمال نموها تطول من ١٠ الى ١٢ سم. جسمها مردني الشكل، اسمر اللون، اسود الرأس والشرح، مشعل الجانبين الايمن والايسر، نشيط الرواجب السود || الطور الاكفالي يستمر نحو ستة اسابيع وينقضي حيث كانت اليرقة.

٨٤٠٠ - حَمْسَة * Emyd (F). Emyd (S).
Marsh-tortoise, Terrapin (E).
جنس سلاحف من فصيلة الحُسميات. انواعه عديدة متوسطة القد طولها يراوح من ٢٥ الى ٤٠ سم. ذيلها بيضي الشكل قليل الاحديداد. ثوبها الى السمرة الزيتونية. قوتها الاسماك والضفادع || اشهر انواعه حمنة قزوين وحمنة المناقع.

٨٤٠١ - حَمْسَة المَنَاقِع، بِنْت طَبَق Emyd orbicularis (S). Emyde bourbouse, Tortue bourbouse, Tortue émyde (F).
نوع من الحمنة موطنها انهر ومناقع الشرق الاوسط واروبه. طولها يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ذيلها بيضي الشكل قليل الاحديداد. ثوبها الى الحنطي الاسمر يعلوه موج اسفع.

٨٤٠٢ - حَمْسَة قَزْوِينَ Emyd caspica (S).
Emyde caspienne (F).
نوع من الحمنة موطنها بحيرات الشرق الاوسط واروبه تكثر في بحر قزوين. طولها نحو ٣٠ سم. ذيلها بيضي الشكل بارز القتر المستطيلة. ثوبها الى السمرة الزيتونية السوية اللون.

٨٤٠٣ - حَمْسِيَّات Emydidae (S).
Emydés, Emydids (F). Emydidae, Terrapins (E).
فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحف. اجناسها وانواعها عديدة تعيش في المياه العذبة مهدا البلاد المعتدلة، جميعها مفترسة قوتها الاسماك والضفادع وبعض الحشريات || اشهر اجناسها الحمنة.

٨٤٠٤ - حُمُشِد * Ruellia (S). Ruellie (F).
Spirit weed (E). Rodel (D). Ruellia (I).
جنس نباتات عشبية وجنبية معمرة برية وتزيينية من

قدأ رهو اسود الرأس والعنق والصدر والبطن الى طرف الذنابي. اغبر الظهر. اريد الجناح الانمر. اصفر المنقار والرجلين || موطنه الحيشة وجزيرة العرب. يدن في الادغال والشجيرات القليلة الارتفاع. انشاء تضيغ ييشتين تحضنها وحدها.

٨٣٨٨ - حُمُصِيَّات Boraginaceae (S).
Boraginacées (F). Boraginaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تعرف ايضاً بلسان الثور اجناسها وانواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي وطبي.

٨٣٨٩ - حَمْد Ptéroclidon (F).
هو فرخ القطاة.

٨٣٩٠ - حَمَر Tamarinier (F). Tamarind tree (E).
هو التمر الهندي، اطلبه.

٨٣٩١ - حَمَر Bitume (F). Bitumen (E).
اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض المواد الطبيعية القابلة للاحتراق الغنية بالكربون والهيدروجين. اشتعالها لاهب كثيف الدخان وقوي الرائحة المستهجنة || والحمر من الوجهة المعدنية جسم مركب من مختلف السواد الهيدروكربونية. ثقله النوعي يراوح بين ٠.٧ و ١.٢ ويكون اما مائعا او رخواً او جامداً || ومن الوجهة الكيماوية فالحمر يقسم الى اربعة اقسام: الحمر النفطية او النفط، الحمر الفروي او الكفر، الحمر المطاط او القفر والحمر الاسفلتي او الزيت || اما اختلاف هذه الاقسام فيعود الى نسبة غناها بعنصر كربور الهيدروجين.

٨٣٩٢ - حُمُرُويَّات Tremellaceae (S).
Trémellacées (F). Tremellaceae (E).
فصيلة فطور من رتبة الدعاميات عديدة الاجناس والانواع المختلفة الاشكال والاحجام. تتميز بدعاماتها الوشيجة الموثورة || منها جنس وحيد النوع يدعى «حرية» يتطفل على الكرمة فيركب الجذور عند انتشائها وينتطقها بوشاخه الحمل الاحمر اللون ثم يمتد شيئاً فشيئاً الى ان يعطب الجردة. وقد يصيب السروع القرية من التربة فيركبها من الجهة السفلى. يكافح بمركبات النحاس.

٨٣٩٣ - حُمُرَة الحُمرة : طائر من العصافير. وفي الصحاح : الحُمرة ضرب من الطير كالعصافير. ج حُمَر.

٨٣٩٤ - حُمُرَة الحِنْزِير Rouget (F). Reddish (E).
هي حصبة الحنزير مرض جرثومي.

٨٣٩٥ - حُمُرَة الشَّجَر اسم شائع يطلق على عدة اوصام مختلفة الاسباب اعماها فطور مجهرية من الرحيات تسبب احمرار الاوراق.

٨٣٩٦ - حُمُرَة الوَرَق Rougeot, Rougeaud, Rougin (F). Red-faced, Ruddy (E).
وصم فيزيولوجي يصيب اوراق الكرمة فتحمر ثم تجف وتسقط.



حُمُرُوش



حَمَة

٨٤١٢ - **جَمِصِيض** (F). Oxalide corniculée (F).
هو الجامض القرني، اطلبه . Procumbent oxalis (E).

٨٤١٣ - **جَمَط** (F). Couvrir, Ombrager (F).
To cover, To shade (E).
جَط الحَر: ستره بالنباتات العارضة. وجَمَط كَرِه: جعل عليه شجراً يستره من الشمس .

٨٤١٤ - **جَمَطُوط** (F). Psylla (E).
هو الجاط راجعه .

٨٤١٥ - **جَمَطُوطُ الاسل** (S). Livia juncorum (S).
Lilie des jons (F).

حشرة من فصيلة الجاطيات ورقية متجانسات الاجنحة . جسمها شديد الصغر يطول نحو ٣ مم . الاثنى اميز قدماً من الذكر . رأسها متوج بفلقين تتقدمان الجبهة . عيناها كبيرتان . زباناها مستفلتان الفصل الاول والثانية . كوسلها مستطيل الشكل يعلوه تخديد معترض . حشفها صغيرة . اجنحتها مستطيلة ، ضيقة . بطنها ينتهي بأشعة ذرية . قوائمها نشيطة ، معتدلة الطول || ثوبها إلى الحنطي الاسمر المتباين الماجات || تألف المواقع التي يكثر فيها الاسل لانها تعيش على نسج عصفه وأزهاره .

٨٤١٦ - **جَمَطُوطِيَّات** (F). Psyllidés (F).
Psyllidae (E).
هي الجاطيات فصيلة حشرات ، اطلبها .

٨٤١٧ - **جَمَلَك** (F).
الصغار من كل شيء . واحدته جمكة وقد غلب على القمل والقراد وما أشبه .

٨٤١٨ - **جَمَل** (F). Agneau (F).
Lamb (E).
نتاج النعجة الى ان يبلغ ستة اشهر .

٨٤١٩ - **جَمَل** (F). Ventrée (F).
Litter (E).
ما في البطن الواحد من ولد . ج جمال وأجمال .

٨٤٢٠ - **جَمَلَج** (F). Chalumeau (F).
Stalk of corn, Straw-pipe (E).

٨٤٢١ - **جَمَلَج** (F).
الحملج : قرن الثور والطبي . ج حاليج .

٨٤٢٢ - **جَمَلِيَّات** (S). Plantaginaceae (S).
Plantaginacées (F). Plantaginaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين الوحيدات القعانة العاليات المبيض . تعرف ايضاً بفصيلة لسان الحمل . انواعها نحو ١٠٠ تجمعها ثلاثة اجناس . موطنها جميع الاصقاع المعتدلة . جميعها نباتات عشبية أوراقها متقابلة أو متعاقبة . أزهارها سنبل كثيف التجميع ، أزهارها خنثوية رباعية الاسدية . ثمارها عليية .

٨٤٢٣ - **جَمِيل** (S). Restio (S).
Restie (F). Restio (E).

جنس نباتات جلمورية معمرة برية وتزيينية من فصيلة الجملييات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ متبها المناطق الحارة الافريقية والاسترالية ومدغسكر || جذاميرها مدادة سوقها متبانية الارتفاع . أوراقها القرصية خسية أما الجذمية فتعاقبة . أزهارها سنبل التجميع ، كثير الأزهار الصغيرة المتبانية الالوان .

فصيلة الاقشيات . انواعها عديدة مهدا البلاد الحارة . سوقها منتصبه زياء . أوراقها كاملة ، متقابلة ، بيضية الشكل ، زغبية النصل . أزهارها ابطية بحيلة منها البيضاء كالحليب والزرقاء والبيضاء والخمر .

٨٤٠٥ - **جَمِص ، جَمِصِي** (S). Cicer arietinum (S).
Pois chiche, Cicérole, Gairance (F). Chick-pea, Gram (E). Echte kicher (D). Cece, Pisello cece, P. cornuto (I).

واحدته حصة نباتات عشبي زراعي حولي من فصيلة القطنيات الفراشية . يزرع لحبه المأكول || مهده الشرق الاوسط وقيل بلاد فارس . جذوره حزمية سطحية . ساقه فروع قاسية وبرة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقه مركبة ، وريقاته بيضية مسننة زياء النصل . أزهاره صغيرة محورية الارتكاز لونها الى الالبيض والاحمر . ثماره قرون صغيرة بيضية الشكل معقوفة الطرف تغلف حبة الى حبتين كرويتين || وهو من الزراعات العذبة التي ترغب في الاتربة العميقة المتوسطة الاندماج المحافظة على رطوبتها || يأتي في الدورة الزراعية بعد الحنطة او الشعير . زراعته لا تستوجب الكثير من العناية . بذره يتم بين منتصف فصل الشتاء واولاخره اذ انه منوط بالاقليم وبالعوامل الجوية . لزوم الدلم من البذار يراوح من ٤ الى ٦ كيلو . اما متوسط انتاج الدلم فنحو ٨٠ كيلو . والحمص من الوجهة الغذائية ، غني بمختلف المواد اخصها الدهنية التي تقود الى السن . المثة جزء من الحب تحوى:

ماء	١٤,٢٤ %
مواد ازوتية	٢٤,٠٠ %
سليولوز	٤,١٨ %
مواد دهنية	٩,٥٩ %
دكسترين	٥,٣٨ %
مواد نشوية	٤٢,٦١ %

اما تبته فن القبيب الجيد الذي يفيد الابقار والاغنام .

٨٤٠٦ - **جَمِص بَمْبَارَه** (F). Pois bambara (F).
نبات زراعي يدعى فسق ملغاشي ، اطلبه .

٨٤٠٧ - **جَمِص جَبَلِي** (F). Chiche de montagne (F).
Mountain chickpea (E).
هو الاسطرغالوس الجبلي ، اطلبه .

٨٤٠٨ - **جَمِص سُكْرِي** (F). Lotier cultivé (F).
هو اللوطس الارجواني ، اطلبه . Garden winged pea (E).

٨٤٠٩ - **جَمِص** (F).
الحمص ما ملح وامر من النبات . الواحدة حضة وهو كفاكهة الابل تأكله عند سآمتها من الحلة وهي ما حلا من النبات . وهي متى شبت من الحلة مالت الى الحمص فكأنها تهضم به . ج حموض .


٨٤١٠ - **جَمِص مَائِي ، جَمِص هيدروجيني** (F). Hydracide (F).
Hydracid (E).

هو الحامض الذي يتكون من اتحاد الهيدروجين بعنصر حمضي خلافاً للاوكسيجن .

٨٤١١ - **جَمِصِيَّات** (F). Agrumes, Hesperidées (F).
Hesperidae (E).
لمة نباتية تشمل البرتقال والليمون والارجح والايكل الخ:



جَمِص



جَمِص

Hispid (F). Hispid, Setaceous (E). ٨٤٣٧ - حُمَيْضٌ
نعت وصفي يطلق على الاعضاء النباتية المكسوة بالهلب
الدقيق الشائك .

Diète (F). Diet (E). ٨٤٣٨ - حُمَيْضٌ
هي الامتناع عن الطعام مدة من الوقت .

Anes, Asiniens (F). ٨٤٣٩ - حُمَيْضٌ، حُمَيْرٌ، حُمَارِيَّةٌ
Asse's, Asinines (E).
جنس حيوانات وحشية وداجنة من فصيلة الحلييات .

Baobab ٨٤٤٠ - حُمَيْضٌ
راجع بوباب .

Rumex (S). ٨٤٤١ - حُمَيْضٌ
Oseille, Patience (F). Patience (E).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البطاطيات .
انواعه عديدة منها البرية التي تثبت في البور والمروج
والمواقع الرملية الرطبة ومنها الزراعية المأكولة || سوقها
فرعاء . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، رحيمة النصل . ازهارها
عنقودي || تعتبر من النباتات الطبية النافعة المضادة
للحفر واسماك المعدة . عصارتها مرطبة مفيدة تستخرج
من سحق اوراقها . ويستخلص منها الحامض الحماضي
واكسالات البوتاس || اعرف واشهر انواعه ما يقع .

٨٤٤٢ - حُمَيْضُ الْحَقْلِ* ، حُمَاضُ الْحَقْلِ ،
حُمَاضُ إِسْبَاقِي

Rumex patientia (S). Patience des jardins, Oseille
épinard (F). Patience, Herb of patience, Spinach-
dock (E). Gemüsepfeffer, Winterspinat (D). Pa-
zienza, Romice, Romice domestica (I).
نوع من الحميض المعمر البري والمزروع . ساقه فرعاء
تعلو من متر الى مترين . اوراقه معنقة ، كبيرة القد ،
مستطيلة . نصلها داكن الخضار متمتع الجوانب .
يكثُر في الارربة الرملية الرطبة . يستخرج من اوراقه
حامض الحماض .

٨٤٤٣ - حُمَيْضُ السَّوَّاقِي ، حُمَيْضُ الْمَاءِ ، حُمَاضُ
السَّوَّاقِي ، لَبَثٌ

Rumex aquaticus, R. longifolius (S). Patience aqua-
tique, P. d'eau (F). Grainless dock, Smooth fruited
dock (E). Wasserampfer (D). Romice aquatica,
R. palustre (I).
نوع من الحميض البري المعمر . يكثُر قرب المياه الجارية
وعلى ضفاف الأنهر . ساقه متشعبة . اوراقه مستطيلة
داكنة الخضار . عصارة اوراقه متوسطة الصنف .

Oseille des brebis (F). ٨٤٤٤ - حُمَيْضُ الْغَنَمِ
Sheep's sorrel (E).
هو الحميض الصغير الورق ، اطلبه .

٨٤٤٥ - حُمَيْضُ الْمَنَاقِعِ* ، سَلَقٌ بَرِّي
Rumex hydrolapathum (S). Oseille aquatique, Grande
patience (F). Water dock, Horse sorrel (E). Flussam-
pfer (D). Lapazio (I).
نوع من الحميض البري المعمر . يكثُر في المنابع والاراضي
القليلة الاندماج الرطبة . ساقه متشعبة تعلو من ٦٠ الى
١٢٠ سم . اوراقه سلقية الشكل . نصلها قائم الخضار
متمتع الجوانب .

Restiaceae (S). ٨٤٢٤ - حُمَيْلِيَّات
Restiacée (F). Restiaceae (E).
فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة . اجناسها المعروفة ٢٠
تجمع نباتات الانواع . منبتها العلوي بعض مناطق افريقية
واستراليا ومدغسكر || يخضع اجناسها معمرة عشبية او
مخشوشة . جذاميرها مدادة يرتفع منها بعض السوق .
سوقها عقدية فرعاء او سرحة . اوراقها القرصية متراكبة
اما الجذعية فتعاقبة . ازهارها سنبلية التجميع . ازهارها
صغيرة وحيدة الشق . ثمارها جراء كثيرة البزور .

Tiques (F). Ticks (E). ٨٤٢٥ - حُمَيْلَان
صغار القراد واحده حنافة وحمة وهي فوق القمناة
ودون القرادة .

Faon (F). Fawn (E). ٨٤٢٦ - حُمَيْج
الحُمُوج : الصغير من ولد الظبي ونحوه ، ويدعى رشا
وشادن وظلا .

Acidité (F). Acidity (E). ٨٤٢٧ - حُمُوضَةٌ
اكتداد مقدار الدالف ، في محلول ما ، عن رقم الاعتدال
المعين وقدره سبعة الى ما هو دون ذلك الرقم . راجع دالف .

Porte-aiguillons ٨٤٢٨ - حُمُورِيَّات ، مَنَحَسِيَّات
مرتبة حشرات من غشائيات الجناح عديدة الفصائل
والاجناس تتميز بجهاثها او مناخسها الدرية السامة .
منها النحل والذبابير والائق ، الخ .

٨٤٢٩ - حُمَيُّ التَّيْكَسَّاسِ ، حُمَيُّ مُخْرِقَةٍ
Fièvre du Texas, Babesiellase, Piroplasmose (F).
مرض سار يصيب البقر سببه بوع خبيث .

٨٤٣٠ - حُمَيُّ الدَّرِّ ، حُمَيُّ الْوَضْعِ
Fièvre du lait, F. vitulaire (F). Milk fever (E).
هو عارض الحسى الذي يصيب البقرة عقب الوضع .

٨٤٣١ - حُمَيُّ بَحْرَاوِيَّةٍ
Fièvre charbonneuse (F). Charbon fever, Pustula maligna (E).
هي الحسى الفحمية .

Theileriasis parva (S). ٨٤٣٢ - حُمَيُّ سَاحِلِيَّةٍ
Theileriose (F).

٨٤٣٣ - حُمَيُّ قَحْمِيَّةٍ ، حُمَيُّ بَحْرَاوِيَّةٍ ، بَحْرَةٌ
خبيثة
Febris carbunculosa (S).
Fièvre charbonneuse, Charbon bactérien, Anth-
rax, Sang de rate (F). Anthrax, Malignant A.,
Splenic fever (E).
مرض خبيث فتاك سار يصيب الخيل والبقر وغيرها .


٨٤٣٤ - حُمَيُّ قَلَاعِيَّةٍ ، جَلَاخُ
Aphthae epizooticae (S). Fièvre aphteuse (F). Aph-
thae, Thrush (E).
ومن اسمائها ابو لسين ، ابوريالة ، شقاق ، طوياق .
مرض معد يصيب البقر . مظهره الخارجي بثور وقلاع في
الفم وبين الاظلاف .

Brucellosis mellitensis (S). ٨٤٣٥ - حُمَيُّ مَائِطِيَّةٍ

Theileriasis annulata (S). ٨٤٣٦ - حُمَيُّ مِصْرِيَّةٍ




حميض الحقل



حميض المنافع




حميض زراعي



حميض الغنم



حميض



حميض



حناء



حناطيل

٨٤٥٦ - حِنَاءٌ* ، قَطَبٌ ، قَاغِيَّة

Lawsonia (S). Henné, Henna, Hinné (F). Henna plant, Alcanna, Camphire (E). Hennastrauch (D). Enné, Alcanna-cipro (I).

شجيرة زراعية صباغية وزينية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الحنائيات. مهدا الجزيرة العربية. جذورها حمراء ساقها واغصانها زغبية اللحاء بيض. اوراقها متقابلة، صغيرة، معنقة، اعليلجية الشكل، سنائية الزام الاخير. نصلها الى الخضار الزاهي يحسف مع العمر. ازهارها عثود متصب. ازهارها صغيرة، بيضاء اللون، فواحة العرف المستحب || اوراقها غنية بالمادة الدبغية يستحضر منها يد تجفيفها وصمغها صباغ الى الحبرة الصفراء او السوداء شائع الاستعمال تخضب به الايدي والاقدام لانه يفيد التشفات. وقد يصلح في تلوين الخشب والصوف والحرير || عرف قدام المصريين هذا النبات واستعملوه في التحنيط وهو لا يزال يزرع في مصر حتى الآن. يرغب في الاتربة الدبالية الغنية المروية.

٨٤٥٧ - حِنَاءٌ أَحْمَرُ Arbuster (F). Arbuta (E).

هو القطب، اطلبه.

٨٤٥٨ - حِنَاءٌ الْغُولُ ، حِنَاءُ الْغُولِ

هو الشنجار، اطلبه. Orcanette (F). Alkanet (E).

٨٤٥٩ - حِنَاءٌ قُرَيْشٍ Lichen fleuri (F).

هو حزاز الصخر، اطلبه. Flowering moss (E).

٨٤٦٠ - حِنَائِيَّات Lythraceae (S).

Lythrées, Lythariées (F). Lythrée (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اجناسها ٢٥ اما انواعها فكثيرة العدد منها البرية والطيبة والصناعية والزينية.

٨٤٦١ - حِنَاجَةٌ Organogenèse (F).

Organogenesis (E).

قسم من النمازة، علم الاجنة، يبحث في تكوين الاعضاء ونهتها.

٨٤٦٢ - حِنَازٌ ، تكافؤ Equivalence

هو المساواة. هذا حنز هذا اي مساو له.

٨٤٦٣ - حَنَاطُ Grainier, Marchand de blé (F).

هو بائع الحنطة. Seedsman (E).

٨٤٦٤ - حَنَاطِيْبٌ Teignes des céréales (F).

Clothes moth (E).

اسم شائع يطلق على بعض الفراشات الصغيرة القد من حشرغيات الاجنحة وفصيلة السمغيات || اشهر الحنابط حنطب الجوب وحنطب الحنطة.

٨٤٦٥ - حَنَاطِيلٌ* Trienops (S). Trienops (F).

جنس حيوان من فصيلة العاشيات. انواعه ٢ تتميز برؤسها المنخرية، الورقية، النضوية الشكل، المنتصبة، المنقسمة الى ثلاثة اقسام. اذانها بوقية لا وتدية. ثنائياها العليا فارقة || اجسامها صغيرة القد تقطول نحو ٨ سم. بسطها نحو ٣٢ سم. واذنانها ٢ سم. الثواها الى الربرة الصهباء، قائمة في الذكور زاهرة في الاناث || موطنها الشرق الادنى من العجم الى

٨٤٤٦ - حُمَيْضٌ أَمْرِيكِي ، حَنَبِيْطٌ ، حَنَبِيْطٌ

Rumex vesicarius (S). Oseille d'Amérique, Canaigre (F). Bladder-dock, Sorrel (E). Amerikanischer sauerampfer (D). Acetosa d'America, Romice d'America (I).

نوع من الحميض الزراعي الامريكي المنبت. اوراقه كبيرة النصل قليلة الحموضة مأكولة.

٨٤٤٧ - حُمَيْضٌ زِرَاعِي* ، حُمَيْضَةٌ

Rumex acetosa (S). Patience commune, Oseille commune, Algrette, Paralle, Surette (F). Garden sorrel, Sour grass, Sourdock (E). Sauerampfer (D). Acetosa, A. commune, Orecchio dei prati (I).

نوع من الحميض البري والزراعي. يرغب في الاتربة الرملية. اوراقه لسنة، مديبة العقصة، قائمة الخضار، حامضة، حامزة، مأكولة.

٨٤٤٨ - حُمَيْضٌ صَغِيرٌ الْوَرَقِ ، حُمَيْضُ الْغَنَمِ*

Rumex acetosella (S). Oseille des brebis, Petite patience, Vinette (F). Sheep's sorrel, Small sorrel (E). Kleiner ampfer (D). Romice dei campi, Acetosella piccola (I).

نوع من الحميض البري المعمر. ساقه دقيقة نحيلة متشعبة. اوراقه صغيرة القد، مستدقة، قليلة الحموضة، شديدة الحمازة. يقال انها قابضة تصلح المعدة الفاسدة.

٨٤٤٩ - حُمَيْضَةٌ هي الحميض الزراعي.

٨٤٥٠ - حَنَبِطٌ Tragla (S). Tragie (F).

Stinging nettle (E). Tragla (D). Ortica rampicante (I). جنس نباتات عشبية ليفية عارضة معمرة من فصيلة البتوميات مهدا البلاد الحارة. تزرع للزينة. ازهارها جميلة الشكل ملونة.

٨٤٥١ - حَمِيلٌ Allogène (F). Allogeneous (E).

ثمت تعريفه يطلق على كل دخیل او تزيل لا ينتمي بنسبه او عنصره الى الانساب والعناصر المستوطنة.

٨٤٥٢ - حَمِيمَةٌ Moricandie (F). Moricandia (E).

راجع سم، نبات عشبي بري من الصليبيات.

٨٤٥٣ - حَمِيمَقٌ Buteo buteo (S).

Buse variable (F). Long-legged buzzard (E). نوع من السقاوة ربع الجثة اسمر الثوب المرقط والمنق، مجزع الذيل، خفيف الطيران، سريع الانقضاض. يصيد القطا والجنادب وجميع انواع الحشرات.

٨٤٥٤ - حَمِيمَةٌ* Beloptera (S).

Béloptère (F). Beloptera (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل وفصيلة الحمينيات. انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من احافير الحقبة الايسانية، اقدم عصور الاباج الثالثي.

٨٤٥٥ - حَمِيمَتِيَّاتٌ Belopteridae (S).

Béloptéridés (F). Belopteridae (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الارجل مزدوجات الحياشيم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من متحجرات الاباج الثالثي || اعرف اجناسها الحمينية.

٨٤٧٥ - حُنْبِيْط *Oselle d'Amérique (F).*
راجع حَيْضَ امْرِيْكِ . *Bladder-dock (E).*

٨٤٧٦ - حِنَّةُ الْغُول *Orcanette vipérine (F).*
هي الشَّجَارُ الصَّبَاغِي ، اَطْلُبْهَا . *Dyer's bugloss (E).*

٨٤٧٧ - حُنْتُلٌ *Onychium*
هو في الحشرات الفصيلة الاخيرة من الرسغ تحمل مخالبين منعقلين .

٨٤٧٨ - حَنْتَمٌ هو الخندقوق الحقلِي ، اطلبه .

٨٤٧٩ - حَنْتِيْبَتٌ هو الانجذَان ، اطلبه .

٨٤٨٠ - حَنْجُجٌ *Prototype (F), Prototype (E).*
هو في الحيوان ، الفرد الذي يتحلل بجميع الصفات المثالية المطلوبة . ويدعى العشب في النبات .

٨٤٨١ - حَنْجُجٌ *Organogène (F).*
Organogenetic (E).
اسم يطلق على كل من العناصر الاربعة ، الاوكسيجن والهيدروجن والكربون والازوت ، بصفتها اصول المادة العضوية .

٨٤٨٢ - حَنْجُجِيَّةٌ *Corie (F).*
الحنجب او الحنجبة الجزء الصلب من ظهران الحشرات التابعة لطبقة نصفيات الاجنحة .

٨٤٨٣ - حَنْجُفٌ ، حَنْجُفَةٌ *Tête du fémur*
الحنجف والحنجفة : رأس الورك مما يلي الحجة . ج حناجف .
٨٤٨٤ - حَنْجُجُلٌ ضرب من السباع (اللسان) .

٨٤٨٥ - حَنْجُجُوفٌ *Ophisaurus (S), Ophisauure (F).*
جنس حيوانات زحافة عادمة الارجل من فصيلة الحنججوفيات انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة قريبة الشبه بالبدغ . اجسامها اسطوانية مستطيلة ، حراشفها معينة . اذنانها دقيقة . قوتها الحشرات . تفيد الزراعة .

٨٤٨٦ - حَنْجُجُوفِيَّاتٌ *Anguidae (S).*
Anguidés (F), Anguidae (E).
فصيلة حيوانات زحافة من العظائيات . اجناسها وانواعها عديدة اعطانها البلاد الحارة . تتميز باجسامها الاسطوانية المستطيلة العادمة القوائم .

٨٤٨٧ - حَنْجُجُولَةٌ * ، مَانُورِي

Sparus oblada, Oblada melanura (S). *Spare oblade, Oblade, Blade (F).* *Sparus melanurus (E).*
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات شائكات الزعانف . اعطانها معظم مناطق البحر الابيض المتوسط || ملجنها الحياتي كرسوعي || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبعيط ، يطول نحو ٢٥ سم . ثوبها الى الطحلة الفضية يعلوها تشيز قاطب اسمر ربة سوداء عند قاعدة الذنب || زعانفها الظهرية والشرجية مستطيلة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٨٤٨٨ - حُنْدُجِيَّاتٌ *Protrachéates (F).*
صف من الدويبات كثيرات الارجل القصيرة ، مركزها الجسموري يأتي بين المفصليات والحلققيات . معظم انواعها يعيش في الاماكن المظلمة كالكهوف والاقبية .

البحر الاحمر والاسود . تألف الكهوف والمغاور . تعيش جماعات كثيرة العدد . مسرحها من الفسق حتى فحمة الليل . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٨٤٦٦ - حُنَّاك *Stomatite (F), Stomatitis (E).*
هو التهاب غشاء الفم .

٨٤٦٧ - حَنْبَاجٌ امْرُوطٌ *

Xantholinus glabratus (S), Xantholin glabre (F).
Xantholinus glabratus (E).
حشرة جاسة واثجة وقانصة من فصيلة الدنيات ورتبة غديات الاجنحة . تألف الحقول والبراري والاحراج قوتها الحشرات الدنيا والمكن والديدان والمواد العضوية || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم . ثوبها اسود اللون ، احمر الظهران . رأسها مستغلف الجرم ، ضليع الفكين . زباناها شطيان اصفران . عيناها صغيرتان . ظهرانها يلحف نحو ثلث البطن . بطنها مخروطي المؤخر . جرامزها حراء اللون . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . تسافد في اواخر آب . تمنح المكن تحت الجشالة والاوراق الساقطة || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٢٥ الى ٣٠ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، مستغلف الرأس الامفر ، اسمر المذب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي في التربة على عمق ٢ او ٣ سم .

٨٤٦٨ - حَنْبِجٌ ضرب من القمل .

٨٤٦٩ - حَنْبُلٌ *Haricot (F), Kidney-bean (E).*
هو الفاصولياء ، اطلبها .

٨٤٧٠ - حَنْبُولَةٌ *Gousse (F), Husk, Pod (E).*
هي السنفة .

٨٤٧١ - حَنْبُولَةٌ * *Vermetus (S).*
Vermet (F), Vermetus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الحنبوليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . ملجنها الحياتي جاحي تعيش بالقرب من بعضها البعض || اصداقها حنبلية الشكل . مستطيلة ، ملولبة ، محلزنة الاطراف الزلقة الدقيقة || اعرف انواعها من عظم البحر الابيض المتوسط .


٨٤٧٢ - حَنْبُولَةُ الرِّمَالِ *Vermetus arenarius (S).*
يكثر وجودها على رمال الشواطئ المنمورة .

٨٤٧٣ - حَنْبُولَةٌ مُشَلَّطَةُ الزَّوَايا


Vermetus triquetrus (S).
يكثر وجودها قرب مصور المجاح .

٨٤٧٤ - حَنْبُولِيَّاتٌ *Vermetidae (S).*
Vermétidés (F), Vermetidae (E).

فصيلة من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها حنبلية الشكل او عنمية ، مستطيلة ، ملولبة محلزنة الاطراف الدقيقة || اعرف اجناسها واشهرها الحنبلية والكوكمية .



حنباج امروط




حنبلية



حنجوف



حنجولة



حنْدَق كَنَارِيَة



حنْدَق أَزْرَق



حنْدَق حَقْلِي



حَنْش مَبْدُول

٨٤٩٩ - حَنْش
Similaire (F). Similar (E).
من ذات المادة أو الطبيعة أو الكنه .

٨٥٠٠ - حَنْزَاب ، حَنْزَابَة ، حَنْزُوب
Pastenado (F). Wild carrot (E).
هو الجزر البري . والحَنْزَاب هو ذكر القطا وقيل جماعة القطا .

٨٥٠١ - حَنْش
Colubra (S).
Couleuvre (F). Coluber (E).
جنس حيات غير سامة من خلفيات الاخاذيد . انواعها عديدة واثوابها كذلك تغلب فيها السرة الداكنة السوداء الموج وبعض التخطيط المستطيل المختلف الالوان . اما قدها فيراوح من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . قوتها الوزغ والسماك والضفادع والمصافير والحشرات .

٨٥٠٢ - حَنْش مَبْدُول * ، أَرْقَم ، أَيْم ، أَيْن
Colubra atro-virens, Zamenis gemonensis (S).
Couleuvre commune, Zamenis commun (F).
Snake, Zamenis (E).

حية بيوض من الاحناش عادات الاخاذيد محبسات السموم . جسمها مستدق الجرم يطول نحو ١٥٠ سم . ثوبها الى الخضار الاربيد الاسمر الموج تعلوه من الخطم الى طرف الذنب رقشة حنطية تستدق عند الظهر وتحول الى بقع مرقطة مع اقترابها من البطن . مدبها الى البياض الاكدر يحوقه من جانبيه تجذيع اسود . رأسها مبسط القمة . عينها مطوقتان بخراشف صفراء اللون . شدتها ضيق الزاوية الخارجية . عدد اسنانها ٥٠ منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى . عنقها قصيرة || قائف المروج والسياسات والمواقع الرطبة والمستنقعات . قوتها كل ما دب وطار . تتسلق الاشجار في طلب الوزغ والمصافير وتخوض الماء في طلب البلاءعيط والاسماك || تسرح في النهار وحتى اوائل الليل . اخلاقها هنية ، تتحاشى الانسان . حسيها نجيع خافت متقطع || بياتها الشتوي يستمر من اواخر الخريف الى اوائل الربيع . تبلغ كامل نموها بعمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض من ١٦ الى ٣٢ بيضة مجموعة في سبتين تطورها في الجثالة المختصرة او في الرمل || تعتبر من الحيات النافعة .

٨٥٠٣ - حَنْشَات
Albuque (F). Albuca (E).
هي البوقة ، اطلبها .

٨٥٠٤ - حَنْشِيَّات
Colubridae (S).
Colubridés (F). Colubridae (E).
فصيلة من الحيات العديمات الاخاذيد منها الخنش والحفاث وغيرها .

٨٥٠٥ - حَنْطُوب الحَبُوب
Taigne des grains (F).
هو قوبة الحبوب ، اطلبها .

٨٥٠٦ - حَنْطُوب الحِنْطَة
هو عنبول الحبوب ، اطلبه .

٨٥٠٧ - حِنْطَة
Blé, Froment (F). Wheat (E).
هي القمح الزراعي المعروف . اطلب قمح . ثمارها حبوب يابسة نشوية التركيب تدعى برأ واحدة برة .
لمحة تاريخية عن اصل الحنطة : يقال ان تاريخها يعاصر المجموعة النباتية الكبرى لذلك فوجدوها على الارض كان

٨٤٨٩ - حَنْدُر ، حَنْدُرَة ، حَنْدُور
Prunelle de l'oeil (F). Eyeball (E).
هو بؤبؤ العين .

٨٤٩٠ - حَنْدُوق
Aizoon
جنس نباتات عشبية لحمية برية وزيينية من فصيلة الظهريات . انواعه المعروفة ثمانية جميعها من نباتات حوض البحر المتوسط . اوراقها لحمية مختلفة الاشكال . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل برتقالية اللون او حمراء . يستخرج من رمادها البوتاس .

٨٤٩١ - حَنْدُوق كَنَارِيَة *
Aizoón canariens (S). Aizoon de Canaries, Mésembryanthème de Canaries (F). Purslane leaved aizoon (E). Immergün (D). Aizona canariense (I).
نوع من الحندوق وهو نبات عشبي لحمي حولي تزييني . اوراقه لحمية . ازهاره جميلة كبيرة برتقالية اللون .

٨٤٩٢ - حَنْدَقُوق
Mellilotus (S). Méllilot (F).
Mellilot, Sweet-Clover (E).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة القطانيات الفراشية . اوراقها معنقة ثقلية مركبة من ثلاث وريقات . ازهارها عنقودية التجميع منها الببيض والصفر والزررق . انواعه عديدة اعرفها ما يلي :

٨٤٩٣ - حَنْدَقُوق أَيْض
Mellilotus alba (S).
Méliot blanc, M. de Sibérie (F). White mellilot (E).
نبات مرعوي عشبي معمر يعلو نحو ٢٠٠ سم . وريقاته السفلى بيضة مقلوبة والعليا مستطيلة . ازهاره بيض . يعتبر من اجود الاعلاف .

٨٤٩٤ - حَنْدَقُوق أَزْرَق * ، حَنْدَقُوق بُسْتَانِي ، كَرْكَمَان
Mellilotus Indica (S).
Méliot-bleu, M. musqué (F). Scented trefol (E). Trifoglio muschiato (I).
نبات عشبي تزييني معمر . وريقاته بيضية الشكل مقلوبة . ازهاره زرق . عرفها فواح الرائحة المسكية المستحبة .

٨٤٩٥ - حَنْدَقُوق حَقْلِي * ، حَنْتَم
Mellilotus officinalis, M. arvensis, Corona regia (S).
Méliot officinal, Mirlilot, Couronne royale, Trèfle de cheval (F). Mellilot, Honey lotus, King's clover (E). Echter steinklee, Mellilotenklee (D). Mellilot, Corona reale, Trifoglio cavallino (I).
نبات عشبي بري طبي مرعوي يعتبر من الاعشاب الصارة فيما لو كثر وجوده بين الزرع . وريقاته بيضية مقلوبة . ازهاره صفراء اللون كثيرة العدد || يقال انه يسكن المغص والقولنج وبغيد اليرقان والاستسقاء .

٨٤٩٦ - حَنْدَقُوق صَغِير الزَّهْر ، قُرْط ، حَيْلَبَة
Mollilotus parviflora (S). Méllilot à petites fleurs (F).
نبات عشبي بري واسع الانتشار يوجد في معظم المواقع والارربة الرطبة . وريقاته السفلى بيضية مقلوبة والعليا مستطيلة اسفلية . ازهاره صغيرة القد صفراء اللون .

٨٤٩٧ - حَنْدَم
Arbousier (F). Arbut (E).
شجر احمر العروق واحده حنمة . يعرف بالقطلب ، اطلبه .

٨٤٩٨ - حَنْدُورَة ، حَنْدِيرَة
الحندورة والحنديرة : حنقة العين .

Bitterapfel, Bitterzitrulle (D). Coloquinda, Popone amaro (I).

نبات حولي مداد من فصيلة القرعيات . ضروبه عديدة منها البرية والزراعية . سوقها نحيلة منبسطة . ازهارها صفراء . ثمارها صغيرة القذ مختلفة الاشكال فيها الطيخني والقرعي والبرتقالي والاجاصي . قشرها رقيقة جامدة . لها اسفنجي التركيب ، ابيض اللون ، شديد المارارة ، كان ولا يزال يستعمل في الطب . يدخل في تركيب عدة مستحضرات ويعتبر من المسهلات القوية المفعول .

٨٥١٦ - حَنْفَاء * Thalassochelys (S).

Caouane, Caouanne (F). Logger-head, Large sea turtle (E).

جنس سلاحف بحرية من اللعجيات انواعه قليلة تعيش في المتوسط وفي مياه بحار المناطق الحارة . جشها كبيرة القذ تطول نحو ١٥٠ سم . ذيلها قليل الاحديداب ، قلبي الشكل ، ذلق الطرف ، قتره منبسط السطح ، لونه الى السمرة الخطية || وهي من السلاحف المأكولة اللحم . قوتها الاعشاب البحرية .

٨٥١٧ - حَنْفِيش * Natrix viperina (S).

Couleuvre vipérine (F).

حية بيوض من الاحناش عادات الاتحاديد محتسبات السوم || جسمها معتدل الشخانة ، يطول من ٩٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها قريب الشبه بثوب الافسي المبدولة وهو الى الكهبة الخطية الموج يعملوها صف من الزراكش والتجاذيع المعترضة اللاقياسية الترتيب ، يمتد من الرأس الى طرف الذنب ، وصفان ايمن وايسر من البقع الخطية الصفراء الموج المطوقة والمذنية بالاسود || رأسها صغير الجرم ، لوزي الشكل . عينها صغيرتان . شدقها متوسط الانفراج . عدد اسنانها ٥٠ ، منها ٢٦ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى . عنقها شديدة القصر || تبلغ كامل نموها بعمر ١٦ سنة وتعيش نحو ١٢٥ سنة . تسرح في النهار وفي اوائل الليل . تألف الغابات والرياض والمناقع . قوتها الحشرات والضفادع والبلاغيط والاسماك والعظاء || الانثى تسافد بعمر خمس سنوات وتبيض نحو ٢٠ بيضة مجموع في شلتين تخفيها في التربة على عمق ٥ او ٦ سم . تعتبر من الحيات النافعة .

٨٥١٨ - حَنْقُ هو الاسبال . وحقق واحقق الزرع : انتشر سنا سنبه بعد ما يقنع .

٨٥١٩ - حَنْقُط * ، حِنْقُطَان (F). Lophophore (F). Lophophorus (E).

جنس طير من فصيلة التدرجيات . كبير الجثة ، ملون الثوب ، قنبري الرأس . قوي المنقار مستطيله ، مستدير السقط ، طويل الذيل ، املط الرسغ ، ذرب الصيصه الغنية . ج حناظ . انواعه ثلاثة مهدها الشرق .

٨٥٢٠ - حِنْقُط بَهِيَّة ، حَنْقُط * Lophophorus impayanus (S). Lophophore resplendissant, Monaul (F).

طائر من الحنقطة كبير الجثة طوله نحو ٧٠ سم . قترته قليلة الريش المستطيل الاخضر الاسفع . ثوبه متراكب الالوان البهية من الاخضر المذهب الى الابيض والاسود والاصهب والاحمر الياقوتي والبنفسجي || موطنه جبال الهند . قوته الاعشاب والثمار والحبوب والجذور والمسائل

قبل التاريخ الذي يعود بنا الى عدة عقود من القرون الخالية . هذا وقد اثبت التاريخ انها كانت مبدولة في مصر قبل المسيح بثلاثة وثلاثين قرناً وانها كانت تزرع في الصين قبل المسيح بالفين وسبعمائة سنة وانها كانت مأكولة من الهنود والشر والاشوريين واليونانيين والبرانيين والرومانيين والعرب والفرس || يقال ان مهدها الاصلي هو الشرق الاوسط وذلك لان القمح البري لا يزال حتى يومنا هذا من النباتات الطوعية في بعض مناطق لبنان وسورية وفلسطين والعراق والاناضول .

٨٥٠٨ - حِنْطَة تَرْتِيَّة Blé de Tartarie (F).

هي النظم الترتي ، اطلبه . Tatarian buckwheat (E).

٨٥٠٩ - حِنْطَة سَوْدَاء Sarrasin menager (F).

هي النظم المعروف ، اطلبه . Sarrasin corn (E).

٨٥١٠ - حِنْطُوف * Crinigerus (S).

Crinigère (F). Crinigerus (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الكعيتيات . انواعه المعروفة نحو ٥٠ موطنها المناطق الحارة والاستوائية من العالم القديم . تألف الغابات ولا تبعد عن مجاري الماء . قوتها الحشرات اخصها الفراش وبعض البزور البرية || اجسامها متوسطة القذ تطول من ٢٣ الى ٢٧ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . مناقيدها مخروطية الشكل . سبالها كثيفة اطلبه الدقيق . اجنحتها كبيرة ذلقة . اذناها مستديرة الاطراف . اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الالمن في الصفحات العليا والاصفر الاغر في الصفحات السفلى || تدثن في الاشجار الرقيقة وتركز اعشاشها عند اطراف الاغصان . اناثها تحضن بمناوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات على ثلاث مراحل في الحول .

٨٥١١ - حِنْطُوب * Trox

الحنطوب ج حناظب جنس حشرات من فصيلة الحنطليات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القذ تعيش على الصوف والريش والشعر || اشهرها واعها حنطوب الطير والحنطوب اللؤلؤي .

٨٥١٢ - حِنْطُوب الطير * Trox perrisi (S).

نوع من الحناظب صغير القذ طوله نحو ٦ مم . ثوبه الى السمرة يعملوه موج اسفع لامع . يعيش في الحممة وعلى الاشجار التي يدثن فيها الطير . قوته الريش .

٨٥١٣ - حِنْطُوب لُؤْلُؤِي * Trox perlatus (S).

نوع من الحناظب طوله يراوح من ٨ الى ١٢ مم . ثوبه الى السواد الداكن ، غمداء لؤلؤية الرقشة . يكثر وجوده من نيسان الى تشرين . يعيش على مختلف المواد العضوية اخصها الصوف واللباد .

٨٥١٤ - حِنْطُوبِيَّات * Trogidæ (S).

Trogidés (F). Trogidæ (E).


فصيلة الحناظب وهي حشرات من مغمدات الاجنحة صفيحيات القرون . اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القذ محدودة . قوتها المواد العضوية اخصها الريش والصوف والوبر والشعر واللحوم الجافة .

٨٥١٥ - حَنْظَل * ، حَدْج ، مَرَاة الصَحَاي Citrullus colocynthis, Cucumis colocynthis (S). Co-

loquinte, Chicotin (F). Colocynth, Bitter apple (E).



حِنْطُوف



حنطوب الطير



حنطوب لؤلؤي




حنظل



حنفاء




حنفش



حَنْقِطٌ




حَنْكَرَان



حِنْكَلةُ الاجاص



حِنْكَلةُ الارطُنسيا



حِنْكَلةُ القُطْنِ

٨٥٢٨ - حِنْكَلةُ الأغرُوَانِ ٥ أسْكُوشِيَتَا الأغرُوَانِ ٥
Ascochyta syringae (S).

فطر مجهري يتكاثر في الخريف فيركب اوراق الاغروان. مظهره الخارجي بقع مبعثرة لاقياسية الشكل والحجم توهم النصل على صفحته العليا. تبدو حنطية اللون موشحة ثم تنحرف الى السمرة. يكافح باستعمال احد الفواطير الخفيفة الوقع .

٨٥٢٩ - حِنْكَلةُ البُرْتُقَالِ ٥ ، أسْكُوشِيَتَا البُرْتُقَالِ ٥
Ascochyta corticola (S).

Bark blotch of citrus (E).
وصم يصيب ليمون الحامض والبرتقال سببه فطر مجهري يعترى السوق والاغصان. مظهره الخارجي لطخ موشحة مستطيلة سمراء اللون تركب اللحاء فتصدعها وتلوينها. يكافح بانزعاج اللحاء الموبوءة وبتهجير الجروح المستحدثة باحد المحاليل النحاسية ثم طليها بالمسليك .

٨٥٣٠ - حِنْكَلةُ التبغ ٥ ، أسْكُوشِيَتَا التبغ ٥
Ascochyta Ducometi, A. nicotianae (S).

فطر مجهري يصيب التبغ في سوقه واوراقه. مظهره الخارجي على الاوراق بقع لاقياسية الشكل والحجم لونها الى الصهبة الحنطية. إطارها اسمر. وهو على السوق لطخ قرحية مستطيلة تعطب الانسجة والالياف حتى الممكك. بكتيداتا شبه كروية، قياسها نحو ١٢٥×١٤٠ مي. بويقاتها شفافة بيضية، متوسط قياسها ٣×٧ مي. وهي وحيدة الخلية بمعدل ٧٥٪. ثنائياتها بمعدل ٢٠٪ وثلاثية الخلية بمعدل ٥٪. يكافح بتهجير البذار وبتمجير التربة باحد الفواطير الفعالة غير المرتكزة على الكبريت النحاس .

٨٥٣١ - حِنْكَلةُ التيرَمِسِ ٥ ، أسْكُوشِيَتَا التيرَمِسِ ٥
Ascochyta caulicola (S).

فطر مجهري يركب سوق الترمس. مظهره الخارجي بقع صغيرة، كثيفة التجميع، مستديرة، غبراء اللون أو فضية. يحرقها اطار احمر. توهم الساق ربما فتشوها وتقتضي على الاوراق. يكافح بتهجير البذار وباجتناب التربة الموبوءة .

٨٥٣٢ - حِنْكَلةُ التين ٥ ، أسْكُوشِيَتَا التين ٥
Ascochyta caricae (S).

فطر مجهري يعترى اوراق التين. مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم لونها الى الجزوة الغبراء يكتشفها اطار اسمر. تركب النصل بموازة العروق والاعصاب فتسبب يباس النسيج المنحارة. يكافح باستعمال الزيت الشتوي بعد اقبال الورق .

٨٥٣٣ - حِنْكَلةُ الجوز ٥ ، أسْكُوشِيَتَا الجوز ٥
Ascochyta juglandis (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الجوز. مظهره الخارجي بقع صغيرة مستديرة كثيفة التجميع سمراء اللون تركب النصل على صفحته العليا فتسبب يباس النسيج المنحارة. لا يستوجب المكافحة نظراً لضآلة اضراره .

٨٥٣٤ - حِنْكَلةُ القُطْنِ ٥ ، أسْكُوشِيَتَا القُطْنِ ٥
Ascochyta gossypii (S).

فطر مجهري يصيب القطن في فروعه واوراقه وعفازاته. مظهره الخارجي بقع مستديرة حنطية اللون زيتية المواج تركب الاوراق فتعرقل سير النسج وتركب العروق واليلىم

والحشرات والديدان. انشاء تبيض من ١٢ الى ١٦ بيضة تحضنها وحدها في عش تدثه في الجنبات والشجيرات الدغلة .

٨٥٢١ - حِنْقِطٌ صِينِي (S). Lophophorus lhuysii (S).
Lophophore de Lhuys (F).

طائر من الحنقطة كبير الجثة طوله نحو ٨٥ سم. قنزته كثيفة الريش القصير. ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الازرق الاسفع المواج. موطنه جبال الصين. مجثمه الاشجار الافقية الاغصان .

٨٥٢٢ - حِنْقِطٌ مَلَقَّة (S). Lophophorus sclateri (S).
Lophophore de Sclater (F).

طائر من الحنقطة كبير الجثة. طوله نحو ٧٠ سم. قنزته صغيرة، قصيرة، قليلة انريش. ثوبه متراكب الالوان يكثر فيه الاصهب والاخضر المذهب. موطنه ملقة والهند الصينية .

٨٥٢٣ - حَنْكَثٌ ضرب من النبات (اللسان) .

٨٥٢٤ - حَنْكَرَانٌ * (F). Helotarsus (S). Hétotarse (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الحداء وفصيلة الصقريات يتميز باستطالة سقطة وبقصر عنقه وذنبه. ثوبه متراكب الالوان. رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى السواد. ظهره الى الصهبة الحنطية المايقة، ظاهر سقطة ينحرف من الصهبة الشقراء الى الرصاصية، باطنه الى الابيض القضي. منسره اصفر اللون، احمر الانتشاب، ازرق البهرة. موطنه البلاد الافريقية، يعيش ازواجا ذكراً وأنثى. يألف الجبال والفيافي. قوته الافاعي على اختلاف اجناسها واحجامها. يقتنص الطباء الصغيرة والرتال والحملان. يدرن عشه في الاشجار. انشاء تبيض من ٢ الى ٤ رفئات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع .

٨٥٢٥ - حِنْكَلةُ ٥ ، أسْكُوشِيَتَا ٥ Ascochyta

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصنفيات. بكتيداتا محضونة، كروية أو بيضية الشكل، جوها مسودي التركيب. بويقاتها بيضية، شفافة، وحيدة الخلية في اول عهدها ثم ثنائياتها. انواعه عديدة بعضها يركب الاوراق والتار فيقرحها ويؤذيها. أشهرها ما يلي .

٨٥٢٦ - حِنْكَلةُ الإِجاص ٥* ، أسْكُوشِيَتَا الإِجاص ٥
Ascochyta piricola (S).

فطر مجهري يصيب اوراق الاجاص فيؤذيها. مظهره الخارجي بقع مبعثرة تبدو صغيرة فضية اللون ثم تتسع وتمتد بدون قياس فيبلغ قطرها نحو ٤ مم. ويصبح لونها الى الغبرة الصفراء الزاهية يتوسطها محور فضي ويجرقها اطار ضيق الاتساع قرمزي اللون. يركب الاوراق في خلال شهر آب فيدفعها الى الاعمال الباكر. يكافح، اذا دعت الحاجة، باستعمال احد الفواطير المتوسطة الوقع .

٨٥٢٧ - حِنْكَلةُ الأرطُنْسِيَا ٥* ، أسْكُوشِيَتَا الأرطُنْسِيَا ٥
Ascochyta hydrangeae (S).
Maladie des hortensias (F).

فطر مجهري يعترى فروع واوراق الارطنسيا. مظهره الخارجي بقع لا قياسية الشكل والحجم تبدو طابقة اللون الاخضر ثم تنحرف نحو السمرة. يكافح باستعمال اوكسيكلوريد النحاس المركز ١٪ .

منها البرية والزراعية . جميعها صغيرة القد . سوقها فرعاء .
اوراقها كاملة متماقبة سنانية النصل الضيق . ازهارها
لا تذبل وهي طويلة الزناد ، فارشة البتلات ، كثيفة الرؤوس
الحشني الشذور . اعرف أنواعه واشهرها الحنوة الحولية .

٨٥٤٣ - حَنُورَة حَوْلِيَّة *

Xeranthemum annuum (S). Xéranthème annuel,
Immortelle de Belleville, Œillet de Belleville (F).
Dry flower, Immortelle flower (E). Papierblume (D).
Xerantemo, Perpetuini (I).

نوع من الحنوة وهو نبات عشبي حولي . أزهاره
لا تذبل . ضروبه عديدة . ساقه فرعاء تعلو من ٥٠ الى
٦٠ سم . اوراقه لسنة ، سنانية . ازهاره طويلة كثيرة
العدد ، مختلفة الالوان التي تتغير مع الضروب . ازهاره
يستمر من حزيران الى آب .

٨٥٤٤ - حَنُور ٥ ، عَصْفُور فَأَرِي (S). Colius (S). Coliou, Oiseau-souris (F). Colius (E).

جنس طير من فصيلة الحنوريات . انواعه المعروفة سبعة
جميعها من طيور المناطق الافريقية الحارة . تعيش جماعات
متفاوتة العدد . تألف الادغال وتسلق الاشجار بخفة وتعدو
بين الاعشاب كالفتران بما دعا الى نعتها بالمصافير الفأرية .
اثوابها الى الرمدة . ريش ظهورها وبطنها واغانيها دقيق ،
قصير ، ناعم ، حريري الملمس || قوتها الثمار والبذور
والزبعات والنواصي || تدثن اعشاشها في الاشجار والادغال
الشائكة . تحبها بالالفاف والحشائش وكثيراً ما تقيها
الواحد قرب الآخر فتبدو كالصفوف المتتابعة || اشهر
انواعه الحنور الابيض المحاسر .

٨٥٤٥ - حَنُور اَبْيَض المَحَاسِر ٥ ، تِهِيْط

Colius leucotis (S). Collou à joues blanches (F).
Collus leucotis (E).

نوع من الحنور . اعطانه تمتد من تهام حوض البحر الاحمر
الى الحبشة والسودان والكنزو . طوله نحو ٣٧ سم . ثوبه الى
الريدة ، ظهره عايق اللون . بطنه الى الريدة الحنطية الشهباء
المواج . جبهته الى السمرة . محمره الى الصفرة التبنية .
زوره الى الريدة الرمادية . منقاده ازرق المخطم الاعلى ،
احمر الاسفل . رسفاه الى الحمرة المرجانية || يعيش جماعات
قليلة العدد . سر به يعد من زوجين الى خمسة ازواج . يألف
العيص والاجام والاحراج الوعرة || طيرانه قصير الشوط
ولا يستطيع اليه سبيلاً الا من على ارفع الاغصان او قن
الاشجار حيث يرمي بنفسه ليتمكن من التحليق قليلاً ||
قوته ثمار النباتات البرية وان تعذرت عليه فلا يعف عن
ثمار النباتات المزروعة ويطلبها حيث تكون ان في المزارع
او قرب المساكن || ومن عاداته المألوفة انه يمضي الليل
في مجاثم معينة تجتمع فيها جميع اسراب المنطقة مها كان
عندها ان مئة او الف . وهو يمضي الليل معلقاً برجليه
كالخفاش لا جاثماً فوق الفصن كسائر الطير || الاثني
تضع من ٦ الى ٧ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو
١٥ يوماً .

٨٥٤٦ - حَنُورِيَّات ٥ Collidae (S). Collidés (F). Collidae (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم سنيات المناقير . انواعها
المعروفة سبعة يجمعها جنس واحد . موطنها يمتد من افريقية
الجنوبية الى الوسطى والشرقية || اجسامها ربعة . مناقيدها
قصيرة . مخاطمها العليا محدبة تنتهي بهرة محبنة . اجنحتها

فتبدو عليها أشد سمرة وواضح اطاراً || يكافح بتغير
القطن باحد الفواطير غير المرتكزة على النحاس .

٨٥٣٥ - حَنَكَلَة هورتوروم ٥ ، أَسْكُوشِيَّتَا

Ascochyta hortorum (S). هورتوروم ٥

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات من الفصيلة الباذنجانية
اخصها الباذنجان والبندوره كما يصيب الارضي شوكي .
مظهره الخارجي على الباذنجان قروح عفنية تمتدق سوق
الشتول الفتية عند انتشارها من التربة فتقضي عليها . ويكون
في الشتول البالغة والمثمرة قروح لا قياسية الشكل والحجم
لونها الى السمرة تركب السوق والفروع والاوراق والثمار
فتعطيها وتلويها || يتكاثر ويفتك في المواقع الحارة
الرطبة || وهو على البندوره قروح فسيحة مستطيلة حنطية
اللون او غبراء تركب العروق فتسبب يباس البشرة
الذي يعقبه يباس وانفجار النسيج الحليوية . وقد يكون
على الوراق بثوراً مختلفة الاحجام تبدو حنطية ثم تيبس
فتسبب نخر النسيج . وهو في الثمار قروح حنطية ثم
سمره اللون ترفع النسيج المنحارة الى ان يتم تطورها ثم
تخشفها وتصلبها وتقودها الى العفن || يكافح باستعمال
اجد الفواطير الفعالة المرتكزة على النحاس .

٨٥٣٦ - حَنَكَلِيْس Anguille commune (F). Eel (E).

هو الانقليس ، اطلبه .

٨٥٣٧ - حَنَكَلِيْسِيَّات Anguillidés (F).

Anguillidae, Eels (E). هي فصيلة الانقليسيات ، اطلبها .

٨٥٣٨ - حَنُكُور Dromas ardeola (S).

Dromas (F). Crab plover (E).

طائر من طوائف الساق وطيور الماء مركزه الخليق بين دجاج
الارض والشنطلي وهو وحيد الجنس والنوع . ابيض الرأس .
اسود الظهر والمنقار الكبير ، اسمر البطن والرجلين .
موطنه حوض البحر الاحمر والهند وسيشل ومدغسكر .

٨٥٣٩ - حَنَكِيَّات Gnathobdellidés (F).

Gnathobdellides (E).

رتبة العلق الحنكيات من صف العلقيات .

٨٥٤٠ - حَنَمَة *

Carine passerina, Glaucidium passerinum (S). Che-
vêchette, C. naine (F).

طائر من البوميات وعارة الفداديات . وهو اصغر انواع
الفصيلة قدماً واكثها انسجماً . طول الذكر نحو ١٨ سم .
وبسطة سقطيه ٤٢ . الانثى طولها نحو ٢٠ سم . وبسطة
سقطيها ٤٧ وثوبها اعقب لوناً من ثوب الذكر || موطنه
جميع البلاد المعتدلة الحرارة . يألف الاحراج ويمضي
الصيف في الجبال العالية ثم يقترب من الاماكن الآهلة
مع شتيع الشتاء وزمهريره || يدثن عشه في صدوع
وتجاويف الاشجار . اثناء تضع اربع بيضات صغيرة
مستديرة غبراء اللون تحضنها وحدها || يلتبس قوته عند
الغروب وفي الصباح الباكر . يصيد الفار وجميع انواع
الحشرات .

٨٥٤١ - حَنَن الحن هو الجمل ، اطلبه .

٨٥٤٢ - حَنُورَة Xeranthemum (S). Xéranthème (F).

جنس نباتات عشبية من فصيلة المركبات . انواعه قليلة



حنكلة هورتوروم



حنكور



حنمة




حنوة حولية



حنور ابيض المحاسر

٨٥٥٨ - حَوَّافِيَّات * Trochozoaires (F).
اسم يطلق على جميع دويبات الحلقيات والرخويات المميزة بالحوافة .

٨٥٥٩ - حَوَّام Pernis (S). Bondrée (F).
جنس طير من عائلة السقاوات ونصية الصقريات .
انواعه اربعة جميعها مستطيلة الشكل ، هيفاء القد ، طويلة
الجنح والذنب ، قصيرة الارباع المسرولة . انواها تختلف
 باختلاف النوع والعمر وبين الذكر والانثى وهي متراكبة
الالوان الموشحة والموشمة . مناسرها سود . عيونها صفراء أرجلها
حنطية || قوتها العطاء والضفادع والزناير والحشرات
لذلك فهي من الطيور النافعة التي يجب ان نسلّم من اذى
الانسان .



حَنِيَّت

٨٥٦٠ - حَوَّام إفريقي Pernis tachardus (S).
Bondrée africaine (F).
طائر من الحوام موطنه افريقية الشرقية ومدغشكر . طوله
نحو ٦٠ سم . ظهره اسمر الريش الموشح . بطنه يميل الى
الزرقا يعلوه وشم ابيض . قوته العطاء وجميع انواع الدويبات
والحشرات .

٨٥٦١ - حَوَّام النَّحْل * Pernis apivorus (S).
Bondrée apivore (F). Honey buzzard (E).
طائر من الحوام طوله نحو ٦٠ سم . وبسطه ١٣٠ .
وهو من الطيور القواطع التي تجوب المناطق الحارة والمعتدلة .
رأسه أطحل ازرق . ظهره وسفطاه الى السفرة الموشمة .
بطنه الى الرمادي الازرق يعلوه توشيم ابيض . ذنبه اسمر
اللون تعلوه ثلاثة خطوط سود معترضة || قوته الزناير
والعطاء والضفادع والحشرات .



حوام النحل

٨٥٦٢ - حَوَّام مُتَوَج Pernis cristatus (S).
Bondrée huppée (F).
طائر من الحوام يتميز بقنبرة صغيرة تعلو مقدم الرأس .
موطنه الهند وجاها . ريشه متراكب الالوان المتداخلة ،
براق الموج . قوته الدويبات والحشرات .

٨٥٦٣ - حَوَّام مُدَوَّك Pernis longicauda (S).
Bondrée à longue queue (F).
طائر من الحوام يتميز بطول ذنبه وبضارة الوان ريشه .
موطنه البلاد الحارة . يكثر قرب المياه الجارية : قوته
الحشرات والضفادع والدويبات .

٨٥٦٤ - حَوَّابَة ، حَيَّابَة Parenté du côté maternel
القرابة التناسلية الانثوية .

٨٥٦٥ - حَوَّت الجَنِّ ، حَوَّت الحَيَض Gobie (F). Goby (E).
هو القويون جنس اسماك بحرية ونهرية .

٨٥٦٦ - حَوَّت جَنُوبِي Poisson austral (F).
Piscis australis (E).
الحوت الجنوبي كوكبة نجوم جنوبية الموقع مركزها جنوبي
برج الدلو . رأس الحوت الى المشرق وذنبه الى المغرب ||
عدد نجومها ١٤ والعرب تسمي النير الذي على فم « فم
الحوت » .

٨٥٦٧ - حَوَّة Louvet (F). Wolf-coloured, Grey (E).
من اثواب الخيل . وهي شقرة الى سواد . يقال للذكر
أحوى وللانثى حواء .

قصيرة . اذناها مستطيلة . ومن ميزاتها انها تحرك اصابعها
كيفية تشاء فتجعل الاربع في صف واحد || قوتها الثمار
والبنور والزمعات والنوامي .

٨٥٤٧ - حَوْنُ الْبَرَّاز Adonide automnale (F).
هو الادونيس الخريفي ، اطلبه . Autumn adonis (E).

٨٥٤٨ - حَنِيَّت * Hinnites (S).
Hinnite (F). Hinnites (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة المشاقيات . انواعها المعروفة عديدة بعضها من
متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر منتشر في معظم
بحار العالم || اصداقها شبه مخروطية الشكل ، لامتناهية
المصاريع الشعاعية التخديد طولاً والحزرة عرضاً . تتميز
بغزارة ليفها في عهد النشوء وبقلته في عهدي الكمال
والاستقرار || تعيش لاصقة بالصخور المتوسطة الغور .

٨٥٤٩ - حَنِيِير Voûte (F). Arch, Vault (E).

٨٥٥٠ - حَنِيِيرَة Clé de voûte (F). Keystone (E).

٨٥٥١ - حَوَّ ، نَمَل سَلِيمَان Fourmi de Salomon (F).

نوع من النمل الاخر صغير القد واسع الانتشار يكثر
وجوده في معظم مناطق الشرق الاوسط .

٨٥٥٢ - حَوَّابَة * Carpoceras (S). Carpocère (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الخنازيريات .
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم الاصقاع الحارة
والاستوائية || ازهارها بيضاء اللون او وردية . اعرف
انواعها واشهرها الحوابة المقرنة .

٨٥٥٣ - حَوَّابَة مُقَرَّنَة * Carpoceras oxyceras (S). Carpocère cornu (F).

نوع من الحوابة . منبتها بعض اصقاع الشرق الاوسط .
ساقها قليلة الفروع ، منتصبة تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم .
اوراقها السفلى سنانية النصال المستطيلة . اوراقها الساقية
والعليا ضيقة النصال الطويلة . ازهارها وردية اللون .
تتويرها صيفي . ثمارها غرنوبية مقرنة حادة القرون ،
ثلاثيتها . بزورها صغيرة مفلطحة منقطة .

٨٥٥٤ - حَوَّار Chamelet (F). Young camel (E).
ولد الناقة من حين يرضع الى ان يفطم ويفصل عن امه
فهو اذ ذاك فصيل . ج أحورة وحيران وقالوا ايضاً
حوران .

٨٥٥٥ - حَوَّارَة Marne gypseuse (F).
Gypseous marly (E).
تراب كثر فيه نسبة المواد الصلصالية اللزجة بعد الجصية
ومزجت مع القليل من الرمل الناعم وبعض المواد الاخرى .

٨٥٥٦ - حَوَّار هو الجمعان الكبير .

٨٥٥٧ - حَوَّافَة Trochosphère (F).

اسم يطلق على كل دموعصة من الحلقيات والرخويات تتميز
بجسمها الشبه ابجاسي الشكل يطوقه حزام من اللمب الهزاز .
حركتها اندفاعية كالندودة .



حَوْتَنَة



حَوْذَل



حَوْذَان اَسْبَوِي



حَوْذَان تَنِي



حَوْذَان حَرِيف



حَوْذَان حَقْلِي

٨٥٧٧ - حَوْذَان اَسْبَوِي * ، شَقَائِق النَعْمَان ، كَبِينَكَج ، كَف السَّبْع ، كَف الضَّبْع ، لَالَة

Ranunculus asiaticus (S). Renoncule d'Orient, R. des fleuristes, R. des jardins, R. asiatique, Rouma, Hasard (F). Asiatic crowfoot, Persian buttercup, Turban (E). Ranunkel, Asiatischer hahnenfuss (D). Ranuncolo, R. di Persia, R. scempio (I).

نوع من الحوذان الزراعي التزييني المعمر. ضروره عديدة. يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقه داكنة الخضار مسننة النصل. ازهاره فردي التجميع تاجي الارتكاز. ازهاره خاسية التركيب ومنها مكبسة. الوانها عديدة تختلف مع الضروب. فيها الالبيض والاصفر والاحمر والبرتقالي والموشح.

٨٥٧٨ - حَوْذَان تَيْنِي * ، شَقِيق الجَبَل ،

Ranunculus ficaria (S). مَامِيَزَان صَفِير Renoncule ficarioïde, Eclairette, Petite chéridoine (F). Celandine, Lesser celandine, Marsh pilewort (E). Scharbocks hahnenfuss (D). Ranuncolo ficario, Celidonia minore (I).

نوع من الحوذان المعمر البري الجبلي المنبت. يعلو من ٥ الى ٢٠ سم. ساقه منتصبه وحيدة الزهرة الناجية البيضاء اللون. اوراقه مستعرضة الشكل مفرصة النصل البحري الخضار، تشبه ورق التين.

٨٥٧٩ - حَوْذَان حَرِيف * ، شَقِيق السُّفُوط ،

Ranunculus acer (S). زِرْ ذَهَبِي Renoncule acre, Bassin d'or, Bouton d'or (F). Buttercup, Blister plant, Crowfoot (E). Butterblöme, Scharfer hahnenfuss (D). Ranuncolo acre, Batrachio, Bottone d'oro (I).

نوع من الحوذان الزراعي التزييني المعمر. يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ساقه منتصبه زباء. اوراقه كثيرة التفرييض والتشريم، مسننة الحافة، زغبية النصل. ازهاره ذهبية اللون. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران.

٨٥٨٠ - حَوْذَان حَقْلِي * ، شَقِيق حَقْلِي ، كَف الهَر

Ranunculus arvensis (S). Renoncule des champs, Bassinet des champs (F). Corn buttercup, Corn crowfoot (E). Acker hahnenfuss (D). Ranuncolo dei campi, Bella pulcella (I).

نوع من الحوذان البري الحولي يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم. ساقه قليلة الزغب. اوراقه السفلى بيضية اسفينية مسننة، أما العليا فمفرصة عيقة التشريم الرمحى الشكل. ازهاره بيض مستعرضة البتلات. ازهاره ربيعي.

٨٥٨١ - حَوْذَان شَرِير ، حَوْذَان شَقِيف ، زَغَلِيل القِسْقِ

Ranunculus sceleratus (S). Renoncule scélérat (F). Celery leaved crowfoot, Water celery (E). Giftahnenfuss (D). Ranuncolo scellerato, R. di padule (I). نوع من الحوذان البري الحولي يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقه منتصبه فرعاء. اوراقه السفلى والعليا ثلاثية التفرييض. خرقية التشريم. ازهاره بيض. ازهاره ربيعي. يكثر في الآتربة الرملية الرطبة || يعتبر من النباتات السامة الخبيثة.

٨٥٦٨ - حَوْتَنَة ٥ Cétographie (F).

Cetography (E).

الحوتنة علم يبحث في تحلية الحيتان وملاجئها الحياتية.

٨٥٦٩ - حَوْتِيَّات Cétacés (F).

Cetacea, Whales (E).

الحوتيات أو الحيتان رتبة حيوانات مائية من الثدييات. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة تجسمها سبع فصائل تنضم الى مرتبتين كما هو مبين في الجدول التابع || اجسامها متفاوتة القد، شبه وضعية الشكل، تكثر فيها الضخامة والاستطالة. جميعها ثنائية المحاصج الحوضية الارتكاز والتي تقوم مقام الزعانف. محاصجها رباعية الاصابع المغلوقة، مستطيلة الشكل، قليلة العرض، ذلقة الطرف. زعانفها الذيلية مغلوقة، افقية الانتشاب وليست عمودية كما في الاسماك. ضرورها بطنية الارتكاز، ثنائية الاخلاف || ملجئها الحياتي جماعي عند معظم الانواع. جميعها لاحمة، قوتها الاسماك والرخويات والقشريات.

٨٥٧٠ - حَوْت Veine du foie (F). Liver vein (E).

الحوت: عرق الحوتاء.

٨٥٧١ - حَوْتَاء Foie (F). Liver (E).

الحوتاء هي الكبد.

٨٥٧٢ - حَوْتَمَة * ، سَوَسَن اَنَمَر

Pardanthus (S). Pardante, Iris tigré (F).

Pardanthus (E).

نبات عشبي جذموري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة السوسنيات. مهد الشرق الاقصى وقد انتشرت زراعته التريينية في معظم بلاد العالم || اوراقه شبه عصفية الشكل، ميزابية النصل. شماريخه ربيعة تنتهي باعذاق متشعبة. ازهاره صفراء اللون منمشة بالارجواني || زراعته لا تتطلب عناية خاصة لانه نبات سبروتي يحود في جميع الاقربة الزراعية وفي معظم الاقاليم.

٨٥٧٣ - حَوْتَجَة ، حَوْتَجَنَة Rosier rouge (F).

Red rose-tree (E).

الحوتجة والحوتجة هي الوردة الحمراء. ج حريم وحريم.

٨٥٧٤ - حَوْذَل * ، مَنَجَبِي Cercocibus (S).

Mangabey, Cercocèbe (F).

جنس قروذ ذبالة من فصيلة الطهرسيات. انواعه ٦ موطنها بعض مناطق افريقية الشالية اخصها ليبريه. اجسامها صغيرة القد ريمة تطول نحو ٥٠ سم. اذنانها مستطيلة اثوابها الى الصهبة الغبراء. حنار وجوهها ابيض. اخلاقها رضية رغم شدة نزقها ومرحها.

٨٥٧٥ - حَوْذَلَة Petit bois (F). Grove (E).

هي الاكة.

٨٥٧٦ - حَوْذَان Ranunculus (S). Renoncule (F).

جنس نباتات عشبية من سبط الحوذانيات وفصيلة الشقيقيات. انواعه نحو ١٥٠ معظمها معمر وبعضها حولي. منها البرية والزراعية والتزيينية والمنفعة والمائية والسامة والطبية || ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الالبيض. اشهرها ما يتبع.

رتبة الحوتيات

الموتبة	الفصيلة	أشهر الأجناس
ريشيات الأسنان Mysticètes		
		Baleine franche بال الشمال
		Baleine australe بال الجنوب
		Baleine de Biscaye بال المحيط
		Baleine du Japon وال
		Baleine pygmée بال أزعب
	Balaenidés	Mégaptère Boops كُبعة القطب، جمل البحر
		Mégaptère Lalaudi كُبعة الجنوب
		Mégaptère indienne كُبعة الخليج
		Rorqual bleu هرْكول أزرق
		Rorqual commun هرْكول معروف، منارة
		Rorqual boréal هرْكول القطب
		Rorqual rostré هرْكول حنْزومي
		Rorqual à bosse هرْكول سيم
	Balaenopteridés	
		Baleine grise فال
متممات الأسنان Denticètes		
		Narval قَوْقي، حَرِيش البحر، كَرَكْدَن البحر
		Béluga بالوغه، حَقَش رُوسي
	Delphinaptéridés	
		Cachalot عُمير
		Ziphius زِفْيوس
		Hyperoodon دَحاس
		Mésoplodon جَناف
	Physétéridés	
		Dauphin دَلْفِين، دُخَس
		Lagénorhynque لَجَاد
		Tursiops تَرْسُوب
		Delphinorhynque, Steno دَحاس
		Marsouin دُخَس، خَنْزِير البحر
		Orque أَرْكَة
		Pseudorque دُخْشَم
		Grampus جَرَش
		Globicéphale جَرَّاقَة
		Marsouin noir دُخَس أسود
	Delphinidés	
		Plataniste جَبَحَل
		Inia إِنْيا، بُونُو الأمازون
		Poutoporia بُونوبوريا، جَبَحَل الرّيو
		Lipotes لِيوت، جَبَحَل العين
	Platanistidés	

اوراقه معنقة طويلة الزناد بيضية الشكل قلبية القاعدة طولها نحو ١٢ سم. نصلها مالمس الصفحة العليا العابقة الخضراء، خلي السفلى البيضاء الموج || زعماته غليظة دبكة بلسية العرف .

٨٥٩٠ - حَوْر رَجْرَاج *

Populus tremula (S). *Peuplier tremble, Tremble* (F). *Aspen, Asp tree, Trembling poplar* (E). *Aspenbaum, Espe, Zitterpappel* (D). *Ploppo tremolo, P. libico, P. pendulo, Tremula* (I).

نوع من الحور يعلو من ١٥ الى ٣٠ م. اوراقه الفتية قلبية الشكل خلية النصل على صفحتيه . اوراقه البالغة معنقة مستديرة نصلها مالمس الصفحة العليا البحرية الخضراء، ازغب السفلى، منشاري الحافة، طويل الزناد القاتم الخضراء .

٨٥٩١ - حَوْر عَطِير

Populus suaveolens (S).

Peuplier odoriférant (F).

نوع من الحور الشرقي المنبت يعلو من ١٠ الى ١٥ م. اوراقه معنقة قصيرة الزناد بيضية الشكل طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٤، نصلها اخضر الصفحة العليا الملساء البشرة، ابيض السفلى الخملية || ازهاره وزعماته عطرية .

٨٥٩٢ - حَوْر غَارِي

Populus laurifolia (S).

Peuplier à feuilles de laurier (F).

نوع من الحور الشرقي المنبت . يعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. افئانه زغبية البشرة لونها الى الكهبة الصفراء . اوراقه معنقة، قصيرة الزناد، غارية الشكل واللون، مدبية الزام الاخير تطول نحو ٩ سم. نصلها مالمس البشرة مسنن الحافة .

٨٥٩٣ - حَوْر فُرَاتِي * ، حَرَب ، مَرَسِيَس

Populus euphratica (S). *Peuplier de l'Euphrate, P. de Mésopotamie* (F). *Willow* (E). *Weiden* (D). *Ploppo* (I).

نوع من الحور. اقليمه شاسع الحدود يمتد من الصين الى افريقية الشمالية . يكثر وجوده على ضفاف الفرات . يعلو من ١٥ الى ٣٥ م. افئانه زباء اللحاء . اوراقه معنقة مستديرة نصلها بارز العروق زغبية الصفحة السفلى مسنن الحافة ، بحري اللون القاتم .

٨٥٩٤ - حَوْر فَيْضِي ، حَوْر يَابَانِي

Populus sieboldi (S). *Peuplier argenté, Tremble du Japon* (F).

نوع من الحور الشرقي الياباني المنبت . يعلو من ١٥ الى ١٨ م. افئانه ونواميه خلية البشرة البدة الزغب . اوراقه معنقة طويلة الزناد الاسطواني الازغب ، قلبية الشكل ، مستديرة القاعدة ، مدبية الزام الاخير ، خلية النصل على صفحتيه .

٨٥٩٥ - حَوْر فِيرَجِينِيَة

Populus virginiana (S).

Peuplier de Virginie, P. Suisse (F).

نوع من الحور يعلو من ٣٥ الى ٤٠ م. ازهاره مبهكارة تسبق الاوراق من الاسبوعين الى الثلاثة اسابيع . اوراقه معنقة مشرومة تطول نحو ١٠ سم. زنادها احمر اللون طولها نحو ٤ سم .

٨٥٩٦ - حَوْر كَرُولِينَة

Populus angulata (S).

Peuplier de la Caroline (F).

نوع من الحور يعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. افئانه زيتية

٨٥٨٢ - حَوْدَان مَائِي * ، شَقِيْق مَائِي

Ranunculus aquatilis (S). *Renoncule aquatique, Grenouillette, Mort aux vaches* (F). *Water anemone, Water crowfoot* (E). *Wasser hahnenfuss* (D). *Ranuncolo acquatico, Ranonchiella* (I).

نوع من الحودان البري المعمر يكثر في المناقع وعلى ضفاف الماء . يعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه طويلة الزناد . ازهاره صفراء . بثلاثها بيضية الشكل مقلوبة || يعتبر من النباتات السامة التي تؤذي المواشي انحصها الابقار .

٨٥٨٣ - حَوْدَان مَدَاد * ، رَجُلُ الْغُرَابِ الْمَدَاد

Ranunculus repens (S). *Renoncule rampante, Clair bassin* (F). *Creeping buttercup, Cruping crowfoot* (E). *Kriechender hahnenfuss* (D). *Ranuncolo strisciante, Capo di turco* (I).

نوع من الحودان المعمر . ساقه منتصبه فراء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. جذوره سطحية مدادة . ازهاره صفراء . ازهاره يستمر من ايار الى تموز . يزرع للتزيين . يرغب في الأتربة المتوسطة الاندماج الرطبة .

٨٥٨٤ - حَوْدَانِيَّات

Renonculées سبط من فصيلة الشقيقيات . اجناسه وانواعه عديدة اعرفها الحودان .

٨٥٨٥ - حَوْر ، جَوْن ، أَلِيَة

Alcor, Alioth, Allath (F). *Alcor, Alioth* (E).

الحور والجون والألية ثلاثة أسماء لنجم واحد من كوكبة الدب الأكبر اي نبات ثمنش الكبرى . مركزه قرب النعش ويليه العناق ثم القائد .

٨٥٨٦ - حَوْر ، حَوْر ، حَوْر

Populus (S).

Peuplier (F). *Poplar* (E).

جنس الشجار حرجية وزراعية صناعية من فصيلة الصفصافيات . ترغب في الاراضي الرطبة . تتميز بسرعة نموها . يوشبها ابيض ، خفيف ، لدن ، شائع الاستعمال الصناعي المختلف المرامي ، من عيدان الثقاب الى صناعة الورق . || انواعه عديدة وضروبه كثيرة نخص منها بالذكر ما يلي .

٨٥٨٧ - حَوْر أَيْض

Populus alba (S).

Peuplier blanc, P. cotonneux, Abele, Franc picard (F). *White poplar, Abele tree* (E). *Weisse pappel, Silberpappel, Abele* (D). *Popolo bianco, Albarello, Gattero* (I).

نوع من الحور يعلو من ٢٠ الى ٣٠ م. نواميه خلية البشرة الثلجية اللون . اوراقه البالغة معنقة طويلة الزناد الازغب ، خامسة التفصيص ، بحرية الصفحة العليا ، ثلجية السفلى الكثيفة الازغب القطي .

٨٥٨٨ - حَوْر أَسْوَد * ، حَوْر رُوْمِي

Populus nigra (S). *Peuplier noir, P. franc, Liard* (F). *Black poplar* (E). *Schwarzpappel* (D). *Ploppo nero, P. da polli, P. tuberino* (I).

نوع من الحور . يعلو من ٢٥ الى ٣٠ م. افئانه ونواميه زغبية . اوراقه معنقة ، قلبية ، ملساء النصل السوي اللون على صفحتيه العليا والسفلى || من ضروبه المشهورة الحور الايطالي الهرمي الشكل (*P. italica pyramidalis*)

٨٥٨٩ - حَوْر بَلْسَمِي


Populus balsamifera (S).

Peuplier baumier (F).

نوع من الحور الايريكي المنبت يعلو من ٢٥ الى ٣٥ م.



حودان مائي



حودان مداد



حور ابيض



حور اسود



حور رجراج



حور فرائي

٨٦٠٦ - حَوْصَل *Pélican (F). Pelican (E).*
راجع بيج .

٨٦٠٧ - حَوْصَلَة ، ذَوْرَة *Gésier, Jabot (F). Gizzard, Crop (E).*
عضو من أعضاء الهضم في الطير ، أطلب قانصة .



حور كندي

٨٦٠٨ - حَوْض *Abreuvoir, Bassin (F). Watering-place, Basin (E).*
هو المكان المعد لجمع الماء اللازم لسقاية الدواجن . وهو بركة تجمع فيها المياه لمختلف الحاجات .

٨٦٠٩ - حَوْض السَمَك *Vivier (F). Fish-pond (E).*
حوض جعل لتربية السمك خاصة .

٨٦١٠ - حَوْضِي *elvien (F). Pelvic (E).*
نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بحوض الحيوان كقوائم زعانف حوضية .



حوسك

٨٦١١ - حَوْقَث *Hétérodon (F).*
جنس حيات من الحنثيات يدعى عصابة ، اطلبها .

٨٦١٢ - حَوْقَث مُتَوَج *Hétérodon diadème (F).*
هو العصابة المترجة ، من الثعابين المفيدة اللامؤذية . اطلبها .

٨٦١٣ - حَوْقَل ٥ ، قُلَنْسُوءَة ، بُرْس *Coiffe (F). Tîp (E).*
بسة واقية صلبة المادة تغلف طرف الجذر وتشق له الطريق في اندفاعه خلال حبيبات التربة .



حوشب


٨٦١٤ - حَوْقَلَة ٥ *Protandrie (F). Protandry (E).*
هي ادراك الطلع في مآبر الزهرة قبل ادراك الازيم والتهاف المدقة .

٨٦١٥ - حَوْق *Châssis (F). Case, Frame (E).*
اطار من خشب او حديد .

٨٦١٦ - حَوْق مُقَرَّر *Châssis vitré (F). Garden-frame (E).*
اطار من خشب او حديد سقف بالزجاج .

٨٦١٧ - حَوْقَل ٥ *Mastacembelus (S). Mastacembla (F).*

جنس اسماك نهريه من شائكات الزعانف . انواعها المعروفة سبعة . اعطانها انهر الهند والصين وماليزية || اجسامها صغيرة القد او معتدلة ، مستغرقة الشكل المستطيل الاعوج الخط . رؤوسها اسفينية صغيرة تنتهي بمخاطم مدببة . عيونها صغيرة ماسحة . زعانفها الظهرية قاطبة ، القسم الامامي منها شائك المناخس الدقيقة ، اما القسم الخلفي فنفسروفي المادة يقابل الشرجية . الذيلية صغيرة مقطوعة . اثوابها عادية الرونق يكثر فيها الخضار الالفس القائم والخضار الاربد الباهت والسمرة الحديدية || لحونها متوسطة الصنف مأكولة .



حوقل

اللون بارزة الصلح الاحمر . اوراقه معتقة كبيرة القد قلبية القاعدة طوطا من ١٠ الى ٢٠ سم . وعرضها من ٨ الى ١٦ . اما زنادها فيبلغ نحو ١٠ سم .

٨٥٩٧ - حَوْر كَنْدِي * *Populus canadensis (S). Peuplier du Canada (F). Canadian poplar (E). Kanadischenpappel (D). Pioppo Canada (I).*
نوع من الحور . يعلو من ٣٠ الى ٤٥ م . افئانه مضلعة . اوراقه معتقة قلبية كبيرة القد طولها من ٦ الى ١٢ سم . زنادها اخضر اللون ، نصلها ينحرف من الخمرة الجؤرية الزاهية اللون الى الخضرة البحرية الزيتية الموج || ضرره عديدة أشهرها الحور الذهبي الورق .

٨٥٩٨ - حَوْر وَحِيَّة *Ophiuchus, Serpente, l'Homme au serpent (F). Ophiuchus, Serpentarium (E).*

كوكبة نجوم شمالية الموقع . اما الحور فصورة رجل قائم قد قبض بيده على حية ونجومه تسعة وعشرون . اما الحية فنجومها ثمانية عشر وعلى عنقها نجم يسمى « عنق الحية » . وتسمى الكواكب المصطفة على رأس الحية « نسقا شاميا » ، والمصطفة تحت العنق « نسقا يمانيا » . ويسمى ما بين النسقين الروضة . والكواكب التي بين النسقين ، في الروضة « الاغنام » . والذي على رأس الحور يدعى « الراعي » .

٨٥٩٩ - حَوْرَاء ، حَوْرِيَّة ، عَدْرَاء *Nymphe (F). Nymphe (E).*
تمر الحشرة في دورتها الحياتية بعدة مراحل انتقالية . وقد تكون حورية او عدراء في مرحلة الانتقال والتحويل من يرقة الى حشرة كاملة .

٨٦٠٠ - حَوْرَان *Peau de l'éléphant (F). Skin of elephant (E).*
الحوران / جلد الفيل وباطن جلده يدعى الحرسيان .

٨٦٠١ - حَوْسَك ٥ *Trachystemon (S). Trachystème (F).*

جنس نباتات عشبية معمرة سبوتية من فصيلة الحمحميات . انواعها المعروفة قليلة العدد مهددا الشرق الاوسط || سوقها قصيرة سمراء اللون تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها السفلى معتقة متقاربة . اوراقها الجذمية متعاقبة ، معتقة ، سنانية النصال المكتسية بالهلب الدقيق الجامد . ازهارها عثقودي التجميع . ازهارها صغيرة ، بنفسجية اللون او بيضاء . تنويرها يستمر من اذار الى ايار . اعرف انواعها واشهرها الحوسك الشرقي والحوسك الاكريقي .

٨٦٠٢ - حَوْسَكَة
كل سمكة صغيرة كثيرة الحسك تدعى حوسكة .

٨٦٠٣ - حَوْش ، زَرِيَّة *Enclos pour bestiaux (F). Paddock (E).*

٨٦٠٤ - حَوْشَب * *Boulet (F). Fetlock-joint (E).*
هو في الخيل المفصل الواقع بين اسفل الوظيف واعلى الرسغ .

٨٦٠٥ - حَوْشَب *Lapin mâle (F). Male rabbit (E).*
الحوشب هو الارنب الذكر .

نشيطة . اثوابها ملونة || تألف الحراج والغابات . تعيش بين الاعشاب . قوتها ما تستطيع قنصه من قواقع صغيرة .

٨٦٢٩ - حَوْمَلَكَة *
Brama (S).
Brame (F). Brama (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسقمريات شائكات الزعانف . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط ، اخصها الممتدة من اليونان الى ايطاليا || جسمها اهليلجي الشكل ، معتدل التبسيط ، يطول من ٢٥ الى ٤٥ سم . ثوبها الى الرتبة الفضية يعبق في الظهر ويبيض في البطن . رأسها قصير الخطم المقطوم . فكها الاسفل يتقدم الاعلى بعض الشيء . شدقها واسع الانفراج . عيناها كبيرتان مستديرتان . اسفاطها متراكبة ، كبيرة . زعانفها الظهرية والشرجية متقابلة ، مستطيلة ، شارفة المقدم . زعنفتها الذيلية هلالية الشكل || تعتبر من الاسماك اليمية التي لا تقترب من المجاذج الا في بعض الازمنة || لحمها فاخر الصنف ، مرغوب فيه .

٨٦٣٠ - حَوْمَلِيَّات *
Homalidae (S).
Homalidés (F). Homalidae (E).

فصيلة حشرات مفترسة من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم حراج البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ١٠ سم . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة . عيونها بارزة تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها حادة الاطراف الخلفية . اغدادها لاحفة ، رخفة . اوساغها خاسية العقل . اثوابها ملونة || تألف الحراج . تعيش بين الاعشاب . قوتها القواقع الصغيرة || اشهر اجناسها الحومل .

٨٦٣١ - حَوِيَّة *
Pitangus (S). Pitangue (F).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقر وفصيلة الغصوبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض المناطق الاستوائية الممتدة من الهند الى امريكا || اجسامها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٢ سم . مناقبها مسننة المخاطم العلوية . سواقطها متوسطة الطول . اذنانها رتاجية الرفال ، مستديرة الاطراف . اثوابها مبلقة ، ثلاثية الالوان فيها الاسود والابيض والاصفر . بطونها دائماً بيضاء اللون || قوتها الحشرات والدويبات والعطاء والجوارن .

٨٦٣٢ - حَوَيْشَرَة *
Aetheria (S).
Ethérie (F). Aetheria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الحويشريات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع انهر وبحيرات القارة الافريقية || اصداغها كبيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مقرنة الاطراف . مصاريعها محدبة ، لامساوية . اصفاها مضلعة وملونة من الخارج ، لؤلؤية من الداخل || تعيش لاصقة بالصخور المغمورة . حومها مأكولة متوسطة الصنف .

٨٦٣٣ - حَوَيْشَرِيَّات *
Aetheriidae (S).
Aetheriidés, Ethériidés (F). Aetheriidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد . اعطانها معظم انهر وبحيرات البلاد الحارة || اصداغها متباينة القد والشكل ، لانظامية التنسيق . اجسامها مائحة المناعب ، مستغلظة الارجل || اعرف اجناسها واشهرها الحويشيرة .

٨٦١٨ - حَوْقَلَةُ الْبَنْغَال *

Mastacembelus pancalus (S).
Mastacemle du Bengale (F).

نوع من الحوئل . سمكة نهريه اعطانها انهر الهند . جسمها يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى اخضرار الاربد يملوه تسنج معترض اسود يمتد الى الزعنفة الشرجية || لحمها متوسط الصنف .

٨٦١٩ - حَوْقَم *
Pisonia (S). Pisonie (F).
Pisonia, Cockspur (E). Pisonie (D). Pisonia (I).

جنس شجيرات برية من فصيلة الشيات انواعه قليلة بعضها شائك السوق والاغصان . اوراقها كاملة متعاقبة . ازهارها عنقودي التجميع . ثمارها عشبية دبقية . عيدانها شديدة الالتواء تستعمل في عدة صناعات .

٨٦٢٠ - حَوَك *
Basilic commun (F). Basil (E).

هو الحبق المعروف ، اطلبه .
٨٦٢١ - حَوَل ، حَلَل ، اخْتَزَل *
Réduire (F).
To reduce (E).

٨٦٢٢ - حَوَلِي ، سَنَوِي *
Annual (F).
Annual, Yearly (E).

النبات الحولي هو كل نبات يزهر في السنة التي ينبت فيها ثم يذبل ويموت عقب الاثمار .
٨٦٢٣ - حَوْمَان *
Psoralea (S).

Psoraller, Psoralée (F). Bread-root (E). Brodwurzel, Harzklea (D). Psoralea (I).

جنس جذبات برية من فصيلة القرنيات القراشية . انواعه عديدة . اوراقها معنقة متعاقبة نفلية الشكل والتركيب . ازهارها نورية منها ، البيض والزرقي والبنفسجية . اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٨٦٢٤ - حَوْمَان جَوَرِي *
Psoraller comestible, Picotiane (F).

نوع من الحومان جذوره تشبه الجزر الطويل وهي مأكولة تحوي بعض المواد النشوية .

٨٦٢٥ - حَوْمَان زَفْتِي ، حَوَيْنَة *
Psoraller bitumeux, Trèfle odorant (F).

نوع من الحومان اوراقه تستعمل في بعض المستحضرات الطبية الخاصة بالامعاء .

٨٦٢٦ - حَوْمَان مَغْضَنِي *
Psoraller glanduleux, Thé du Paraguay (F).

نوع من الحومان اوراقه عطرية صمغية تستعمل استعمال الشاي .

٨٦٢٧ - حَوْمَر *
Tamarinier (F). Tamarind-tree (E).


هو التمر الهندي ، اطلبه .

٨٦٢٨ - حَوْمَل *
Homalidae (S).
Homalide (F). Homalidae (E).


جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحويليات ورقبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة متوسطة العدد . اعطانها حراج وغابات بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها مستعرضة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة . تأشيرها وفكوكها ولامساها نظامية . كواسلها شبه اسطوانية . اغدادها لاحفة . قوائمها




حوقلة البنغل



حومان



حومل



حوملة



حوية



حويثرة



حوراء

٨٦٤٤ - حَيِّ الْعَالَمِ ، حَيَّوْن ، وَدْنَه

Sedum (S). Orpin, Sedum (F). Orpine, Stonecrop (E). Fetthenne (D). Fabaria (I).

جنس نباتات عشبية لحية حولية ومعمرة من فصيلة الخلدات معظمها من النباتات الطبية التي تدمل الجرح وتشنى البواسير. انواعه نحو ١٣٠ تقسم الى ثلاث لم. اللمة الاولى تشمل الحَيَّوْن الاسطواني والبيضي الورق منها كانت ألوان الازهار. اللمة الثانية تشمل الحَيَّوْن الصفيحي النصل الابيض والاحمر الزهر. اللمة الثالثة تشمل الحَيَّوْن الصفيحي النصل الاصفر والاخضر الزهر || اوراقه لحية مختلفة الاشكال لانظمة التركيب والترتيب. ازهاره طرفية الارتيكار. اشهر انواعه التزيينية والطبية ما يتبع.

٨٦٤٥ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَبْيَض ، حَيَّوْن اَبْيَض

Sedum album (S). Orpin blanc, Trique-Madame, Perruque (F).

نوع معمر من اللمة الاولى. يعلو نحو ٢٥ سم. ساقه قليلة الفروع. اوراقه اسطوانية مضلعة تطول نحو ٢ سم. لونها جيل الخضار يعلوه موج احمر. ازهاره تاجية بيضاء اللون او وردية.

٨٦٤٦ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَحْمَر ، حَيَّوْن اَحْمَر

Sedum rubens, Crassula rubens (S). Orpin rougeâtre (F).

نوع حولي من اللمة الاولى. يطول نحو ٢٠ سم. ساقه قليلة التشعب. اوراقه اسطوانية مقطوعة تطول نحو ٢ سم. ازهاره وردية اللون، حمراء العروق خماسية البتلات والاسدية.



حي العالم الاحمر

٨٦٤٧ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَرْغْنِي ، حَيَّوْن اَرْغْنِي

Sedum oreganum (S). Orpin de l'Oregon (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة. يعلو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقه صغيرة قليلة التشعب. ازهاره مندعمة البتلات، صفراء اللون.

٨٦٤٨ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَزْب ، حَيَّوْن اَزْب

Sedum pilosum (S). Orpin poilu (F).

نوع معمر من اللمة الاولى. يطول نحو ١٠ سم. ساقه قليلة الفروع زباء. اوراقه مستطيلة متراصة زغبية. ازهاره وردية اللون.

٨٦٤٩ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاِسْبَانِي ، حَيَّوْن اِسْبَانِي

Sedum hispanicum (S). Orpin d'Espagne (F).

نوع حولي من اللمة الاولى. يطول نحو ١٥ سم. ساقه نحيلة. اوراقه خيطية، متقاربة، بحرية اللون تطول نحو ٥ سم. ازهاره بيض او وردية، سداسية البتلات.

٨٦٥٠ - حَيِّ الْعَالَمِ الْاَفْنَد ، حَيَّوْن اَفْنَد

Sedum multiceps (S). Orpin branchu (F).

نوع معمر من اللمة الاولى. يعلو من ٥ الى ١٥ سم. ساقه فرعاء. اوراقه زباء النصل، بحرية اللون. ازهاره كبيرة، خماسية البتلات، صفراء اللون. قطرها نحو ١٢ مم.

٨٦٥١ - حَيِّ الْعَالَمِ الْبَرِيطَانِي ، حَيَّوْن بَرِيطَانِي

Sedum anglicum (S). Orpin d'Angleterre (F).

نوع معمر من اللمة الاولى. يطول نحو ١٠ سم. ساقه غليظة. اوراقه جميلة الخضار، بيضية الشكل. طولها نحو ٥ مم. ازهاره كبيرة القدر قطرها نحو ١٠ مم. بتلاتها قلبية مدببة لونها الى الابيض او الوردي.

٨٦٣٤ - حُورَاء * ، تَفْرُزْ Tephrosia (S).

Téphrosie (F). Tephrosia (E).

جنس نباتات عشبية وجنية وشجرية من فصيلة القرنيات الفرائية. انواعها نحو ١٢٥ معظمها بري وبعضها زراعي وتزييني. قشورها غفيرة غفارها ناعم، حريري الملئس، رمادي اللون. اوراقها متعاقبة مركبة ريشية كبيرة القدر. ازهارها لا قياسي التنوير. ازهارها بيض او حر او بنفسجية. ثمارها قرون مقلطحة مستطيلة. اشهر انواعه ما يلي.

٨٦٣٥ - حُورَاء صِبَاغِيَّة

Tephrosia tinctoria (S). Téphrosie tinctoriale (F).

نوع من الحوراء يستخرج منها صبغ ليلي اللون جيد الصنف. منها البلاد الحارة.

٨٦٣٦ - حُورَاء كَبِيرَة الزَّهَر

Tephrosia grandiflora (S). Téphrosie à grandes fleurs (F).

نوع من الحوراء الزراعية التزيينية وهي بحلة معمرة تعلو من ٦٠ الى ٨٠ سم. وريقاتها مخروطية الشكل ازهارها كبيرة القدر حمراء اللون.

٨٦٣٧ - حُورَاء مُسْكِرَة ، غَبَادَة

Tephrosia senticosa (S). Téphrosie toxique, T. toxicaire (F). Fish poison plant, Surinam poison (E).

نوع من الحوراء ثمارها واوراقها تستعمل لاثمال السمك وصيده. يستخرج من جذورها مادة الروتينون التي تستعمل في مكافحة الحشرات.

٨٦٣٨ - حُورَاء مُسَهِّلَة Tephrosia cassia (S).

Téphrosie séné (F).

نوع من الحوراء اوراقها طبية مسهلة ويستخرج من جذورها مادة الروتينون.

٨٦٣٩ - حُورَاء Chamélaucier (F).

Chamelaucion (E).

جنس نباتات جنية من فصيلة الآسيات. انواعه قليلة العدد مهددا استرالية جميعها خلنجية الشكل. اوراقها وازهارها فواحة العرف المستحب. ثمارها عنبية وحيدة البذرة.

٨٦٤٠ - حُورَاء صِلَات مَنُورِيَّة

Vésicules séminales (F). Seminal vesicles (E).

اوعية جرابية الشكل صغيرة القدر تستلقي وتصرف المادة المنوية. وهي تدعى الحويصلات الشلجية في الحيوان والحويصلات الزكبية في الحشرات.

٨٦٤١ - حُورَاء صِلَة Vésicule (F). Vesicle (E).

عضو في الجسم كالجراب الصغير يجمع ويصرف ما تفرزه بعض الغدد الخاصة.

٨٦٤٢ - حُورَاء Animalcule (F). Animalcule (E).

كل حيوان مجهرى شديد الصغر لا يرى بالعين المجردة يدعى حوراء ج حوريات.

٨٦٤٣ - حُورَاء مَنُورِيَّة Spermatozoide (F).

Spermatozoon (E).

الغامة الخيرية الذكر وهي مؤلفة، عادة، من الرأس حامل الجيلة ومن السوط الذي يؤمن الانتقال.

٨٦٦١ - حَيَّ الْعَالَمِ السَّرْعِي ، حَيَّون سِرْعِي
Sedum sarmentosum (S). Orpin sarmenteux (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ٣٠ سم . ساقه
مدادة . اوراقه ضيقة مستطيلة بحيلة الخضار . ازهاره
نجمية الشكل صفراء اللون .

٨٦٦٢ - حَيَّ الْعَالَمِ السَّمْنَجُونِي ، حَيَّون سَمْنَجُونِي
Sedum heptapetalum (S). Orpin azuré (F).
نوع حولي من اللمة الاولى . يطول نحو ١٥ سم . ساقه
متشعبة اوراقه متعاقبة تطول نحو ٦ سم . ازهاره زرق
سباعية او تساعية البتلات .

٨٦٦٣ - حَيَّ الْعَالَمِ السَّمِيكَ الْوَرَق ، حَيَّون سَمِيكَ
الوراق
Sedum dasphyllum (S).
Orpin à feuilles épaisses (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ١٥ سم . ضروبه
عديدة منها الابيض الزهر والوردي والبنفسجي والاصفر .
ساقه نحيلة فرعاء . اوراقه بيضية الشكل بحرية اللون
تطول نحو ٥ سم .

٨٦٦٤ - حَيَّ الْعَالَمِ الشَّجَرِي ، حَيَّون شَجَرِي
Sedum arboreum (S). Orpin arborescent (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو نحو ٦٥ سم . ساقه
ليفية متشعبة . اوراقه مقرنة الضلوع تطول نحو ٣ سم .
ازهاره كبيرة القد خماسية البتلات ، بيضاء اللون ، قطرها
نحو ١٢ سم .

٨٦٦٥ - حَيَّ الْعَالَمِ الصَّخْرِي ، حَيَّون صَخْرِي
Sedum rupestre (S). Orpin des rocaillies (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم .
ساقه نحيلة قليلة الفروع . اوراقه متعاقبة . ازهاره نجمية
الشكل ، صفراء اللون ، خماسية او ثمانية البتلات .

٨٦٦٦ - حَيَّ الْعَالَمِ الظَّرِيف ، حَيَّون ظَرِيف
Sedum pulchellum (S). Orpin gracieux (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٨ الى ١٥ سم .
ساقه نحيلة منتصبه فرعاء . اوراقه خيطية متراسة تطول
نحو ٢ سم . ازهاره قرمزية او بيضاء اللون .

٨٦٦٧ - حَيَّ الْعَالَمِ الْعُشْكُولِي * ، حَيَّون عُشْكُولِي ،
جَوَزُ الْبَرِّ
Sedum cepaea (S).
Orpin paniculé, Orpin capé (F).

نوع حولي او محول من اللمة الثانية . يعلو من ٢٠ الى
٤٠ سم . اوراقه اهليلجية تطول نحو ٣ سم . ازهاره
عشكولي التجميع . ازهاره معققة زباء ، بتلاتها خلية
الصفحة الخارجية ، بيضاء الداخلية ، حمراء العروق .

٨٦٦٨ - حَيَّ الْعَالَمِ الْقَصِير الْوَرَق ، حَيَّون قَصِير
الوراق
Sedum brevifolium (S).
Orpin à feuilles courtes (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يطول نحو ٨ سم . ساقه
ليفية معنوجة . اوراقه شبه كروية الشكل ، رباعية
التصنيف ، متراسة . ازهاره صغيرة اهليلجية البتلات .

٨٦٦٩ - حَيَّ الْعَالَمِ الْكَبِير ، حَيَّون كَبِير
Sedum maximum (S). Orpin grand, Grand orpin (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو من ٥٠ الى ٩٠ سم .
اوراقه اهليلجية متقابلة . ساقه واوراقه حمر . ازهاره
عطرية العرف ، خضراء اللون ، يعلوها توشيح وردي .

٨٦٥٢ - حَيَّ الْعَالَمِ النَّتْرِي ، حَيَّون نَتْرِي
Sedum tatarinowii (S). Orpin de Tatarinow (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو من ١٠ الى ٢٠ سم .
اوراقه سنانية مسننة الحافة . ازهاره رهل التجميع .
ازهاره وردية اللون حادة البتلات .

٨٦٥٣ - حَيَّ الْعَالَمِ الْجَبَّار ، حَيَّون جَبَّار
Sedum praealtum (S). Orpin géant (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو نحو ١٦٠ سم . ساقه
فرعاء . اوراقه مستطيلة طولها نحو ٧ سم . وعرضها ٢ .
ازهاره عنقودي . التجميع . ازهاره كبيرة القد صفراء اللون .

٨٦٥٤ - حَيَّ الْعَالَمِ الْجَبَلِي ، حَيَّون جَبَلِي
Sedum alpestre (S). Orpin alpestre (F).
نوع معمر من اللمة الاولى يرغب في الاتربة الرملية
والمواقع الباردة . يعلو من ٥ الى ٧ سم . اوراقه مستطيلة ،
رافعة الصفحة العليا . ازهاره خماسية البتلات صفراء اللون .

٨٦٥٥ - حَيَّ الْعَالَمِ الْحَرِيف * ، حَيَّون حَرِيف
Sedum acre (S). Orpin âcre, Pain d'oiseau, Vermi-
culaire, Orpin brûlant (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٥ الى ١٥ سم .
اوراقه رافعة ملساء النصل تطول نحو ٦ سم . ازهاره ثنائي
او رباعي السطوح . ازهاره عديدة ذهبية اللون || عصارة
اوراقه حريفة محرقة .

٨٦٥٦ - حَيَّ الْعَالَمِ الْحُنْدُوتِي ، حَيَّون حُنْدُوتِي
Sedum aizoon (S). Orpin aizoon (F).
نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٢٠ الى ٣٥ سم .
ضروبه عديدة . سوقه قوية . اوراقه مستطيلة . ازهاره
خيمي التجميع . ازهاره بحيلة الصفار رباعية او سداسية
البتلات .


٨٦٥٧ - حَيَّ الْعَالَمِ الْحَوْرِي الْوَرَق ، حَيَّون
حَوْرِي الْوَرَق
Sedum populifolium (S). Orpin à feuilles de peuplier (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم .
اوراقه مستطيلة معنقة متعاقبة مسننة الحافة . ازهاره بيض
عطرية العرف .

٨٦٥٨ - حَيَّ الْعَالَمِ الْخَمْلِي ، حَيَّون خَمْلِي
Sedum villosum (S). Orpin velu (F).
نوع معمر من اللمة الاولى يرغب في الاتربة الرملية الرطبة .
ساقه قليلة الفروع تطول نحو ٢٠ سم . اوراقه اسطوانية
خلية متباعدة الرصف . ازهاره رهل التجميع صفراء اللون .

٨٦٥٩ - حَيَّ الْعَالَمِ الدَّاكِن الْوَرَق ، حَيَّون دَّاكِن
الوراق
Sedum ternatum (S).
Orpin à feuilles ternées (F).

نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ١٠ الى ١٥ سم .
ساقه ثلاثية او رباعية الفروع . اوراقه ملققة مستطيلة
ثلاثية التصنيف . ازهاره بيض رباعية البتلات والفصل .

٨٦٦٠ - حَيَّ الْعَالَمِ الزَّخْرَفِي * ، حَيَّون زَخْرَفِي
Sedum spectabilis (S). Orpin décoratif (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .
اوراقه بيضية الشكل . ازهاره ارجوانية مزخرفة . ضروبه
عديدة تختلف بلون زخارفها .



حي العالم الحريف




حي العالم الزخرفي



حي العالم العشكولي

٨٦٨١ - حَيَّ الْعَالَمَ الْوَرْدِي * ، حَيَّونَ وَرْدِي
Sedum roseum, Rhodiola rosea (S). Orpin rosat (F).
نوع معمر من اللمة الثانية يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم.
ارومته بنفسجية الرائحة . اوراقه اهليلجية مسننة . ازهاره
رباعية البتلات والنصل . ثمانية الاسدية ، لونها الى الخضار
الاصفر يعلوه موج احمر .



حي العالم المكرار

٨٦٨١ - حَيَّ الْعَالَمَ الْيَابَانِي * ، حَيَّونَ يَابَانِي
Sedum sieboldi (S). Orpin de Siebold (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . اوراقه دقيقة ثلاثية التصفيف
ضخلاء اللون حمراء الاطراف . ازهاره وردية كثيفة .

٨٦٨٢ - حَيَّاة Vie (F). Life (E).

الحياة هي حالة الكائن الحي . اما مصدر الحياة الاول ..
ومن اوجد الحياة .. وكيف نشأت .. فن يعلم ؟ ..
نحن نعرف بوجود رب خلق الكون والحياة . اما العلم
الحديث فيقول ان الغمر والعوامل الطبيعية المتباينة المفاعيل ،
التي كانت تهيمن على الكرة الارضية في الازمنة السحيقة
القاهرة ، هي التي كونت اول الجراثيم الحية علمياً ،
لامتطوياً ، وبصرف النظر عن مفاهيم الاديان السماوية
ومعطياتها الوجدانية ، وبعد الاخذ بالنظريات البيولوجية
والكيمياوية والفيزيائية والاحاثية الشائعة في هذا العصر ،
يبدو ان نشأة الحياة على هذه الارض او بالاحرى في هذا
الكون المعروف بالكرة الارضية ، يعود الى بعض الوف
ملايين السنين . وان عمر الارض لا يقل عن سبعة الاف
مليون سنة كما هو مفصل في الجدول البياني التابع ، رقم ١ .
اما نشأة الحياة وتطوراتها عبر الازمنة القاهرة فهي موضوع
الجدول رقم ٢ || والجدول رقم ٣ يعطي العدد التقريبي
لمختلف انواع المخلوقات الحيوانية المعاصرة المعروفة .



حي العالم الوردي

٨٦٨٣ - حَيَّات Ophidiens (F). Ophidia (E).

شعبة من الحيوانات الزحافة عديدة الفصائل والاجناس
والانواع تجسمها خمس رتب صار تحديدها بالنسبة الى وضع
اسنانها . اما رتبها فهي : اماميات الاخاديد ، انبوييات
الاخاديد ، خلفيات الاخاديد ، عديمات الاخاديد
ومتراوحات الاسنان .

٨٦٨٤ - حَيَّات Vital ما كان لازماً للحياة او لاستمرار الحياة .

٨٦٨٥ - حَيَّازَة ، وَضْع الْيَدِ Détention (F).
Detainment (E).
حق استعمال العين المادية دون امتلاكها كالمستأجر مثلاً .

٨٦٨٦ - حَيَّة Opnis (S). Serpent (F). Snake (E).
اسم شامل يطلق على جميع اجناس وانواع الحيات من
الافعى الى الصل والثعبان والحش || قال الجاحظ :
« الحية اسم يطلق على الذكر والانثى فيقال هذا حية ذكر
وهذه حية انثى . والحية انواع منها الرقشاء والرقطاء والازعر
والازب وذات القرنين والشجاع والعريد والاصلة والصل
والابتر والناشر والارقم وابو عثمان وابو العاصي وابو مذخور
وابو وثاب وابو يقطان وام عافية وام عثمان وام الفتح
وام محبوب ... »

٨٦٨٧ - حَيَّة الْمَاء Hydrophis
جنس حيات مائية من اماميات الاخاديد . انواعها المعروفة
١٥ جميعها سامة خبيثة . طولها يراوح من متر الى مترين .
اثوابها عديدة الالوان يكثر فيها التخطيط الطوقي . اعطائها
بحار المناطق الحارة اخصها بحار الهند .



حية الماء

٨٦٧٠ - حَيَّ الْعَالَمَ الْبَيْدِي ، حَيَّونَ لَيْدِي
Sedum lydium (S). Orpin de Lydie (F).
نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ١٠ الى ١٢ سم .
اوراقه مخززية الشكل تطول نحو ٦ سم . لونها الى
الخضار البحري يعلوه موج احمر . ازهاره وردية .

٨٦٧١ - حَيَّ الْعَالَمَ الْمَائِي هو الزقيم ، اطلبه .
Pistie (F).
Water lettuce (E).

٨٦٧٢ - حَيَّ الْعَالَمَ الْمُتَقَابِلُ الْوَرَق ، حَيَّونَ مُتَقَابِلُ
الوراق Sedum oppositifolium (S).

Orpin à feuilles opposées (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يعلو نحو ١٥ سم . اوراقه
متقابلة معينة الشكل طولها نحو ٤ سم . وعرضها ٢ .
ازهاره بيض خاسية التركيب .

٨٦٧٣ - حَيَّ الْعَالَمَ الْمُسْتَدِيرُ الْوَرَق ، حَيَّونَ مُسْتَدِيرُ
الوراق Sedum anacampseros (S).

Orpin à feuilles rondes (F).
نوع معمر من اللمة الثانية . يرغب في الاتربة الرملية .
يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، اهليلجية ،
مقطوبة . ازهاره بنفسجية .

٨٦٧٤ - حَيَّ الْعَالَمَ الْمَشْجَر ، حَيَّونَ مَشْجَر
Sedum dendroideum (S). Orpin en arbre (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو نحو ٦٠ سم . اوراقه
مستطيلة ، مفروضة ، بيضاء الاطراف ، حمراء الحافة . ازهاره
عنقودي التجميع ، كبير القد يبلغ نحو ١٠ سم . ازهاره
الى الصفار الكبيرتي .

٨٦٧٥ - حَيَّ الْعَالَمَ الْمَكْرَار * ، حَيَّونَ مَكْرَار
Sedum telephium (S). Orpin reprise, Herbe à la
coupure, O. telèphe (F).

نوع معمر من اللمة الثانية . ضرابه كثيرة العدد . ساقه
تعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة بيضية الشكل .
ازهاره كثيفة التجميع . لونها يختلف مع الضرب .

٨٦٧٦ - حَيَّ الْعَالَمَ الْمُلْمَعَقِي ، حَيَّونَ مُلْمَعَقِي
Sedum spathulifolium (S). Orpin spatulé (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة يعلو من ٧ الى ١٢ سم .
اوراقه مللمقية الشكل قائمة الخضار المنش بالاحمر .
ازهاره كبيرة القد ، عريضة البتلات ، لونها الى الاصفر القاقح .

٨٦٧٧ - حَيَّ الْعَالَمَ الْمَنْشُورِي ، حَيَّونَ مَنْشُورِي
Sedum selskianum (S). Orpin de Mandchourie (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم .
ساقه زباء منتصب . اوراقه خيطية مسننة زغبية النصل .
ازهاره مستعرضة الشكل بحيلة الصفار الكبيرتي .

٨٦٧٨ - حَيَّ الْعَالَمَ النَّحِيف ، حَيَّونَ نَحِيف
Sedum gracile (S). Orpin gracile (F).

نوع معمر من اللمة الاولى . يعلو من ٣ الى ٥ سم . ساقه
نحيلة قصيرة . اوراقه مخززية الشكل ، مهاذبة القاعدة
تطول نحو ٨ سم . ازهاره بيض موشحة بالاحمر والاخضر .

٨٦٧٩ - حَيَّ الْعَالَمَ الْهِنْدِي ، حَيَّونَ هِنْدِي
Sedum kirilowii (S). Orpin de Kirilow, O. de l'Himalaya (F).

نوع معمر من اللمة الثالثة . يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم .
ارومته غليظة . ساقه فرعاء . اوراقه مستطيلة مسننة . ازهاره
الى الصفار الاخضر . منبته جبال حملايا .

جدول رقم ١
مراحل تطورات الكرة الأرضية وعلاقتها عبر الزمن

إباح	عرة	حقبة	عقبة	زمن	Periode	مليون سنة	حياة مائة	Vie a quatique	حياة برية	Vie terrestre
رابعي	Quaternaire	معاصرة	Actuel	اعتدال الحرارة	Tempérée	٥	جميع الفئات المعاصرة	تطور الجنس البشري أزمة المبيك والدفع	انتشار الثدييات والطيور والحشرات والنباتات الكبيرة الزهر	عصر الثدييات
					Glaciation					
					Temperée					
					Glaciation					
ثالثي ، حديث	Tertiaire	تقوية	Nummulitique	إسباني	Oligocène	٤٠	انتشار التورليات	انتراض المعنويات ومعظم الزخافات المائية	انتراض المفاصير وأعطاء - عصر الزخافات	عصر الثدييات
					Eocène	٦٠				
					Paleocène	١٠٠				
ثاني ، اوسط	Secondaire	جورنية	Jurassique	Cretacé	Trias	٢٠٠	انتشار الزخافات المائية والسريت	انتراض التريلوبيت	عصر الزخافات المائية	عصر الزخافات
						٢٢٠				
						٢٤٠				
أول ، قديم	Primaire	ديفونية	Silurien	Devonien	Cambrien	٦٥٠	انتشار التريلوبيت والرخويات والقشريات	انتشار الغنبايت والأسماك المظلمة	عصر التورليات	عصر الزخافات
						٤٢٠				
						٥٢٠				
ما قبل الكبري	Précambrien	محيية	Protérozoïque	Archéen	Origine de la Terre	١١٠٠	بعض الأحافير اللائسوية	انتشار الحياة برية على اليابسة	عصر التورليات	عصر الزخافات
						٢٠٠٠				
						٢٠٠٠				

جدول رقم ٣
العدد التقريبي لمختلف أنواع المخلوقات الحيوانية المعاصرة

Classe	Sous-Classe	عدد الأنواع	صنيف	صف
Vertébrés		٧٠.٠٠٠		فقاريات
	Crustacés	٢٥.٠٠٠	قشريات	
Arthropodes	Arachnides	٣٠.٠٠٠	عنكبوتيات	مفصليات
	Myriapodes	٨.٠٠٠	دخاخنيات	
	Insectes	٨٥٠.٠٠٠	حشرات	
Mollusques		١٠٠.٠٠٠		رخويات
Annélides		١٠.٠٠٠		حلقيات
Bryozoaires		٤.٠٠٠		حيوانات طحلبية
Echinodermes		٦.٥٠٠		شوكيات
Nématodes		١٠.٠٠٠		سلكيات
Vers plats		١٦.٠٠٠		عريصات
Coelentérés		١٠.٠٠٠		بحرقيات
Spongiaires		٥.٠٠٠		اسفنجيات
Protozoaires		٣٠.٠٠٠		أوليات
Rotifères		١.٥٠٠		دوارات
Divers		٢.٠٠٠		مختلف
Total		١.١٧٨.٠٠٠		المجموع

منها الحولية والمهولة والمعمرة . سوقها نخيلة فرعاء . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، شفعية . ازهارها رؤسية مستطيلة الزناد . الوانها متعددة منها الازرق السماوي والاصفر الكبريتي والابيض والليلكي والموشح || تنويرها صيفي او خريفي يستمر نحو ثلاثة أشهر .

٨٦٩٢ - حيدبة * Chiton (S). Oscabron (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات ممديات الارجل اماميات الخياشيم مصفحات القشار وفصيلة الكيتونيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم . تعيش على الصخور قرب الشواطئ || اصداؤها اهليلجية الشوزن ، مستديرة المقدم والمؤخر ، ثمانية الصفيحات المتراكبة . اجسامها تطول من ٥ الى ٢٢ سم . رؤوسها وعيونها صغيرة ملحوفة بالاردية . لوامسها رباعية ، زوج مستطيل وزوج قصير . جميعها تتكور عند الحاجة فتبدو كالكرة || اكبر انواعها تعيش في المحيط الهندي والبحر الاحمر . جميعها مأكولة مرغوب فيها .

٨٦٩٣ - حيدكة Anneau (F). Ring (E).
هي العتدة في القرن وفي القصة . ج حيد .

٨٦٩٤ - حيدلان ، مندورة * Monodora (S).
Monodore (F).
جنس اشجار متوسطة القد من فصيلة القشديات . انواعها المعروفة خمسة جميعها من نباتات افريقية الحارة والاستوائية . سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة ، بيضية النصل الجامد

٨٦٨٨ - حية عمياء Blane cendré (F).
هي البلتوس الاريد ، اطلب .


٨٦٨٩ - حيشل * Pellorneum (S).
Pellornée (F). Pellorneum (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدخليات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها هندية المهد . اجسامها صغيرة القد . اثوابها الى الصبهة متفاوتة الموج . صدرها وبطنها منمشة بالاسمر الكستني .

٨٦٩٠ - حيجن * Brunonia (S).
Brunonia (F). Brunonia (E).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الحيجنيات . انواعه المعروفة عديدة . منتبها الطوعي بعض اصقاع امريكة واوسترالية وافريقية . معظمها بري وبعضها تزييني || سوقها نخيلة فرعاء . اوراقها متعاقبة مركبة ، شفعية الترتيب . ازهارها رؤسية ، فردية ، متراكبة البتلات اللسنية الشكل ، عديدة الالوان الزاهية الجميلة . يكثر فيها الازرق ثم الاصفر فالابيض فالارجواني ... || تنويرها يستمر نحو ثلاثة أشهر ، معظمها صيفي وبعضها خريفي .

٨٦٩١ - حيجنيات * Brunoniaceae (S).
Brunoniacées (F). Brunoniaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة القملات ، قريبة النشبه بالمركبات والديساسيات . انواعها المعروفة عديدة ، يجمعها جنس واحد || جميعها نباتات عشبية برية وتزيينية ،



حيتل



حيدبة



حَيْدَلَانَ الطَّيْب

٨٧٠٢ - حَيْصَلْ بَرَاذِيلِي (S). *Solanum warscewiczii* (S).
Morelle de Warscewicz (F).
نوع من الحَيْصَلْ المعمّر البري والتزييني . ساقه فرعاء تعلو
نحو ١٨٠ سم . أوراقه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ،
تساعية الفصوص ، منعقفة الشوك الأحمر . أزهاره بيض .
ثمارة صغيرة القد كبيض العصفور .

٨٧٠٣ - حَيْصَلْ بَطِّيخِي

Solanum citrullifolium (S). Morelle à feuilles de
pastèque (F).
نوع من الحَيْصَلْ الحولي التزييني . ساقه فرعاء قصيرة
تعلو من ٥٠ إلى ٦٠ سم . أوراقه بطيخية الشكل ، مسننة
الحافة . أزهاره كبيرة عريضة ، قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى
الازرق البنفسجي . ثمارة بيضوية صغيرة القد جؤوية اللون .

٨٧٠٤ - حَيْصَلْ جَبَّار (S). *Solanum giganteum* (S).
Morelle géante (F).

نوع من الحَيْصَلْ المعمّر البري والتزييني . يعلو من
مترين إلى خمسة أمتار . فروعه زبابة البشرة الطحلاء .
أوراقه مستطيلة الشكل ، نصلها أخضر الصفحة العليا الملساء
البشرة ، أزغب السفلى . أزهاره صغيرة القد متدللة لونها
إلى البنفسجي العابق . ثماره أرجوانية بحجم الحمص .

٨٧٠٥ - حَيْصَلْ جِيلُو (S). *Solanum gilô* (S).
Morelle gilô (F).

نوع من الحَيْصَلْ البري والتزييني المعمّر . ساقه فرعاء
مرطاة تعلو نحو ٩٠ سم . أوراقه بيضية متمنعة الحافة
المشرمة . نصلها مائل الصفحة العليا نخل السفلى .
أزهاره إلى البياض الوردي . ثماره بيضوية الشكل والقَد ،
لونها أصفر أو برتقالي .

٨٧٠٦ - حَيْصَلْ تَمَّارِي

Solanum sisymbriifolium (S). Morelle à feuilles de
vélar (F).
نوع من الحَيْصَلْ الزراعي المأكول الثمار . ساقه فرعاء تعلو
من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقه مفرضة . أزهاره بيضاء
اللون أو ليلية . ثماره بيضوية الشكل والقَد ، برتقالية
اللون مأكولة .

٨٧٠٧ - حَيْصَلْ مُجْتَع (S). *Solanum alatum* (S).
Morelle ailée (F).

نوع من الحَيْصَلْ المعمّر البري والتزييني . ساقه زغبية ،
فرعاء ، شائكة ، تعلو نحو المتر . أوراقه كبيرة تطول
نحو ٢٥ سم . تفصيصها قليل العمق ، نصلها خلي
البشرة على صفحتيه . أزهاره بيض . ثماره كروية صغيرة .

٨٧٠٨ - حَيْصَلْ مُوشَّح

Solanum marginatum (S). Morelle marginée (F).
نوع من الحَيْصَلْ الحول البري والتزييني منبته الشرق
الأدنى والحبشة . ساقه فرعاء تعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم .
لوراته شبه قلبية . نصلها خلي البشرة على صفحتيه .
أزهاره بيض تعلوها رقشة حمراء . ثماره بندقية الحجم
والشكل لونها إلى الصفار الباهت .

٨٧٠٩ - حَيْقُفَة

الحقيقة : شجرة كالشيخ يؤكل بها التمر (اللسان) .

٨٧١٠ - حَيْقُطَان * ، حَيْقُط (S). *Pternistes* (S).
Pterniste (F).

الأنثى حَيْقُطَانَة . طائر من الدراج طوله نحو ٣٢ سم .

العابق الخضار . أزهارها فردية ، مستطيلة الالهان ، محفوفة
ببعض القنابات الورقية الشكل المفروضة النصل || أشهر
أنواعه حَيْدَلَانَ الطَّيْب .

٨٦٩٥ - حَيْدَلَانَ الطَّيْب * ، مُنْدُورَة كبيرة

الزَّهَر * (S). *Monodora grandiflora* (S).

Monodora muscadier (F).

نوع من الحَيْدَلَانَ شجرته تعلو من ٧ إلى ٨ أمتار . أوراقها
عروية . أزهارها كبيرة القَد تبدو بيضاء اللون منمشة بالجؤوي
ثم يتحول بياضها إلى الأصفر وأحمرها الجؤوي إلى
الأرجواني الزاهي . ثمارها تفاحية الشكل والقَد تغلف
بزوراً طيبة خواصها خواص جوز الطيب .

٨٦٩٦ - حَيْدِي ، عَقْصِي ، أَحْبَد

Annelé (F). Ringed (E).

نعت وصفي للقرن المتتابع الحيد أو العقص .

٨٦٩٧ - حَيْدُوان * (S). *Columba livia* (S).

Colombe biset, Pigeon de roche (F). Rock dove (E).
نوع من الحمام البري يقال إن الحمام الداجن قد تحدر
منه . ضروبه عديدة جميعها صغيرة القَد . طولها نحو ٣٢ سم .
ثوبها إلى الرمادي الرصاصي يعلوه توشيح أبيض وأخضر
وبنفسجي . أجنحتها مخططة بالأسود . قوادمها بيض .
مناقيرها حنطية . عيونها حمراء وأرجلها كذلك || موطنه
فسيح الأرجاء يعم الشرق وأروبة وأفريقية . يألف
المناطق الصخرية والجبلية والبقاع الجرداء . يعيش أسراباً
صغيرة يراوح عدد أفرادها من ٤٠ إلى ٨٠ . قوته المحبوب
والبدور . يذبح عشه بين الصخور وفي نقارها . أناته
تبيض مرتين في السنة .

٨٦٩٨ - حَيْرَم (S). *Bubalis, Alcelaphus, Achronotus* (S).
Bubale (F).

جنس حيوانات لبولة من بقر الوحش ، كبيرة الجثة ، عالية
الدوارج ، رفيعة الحارك ، منحدر الكفل ، طويلة الرأس
الضيق ، منعطفة القرون المحدودة ، كبيرة الاذان ،
طويلة الذيل || طولها يراوح من ٢٦٠ إلى ٢٨٠ سم .
وارتفاعها من ١٢٠ إلى ١٣٠ سم . قرونها نحو ٥٠ سم .
أنواعها الحالية المعروفة ٢ : حيرمة كاما وحيرمة كنزي .

٨٦٩٩ - حَيْرَمَة كاما * (S). *Bubalis caama* (S).

Bubale caama, Alcélaphe (F).

نوع من الحيرم . ثوبه أشهب اللون حنطي الموج . ظهره
يميل إلى السمرة وبطنه إلى البياض . جبهته فحمة وذيله
أسود . الأنثى بحجم الذكر لكنها افتح لوناً || موطنه
أفريقية الجنوبية والشرقية . أجله يراوح من ٨ إلى ١٠
أنفار .

٨٧٠٠ - حَيْرَمَة كنزي

Bubalis lichtensteini (S). *Bubale konzi* (F).

هو النوع الثاني من الحيرم موطنه أفريقية الشرقية وهو
أصغر جثة من حيرمة كاما ذيله ودوارجه سود . أجله
لا يقل عن ٢٠ نفراً .

٨٧٠١ - حَيْصَلْ * (F). *Morelle épineuse* (F).

قسم من الباذنجان . أنواعه عديدة تتميز بكبر أوراقها
الشائكة الفلج والبروق ، نصلها مزغب البشرة . أزهارها
أبطية الارتكاز . ثمارها بيضوية الشكل || أعرف وأشهر
أنواعه ما يتبع .



حيدوان



حيرمة كاما



حيسل



حيقطان

٨٧١٤ - حَيَوَان Animal
كل كائن حي يتميز بالحركة والانتقال يدعى حيواناً .
ملكة الحيوان وعلى رأسها الانسان تقسم الى صفوف
ورتب وفصائل واجناس وانواع صار ترتيبها وفقاً لتركيبها
الجسموري ومظهرها وغرائزها .

٨٧١٥ - حَيَوَان أَهْلِي ، حَيَوَان دَاجِن Animal domestique (F). Domestic animal (E).
هو الحيوان الاليف الذي يعيش في حى الانسان .

٨٧١٦ - حَيَوَان مَنَوِيّ Zoosperme

٨٧١٧ - حَيَوَان نَبَاتِي Zoophyte
كل حيوان نباتي الشكل كالاسفنج وغيره .

٨٧١٨ - حَيَوَانَات طَحْلِيَّة Bryozoaires (F).
صف من اشباه الديدان . Bryozoon (E).

٨٧١٩ - حَيَوَانَات نَبَاتِيَّة Phytozoaires (F).
Phytozoon (E).
صف يشمل شمع الاسفنجيات والجوفيات والشوكيات .

٨٧٢٠ - حَيَوَات Serpent mâle (F). Male snake (E).
ذكر الحيات .

٨٧٢١ - حَيَوَد Neutre (F). Neutral (E).
هو ما كانت صفات خواصه المميزة موزونة الاعتدال
لا تنسم بعنصر متفوق او بطابع جلي خاص .

٨٧٢٢ - حَيَوَان Orpin (F). Orpine (E).
نبات عشبي لحمي يعرف بحى العالم ، اطلبه .

٨٧٢٣ - حَيَوِيّ Blotique (F). Blotic (E).
المنسوب الى المتعضيات الحية من حيث البيئة وتوابعها
قبل العوامل الفيزيولوجية .

ثوبه متراكب الالوان العابقة . اسود باطن الجناحين
اما ظاهرهما فأغبر مؤذر . صدره وبطنه الى الصهبة الربداء
يعلوها توشيم مستطيل . عنقه ورأسه الى الجؤوة الرصاصية
المواج . اطلب دراج .

٨٧١١ - حَيْقَل * Promerops (S).

Promérops (F). Promerops (E).
جنس طير من فصيلة المغنريات ورثة الجواثم رقيقات
المناكير . انواعه المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز الخمسة .
اعطانها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية ||
جميعها صغيرة القد ، مستطيلة المناقيد المقوسة . اذناها
عذابة الطول ، رتاجية الريش . اثنائها جميلة الالوان
المتباينة السفعاء المواج || قوتها الخوام وريحق الازهار ||
تدثن في الاشجار الفناء الوارفة الظل . اثنائها تضع نحو ٥
بيضات قرخها بمنابرة الذكور نحو ١٥ يوماً .

٨٧١٢ - حَيْقَلَة * Hebeloma (S).

Hébélome (F). Hebeloma (E).
فطر من فصيلة الفاريقونيات . يوجد في بعض مراعي
الغابات الجبلية . ساقه معتدلة الارتفاع والفلاطة ، طحلاء
اللون . نكهته صاجية مقلوبة ، قطرها نحو ٧ سم . لونها
الى الصفار الاغبر يعلوه مواج بني . اطراسها الى الطحلة
الفضية || لحميته كاعنة الصنف ، مستهجنة الرائحة ، غير
مرغوب فيها .

٨٧١٣ - حَيْهَلَة Carrichtera (S).




Carrichtère (F). Carrichtera (E).
نبات عشبي حولي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة
الصليبيات . منبته بعض مناطق الشرق الاوسط || ساقه
قليلة الفروع تعلو من ٤٥ الى ٦٠ سم . اوراقه متعاقبة .
مركبة ، ثنائية التفصيل الريشي . ازهاره الى البياض الاصفر
المواج . اعصاب البتلات وردية اللون . تنويره صيفي .




حَيْقَل




حَيْقَلَة



خ



خاتم سليمان الأمرط



خاتم سليمان الكثير الزهر

٨٧٢٩ - خَاتَمُ سُلَيْمَانَ الضَّمِيّ الْوَرَقِي ، عَقْدَاءُ ضُمِيَّةِ الْوَرَقِي

Polygonatum verticillatum (S). *Polygonate verticillé*, *Sceau de Salomon verticillé* (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل ، ضمية الارتكاز، رباعية او خماسية او سباعية الانتشاب. طولها نحو ١٠ سم. وعرضها ٢ نصلها خلي الصفحة السفلى. معاليق ازهاره تحمل من زهرة الى ثلاث زهرات صغيرة القد لونها الى البياض الاخضر || تنويره يستمر من ايار الى تموز.

٨٧٣٠ - خَاتَمُ سُلَيْمَانَ الْكَبِيرِ الْوَرَقِي ، عَقْدَاءُ كَبِيرَةِ الْوَرَقِي

Polygonatum latifolium (S). *Polygonate à grandes feuilles*, *Sceau de Salomon à grandes feuilles* (F).

نبات عشبي معمر منبته اربعة الشرقية والشالية. ساقه زباء تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل، نصلها خلي الصفحة السفلى. يطول من ٨ الى ١٦ سم. معاليق ازهاره تحمل من زهرة الى خمس زهرات. تنويره يستمر من ايار الى حزيران.

٨٧٣١ - خَاتَمُ سُلَيْمَانَ الْكثيرِ الزَّهْر* ، عَقْدَاءُ كَثِيرَةِ الزَّهْر

Polygonatum multiflorum (S). *Polygonate multiflore*, *Sceau de Salomon multiflore* (F).

نبات عشبي معمر يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية. اوراقه اهليلجية متعاقبة بارزة العروق. ازهاره لا عرف لها. معاليقه تحمل من زهرتين الى ست زهرات لونها الى البياض الاخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران.

٨٧٢٤ - خَابُور

زارع على نصيب معين كالثلاث او الربيع وقيل ببعض ما يخرج من الارض.

٨٧٢٥ - خَابُور

Sullon (F). *Arn tree* (E).

هو البيلسان الاسود ، اطلبه.

٨٧٢٦ - خَاتِل

Prédateur (F). *Predatory* (E).

صفة الحشرة التي تعيش من قنصها.

٨٧٢٧ - خَاتَمُ سُلَيْمَانَ ، عَقْدَاءُ

Polygonatum (S). *Polygonate*, *Sceau de Salomon* (F). *Seal-wort*, *Salomon's seal* (E). *Salomonssiegel*, *Siegelwurz* (D). *Polygonato*, *Sigillo di Salomone* (I).

جنس نباتات جذسورية عقدية معمرة من الهليوليات وفصيلة الزنبقيات. انواعه عديدة منها البرية والزراعية. سوقها فردية منتصبة. اوراقها حاضرة متعاقبة او متقابلة اوضمية. ازهارها شراخية الارتكاز، انبوية، معنقة متدلية، لونها الى الابيض الموشح بالاخضر او الودي الموشح بالاصفر || اعرف واشهر انواعه ما يتبع.

٨٧٢٨ - خَاتَمُ سُلَيْمَانَ الْأَمْرَط* ، عَقْدَاءُ مَرَطَاء

Polygonatum commutatum (S). *Polygonate glabre*, *Sceau de Salomon glabre* (F).

نبات عشبي معمر منبته امريكة الشالية. يعلو من ٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه مرطاه البشرة. اوراقه متعاقبة، بيضبة، لامعة، نصلها يطول من ١٠ الى ١٥ سم. ويعرض من ٦ الى ١٠. ازهاره لا رائحة له. معاليقه تحمل من الزهرة الى ثماني زهرات لونها الى البياض الاخضر، طولها نحو ٢٠ مم. وقطرها ٨ || تنويره يستمر من ايار الى تموز.

٨٧٤٤ - خاشب Dendrophage (F).

Dendrophagous (E).
نمت تعريف يطلق على كل حيوان أو حشرة قوتها المواد الخشبية.

٨٧٤٥ - خاشبيات Xylophages (F).

Xylophagous (E).
هي الحشرات من أي نوع كانت تغذي من الياف النبات الخشبية حية كانت أو ميتة. مفردها خاشب وخاشبة.

٨٧٤٦ - خاشبيات ٥ ، تشرانيكيات

Trombididae, Tetranychidae (S), Trombidids, Tetranychids (F), Trombididae, Tetranychidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة القراديات، أجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القد لا تكاد ترى، تركيب مختلف أنواع النبات فتعيش على خسلها النسيج النباتية التي تقضي عليها ومن النسغ الذي تمتصه من الاعصاب والشرابين.

٨٧٤٧ - خاشبيكة ٥ Trombidion

جنس حشرات ضارة من فصيلة الخاشبيات، أنواعه عديدة جميعها شبه مخروطية الشكل، طولها نحو نصف مليمتر، مكنتها ذري أبيض اللون أو أحمر تمتحها الالتي، في الربيع والصيف، على صفحة النصل السفلى، وفي الخريف بين تجاعيد اللحاء وفي شقوقها، فينقف عن يرقات تدعى أرينوز (Erinose) تلغم بشرة النسيج ومسامه وتحدث فيه ما يشبه الجرب.

٨٧٤٨ - خاشبيكة الإحاص ٥ ، فيتوبتوس الإحاص

Phytoptus pyri, Eriophyes pyri (S), Phytopte du poirier (F), Pear leaf blister mite (E), Birnblatt-pockenmilbe (D).

حشرة من الخاشبيات المجهرية المخروطية الشكل طولها نحو نصف مم. لونها إلى الصفرة النارية تركيب أوراق الإحاص قتلهم مسام النصل وبشرته وتسبب له ما يشبه الجرب. تكافح كثيرها من الحشرات.

٨٧٤٩ - خاشبيكة التفاح ٥ ، أكاروز التفاح، كنهذب التفاح

Tetranychus pilosus, Paratetranychus pilosus, Penthalodes mytilaspidis (S), Araignée rouge du pommier, A. r. des arbres fruitiers (F), Red spider (E), Rote spinne, Obstbauspinnmilbe (D).

حشرة من الخاشبيات المجهرية طولها نحو نصف مم. لونها إلى الحمرة تركيب أوراق وثمار التفاح تتؤذيها وتشوهها. أجيالها الحولية عديدة تبندئ من الربيع وتفتفي في أوائل الخريف حيث تمتح مكنتها الشتوي في شقوق وتجاويف اللحاء وعند ابط الافناد والبراعم وفي جميع أخاديد وثنايا البشرة || تكافح أولا في الشتاء باستعمال الزيوت المعدنية أو أحد الموائين الفعالة على دفعتين متواليتين بين الأولى والثانية من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع. ثم في الربيع، بعد نقف المكن، باستعمال أحد الحواشير المجربة الفعالة.

٨٧٥٠ - خاشبيكة الكرمة ٥ ، فيتوبتوس الكرمة

Phytoptus vitis (S), Phytopte de la vigne (F).
حشرة من الخاشبيات المجهرية المخروطية الشكل طولها نحو نصف مم. تركيب أوراق الكرمة قتلغها وتسبب مرض الارينوز.

٨٧٥١ - خاصة ، خاصية Propriété (F).

Characteristic (E).
الميزة التي يتصف بها الشيء.

٨٧٣٢ - خاتم سليمان المخزني* ، خاتم

سليمان العطري، عقدا عطرية
Polygonatum officinale, P. odoratum, Convallaria polygonatum (S), Polygonate officinale, P. odorant, Sceau de Salomon odorant, Genouillet (F).

نبات عشبي طبي بري معمر يعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقه مضلعة، ملساء البشرة. أوراقه مستطيلة يراوح طولها من ٥ إلى ٨ سم. وعرضها نحو ٢ سم. أزهاره عطري العرف، مباليقه تحمل من زهرة إلى زهرتين، لونها إلى الأبيض الأخضر، طولها نحو ٢٠ مم. وقطرها ٧ مم || يكثر في الغابات والحراج الرطبة. يستعمل في علاج داء النقطة || تنويره يستمر من أيار إلى حزيران.

٨٧٣٣ - خاتم سليمان الوردي، عقدا وردية

Polygonatum roseum (S), Polygonate rose, Sceau de Salomon rose (F).

نبات عشبي معمر منبته الاصقاع الاسيوية الباردة. ساقه ملساء البشرة تعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه مستطيلة النصل الضيق. أزهاره ثنائية التجميع لونها إلى الوردي || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

٨٧٣٤ - خائير Lait caillé (F), Curdled milk (E).

هو اللبن الرائب إذا ظهرت حموضته ولم تشتد.

٨٧٣٥ - خادرة* Chrysalide (F), Chrysalis (E).

هي كل عذراء من فراشات حرشقيات الاجنحة عندما تكون في دورها الانتقالي من يرقة إلى حشرة كاملة.

٨٧٣٦ - خادشة

طرف السفا. خادشات السفا: اطرافه من منبل البر والشعير.

٨٧٣٧ - خار Mugir (F).

To bellow (of bull), To low (of cow) (E).

خار البقر يخور خواراً: صاح وجار وصج ونأج.

٨٧٣٨ - خارج القسمة Quotient

٨٧٣٩ - خارجي Exogène (F), Exogenous (E).

صفة بعض الاعضاء النباتية وأخصها الفطور التي تتكاثر من الخارج.

٨٧٤٠ - خارجي الإتجاء Extrorse

٨٧٤١ - خارصين ، زئلك ، توتيا Zinc


معدن ذو لون أبيض ضارب إلى الزرقة يصدأ عند تعرضه للهواء الرطب فيصبح رمادياً. وهو قابل للسحب والطرق، موصل للحرارة والكهرباء || رمزه (Zn)، وزنه الذري ٦٥.٣٨، تكافؤه ٢ ثقله النوعي يراوح من ٦.٨٥ إلى ٧.٢٠. ينصهر عند بلوغه ٤١٩°سغ. ويغلي في ٩٣٢°سغ. || لا يوجد نقياً في الطبيعة. خاماته عديدة أخصها كربونات الخارصين. يستخدم في عدة صناعات وتركيب وفي وقاية الحديد من الصدأ.

٨٧٤٢ - خارطة Carte (F), Playing-card (E).


٨٧٤٣ - خازن الجليوز، خازن البندق

Sittelle (F), Sitta, Nuthatch (E).


طائر يدعى كياسر الجوز، اطله.




خاتم سليمان المخزني



خادرة



خاشبي الإحاص



خاشبي التفاح




خاشبي الكرمة



خاطف الذباب



خانور



خالدة دموية



خالدة سنية



خالدة صفراء



خالدة طاقية

٨٧٦٥ - خَالِدَة ، هَلِيكْرِيز Helichrysum (S).

Helichryse, Immortelle (F). Eternal flower (E). Strohlume, Gartenimmortelle (D). Elicriso, Immortali (I).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة المركبات. أنواعه نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع الاصقاع العالمية. منها العشبية والليفية والحولية والمعمرة. اوراقها متعاقبة، حاضرة. ازهارها رويسي كثيف القنابات الشارفة الزاهية الالوان. ازهارها صغيرة قرصية التجميع تحيطها القنابات الجامدة. ألوانها ثابتة تدوم ما دامت الازهار المقطوعة التي لا تذبل || أعرف أنواعه واشهرها ما يتبع.

٨٧٦٦ - خَالِدَة الْجُرُر Immortelle stéclade (F).

اطلب أمارنطون، نبات عشبي تزييني.

٨٧٦٧ - خَالِدَة دَمَوِيَّة* ، هَلِيكْرِيز دَمَوِي Helichrysum sanguineum (S). Helichryse sanglante, Immortelle sanglante (F).

نبات عشبي زغبى معمر. منبته الشرق الادنى. يكثر في لبنان وفلسطين. ساقه زباء تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه زغبية النصل السناني الشكل الاطلح اللون. ازهاره دموية || ازهاره يستمر من اوائل ايار الى اواخر حزيران.

٨٧٦٨ - خَالِدَة سَنِية* ، هَلِيكْرِيز سَنِي Helichrysum fulgidum (S). Helichryse éclatante, Immortelle éclatante (F).

نبات عشبي معمر. ساقه منتصبه زباء البشرة تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه عصفية الشكل منتصبه النصل تطول من ٤ الى ٨ سم. ازهاره كبيرة القد جميلة الصفار المذهب العابق || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

٨٧٦٩ - خَالِدَة صَفْرَاء* ، هَلِيكْرِيز شَرْقِي Helichrysum orientale (S). Helichryse orientale, Immortelle jaune, l. à bouquets (F).

نبات عشبي معمر. ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقه متعاقبة، حاضرة، سنانية، ضيقة النصل. ازهاره عذقية التجميع، صفراء اللون || زراعته واسعة الانتشار. ازهاره يستمر من نيسان الى آب.

٨٧٧٠ - خَالِدَة طَاقِيَّة* ، هَلِيكْرِيز طَاقِي Helichrysum arenarium (S). Helichryse arénaire, Immortelle des sables (F).

نبات عشبي معمر. ساقه منتصبه فرعاء تعلو نحو ٣٠ سم. اوراقه ملعقية، مستطيلة، زباء النصل. ازهاره عذقية التجميع لونها الى الصفار || يرغب في الاتربة الرملية وينبت في جميع الاصقاع المعتدلة || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

٨٧٧١ - خَالِدَة قَنَابِيَّة* ، هَلِيكْرِيز قَنَابِي ، ذَهَبَ الشَّمْس

Helichrysum bracteatum (S). Helichryse à bractées, Immortelle à bractées, l. de la Malmaison, Fleur de paille (F).

نبات عشبي معمر عديد الفروع الزينية. ساقه صلبة تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه سنانية النصل الضيق تطول من ٧ الى ١٠ سم. ازهاره مستطيلة المالحق، عديدة الالوان التي تختلف مع الفروع. يكثر فيها الاصفر والاحمر والبنفسجي || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

٨٧٥٢ - خَاصِرَة Flanc (F). Flank (E).

٨٧٥٣ - خَاصِم Actionner, Agir en justice
رفع دعوى على. اي التجأ الى القضاء.

٨٧٥٤ - خَاصِيَّة Faculté (F). Property (E).

ج. خاصيات وخصائص. هي قوة طبيعية كامنة تمكن الاحياء من القيام بعمل ما.

٨٧٥٥ - خَاصِيَّة الْإِنْتِاش Faculté germinative (F). Germinal faculty (E).

القوة الجبلية الكامنة في البذور وتدعى قابلية الانتاش لانها نسبية متفاوتة النشاط.

٨٧٥٦ - خَاصِب ، صِبَاغ Colorant (F).

Colouring (E).

٨٧٥٧ - خَاضِلَات ٥

Melolonthidés, Phyllophages, Phytophages (F). Melolonthidae, Phyllophagous, Plant-eating (E).

هي الحشرات المضرة من اي نوع كالت تركب اوراق النباتات وزيمعته فتفرضها وتؤذيها.

٨٧٥٨ - خَاضِلَة ٥ ، رَابِلَة ٥ Phytophage (F).

Plant-eating (E).

نعت تعريفي يطلق على الحشرات التي تتغذى من اي جزء كان من النبات.

٨٧٥٩ - خَاطِف الذَّبَاب* ، شَوْرَب ، بُوبَالَة ، مَذْبَاب ٥

Muscicapa (S).

Muscicape, Gobe-mouches (F). Fly-catcher (E).

جنس عصافير من فصيلة المذبذبات. أنواعه عديدة جميعها صغيرة القد طويلا يراوح من ١٣ الى ١٦ سم. معظمها ايلق الثوب. ذكورها ازهى من اناثها. وهي باكثريتها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والمشي. تألف الغابات والحدائق. قوتها الحشرات المجتمعة انحصار الذباب. تدش في الاشجار. اناثها تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمنابرة الذكور من ١٤ الى ١٥ يوما.

٨٧٦٠ - خَاطِف ظِلَّة Céryle (F).

Pied kingfisher (E).

هو الرفراف، اطلبه.

٨٧٦١ - خَاطِيَّة Aigle impérial (F).

Imperial eagle (E). هي العقاب القيصرية، اطلها.

٨٧٦٢ - خَافِيش ٥ ، دَالِس ٥ Lucifuge (F).

Lucifugous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تسرح في الظلام.

٨٧٦٣ - خَافُور* Danthonia (S).

Danthonie (F). Wild oat-grass (E). Kelchgras, Danthonie (D). Vena spigata (I).

جنس نباتات عشبية، برية، حولية، مرعوية وعلفية تنتمي الى الحوطا وفصيلة النجيليات. أنواعه نحو ٢٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. يكثر وجودها في المراعي والحقول تحتلفها الماشية والجمال خاصة.

٨٧٦٤ - خَافُور الجِمَمَال Avoron (F). Flaver (E).

هو غرطال فتوا، اطلبه.

٨٧٨١ - خَامَة

الخامة من الزرع : اول ما ينبت على ساق وقيل الطاقة الغضة . وفي الحديث : « مثل المؤمن مثل الخامة من الزرع يحبلها الريح مرة هكذا ومرة هكذا » .

٨٧٨٢ - خَامَدْرِيس جَبَلِي (F). Dryade à pétales (F). White dryas (E).

هو الليميص الثماني البتلات، نبات عشبي مداد، اطلبه .

٨٧٨٣ - خَانِقِ الذُّبَابِ* ، دَيُونَة

Dionaea (S). Dionée, Attrape-mouches, Trappe de Vénus (F). Venus's fly-trap, Fly catcher (E). Echte fliegenfalle (D). Chiappa mosche (I).

نبات بري وتزييني معمر من فصيلة النيدمانيات الحشرات. اوراقه ثنائية الفلقة المحمية ، هدية الاطار ، قرصية التجميع ، تلامس التربة . ازهاره عشكولي يقوم على شراخ طويل دقيق . ازهاره صغيرة القد ، نظامية التركيب ، بيضاء اللون : من ميزاته ان اوراقه تنطق على كل حشرة تلمسها كالذباب وعيره فتفرز عنه انطباقها مادة حضية تبيت الحشرة وتحولها الى غذاء يمتصه النبات .

٨٧٨٤ - خَانِقِ الفَهْدِ (F). Arnica (E). هو الارنيكا ، اطلبها .

٨٧٨٥ - خَانِقِ الكَلْبِ (F). Tue-chien (F). Dog's bane (E).

هو الخوشان نبات طبي من الدفليات ، اطلبه .

٨٧٨٦ - خَانِقِ النَّمِرِ (F). Doronic (F). هو الدرنوق ، اطلبه .

٨٧٨٧ - خَانِقِ (F). Diphtheria (E). هو الليفتريا مرض وبائي .

٨٧٨٨ - خَائِثَة (F). Aigle impérial (F). هي العقاب القيصرية ، اطلبها .

٨٧٨٩ - خُبْ* ، سُعَادِي مَدَّاد (F). Carex extensa (S). Carex extensible, Laiche extensible (F). Long bracted sedge (E). Riedgras (D). Carico panico (I).

نوع من السعادي وهو نبات جذموري معمر من فصيلة السعديات يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لتثبيتها .

٨٧٩٠ - خُبْ* الخب هو لحاء الشجر الغض النضر .

٨٧٩١ - خُبْ* (F). Végéter (F). To vegetate (E). خب النبات اذا ارتفع عن التراب .

٨٧٩٢ - خِبَاءٌ، كَرْبَلَة (F). Carpel (E). مجموع الاعضاء الانثوية التي يتألف منها متاع الزهرة وهي المبيض والقلم والسمة والمدقة .

٨٧٩٣ - خِبَاءٌ ، سَبَا (F). Alchiba الخباء ويدعى السبا وينتقل الغراب نجم نير من كوكبة الغراب .

٨٧٩٤ - خِبَاءٌ يَمَانِي (F). le Corbeau (F). Corvus (E).

الخباء الباني كوكبة نجوم جنوبية الموقع تدعى الغراب ، اطلبه .

٨٧٧٢ - خَالِدَة مُذَهَبَة* ، هَلِيكْرِيز ذَهَبِي (F). Helichrysum plicatum (S). Helichryse dorée, Immortelle de Grèce (F).

نبات لبني معمر . ساقه فرعاء تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه عصفية ، منبسطة ، خلية النصل ، فضية اللون . ازهاره عذقية التجميع ذهبية اللون . مبذول في الشرق الاوسط واليونان || ازهاره يستمر طوال الصيف .

٨٧٧٣ - خَالِدَة مُعَنْقَة ، هَلِيكْرِيز مُعَنْق (F). Helichrysum petiolatum, Gnaphalium lanatum (S). Helichryse pétiolée, Immortelle pétiolée (F).

جنبية ليفية معبرة . ساقها فرعاء تعلو نحو المتر . اوراقها معنقة متعاقبة بيضية الشكل خلية النصل على صفحتيه . ازهارها عذقية التجميع صغيرة القد تبني اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

٨٧٧٤ - خَالِدَة بُتْنَة ، هَلِيكْرِيز بُتْن (F). Helichrysum foetidum (S). Helichryse fétide, Immortelle fétide (F).

نبات عشبي معمر . ساقه منتصبه قوية تعلو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه عصفية الشكل منبسطة . طولها نحو ٧ سم . وعرضها ٢ نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهاره كريمة الرائحة ، كثيفة التجميع ، لونها من الاصفر التبي الى الاصفر المذهب || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٧٧٥ - خَالِص الى السَفِينَة ، قُوب (F). F.O.B., Franco à bord (F). Free on board (E).

صيغة شرطية يتعهد بموجها البائع ان يسلم المبيع على ظهر السفينة الناقلة دون اضافة أي اجرة كانت .

٨٧٧٦ - خَامَا أَقْطِي (F). Yèble (F). Damwort (E). راجع بيلسان صغير .

٨٧٧٧ - خَامَا بُوْقِي* (F). Chamaepeuce diacantha, Cirsium diacantha (S). Chamépeuce (F). Fishbone thistle (E). Schirsumpfler (D). Camepuce (I).

نبات عشبي بري شوكي طبي من فصيلة المركبات . يكثر في الاراضي البور وعلى حواشي الطرقات . ساقه مضلعة فرعاء تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه حاضنة ، مفروضة ، ضيقة التشريح ، حسفة ، نصلها لامع الصفحة العليا ، خلي السفلى .

٨٧٧٨ - خَامَا دَرِّيُوس (F). Germandrée officinale (F). Common germander (E).

هو الطوقريون الخزفي نبات عشبي بري طبي جزيل النفع .

٨٧٧٩ - خَامَا سُوقِي* ، تَبْنِ الارْض (F). Euphorbia chamaesyce (S). Euphorbe monnoyer (F). Crenated annual spurge (E). Niedrige euphorbie (D). Erba pondina, Fico per terra (I).

نبات نجمي عشبي بري من فصيلة الفربيونيات . عيدانه لبني العصارة . اوراقه مستديرة صغيرة القد . ثماره ثنائية مفلطحة تلحفها الاوراق || يقال انه طبي يسهل الاخلاط الغليظة ويسقط البواسير اكلا بالخبز ويلحم القروح ويقطع الثآليل .

٨٧٨٠ - خَامَا قَيْسُس (F). Asarine (F). هو سيسم اصريته ، اطلبه .




خَالِدَة قَذَابِيَة



خَالِدَة مُذَهَبَة




خَامَا بُوْقِي



خَامَا سُوقِي



خَانِقِ الذُّبَابِ



خَبْ

٨٨٠٤ - خُبَّازَة مِسْكِيَّة ، عِطْر

Malva moschata (S). Mauve musquée (F).
بجلة معمرة مهددا الشرق الأدنى تملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها فرعاء متشعبة. أوراقها خنسية التفريضة العميق ، فصلها خلي البشرة. مسن الحافة. باهت الخضار الزهري. ازهارها متوسطة القد ، قطرها نحو ٣ سم. لونها الى الوردي ، كرايلها زياء الصفحة ، خالية من التخديد. اوراقها وازهارها عطرية ، اريجها اريج المسك || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٨٨٠٥ - خُبَّازَة مَغْرِبِيَّة
Malva mauritiana (S). Mauve de Mauritanie, M. d'Alger (F).
جنبه محولة تملو نحو ١٥٠ سم. ضروبها عديدة ، سوقها منتصبه زياء اللحم. اوراقها كبيرة القد ، خنسية التفصيص ، زغبية النصل. ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. ألوانها تختلف مع ضروبها ، منها الوردي والبنفسجي والارجواني || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى آواخر تموز.



خبازة

٨٨٠٦ - خُبَّازِيَّات

Malvaceae (S). Malvacées (F). Malvaceae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القملات ، سفلية الاسدية. اجناسها نحو ٥٠٠ تجمع ما لا يقل عن ١٥٠٠٠ نوع منتشرة في جميع اصقاع العالم اخصها المناطق الحارة والاستوائية || نباتاتها مختلفة القد والشكل ، منها الاعشاب واليجلات والجنبات والشجيرات والشجر. اوراقها معنقة ، اذنية ، متعاقبة ، بسيطة او مفصصة وبعضها زغبية النصل. ازهارها لاقياسي الارتكاز والتجميع ، منه الابطي والمحوري والتاجي والطامي ومنه الفردي والنوري والمتفودي والسنبلي. ازهارها خنسية التركيب عديدة الالوان || والخبازيات من اشهر فصائل المملكة النباتية لانها تشمل الكثير من الانواع الزراعية التي يستعملها الانسان لغذائه وصناعاته وبعجته. كما انها غنية بالانواع الطيبة والصحية النافعة.

٨٨٠٧ - خُبَّاط *
Ophiocephalus (S).

Ophiocephale (F). Ophiocephalus (E).
جنس اسماك نهريه من فصيلة الخباطيات. انواعه المعروفة ٤ اعطائها تمتد من الهند الصينية الى ماليزية وافريقية الاستوائية. تألف الانهر والبحيرات والمناقع || اجسامها اهليلجية ، مستطيلة ، معتدلة التبطيط. طول من ٣٠ الى ٥٠ سم. رؤوسها مستطيلة ، منخفضة الجباه ، مخروطية الاخطام ، كبيرة الاشدان. هيونها صغيرة ، ماسحة ، متقدمة. زعانفها الظهرية مشطية الشكل ، قاطبة ، تقابلها الشرجية حتى منتصف البطن. الذيلية مستديرة الاطراف. اثوابها الى الخضار الباهت يعلوه تجذيع متقطع يمتد من العنق الى الذيل || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة.



خباط

٨٨٠٨ - خُبَّاطِيَّات ه

Ophiocephalidae (S). Ophiocephalidés (F). Ophiocephallidae (E).
فصيلة اسماك نهريه وهورية من شائكات الزعانف وفئة البلعوميات العجبة. انواعها عديدة تجتمع الى جنسين الخبباط والشنه. جميعها من اسماك المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية. يكثر وجودها في بحيرات واهوار وانهر الهند الصينية وماليزية وافريقية الاستوائية.

٨٧٩٥ - خُبَّاب

Trotteur (F). Trotter (E).
هو الفرس المروض على الخيب.

٨٧٩٦ - خُبَّازَة

Terrier de rat (F).
جحره الجرذان ج خبار.

٨٧٩٧ - خُبَّازَة ، إختيَّاز

Panification
هي صناعة الخبز اي تحويل الدقيق خبزاً.

٨٧٩٨ - خُبَّازَة * ، خُبَّازِي

Malva (S). Mauve (F). Mallow (E). Malve (D). Malva (I).
جنس نباتات عشبية من فصيلة الخبازيات. انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. اوراقه معنقة ، متعاقبة ، مفصصة او مفرضة. ازهاره لا قياسية الارتكاز والتجميع ، مختلفة الالوان ، تفيد الصدر وتدخل في بعض المستحضرات الطبية والتركيب الصحية || اشهر انواعه الزراعية الزينية ما يتبع :

٨٧٩٩ - خُبَّازَة إصْبَعِيَّة

Malva digitata, Callirrhoe digitata (S). Mauve digitée, Callirrhoe digitée (F).
بجلة معمرة تملو نحو المتر. مهددا امريكة الشمالية. اوراقها عميقة التفريضة الاعصبي الشكل. ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها مثلثة الزوايا. مسنة الحافة ، جؤوية اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٨٨٠٠ - خُبَّازَة بَرِّيَّة

Malva sylvestris (S). Mauve sauvage, Grande mauve, Fromageon (F).
بجلة محولة تملو من ٤٠ الى ١٢٠ سم. ساقها خفيفة منبسطة ، هلية وزياء اللحم. اوراقها لاقياسية التفصيص ، عدد فصوصها يراوح من ٣ الى ٧. ازهارها ابطية الارتكاز ، متوسطة القد ، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بنفسجية اللون تقطبها ثلاثة خطوط عابقة. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٨٨٠١ - خُبَّازَة جَعْدِيَّة

Malva crispa (S). Mauve frisée (F).
جنبه حولية مهددا الشرق الأدنى. تملو من متر الى مترين. ساقها مستقيمة ، منتصبه ، مورقة حتى ذروتها. اوراقها كبيرة القد ، مستديرة ، مجمدة النصل. ازهارها صغيرة لاطة ، بتلاتها ثنائية التفصيص لونها الى الابيض الوردي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

٨٨٠٢ - خُبَّازَة مُخَطَّمِيَّة

Malva alcea (S). Mauve alcée, Aicée (F).
بجلة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها السفلى مقرنة الزوايا ، العليا خنسية التفريضة. فصلها ضيق الصفحة مسن الحافة. ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الوردي. كرايلها محددة ، مرطاه البشرة. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

٨٨٠٣ - خُبَّازَة قَنَابِيَّة

Malva involucrata, Callirrhoe involucrata (S). Mauve involuquée, Callirrhoe involuquée (F).
عشبة معمرة تملو نحو ٨٠ سم. ساقها زياء اللحم. اوراقها مخروطية الشكل ثلاثية او خنسية التفريضة العميق. ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم. لونها الى البنفسجي يعلوه موج ارجواني || ازهارها يستمر طوال الصيف.

٨٨٢٢ - خُبْزِيَّات (F). Artocarpae (E). Artocarpées (F).
سيط من فصيلة الانجريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠
معظمها من نباتات المناطق الاستوائية .

٨٨٢٣ - خَبْط ، مَقْس (F). Malaxage (F).
Kneading (E).
خبط او مقس الزبدة بعد فصلها عن الخيض لتجانس
اجزاؤها بعد طرد الهواء منها .

٨٨٢٤ - خَبَق * (S). Chara (S).
Chara, Charagne, Lustre d'eau (F). Chara, Stone-
wort (E). Armleuchter (D). Chara, Foladina (I).
نبات بحري من فصيلة الخبقيات يتميز بزوائده التي
تحوق بالغلايا العقدية وتؤلف معها قلائس مركبة من
خمس نيمات جولية الخنار .

٨٨٢٥ - خَبَقِيَّات (F). Characées (S). Characeae (E).
فصيلة نباتية من الخباق . اجناسها وانواعها المعروفة
عديدة ، معظمها من متحجرات الحفبة الترياسية من الاباج
الاول || اكثر انواعها المعاصرة يعيش مغموراً في المياه
العذبة المستنقعة وبعضها في الماء الاجاج || جميعها قائمة
الحضار وينفوخ منها عند لمسها صلبة ننتة .

٨٨٢٦ - خَبَل * (S). Strix aluco, Syrnium aluco (S).
Hulotte, Chat-huant (F). Tawny owl (E).
طائر من البوميات وعمارة الفداديات . جثته متوسطة
الحجم ، طوله نحو ٥٠ سم . رأسه غليظ الشكل . محسره
كروي القرص . منسره قصير القد ، منعقف الطرف ،
اسمر اللون . سقطاه منفرجة مستطيلة تكاد تشرف
على الذنب . ذنبه قصير الافنيك مستديره . ارسافه
صغيرة قوية كاسية ومخالبه كذلك || موطنه جميع البلاد
المعتدلة الحرارة . يألف الغابات والاحراج . يبتعد
عن الاماكن الآهلة وهو كثير الزقاء لا ينقطع
عنه من الغسق الى الفجر || يدن عشه في صدوع الاشجار
القديمة الباسقة وفي اوكن غيره من الطير . انشاء تبيض
نحو ٤ بيضات مستطيلة خشنة عاجية اللون تحضنها وحدها
نحو اربعة اسابيع || يلتصق قوته في الليل ولا يعف عن
شيء يستطيع اقتناصه من الحشرة الى الحية .

٨٨٢٧ - خَبْه (F). Erysimum (F). Treacle worm-seed (E).
هي حشيشة الحفر ، اطلبها .

٨٨٢٨ - خَبِيَّارِي ، صُعْثَر (F). Caviar (F).
Caviare (E).
هو سره السمك المحضر .

٨٨٢٩ - خَبِير (F). Expert
الخبير من درس الشيء واختبره وتوصل الى معرفته وادراك
كنهه . لذلك فهو اولاً واختيراً رجل علم واختصاص
وفطنة ودراية .

٨٨٣٠ - خَبِيرَة (F). Tonte de l'er choix (F).
الخبيرة : الصوف الجيد من اول الجز .

٨٨٣١ - خَبِيرَة (S). Althaea (S).
Guimauve (F). Marsh-mallow (E).
جنس نباتات عشبية سبوتية من فصيلة الخبازيات .
انواعها عديدة منها البرية والزرينية ، اوراقها شبه غليبية

٨٨٠٩ - خَبَال (F). Dysboulie (F).

الخبال اسم جنسي جامع يطلق على كل ما يسبب اضطراب
قوة الإرادة او اختلالها .

٨٨١٠ - خَبَب (F). Trot

هو مراوحة الفرس بين يديه ورجليه لذلك فهو نوع من
السير بين الخطو والعدو . وقد يكون على اشكال وهي :

خبب طويل Trot allongé (F).

خبب عادي Trot ordinaire (F).

خبب قصير ، هريرة Trot raccourci (F).

خبب معيب ، هملجة Trot décousu, Amble rompu (F).

٨٨١١ - خَبْت (F). Terrain déprimé (F).

Depress soil (E).

الخبث ج أخبات وخبوت هو المتسع المظلم من بطون
الارض .

٨٨١٢ - خَبْطَة (F). Bande de sables (F). Sand-strip (E).

الخبطة ج خبيب : طريدة مستطيلة من الرمل .

٨٨١٣ - خَبَث الحديد (F). هو التوبال ، اطلبه .

٨٨١٤ - خَبْدُع (F). Rainette (F). Tree-frog (E).

هو الشرعوف نوع من الضفدع الاخضر اللون ، الصغير
القد ، يتسلق الاشجار .

٨٨١٥ - خَبْدُعِيَّات (F). Firmisternes (F).

Firmisternes (E).

لغة من رقية السنويات ، عديمات الذنب ، سلمات اللسان .
افواصها المعروفة كثيرة العدد تجمعها خمس فصائل الرزانيات
الشقدعيات ، المدموليات ، النشيديات والهورسيات ||
تتميز جميع صفادع هذه اللغة بمساواة سطح ضلعي قوسها
الصدري في مركز تلاقيها || اشهر اجناس هذه اللغة
الضفدع والشقدع .

٨٨١٦ - خَبَر (F). Préparer (F). To prepare (E).

خبر التربة : حضرها للزراعة .

٨٨١٧ - خَبِيرَة (F). Expertise (F). Survey (E).

هي كشف الخبر وتقريره .

٨٨١٨ - خَبْز (F). Pain (F). Bread (E).

طعام يصنع من دقيق بعض الحبوب بعد عجنه بالماء واختاره
واختبازه . اشيع الحبوب المستخدمة في صناعة الخبز هي
الحنطة والدره والشعير والشوفان || وهو يعتبر كالطعام
الرئيسي للانسان في اكثر انحاء العالم . يقال انه عرف
منذ اقدم العصور نظراً لبقايا خبز الشعير التي وجدت
في كهوف يرجع عهدها الى العصر الحجري .

٨٨١٩ - خَبْزُ الْعُقَاب (F). Campanule lacnulée (F).

هو الجريس الاعجن ، اطلبه . Hare-bell (E).

٨٨٢٠ - خَبْزُ الْقَاق ، خَبْزُ الْغُرَاب (F).

Cotylédon ombilique (F). Pennywort (E).

هو سرة الارض ، اطلبها .

٨٨٢١ - خَبْزُ الْمَشَايِخ (F). Cyclamen (F).

هو السكع ، اطلبه .




خبق



خبيل



خَبِيرَة ثَيْبِيَّة



خَبِيرَة وَدِيَّة



خَتِير



خَتِير اَرْجَوَانِي



خَتِير بَنْفَسَجِي

٨٨٣٩ - خَبِيرَة ، خَتَارَة Condensat (F).
Condensat (E).
الختار أو الختارة ما تبقى من مادة معينة بعد معالجتها بالتبخير أو التجفيف .

٨٨٤٠ - خَتْرُف Absinthe (F). Absinthium (E).
أطلب أبسنت .

٨٨٤١ - خَتْعِيَّة Tigresse (F). Tigress (E).
الختعة : أنثى الببر ومن اسمائها المشهورة : فزارة .

٨٨٤٢ - خَتَل Tanière de lièvre (F).
Hole of hare (E).
جحر الارنب البري .

٨٨٤٣ - خَتُّو* ، أَبُونَضْوَة Buceros (S).
Calao, Dichocère (F). Hornbill (E).
جنس طير من الجواثم الملتصقات الأصابع . أنواعه قليلة جميعها بلقاء الثوب . طولها براوح من ١٢٠ إلى ١٣٥ سم . منقارها كبير القد طولها من ٢٨ إلى ٣٦ سم . غليظ الهيئة مسلح بقرن غضروفي شكله شكل النضوة يمتد من الرأس إلى منتصف المنقار || موطنه البلاد الحارة . يألف الغابات الكثيفة . قوته الثمار على أشكالها وأنواعها . يلدن عشه في صدوع الأشجار . انشاء تضع من ٥ إلى ٦ بيضات تحضنها ثلاثة أسابيع دون أن تتركها دقيقة واحدة لأن الذكر يحجر عليها بالطين والقش ولا يترك لها سوى مخرج منقار ليتمكن من زلقها .

٨٨٤٤ - خَتُونِيَّات ٥ Chétognathes (F).
Chetognathes (E).
فئة دوبيات بحرية من اشياء الديدان . أجسامها شبه انبوبية الشكل تطول من ١٠ إلى ٥٠ م . تعيش على الطلوج . تتميز بنشاطها وبسرعة تكاثرها .

٨٨٤٥ - خَتِير ٥ Cortinarius (S). Cortinaire (F).
جنس فطور غشائية من فصيلة الفاريقونيات . انواعه المعروفة كثيرة العدد الذي يتجاوز ٣٠٠ اعطانها معظم اقاليم البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش على المواد الدبالية والنباتية المنحلة . تتميز ببوغها النحاسي اللون وبأغشيتها الدقيقة التي تنقلص مع تقادم العمر وتجتمع على السوق || انواعه الجيدة الصنف المأكولة قليلة العدد والاخرى كاعنة غير مرغوب فيها . اشهرها التالية :

٨٨٤٦ - خَتِير اَرْجَوَانِي ٥ Cortinarius purpurascens (S).
Cortinaire pourpré (F).
نوع من الختير ، يوجد في الغابات والحراج الرطبة . ساقه مستقيمة القاعدة ، معتدلة الارتفاع . ارسوته صيوانية الشكل ، ارجوانية اللون ، قطرها نحو ١٢ سم . اطراسه ولحميته الى البنفسجي . لحميته جيدة الصنف ، مأكولة .

٨٨٤٧ - خَتِير بَنْفَسَجِي ٥ Cortinarius violaceus (S). Cortinaire violacé (F).
نوع من الختير ، يوجد في المواقع الظليلة . ساقه شبه مخروطية الشكل . ارسوته صيوانية ، بنفسجية اللون ، قطرها نحو ١٢ سم . اطراسه دقيقة لونها لون الارسوة والساق . لحميته جامدة ، جيدة الصنف ، مأكولة .

مفصصة متعاقبة . ازهارها ابطية متعددة الالوان || جذورها واوراقها وازهارها طيبة لعابية ملينة || اشهر انواعها التريينية ما يلي .

٨٨٣٢ - خَبِيرَة ثَيْبِيَّة Althaea ficifolia (S).
Guimauve à feuilles de figuier (F).
نوع من الخبيزة الحولة . تعلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها تشبه اوراق التين وهي سباعية التفريض العميق ، مسنة الخافة . ازهارها كبيرة القد برتقالية اللون || ترغب في المواقع الجبلية الباردة .

٨٨٣٣ - خَبِيرَة صَيْبِيَّة ، جَوْحَم صَيْبِي ، وَرْدُ الزَوَانِي الصَيْبِي Althaea chinensis (S).
Guimauve de Chine, Rose trémière de Chine (F).
نوع من الخبيزة يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه مزأبرة البشرة الجامدة الملب . اوراقه مقرنة الزوايا لا مفصصة . ازهاره بيض وحر ، قصيرة الزناد ، كبيرة القد ، مكسبة . قطرها نحو ١٠ سم . ازهاره يستمر من تموز الى اواخر الخريف .

٨٨٣٤ - خَبِيرَة قَنَابِيَّة Althaea cannabina (S).
Guimauve à feuilles de chanvre (F).
نوع من الخبيزة المعمرة . تعلو من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم . اوراقها قنابية الشكل ، خماسية التفريض العميق . فصلها ازغب الصفحة السفلى . مسن الخافة . ازهارها كثيرة العدد ، طويلة الزناد لونها الى الورد المصطب والموشح . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٨٨٣٥ - خَبِيرَة مَخْرُوفِيَّة* ، عَضْرَس Althaea officinalis (S).
Guimauve officinale, Althée officinale (F).
White mallow, Marsh-mallow (E).
Apothekerstockmalve, Witte malve, Elbisch (D).
Malvavisco, Altea officinale (I).
نوع من الخبيزة وهو نبات عشبي طيب معمر يعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم . سوقه واوراقه زباء البشرة . اوراقه خلبية ثلاثية او خماسية الفصوص ، مسنة الخافة . ازهاره وردية اللون ، ثلاثية التجميع ، متوسطة القد ، قطرها نحو ٤ سم . || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

٨٨٣٦ - خَبِيرَة وَرْدِيَّة* ، جَوْحَم ، وَرْدُ الزَوَانِي ، شَحَم المَرْوَج ، سُبْت Althaea rosea, Alcea rosea (S).
Rose trémière, Rose de mer, Passe-rose, Alcée rose (F).
Hollyhock, Rose mallow (E).
Rosenstockmalve, Rosenalcee, Malvenstockrosen (D).
Alcea rosa, Malva rosa, Rosa di mare (I).
نوع من الخبيزة . يعلو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ضروره عديدة منها المكبس والعادي ثم الاحمر والارجواني والابيض والاصفر والوردي || ساقه خلية زباء . اوراقه خماسية او سباعية التفصيص . متمجة النصل . ازهاره سنبلية التجميع ، طويلة الزناد ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٨ سم .

٨٨٣٧ - خَبِيرَة بَرْوَنِيَّة Bryone dioïque (F).
Snake-bryony (E).
هي الفاشرا السوداء ، اطلبها .

٨٨٣٨ - خَبِيرَة Carpopore

٨٨٥٥ - خُثَّ ، خُثَيَّات ، أَلْغ

Algues (F). Algae (E).

نباتات من مستورات الزهر ، تنتمي الى رتبة المشريات ، لا تتميز في هيكلها السوق والاوراق والجذور وهي عديدة الفصائل والاجناس والانواع تعيش في البحار او في المياه العذبة || والخث يقسم الى اربع مراتب :

٨٨٥٦ - خُثَّ أَجْمَر ، أَلْغ أَجْمَر

Algues rouges, Floridées, Rhodophycées (F). Red algae, Floridae, Rhodophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تشمل بعض الفصائل .

٨٨٥٧ - خُثَّ أَخْضَر ، أَلْغ أَخْضَر

Algues vertes, Chlorophycées (F). Green algae, Chlorophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تشمل بعض الفصائل كالمذغفات والممصيات .

٨٨٥٨ - خُثَّ أَزْرَق ، أَلْغ أَزْرَق

Algues bleues, Cyanophycées (F). Blue algae, Cyanophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تنسب اليها بعض الجراثيم والبكتيريا .

٨٨٥٩ - خُثَّ أَسْفَع ، أَلْغ أَسْفَع

Algues brunes, Phéophycées (F). Brown algae, Pheophyceae (E).

مرتبة من الخثيات تشمل الفوقسيات وغيرها .

٨٨٦٠ - خُثَّة ، خِثِي

Bouse de vache (F).

Cow-dung (E).

هو روث البقر اللين اي رحيمة . ج اخفاء .

٨٨٦١ - خُثْرِيَّات

Saccharomycetaceae (S). Saccharomycetacées, Saccharomycètes (F). Saccharomyces (E).

فصيلة فطور مجهرية تنتمي الى سرتبة النضيات ورتبة الزقيات تتميز بازرقاقها العريضة الحالية من كل غشاء . اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الخمائر التي تخرج عن نطاق الطفيليات الزراعية . ومنها نوع يعرف بالقشبة يركب ثمار البرتقال والبنندورة والقطن ... اطلبه .

٨٨٦٢ - خُثْق

Gyps fauve (F). Gyps fulvus (E).

هو القشعام الاكلف ، اطلبه .

٨٨٦٣ - خُثْلَة

Bas-ventre, Hypogastre (F).

Hypogastrium (E).

هي اسفل البطن ما بين السرة والعمانة .

٨٨٦٤ - خُثْمَاوَات ، فَتْطَاسِيَّات

Platyrrhiniens (F). Platyrrhiniens (E).

هي مجموعة قرود العالم الجديد . انوفها مستعرضة ، ثخينة الوثيرة ، جانبية السهام || اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجتمع الى فصيلتين : السبوسيات والقرود الدبية .

٨٨٦٥ - خُثْمِي

Algueux (F).

نمت تعريفي يطلق على كل موقع في الماء يكثر فيه الخث .

٨٨٦٦ - خُثْمِي

Exogyne (F). Exogynous (E).

خشم م . خشيمة . نمت تعريفي توصف به الزهرة الناضرة المدقة المستضخمة .

٨٨٦٧ - خُثْد

Joue (F). Cheek (E).

الجزء الجانبي من الرأس وهما خدان .

٨٨٤٨ - خَيْتَر حُرْشَفِي

Cortinarius pholideus (S).

Cortinaire écaillé (F).

نوع من الختير ، يوجد في الغابات الرطبة . ساقه نحيلة ، رفيعة ، عديدة الاطواق الغشائية . ارسوسته مظلية الشكل ، حرشفية الصفحة ، عنايبه اللون . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٨٨٤٩ - خَيْتَر دُمْلُجِي

Cortinarius collinitus (S).

Cortinaire à bracelets (F).

نوع من الختير ، يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه حرشفية الاطواق الغشائية التي تبدو كالدمايح ، لونها الى اليلكي . ارسوسته كستنية اللون يعلوها موج برتقالي ، قطرها نحو ١٠ سم . لحميته كاعنة الصنف لا تؤكل .

٨٨٥٠ - خَيْتَر رَفِيع

Cortinarius elatior (S).

Cortinaire élevé (F).

نوع من الختير ، يوجد في حراج السنديان . يعيش على الدبال . ساقه رفيعة ، معتدلة الشخانة ، بيضاء اللون . ارسوسته شبه مظلية الشكل ، كستنية اللون ، قطرها نحو ١٠ سم . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٨٨٥١ - خَيْتَر كَافُورِي

Cortinarius camphoratus (S).

Cortinaire camphré (F).

نوع من الختير ، يوجد في حراج الصنوبر . ساقه قصيرة مستضخمة القاعدة يبداء اللون يعلوها تمشيح اصفر . ارسوسته قلنسوية الشكل لونها الى الريدة يعلوها موج ازرق وشعة صفراء . رائحة رائحة الكافور . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٨٨٥٢ - خَيْتَر مُتَقَلِّب

Cortinarius multiformis (S).

Cortinaire variable (F).

نوع من الختير ، يوجد في المواقع الظليلة . ساقه مستغلظة القاعدة طحلاء اللون . ارسوسته صيوانية ، صفراء اللون ، موشحة بالبنّي ، قطرها نحو ١٠ سم . لحميته جامدة ، جيدة الصنف ، مأكولة ، رائحتها رائحة السل .

٨٨٥٣ - خَيْتَر مُنْتَصِر

Cortinarius triumphans (S).






Cortinaire triomphant (F).

نوع من الختير ، يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه رفيعة ، معتدلة الجرم ، مستضخمة القاعدة ، عديدة الاطواق الغشائية . ارسوسته كبيرة ، فارشة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها الى البنفسجي الزاهي الاصفر الموج . اطراسها عنايبه اللون . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .

٨٨٥٤ - خَيْتَر مُوَشَّح

Cortinarius armillatus (S). Cortinaire volé (F).

نوع من الختير ، يوجد في الغابات . ساقه صفراء اللون ، برتقالية الاطواق . ارسوسته شبه صيوانية الشكل ، صفراء اللون يعلوها موج امفر ، قطرها نحو ١٠ سم . اطراسها الى الصفار الباهت . لحميته كاعنة الصنف غير مرغوب فيها .






خَدَّابَة



خَدَّاش مَبْدُول



خَدَّال المَتَوَسِّط



خَدَّرَاف رَفِيع



خَدَّرَنْق



خَوَرَنْق عَنكَبُونِي

٨٨٧٧ - خَدَّال المَتَوَسِّط *

Isurus oxyrhynchus (S).

Oxyrhine de la Méditerranée (F).

نوع من الخدال . سمكة بحرية ولود مفترسة من فصيلة
الخمفيات . اعطانها جميع مناطق البحر الابيض المتوسط ||
مسرحتها بمبي غوطي ولا تعبر المياه الاقليمية وتقترب من
المحاذج الا عند مطاردتها اسرلب الرنكة والسردين || جسمها
كبير القد ، وشعي الشكل ، يطول من ٣ الى ٤ امتار .
ثوبها الى الكلسة الزرقاء المواج يعبق عند الظهر وينحرف
نحو الابيض عند البطن . رأسها مخروطي . خطمها شارف .
فها لاطى ، مستعرض الشدق . اسنانها ذرية متراصة .
تتميز بفارق الحجم الكبير بين الزعنفة الظهرية الامامية
والخلفية || الاثنى معتدلة النثار تضع في كل حول ، بين
اوائل ايار وواخر حزيران ، نحو ٤٠ مجراً || لحمها
كاعن الصنف قل من يرغب فيه .

٨٨٧٨ - خَدَّابَاء الخدباء : المقور من كل الحيوان .

٨٨٧٩ - خَدَّاج

خدجت الناقة وكل ذات ظلف وحافر : ألقت ولدها قبل
اوانه وان كان تام الخلق || قال ابن مطير :
لما لقحن الماء الفحل أعجلها
وقت النكاح فلم يتسن تخديج

٨٨٨٠ - خَدَّوَر Loge (F). Cell (E).

الفجوة من ألبيض النباتي حيث تتكون البزرة وتستقر .

٨٨٨١ - خَدَّارَاف رَفِيع *

Alectryon excelsum (S). Alectryon élevé (F).

نبات شجري وحيد الجنس والنوع من فصيلة السابنديات .
منبته زيلاندا الجديدة وسيشل وبعض مناطق الهند ||
شجرته كبيرة القد فرعاء دائمة . اوراقها اهليلجية معنقة .
ازهارها عشكولي التجميع . ازهارها خاسية التركيب . ثمارها
اهليلجية الشكل متنفخة ، سريعة الانفلاق ، قليلة
الالياف ، مأكولة ، مستحبة الطعم . عجائتها دهنية المادة
يستخرج منها دهن شائع الاستعمال المنزلي .

٨٨٨٢ - خَدَّارَة

الخدرة : السرة تقع من النخل قبل ان تنضج .

٨٨٨٣ - خَدَّارَنْق *

Galéode (F).

جنس رتيلاوات من فصيلة الخدرنقيات انزاعه قليلة اعطانها
البلاد اخارة . اجسامها كبيرة او متوسطة القد . اثوابها حنطية
او شقراء اللون . جرامزها مرهقة التهذيب الكثيف . جميعها
خبثية مفترسة تسرح في الليل . تلسع وتسبب بعض الحمود
او بعض القشعريرة المعاودة . ج خدران .

٨٨٨٤ - خَدَّارَنْق عَنكَبُونِي *

Galeodes araneoides (S). Galéode aranéolde (F).

Galeodes aranoides (E).

دويبة من العناكب القانصة من ثنائيات الروايا سداسيات
المشاقن تنتمي الى فصيلة الخدرنقيات || جسمها كبير القد
يطول نحو ٥ م . عند الذكر ونحو ٦ م . عند الانثى .
صدراسها مخروطي الشكل ، حنطي اللون أشقر المواج ،
يتوسطه من القمة الى قاعدة التأشير خط اسود . عينها
زُمَيْتان . شيسفاها ضليمان ، ذربا الحمة . فكها
مستطيلان ، مهدبان . جرامزها مرهقة التهذيب الكثيف .

٨٨٦٨ - خَدَّ البَنْت Eupatoire d'Avicenne (F).

هو غثث ابن سينا ، اطلبه . Hemp agrimony (E).

٨٨٦٩ - خَدَّآ

الخدآ : الدود يخرج من روث البهم . للواحدة خدآة .

٨٨٧٠ - خَدَّابَة * ، رَمَّاح البَحْر ، أَبُو رُمَح

Tetrapterurus belone (S). Tétraptérure aiguille, Poisson-pique, Marlin (F). Two-handed sword (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة السيافيات . اعطانها البحر
الابيض المتوسط || جسمها كبير القد ، وشعي الشكل ،
يطول نحو ثلاثة امتار . ثوبها الى الشبهة الفضية المواج
تزرق وتختصر وتسر عند الظهر وتغير وتبيض عند البطن .
رأسها مخروطي ، خطمها ذلق منقادي الشكل ، عظم نكه
الاعلى وهو مخروطي الشكل يتقدم الاسفل نحو ٢٠ سم .
زعنفها الذيلية هلالية ، اما الظهرية فستطيلة ، قاطبة ،
ثلاثية النتوءات || لحمها مأكول لكنه كاعن الصنف كثير
المادة الزيتية .

٨٨٧١ - خَدَّاج

الخداج هو إلقاء الاثنى ولدها قبل اوانه لغير تمام الايام
وان كان تام الخلق .

٨٨٧٢ - خَدَّارَة *

Nymphose (F). Pupation (E).

الطور الانتقالي الذي تمر به اليرقة قبل ان تتحول الى
حشرة كاملة .

٨٨٧٣ - خَدَّارِيَّة

Aigle des steppes (F).

هي عقاب البادية ، اطلبها . Booted eagle (E).

٨٨٧٤ - خَدَّاش

Pinicola (S).

Durbec (F). Hawfinch (E).

جنس طير من الجواثم مخروطيات المناقير وفصيلة
الشرشوريات . انواعه المعروفة ستة منتشرة في معظم اصقاع
العالم || جميعها صغيرة القد . اطوالها قراوح من ١٦ الى
٢٢ سم . اثوابها متباينة الالوان الزاهية || قوتها الحبوب
والبزور البرية والحشرات || اشهر انواعه الخدش المبدول .

٨٨٧٥ - خَدَّاش مَبْدُول *

Pinicola enucleator, Corythus enucleator (S).

Durbec vulgaire (F). Common Hawfinch (E).

طائر من الخدش مهده يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة
الجنوبية والشرقية || جسمه يطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير
الجرم . منقاره مخروطي الشكل ضليع وقصير . ثوبه الى
الحمرة الخمرية يعلوها تبقيع اسود وابيض || يألف الغابات
ويعيش ذكراً وانثى حتى زمن الارتحال حيث يجتمع الى
اسراب كبيرة تقطع البلاد سعياً وراء المنتجع والرزق في
المناطق الحارة || يدثن عشه في الاشجار الرقيقة . الاثنى
تضع من ٤ الى ٦ بيضات يحضنها بمنابرة الذكر من
الى ١٣ الى ١٤ يوماً .

٨٨٧٦ - خَدَّال *

Oxyrhina, Oxyrrhina (S).

Oxyrhine, Oxyrrhine (F). Oxyrrhina (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة اللغميات ورقة الاشلاق .
انواعه المعروفة ثلاثة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة
الحرارة || اجسامها مستطيلة يغلب فيها الشكل الوشعي .
رؤوسها هرمية المخاطم ، كبيرة الاشدق ، مستدقة الاسنان
المتكاثفة التجميع ، صغيرة النياسم والمناسم .
اشهر انواعه خدال المتوسط .



خَدَرَس

٨٨٩١ - خَدَرَمَانَّة ٥ Kundmannia (S).

Kundmannie, Brignolle, Campdérie (F).

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الخيميات .
أنواعها المعروفة عديدة منبتها بعض مناطق حوض البحر
الابيض المتوسط واروبة الجنوبية والوسطى || سوقها
منتصبة فرعاء . أوراقها ريشية . أزهارها صيواني التجميع ،
طرفي الارتكاز . أزهارها متباينة الاحجام صفراء اللون
او بيضاء || أشهر أنواعها واعرفها الخدمانة السورية .

٨٨٩٢ - خَدَرَمَانَّة سُورِيَّة ٥ Kundmannia

syriaca (S). Kundmannie de Syrie (F).

نوع من الخدمانة . ساقها ملساء فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم .
أوراقها ريشية ، غضة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم .
أزهارها صيواني التجميع ، يمد من ١٠ الى ١٥ شعاعاً .
أزهارها صفراء اللون || تنويرها ربيعي .

٨٨٩٣ - خَدَرَنَق ٥ Mygales (S).

Mygale (F). Mygale, Trap-door spider (E).

جنس عناكب من فصيلة الخدنتقيات . أنواعه المعروفة نحو
٢٠ جميعها من رتيلاوات البلاد الحارة والاستوائية . منها
البناءة والبياشة والنساجة . اجسامها متباينة الاحجام ،
منها الكبيرة الخارقة ومنها الوسطى والصغيرة . أثوابها مختلفة
الالوان . جرامزها مرهفة الهلب الكثيف || جميعها خبيثة
تلسع وتسبب بعض الحمود والقشعريرة المعاودة .

٨٨٩٤ - خَدَرَنَق سَاع ٥ Cteniza sauvagel (S).

Crénize, Mygale plonnière, Mygalodonte (F).

دويبة من العناكب وحيدة الجنس والنوع من فصيلة
الخدنتقيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة
اخصها حوض البحر الابيض المتوسط || جسمها يطول
نحو ٢٠ مم . ثوبها الى الرتبة الغبراء بطنها منقط بالاسود .
قوائمها كبيرة نشيطة || عكديتها بيش في التربة اسطوانى
الشكل ، جالس الارتكاز ، ملس الجانب ، مبطن القمر .
تكتم فوهته بصمام من النواس المجهول بالتراب والجشالة ،
مبكل الطرف تفتحه عند الخروج وتوصده عند الدخول ||
مسرحتها دجوي يستمر طوال الليل . قوتها الحشرات والمهام .

٨٨٩٥ - خَدَرَنَق شَرَس ٥ Mygale avicularia (S).

Mygale aviculaire (F). Bird-eating spider, Bird-
spider (E).

دويبة من العناكب المفترسة وفصيلة الخدنتقيات . جسمها
كبير القد ، كثير الهلب . الانثى اكبر جرمًا من الذكر
وتطول نحو ٨٠ مم . اما الذكر فلا يتجاوز ٧٠ مم .
صدراسها مجني الشكل عثاري الاحاديد . عيناها زئيمتان .
شيفها كبيران ، ضليهان ، محبجان ، ذريان . فكاهها
مستغلقتان ، مجهزان بعقاف محلبة حادة . جرامزها
مستطيلة ، غليظة ، كثيفة الهلب . بطنها بيضي الشكل ،
رباعي الروايا والمشائن ينتهي بزائدتين . ثوبها الى السرة
الخطية يعلوها موج جزوي || تألف البراري والاماكن
الاهلة . عكديتها بيش في التربة اسطوانى الشكل ، عمودي
الغور ، فسيح القمر ، تكتم فوهته بصمام من النواس
والجشالة والطين تبكله في التربة بمفصلة من النواس المثين
الحبك || مسرحتها دجوي . قوتها الحشرات والجوارن والعطاء
والوزغ وفراخ المصافير || ملجئها التناسلي لا يختلف عن
ملجن غيرها من العناكب || لسمتها شديدة الالام تسبب
بعض الحمود وقشعريرة معاودة وحرارة تستمر من ٢٤ الى
٤٨ ساعة || تعتبر من الدويبات الضارة المؤذية .

بطنها كبير القد حنطي اللون ، كثيف الهلب الاغبر
تعلوه سبعة خطوط معترضة فحمة السواد || تألف البراري .
عكديتها سعة متوسطة الرخابة تنسجها بين الحجارة
والاعشاب النجمية . مسرحتها دجوي . قوتها الحشرات
اخصها المجنحة || يباتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر
وينقضي ضمن جراب تنسجه تحت الحجارة القريب من
عكديتها || تعيش نحو اربع سنوات . ملجئها الحياتي لا
يختلف عن ملجن غيرها من العناكب || تلسع الناس
فتؤذيهم وتسبب لهم بعض الحمود او بعض القشعريرة
المعاودة .

٨٨٨٥ - خَدَرَنَقِيَّات ٥ Galeodidae, Solpugidae (S).

Galeodidés, Solpugidés (F).

Galeodidae, Solpugidae (E).

فصيلة الخدران من العنكبوتيات . اجناسها وانواعها
عديدة . اعطائها البلاد الحارة . جميعها مفترسة كبيرة القد
او متوسطة . تسرح في الليل قوتها الحشرات الصغيرة اخصها
المجنحة من الهوام الى الذباب .

٨٨٨٦ - خَدَرَنَق رُوس * قاشيرا إفريقيا Kedrostis (S).

Kédrostis, Bryone africaine (F). Ke-
drostis (E).

نبات عشبي بري طلي عارش من فصيلة القرعيات يطول
من ٤ الى ٦ أمتار . حوالقه بسيطة . أوراقه كبيرة ثلاثية
او خماسية التفريغ الاصبعي الشكل . نصلها ملس البشرة
عابق الخضار . أزهاره الذكورية عنقودية التجميع اما
الانثوية ففردية . ثماره تبدو خضراء اللون وتستقر ، عند
الادراك في علل الاحمر البرتقالي .

٨٨٨٧ - خَدَرِيَّات ٥ Lycopodiaceae (S).

Lycopodiacees (F). Lycopodiaceas (E).

ومنهم من سماها فصيلة رجل الذئب وفصيلة غلب الذئب .
فصيلة نباتية من مستورات الزهر الوعائية . اجناسها
وانواعها عديدة . جميعها نباتات عشبية معمرة سوقها مدادة ،
أوراقها خيطية كثيفة التجميع . يكثر وجودها في المناطق
وفي الاراضي الرطبة .

٨٨٨٨ - خَدَرِيَّة * رَحَن ، رَجُل الذئب

Lycopodium (S). Lycopode, Griffes de loup, Mousse
terrestre (F). Club moss, Wolf's-claw (E). Kloben-
moss, Bärlappmoss, Wolfsklau (D). Licopodo,
Zampa di lupo (I).

جنس نباتات عشبية برية طلية معمرة من فصيلة الخدريات .
أنواعها عديدة . جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة .
ترغب في المواع الرطبة . سوقها مدادة او منتصبة تعلو نحو
٥٠ سم . أوراقها خيطية ، قصيرة ، كثيفة ، متراكبة .
أزهارها سنبلية مرصوفة . سنايلها فردية او ثلاثية التجميع
من منافعها الطبية انها مهوغة ومسهلة . ويستخرج منها مسحوق
ناعم ، خفيف كالحباب ، اصفر اللون ، سريع الاشتعال
يستعمل في التسميح وفي تركيب بعض العقاقير .

٨٨٨٩ - خَدَرَف Gouvernail (F). Rudder (E).

الخدرف : سكان السفينة .

٨٨٩٠ - خَدَرَلَة


الخدلة ، الحلية الضبيلة من العنب : والساق من الصابة
(شجرة الصاب) .



خَدَرِيَّة



خَدَمَانَة سُورِيَّة




خَدَرَنَق سَاع




خَدَرَنَق شَرَس



خَدُوش أسود



خَدُوش مَمَاج



خَدُوش مَخَطَط




خَذَّاق



خَذَراف



خَذَرَة



خَذَرُوفَة الارز

والاصفر الباهت || اوراقها مأكولة ، تمسحبة الطعم ، مذاقها بين الخس والهندباء .

٨٩٠٤ - خَذَرُوفَة ٥ ، قَلُوت ٥ *
Voluta (S). Volute (F). Voluta (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخدرفيات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . تعيش على رمال الشواطئ || اصداؤها متباينة الاشكال والأحجام ، يكثر فيها الشكل الاهليلجي . اعقابها صغيرة محلزنة . فروجها مستطيلة ، ضيقة ، ملتوية الاريفات الزمبلوية . جميعها ملونة ومزخرفة ومسنجة || اجسامها شبه بيضية الشكل مستغلظة الرؤوس الثنائية اللوامس المبيونة . افواهها مجهزة باخطام قوية مزودة بأسنان دقيقة محببة . اشهر انواعها :

- مركبة نبتون V. char de Neptune
- ذيل الطاووس V. queue de Paon

٨٩٠٥ - خَذَرُوفِيَّات ٥
Volutidae (S). Volutidés (F). Volutidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل ، اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها سمكة ملونة جميلة الزخارف ، متباينة الاشكال منها المحلزنة الاعقاب ومنها المطوقة بالمناخس الحادة . اعرف اجناسها واشهرها الخدرفة .

٨٩٠٦ - خَذَرُوفَة ٥
Piricularia

جنس فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات . مشيجه داخلي الانتشاح . اجربته الكنيديية ضمية التجميع ، قليلة الفروع الملوثة . كائناته خذروفية الشكل ، فردية ، شفافة ، شفعية الانقسام || انواعه قليلة العدد اعرفها خذروفة الارز وخذروفة الموز .

٨٩٠٧ - خَذَرُوفَة الارز ٥ *

Piricularia oryzae (S). Brunissure du riz, Piriculariose du riz (F). Pitting disease of rice, Blast (E).

فطر مجهري يصيب الارز في اوراقه وبنوقه فيؤذيه اشد الاذى || مظهره الخارجي يقع سمر كشفة التجميع ، هالية الحافة الفضية الموج تعلو نصال العصف في لواسطها وعند اطرافها العليسا فتذيلها وتقودها الى الياس . وهو على السوق يقع سمر تركيب الزام الاخير . عند انتشاح السنبلة فتعطب الالياف وتسبب التواء السنبلة وذبوتها قبل ادراك الشلب || يدرك باستعمال الاسمدة مع الدورة الزراعية .

٨٩٠٨ - خَذَرُوفَة الموز ٥
Piricularia grisea (S). Piriculariosa de la banane (F). Pitting disease of banana (E).

فطر مجهري يصيب ثمار الموز فيعطبها || مظهره الخارجي قروح سمراء اللون ، فضية الحالة ، مستديرة الشكل . قطرها من ١٠ الى ١٥ مم . تركيب قشور الثمار في طور نموها النهائي فتقرحها وتعطبها || يبيكاج باستعمال احد الفواطير الفعالة الحالية من المواد النحاسية .

٨٩٠٩ - خَذَرَة
Parcelle (F). Portion (E). هي القطعة من الارض .

٨٨٩٦ - خَذَرَقِيَّات ٥
Mygalidae (S).

Mygalidés (F). Mygalidae (E).

فصيلة من الرتيلاوات . اجناسها المعروفة ٢٤ تضم نحو ٣٥٠ نوعا . اعطانها البلاد الاستوائية والحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متباينة القد ، كثيرة اطلب . جميعها مفترسة || اشهر اجناسها الخندق .

٨٨٩٧ - خَذَرُوش ٥ ، أَلْتِيْز الصَلْبِيَّات ، خَضَفَسَاء برغوثية ، نُضَارِيَّة الصَلْبِيَّات فيلوتراته

Phyllotreta (S). Altise des crucifères, Puce de terre (F). Flea beetle (E). Kohlerdfloh (D).

جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة النضاريات . انواعه عديدة ، طولها يراوح من ٢ الى ٤ مم . لونها يختلف مع النوع || يركب النباتات الصليبية ولا يعف عن مشاتل التبغ . قوته ما يمتصه من العصارة || يرقاته دقيقة نحيلة ، سمراء اللون ، تلغم الاوراق والجذوع والجذور || اعرف انواعه ما يلي :

٨٨٩٨ - خَذَرُوش أسود ٥
Phyllotreta atra (S).

نوع من الخدوش طوله نحو ٢ مم . ثوبه سوي السواد اللامع || يركب النباتات الفتية اخصها مشاتل الخس والتبغ . يرقاته قاضمة مؤذية .

٨٨٩٩ - خَذَرُوش مَمَاج ٥ *

Phyllotreta undulata (S).

نوع من الخدوش طوله نحو ٢ مم . ثوبه اسود عايق . يعلو كل من غمدية خط قاطب اصفر اللون زاهي الموج . ارجله سمر || يرقاته شديدة الاذى تقضم الجذور .

٨٩٠٠ - خَذَرُوش مَخَطَط ٥ *

Phyllotreta nemorum (S). Altise des crucifères (F). Striped turnip flea beetle, Turnip fly (E). Gestreifte Erdflöhe (D).

نوع من الخدوش طوله نحو ٣ مم . ثوبه اسود لامع ، يعلو كل من غمدية خط قاطب اصفر . ساقه صفراء . فخذيه سوداء || يركب جميع الصليبيات اخصها السلق والخردل والملثوف والكرنب || يرقاته تلغم الاوراق وتؤذيها .

٨٩٠١ - خَذَرِيْر ٥
Logette (F).

Small lodge, Small cell (E).

كل نقرة في نص المتك حيث يوجد الطلع تدعى خديرا .

٨٩٠٢ - خَذَرَّاق ٥
Sepia officinalis (S).

Seiche officinale (F). Common cuttle-fish (E).

نوع من الحبار عشاري الذوائب الرأسية منها اثنين مستطيلتين جميعها محببة الاطراف اخاذة ناشبة ومنقبضة . سمي خذاقا لانه اذا دوهم خذق في الماء مادة سوداء اللون سريعة الانتشار تحجب عن النظر وتمكنه من الهرب .

٨٩٠٣ - خَذَرَّاف ٥
Hypochaeris (S).

Porcelle, Porcellie (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية برعوية من فصيلة المركبات انواعها المعروفة عديدة جميعها من نباتات جبال البلاد المعتدلة الحرارة || جذورها ودية . سوقها مقرة . اوراقها قرصية الانتشاح مستطيلة النصال الملوقة الشكل ، منشارية الحافة . شماريحها دقيقة . ازهارها رؤسية . قلافة ازهارها عديدة القنابات اللامتساوية القد . الوانها تراوح بين التبي

٨٩٢٢ - خَرَّاطِينِيَّات Lombricidés (F).
Lumbricidae (E). هي الخراطونيات فصيلة من الديدان .

٨٩٢٣ - خَرَّاعَة ، فَسُولَة Rachitisme (F).
Rachitis (E). مرض بيولوجي من امراض النمو يصيب الحيوان فيشوه عظامه ويؤخر تصلبها . اسبابه نقص في الغذاء أو عوز في غدد الجسم .

٨٩٢٤ - خَرَّاف ، خِرَاف Cueillage, Cueillaison, Xeraph (F).
Cueille (F). Gathering-time (E). هو وقت اجتناء الثمر . خرف الثمار : اجتناها . أخرف النخل والتفاح والاجاص : حان له ان يخرف أي ان يجنى .

٨٩٢٥ - خِرَافِ الْبَحْرِ Manatidae (S).
Manatidés (F). Manatidae (E). فصيلة حيوانات مائية لبونة من رتبة الخيلان أي بنات الماء . مسرحها البحار والانهار . اعطانها معظم المياه الاريقية والامريكية . يكثر وجودها في الانهر الكبيرة وعند مصباتها . اجسامها شبه اسطوانية الشكل مضغوطة المقدم والمؤخر ، تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . رؤوسها قصيرة الاعناق والاعظام . شفاها العليا جاحة ، مستديرة الطرف . شعورها هليية مبعثرة . جلودها ناعمة خبنة || الانثى اصغر قدأ من الذكر . يحملها يلوم نحو ٣٦٠ يوماً تضع في نهايته من جرو الى جروين .

انواعه المروفة ثلاثة : خروف البحر الاريقي والامريكي واللاتفري الذي يعيش في نهري الامازون والاورينوك .

٨٩٢٦ - خَرَّافَة * Chimaera (S).
Chimère (F). Chimera (E). جنس اسماك بحرية من فصيلة الخرافيات . انواعها المعروفة خمسة جميعها كبيرة القد طولها يراوح من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اجسامها مستحجنة الشكل ، عادمة الخراف . فضية اللون غليظة الرأس والصدر ، مقطوعة الخطم ، مستدقة المؤخر ، مستطيلة الذنب السوطي الشكل || لحمها مأكول متوسط الصنف . يستخرج من كبدها زيت كريحه الرائحة يستعمل في الصناعة والانارة .

٨٩٢٧ - خَرَّافِيَّات Chimeridae (S).
Chiméridés (F). Chimeridae (E). فصيلة اسماك بحرية من رتبة كاملات الرؤوس اجناسها وانواعها . المعروفة ثمانية اعطانها المحيط الاطلسي والبحر المتوسط . جميعها عجيبة الشكل ، مستطيلة الجسم العادم الفلوس ، غليظة الرأس والصدر ، مستدقة الذنب السوطي الطرف .

٨٩٢٨ - خَرَّام Astère attique (F). Sea aster (E).
راجع اسطراطيقيوس .

٨٩٢٩ - خَرَّاب Outarde houbara (F).
Houbara bustard (E). هي الحباري المتوجة راجعها . الجمع خراب وأخراب وخربان .

٨٩٣٠ - خَرَّابَاق Eranthis (S). Erante (F).
جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الشقيقيات . انواعه قليلة جميعها جذمورية ، نجمية صغيرة القد . اوراقها قرصية التجميع ، تلامس التربة ، معنقة ،

٧٢٤٥ - خُدعة Tranche (F). Slice (E).
القطعة من البطيخ والقرع ونحوها .

٨٩١١ - خُدَق Fiente (F). Mute (E).
الخدق والذرق والسلمح : روث الطائر . يقال خدق الطائر وذرق وسلمح .

٨٩١٢ - خُدَّتَق ، خَزَزَنَق Araigée (mâle) (F). Spider (male) (E).
الخدتنق : ذكر العناكب الكبيرة القد . اما الخدزنق فذكر العناكب الصغيرة القد . والعكاس هو ذكر العناكب بدون تخصيص .

٨٩١٣ - خُصْر Boitard (F). Vertical floor-bering (E).
الخر : قم الرحي . والخرّي : طوق الرحي وهو الخرق الذي تلفى فيه الحب .

٨٩١٤ - خُصْرَانَان الخراتان نجمان وهما زهرة الاسد . وكل واحد منهما خرة . اطلب زهرة .

٨٩١٥ - خُجْرَاج Impôt (F). Tax, Impost (E).
الخراج هو المال المضروب على الارض واصله ما يحصل من غلة الارض .

٨٩١٦ - خُجْرَاج ، دُفْعَل Abscess (F). Abscess (E).
كل ما يخرج بالبدن من البثر ونحوه . الواحدة خراجة ودملة . ج خراج وخراجات ودمل ودمايل .

٨٩١٧ - خُجْرَاوَة * Spreo (S).
Spréo, Merle métallique (F). طائر من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الزرزوريات . اعطانه تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية || جسمه متوسط القد ، قريب الشبه بالزرزور الا انه اطول ساقاً واعرض ذنباً || ثوبه جميل الالوان المتراكبة يعلوها الاخضر الاسفع . بطنه وزمكاه الى الصهبة الخطية || ريشه مرغوب فيه ، شائع الاستعمال التزييني .

٨٩١٨ - خُجْرَاشَة Furfur (F). Furfur (E).
الخراشة رغام من الخلايا الميتة يكتنف قشار الجلد أو النسيج النباتية .


٨٩١٩ - خُجْرَاشِيّ Furfuracé (F).
Furfuraceous (E). نعت تعريفي يطلق على السطوح الحيوانية والنباتية المدثرة بنشاء من الرغام الشبيه بالنخالة .

٨٩٢٠ - خُجْرَاص ، خَرَّاص Homme pendu (F).
الخراص والخراص نبات عسقول مشهور باسم بحلبية ، اطلبها .


٨٩٢١ - خُجْرَاطِيْط Teignes des plantes (F).
Tinea of plants (E). اسم شامل يدل على انواع مختلفة من الفراش تنسب الى حشرقيات الاجنحة جميعها صغيرة القد بسطها من ٨ الى ١٥ مم . اجنتها منقوشة ومهدبة الخشار . يرقاتها تلثم الاوراق وتؤذيها || من اشهر انواعه خرطيط التفاح والتين والحمضيات والزيتون .



خَرَّارة



خَرَّافَة



خرباق شتوي

شراخية تحمل من الزهرة الى الزهرتين . والزهرة كبيرة القد، جميلة الشكل، لونها الى الالبيس يملوه موج وردي . ازهاره يستمر من اوائل كانون الاول الى اواخر شباط . والخريق الاسود مسهل مائي شديد الوقع ، مدر للطمث ومقو للقلب . بزوره تقتل الدجاج .

٨٩٣٨ - خَرَبَاق الشَّرْق (S). Helleborus orientalis (S). Ellébore d'Orient (F).

عشبة تزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ضرورها عديدة . اوراقها قرصية التجميع اهليلجية الشكل سباعية او تساعية التشرم ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ازهارها كبيرة القد مختلفة الالوان من الالبيس الاخضر الى الوردي والارجواني والاصفر الاسمر || ازهاره يستمر من شباط الى ايار .

٨٩٣٩ - خَرَبَاق عَطِير (S). Helleborus odorus (S). Ellébore odorant (F).

عشبة تزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم ورقها قرصية وحيدة ، وريقاتها من ٧ الى ١١ . ازهارها كبيرة القد فواحة الارجيح المستعبد ، لونها الى الاخضر الفستقي || ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .

٨٩٤٠ - خَرَبَاق عَقِيْقِي (S). Helleborus atrorubens (S). Ellébore pourpre-noir (F).

عشبة تزيينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها عابلة قرصية التجميع ، برثنية الشكل ، تساعية الوريقات ، نصلها خلي الصفحة السفلى ، لونه الى الاخضر الزاهي . ازهارها صغيرة القد كثيرة العدد ، عقيقية اللون ، لا عرف لها || ازهارها يستمر من اذار الى ايار .

٨٩٤١ - خَرَبَاق مُسْتَدِير الُورَق (S). Helleborus cyclophyllus (S). Ellébore à feuille circulaire (F).

عشبة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، مستديرة الشكل ، سباعية او تساعية التشرم ، وريقاتها بارزة العروق ، زباد النصل على صفحته السفلى . ساقها شراخية تحمل من ٣ الى ٤ ازهار كبيرة القد عطرية العرف لونها الى الاخضر الفستقي || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

٨٩٤٢ - خَرَبَاق نَجَس* ، رَجُل العَنْقَاء (S). Helleborus foetidus (S). Ellébore fétide. Pied de griffon, Patte d'ours, Rose de serpent (F). Bear's foot, Setter-wort, Stinking hellebore (E). Stinkendeswurz (D). Elleboro puzzolante, Piè di gallo, P. di griffo (I).

عشبة برية وتزيينية معمرة تملو نحو ٧٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، كبيرة القد ، كثيرة التشرم ، نصلها خلي الصفحة السفلى . ساقها شراخية مستطيلة تحمل بعض الازهار الكريهة الرائحة ، الخضراء اللون ، المرتكزة على قنابات سنانية لونها الى الاخضر الاصفر يحوقها اطار خري || ازهارها يستمر من شباط الى ايار .

٨٩٤٣ - خَرَبَاقَات (F). Elléborées, Helleborées (F). سبط من فصيلة الشقيقات . اجناسه وانواعه نحو ١٥ جميعها نباتات معمرة . اوراقها قرصية التجميع ، جلدية النصل المفصص والمشرم . سوقها شراخية تحمل في اعلاها من الزهرة الى بعض الازهار الجميلة المنظر ، المختلفة الاحجام والالوان .

مستديرة النصل الخماسي او السباعي التشرم . سوقها شراخية نحيلة تحمل بعض الازهار الصغيرة القد || اعرف انواعه واشهرها الخرباق الشتوي .

٨٩٣١ - خَرَبَاق شَتَوِي* (S). Eranthis hiemalis (S). Eranthe d'hiver, Hellebore d'hiver (F). Winter aconite, Winter hellebore (E). Echter winterling (D). Piè di gallo (I).

نوع من الخرباق وهو نبات عشبي طبي جذموري معم . اوراقه قرصية معنقة خاسية او سباعية التشرم . ساقه شراخية نحيلة دقيقة تملو من ٩ الى ١٢ سم. ازهاره صغيرة القد || يستخرج من جذاميره مواد طبية بيطرية نافعة ورائحة .

٨٩٣٢ - خَرَبَاق (E). Pastèque (F). Water-melon (E). هو البطيخ ، اطلبه .

٨٩٣٣ - خَرَبَاقِيصَة (F). Blatte (femelle) (F). Black-beetle (female) (E).

الخرباصيصة : الانثى من بنات وردان .

٨٩٣٤ - خَرَبَاق (S). Helleborus (S). Ellébore, Hellebore (F). Hellebore (E).

اسمه العلمي يوناني وقد أخذ عن السامي الذي يعني « علاج الجنون » || جنس نباتات عشبية معمرة سامة من الخربقيات وفصيلة الشقيقات . انواعه عديدة جميعها جصاصمة تألف الازرية الكلسية . ازهارها كبيرة القد جميلة الشكل ، بتلاتها بوقية يراوح عددها من ٨ الى ١٠ ، فصلاتها خاسية ، اسديتها من ٣٠ الى ٦٠ . يستخرج من جذور بعض انواعها مواد غلوكوزية مخدرة ومسهلة كانت تستعمل في الطب القديم وقد اقتصرت استعمالها الآن على الطب البيطري || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

٨٩٣٥ - خَرَبَاق أَخْضَر* (S). Helleborus viridis (S). Ellébore vert (F).


عشبة طبية وتزيينية معمرة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها قرصية التجميع عابلة تشرم من ٩ او ١١ وريقة مستطيلة ، نصلها مائل البثرة ، لونها الى البحري العابق . ساقها شراخية تحمل من ٣ الى ٥ ازهار كبيرة القد ، لا عرف لها لونها الى الاخضر الزاهي || ازهاره يستمر من اذار الى ايار || يستعمل طبياً استعمال الخريق الاسود الا انه اخصب مادة راشد مفعولاً .

٨٩٣٦ - خَرَبَاق اُرْجُوَانِي (S). Helleborus purpurascens (S). Ellébore pourpré (F).


عشبة تزيينية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها عابلة ، قرصية التجميع ، كفية الشكل ، خاسية الوريقات ، نصلها خلي الصفحة السفلى . لونه الى الخضار الجليل الزاهي . ازهارها كبيرة القد ، خرية اللون ثم ارجوانية لا عرف لها || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

٨٩٣٧ - خَرَبَاق اُسْوَد* (S). Helleborus niger (S). Ellébore noir, Rose de Noël, Herbe de feu (F). Christmas-rose, Black hellebore (E). Christwurz, Schwarze nieswurz (D). Elleboro nero, Rosa di Natale (I).

عشبة طبية وتزيينية معمرة تملو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها قرصية التجميع ، سباعية او تساعية التشرم ، وريقاتها سنانية الشكل ، نصلها عابق الخضار . ساقها



خرباق اخضر



خرباق اسود



خرباق نجس



خربوس




خربوق ابيض



خردل ابيض



خردل اسود



خردل بري

٨٩٤٤ - خَرْبَقِينَ أَخْضَرَ Elléborine (F).

مادة غلوكوزية مخدرة تستخرج من جذور الخربق الاخضر وقد تكون سامة ممتة عندما تبلغ جرعتها ٠,٢٥ من الغرام || كانت تستعمل في الطب القديم وقد اقتصر استعمالها الحالي على الطب البيطري .

٨٩٤٥ - خَرْبَقِينَ أَسْوَدَ Elléboréine (F).

مادة غلوكوزية مخدرة تستخرج من جذور الخربق الاسود . جرعتها تكون سامة ممتة عندما تبلغ ٠,٣٠ من الغرام كانت تستعمل استعمال الخربقين الاخضر .

٨٩٤٦ - خَرْبُوسٌ * Ochyropus (S).

Ochyrope (F). Ochyropus (E).
جنس حشرات قانصة مفترسة نافعة من غديات الاجنحة وفصيلة السلكوتيات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها بعض مناطق افريقية الشمالية || اجسامها كبيرة ، محصورة ، تطول من ٤ الى ٥ سم . رؤوسها ضخمة ، تأشيرها ضليعة ، منمقفة الاطراف . قرونها الاستشعارية خيطية مدبسة الاطراف . كواسلها يرمعية الشكل . اغمارها مجنحة ، مخددة لاحقة . اثوابها الى السواد الاسفع || تسرح في الليل وتبيت في النهار تحت الحجارة والاشخاب . قوتها كل ما تستطيع قتله من حشرات وحلازين وبزاق .

٨٩٤٧ - خَرْبُوقٌ Veratrum (S). Varaire, Vérate (F).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة ، سامة في جميع اجزائها ، من فصيلة الزنبقيات السورنجانيات . انواعه قليلة ، جذاميرها ضخمة مدادة ، سوقها منتصبه قوية فرعاء . اوراقها كبيرة القد بيضيه الشكل متعاقبة منخفضة النصل بمحاذاة الضلع . ازهارها جميلة الشكل لونها يختلف مع النوع || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

٨٩٤٨ - خَرْبُوقٌ أبيضٌ * ، بَقْلَةٌ الرِّمَاح Veratrum album (S). Varaire blanc, Vérate blanc, Ellébore blanc (F). White veratrum, Lang-wort (E). Weisser germer (D). Veladro bianco (I).

نوع من الخربوق وهو نبات طبي وتريبي . يستخرج من جذاميره وسائر اجزائه مادة شبه قلوية تستعمل ضد الحميات ولعلاج الالتهابات || ساقه تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقه زباء انصفحة السفلى . ازهاره الى البياض العاجي يعلوه موج اخضر || ازهاره صيفي يستمر من اواسط تموز الى اواخر آب .

٨٩٤٩ - خَرْبُوقٌ أَسْوَدَ Veratrum nigrum (S).

Vaire noir (F).
نوع من الخربوق البري والتريبي . ساقه تعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه ملساء النصل على صفحتيه . ازهاره بلون الارجوان العابق القاتم || ازهاره صيفي يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .

٨٩٥٠ - خَرْبُوقِينَ Vérateine (F). Veratrin (E).

مادة شبه قلوية تستخرج من بذور الخربوق الابيض كثيرة الاستعمال الطبي ، مضادة للحميات وبانعة الالتهابات .

٨٩٥١ - خَرْبُوسٌ ، خَرْبُوسٌ Carpinus (S).

Charme (F). Hornebeam (E).
هو الشرم جنس اشجار حرجية من البتوليات . انواعه عديدة . اطلب شرم .

٨٩٥٢ - خَرَّت Rhinocéros bicolore (F).

خرت = ثقب . يقال خرت انف الجمل والثور ...

٨٩٥٣ - خَرْوَع Bicorned rhinoceros (E).

٨٩٥٤ - خَيْرْتِيَت Fourmi rougeâtre (F).

هو الكركدن الافريقي .

٨٩٥٥ - خِرْتَاءَة Reddish ant (E).

نملة مستطيلة القد ثوبها الى الحمرة . ج خرتاء .

٨٩٥٦ - خَرْخَفْسِي Orme champêtre (F).

اطلب بوقيصا حمراء .

٨٩٥٧ - خَرْدَل Sinapis (S).

Moutarde, Sénévé (F). Mustard (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الصليبيات تنبت مع الزرع في الحقول وعلى حواشي الطرق . وقد يزرع بعضها لجناء بزوره الطيبة والمستعملة في صناعة الخردل . اوراقه متعاقبة يختلف شكلها وتفريضها باختلاف نوعها . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صديرة القد ، صفراء اللون . بزوره صفيرة ، حريفة ، نافطة ، غنية بالمواد الدهنية ومبروزين ومبروزات البوتاسيوم || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

٨٩٥٨ - خَرْدَلٌ أبيضٌ * ، أَسْفَنْد Sinapis alba, Brassica alba (S). Moutarde blanche, Sénévé blanc (F). White mustard, Salad mustard, Cultivated mustard (E). Echter senf, Weisser senf (D). Senape blanca, Luchettone (I).

هو الخردل الزراعي يعلو نحو ٥٠ سم . ازهاره الى الصفرة الفاقمة . بزوره حنطية اللون ، صفر الموج تستعمل في صناعة الخردل لانها لا تحوي مبروزات البوتاسيوم . ومنهم من استعمله كنبات علي او سماد خضري .

٨٩٥٩ - خَرْدَلٌ أَسْوَدَ Sinapis nigra, Brassica nigra (S). Moutarde noire, Sénévé noir (F). Black mustard (E). Senfkohl, Senf (D). Mostarda, Senape nero (I).


هو الخردل الكبير يعلو نحو ١٠٠ سم . اوراقه زباء مفرصة . ازهاره صفر . بزوره حمر ثم تصير مع الزمن تحوي الكثير من مادتي المبروزين ومبروزات البوتاسيوم . غناها بالادهان الطيارة الحريفة النافطة يجعلها معرقة ، تدر اللعاب وتنبه الهضم والقلب || يستخرج من بزوره بعد نقعها بالماء روح الخردل .

٨٩٦٠ - خَرْدَلٌ برِّي * ، خَرْدَلٌ حَقْلِي ، خَرْدَلٌ حَرَشَاء Sinapis arvensis, Brassica sinapistrum (S). Moutarde des champs, M. sauvage, Raveluche, Ravison (F). Wild mustard, Corn mustard, Charlock (E). Wilder ackersenf, Ackersenf (D). Senape salvatica, S. arvense, S. del campi (I).

هو الخردل البري ينبت في الحقول مع الزروع وعلى حواشي الطرق . كثرة وجوده ضارة تؤذي الزروع وتقاسمها الغذاء || يكافح باستعمال اخذ العواشب الحديثة القوة الفاعلية .

٨٩٦١ - خَرْدَلٌ فَارِسِي Cresson des champs (F).


هو حرف السطوح ، اطلبه .




خرديل فيرجينية



خرز الصخور



خَرَشَةُ الثَّار



خَرَشَةُ الزَّيْتُون



خَرَشَةُ الْكَرَز

٨٩٦٦ - خَرْدَلِيَّة

Parmeliaceae (S).

Parméliacées (F). Parmeliaceae (E).

فصيلة من الحزاز المورق الاربع . انواعها عديدة بعضها طبي نافع كخرز الصخور .

٨٩٧٠ - خِرْس

Jachère (F). Fallow (E).

الحرس : الأرض التي لم تحرث للزراعة .

٨٩٧١ - خَرَسُوِيَّات

Chrysopidae (S).

Chrysopidés (F). Chrysopidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شارفات الاجنحة وطبقة عصبيات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || جميعها نافعة مفيدة تقضي على الارق والهوم . اشهر انواعها الخرسوب .

٨٩٧٢ - خَرَش ، خَرَش

خرش الغصن : اجتذبه اليه بالحقن .

٨٩٧٣ - خَرَشَاء

الخرشاء هي جلدة البيضة الداخلة (التهذيب) وهي جلد الحية || وخرشام العسل : شمع وما فيه من ميت نحله .

٨٩٧٤ - خَرَشَةُ الثَّار * ذُبَابَةُ الْبَحْرِ الْمَتَوَسِّط ،

ذُبَابَةُ الْبَرْتَقَال ، ذُبَابَةُ الْفَوَاكِهِ

Ceratitis capitata (S). Mouche des fruits, M. des oranges (F). Mediterranean fruit fly (E). Mittelmeerfruchtfliege (D).

ذبابة من فصيلة الخرشيات . موطنها جميع الاصقاع الحارة والمعتدلة . يكثر وجودها في مختلف اقاليم حوض البحر المتوسط || طولها من ٤ الى ٥ سم . اجنتها شفافة مزركشة ، رأسها اصفر ، صدرها اسمر منقط ، بطنها مطوق . احيائها الحولية عديدة تراوح من ٣ الى ١٢ واختلافها هذا يعود الى المناخ والاقليم || مكنتها صغير القند وشعي الشكل ابيض اللون تمتعه الانثى على مختلف الثمار كالكرز والدراق والاجاص والسفرجل والبرتقال والاكيدنيا والموز والتين والبنندورة . فينتف عن يرقات اسطوانية الشكل ، غبراء اللون ، ملساء البشرة ، مدببة الرأس ، مقطوبة العقب . تعيش حيث تنقف فتتخر الثمرة وتقيم فيها حتى اكتمال تطورها اليرقي ثم تخرج منها الى التربة حيث تتحول الى كزود فحشرة كاملة .

٨٩٧٥ - خَرَشَةُ الزَّيْتُون * ، ذُبَابَةُ الزَّيْتُون ،

كَبِيرُن

Dacus oleae (S).

Mouche de l'olive (F). Olive fly (E). Olivenfliege (D).

ذبابة صغيرة من الخرشيات . طولها نحو ٥ سم . اجنتها شفافة تعلوها بقع ملونة . جسمها الى السمرة البنية . ارجلها صفر وحر || تظهر في اوائل تموز . تمتع مكنتها في لب ثمار الزيتون ولا تمتع في الثمرة الواحدة اكثر من مكنة واحدة تنقف بعد وضعها بنحو ٦٠ ساعة عن رقة بيضاء طولها نحو ٤ سم . تعيش حياتها اليرقية في اللب ثم تتحول الى كزود فحشرة || احيائها الحولية تراوح من ٣ الى ٥ لانها مرتبطة بالمناخ والاقليم .

٨٩٧٦ - خَرَشَةُ الْكَرَز * ، ذُبَابَةُ الْكَرَز

Rhagoletis cerasi (S). Mouche des cerises (F).

Cherry maggot (E). Kirschfruchtfliege (D).

ذبابة من الخرشيات . طولها من ٣ الى ٥ سم . لونها اسود . اجنتها شفافة مجزعة بخطوط سود . طيرانها بطيء ضعيف .

٨٩٦٢ - خَرْدَلِيَّة

Silique (F). Siliqua (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ثمرة تشبه ثمار الصليبيات . وهي سنفة ذات مصراعين ، مستطيلة ، مفتوحة ، مركبة من خبائين يفصلهما حاجز دقيق يشطر السنفة الى شطرين .

٨٩٦٣ - خَرْدِيل

Chordeiles (S).

Chordeile (F). Chordeiles (E).

جنس طير رأس من فصيلة السيديات . انواعه المعروفة نحو ١٢ موطنها يمتد من امريكا الشمالية الى الجنوبية . تألف الاحراج وضفاف مجاري الماء والحقول المزروعة . تسرح من العصر الى ظلمة الليل ومن الفجر العميق الى اقبلاج النور || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . رؤوسها مستعرضة . اعناقها قصيرة . اجنتها واذاها مستطيلة . مناقيدها مخروطية مستعرضة الاشدق الرحبة ، مدببة الاطراف الذرية . اثوابها تختلف مع الانواع || قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والرتب || اعرف انواعها واشهرها خرديل فيرجينية .

٨٩٦٤ - خَرْدِيل فيرجينية *

Chordeiles virginianus (S). Chordeile de

Virginie, Faucon de nuit (F). Nighthawk (E).

نوع من الخرديل . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية اخصها فيرجينية . يألف حواشي الاحراج وضفاف الانهر والحقول المزروعة ، ويرتاد المدن في الليل حيث يكثر الفراش والبعوض حول الانوار الساطعة || جسمه معتدل القد يطول نحو ٢٣ سم . ثوبه الى الطحلة السمر يعلوها تجذيع ابيض ورقشة شهباء . حدقة عينه كستنية اللون . سباله معتدل الكشافة والطول . منقاده واسع الشدق ، منعقد البهرة . جناحه مستطيل ذلق . ذنبه فارق الطرف || طيرانه خفيف الحركة سريعها ، يجيد التحليق والتصميمد والانتفاض || قوته الحشرات المختلفة من اي رتبة كانت || عشه افحوص يدبره في التربة بين الاعشاب . الانثى تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٨ يوما .

٨٩٦٥ - خَرَز

Débitage (F). Cutting up (E).

تقطيع الخشب حسب تدعو الحاجة .

٨٩٦٦ - خَرَزُ الصُّخُور *

Cetraria Islandica (S).

Parmélie, Lichen d'Islande, Mousse d'Islande (F).

Iceland lichen, Iceland moss (E). Isländische tart-schenflechte (D). Lichène islandico (I).

جنس من الحزاز الجامد البشرة . يكثر في المناطق المعتدلة والباردة . يعيش على المواد العضوية السائرة نحو الانحلال . انواعه عديدة معظمها طبي يتحلل ببعض الخواص النافعة الفعالة الحبيدة العواقب .

٨٩٦٧ - خَرَزَة

Vertèbre (F). Vertebra (E).

هي كل فقرة من الظهر والعنق . خرز الظهر : فقاره .

٨٩٦٨ - خَرَزَة

حفصة من النجيل ترتفع قدر الذراع خضراء ترتفع غيطانا من اصل واحد لا ورق لها لكنها منظومة من اعلاها الى اسفلها حبا مدورا اخضر في غير علاقة اكائها خرز منظوم في سلك وهي تقتل الابل (السان) .

٨٩٨٥ - خَرَشَتَانِ مُتَوَجَّهَةٌ * ، أَبُو قُشَشْ

Sterna bengalensis (S). *Sterne du Bengale* (F). *Crested tern* (E).

طائر هندي الموطن له مصيفه ومشتاه . متوسط القد طوله نحو ٣٠ سم . أبيض اللون ، متوج الرأس ، أحمر المنقار ، أسمر الساق .

٨٩٨٦ - خَرَشُوف

Artichaut (F). *Artichoke* (E).

هو الارضي شوكي ، اطلبه .

٨٩٨٧ - خَرَشُومَةٌ

Proctonotus (S). *Proctonote* (F). *Proctonotus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخرشوميات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة وخصها البحر الابيض المتوسط || اصداؤها سنائية الشوزن ، قليلة التبليط والاعوجاج مستديرة القواعد المشرومة الخفاف ، مستدقة الاعقاب .

٨٩٨٨ - خَرَشُومِيَّات

Proctonotidae (S). *Proctonotidés* (F). *Proctonotidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل غلافيات الخياشيم العديدة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطانها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها مستطيلة . بعض اجناسها عادم الغشاء الصدفي والبعض الآخر يحمل اصدافاً مستطيلة مقمرة الفوهات المستديرة ، مقرنة الاعقاب || اعرف اجناسها واشهرها الخرشومة والصيكل .

٨٩٨٩ - خَرَشِيَّات

Trypetidae (S). *Trypétides* (F). *Trypetides* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها متوسطة القد او صغيرة . جملة الشكل ، متعددة الالوان المراكبة الزاهية . تعيش على مغثر الازهار وعلى الافراشات السكرية التي تنضجها النباتات والحشرات القشرية || مكنها وشعي الشكل ، ابيض اللون تمتحه الانثى في نصل الاوراق وفي الثمار وعلى السوق والجذور فينتقف عن يرقات اسطوانية الشكل مدببة الرؤوس تحمل خطاطيف قوية تقوم مقام التأشير . وهي تعيش في المواضع التي نقفت فيها فتنخرها وتعطبها قبل ان تتحول الى عذارى وكزد .

٨٩٩٠ - خَرُص

Feuille de dattier (F). *Date-tree leaf* (E).

الخرص هو جريدة النخل .

٨٩٩١ - خَرُص ، خَرُص

Estimation des récoltes fruitières (F).

هو تقدير الانتاج الثمري .

٨٩٩٢ - خَرُصَة

Part, Dû (F). *Part, Due* (E).

الخرصة هي النصيب من الشيء . يقال اعطني خرصتي من الماء .

٨٩٩٣ - خَرُط *

Cupidonia (S).

Cupidon, Gâlinotte des prairies (F). *Prairie chicken* (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من عمارة الخريسيات وفصيلة الطيهوجيات : الذكر منه يتميز بكشتين من الريش الدقيق الناعم تركبان العنق من اليمين ومن اليسار . ثوبه متراكب الالوان المتداخلة فيه الاسمر والاسود والاحمر

تظهر في ايار . تمتح مكنها على ثمار الكرز فينتقف عن يرقات اسطوانية غبراء اللون صلبة الجسم طويلا نحو ٤ مم . تنخر الثمرة ولا تتركها الا عند اقترابها من طور الكزود . جيلها الخولي واحد .

٨٩٧٧ - خَرَشَةُ الكَرَفَس *

Philophylla heraclei, Acidia heraclei (S). *Mouche du Céleri* (F). *Celery fly* (E). *Sellerieflye, Sellerieminielflye* (D).

ذبابة من الخرشيات . طولها نحو ٥ مم . لونها الى الصفرة العابقة . تظهر في الربيع وتمتخ مكنها على اوراق الكرفس فينتقف عن يرقات تلغم النصل الواحد تلو الآخر . اجيالها الخولية من ٢ الى ٣ .

٨٩٧٨ - خَرَشَةُ اَهْلِيُون *

Platyparea poeciloptera (S). *Mouche de l'asperge* (F). *Asparagus maggot* (E). *Spargelflye* (D).

ذبابة من الخرشيات . طولها نحو ٦ مم . لونها الى السواد اللامع . اجنحتها مستطيلة ، شفافة تعلوها زراکش سمر . تظهر من ايار الى حزيران . تمتخ مكنها على اغاليج اهلين فينتقف عن يرقات تعيش كامل حياتها اليرقية داخل الانفاق التي تخلدتها في الاغاليج ثم تخرج بعد الانسلاخ الاخير لتتحول الى كزود .

٨٩٧٩ - خَرَشَقْلِي

Castagnole (F).

الخرشقلي سمكة بحرية تدعى بلطي المتوسط ، اطلبها .

٨٩٨٠ - خَرَشَم

Ruchée (F). *Hiveful* (E).

جماعة النحل التي يتألف منها القفير .

٨٩٨١ - خَرَشَتَانِ ، خَطَافِ الْبَحْرِ

Sterna (S). *Sterne, Hironde de mer* (F). *Tern* (E).

جنس طيور مائية من كفيات القدم . انواعه نحو ٣٦ منتشرة في جميع الاقطار . قريبة الشبه من النورس او الخطاف . تتميز باثوابها البلقاء اللون وباذنابها المستطيلة الفرقاء || اعرفها ما يلي .

٨٩٨٢ - خَرَشَتَانِ الْمُتَوَسِّط *

Sterna media (S). *Sterne de Médie* (F). *Cheeked tern* (E).

طائر من القواطع . محبوب اقاليم المتوسط . معتدل القد . طوله نحو ٣٢ سم . أبيض اللون ، بياضه مشوب بالرماد . منقاره الى الجؤرة وساقاه كذلك .

٨٩٨٣ - خَرَشَتَانِ سَرِيْعَةٌ * ، حَقُط

Sterna bergii (S). *Sterne de Bergi* (F). *Swift tern* (E).

طائر من القواطع . يألف الشواطئ . كبير القد طوله نحو ٤٠ سم . ثوبه الى البياض المنش بالوردي . سقطاه الى الصهبة الرمادية يعلوها موج ازرق . منقاره اسود . ساقاه الى الحمرة القائمة .

٨٩٨٤ - خَرَشَتَانِ صَغِيرَةٌ * ، دَغْبِز

Sterna albifrons (S). *Sterne naine* (F). *Little tern* (E).

طائر من القواطع . يألف ضفاف الانهر والشطوط . صغير القد طوله نحو ٢٣ سم . ثوبه ابيض ، سقطاه الى الرصاصي يعلوها موج ازرق . رأسه اسود . منقاره اصفر ، ساقاه الى البرتقالي .



خرشة الكرفس



خرشة اهلين



خرشة المتوسط




خرشة سريعة




خرشة صغيرة



خرشة متوجة



خرط



خَرْطَال بَرِّي



خَرْطَال زَرَاعِي



خَرْطَال عَرِيَان



خَرْطَال فَتَوَا



خَرْطَالِيَّة زَرْقَاء



خَرْطَالِيَّة قَرْنَفَلِيَّة

٩٠٠١ - خَرْطَالِيَّات (F).
Avenées (F).
سبط من فصيلة النجيليات يشمل بعض الاجناس والانواع
اشهرها الخرطال .

٩٠٠٢ - خَرْطَالِيَّة (S).
Aira (S).
Canche (F), Hair-grass (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النجيليات . النوع
عديدة منها الزراعية التزيينية ومنها البرية الكلائية تستحبها
الانعام ورعاها الماشية فتسمن عليها || جميعها اعشاب
صغيرة القد تعلو من ١٠ الى ٥٠ سم . اوراقها متعاقبة ،
عصفية للنصل الغمدى . ازهارها هامى الارتكاز سنبل
او عنقودي التجميع || اعرفها الانواع التالية .

٩٠٠٣ - خَرْطَالِيَّة النَمِيس (S).
Aira cespitosa (S).
Canche gazonnante (F).
تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . تنبت وتكثر في الاراضي
البور ولا تحصى القاحلة والرملية . رعاها الماشية بشبه .

٩٠٠٤ - خَرْطَالِيَّة زَرْقَاء * ، مُولِينِيَّة

Aira caerulea, Molinia caerulea (S). Canche bleue,
Molinie, Flèche (F). Blowing grass, Lavender grass
(E). Pfeifengras blaues (D). Gramigna liscia, Melica
azzurra (I).

نوع زراعي تزييني تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . ازهاره
سنبل التجميع ، ازهاره زرقاء اللون مستحبة العرف .

٩٠٠٥ - خَرْطَالِيَّة قَرْنَفَلِيَّة *

Aira caryophylla (S). Canche caryophyllée (F).
Hair grass, Mouse grass (E). Nelkengrass, Nelken-
hafer (D). Ghingola, G. nebbia, Pabbio (I).

نوع زراعي تزييني تعلو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره
عنقودي التجميع . ازهاره مختلفة الالوان مستحبة العرف .

٩٠٠٦ - خَرْطَالِيَّة مُتَعَرِّجَة (S).
Aira flexuosa (S).
Canche flexueuse (F).

عشبة برية تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم . تنبت في المواقع
الرطبة . تكثر في المراعي الطبيعية وفي الغابات والاحراج .
رعاها الماشية بشبه .

٩٠٠٧ - خَرْطُون (F).
Trompe (F). Trunk (E).

خرطوم الفيل : ما يلفه على الشيء الذي يريد ان يتناوله
اذا كان كبيراً . وما يتناول به الشيء مباشرة اذا كان
صغيراً || والخرطوم هو اول ما يجري من عصارة العنب
قبل ان يداس الحب . وهو ايضا الخمر السريعة الاسكار .

٩٠٠٨ - خَرْطُونِيَّي (F).
Proboscidiiforme (F).

Proboscidiiform (E).
نعت تعريفي يطلق على ما كان كالخرطوم قابلاً وقلباً .

٩٠٠٩ - خَرْطُونِيَّات (S).
Proboscidiens

رتبة حيوانات من ذوات الجثث الضخمة العظيمة . تمثل
الآن ، بعد انقراض اكثرها ، بفصيلة الفيليات .

٩٠١٠ - خَرْطُون ، أَبُو مِدْيَد ، حُبْلِيل ،

دُودَة الْأَرْض (S).
Lumbricus terrestris (S).

Lombric, Ver de terre (F). Earth-worm (E).
الحراطين ديدان طويلة حلقيه من فصيلة الخرطونيات .
تكثر في الاراضي الرطبة ، الحصبة ، الغنية بالمواد العضوية
والدبالية .

والابيض || يالغ الادغال الرطبة والمراعي الطبيعية .
قوته الاعشاب والحبوب . اثناء تدن في افصوص ترصعه
بشئ الخشائش والافنان ، الدقيقة وهي تضع من ٨ الى ١٠
بيضات تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

٨٩٩٤ - خَرْطَال ، شُوفَان (S).
Avena (S).

Avoine (F). Oats (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من فصيلة
النجيليات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في جميع
الاصقاع العالمية . تتميز بقله الاشطاء وباستطالة العناقد
الزهرية الفرقة التجميع . سوقها جوفاء . اوراقها متعاقبة ،
غمدية ، عصفية للنصل || اعرف واشهر انواعه ما يشيع .

٨٩٩٥ - خَرْطَال بَرِّي * ، شُوفَان بَرِّي ، هَرْطُمَان

Avena barbata (S). Avoine à 2 barbes (F). Slender
wild oat (E). Wilder hafer (D). Avena a due
barbe (I).

ينبت في المراعي ويكثر في الاراضي البور . رعاها الماشية .

٨٩٩٦ - خَرْطَال حَقْلِي ، شُوفَان حَقْلِي

Avena pratensis (S). Avoine des prés, Avenette (F).
Oat grass, Perennial oat (E). Feldhafer, Wissenha-
fer (D). Avena dei prati (I).

يكثر في المروج الطبيعية ويزرع في المراعي . ترغب
فيه الماشية على اختلاف اجناسها وانواعها ، من الغم
الى الخيل .

٨٩٩٧ - خَرْطَال رَفِيع ، دُوسَر (S).
Avena elatior (S).

Avoine élevée, Fromental (F). Tall oat grass (E).
Gemeines franzosengras (D). Avena elatior,
Saggian elatia (I).

نوع من الخرطال المعمر الكلائي . قصبته تعلو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . عصفه منبسط للنصل ثام الملمس . زراعته
المرعوية واسعة الانتشار لانه وانر الانتاج جيد الصنف
قابل الحش على عدة مرات || يرغب في الاتربة الخصبة
المتوسطة الاندماج .

٨٩٩٨ - خَرْطَال زَرَاعِي * ، شُوفَان زَرَاعِي ،

قَرْطُمَان (S).
Avena sativa (S).

Avoine cultivée (F). Common cultivated oat (E).
Even, Hafer, Saathafer (D). Avena, Vena, Gramigna
montana (I).

هو النوع الزراعي العلني المشهور يفيد الخيل ويحسن
حال الجياد . ضروره عديدة جميعها حميدة الانتاج ولكل
منها ميزات خاصة ورتبة صالحة واقلهم مناسب || وهو
بوجه عام يرغب في المواقع المرتفعة عن سطح البحر كما
يفضل الاتربة الرطبة المتوسطة الاندماج .

٨٩٩٩ - خَرْطَال عَرِيَان * ، شُوفَان عَرِيَان ،

زُمَيْر قَبْوِي (S).
Avena nuda (S).

Avoine nue, Avoine de Tartarie, Focillon (F).
Hull-less oat, Naked oat, Pill corn, Pillcorn (E).
Nackthafer, Tartaren hafer (D). Avena nuda (I).

نوع زراعي علني عديد الضروب . تكثر زراعته في البلاد
الامريكية .

٩٠٠٠ - خَرْطَال فَتَوَا * ، خَالْفُور ، زُمَيْر

Avena fatua (S). Avron, Folle-avoine, Avoine ani-
mée (F). Wild oat, Drake, Flaver (E). Flughafer,
Wilder hafer (D). Avena fatua, Av. matta, Vena
Europea (I).

ينبت مع الزرع وقد يكثر احيانا فيصبح من الاعشاب
الضارة الواجب اتلانها .

والكروم والحدائق. قوته الحشرات والديدان يقتنصها على الارض وعلى الاشجار || جسمه صغير القد. طوله نحو ١٧ سم. وبسطته نحو ٢٤ سم. ثوبه العلوي، من الرأس الى الرداء والظهر، اطحل اللون صفاني الموج. جناحاه الى السعرة، زفاه مهبدة بالحنطلي الاثقر. عجزه حنطي اللون تعلوه مسحة سمراء. ذنبه مستعرض الشكل، محدب الطرف، لونه الى الشقرة الزاهية تحوق به من جانبيه اربعة وقال بجذعة الاطراف بالاسود والابيض. عنقه وصدره ويطنه الى البياض الاغبر. عيناه مستديرتان، معتدلتا القد. حدقة عينه عسقية اللون، سمراء الموج. منقاره الى الجقوة الباهتة. رسناه نشيطان. مخالبه نحيلة || الانثى اصفر قدماً من الذكر ولكنها تتعلى بذات الثوب || طيرانه سفيف خفيف الحركة قصير الشوط. تغريده مستحب الانعام لكنه دون العنديلين والحسون || يدثن عشه في الادغال وفي الاشجار الداسية. عشه قدحي الشكل يحبكه بالقش والالياف ويطنه بالزغب والصوف || الانثى تضع نحو ٥ بيضات. الحفن يستمر نحو ١٣ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || يعتبر من المصافير الجزيلة النفع.

٩٠٢٢ - خُرْمَطَان *Loranthus globiferus* (S).

Loranthus globifera (F).

نوع من الحصال الطبي الحفيد القوائد. راجع حصال.

٩٠٢٣ - خُرْم * *Nielle* (F).

مرض جرثومي، تسببه ثعبانية الحنطة. يصيب القمح فيعطب البر الذي يصبح اسود كبزور الحرم.

٩٠٢٤ - خُرْم *، سِرَاج القُطْرُب

Agrostemma (S). *Agrostemma* (F). *Agrostemma* (E).

جنس نباتات عشبية حولية من سبط السيلانيات وفصيلة القرنفليات. انواعه عديدة بعضها زراعي تزييني ومنها البري والجهالي الذي يعتبر من الاعشاب الضارة.

٩٠٢٥ - خُرْم الابرة *Alyse argentée* (F).

راجع اليسم بحري. *Sweet alison* (E).

٩٠٢٦ - خُرْم الحنطة *

Agrostemma githago (S). *Agrostemma du blé*, *Nielle des blés*, *Couronne des blés* (F). *Bastard nigella*, *Corn cockle*, *Wild savager* (E). *Kornrade*, *Raden*, *Rade* (D). *Agrostema* (I).

نوع من الخرم البري يكثر في الحقول بين الزروع. يزوره مرة الطعم سامة. اذا اختلطت بدقيق الحنطة احدثت في آكلية اسهالا وفساداً في المعدة.

٩٠٢٧ - خُرْمَا * *Diospyros chinensis* (S).

Figue-caque, *Colng de Chine* (F). *Japanese date plum* (E). *Ita onische dattelpflaume* (D). *Ermellino*, *Lotu africano* (I).

جنس اشجار مثمرة من فصيلة الابنوسيات. مربية الشبه من الكاكي. انواعه وضروبه عديدة، مهذب الصين وقد انتشرت في جميع البلاد الحارة والمعتدلة || الشجرة صغيرة القد تعلو من ٣ الى ٤ امتار. ساقها بيشاء اللحاء.

اوراقها اهليلجية، متعاقبة، معنقة، زباء النصل. ازهارها صغيرة القد، عقدية الاهان. الذكورية منها كثيرة العدد تحمل من ١٦ الى ١٨ سداة مجموعة الى ثمانية اصسام. اما الازهار الحنثوية فقليلة العدد، مدقاتها غليظة زباء واسديتها نحو ١٦ || ثمارها كروية او شبه كروية الشكل، قطرها يراوح من ٤ الى ٥ سم.

٩٠١١ - خُرْطُونِيَّات، خُرْطُونِيَّات

Lombricidae (S). *Lombricidés* (F). *Lombricidae* (E).

فصيلة من الديدان الحلقيات الارضية.

٩٠١٢ - خُرْطِيْط السَفَّاح *

Hyponomeuta malinellus (S). *Hyponomeuta du pommier*, *Teigne des pommiers* (F). *Small ermine moth* (E). *Apfelbaumgespinstmotte* (D).

فراشة من القوبيات وحيدة الجيل الحولي، صغيرة القد، منقوشة الرواشن، بسطتها نحو ١٢ سم. تمنح مكها في الخريف على الافناد والاغصان بشكل لطخ مربعة او مستطيلة التجميع لونها الى الشقار الثني، فينقف بعد وضعه بيضة أيام عن يرقات صغيرة تمضي الشتاء في شقوق اللحاء قوتها ما تيسر من المواد العضوية وتبقى كذلك حتى الاوراق حيث تتركب الاوراق الفتية فتلتغها ثم تمتلق النوامي بنواسها الجزيري الذي يشبه بيت المنكبوت فتقيم فيه بعض الوقت الى ان تقضي على الاوراق ثم تحوّل صلجتها وتخلد في ثباتها الطبيعي الى اواخر الصيف حيث تتطور الى حشرة كاملة تعيد سيرتها الارلى.

٩٠١٣ - خُرْطِيْط التين *، قُوبَعَة التين

Simaethis nemorana (S). *Teigne du figuier* (F).

فراشة من القوبيات صغيرة القد منقوشة الرشنين بسطتها نحو ١٥ سم. اجيالها الحولية اثنان. يرقاتها ترعى بشرة فصل الاوراق على صفحاتها العليا.

٩٠١٤ - خُرْطِيْط الحَمْضِيَّات

Teigne du citronnier (F).

فراشة صغيرة القد مؤذية تعرف بقوبعة الحمضيات.

٩٠١٥ - خُرْطِيْط الزَيْتُون *Teigne de l'olive* (F).

فراشة مؤذية صغيرة القد تعرف بقوبعة الزيتون.

٩٠١٦ - خُرْعَب، خُرْعُوب، خُرْعُوبَة

Rameau d'un an (F). *Yearly bough* (E).

النصن لسنته. القصب السامق النص. الفن الناعم الحديث الشاخ الذي لم يشد. ج خرايب.

٩٠١٧ - خُرْفَاق مُشَبَّك

Coluteocarpus reticulatus (S).

Colutéocarpe réticulé (F).

نبات عشبي حزمي بري وحيد الجنس والنوع من فصيلة الفصلييات. منيته بعض الجرود النباتية اخصها منطقة الارز || ساقه فرعاء منتصب. اوراقه الجذعية قرصية التركيب، حزمية، خطية النصال المستطيلة. مسنة الحنار. اوراقه الساقية شبه سنائية الشكل. ازهاره هامى الارتكاز. ازهاره صغيرة بيشاء اللون. تنويره صيفي.

٩٠١٨ - خُرْفَع، خُرْفَع

القطن الفاسد في لوزه عند جنبه.

٩٠١٩ - خُرْفَق *Thlaspi odorant* (F).

هو الاندلسية العطرة. اطلها.

٩٠٢٠ - خُرْق

ضرب من المصافير. الواحدة خرقة (اللسان).

٩٠٢١ - خُرْقَة

Aedon (S).

Aedon, *Agrobate* (F). *Aedon* (E).


طائر من فصيلة الدخليات. اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافريقية الشمالية. يألّف المواقع الرطبة والرواين




خُرْطِيْط السَفَّاح



خُرْطِيْط التين



خُرْم



خُرْم



خُرْم الحنطة



خُرْمَا



خرمّان عادي


النهرية التي تعيش في المياه العذبة ومنها البحرية . اعطائها مياه البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها شبه اهليلجية الشكل ، رفيعة المقدم ، متساوية المصارع ، لامتناهية الاضلع ، جميلة الالوان ، تحيلة التحزير القاطب والمعرض || تعيش لاصقة بالصخور وبالاخشاب المنمورة بالماء . لحومها جيدة الصنف مرغوب فيها .

٩٠٣٧ - خرّوب* ، خرّوب (S). Ceratonias silliqua (S). Caroubier (F). Carob tree, Locust tree (E). Karobbaum (D). Carrubbio, Siliqua di Levante (I). شجرة مشرة من فصيلة القرنيات . وحيدة النوع عديدة الضروب منها المقدسي والحشاني والبري . يعلو من ٧ الى ١٢ م . ساقه شديدة الصلابة ، خشبها احمر اللون يستعمل في الصناعات الدقيقة . اوراقها عروية ، مركبة ، وريقاته شفعية بيضية ، بختانية ، لامعة ، جلدية ، عفصة ، تستعمل في الدباغة . ازهارها ثنائية المسكن ، صغيرة القند ، حمراء اللون . ازهارها عنقودي الشكل منتصب ثماره قرنية مفلطحة تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . لبها مخشوشب شبه اسفنجي يحوي بعض المواد السكرية والنشوية والازوتية || اقليمه اقليم الزيتون ، لكنه يتأثر من شدة البرد ، يرغب في المعارض الجنوبية ، يعيش ايما غرس وفي اي تربة كانت شرط ان لا تكون مرطاباً . يتكاثر بالبذور وبالفسائل . ينشأ بعد غرسه بنحو ٨ سنوات وقد تنمر الشجرة المعنى بها عند بلوغها نحو ١٥ سنة من ٩٠٠ الى ٩٠٠ كيلو . حله حولي متتابع لكنه متناوب الانتاج الكامل || ثماره كثيرة الاستعمال تصلح لعدة صناعات منها الدبس والكحول والعلف . اما بزوره فغرائية صناعية || وثماره هذه من الوجهة الكيماوية العنصرية تحوي على :

٥٠٨	%	من المواد الازوتية
٥٠٥	%	الدهنية
٣٠١	%	السكرية (سكاروز وغلوكوز)
٢٩٨	%	الهيدروكربونية غير السكرية
١٩٠	%	الحشبية
٥٤٥	%	غير المقررة



لخرنوب



خرنوب هندي

٩٠٣٨ - خرّوب هندي* ، خييار شنبّر Cassia fistula (S). Cassier, Casse en siliqua, Canéfier (F). Golden shower, Indian laburnum, Pudding pipe tree (E). Purgierkassie, Röhrenkassie (D). Cassia solutiva, C. in bastoni, C. di Levante (I). شجرة برية وزينية من فصيلة القرنيات . جميلة الغالب . تعلق نحو خمسة امتار . اوراقها عروية ، مركبة ، وريقاتها وريّة اهليلجية جلدية لامعة . ازهارها عنقودي . ازهارها صغيرة متدلية . ثمارها قرنية اسطوانية تطول نحو ٤٠ سم . بشرتها ولها سمر . بزورها حمر ، سكرية الطعم ، تستحلط وتستعمل في عدة مستحضرات طبية . ويقال انها من مسهلات المعدة القوية المفعول .



خرنوب

٩٠٣٩ - خرّوبية* ، خرّوبية Caroube, Carouge (F). Carob (E). ثمرة الخرنوب قرنية مخشوشبة سكرية المادة جثا على تحليتها في بحث الخرنوب .

٩٠٤٠ - خرّوب الخنّير Anagyris fétide (F). Stinking wood (E). اطلب ينبت نخل .

لونها الى الصهبة الصفراء . لبها عايق الصفار ، شديد الحلاوة عند تمام الادراك . تتميز بنرج عطري يتقلص مع النضج || زراعتها كزراعة الكاكي ومتطلباتها كذلك .

٩٠٢٨ - خرّمان Phygelius (S). Phygelie (F). Phygelius (E).

بجلة معمرة من فصيلة الخنازيريات . ساقها مخشوشبة ترتفع نحو ١٠٠ سم . اوراقها معنقة ، متقابلة ، سانية النصل المسنن الختار ، تطول من ٥ الى ٨ سم . ازهارها الى الحمرة المرجانية المطوقة بالاصفر الكبريتي . قطرها نحو ٤ سم . ازهارها عشكولي التجميع ، محوري الارتكاز . تنويرها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

٩٠٢٩ - خرّمان ، براك Belone (S). Orphie (F). Belone, Garfish (F).

جنس اسماك بحرية من الاسقمريات الشائكات الزعانف . انواعها المعروفة خمسة جميعها خضراء اللون ، طويلة القند ، اسطوانية الشكل . رؤوسها مستطيلة المقدم على شكل المنقار . وهي من الاسماك غير المرغوب فيها لانها قد تكون سامة في بعض فصول السنة . اعرفها واشهرها ما يلي .

٩٠٣٠ - خرّمان المتوسط Belone imperialis (S). Orphie de Cantraine (F). Imperial garfish (E).

اكبر انواع الخرمّان . طولها نحو ١٢٥ سم . ظهرها الى الخضار الازرق . بطنها فضي . منقارها مسنن . تقترب من الشواطئ . موطنها البحر المتوسط .

٩٠٣١ - خرّمان عادي* Belone vulgaris (S). Orphie commune (F). Common garfish, Greenbone (E).

سمكة من الخرمّان طولها نحو المتر . منقارها مستطيل مسنن ، ظهرها اخضر . بطنها ابيض . موطنها بحار البلاد الحارة والمعتدلة . تكثر قرب الشواطئ .

٩٠٣٢ - خرّمان ميبّر Belone acus (S). Orphie aiguille (F). Needlefish, Billfish (E).

اصغر قليلاً من الخرمّان العادي . منقارها خال من الاسنان . موطنها المحيط الاطلسي . تكثر قرب الشواطئ الافريقية والاروبية .

٩٠٢٣ - خرّمانيات Belonidae (S). Belonidés (F). Belonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من الاسقمريات شائكات الزعانف . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اسطوانية الشوزن . مستطيلة الجرم . رؤوسها معتدلة الحجم ، مستطيلة الاغظام المتقادية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الخرمّان .

٩٠٣٤ - خرّنباش Amaraque (F). Amaracus (E). هو المرو ، اطلبه .

٩٠٣٥ - خرنق Levraut (F). Young hare (E). هو ولد القواقع ، الارنب الوحشي ، قبل بلوغه ستة اشهر . ج خرائق .

٩٠٣٦ - خرنقة* Modiola (S). Modiole (F). Modiola (E).

جنس حيوانات بحرية ونهرية من الرخويات خفيفيات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعها المعروفة نحو ٧٠ منها

٩٠٤٩ - خَرَيْسَب ٥

Endostome (F). Endostom (E).

الخرب فويهة في الغشاء الداخلي من البويضة النباتية .

٩٠٥٠ - خَرَيْسَبُ أَسْوَدُ الْعُنُقُ *

Indicator sparmanni (S). Indicateur à gorge noire, l. à bec blanc, Maroc (F). Honey-gulde (E).

طائر من الخريث وفصيلة الخريثيات . موطنه يمتد من حوض البحر الاحمر الى الحبشة فافريقية الجنوبية || جسمه رشيق الشكل يطول نحو ١٨ سم . بسطته نحو ٢٨ سم . ثوبه العلوي الى الكهبة . لواحف جناحيه مرقوشة بالابيض . عنقه اسود . صدره وبطنه الى البياض الاشهب . مؤخر البطن مع الفخذين مرقوشة بالاسمر . منطقة العين والاذن الى الصفار الباهت . قاعدة الجناح هلالية الشكل صفراء اللون . حذقة عينه عسليه . متقاده الى البياض الاسمر . ساقاه الى السمر || طيرانه خفيف الحركة ، معتدل الشوط . قوته الحشرات واساريها وذي النحل والعسل . وقد اطلق عليه اسم خريث لانه يهدي الى مكان وجود العسل وذلك بترداده عليه في الصباح وبعد العصر || الانثى لا تعشش بل تضع البيض في اعشاش غيرها من الطير ولا تضع في العش الواحد اكثر من بيضة .

٩٠٥١ - خَرَيْسَبَات ٥

Indicatoridae (S). Indicatoridés (F). Indicatoridae (E).

فصيلة طير من المتسلقات . مركزها بين القيقوبيات والنفازيات . انواعها المعروفة ١٢ جميعها من طيور البلاد الاسيوية والافريقية || تتميز بمناقيدها المخروطية الشكل ، المعتدلة الطول ، وباجنحتها الذلقة الاطراف ، وبريشها القصير اللبد || اناثها لا تعشش ولا تحضن البيض بل تضعه في اعشاش بعض الجواثم كالدخل والحواجز والذعر . اشهر انواعها الخريث الاسود العنق .

٩٠٥٢ - خَرَيْدَة

Perle non percée (F).

المؤلوة لم تثقب . ج خرائد وخرد وخرد .

٩٠٥٣ - خَرَيْدَلِيَّة

Silicule (F). Silicula (E).

نعت وصفي للدلالة على شكل ثمري خاص يشبه ثمرة الخردل الصغيرة التي يكاد طولها يفوق عرضها .

٩٠٥٤ - خَرَيْزَة

Coccidium (S).

Coccidie (F). Coccidia (E).

جنس حيوانات مجهرية من فصيلة الخريزيات .

٩٠٥٥ - خَرَيْزَة الْأَرْتَب ، كُكْسِيدِيُوز

Coccidium cuniculi (S). Coccidiose, Coccidie du lapin, Maladie du gros ventre (F).

مرض فتاك يصيب الارانب والطيور الداجنة سببه حيوان مجهري من الخريزيات .

٩٠٥٦ - خَرَيْزِيَّات

Cocciens (F).

فصيلة حيوانات دنيا من الاوالي المجهرية .

٩٠٥٧ - خَرَيْس

Salicorne herbacé (F).

هو إثنان القلي ، اطلبه .

٩٠٥٨ - خَرَيْس ، خَيْرَيْس

Tétrás (F). Grouse (E).

هو الطيهوج ، اطلبه .

٩٠٤١ - خِرْوَع ، تُبْشُع Ricinus communis (S).

Ricin, Palma Christi (F). Castor oil plant, Palma Christi (E). Echter wunderbaum, Palme Christi (D). Risino, Palma Christi (I).

شجرة من الفصيلة التنوعية . وحيدة الجنس والنوع . عديدة الضروب المعمرة في البلاد الحارة والحولية في البلاد الباردة . ساقها ليفية مخشوشبة تعلو نحو ٣ امتار . اوراقها متعاقبة ، معنقة ، طويلة الزناد ، كفية النصل ، ثمانية ار تساعية الفصوص . ازهارها عنقودي منتصب . ازهارها صغيرة كثيفة التجميع . ثمارها جراء مستطيلة شائكة الغلاف . بزورها مصقولة لامعة القشرة الحمراء المخططة والمنمشة بالاسمر . لها ابيض كريبه الطعم مقبى يستخرج منه زيت الخروع المعروف || ضروب الخروع عديدة ، اشهرها ما يلي :

Ricin albidus (S). Ricin blanc (F).

خروع ابيض

Ricin purpurens (S).

خروع ارجواني

Ricin pourpre (F).

خروع اخضر

Ricin viridis (S). Ricin vert (F).

خروع دموي *

Ricin sanguineus (S).

خروع زنجباري

Ricin sanguin (F).

خروع صغير

Ricin minor (S). Ricin petit (F).

خروع كبير *

Ricin major (S). Ricin grand (F).

٩٠٤٢ - خِرْوَع صِينِي Croton cathartique (F).

هو كروتون الزيت ، اطلبه .

Croton-oil plant (E).

٩٠٤٣ - خِرْوَف Mouton (F). Sheep (E).

هو الذكر من النعم قبل ان يصير كبشاً وبعد ان يكون

حلاً . ج خراف وخرفان وأخرقة .

٩٠٤٤ - خِرْوَف الْبَحْر ، أم زُبَيْسَة

Manatus (S). Lamantin (F). Manatee (E).

جنس حيوانات مائية لبونة من الخيلان يكثر وجودها

في المحيط الاطلسي وفي بعض الانهار الكبيرة التي تصب

فيه . انواعه ثلاثة جميعها قائمة اللون الحنطي الاسمر ،

عظيمة الجثة . شعورها هليية مبعثرة ، جلودها ناعمة خبنة .

٩٠٤٥ - خِرْوَف الْبَحْر الْافْرِيقِي Manatus senegalensis (S). Lamantin d'Afrique (F).

نوع من خرووف البحر طوله نحو ٢٥٠ سم . وزنه

٢٥٠ كيلو ، ثوبه ارمدا اسمر ، هلبه الى السمرة . يعيش

عند مصب الانهر الافريقية ويوجد منه في بحيرة تشاد .

٩٠٤٦ - خِرْوَف الْبَحْر الْافْرِيقِي Manatus latirostris (S). Lamantin d'Amérique (F).

نوع من خرووف البحر طوله نحو ٣٠٠ سم . وزنه

٣٥٠ كيلو ، ثوبه ارمدا ازرقي يسمر ويمبق مع اقترابه

من ثبج الظهر . هلبه الى الصفرة . يكثر قرب شواطئ

الانتيل وفلوريدا .

٩٠٤٧ - خِرْوَف الْبَحْر الْاَلْفَرِي Manatus inunguis (S). Lamantin sans ongles (F).

نوع من خرووف البحر اصغر من الافريقي . طوله نحو

٢٢٠ سم . وزنه ٢٠٠ كيلو ، عديم الاظفار ، ثوبه اعقب

من الامريكي . يعيش في نهري الامازون والاورينوك .

٩٠٤٨ - خِرْوَمَانَة

بقلة خبيثة الريح تنبت في الدمن (اللسان) .



خروع دموي



خروع كبير



خرووف البحر



خريث اسود العنق



خزّام أبيض

٢٥ الى ٥٠ سم. فروعه عديدة متتامة ، منفرجة الانتشاب . اوراقه شديدة الخضار . ازهاره الى الصفرة المشربة البياض .

٩٠٦٩ - خَزَام القِطّ Astragalus cruciatus (S).
Astragale pendu (F).
هو الاسطراغالوس المتصالب ، اطلبه .

٩٠٧٠ - خَزَام بَرِّي Réséda sauvage (F).
Wild reseda (E).
هو الاسليخ نبات عشبي بري ازهاره فسقية اللون .



خزّام الصياغين

٩٠٧١ - خَزَام عَطِير * Reseda odorata (S). Réséda odorant, Mignonette, Herbe d'amour (F). Common garden mignonette (E). Reseda-wau, Garten reseda-wau (D). Reseda odorosa, Amoretti d'Egitto, Amorino (I).

نوع من الخزّام الزراعي التزييني . ضرّوبه عديدة جميعها مخشوشة معمرة تعلو من ٢٥ الى ٤٥ سم. فروعه متتامة منفرجة . اوراقها بسيطة كاملة شبه فصية . نصلها بحيل الخضار الزاهي . ازهارها فواحة العرف المستحب . بتلاتها الى الخضار الاصفر . اسديتها حمراء اللون || ترغب في الاتربة المتوسطة الاندماج والعنصر الكلسي || ازهارها يستمر طوال الصيف .



خزّام عطر

٩٠٧٢ - خَزَامِي ، لاوَنْدَه Lavandula (S).
Lavande (F). Lavender (E).
جنس نباتات عشبية ليفية نجمية معمرة من فصيلة الشفويات انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها نجمية صغيرة القد فرعاء . اوراقها لسنة خيطية متقابلة . ازهارها سنبلية التجميع ، ناجي الارتكاز . ازهارها بنفسجية زاهية او زرقاء اللون . وهي من النباتات الزراعية الصناعية التي يستخرج من ازهارها واوراقها عطر ودهن الخزّامي || اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .



خزّامي بحرية

٩٠٧٣ - خَزَامِي بَحْرِيَّة * ، لاوَنْدَه بَحْرِيَّة ، ضُرْم ، أَسْطُوخُوْدُس ، شاه اسبرم رومي Lavandula stoechas (S). Lavande stoechade, Quereillet (F). Stoechas, French lavender (E). Fremder lavendel (D). Lavanda stecade, L. dimonte, Stecade (I).
نوع من الخزّامي وهي نجمة برية تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها خيطية رمضاء اللون زباء النصل على صفحتيه . ازهارها سنابل مربعة التصفيف تقوم على ضمة من القنابات الضيقة . ازهارها بنفسجية . كانت ولا تزال شائعة الاستعمال الطبي . تدخل في عدة شرابات صحية ويستخرج منها دهن عزيز القدر .

٩٠٧٤ - خَزَامِي حَقِيقِيَّة * ، خَزَامِي مَخْزَنِيَّة ، خَيْرِي البرّ ، لاوَنْدَه أَصْلِيَّة Lavandula vera, L. officinalis (S). Lavande commune, L. vraie, L. femelle (F). True lavender (E). Echter lavendel (D). Lavanda, Lavandola (I).
اشهر واجود انواع الخزّامي . تعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقها كاملة ضيقة ، طولها يفوق عرضها ثماني مرات . ازهارها سنبلية . سنابلها دقيقة . ازهارها مغشية زرقاء اللون قناباتها سباجية المروق المروحية الشكل || اوراقها وازهارها فواحة العرف يستخرج منها بالتقطير عطر ودهن الخزّامي . وقد تستعمل في الطّب وهي عديدة الفوائد .



خزّامي حقيقيّة

٩٠٥٩ - خَرْبَسِيَّات ، خَرْبَسِيَّات Tétroniens (F). Tetraniinae (E).

صارة طير من فصيلة الطيوريات . تتميز بامتداد المنطقة الريشية على كامل رأسها حيث تكسوه حتى المنقار . اجناسها اربعة الخوط والسلكان والطيوج والعقد .

٩٠٦٠ - خَرْبِطَة ، رَسَم Plan (F).

٩٠٦١ - خَرْبِطَة المِسَاحَة Plan cadastral (F).
Cadastral plane (E).

مجموعة الرسوم الرسمية التي تخطط وتحدد الاملاك العقارية فتبينها بجلاء وتدلل على مساحتها بالتفصيل .

٩٠٦٢ - خَرْبِطَة تَقْسِيم القِطْع Plan parcellaire, Cadastre parcellaire (F). Register of lands divided into small portions (E).

هي رسم التعضية العقارية كما يفرضها القانون والحال والمكان .

٩٠٦٣ - خَرْيَع Gourmand (F). Sucker (E).

القضيب الجديد السريع النمو الذي يستفيد من نسج الشجرة على حساب سائر أو بعض اجزاء هيكلها الخشبي .

٩٠٦٤ - خَرْيَف Autonne (F). Autumn (E).

فصل بين الصيف والشتاء وهو في الاصل اسم مطر القيط ثم سمي الزمن به . مدته ثلاثة اشهر ، من ٢١ ايلول الى ٢٠ كانون الاول . يبتدئ عند نزول الشمس اول الميزان يتميز باستواء الليل بالنهار وابتداء الليل بالزيادة ، ومهبوب الشمال ونقص المياه وسقوط اوراق الاشجار وانصراف الطير في طلب المناطق الدافئة || يدوم حتى بلوغ الشمس آخر القوس حيث يدخل الشتاء .

٩٠٦٥ - خَرْز Martre commune (F).

هو السمور الشائع ، اطلبه . Common marten (E).

٩٠٦٦ - خَزَام Reseda (S). Réséda (F).

Reseda, Mignonette (E). Reseda, Wau (D). Reseda (I).
جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة ، برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخزّاميات . انواعه عديدة . اوراقه بيضية مستطيلة مختلفة التركيب . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره صغيرة القد ، عطرية الرائحة ، متعددة الالوان . اشهر انواعه ما يلي .

٩٠٦٧ - خَزَام أبيض * ، ذَيْل الخُرُوف ، جَلْبَهَنَك Reseda alba (S). Réséda blanc (F). White upright mignonette (E). Weisser wau (D). Reseda bianca (I).

نوع من الخزّام يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. اوراقه مركبة . وريقاته مستطيلة متقابلة كثيرة العدد . نصلها اخضر اللون ، ازرق المواج . ازهاره عنقودي لبد . ازهاره عطرية الرائحة لونها الى البياض || ازهاره يستمر من ايار الى ايلول وهو من النباتات التي ترغب في المعارض البحرية وتخشى الصقيع والاتربة القوية الاندماج .

٩٠٦٨ - خَزَام الصَّبَاغِيْن * ، بَلْبَحَاء ، وَيْبَه Reseda luteola (S). Réséda des teinturiers, Gaude, Herbe aux Juifs (F). Dyer's weed, D. rocket, Weld, Yellow weed (E). Färberwau, Gelbliche reseda (D). Reseda dei tintori, Guada, Guaderella, Luteola, Erba gialla, Biondella (I).

نوع من الخزّام وهو نبات عشبي صبغي حولي يعلو من

صغيرة تطول من ٢ الى ٧ سم. رؤوسها كبيرة. عيونها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة. ملامسها صغيرة او ضامرة. كواسلها مستطيلة. بطونها شبه يرمعية الشكل. اثوابها ملونة. رواشها قسطانية التخضيب || الحشرة الجملانة تعيش على رحيق الازهار وطلعها. اما اليرقة فمعظم انواعها يعيش على النجيليات فيؤذيها. اشهر اجناسها الخزياء والمرمزة.

٩٠٨٤ - خَزَرْج (F). Vent froid du sud (F). الخزرج: ريح الجنوب الباردة.

٩٠٨٥ - خَزَرْوَقِي (F). Araignée mâle (F). الخزرق ذكر العناكب الصغيرة القد. اما ذكر العناكب الكبيرة القد فيسمى خزانق.

٩٠٨٦ - خَزَرْو (F). Bouquin (F). Buck-hare or rabbit (E). هو الارنب الذكر والقواع الذكر. ج أخزة وخزان.

٩٠٨٧ - خَزَرْف (F). Poterie, Faïence (F). Pottery, Crockery, Earthenware (E). ما عمل من الآنية بالطين وشوي بالنار فصار فخاراً. الواحدة خزفة.

٩٠٨٨ - خَزَرْم، خَشْش (F). Bouclage, Boucllement (F). Ringing (E). الخزم هو وضع الخزامة او الخشاش في انف الثور ليدل او في خطم الخنزير ليمتنع عن اثارة التراب.

٩٠٨٩ - خَزَرْم * ٥، كِنْتِيَّة ٥ (S). Kentia (S). Kentie, Howée (F). جنس اشجار ليفية الجذع من فصيلة النخلات. مهدا البلاد الاسترالية الحارة. انواعها عديدة معظمها بري وبعضها تزييني يزرع في المراكن. جذوعها منتصبة رشيقة مستدقة. براعمها كثيفة. خوص سعتها ريشي التركيب، متقابل، مفلق، دقيق النصل اللامع المتدلي الاطراف || اشهر انواعه التزيينية ما يتبع.

٩٠٩٠ - خَزَمَة بَلْمُور ٥ (S). Kentia balmorea, K. australis, Grisebachia (S). Kentie de Balmore, K. d'Australie, Palmier frisé (F). نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ١٢ م. برمتها كثيفة التجميع. سعتها يطول ٢٧٥ سم. خوصها الى الخضار الزاهي اللامع، تحجبه رجب التقويس. تعيش في المواقع الدافئة وتزرع في المراكن. لا تحشى الرطوبة.

٩٠٩١ - خَزَمَة فُورستري ٥ (S). Kentia forsteriana (S). Kentie de Forsteri (F). نوع من الخرم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ٥ امتار. برمتها متوسطة الكثافة. سعتها مستطيل الكرب، خوصها جميل الخضار الزاهي الفاتح. تحجبه ضعيف التقويس. تزرع في المراكن، ترغب في الاتربة الجيدة والرطوبة المستمرة.

٩٠٩٢ - خَزَمَة كَنْتِيرْبُورِي ٥ (S). Kentia canterburyana, Hedyscepe canterburyana (S). Kentie de Canterbury, Hedyscepe (F). نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ٨ امتار. برمتها كثيفة. سعتها مستطيل الكرب. خوصها جميل

٩٠٧٥ - خَزَامِي ذَكَرِيَّة *، لَؤُنْدَه ذَكَر، هَنَان (S). Lavandula spica, L. latifolia (S). Lavande spic, L. mâle, Grande lavande (F). Common lavender (E). Lavendel, Breiter lavendel (D). Lavanda nardo Spico (I).

نوع من الخزامي تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة، رمادية النصل، طولها من ٤ الى ٥ سم. وعرضها نحو ٧ مم. ازهارها سنبل. سنابلها قصيرة وعفية. ازهارها بنفسجية. قناباتها ضيقة، وحيدة المرق الاوسط. تزرع بكثرة ويستخرج من اوراقها وازهارها دهن الخزامي المشهور.

٩٠٧٦ - خَزَامِي رِيْشِيَّة (S). Lavandula pinnata (S). Lavande pennée (F). نوع من الخزامي وهي نجمة برية وزراعية تعلو من ٢٥ الى ٥٠ سم. اوراقها مستطيلة، مشرمة، ريشية، خلية النصل. سنابلها دقيقة تطول نحو ٨ سم. ازهارها صغيرة القد والاهان لونها الى الليلي يعلو موج اذرق.

٩٠٧٧ - خَزَامِي صُوفِيَّة (S). Lavandula lanata (S). Lavande laineuse (F). نوع من الخزامي وهي نجمة برية تعلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقها كاملة، لسنة، زباء النصل على صفحتيه، زغبها صوفي لبد. ازهارها سنابل صغيرة القد دقيقة. ازهارها زرق.

٩٠٧٨ - خَزَامِي مُسَنَّنة (S). Lavandula dentata (S). Lavande dentée (F). نوع من الخزامي وهي نجمة برية - تعلو نحو ٥٠ سم. اوراقها اهليلجية الشكل مسننة او مفرصة الحافة، نصلها ازغب الصفحة السفلى. سنابلها زهقة يعلوها ضمة من القنابات الملونة. ازهارها ليلية اللون طويلة الاذن.

٩٠٧٩ - خَزَامِيَّات (S). Resedaceae (S). Résédacées (F). Resedaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. اجناسها ستة وانواعها نحو ٧٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحارة. نباتاتها اعشاب وجنات متعاقبة الاوراق البسيطة الممتدة الاذنية. ازهارها خشوية او وحيدة المسكن، عنقودية التجميع او سنبلية.

٩٠٨٠ - خَزْرَان (F). Réservoir (F). Réservoir (E). بحقن خزن الماء.


٩٠٨١ - خَزَوْب (F). الخزوب ورم يصيب الفرع عند التشاج وقد يشبه الرجل.

٩٠٨٢ - خَزَرْبَاء ٥ (S). Chlorops (S). Chlorops (F). Gout fly (E). Halmflege (D). ذبابة من ذوات الجناحين صغيرة الغد لونها الى الصفرة المؤذرة بالاسمر غيها الى الخضار اللامع. حلقها الصدرية الثانية سوداء. انواعها نحو ٦٠ منتشرة في جميع الاصقاع المعتدلة الحارة. انها تتمتع مكانها في اصول النجيليات وغيرها من النباتات الزراعية والبرية فينقف عن يرقات تنخر السوق وتعيش في داخلها.

٩٠٨٣ - خَزَرْبَائِيَّات ٥ (S). Chloropidae (S). Chloropidés (F). Chloropidae (E). فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم. تألف الغابات والحقول المزروعة والمروج وصفات مجاري الماء || اجسامها



خزامي ذكرية



خزباء



خزرم

الماء . عصارته لبنة عاجية اللون جحالية المادة يكثر فيها الحامض العنبري .

٩١٠٣ - خَس "الغَاب" (S). *Lactuca perennis* (S).
Laitue vivace, Salade de Ilèyre (F).

نوع من الخس التريبي المعمر . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه كبيرة انحد ، مستطيلة ، عيفة التفريص .
نصلها رهل الصفحة . قليل التسنين . ازهاره عذقي
الشكل . ازهاره رؤسية زرقاء اللون ، ثلاثية او رباعية
التجميع || يزرع للتزيين .

٩١٠٤ - خَس "النعجة" (F). *Valerianella potagère* (F).
Milk grass (E). هي السنه ، بقلة زراعية من الناردنيات .

٩١٠٥ - خَس "بحري" * ، أشنة خَسِيَّة

Ulva lactuca (S). *Ulve laitue*, *Laitue de mer* (F).
Sea lettuce, Sloke, Oyster green (E). *Lattichwatt*,
Meersalat (D). *Lattuga di mare* (I).

نبات بحري من الطحيات الخضراء . اوراقه بحجم وشكل
اوراق الهندباء ، لكنها لزجة ، خالية من الصلغ والعروق .
تؤكل نيئة ومطبوخة . يسميها الروس « زبدة بحرية » .
يوجد قرب الشواطئ البحرية . يكثر في بعض بحار الشمال .

٩١٠٦ - خَس "بري" * ، خَس "الزيت"

Lactuca scariola (S). *Laitue sauvage*, *L. scariola*, *L. d'huile* (F). *Oil lettuce*, *Prickly lettuce* (E). *Stachel-*
lattich (D). *Lattuga salvatica* (I).

هو الخس البري المعروف . يستعمل في حلة مستحضرات
طبية لمعالجة الحلق والصدر . يستخرج منه زيت الخس
المشهور || يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور .

٩١٠٧ - خَس "بستاني" *
Lactuca sativa (S).
Laitue cultivée (F). *Common lettuce* (E). *Lattich*,
Gartenlattich, *Kopfsalat* (D). *Lattuga* (I).

هو الخس الزراعي الشائع ، المشهور ، المأكول الاوراق ؛
يحتوي الشيء الزهيد من الفيتامينات ا و ب . لكنه يحوي
الكثير من الفيتامين (ب) || ضرره عديدة احصاها
الثلاثة التالية :

الخس الروماني
Lactuca sativa romana (S).
Laitue romaine, *Chicon* (F).
اوراقه بيضيه ، اهليلجية ، متراكبة ، متراصة ،
لاحقة ، غليظة الصلغ الغزير العصارة .

الخس القلبي
Lactuca sativa capitata (S).
Laitue pommée (F).
اوراقه بيضيه ، قلبية ، متراكبة ، فارشة . ضلعها
متوسط الغلاظة والعصارة .

الخس المجعد
Lactuca sativa crispa (S).
Laitue crispée (F).
اوراقه كبيرة ، مستعرضة ، مجعدة النصل المتجمع .
ضلعها قليل الغلاظة والعصارة .

٩١٠٨ - خَس "جبار"
Lactuca altissima (S).
Laitue géante (F).

نوع من الخس البري الطبي . يعلو نحو ٨٠ سم . ساقه
غليظة غزيرة العصارة . عصارته لبنة لزجة تدعى حليب
الخس . تعتبر من المسكنات النافعة .

٩١٠٩ - خَس "مُدَرَّن"
Lactuca tuberosa (S).
Laitue tubéreuse (F).
نوع من الخس التريبي المعمر . منبتة الشرق الاوسط .

الخضار الزاهي العابق . تحجيتها ضعيف التقويس || تعيش
في المواقع الدافئة وتزرع في النراكن ، ترغب في الارربة
الرطبة الغنية بالدبال وبسائر المواد العضوية .

٩٠٩٣ - خَزَمَة مُور °

Kentia mooreana, *Clinostigma mooreanum* (S).
Kentia de Moore (F).

نوع من الخزم جذعها بطيء النمو يعلو نحو ١٠٠ سم .
برمتها كثيفة . سعتها مستطيل الكرب الدقيق بطول نحو
٦٠ سم . خوصها جميل الخضار الزاهي العابق . تحجيتها
ضعيف التقويس . وهي من النباتات السبروتية التي
تعيش وتنمو في جميع المواقع الدافئة .

٩٠٩٤ - خَزَمَة يُونِس °
Kentia joanis, *Veitchia* (S).
Kentia joanis, *K. de Velt* (F).

نوع من الخزم جذعها بطيء النمو . تعلو من ٢٠
الى ٣٠ سم . برمتها كثيفة . سعتها مستطيل الكرب .
خوصها جميل الخضار الفسقي ، بنفسجي الحافة ، مذهب
البزيم ، تحجيتها واسع التقويس || سبروتية في اقليمها
الطبيعي . ترغب في الارربة الرطبة . تعتبر من النباتات
التزيينية الفاخرة . تزرع في المراكن .

٩٠٩٥ - خَزَن
Engrangement (F). Getting (E).
هو خزن الحصيد والتبن وغيرها في السقيفة او التبان .

٩٠٩٦ - خَزَيْبَة
Minière d'or (F). *Gold-mine* (E).
منجم معدن الذهب .

٩٠٩٧ - خَزِير

هو العوسج او الشوك الذي يحمل على قن الحيطان منعاً
للتسلق .

٩٠٩٨ - خَس
Lactuca (S).
Laitue (F). *Lettuce* (E). *Lattich* (D). *Lattuga* (I).
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات
السينية الزهر . انواعه كثيرة سوقها غليظة القاعدة لبنة
العصارة . اوراقها متعاقبة وهي متراكبة في الانواع
الزراعية . ازهارها عنقودي التجميع منتصب الارتكاز
الهامي . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون . ثمارها زور
مستدقة مستطيلة || أشهر انواعه ما يتبع .

٩٠٩٩ - خَس "الحمار"
Alkanna tinctoriale (F).
Alkanet (E).
هو الكنهان ، اطلبه .

٩١٠٠ - خَس "الحيطان" °
Lactuca muralis (S).
Laitue des murailles, *Pendrille* (F). *Wall lettuce*,
Ivy leaved lettuce (E). *Mauerlattich* (D). *Lattuga*
montana (I).

نوع من الخس البري يكثر في الارض البور وبين
البيوت وعلى الجدران والحيطان . اوراقه متعاقبة ، كبيرة ،
مفرضة ، حاضنة . ازهاره عنقودي منتصب . ازهاره
صغيرة صفراء اللون .


٩١٠١ - خَس "الزيت"
Laitue scariola (F).
Oil lettuce (E).
اطلب خس بري .

٩١٠٢ - خَس "السَم" * ، لَبِيَنَة

Lactuca virosa (S). *Laitue vireuse* (F). *Acrid lettuce*,
Wild lettuce (E). *Gifclattich*, *Wilder lattich* (D).
Lattuga velenosa, *Pinocchio acquaiolo* (I).
نوع من الخس البري يعيش بين الزروع وقرب اقنية



خس الحيطان



خس السم



خس بحري



خس بري



خس بستاني

Nid de frelons (F).
Hornet's nest (E).

٩١١٧ - خُصَّاء

الخُصَّاء ج خُصَّاءات . هي وكر الخُشرم .

٩١١٨ - خُشَّار ، خُشَّارَة

الردي من كل شيء . وما لا لب له من الشعر .

٩١١٩ - خُشَّارِيَّات ٥ ، قُرُصِيَّات

Discomycetes (S). Discomycètes (F). Discomycetesi (E).
فصيلة فطور تنتمي الى مرتبة الفُشِيَّيات ورتبة الرُقيَّات .
اعسامها مغشاة بنكعة مكونة من التكتات والنكت . مقها
مصراعي الانفلاف ، انفلافها سهبي اذا انشق عن
النكة ولا سهبي اذا انشق عن السمة || اجناسها وانواعها
عديدة ، منها رمية كبيرة الحجم كالغوشنة ومنها طفيلية
صغيرة ومجهرية ، تجمعها نحو ١٦ عمارة اعرفها اقتصادياً
وزراعياً : الدشيات ، الدرمليات ، الذعلبيات ،
الربشيات ، الربنيات ، الرهفيات ، الرهيطيات ،
الروخيات ، الزيميجيات والسقديات .

٩١٢٠ - خُشَّاشَة
Bestiole (F). Little animal (E).
خُشَّاشَة ج خُشَّاش : هوام الارض وحشراتهما .

٩١٢١ - خُشَّاف ٥
Vesperugo (S).
Vespérugo, Vespertilions (F). Bats proper (E).
Dämmerungsmäuse (D).

جنس حيوان من فصيلة الخُفَّاشيات . انواعه عديدة
رؤوسها مسترصة . فراطيسها مخروطية الشكل ، قصيرة
القد ، مقطومة . آذانها كبيرة ، ذلقة ، منفصلة . سننها
مستطيلة . اجنحتها فارشة || موطنه العالم . معظم انواعه
يعيش في البلاد الحارة والمعتدلة . وبعضها يألف البلاد
الباردة . اناته تضع جروين تحملها حتى الفطام اي
نحو ثمانية اسابيع || اعرف واشيع انواعه ما يتبع .

٩١٢٢ - خُشَّاف الشَّمَال ٥

Vesperugo borealis (S). Vespérugo boréal (F).
نوع من الخُشَّاف طوله نحو ١٠٥ مم . بسطته ٢٧٠ ،
ذنبه ٤٧ مم . ثوبه الى السمرة الدخلاء يعلوها ذر ثبري
شديد اللمعة || موطنه البلاد الباردة . يعتبر من القواطع
البعيدة المجال يزرح الى شمال روسيه وفنلند والناروج
ابتداء من شهر آب عندما يطول الليل . يألف اغنية
وسقوف البيوت الآهلة والمهجورة . يعيش جماعات
كثيرة العدد . مسرحه من الفسق الى الفجر . قوته
الحشرات على اختلاف انواعها .

٩١٢٣ - خُشَّاف الغَسَق ٥
Vesperugo noctula (S). Vespérugo noctule, Noctule (F). Noctule (E).

نوع من الخُشَّاف كربه الرائحة طوله نحو ١٢٠ مم .
بسطته ٣٨٠ مم . وذنبه ٤٠ . ثوبه الى السمرة الخطية
الصفراء ، ظهره عابق الموج ، بطنه زاهر || موطنه
شاسع الاطراف يعم جميع المناطق المعتدلة الحارة من
اليابان الى الهند والشرق الاوسط واروبه وافريقية .
يألف الاشجار الحرجية العروة . يعيش جماعات كثيرة
العدد . مسرحه من الغروب الى فحة الليل . قوته
الحشرات على اختلافها ، احصها غميدة الاجنحة .

٩١٢٤ - خُشَّاف الليل ٥
Vesperugo serotinus (S). Vespérugo séroclin, Séroline (F). Serotine (E).

نوع من الخُشَّاف طوله نحو ١٢٠ مم . بسطته ٣٥٠ مم .

يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه كبيرة القد طولها نحو
٣٠ سم . وعرضها ٢٠ وهي خلبية الشكل حادة الاسنان
الشائكة . ازهاره عنقودي التجميع ، هامي الارتكار .
ازهاره رؤسية بنفسجية اللون .

٩١١٠ - خُصَّاف ٥ ، فُفَّاش البُنْدُق ٥

Nucifraga caryocatactes (S).
Casse-noix vulgaire (F). Nut-cracker (E).
Nusshäher, Tannenhäher (D).

طائر من فصيلة الغربان متوسط القد يطول نحو ٣٥ سم .
ثوبه الى السمرة الخطية العابقة يعلوها توشيم ابيض لاقياسي
الشكل تكاثر فيه الاستطالة كالاندا . رأسه وجناحاه
وذنبه الى السواد العابق تعلوه ماجة خضراء ورقشة خفيفة
لانظامية تحتل اطراف الريش . حدقة عينه الى السمرة
البندقية . منقاده ورجلاه الى السواد الفحمي || اعطانه
تشمل معظم جبال العالم القديم . يألف احراج الصنوبر
قوته الحشرات والرخويات وبعض العصافير وجلايبتها
والثمار والبزور واهصها البندق وصنوبر سمبرو || وهو
من الطيور المدخارة المحترسة التي تجمع في اناوير خاصة ،
ترتبها في تجاويف الاشجار او في اوقاب الصخور ، ما
استطاعت جمعه من بزور وثمار تسد بها فمها الجوع عند
الحاجة || وهو يتميز ايضاً بغدة جرابية مطاطة تتاخم
مدخل المسرط تستوعب قدر البيضة الكبيرة يستعملها لنقل
ما يرغب في اختزانه || يدفن عشه في الشربين والتنوب .
انثاء تحضن وحدها من ٤ الى ٥ بيضات .

٩١١١ - خُصَّافَة
Tare (S). Tare, Waste (E).
ثقل الوعاء .

٩١١٢ - خُصَّان
Etoiles qui ne se couchent pas
الخصان هي النجوم التي لا تغرب كالجدي والقطب وبنات
نعل والفرقدن الخ ...

٩١١٣ - خُصْبُورَة
Chorospore (F).
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية من فصيلة الصليبيات
مشهورة باسم ديسوية ، اطلها .

٩١١٤ - خُصْبُولِيَّات ٥
Alleculidae (S). Alléculidés (F). Alleculidae (E).

فصيلة حشرات من منعمات الاجنحة مختلفات الاجزاء .
اجناسها وانواعها المعروفة . متوسطة العدد اعطانها بعض
مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط واروبه ||
اجسامها صغيرة شبه بيضية الشكل ، معتدلة التبيط ،
معدبة الصفحات العليا . قرونها الاستشعارية خيطية مركبة
من ١١ فصلة . ارساغها الامامية رباعية الاجزاء والاعرى
خماسيتها || يكثر وجودها في البراري على الازهار وفي
المواقع اللغلة والحرجية . يرقات معظم اجناسها دائمة
وبعضها خاشب يعيش تحت اللحاء على الشكير .

٩١١٥ - خُصْفِي
Nucifère (F). Nuciferous, Nut-bearing (E).

نعت تعريفي يطلق على ما كان شكله كالجوزة .

٩١١٦ - خُصُوف
Eclipse de lune (F). Eclipse (E).

خُصُوف القمر او انخساف القمر ظاهرة طبيعية تتميز
باحجاب ضوء القمر عن الارض وقد يكون ذلك عندما
تتوسط الارض بين الشمس والقمر .



خُصَّاف



خُشَّاف



خُشَّاف الغَسَق



خُشَّاف الليل

سرقها تعيش على اوراق الدبساسيات والحمليات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم. بسطتها تراوح من ٣٣ الى ٣٧ مم. رأسها صغير الجرم. عيناها كبيرتان. زباناها صولجانيان. مرشغها دقيق الجرم، معتدل الطول. جوشنها كستني اللون، جزوي الموج. بطنها كستني اللون، اصفر الاطواق || رواشها، عند الشقين، الى المغرة الصفراء الموج يملوها بتقيج احمر واصفر واشقق وصنابي تعترضه خطوط متعرجة كستنية || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في النهار. تعاظم بعد ظهورها بنحو ثمانية اسابيع وتمتج المكن مباحداً على نصال اوراق النبات العائل || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل، مبعر الهلب. ثوبها الى الحنطلي الاسمر يعلوه خطان جانبيين من التزاويق الصفر وخط ثيجي قاطب من الهلب المنشعب الشاقل. رأسها اسود. شرجها مجهز بزائدة سفلية الارتكاز || طور الاكمال يستمر نحو ثلاثة اسابيع.



خشاف المتوسط

Bois (F). Wood (E).

٩١٣٠ - خَشَب

الحشب مادة ليفية متماسكة صلبة متوازية الاتجاه الطولي مختلفة الرقعة والاندماج والكثافة. تتألف منها سوق واغصان النباتات العليا. وهو يتكون عادة من عدة طبقات مرصوفة متشابكة متتالية مركزها القلب حنارها الشكير فالحاء || والخشب يقسم، بالنسبة الى استعماله، الى ثلاثة اقسام: (١) اخشاب الترميم وهي التي تستعمل في بناء البيوت والسفن (٢) الاخشاب الصناعية وهي التي تستعمل في مختلف الصناعات من صناعة الورق الى النجارة (٣) اخشاب الوقود وهي التي تستعمل للحريق || ويقسم الحشب ايضا بالنسبة الى تركيبه الحكمي واستعماله الصناعي الى ست فئات: الاخشاب الصلبة والمتوسطة الصلابة واللينة والدقيقة والراتنجية والغريبة كما هو مبين في الجدول اللاحق.



خشاف شرقي

تصنيف الاخشاب بالنسبة الى ماهيتها واستعمالها

١ - الاخشاب الصلبة

النوع	الذلل النوعي	من	الى
بندق، جلوز	٠٧٢٩	٠٦٢٠	
جوز	٠٨٠٠	٠٧٥٩	
زان	٠٩٠٧	٠٦٨٦	
سنديان اخضر	١١٨٢	٠٩٠٣	
سنديان مبدول	١٠٢٠	٠٥٧٢	
سنديان مزند	٠٩٠٠	٠٦٣٣	
غرغار	٠٨٥٤	٠٦٠٣	
غرغار جبلي	٠٦٦٠	٠٦٠٩	
قندلي	٠٨٨٢	٠٥٣٦	
كستنه	٠٧٤٢	٠٥٥٠	
مران	١٠٠٢	٠٦٢٦	
ميس، نشم	٠٧٨٨	٠٦٠٥	

٢ - الاخشاب المتوسطة الصلابة

اسفندان، قيقب	٠٨٤٢	٠٥٦٣
او كالييتوس	٠٧٢٦	٠٥٧٧
هشية	٠٩٥٢	٠٧٦٤
توت	٠٧٧٢	٠٥٨٣
دلب	٠٧٨٢	٠٦٤٢
روبينية سنطية	٠٧٧٢	٠٦٦١



خشالة

ذنبه ٥٥ مم. ثوبه الى السمرة الحنطية؛ ظهره فاحم الموج، بطنه زاهر فاتح || موطنه العالم بآسره، يوجد في آسية واروپة وافريقية وامريكة واسترالية || يألف الكهوف والمغاور وسقوف البيوت الالهة والمهجورة يعيش منفرداً، الذكر لا يقرب الانثى ويتبعها الى مرقدها الا عند الكوم. مسرحة من الغسق الى الفجر. قوته الحشرات على اختلاف انواعها.

٩١٢٥ - خُشَافُ الْمُتَوَسِّط *

Vesperugo pipistrellus (S). Vespérugo pipistrelle, Pipistrelle (F). Pipistrelle, Small bat (E).

نوع من الخشاف سريع الطيران والحركة. طوله نحو ٧٠ مم. بسطته ١٨٠، ذنبه ٣٣. ثوبه الى الصهبه الدخناء، وقدة اذنه مدية الشكل || موطنه حوض وجزر البحر المتوسط وحوض البحر الاحمر والخليج الفارسي. يألف البيوت القديمة الالهة والمهجورة والحربة والاشجار الحرجية الدائمة العروة والكهوف والمغاور. يعيش جماعات قليلة العدد. مسرحة من الغروب الى فحمة الليل. قوته الذباب على اختلاف انواعه.

٩١٢٦ - خُشَافُ شَرْقِي *

Vesperugo abramus (S). Vespérugo oriental (F).

نوع من الخشاف يعتبر من القواطع له مشتاء في البلاد الحارة ومضيفه في المناطق المعتدلة. طوله نحو ٧٠ مم. بسطته ٢٠٠ وذنبه ٣٠، ثوبه الى السمرة الدخناء، ظواهره اعقب من خوافيه || يألف اغنية وسقوف البيوت القديمة من خربة ومهجورة ومأهولة التي يفضلها على الاشجار والكهوف. يعيش جماعات قليلة العدد تجتمع في مواعيد زواجها فتصبح اسراباً كبيرة مؤلفة من بعض المئات. مسرحة من الغروب الى الفجر. قوته الذباب والهام وجميع الحشرات الصغيرة.

٩١٢٧ - خُشَافُ لَيْزِلِرِه

Vesperugo leisleri (S). Vespérugo de Leisler (F).

نوع من الخشاف طوله نحو ٩٥ مم. بسطته ٢٨٠ ذنبه ٨٠. ثوبه حنطلي داكن اصفر الموج || موطنه يعم جميع البلاد الاسيوية والاروپية والافريقية المعتدلة الحارة || يألف الاشجار الحرجية العروة. يعيش جماعات قليلة العدد. مسرحة من الغروب الى فحمة الليل. قوته الحشرات التعمدية الاجنحة.

٩١٢٨ - خُشَافُ مُسَنِّج

Vesperugo külli (S). Vespérugo marginé (F).

نوع من الخشاف، طوله نحو ٨٠ مم. بسطته ٢٢٥، ذنبه ٣٨. ثوبه الى السمرة الدخناء. ظواهره اعقب من خوافيه، بطنه اصفر الموج، جناحه موشع الاطراف تمشيحه الى البياض الاصفر || موطنه يمتد من الشرق الاوسط حتى فرنسه، يكثر في البلاد التي تنأخم البحر المتوسط. يألف اغنية وسقوف البيوت المهجورة والآلهة. يعيش جماعات قليلة العدد. مسرحة من الغسق الى الفجر. قوته الحشرات والهام.

٩١٢٩ - خَشَالَة *

Melitaea aurinia (S).

Méltée aurinie, Damier des scabieuses (F).

Melitaea aurinia (E).

حشرة من فصيلة البشوريات ورقبة حرشفيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط والاقليم الداخلية المتاخمة. فراشتها جارية قوتها رحيق الازهار.

القد ، أوراقها عروية ، متقابلة ، مركبة ، وريقاتها بيضية شفعية . أزهارها زرق . ثمارها صغيرة القد جلدية القشرة . بزورها صفر ، غروية اللباب || أخشابها شديدة الصلابة لا تقنى . يستخرج منها مواد راتنجية شائعة الاستعمال (اطلب عود الانبياء) .

٩١٣٤ - خَشَبُ الْمِسْك هو الرقاق الموهج ، اطلبه .

٩١٣٥ - خَشَبُ الْمَوْس Bois de cuir (F).
هو الدرکه ، اطلبه .
Leather-wood (E).

٩١٣٦ - خَشَبُ فِرْنَامْبُوك Bois de Fernambouc (F).
هو العندم البرازيلي ، اطلبه .
Brasil-wood (E).

٩١٣٧ - خَشَبُ مُر Quassia (F). Bitter ash (E).
هو الكاسيه ، اطلبه .

٩١٣٨ - خَشَبُوز ، كَسِيلُوز ، زِيلُوز Xylose
مادة سكرية تستخرج من قش الخطة والذرة الصفراء وخشب الزان ونبات الطرفيل ، الخ ...

٩١٣٩ - خَشَبِين ، لِسْنِين Lignine, Lignone, Lignose (F). Lignin, Lignose (E).
هي المواد الكيماوية الطبيعية التي تغم النسيج النباتية الخشوية فتشبعها الصلابة وتعلملها القوة .

٩١٤٠ - خَشَخَاش Papaver (S).
Pavot (F). Poppy (E).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة الخشخاشيات . انواعه كثيرة العدد منها البرية والتزيينية والصناعية . تتميز بمصارتها اللبية المخدرة . سوقها مخشوشة ، أوراقها حاضنة ، متقابلة ، متواجبة . نصلها رهل النسيج ، كثيف العروق والشرابين ، سنائي الزام الاخير ، مفرض الحافة . ازهارها فردية مستطيلة الزناد . الزهرة كبيرة القد ، تويجها ثنائي الفصل القاعدية ، رباعي البتلات ، عديد الاسدية ، ضخم المبيض . ثمارها جراء تغلف البزور . الجرو الواحد يحضن من ١٥٠٠٠ الى ٣٠٠٠٠ بذرة صغيرة القد ، ككلوية الشكل ، حنطية او سمراء اللون || اشهر انواعه الزراعية ما يتبع .

٩١٤١ - خَشَخَاشْ أبيض * ، رُمان السعال Papaver somniferum album (S). Pavot blanc, P. officinal (F). White poppy, White opium poppy (E).
Weisser mohn, Weisse pavot (D). Papavero bianco (I).

ضرب من الخشخاش المنوم . يزرع للتزيين ولإستخراج الافيون . افيونه يحتل المرتبة الثانية وجراؤه الجافة طيبة تحوى بعض المورفين وغيره من الجواهر الفعالة || يستخرج من بزوره زيت حريف يستعمل في صناعة الصابون .

٩١٤٢ - خَشَخَاشْ أَعْمَى * ، خَشَخَاشْ مَنثور ، عَمَى الدَجَاج ، شَقَائِقْ حُمُر ، شَقَائِقْ النَعَمَان

Papaver rhoeas (S). Pavot coquelicot, P. des moissons, Coquelicot, Ponceau (F). Corn poppy, C. rose, Field poppy (E). Feldmohn, Gartenmohn, Klatschrose (D). Papavero rosolaccio, P. dei campi, Citole (I).
نوع من الخشخاش البري والزراعي التزييني . خسرويه عديدة برها مبدول ينبت في الحقول وبين الزروع وقد يصبح عند كثرته من الاعشاب الضارة الواجب ابادتها . اما زراعتها فمختلف الاشكال والاحجام يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم . الوانه عديدة منها الابيض والوردي والاحمر

شرم مبدول ٠,٧٥٩ ٠,٩٠٢
قيقب حميزي ٠,٥٧٢ ٠,٧٣٧

٣ - الاخشاب اللينة

بتولا ، سندر ٠,٦٠٠ ٠,٦٣٠
حور ٠,٣٦٠ ٠,٤٨٠
حور رجراج ٠,٤٠٠ ٠,٥٠٠
زيزفون ٠,٤٨٦ ٠,٥٢٥
صفصاف ٠,٣٨١ ٠,٦٩٠
مفت ٠,٥١٠ ٠,٦٥٠

٤ - الاخشاب الدقيقة

اجاص ، كثري ٠,٧٠٧ ٠,٨٣٩
بقس ، شمشاد ٠,٩٠٧ ١,١٦٢
تفاح ، سيلب ٠,٨٠٩ ٠,٨٦٥
خوخ ٠,٧٨٠ ٠,٨٨٦
زيتون ٠,٧٦٠ ٠,٨٥٨
صربة الحابلين ٠,٦٨٨ ٠,٧٣٤
صربة مبدولة ٠,٨١٣ ٠,٩٣٩
غيراء برية ٠,٧٣٤ ٠,٩٣٨
قزنوس ٠,٦٢٠ ٠,٨٤٠
كرز بري ومحلب ٠,٥٨٠ ٠,٧٨٥
مشمش ٠,٧٨٦ ٠,٨٩٤
تبق ٠,٧١٠ ٠,٨٢٦

٥ - الاخشاب الراتنجية

ايبسه ٠,٣٣٧ ٠,٥٧٩
ارز لبنان ٠,٤٥٠ ٠,٦٤٦
تنوب ٠,٣٨٠ ٠,٦٤٩
زرنب ، طقسوس ٠,٤٧٠ ٠,٨٩٦
شربين ٠,٦١٦ ٠,٦٤٦
صنوبر اسود ٠,٥١٤ ٠,٨٩١
صنوبر بحري ٠,٥٢٤ ٠,٧٦٩
صنوبر بري (برز) ٠,٤٠٥ ٠,٨٢٨
صنوبر حليبي ٠,٥٣٢ ٠,٨٦٦
صنوبر يموت ٠,٣٢٠ ٠,٤٨٧
لزاب ، عرعر ٠,٥٥٠ ٠,٧٩٠
ملز ، لاريس ٠,٤٤٨ ٠,٦٦٨

٦ - الاخشاب الغريبة

ابنوس ١,١٩٠ ١,٢٣٠
بلاذر ١,٠٦٥ ١,١٠٥
بليستدر ١,١٥٠ ١,١٩٠
خشب الورد ١,٠١٠ ١,٠٥٠
ساج ١,٠٨٥ ١,١٢٥
عود الانبياء ١,٣٠٥ ١,٣٤٥

٩١٣١ - خَشَبُ أَخْضَر Bois satin (F).
هو الخطبان ، اطلبه .
Satin-wood (E).

٩١٣٢ - خَشَبُ أَصْفَر Virgillier tinctorial (F).
هو الخطر الصباغي ، اطلبه .
American yellow-wood (E).

٩١٣٣ - خَشَبُ الْقَدِيسِن * ، غَبَاك Guaiacum sanctum (S). Gaïac, Gayac, Bois saint (F).
Lignum-vitae, Holy-wood tree (E). Heiliges holz (D).
Legno santo, Guaïaco (I).
نوع من عود الانبياء وفصيلة الفرقديات . اشجاره صغيرة



خشب القديسين



خشخاش ابيض



خشخاش اعمرى

٩١٥٠ - خَشَخَاشِ كَلِيفُورْنِيَّة *

Papaver californicum, Eschscholtzia californica (S). Pavot de Californie, Eschscholtzie de Californie, Globe du soleil (F). Californian poppy (E). Californische escholtzie, Goldmohn (D). Papavero di California, Escolzia di California (I).

نوع من الخشخاش الطبي التريبي. مهدد كليفورنيه. جذوره غليظة يستخرج منها عصارة ذهبية اللون لها استعمالها الطبي. ساقه فرعاء تعلو نحو ٦٠ سم. أوراقه متعاقبة مستطيلة مفرصة النصل. أزهاره جميلة الشكل قطرها نحو ٥ سم. بتلاتها صفر القاعدة، حمر الاطراف. تتأثر بالعوامل الجوية، تنبلج وتفتح مع الرطوبة. تنقل وتنطبق مع الجفاف || وهذا النبات يجذوره وسوقه وأوراقه وأزهاره يحوي ما لا يستهان به من مادة المورفين.

٩١٥١ - خَشَخَاشِ مُقَرَّن

Glauc à fleurs jaunes (F). هي الماميثا الصفراء، اطلبها.

٩١٥٢ - خَشَخَاشِ مُنَوِّم *، خَشَخَاشِ أَجْمَر، خَشَخَاشِ أَسْوَد، أَسْرُ النَوِّم

Papaver somniferum (S). Pavot somnifère, P. des jardins, Cillette (F). Poppy, Opium poppy (E). Schlafmohn, Opium-mohn (D). Papavero somnifero, Gran papavero, P. da oppio (I).

نوع من الخشخاش الزراعي الحولي. ضروبه عديدة أشهرها الأبيض. جذوره ودية. سوقه منتصبه تعلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. أوراقه حاضنة متعاقبة. نصلها متلوج الصفحة، مسنن الحافة. أزهاره كبيرة القند. ألوانها تختلف مع الضروب فيها الأبيض والاحمر والاصفر. يوجد في جميع الأتربة المتوسطة الاندماج الموزونة التركيب الغنية بالمواد المضوية وبمناصر الأزوت والحامض الفسفوري واليوتاس والكلس || يستخرج من جرائه الأفيون على الشكل التالي: عند سقوط التويجات الزهرية، تجرح الجراء يومياً لاستنزاف عصارتها التي تلتقط وتعرض للشمس حتى تمام جفافها واستمرار لونها فتفقد اذ ذاك نحو ٤٠٪ من وزنها الاصلي || اما الأفيون فيحوي من ٥ الى ٢٢٪ من المورفين ومن ٢ الى ١٢٪ من المواد شبه القلوية. (راجع أفيون) || انتاج الدم يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام أفيون. ومن ١٢٠ الى ٢٠٠ كيلو بزر متوسط مقدوره الزيتي نحو ٤٠٪.

٩١٥٣ - خَشَخَاشِيَّات

Papaveraceae (S).

Papaveracées (F). Papaveraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القعالات تشمل بعض الاجناس والعديد من الأنواع. جميعها نباتات عشبية حولية ومجولة ومعمرة. أوراقها مختلفة الاشكال والتفرير والانتظام. أزهارها طرفية مجتمعة او منفردة، رباعية البتلات، عديدة الاسدية. ثمارها جراء. بزورها دقيقة. عصارة معظم نباتاتها لبنة طيبة ومخدرة || أشهر اجناسها الخشخاش.

٩١٥٤ - خَشَخَاشِيَّة

Argémone (F). Devil's fig (E).

هي الارغون نبات طبي وتريبي، اطلبه.

Papavérine (F).

Papaverin (E).

المصدر للفعال الموجود في الخشخاش وهو شبه قلوي من الأفيون.

والقرمزي الاسود القاعدة والمنقط بالاسود والاصفر. ازهاره يستمر من ايار الى تموز.

٩١٤٣ - خَشَخَاشِ إفْرِيقِي

Papaver rupifragum (S). Pavot casse-pierres (F).

نوع من الخشخاش المعمر التريبي. ضروبه اربعة تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم. سوقها قوية منتصبه. أوراقها الى الحصار الزاهي. أزهارها فردية او ثلاثية التجميع، كبيرة القند، قطرها يراوح من ١٢ الى ١٥ سم. بتلاتها وردية او أرجوانية او قرمزية اللون. جراؤها خلية البشرة. سماتها من ٦ الى ٨ || ازهاره قصير الامد يستمر شهراً واحداً.

٩١٤٤ - خَشَخَاشِ الْعَجَم

Papaver persicum (S). Pavot de Perse (F).

نوع من الخشخاش الحولي التريبي. يعلو نحو ٥٠ سم. أوراقه مخرمة الخافة، اهليلجية النصل، بحرية اللون. أزهاره الى الجؤوة، تعلو قاعدة بتلاتها مشحة خضراء عابقة تخف مع انتشارها || ازهاره قصير الامد يستمر شهراً واحداً.

٩١٤٥ - خَشَخَاشِ زَغْبَر

Papaver pilosum (S). Pavot velu (F).

نوع من الخشخاش المعمر التريبي. يعلو من ٨٠ الى ١٠٠ سم. ساقه قوية، منتصبه، زباء، مورقة. أوراقه مخرمة النصل، زاهية الحصار. أزهاره عذقية التجميع متوسطة القند متعددة الالوان فيها الأبيض والارجواني والمرقش. جراؤه مزغبة البشرة، سماتها من ٦ الى ٧. ازهاره يستمر طوال الصيف.

٩١٤٦ - خَشَخَاشِ شَائِك

Papaver aculeatum (S). Pavot épineux (F).

نوع من الخشخاش الحولي التريبي. يعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقه منتصبه شائكة. أوراقه كبيرة مستطيلة مفرصة، نصلها هليبي البشرة. أزهاره فردية صغيرة القند. قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الاحمر المختلف الموج. جراؤه بيضية الشكل، صغار القند، ملس البشرة. ازهاره ربيبي.

٩١٤٧ - خَشَخَاشِ شَرْقِي

Papaver orientale (S). Pavot d'Orient, P. de tournefort (F).

نوع من الخشخاش المعمر التريبي. ضروبه عديدة تعلو من ٨٠ الى ١٣٠ سم. سوقها قوية، منتصبه، زباء. أوراقها مستطيلة خلية النصل المشرم. أزهارها فردية كبيرة القند، قطرها نحو ١٥ سم. ألوانها متعددة. ازهاره ربيبي وصيني وخريبي.

٩١٤٨ - خَشَخَاشِ عَيْنِ الطَّائُوس

Papaver pavoninum (S). Pavot œil de paon (F).

نوع من الخشخاش الحولي التريبي. يعلو نحو ٣٠ سم. أوراقه ريشية مخرمة. أزهاره أرجوانية تعلوها دوائر سود طوقية عويونية. جراؤه بيضية، صغيرة، هليبي البشرة. سماتها من ٤ الى ٧ || ازهاره يستمر طوال الصيف.


٩١٤٩ - خَشَخَاشِ فِلِيقِي

Glaucienne (F).

هي الماميثا الحمراء، اطلبها.



خشخاش كليفورنيه



خشخاش منوم

٩١٦٧ - خُشَيْلَاء سَهْمِيَّة النَّصَل °

Xanthosoma sagittaeifolium (S).

Xanthosome à feuilles sagittées (F).

نوع من الخشيلاء . منبتها الاقاليم الاستوائية . تعلق من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق الخضراء ، كبيرة النصال التي تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . سهمية الشكل ، ذرية الفلق الجانبية . ضبتها اقصر من شرعافها الذي يطول من ١٦ الى ١٨ سم . وهو الى الخضار الاطحل الموج .

٩١٦٨ - خَشَيْلَة

Myosurus (S).

Myosure (F). Mouse-tail (E).

جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية من الشقاريات وفصيلة الشقيقيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها المناطق الباردة وجبال البلاد المعتدلة الحرارة || سوقها قصيرة . اوراقها جذرية ، خطية ، مستطيلة النصال الجمادة . ازهارها صغيرة ، فردية ، صفراء اللون ، خضراء الموج ، خاسية الفصل والبثلاث . فصلها مهازية القواعد . بثلاثها ذات محالب ، وقواعدها مجهزة بمسام انبوبية الشكل منفرية يجرسها النحل || تنويرها ربيمي . اعرف انواعها الخشيلة القرمة المشهورة باسم ذنب الفار .

٩١٦٩ - خُصَّ

Magnanerie (F).

Silkworm nursery (E).

سقيفة من قصب مرصوفة الجدران هردية السقف تشاد لتربية دود القز .

٩١٧٠ - خُصَّ

Compéter (F).

To be within the competence (E).

تعبير حقوقي يراد به الادخال في الاختصاص اي الصلاحية .

٩١٧١ - خِصَاء ، مَتْن

Castration (F).

Castration, Gelding (E).

القضاء على الغدد التناسلية في الذكر او الانثى من الحيوان .

٩١٧٢ - خِصَاء القِرَاح ، قَطُّش

Chaponnage (F).

Caponizing (E).

عملية سل الحسيتين تم بشق خاصرة الديك اليسرى قرب رأس الفخذ حيث توجد الحسية اليسرى وخلفها اليمى . الفراخ المخصية تدعى مقاطيش واحدها مقطوش .

٩١٧٣ - خُصَاصَة

ما يبقى في الكرم بعد قطافه ج خصاص .

٩١٧٤ - خُصْب ، إِمْرَاع

Fertilité (F). Fertility (E).

قابلية التربة للمحاصيل المنتظمة الجيدة الاتاة .

٩١٧٥ - خُصَر

le Froid (F). the Cold (E).

انحصر البرد الصناعي في جميع استخداماته وطرق استعماله .

٩١٧٦ - خُصَلِيَّات الخيَاشِيم

Lophobranches (F).

رتبة من الاسماك العظمية غير المأكولة . فصائلها ثلاث واجناسها ١٦ . سفنها غليظ مصفح . اخطامها انبوبية خالية من الاسنان . خياشيمها خصلية التركيب والشكل يجننها تجويف وقبي ضيق الفوهة .

٩١٥٦ - خَشْرَم

Frelons (F). Hornets (E).

الخشرم : جماعة الزناير . قال الاصمعي لا واحد له من لفظه .

٩١٥٧ - خَشَش

Gazelle (petite) (F).

Gazelle (young) (E).

الخشش هو الغزال الصغير القد .

٩١٥٨ - خَشَف ، خَشَيْف

Grésil (F). Sleet (E).

حبات من الجليد الابيض سهلة الفث تسقط مع الثلج مختلفة الاشكال قطرها من ٣ الى ٥ مم .

٩١٥٩ - خُشْف ، خَشْف ، خِشْف

Faon (F).

Fawn (E).

ولد الظبي اول مشيه وقيل هو طلا ثم خشف ثم رشا .

٩١٦٠ - خُشْفَة خَضْرَاء *

Lucilia caesar (S).

Lucilie verte, Mouche verte de la viande (F).

هي ذبابة اللحم الخضراء . طولها نحو ١٠ مم . ثوبها الى الخضار المذهب . تكثر في الصيف . يرقاتها تعيش على اللحم والجيف .

٩١٦١ - خُشْقَاء

Yack (F). Yak (E).

جنس ابقار وحشية تعرف بالقطاس موطنها بلاد التبت . راجع قطاس .

٩١٦٢ - خُشَل

Elimination

الخشل والتخشل : ابعاد او منع تكاثر الهاليج النباتية التي لا تنى بالغاية المطلوبة .

٩١٦٣ - خُشَل

Coquille d'œuf (F).

Shell (empty egg) (E).

الخشل : البيضة اذا اخرج ما في جوفها .

٩١٦٤ - خُشْنَاء ، خُشَيْنَة

Lavatera (F).

Tree mallow (E).

هي الخبازى النوار ، اطلبه .

٩١٦٥ - خُشَيْلَاء °

Xanthosoma (S).

Xanthosome (F). Xanthosoma (E).

جنس نباتات عشبية معمرة حلبوية العصارة من فصيلة القلقاسيات . مهدا بعض الاقاليم الاستوائية الاسيوية والافريقية || انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها قريبة الشبه بأذان الفيل . سوقها عسقلية . اوراقها قرصية التجميع ، مستطيلة المعاليق ، كبيرة النصال ، رجمية الشكل ، تكسوها مادة طيسلية غبراء اللون || تزرع للتزيين ضمن البيوت وفي المواقع التي لا تحشى البرد . ترغب في الاثربة المناسبة التركيب العنصري ، الوافرة المواد العضوية والازوت .


اعرف انواعها واشهرها التالية :

٩١٦٦ - خُشَيْلَاء بِنْفَسَجِيَّة *

Xanthosoma violaceum (S).

Xanthosome violacé (F).

نوع من الخشيلاء . تعلق من ٦٠ الى ٨٠ سم . اوراقها مستطيلة المعاليق البنية اللون ، البنفسجية الموج . نصالها كبيرة القد تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . فلقها الجانبية مستديرة الزوايا . شرعافها يطول نحو ٢٥ سم . زنادها بنفسي اللون ، نصله الى الصفار الكبيرتي يعلوه موج تبني .



خشفة خضراء




خشيلاء بنفسجية

يألف المواعظ الرطبة حيث تكثر الحشرات . يدرأ فحوصه في التراب بين الصخور الشائخة الشارفة . ولكنه يضم من الافحوص الواحد الى نحو ٣٠ تجتمع فيه الاناث للبيض والترحيم || اعرف انواعه واشهرها الخضار المبذول والخضار القرمزي .

٩١٨٨ - خُضَار قِرْمِزِي * ، وَرَوَار قِرْمِزِي ، وَرَوَّر قِرْمِزِي

Merops nubicus (S). Guêpier écarlate, G. superbe (F). Blue cheeked bee eater (E).

نوع من الخضار موطنه غابات وأدغال افريقية الغربية . طوله نحو ٢٠ سم . ظهره احمر مدمى . بطنه وردي . رأسه ونحوه الى الخضرة الزرقاء . عينه حمراء مكحلة الحاجب الازج الممتد من فتحة المنقار الى اسفل القفن . اياهه سود . افنيكه اخضر اللون ، ازرق الموج . زمكه اخضر اطحل || سربه يعد من ٦٠ الى ١٠٠ . اناته تبيض وتخصن من ٤ الى ٥ بيضات . وكها يحوى من ٥ الى ٣٠ افحوصاً .



خفيف باربانوم

٩١٨٩ - خُضَار مَبْدُول * ، وَرَوَار مَبْدُول ، وَرَوَّر مَبْدُول

Merops aplaster (S). Guêpier commun, G. vulgaire (F). Common bee eater (E).

نوع من الخضار طوله نحو ٢٦ سم . ثوبه اسمر كستنائي يعلوه موج اخضر . جهته الى البياض الاخضر . عينه حمراء . منقاره اسود . نحوه الى الصفار المذهب يحرق به اطار اسود . صدره وبطنه الى الازرق الاخضر . جناحه اصهب الوسط عابقه ، زيتوني الاطراف والاذنب . موطنه فسيح الاربعاء ، يحوب البلاد من الهند الى اربعة وافريقية الشمالية || اناته تبيض في حزيران من ٤ الى ٥ بيضات تخصنها وحدها نحو ثلاثة اسابيع || سربه متوسط العدد ، يعد من ٢٠ الى ٦٠ || يعتبر من الطيور المؤذية لانه يلتهم النحل بشراهة .



خضار قرمزي

٩١٩٠ - خُضَارِي هو البط الوحشي ، اطلبه .

٩١٩١ - خُضَارِيَّات Meropidae (S). Méropidés (F). Meropidae (E).

فصيلة طير من الجواثم ملتصقات الاصابع ورقة ضوئيات الشكل . انواعها المعروفة ٢٥ اعطانها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم القديم واسترالية || معظم انواعها آبد وبعضها ضارب وقاطع . ملجئها الحياتي جماعي . اسراها متفاوتة العدد . قوتها الحشرات المختلفة الانواع اخصها الخشرم والنحل || اجسامها رشيقة ، متباينة القد ، تطول من ١٦ الى ٣٠ سم . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها مكحلة . مناقبها مستطيلة ، ذرية . اجنحتها مستطيلة ، ذلقة . اذنانها طويلة تتوسطها رفلتان كبيرتان ناشرتان . تتميز باصابعها الثالثة والرابعة الملتصقة بحظاب يمتد حتى الزام الثالث . اثوابها جميلة متراكبة الالوان الزاهية البراقة . اشهر اجناسها الخضار .

٩١٩٢ - خُضَاض Collier (F). Collar (E).

الخضاض حزام من جلد او نحوه يطوق عنق الكلب او السنور .

٩١٩٣ - خُصَالَة Psychrométrie (F). Psychrometry (E).

قياس رطوبة الهواء .

٩١٧٧ - خَصْم ، قَطْع Escompte (F). Discount (E). هو ما يستفيدة من عليه دين آجل اذا دفعه قبل حلول اجله .

٩١٧٨ - خُصَي الثَعْلَب ، خُصَي الكَلْب

هو السحلب ، اطلبه . Orchis (F).

٩١٧٩ - خَصِي Châtré, Châtron, Chapon (F).

Emasculate, Castrated, Capon (E). هو الذي سلت خصيتاه .

٩١٨٠ - خُصَيَان الجَمَل Moricandie (F).

Moricandia (E). هو الحم ، اطلبه .

٩١٨١ - خُصِيَة Testicule (F). Testicle (E).

الغدة التناسلية في الذكر وهما خصيتان يحويهما الصفن وتفرزان النطفة والمني والوداف عند الرجل . والشلخ عند الحيوان عامه . والصلوك عند الدواب والذنين عند الحشرات والكراض عند الطير والزكية عند الحشرات والرول عند السمك .

٩١٨٢ - خَصِيف ٥ ، بِلِسِيوم Pythium

جنس فطور مجهرية من عمارة الخسيفيات وفصيلة الصنانيات . انواعه عديدة اكثرها لا مؤذية وبعضها قليل الاذى . اشهرها خفيف باربانوم .

٩١٨٣ - خَصِيف بَارِبَانُوم ٥ ، دُوبَان Pythium de Baryanum (S). Fonte des semis (F).

Damping off and stem rot (E). Wurzelbrand (D). فطر من الخفيف يركب نواحي النبات فيؤذيها . مظهره الخارجي عفونة غبراء اللون ، شفاقة المشيج ، تقش الاجزاء النامية فتعطلها || من النباتات الزراعية التي يؤذيها : الذرة والدخن والفلفل وقد يقضي على مشاتل الشوندر والتبغ اذا اصابها عند كوثها || يكافح باستعمال المساحيق النحاسية الكبريتية .

٩١٨٤ - خَصِيفِيَّات Pythiées (F).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الصنانيات . تتميز بوجود القسم الاكبر من مشيجها خارج دعامة . ومشيجه يستطيع اجتياز الخلايا وهو عديم المرافش . تكاثرها بوغي ويضي || انواعها عديدة منها رمية تعيش على المواد العضوية المنحلة وسها طفيلية تعيش على النباتات العليا دون ان تلحق بها شديد الاذى .

٩١٨٥ - خَصِيْن Hachette (F). Hachet (E).

الفأس الصغيرة ، ج خصن .

٩١٨٦ - خِضَاب ، شِقَاح Pigment

كل مادة صبغية عضوية تلون النسيج .

٩١٨٧ - خُضَار ، وَرَوَار ، وَرَوَّر Merops (S). Guêpier (F). Bee eater (E).

جنس طير من الخضاريات يحوب البلاد في طلب الرزق . انواعه قليلة تتميز برشاقة اجسامها وزهاء الوانها ، باستطالة مناقيرها المقوسة الدقيقة الملاقط ، بارساغها القصيرة ، واجنحتها المستطيلة الذلقة وباذنابها الطويلة المقطومة التي تملؤها وتخرج منها ريشتان فارقتان || حياته جماعية يعيش اسراباً كبيرة يراوح عدد افرادها من ٢٠ الى ١٠٠ . قوته الحشرات على اختلاف انواعها اخصها الخشرم .



خضار مبذول

٩١٩٤ - خَضَامَة ٥

Thalassographie, Océanographie (F).
Thalassography, Oceanography (E).

علم يبحث في عظم البحار ونبوتها .

٩١٩٥ - خَضَب ، خَضِيْب (F).
Chlorophyll (E).
هي المادة الخضراء في النبات .

٩١٩٦ - خَضَد (F).
Flétrissement (F).
Fading, Withering (E).

هو التوهن والضعف في النبات وهو ضمور الثمار والزواوؤها .

٩١٩٧ - خَضْرَة (F).
Légume (F). Vegetable (E).
جماع النباتات الخضرية من احرار البقول وغيرها التي تصلح بكاملها او بجزء منها لغذاء الانسان .

٩١٩٨ - خَضْرَم (F).
ولد الضب اوله حسل ثم مطبخ ثم خضرم ثم غيداق ثم ضب .

٩١٩٩ - خَضْرَم (F).
Saumâtre (F). Brackish (E).
هو الماء الاجاج بين الحلو والمر .

٩٢٠٠ - خَضْرِي (F).
هو البط الوحشي ، اطلب .

٩٢٠١ - خَضْرِيَج (F).
Culture de pastèque (F).
الخضريج : المبطخة أي المكان الذي كثر فيه زراعة البطيخ .

٩٢٠٢ - خَضْعَة (F).
النخلة التي قنبت من النواة . ج خضع .

٩٢٠٣ - خَضَل ، خَضَل ، أَخَضَل (F).
Humecter (F). To humectate (E).
خضل وخضّل وأخضل الشيء : ندهاه حتى ابتل .

٩٢٠٤ - خَضَلَف (F).
Balsamea myrrha (S).
Balsamée, Myrrhe d'Afrique (F). African myrrh tree (E). Afrikanischer myrrhen baum (D). Albero del mirra d'Africa (I).

نوع من المقل وهو جنبة برية من فصيلة البخوريات . اعطائه البلاد الحارة . يكثر في السنغال والهند ومدغشقر وعلى شواطئ البحر الاحمر || يستخرج منه نوع من المر لا يقل جودة عن مر المقل والقطف والتفيل .

٩٢٠٥ - خَضَلَة (F).
Perle fine (F). Real pearl (E).
الخضلة هي الدرة الصافية . ج خضل وخضل . قالت امرأة للحجاج « تزوجني هذا على أن يعطيني خضلاً نبيداً » أي لؤلؤاً صافياً كثيراً .

٩٢٠٦ - خَضِين ٥ (F).
Eburné (F). Eburnean (E).
نعت تعريفى يطلق على ما هو ناتج عن التخضين او ما هو شديد الشبه بالعاج .

٩٢٠٧ - خَضُور (F).
Verdet (F).
وصم عاظم شديد الوقع يصيب مطر الذره سببه فطر مجهرى يدعى فحمة الذره .

٩٢٠٨ - خَضِيْب (F).
Chlorophyll (F). Chlorophyll (E).
الخضيب والخضب هي المادة الخضراء في النبات .

٩٢٠٩ - خَضِيْبِد الشجر الذي قطع شوكه .

٩٢١٠ - خَضِير ، مَخْضَرَة ، يَخْضُور (F).
Gazon (F). Grass (S).
العشب الاخضر الصغير الكثيف يغطي التربة . وهو ايضاً الارض الكثيفة العشب الاخضر المعمر .

٩٢١١ - خَضِير * ، خَضِيرِي (F).
Chloris chloris, Fringilla chloris, Ligurinus chloris (S). Verdier, V. ordinaire (F). Greenfinch (E). Grünfink (D).

طائر من العصافير من فصيلة الشرشوريات ورتبة الجواثم المحروطيات المناقير . موطنه آسيا الوسطى والشرق الادنى وبعض الاقطار الأوروبية || طوله نحو ١٥ سم . ثوبه الصيبي ازهى من الشتوي . منقاره غليظ ، قصير . رأسه وكامل القسم الاعلى من جسمه الى الخضار الزيتوني . زوره وبطنه الى الخضار الاصفر . جناحه الى الريدة . قوادمه صفر . اباهره سود . ذنبه اصفر واسود || يألف الغابات الرطبة والجنانث وضفاف الانهر . قوته الحبوب والبرور . يرغب في القنبر وبزر الكتان والسلمج وبرور العنب . يدن عشه في الاشجار والجنبات الظليلة . اناته تبيض من مرتين الى ثلاث مرات بالسة ، الاولى في اواسط نيسان والثانية في حزيران والثالثة في آب . تضع في كل مرة من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها وحدها نحو الاسبوعين .

٩٢١٢ - خَضِيرَة * (F).
Bunias orientalis (S). Bunlade, Bunier, Roquette turque (F). Hill mustard, Turkish rocket (E). Hohe zackenschote (D). Bunia orientale (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الصليبيات . ساقه واوراقه زباء البشرة . يكثر في الحقول والمروج . ترغب فيه الماشية ، ترعاه وتختلفه .

٩٢١٣ - خَضِيرَة (F).
Lotier de Palestine (F).
اطلب لوطس فلسطيني

٩٢١٤ - خَضِيرَة صوت الخيل من بطونها .

٩٢١٥ - خَضِيلَة (F).
Jardinet (F). Small garden (E).
البستان الصغير خصص للبقول والزهور .

٩٢١٦ - خَضِيمَة * (F).
Streptocarpus (S).
Streptocarpe (F).


جنس نباتات عديمة الساق برية وتزيينية من فصيلة الجسنيريات . مهدها افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها في معظم البلاد الحارة || انواعها المعروفة سبعة . سوقها مقرة . اوراقها فريشة ، قرصية الانتشاب ، معنقة ، كبيرة النصل المتعرج اللامتساوي الانقسام ، الجميل الخضار ، الفستقي الموج . شماريحها الزهرية عديدة وكل شمراخ يحمل من زهرة الى زهرتين . ازهارها بحيلة ، بوقية ، خماسية البتلات ، عديدة الالوان فيها الابيض والاصفر والبرتقالي والارجواني . ثمارها لولبية الشكل || زراعتها لا تستوجب عناية خاصة لكنها تخشى البرد .

٩٢١٧ - خَضِين ٥ (F).
Eburine (F). Eburnean (E).


الخضين مادة صلبة مركبة من مسحوق النظام والعاج يصار الى مزجها وتحثيرها وتجفيفها في أفران خاصة .




خضير



خضيرة



خضيمة



خطاف الشط



خطاف الشواقي



خطاف المتوسط

٩٢٣٨ - خطاف ، تقصير Faute (F). Fault (E).
هو في القانون المدني عدم تنفيذ التزام ما وذلك أما بالعجز او بالامتناع عمداً او سهواً .

٩٢٣٩ - خطاف ، سنونو ، عصفور الجنة ، زوار الهند Hirundo (S).
Hirondelle (F). Swallow (E).

جنس طير من القواطع وفصيلة الخطافيات . انواعه المعروفة نحو ٨٠ موطنها العالم تتميز بمنقارها الصغير القصير المستقيم . اجنحتها مستطيلة ذلقة . اذناها فرقة واسعة البين . ارساغها نحيلة . اصابعها لامتناهية الطول ، تفارحها عارية ضيقة || قيل في وصفها :
« كن زاهداً فيها حوته يد الوري
تفسي الى كل الانسام حبيباً »
« او ما ترى الخطاف حرم زادهم
اضحى مقيماً في البيوت ربيسا »
اشهر انواعه ما يتبع .

٩٢٤٠ - خطاف البحر Sterne (F). Tern (E).
هو الخرشنة ، طائر مائي ، اطلبها .

٩٢٤١ - خطاف الشط* ، سنونو الشط ، خطاف الجرووف

Hirundo riparia, Cotyle riparia (S). Hirondelle de rivage, Cotyle (F). Sand martin (E).
نوع من الخطاف صغير القد طوله نحو ١٢ سم . بسطته ١٨ سم . رأسه وظهره الى الصهبة السمر . زوره وصدره وبطنه وزبكه الى البياض الاخير . عيناه ومنقاره سود || يألف الشطوط وضفاف الانهر . يدن عشه في الفصوص يدبره بين شقوق الحيطان والصخور . انثاه تضع ٤ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٢ يوماً بينا الذكور تؤمن لها الغذاء . يعيش اسراباً كبيرة يراوح عددها من ٦٠ الى ١٦٠ .

٩٢٤٢ - خطاف الشواقي* ، سنونو الجبال

Hirundo montana, Cotyle rupestris (S). Hirondelle de montagne, H. des rochers (F). Crag martin (E).
نوع من الخطاف المتوسط القد ، المستطيل الذنب . طوله نحو ١٥ سم . ثوبه اسمر الظاهر ابيض الباطن . جناحه اسود الريش . ذنبه اسمر اسود تعلوه رقشة بيضية الشكل تبنيه اللون || يألف الجبال العالية . يبني عشه بالتراب المزج مع الترس في الكهوف وبين شقوق الصخور . انثاه تضع من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها نحو ١٢ يوماً .

٩٢٤٣ - خطاف الماء ، جراد الماء

Exocaetus (S). Exocet, Poisson volant (F). Flying-fish (E).
جنس اسماك بحرية من الملساوات وفصيلة الاسقمريات انواعه نحو ٥٠ منتشرة في جميع البحار الحارة . زعانفها الصدرية كبيرة القد شكلها شكل الجناح تمكنها من التحليق فوق الماء وتعاضدها عليه نحو الدقيقة || اشهر انواعه خطاف المتوسط .

٩٢٤٤ - خطاف المتوسط*

Exocaetus volitans (S). Hirondelle de mer (F). Exocaetus volitans (E).
سمكة بحرية من خطاف الماء يكثر وجودها في المتوسط . طولها نحو ٤٥ سم . ظهرها اطمن اللون ، اذرق المواجه . بطنها فضي . تعيش جماعات متوسطة العدد .

٩٢١٨ - خطاف Ligne (F). Line (E).
الخط في الهندسة هو ما يصل بين نقطتين وهو لا عرض له وقد يكون على انواع . المستقيم والمنحني والمنكسر .

٩٢١٩ - خطاف الاستواء Equateur (F). Equator (E).
خط وهمي يرمز له بدرجة صفر طوله نحو ٤٠٠٧٦ كم . يمتد حول الكرة الارضية فيشطرها الى شطرين متساويين شمالي وجنوبي طول الواحد منهما نحو عشرة الاف كم .

٩٢٢٠ - خطاف الاعتدال Ligne équinoxiale (F).
Equinoctial line (E).
هو الخط الوهمي القائم بين خطي مدار الشمس والاستواء .

٩٢٢١ - خطاف الطول Ligne méridienne (F).
Meridian line (E).

٩٢٢٢ - خطاف القوة Ligne de force (F).

٩٢٢٣ - خطاف المقدوف Ligne de tir (F).
Shooting line (E).

٩٢٢٤ - خطاف المييطان Ligne de départ (F).
Start line (E).

٩٢٢٥ - خطاف النفلر ، خطاف الافق Ligne d'horizon (F). Vanishing line (E).

٩٢٢٦ - خطاف بياني ، مخطط Graphique (F).
Graphic (E).

٩٢٢٧ - خطاف تساوي البرد Ligne isochimène (F).
Isochimene line (E).

٩٢٢٨ - خطاف تساوي التصوب Isocline (F).
Isoclinal line (E).

٩٢٢٩ - خطاف تساوي الضغط Ligne isobare (F).
Isobaric line (E).

٩٢٣٠ - خطاف تساوي المطر Ligne isohyète (F).
Isohyet line (E).

٩٢٣١ - خطاف جانبي Ligne latérale (F).
Lateral line (E).

هو في علم الاسماك الخط الفاصل بين القسم العلوي والسفلي من جانبي السمكة .

٩٢٣٢ - خطاف شلجيمي ، خطاف عديسي ، قطع مكافئ Parabole (F). Parabola (E).

٩٢٣٣ - خطاف مستدير Ligne courbe (F).
Graphic curve (E).

٩٢٣٤ - خطاف مستقيم Ligne droite (F).
Straight line (E).

٩٢٣٥ - خطاف مقارب Asymptote

٩٢٣٦ - خطاف منكسر Ligne brisée (F).
Broken line (E).

٩٢٣٧ - خطاف هذلولي Hyperbola (E).

٩٢٥١ - خِطْر - Cladrastis, Virgilia (S).

Cladraste, Virgilier (F). Yellow-wood (E).
جنس اشجار حرجية طبية وزراعية تزيينية من فصيلة القرنبيات . اوراقها عابطة ، مركبة ، وريقاتها بيضيه سنانية مدببة الزام الاخير . ثمارها قرنية . بزورها مأكولة . اخشابها صلبة ، قصيفة ، لونها الى الصفرة ، تستعمل في الصناعات الدقيقة || انواعه قليلة ، اعرفها الخطر الصباغي والصيني .

٩٢٥٢ - خِطْر صِبَاغِي * ، خَشَب أَصْفَر

Cladrastis lutea, Cl. tinctoria, Virgilia lutea (S).
Cladraste tinctorial, Virgilier tinctorial, V. à bois jaune, Bois jaune (F). American yellow-wood (E).
Echter gelbholzbaum (D). Legno giallo (I).

شجرة حرجية طبية وصناعية . منبتها الاصقاع الامريكية . تعلق من ١٢ الى ٢٠ م . اوراقها مركبة ، كبيرة القد ، تطول نحو ٣٥ سم . وريقاتها وريية ، بيضيه ، مدببة ، طوطا يراوح من ٦ الى ١٥ سم . نصلها مالمس البشرة ، ازغب الضلع والعروق . ازهارها عنقودي متبدل . ازهارها صفر . ثمارها قرنية . بزورها مأكولة . جذورها طبية تنفع المعدة والامعاء وتقضي على الزحار . اوراقها صباغية ، خضابها نيل . اخشابها صفر ، فاخرة الصنف ، تستعمل في الصناعات الدقيقة .

٩٢٥٣ - خِطْر صِينِي Cladrastis sinensis (S).

Cladraste de Chine, Virgilier de Chine (F). China yellow-wood (E).

شجرة حرجية وتزيينية . مهدها الصين . تعلق من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها مركبة مستطيلة . وريقاتها وريية اهليلجية . ازهارها عنقودي ، هرمي ، منتصب . ازهارها جميلة ، وردية اللون ، عطرية الرائحة || اخشابها صناعية ، لونها الى الاصفر الخنطي .

٩٢٥٤ - خِطْرَة Gourmand (F). Sucker (E).

هو الخربع ومنهم من قال غصن عرضي . قضيب دقيق يثبت في جذع او فرع الشجرة ، ثم ينمو بسرعة ولا يثمر بل يؤدي الاغصان المثمرة لانه يمنع عنها بعض النسغ .

٩٢٥٥ - خُطَف Martinet (F). Swift (E).

هو السمامة ، اطلبها .

٩٢٥٦ - خُطَف الماء Exocetidae (S).

Exocetidés (F). Exocetidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزعانف مفتوحات المثانة . اجناسها وانواعها عديدة تناهز المئة . جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ١٠ الى ٦٠ سم . رؤوسها مخروطية قصيرة الخاطم . زعانفها الصدرية كبيرة القد تشبه الجناح وتمكنها من التحليق فوق سطح الماء من ٣٠ الى ٥٠ ثانية . اشواطها مستقيمة الخط ، مداها من ٢٠٠ الى ٤٠٠ م . زعانفها الظهرية والشرجية متقابلة . زعانفها الخوضية لاقياسية الارتكاز والحجم . زعانفها الذيلية هلالية الشكل ، كبيرة الغلقة السفلى || اشهر اجناسها خطاف الماء .

٩٢٥٧ - خَطَم Mufle, Museau (F).

Snout, Muzzle, Nose (E).
الجزء العاري المخاطي الذي ينتهي به انف الحيوانات وبعض الحيوانات الاخرى || وهو في الحشرة مقدم الرأس حينما يكون مستديراً ومستطيلاً على شكل الخرطوم .

٩٢٤٥ - خُطَاف المَدَاخِن * ، سُنُونُو العُمُرَان

Hirundo rustica (S). Hirondelle rustique, H. de cheminée (F). Delichon rustica (E).

نوع من الخطاف طوله من ١٨ الى ٢٠ سم . بسطته نحو ٣٠ رأسه وظهره وجناحاه الى السواد الازرق الاسفع الموج . نحره اسمر كستنائي يحده طوق اسود . صدره وبطنه الى الشقحة . ريش ذنبه اسود الظاهر ابيض الباطن . عيناه ومثقاره سمر || يألف الاماكن الآهلة . يبني عشه بالتراب اللزج الممزوج بالقش . الانثى تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو ١٢ يوماً بينما الذكر يقوم لها الغذاء .

٩٢٤٦ - خُطَاف النَوَافِذ * ، سُنُونُو البُيُوت ،

حُجَبِيَّة حَجَبِيَّة Hirundo urbica,

Chelidon urbica (S). Hirondelle de fenêtre, H. à cul blanc, Chéidon (F). House martin (E).

نوع من الخطاف طوله نحو ١٤ سم . بسطته ٢٠ . رأسه وظهره وجناحاه الى السواد اللامع الازرق الموج . نحره وصدره وبطنه وزمكه بيض . ارساغه واصابعه لا تخلو من الريش الور . عيناه ومثقاره سود || يألف الاماكن الآهلة . يبني عشه بالتراب اللزج مع بعض القش والصوف . انشاء تحضن من ٤ الى ٦ بيضات || قوته الحشرات على اختلافها ما عدا الخشرم وجميع اصحاب الحمة .

٩٢٤٧ - خُطَاف أَمْرِيكِي * Progne (S).

Hirondelle d'Amérique, Progné (F). Progne (E).

نوع من الخطاف موطنه البلاد الامريكية يجوبها من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب . طوله نحو ٢٠ سم . بسطته ٣٠ سم . ثوبه اسود اللون يعلوه موج لامع يختلف بريقه مع انعكاس النور من الازرق الى البنفسجي والاحمر || يألف الريف . قوته الحشرات على اختلافها . يعيش اسراباً كبيرة العدد . يبني عشه بالتراب اللزج بين البيوت الآهلة والمهجورة انائه تضع نحو ٥ بيضات تحضنها وحدها .

٩٢٤٨ - خُطَافِيَّات ، سُنُونِيَّات Hirundinidae (S).

Hirundinidés, Hirondinidés (F). Hirundinidae (E).

فصيلة الخطاف او السنونو من الطيور الجواثم المشرومة المناقير . قوتها الذباب والبعوض ومختلف الهوام والحشرات المجنحة . تتميز بطيرانها السريع الخطاف وبقنصها وشرها واغتسالها وسائر اعمالها التي تقوم بها وهي طائفة || اجناسها وانواعها عديدة اشهرها الخطاف .

٩٢٤٩ - خُطَام Anneau nasal (F). Nasal ring (E).

حلقة نجم في انف الحيوان كالثور والبعر والدب ليتتاد بها . راجع برة .

٩٢٥٠ - خُطَبَان * ، خَشَب أَخْضَر

Chloroxylon (S). Chloroxylon, Bois satin (F). Satin-wood, Yellow-wood (E). Seidenholz, Atlasholz (D). Legno rasato (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الازدرختيات . انواعه قليلة منبتها الهند الشرقية . اخشابها صناعية ، فاخرة الصنف ، حريرية الرقة لونها الى الاخضر الاصفر . يستخرج منها بالحز عصارة رائحة غزيرة تستعمل في قلافة المراكب والسفن .



خطاف المداخن



خطاف النوافذ



خطاف امريكي



خطبان



خطر صباغي



خطمي

٩٢٦٥ - **خَطْمِيّ مَنَقِيّ** (S). *Hibiscus palustris* (S).
Ketmie des marais (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . ضرابه عديدة .
يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه كفية ، نصلها
زغبى البشرة على صفيحه . ازهاره مختلفة الالوان ، متوسطة
القد ، قطرها نحو ٧ سم . || يرغب في الاتربة الرطبة
المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية || ازهاره
يستمر من آب الى ايلول .

٩٢٦٦ - **خَطْمِيّ مَنِيْهَوْت** (S). *Hibiscus manihot* (S).
Ketmie manihot (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . مهدد الصين
واليابان . يعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه خماسية
او تساعية التفريص . نصلها ملس البشرة ، مسنن
الحافة . ازهاره كبيرة القد قطرها يراوح من ١٠ الى
١٨ سم . بتلاتها الى الصفرة الباهتة ، قواعدها قرمزية .
ازهاره يستمر طوال الصيف والخريف .

٩٢٦٧ - **خَطْمِيّ هِنْدِي** (F). *Althée* (F).
White mallow (E).
راجع ابوتيلون نجمي .

٩٢٦٨ - **خُطُوطُ الرُّهَاء** (F). *Courbes de niveau* (F).
Level knee (E).
هي خطوط منحنيات الارتفاع تسجل على الخوارط للدلالة
على مقادير مختلف الارتفاعات عن سطح البحر .

٩٢٦٩ - **خُطُوطُ العَرَض** (F). *Parallèles de latitude* (F).
Parallels of latitude (E).
خطوط موازية تبتدئ من خط الاستواء بدرجة صفر وتمتد
شمالاً وجنوباً الى القطبين حيث تنتهي بدرجة ٩٠

٩٢٧٠ - **خَطْمِيَّة**
الارض لم ترو بين مروييتين وقيل التي لم تمطر بين مطورتين .
ج خطاطط .

٩٢٧١ - **خُفّ**
Plante de pied du chameau et de l'autruche (F).
الحف للبعير والنعام بمنزلة الحافر الخيل .

٩٢٧٢ - **خُفّ** (F). *Eclaircissage* (F). *Clearing up* (E).
راجع تخفيف .

٩٢٧٣ - **خُفَّار** (F). *Méropé* (F). *Merope* (E).
الخفّار والخفّار نجم من مجموعة الثريا ، اطلب وروار .

٩٢٧٤ - **خُفَّاش ه** (S). *Vespertilio* (S).
Vespertilion (F). *Vespertilio* (E).
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات أنواعه نحو ٤٥ منتشرة
في جميع اصقاع العالم من المناطق الاستوائية الى الحارة
والمتندلة || اجسامها صغيرة ربعة طولها يراوح من ٨٠
الى ١٢٥ سم . رؤوسها مخروطية . آذانها مستقلة كبيرة
القد ، غشائياتها هلالية . اجنحتها عريضة وقصيرة .
اناثها تضع جرواً واحداً تحمله حتى الفطام نحو ثمانية
اسباع || اشهر انواعه الاربعة التالية .



خفّاش

٩٢٥٨ - **خَطْمِيّ * ، خَطْمِيَّة** (S). *Hibiscus* (S).
Ketmie (F). *Ketmia* (E).
جنس نباتات عشبية وبجلية من فصيلة الحباريات .
انواعه عديدة منها البرية والطبية والتزيينية والزراعية
المأكولة الثمار كالبامية . سوقها زباء ، اوراقها معنقة
مفصصة . ازهارها كبيرة القد متعددة الالوان || اشهر
انواعه التزيينية ما يتبع .

٩٢٥٩ - **خَطْمِيّ إفريقيّ ، تيل شَبْطاني**
Hibiscus trionum, *H. africanus* (S). *Ketmie trifide*,
K. d'Afrique (F). *Bladder ketmia*, *Flower of an hour*
(E). *Afrikanischer ketmie*, *Stundeneibisch* (D). *Ibis-*
co a tre foglie (I).
نوع من الخطمي العشبي الطبي التزييني الحولي والحول .
يعلو من ١٥ الى ٦٠ سم . اوراقه ثلاثية التفريص .
ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، ارجوانية القاعدة .
تنفجر من الساعة الثامنة الى الظهر ثم تنطبق حتى الساعة
الثامنة من اليوم التالي || ازهاره يستمر من تموز الى
ايلول .

٩٢٦٠ - **خَطْمِيّ جُنْدِي** (S). *Hibiscus militaris* (S).
Ketmie militaire (F).
نوع من الخطمي البجلي المعمر . مهدد امريكا الشمالية .
يعلو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية التفصيص ،
مستطيلة الفص الاوسط . نصلها ملس البشرة ، مسنن
الحافة . ازهاره كبيرة القد ، جرسية الشكل ، قطرها نحو
١١ سم ، لونها الى الحمرة الزاهية || ازهاره يستمر من
آب الى ايلول .

٩٢٦١ - **خَطْمِيّ خَمْلِي** (S). *Hibiscus lasiocarpus* (S).
Ketmie à capsule velue (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . مهدد امريكا .
ضرابه عديدة حجمها سبروتية . اوراقه كفية ثلاثية او
خماسية او سباعية التفريص ، نصلها ازغب البشرة .
ازهاره كبيرة القد قطرها نحو ٢٠ سم . لونها ابيض او
وردي . ثماره حقية ، خلية البشرة || ازهاره يستمر
نحو خمسة اسابيع ابتداء من آب .

٩٢٦٢ - **خَطْمِيّ سُورِي * ، خَطْمِيّ مَلَكِي**
Hibiscus syriacus (S). *Ketmie de Syrie*, *K. des Jar-*
dins, *K. royale* (F). *Ketmia*, *Syrian rose*, *Rose of*
sharon (E). *Elbisch*, *Syrischereibisch* (D). *Ibis-*
co del giardini, *Chetmia* (I).
نوع من الخطمي الشجري السبروتي المعمر . مهدد البلاد
السورية . ضرابه عديدة . يعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم .
اوراقه كفية ثلاثية التفصيص ، نصلها ملس البشرة ،
مسنن الحافة . ازهاره كبيرة القد ، بسيطة او مكسبة ،
عديدة الالوان منها الاحمر والليلكي والازرق والبنفسجي
والابيض || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

٩٢٦٣ - **خَطْمِيّ قِرْمِزِي** (S). *Hibiscus coccineus* (S).
Ketmie écarlate (F).
نوع من الخطمي البجلي التزييني المعمر . يعلو من ١٠٠
الى ٢٠٠ سم . اوراقه كفية خماسية التفريص . ازهاره
قرمزية اللون ، كبيرة القد ، منبسطة البتلات قطرها نحو
١٢ سم . ازهاره يستمر نحو ثمانية اسابيع من اواخر
الصيف الى اواسط الخريف .

٩٢٦٤ - **خَطْمِيّ مَسْكِي** (F). *Ketmie musquée* (F).
Abelmosk (E).
مرحب المسك ، اطلبه .

٩٢٨٠ - خُفَّاشِيَّات ٥ Vespertilionidae (S).

Vespertilionidés (F). Vespertilionidae (E).

فصيلة من الخفافيش عديدة الأجناس والأنواع. تتميز بخلوها من الزوائد المنخرية، بأذناها الودية المنفصلة، بأذناها المستطيلة المدرجة ضمن غشاء قاعدة الفخذ، بتسغيها الذي يختلف مع الأجناس وبشائها العلوية الفارقة || أذناها تضع جروين تحملها دائما وترضعها أثناء طيرانها. أنواعها المعروفة نحو ١٥٠ تنتمي إلى عدة أجناس أعرفها التالية: الطمروق والسحاة والخشاف والذعماط والخفّاش والزنباع (اطلها في مواضعها).

٩٢٨١ - خُفَّافِيش ٥ Microchiroptères,

Petites chauves-souris (F). Microchiroptera (E).

مرتبة حيوانات من مجنحات الأيدي. أنواعها نحو ٣٥٠ تجمعها خمس فصائل. تتميز بنواجذها المدببة الحادة كالخفة. يقف أذناها المنفرجة القاعدة. بسببها الوحيدة أو الثنائية السلمي، العديمة الخلب. أذناها، عند وجودها، مدرجة في الغشاء الجلدي بمستوى القاعدة الفخذية. عيونها صغيرة مستديرة يحجبها الهدب والوبر. معظمها من الحيوانات الحاشرة ومنها الثامرة والدائمة. موطنها العالم، تكثر في البلاد الحارة، تقل في المعتدلة وتندر في الباردة || أما فصائلها الخمس فهي: الخفّاشيات والرماسيات والعاشيات والوحريات والورقيات.

٩٢٨٢ - خُفَّان Ponce (F). Pumice (E).

هو الكذان والنسفة حجارة خفيفة نخرة يكثر وجودها عند مرمى الموج.

٩٢٨٣ - خُفَّت Rue (F).

هو السذاب، اطلبه.

٩٢٨٤ - خُفَّج Saillie des chèvres (F).

الخفج هو سفاد الماعز. يقال خفج التيس إذا سفد.

٩٢٨٥ - خُفَّج ، لَبْسَانَة Lampsane (F).

Nipplewort (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات اللسنية. أنواعها أربعة اقليمها حوض البحر المتوسط. أوراقها متقابلة. أزهارها رؤسية، طويلة الزناد، صفراء اللون. واحدته خفجة || أعرف أنواعه الخفج المبذول.

٩٢٨٦ - خُفَّج مَبْدُول * Lampsana communis (S).

Lampsane commune, Herbe aux mamelles (F). Common nipplewort (E). Niplewurz, Gemeine milche, Rainkhol (D). Lampsano, Lassano, Erba da mammelle (I).

نوع من الخفج الطبي البري. اقليمه سواحل البحر المتوسط. أوراقه كبيرة القد، غزيرة المادة الفعالة، مأكولة وتستعمل في علاج القشب خاصة قشب حلمة الثدي.

٩٢٨٧ - خُفَّخُفَة Cri de l'hyène (F).

صوت الضبع. ومنهم من قال صوت الضبع والخنزير.

٩٢٨٨ - خُفَّخُوف * Sericulus (S).

Séricule (F). Sericulus (E).

طائر من التبشريات الفردوسيات. موطنه جزر الزايج وأستراليا || ثوبه جميل الألوان المتباينة. رأسه وقف

٩٢٧٥ - خُفَّاش أُسْبَل * Vespertilio

mystacinus (S). Vespertillon à moustaches (F).

Moustached vespertilio (E).

حيوان لبون حاشر من فصيلة الخفّاشيات. موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢٠ مم. بسطته نحو ٣٥٠ مم. ثوبه إلى السمرة الطحلاء تعبق في الرأس والظهر وتتحرف إلى الخنطي في البطن. رأسه مخروطي الشكل. أذناه وتديتان، مستقلتان. عينا صغيرتان. خنابتاه هلالية الشكل. سباله كثيف التجميع. فقه مستعرض الشدق || يألف البيوت الخربة والكهوف والمغاور. ملجئه الحياتي جماعي. أفواجه كثيرة العدد. بباته الشتوي يستمر نحو عشرة أسابيع. مسرحه دجوي. قوته الحشرات على اختلاف أجناسها وأنواعها || يحبل الانثى يدوم من ٣٨ إلى ٤٠ يوماً تضع في تمامه من جرو إلى جروين يكتسيان ويسمعان بعد ستة أيام ويبصران بعد عشرة أيام ويتعلقان بصدر الام حتى الفطام أي نحو ثمانية أسابيع || يعتبر من الخفّافيش اللامؤذية النافعة.

٩٢٧٦ - خُفَّاش الصَّحْرَاء Vespertilio

desertorum (S). Vespertillon du désert (F).

نوع من الخفّاش. ثوبه بلون الرمال الخنطية. رأسه وظهره أعبق لوناً من بطنه. جسمه ربع القد، طوله نحو ٨٠ مم. بسطته ٢٤٠ وذنبه ٣٠ مم. || موطنه صحاري الشرق الأوسط. يعيش جماعات قليلة العدد. يألف النخل وأوقاب الصخور. قوته الحشرات على اختلافها إخصها الجراد.

٩٢٧٧ - خُفَّاش المَاء Vespertilio

daubentoni (S). Vespertillon aquatique (F).

نوع من الخفّاش ثوبه اطحل اغبر. جسمه ربع القد. طوله نحو ٨٥ مم. بسطته ٢٦٠ وذنبه ٣٥ مم. || موطنه الشرق الأوسط وأروبة. يعيش جماعات قليلة العدد، يرتاد المناطق ومجاري الماء والبحيرات في طلب الحشرات والهوام. يألف المناور والكهوف وأوقاب الصخور.

٩٢٧٨ - خُفَّاش بِيْشْتَيْن Vespertilio

bechsteini (S). Vespertillon de Bechstein (F).

نوع من الخفّاش ثوبه إلى الجؤوة الطحلاء عابق الرأس والظهر، أبيض البطن. جسمه ربع القد طوله نحو ٩٠ مم. بسطته ٢٧٠ وذنبه ٤٠ مم. رأسه مخروطي الشكل. أذناه كبيرتان || موطنه البلاد الأروبية المعتدلة الحرارة. يعيش منفرداً. يألف تجايف الأشجار. مسرحه من الليل إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلافها.

٩٢٧٩ - خُفَّاش فَأْرِي Vespertilio

murinus (S). Vespertillon murin, Murin (F). Murins (E).

نوع من الخفّاش ثوبه إلى السمرة الفاحة، ظهره اطحل الموج، بطنه إلى ألباض التبي. جسمه ربع القد يشبه الفأرة، طوله نحو ١٢٥ مم. بسطته ٣٨٠ وذنبه ٥٥ مم. موطنه فسيح الأرجاء يعم الشرق الأوسط وأروبة وأفريقية الشمالية. يألف البيوت والكهوف والمغاور. يعيش جماعات كثيرة العدد. مسرحه من الليل إلى الفجر. قوته الحشرات على اختلافها.



خُفَّاش أُسْبَل



خُفَّج مَبْدُول



خُفَّخُوف

٩٣٠٢ - خِلَاصَةُ أُزُونِيَّة (F). Extractif azoté (F).
Azotized extract (E).
هي المادة الازوتية الموجودة في الشيء المطلوب تحليله .

٩٣٠٣ - خِلَاصَةُ الْجُنْجُل (F). Lupuline (F).
Lupulin (E).
مادة رائحية عطرية مرة الطعم توجد بين حراشف مخاريط الجنجل تستعمل في صناعة البيرة .

٩٣٠٤ - خِلَاصَةُ جَافَةٍ (F). Extrait sec (F).
Dry extract (E).
الخلاصة الجافة أو اليابسة هي ما يبقى من المواد المعلقة والمذابة بعد تبخير مائها أو سوائلها .

٩٣٠٥ - خِلَاصَةُ غَيْرِ أُزُونِيَّة (F). Extractif non azoté (F). No azotized extract (E).
عبارة ترادف المادة الهيدروكربونية أي هيدرات الكربون .

٩٣٠٦ - خِلَاف (F). Différend (F). Difference (E).
النزاع القائم بين اثنين أو أكثر إذا تباينت آراؤهم أو مصالحهم في موضوع معين .

٩٣٠٧ - خِلَاف * ، زَقُوم (S). Elaeagnus (S).
Chalef, Eléagne (F).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الخلافيات . انواعه عديدة منها الشائكة والسرحة . اوراقها عروية أو عابطة ، كاملة ، معنقة ، جامدة النصل . ازهارها عطرية العرف ، خنثوية يتخللها بعض الذكورية ، لونها الى الصفرة أو البياض || اشهر انواعه ما يلي .



خِلَاف

٩٣٠٨ - خِلَاف سَرَح ، زَقُوم سَرَح (S). Elaeagnus glabra (S). Chalef glabre (F).
نوع من الخلاف العارش . مهدد الصين واليابان . يعلو من متر الى مترين . اوراقه عروية مستطيلة ، نصلها لامع الصفحة العليا ، حنطي السفلى . ازهاره ونواميه حرشفية النلاف واللحاء || يزرع للتزيين . ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

٩٣٠٩ - خِلَاف ضَيْقُ الْوَرَق ، زَقُوم بَلَدِي ، طَبِيي الكَلْبَةِ ، سَوَجَر ، زَيْزْفُون الشَّرْق (S). Elaeagnus angustifolia, E. hortensis (S). Chalef à feuilles étroites, Olivier de Bohême, Oléastre, Eléagne oléastre (F). Zakkoum-oil plant, Oil tree (E). Schmale ölweide (D). Eleagno, Olivagno, Leagno balsamico (I).
نوع من الخلاف . منبته الشرق . يعلو من ٥ الى ٨ أمتار افئانه شائكة . اوراقه عابطة ، معنقة ، مستطيلة ، فضية النصل على صفحتيه . ازهاره محورية الارتكاز . ثماره برتقالية اللون زيتونية الشكل ، مأكولة . ازهاره محبة تفيد الصدر .

٩٣١٠ - خِلَاف فِضِّي ، زَقُوم فِضِّي (S). Elaeagnus argentea (S). Chalef argenté, Eléagne argentée (F).
نوع من الخلاف مهدد البلاد الامريكية . يعلو من مترين الى اربعة أمتار . ساقه وأغصانه سرحة ، أفئانه ونواميه حرشفية اللحاء . اوراقه سنائية ، عابطة ، فضية النصل على صفحتيه . ثماره ناشفة اللب ، بشرتها مزعجرة فضية . يزرعها صلدة كالحجر .

وجوشنه وأواسط جناحيه الى الصفار الكبير يني ، سائر ريشه الى السواد الفحمي الخجلي الموج || يالف الادغال والحراج الكثيفة . قوته الثمار والحشرات . يدثن عشه في الاشجار القليلة الارتفاع || الانثى تضع ثلاث بيضات صفراء اللون مرقوشة بالاسمر ، تحضنها بمتابوة الذكر نحو ١٥ يوماً .

٩٣٨٩ - خُفْدُود ٥ ، خُفْدُود ٥ (F). Pipistrelle (F).
هو خشاف المتوسط ، من الخفافيش المفيدة ، اطلبه .

٩٣٩٠ - خُفَيْش (F). Nyctalope (F). Nyctaliopic (E).
الخفش والاختفش والاجهر من لا يبصر الا في الليل . م . خفشاء .

٩٣٩١ - خُفَيْي ، سَرِّي (F). Esotérique (F).
Esoteric (E).
نعت تعريفي يطلق على بعض التعاليم ، اغصها الفلسفية ، التي كانت في قديم الزمان لا تعلن الا للمطلعين على مبادئ تلك العلوم .

٩٣٩٢ - خُفَيَّاتُ الْأَرْجُل (F). Cryptopodes (F).
Cryptopoda (E).
فئة من القشريات مستورات الارجل .

٩٣٩٣ - خُفَيَّاتُ الشَّرْح ٥ (F). Endoproctes (F).
Endoprocta (E).
خفيات الشرح فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز باستتار الشرح داخل نطاق اللوامس .

٩٣٩٤ - خُفَيَّاتُ الْوَلْبَع ، مَسْتَوْرَاتُ الزَّهَر (F). Cryptogames (F). Cryptogamous (E).
شعبة من النبات مستورة الاعضاء التناسلية تشمل الاشنة والحث والسراخس والطحالب والفطور الخ .

٩٣٩٥ - خُفَيَّة ، خُفَيَّْة (F). Crépide (F).
Hawk's-beard (E).
هي السرعة ، اطلبها .

٩٣٩٦ - خُفَيْرَاء (F). Mérope (F). Merope (E).
الخفيراو او الخفار اكبر نجم في الثريا ، اطلب وروار .

٩٣٩٧ - خُفْل (F). Vinaigre (F). Vinegar (E).
هو الحامض الخلي الخفيف . سائل حضي عديم اللون ، نفاذ الرائحة ، حريف الطعم يستحضر من تخمير العنب وبأكسدة الميثروبات الكحولية اغصها النبيذ وبتطهير الخشب ، الخ . والخل الثقيف هو الحامض جداً .

٩٣٩٨ - خُفْلَاب ٥ (F). Colluvion (F).

٩٣٩٩ - خُفْلَابِي ٥ (F). Colluvial (F).

٩٣١٠ - خِلَاة (F). Acétate (F). Acetate (E).
هي الاسيتات ، اطلبها .

٩٣١١ - خِلَاص ، بِشِيْمَة (F). Délivre (F).
After-birth (E).
هو القاء المشيمة وتوابعها عقب الولادة .

اوراقه ضيقة النصال تطول من ٥ الى ١٠ سم. وتعرض من ١٢ الى ١٤ سم. ازهاره صيواني التجميع. ازهاره بنفسجية اللون يعلوها مزاج ارجواني || تنويره ربيعي .

٩٣٢١ - **خُلْبُوبٌ كَرْدَر** (S). *Bomarea carderi* (S). *Bomarée de Carder* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته جبال الاند . ساقه عارشة ، اوراقه تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٨ سم. نصالها الى الخضار الاطحل . ازهاره صيواني التجميع . زهرته تطول نحو ٥ سم. لونها الخارجى الى الوردي المنقوش بالاحمر اما الداخلى فالى البياض المرقوش بالاخضر || تنويره يستمر من آب الى ايلول .

٩٣٢٢ - **خُلْبُوبٌ مَأْكُول** (S). *Bomarea edulis* (S). *Bomarée comestible* (F).

نوع من الخلوبوب . اوراقه ودوراتها مأكولة . منبته نيكراغوا . ساقه عارشة مألسة اللحماء . اوراقه معتدلة الحجم تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ الى ٥ سم. نصالها الى الخضار الاليس . ازهاره صيواني التجميع . قطر الخيمة يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ازهاره كبيرة تطول من ٦ الى ٧ سم. لونها الخارجى الى الحمرة الوردية المزاج اما الداخلى فالى الصفار الباهت المرقوش بالاسمر || تنويره يستمر طوال شهر آب .

٩٣٢٣ - **خُلْبُوبٌ** (S). *Anoplangthus* (S). *Anoplangthe* (F).

جنس نباتات طفيلية ضارة من فصيلة الجعفلديات . انواعه المعروفة قليلة جميعها جردية او من نباتات البلاد الباردة . تنشب في جذور عائلها من النبات فتعيش عليه وتنمو من نفسه .

٩٣٢٤ - **خُلْبُوبٌ قَرْمِزِي** (S). *Anoplangthus coccineus* (S). *Anoplangthe écarlate* (F).

نوع من الخلوبوب يعيش في الجرد البنيانية . ساقه نحيلة حرشفية تعلو نحو ٢٠ سم. حراشفها دقيقة لينة لينة . ازهاره سنبلية التجميع ، قرمزية اللون ، زباء الاسدية . يركب النباتات القرنية والنجيلية .

٩٣٢٥ - **خُلْبُوبٌ**

الخلبوب طائر اصفر من المصفور بلونه (محيط المحيط) .

٩٣٢٦ - **خِلَّةٌ * ، صَقْلِين ، صَقْلِين ، خَشْبَزَك ، نَائِخَوَاه ، نَائِخَوَعة**

Ammi visnaga (S). *Ammi visnaga*, *Visnaga*, *Visnague*, *Herbe aux gencives*, *Herbe aux curesdents* (F). *Pick-tooth*, *Toothpick* (E). *Zahnstocherkraut* (D). *Ammi visnaga*, *Erba da gengiva* (I).

نبات عشبي طبي حولى بري وزراعي من الامنيات وفصيلة الخيميات يكثر في الارض البور ويزرع في بعض البلاد كصر وغيرها || اوراقه متعاقبة مركبة طويلة الزناد . ازهاره صيوانية التجميع ، جامدة المعالين ، بيضاء اللون ، عطرية العرف ، حامزة الطعم . كانوا ولا يزالوا يتخللون بمعالين زهره || والمعروف عن بزور الخلة ان تقيمها على البارد يحلل المنفس والغازات ، يدر البول ويطرده الحصى . امسا خلاصتها فتفيد الذمحة القلبية . عنصرها الفمال يدعى خلين وقد صنع منه اودية معروفة باسم لينامين واميكاردين وغلوكون لينامين .

٩٣١١ - **خِلَافٌ كَثِيرُ الزَّهْرِ ، زَقُومٌ كَثِيرُ الزَّهْرِ ، غُومِي**

Elaeagnus multiflora (S).

Chalef multiflore, *Goumi* (F).

نوع من الخلاف . ضرابه عديدة . مهدد الشرق . يعلو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقه مستطيلة ، متموجة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، فضي السفلى . ازهاره نورية . ثماره صغيرة القند مأكولة .

٩٣١٢ - **خِلَافِيَّات**

Eléagnacées (F). *Eleagnaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديمة القملات . انواعها عديدة تنتمي الى اربعة اجناس . جميعها اشجار وشجيرات وجنات . منها البرية والزراعية والتزيينية والشائكة والسرحة .

٩٣١٣ - **خِلَال**

الخلال هو البسر اذا اخضر واستدار .

٩٣١٤ - **خُلْبٌ**

Fibres (F). الخلب هو الليف واحده خلبة .

٩٣١٥ - **خُلْبٌ**

Palmité (F). *Palm-marrow* (E). الخلب هو لب النخلة اي قلبها . اطلب حمار .

٩٣١٦ - **خُلْبٌ**

الخلب هو الظفر وحجاب الكبد وغلاف البطن وورق الكربة . ج أخلاب .

٩٣١٧ - **خُلْبُوبٌ ***

Bomarea (S). *Bomarée* (F). *Bomarea* (E).

جنس نباتات عشبية درنية من فصيلة الترجمسات . منبتها بعض مناطق امريكا الجنوبية : سوقها مدادة عارشة . اوراقها معتدلة لاقياسية الشكل . ازهارها صيواني التجميع اوهاشي وطرفي . ازهارها قمية الشكل عديدة الالوان || تزود للتزيين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاتربة المناسبة التركيب المنصري الوفرة المواد الغذائية من عضوية ومعدنية || انواعه المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

٩٣١٨ - **خُلْبُوبٌ أَرْغَب**

Bomarea tomentosa (S). *Bomarée tomenteuse* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته كولومبيا والبيرو . ساقه زباء عارشة . اوراقه مزغبة النصال على صفحتها السفلى ، تطول من ٤ الى ٨ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ سم. ازهاره صيواني التجميع . ازهاره ارجوانية اللون يعلوها تنقيط اسود من الداخل فقط || تنويره ربيعي .

٩٣١٩ - **خُلْبُوبٌ أَصْفَر**


Bomarea vitellina (S). *Bomarée jaune d'œuf* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته جبال الاند . ساقه عارشة ، مبعثرة الزغب . اوراقه تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٤ سم. نصالها جميلة الخضار الزاهي . ازهاره صيواني التجميع ، كبير القند . ازهاره صفراء اللون تطول نحو ٤ سم. || تنويره يستمر من تموز الى آب .

٩٣٢٠ - **خُلْبُوبٌ فَشَاغِي**

Bomarea salsilla (S). *Bomarée salspareilla* (F).

نوع من الخلوبوب . منبته بلاد الشيلي . ساقه عارشة ملساء .



٩٣٣٤ - خُلْتَرُ الْمُسْك ، خُلْتَرُ عَطِير

Pois de senteur (F). Sweet-pea (E).

هو الجلبان المطر ، اطلبه .

٩٣٣٥ - خَلَص

الخلص : شجر ينبت نبات الكرم يتعلق بالشجر فيعلق وهو طيب الريح وحبه احمر كخرز العقيق لا يؤكل ولكنه يعى الواحدة خلصة (عن ابي حنيفة) .

٩٣٣٦ - خَلَع

خلع الزرع خلاعة : اسفى فهو خالغ . وأخلع : صار فيه حب .

٩٣٣٧ - خَلَف

Ayant cause, Ayant droit (F).

هو الذي ينتقل اليه حق او التزام من شخص آخر يدعى سلف . والخلف يكون على وجهين الخلف العام والخلف الخاص .

٩٣٣٨ - خَلْف ، قَرْخ

Ceilieton (F).

Layer, Young bud (E).

هو الملمخ الصغير المشرش يفصل عن ارومته فيزرع كلخ الخرشوف مثلاً .

٩٣٣٩ - خَلْف

Trayon, Pis (F). Dug, Teat (E).

حلمة ضرع البقرة والعز والنعجة والناقة ...

٩٣٤٠ - خَلْفَةٌ

Chamelle (pieine) (F).

هي الناقة الحامل . ج خلفات . She-camel (plenum) (E).

٩٣٤١ - خَلْفِيَّاتُ الْأَخَادِيد

Opisthoglyphes (F).

رتبة من الحيات تشمل الزواحف من ذوات الانياب الخلفية .

٩٣٤٢ - خَلْفِيَّاتُ الْخَيْشُوم

Opisthobranches (F).

صنيف حيوانات من الرخويات المعدية .

٩٣٤٣ - خَلْقُ الْخَيْل

Extérieur du cheval (F).

٩٣٤٤ - خَلْقَةٌ

Morphose (F). Morphosis (E).

الخلقة بيولوجياً الهيئة المتخلدة .

٩٣٤٥ - خَلْقِي ، أَصْلِي ، قَرْجِي

Congénital (F). Congenital (E).

نعت تعريفي يطلق على صفات الحيوان التي تلازمه منذ الولادة ورأية كانت ام اكتسابية رحم وحسنة كانت ام سيئة .

٩٣٤٦ - خَلْقِي ، طَيْمِي ، غَرِيْزِي

Infus (F).

Infused (E).

نعت تعريفي يطلق على الميزات الطبيعية الموهوبة .

٩٣٤٧ - خَلْقِيْن

Cuve (F). Tub, Vat (E).

الرجل الكبير من النحاس .

٩٣٤٨ - خَلْمٌ

Graisse de mouton (F). Suet (E).

ج أخلام وخلاء .

٩٣٤٩ - خَلْمٌ

Gîte de la gazelle (F). Lair (E).

كناس الظية العظيم وقيل مريضها . ج أخلام .

٩٣٢٧ - خَلَّةٌ كَبِيرَةٌ * ، خَلَّةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ، سَدَا

Ammi majus (S). Ammi commun (F). Amee, Bishop's weed (E). Ammei, Grosser ammei (D). Ammi rizzomolo, Rindoncolo, Soffione (I).

نبات عشبي بري طبي وزراعي من الامينيئات وفصيلة الخيميات . كثير الوجود في المزارع والبساتين || يزرع الآن لجني بزره نظراً لفوائده الطبية العديدة اخصها علاج البهاق .

٩٣٢٨ - خَلَج

Vertige (F). Vertigo (E).

الخلج : داء يصيب البهائم تخلج منه اعضاؤها سببه شدة الحر او عارض معوي .

٩٣٢٩ - خُلْدٌ * ، قَارَةٌ عَمِيَاءٌ ، جُلْدٌ

Spalax (S). Rat-taupe, Spalax (F). Mole rat, Blind rat (E).

حيوان جاس وحيد الجنس والنوع عديد الضروب من فصيلة الخلديات . جسمه اسطواني الشكل ، كقدم . طوله يراوح من ٢٠ الى ٢٢ سم . وزنه نحو ٣٠٠ غ . رأسه غليظ ، عنقه قصير . عيناه مخفيتان تحت الجلد . اذناه لا قوفية صغيرتان ماسحتان . ذنبه جدعة بارزة . ثوبه الى الخطي الاسمر . فقه وقوائمه بيض . بطنه رمادي اللون تعلوه رقشة بيضاء || انشاء تضع في الصيف من الدرعين الى الاربعة . قوته الجذور النباتية . يقيم جحره على عمق ٦٥ سم . تتشعب منه عدة انفاق افقية طولها من ٢٠ الى ٣٠ م . تتخللها فوه خارجية . اما مدخره الذي يخزن فيه قوته الشتوي فيخلده تحت جحره على عمق ١٢٠ سم . || يكافح باستعمال القداراة او الطعوم السامة .

٩٣٣٠ - خُلْدٌ أُرُوبِي

Taupe (F). Mole (E).

هو الطوبين ، اطلبه .

٩٣٣١ - خُلْدُ الْمَاءِ *

Ornithorhynchus anatinus, O. paradoxus (S). Ornithorhynque, O. anatin, O. paradoxal, O. à bec de canard, Taupe de rivière (F). Duckbill, Water-mole (E).

حيوان استرالي وحيد الجنس والنوع . يبيض ويرضع . وحيد المسلك له منقار شبيه بمنقار البط ومجدافان متحركان في يديه . يعيش في الماء وعلى ضفاف الأنهار . يرغب في المياه الراكدة . جحره نفق مستطيل لا يقل عن عشرة امتار له مدخلان واحد في قعر الماء والثاني في الجرف او على الضفة بين الاعشاب .

٩٣٣٢ - خُلْدِيَّاتٌ ، مَنَاجِدٌ

Spalacidae (S). Spalacidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة جاسة من مرتبة قردنيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها اربعة . انواعها عديدة . اجسامها صغيرة القد اسطوانية الشكل . اسنانها مستعرضة قاضمة ، قوائمها قصيرة ، اطرافها مستطيلة مقوسة جاسة . فقامها غليظة مقطومة . آذانها وعيونها خفية . اذنانها قصيرة او لا وجود لها || تعيش تحت سطح التربة على اعماق مختلفة تراوح بين التربة الزراعية والهوم . قوتها جميع الاعضاء النباتية التي تتعرض انفاقها || اما اجناسها الاربعة فهي التهنون والخلد والعومة والريزوميس .

٩٣٣٣ - خُلْتَرٌ

Gesse (F). Bitter vetch (E).

هو الجلبان ، راجعه .



خَلَّةٌ كَبِيرَةٌ




خُلْدٌ



خُلْدُ الْمَاءِ




خلنوس



خلنج اسود




خلنج المتوسط



خلنج شجري



خلنج مكسي



خلود ابيض

الى آب . ازهاره رباعية او سداسية التجميع . جلجلية الشكل ، وردية اللون . كعابره خلية || ضروبه التزيينية اربعة ترعب في الاثرية الرملية الدبالية .

٩٣٥٨ - خلنج كثير الزهر Erica multiflora (S). Bruyère multiflore (F).

نوع من الخلنج يعلو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اهدابه ضمية رباعية او خماسية . ازهاره كثيرة العدد ، تاجية الارتكاز ، وردية اللون ، مآبرها سود بارزة || يرغب في الاثرية الكلسية . ازهاره يستمر من تشرين الى شباط .

٩٣٥٩ - خلنج مكسي Erica scoparia (S). Bruyère à balais (F). Small heath (E). Besanheide (D). Scopa, Scoparia, Scoparella (I).

نوع من الخلنج يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقه مرطاء وفروعه كذلك . هديه مالمس البشرة . ازهاره عنقودي مستطيل . ازهاره جرسية الشكل ، صغيرة القد ، خضراء اللون ، يعلوها موج ابيض وردي || جذوعه وجذوره تستعمل في صناعة الغلايين وافئانه للمكانس .

٩٣٦٠ - خلنجيات Ericacées (F). Ericaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين الوسيديات القعالة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي صناعي وتربي || من اجناسها المشهورة الخلنج والجلسان والمصل والمقطلب والقمام والوثير .

٩٣٦١ - خلو ، نقص ، عوز ، جحن Carence (F). Deficiency (E).

هو افتقار الجسم الحيواني او النباتي الى بعض العناصر الغذائية . وهو ايضاً مظهر ذاك النقص الفاضح .

٩٣٦٢ - خلود ، عمير Sempervivum (S). Joubarbe (F). Jupiter's beard (E). Hauswurz (D). Sempervivo (I).

جنس نباتات عشبية لحمية معمرة من فصيلة المخلدات . انواعه كثيرة العدد معظمها بري وبعضها زراعي تربي . اوراقه ضمية التجميع تنشب من وسط قرصها ساق شراخية تعلوها الازهار || اعرف انواعه ما يتبع .

٩٣٦٣ - خلود ابيض Sempervivum leucanthum (S). Joubarbe blanche (F).

نوع من الخلود يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه خلية النصل ، صغيرة ، مستعرضة ، مدية المقصعة الجؤوية اللون . ازهاره صغيرة القد ، بتلاتها بيض النسيج ، خضر المروق . ازهاره يستمر شهراً واحدا ابتداء من اواخر حزيران .

٩٣٦٤ - خلود الرمال Sempervivum arenarium (S). Joubarbe des sables (F).

نوع من الخلود يبيش في الرمال . يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقه مستطيلة سمراء المقصعة المدببة . نصلها جميل الخضار خلي البشرة . ازهاره سداسية البتلات ، جرسية الشكل ، مهدبة الخنار ، لوها الى الصفرة || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٦٥ - خلود السطوح Sempervivum tectorum (S). Joubarbe des toits (F).

نوع من الخلود ضروبه عديدة . يعلو نحو ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة لوها الى البحري . نصلها مالمس البشرة ، مهدب الحافة ، جؤوي المقصعة ، اسمر الخمة . ازهاره فارشة البتلات الشفمية المدد الذي يراوح من ٨ الى ١٨ ،

٩٣٥٠ - خلنوس * Chalimus (S).

Chalime (F). Chalimus (E). جنس دوبيات بحرية طفيلية من القشريات الدنيا مجذافيات الارجل وفصيلة الكليجيات . انواعها المعروفة قليلة المدد || اجسامها شديدة الصغر ، وحيدة العين . رؤوسها ملحوفة بزوائد جامدة محدبة || تنطفل على جميع انواع الاسقمريات اخصها الطراخور .

٩٣٥١ - خلنج ، شنطف Erica (S). Bruyère (F). Heath, Heather (E).

جنس نباتات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الخلنجيات . انواعه المعروفة تبلغ ٤٠٠ جميعها معمرة عروة دائمة الخضار . معظمها جنبات وجنابات مهددا افريقية الجنوبية . اوراقها هدية الشكل قصيرة || اعرف واشيع انواعه ما يتبع .

٩٣٥٢ - خلنج احمر Erica australis (S). Bruyère rouge (F). Red heath (E).

نوع من الخلنج يعلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اهدابه ضمية رباعية . ازهاره تاجية ، نورية ، رباعية التجميع ، هلية التويج ، حمراء اللون || ازهاره يستمر من اذار الى حزيران .

٩٣٥٣ - خلنج اسود * Erica cinerea (S). Bruyère cendrée, B. franche (F). Bell heather, Black heath (E). Grane heide (D). Scopa cinerina (I).

نوع من الخلنج المبدول يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اهدابه ضمية ثلاثية . ازهاره جلجلية وردية او بنفسجية اللون . ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٩٣٥٤ - خلنج الثلوج Erica carnea (S). Bruyère des neiges (F).

نوع من الخلنج اقلية البلاد الباردة الجبلية . يعلو من ١٥ الى ٦٠ سم . اهدابه مستطيلة النصل ، ضمية الارتكاز رباعية او خماسية التجميع . ازهاره وردية موشة ، مآبرها بارزة قرمزية || يرغب في الاثرية الكلسية . ازهاره يستمر من كانون الى اذار .

٩٣٥٥ - خلنج المتوسط Erica mediterranea (S). Bruyère méditerranéenne (F). Mediterranean heath (E).

نوع من الخلنج عديد الضروب . مهدد حوض البحر المتوسط . اهدابه بحرية النصل اللامع . ازهاره وردية او بيضاء اللون . مآبرها قليلة البروز ، لوها الى السمرة . ازهاره يستمر من كانون الى اذار .

٩٣٥٦ - خلنج شجري * Erica arborea (S). Bruyère arborescente, B. en arbre (F). Briar-root, Tree heath (E). Baumheide (D). Scopa in albero, S. forcilli, S. maschia (I).


نوع من الخلنج يعلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . افئانه مزغرة ، هلبها ريشي الشكل . ازهاره عنقودي ، مستطيل ، منتصب . ازهاره بيض او وردية اللون || قضبانه تستعمل استعمال الشيع للقر وخشب في صناعة الغلايين .

٩٣٥٧ - خلنج صيواني Erica terminalis (S). Bruyère à ombelles (F).


نوع من الخلنج يعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . اهدابه ضمية رباعية . ازهاره صيواني ، تاجي الارتكاز ، يستمر من تموز




خلود السطح



خلود عنكبوتي



خلية



خلية نباتية



خلود

تقسم الى فئتين : فئة ذوات المسام وهي التي يدخل اليها الطعام من مسام دقيقة مركزها سطح الجسم . وفئة ذوات القناة الهضمية التي يدخل الطعام الى تجويفها الباطني بواسطة فم يمكنها من التقاط الطعام وتوجيهه .

٩٣٧٤ - خلية * Ruche (F). Bee-hive (E).

هي مأوى النحل مثل الشجرة والفنير والكوار والفسالة والمبابة .

٩٣٧٥ - خلية ، حُجيرة * Cellule (F). Cell (E).

الخلية جسم مركب زلاي المادة ذو حياة ذاتية وصورة قابلة للتغير متناهية الصغر . والخلية بوجه عام تتألف من نطفة ونواة وغشاء . ولكل من هذه الاجزاء طبيعة وميزات . والخلية اساس كل كائن حي . تتكاثر بالانقسام ومن تكاثرها تتركب الانسجة الحية || والخلايا تنقسم الى نباتية وحيوانية . فالحيوانية تعرف بالحجيرة اما النباتية فتعرف بالخلية او الخلية النباتية .

٩٣٧٦ - خلية نباتية * Cellule végétale (F).

Vegetable cell (E).

الخلية النباتية هي اصل تكوين كل نبات ومحور نموه تتميز بجدارها الصلب المركب من السليلوز .

٩٣٧٧ - خليلش Etourneau (F). Starling (E).

الخليلش طائر مشهور باسم زوزور ، اطلبه .

٩٣٧٨ - خليط Provenda (F). Provender (E).

هو العلف المركب من انواع مختلفة كالذيق والقت والفول والبن وغيرها .

٩٣٧٩ - خليود * ، مسقه ٥

Chauliodus solani (S). Chauliode, Masca (F).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الرعاسيات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفة قليلة . اعطانها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسدها شبه وشي الشكل ، مستدق المؤخر ، يطول نحو ٣٥ سم . ثوبها الى الرعدة الفضية المتفاوتة المائجات . تتميز بضخامة الرأس المكور المشبه بالشكل . شدقها واسع ، رجب وكبير . فكها الاسفل يتقدم الاعلى . اسنانها فارقة دقيقة ، مستطيلة . عيناها صغيرتان ، مستديرتان ، ماصتان . || زعانفها متباينة الاشكال . الظهرية الاولى سداسية الشع ، قريبة من الرأس ، تتميز باستطالة الشعاع الاول الذي يبدو كالسلك . الظهرية الثانية مزوانية تحتل قاعدة الذيل . زعنفتها الصدرية سفلية الارتكاز ، مجدافية الشكل ، تتأخم الزور . زعنفتها الحوضية قدية الشكل ، خلفية الارتكاز . زعنفتها الشرجية شديدة الصغر ، تقابل الظهرية الثانية . زعنفتها الذيلية فارقة || تعتبر من اسماك الاغواط المتوسطة العمق . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٣٨٠ - خليون ٥ Cheilio (S). Chéillon (F).

جنس اسماك بحرية بيوض من شائكات الزعانف وفصيلة الكيديات . انواعها المعروفة نحو ٢٠ اعطانها تحت من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || اجسامها مستطيلة الشكل . مخاطها ذلقة . أشداقها كبيرة . زعانفها الظهرية فردية مستطيلة . زعانفها الذيلية مستديرة . أثوابها متباينة الالوان ، جميعها زاهية || لحمها متوسطة الصنف مأكولة || اعرف انواعها واشهرها الخليون الاخضر الازرق .

لونها الى الحمرة الوردية المختلفة الموج | ازهاره يستمر من تموز الى آب .

٩٣٦٦ - خلود جصاص

Sempervivum calcareum (S). Joubarbe calcicole (F).

نوع من الخلود يرغب في الاتربة الجصية ، يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . اوراقه اهليلجية ملعقية . نصلها خلي البشرة . ازهاره عشكولية التجميع كثيرة البتلات المستعرضة الشفعية العدد ، لونها الى الحمرة الارجوانية الجميلة || ازهاره يستمر نحو سبعة اسابيع من تموز الى آب .

٩٣٦٧ - خلود جفري

Sempervivum flagelliforme (S). Joubarbe escour-gée (F).

نوع من الخلود يعلو نحو ١٠ سم . اوراقه بيضية الشكل مدببة العقصة . نصلها خلي الصفحة العليا لونه الى الخضار الباهت . ازهاره جعرية الشكل ، ضمية التجميع السنبل لونها احمر قاني || ازهاره يستمر شهراً واحداً من اواخر حزيران الى اواخر تموز .

٩٣٦٨ - خلود شائك Sempervivum hirtum (S).

Joubarbe hérissée (F).

نوع من الخلود يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقه سنانية النصل المزخرف البشرة ، المهذب الحافة . اهدابه جامدة شائكة . ازهاره سداسية البتلات ، جرسية الشكل ، صفراء اللون ، مهدبة الحثار || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

٩٣٦٩ - خلود عنكبوتي *

Sempervivum arachnoideum (S). Joubarbe aranéeuse (F).

نوع من الخلود يرغب في الاتربة الرملية يعلو نحو ١٢ سم . اوراقه صغيرة القد ، نصلها مدبب العقصة التي تحمل في طرفها خصلة من الخيوط البيض العنكبوتية . ازهاره مستعرضة ، بتلاتها مألسة البشرة ، قرمزية اللون . ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٣٧٠ - خلود كبير الزهر

Sempervivum globiferum (S). Joubarbe à grandes fleurs (F).

نوع من الخلود اوراقه مفلطحة ، بيضية ، اسفينية ، نصلها خلي البشرة البحرية اللون . عقصتها مدببة لونها الى الجذوة القائمة . ازهاره كبيرة القد . قطرها من ٢ الى ٤ سم . بتلاتها الى الصفرة الموشحة بالارجواني . ازهاره ضيبي يستمر نحو ١٣ اسبوعاً .

٩٣٧١ - خلود مريخ Sempervivum soboliferum (S).

Joubarbe prolifique (F).

نوع من الخلود يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقه مستطيلة نصلها مألس البشرة ، هليبي الحافة . ساقه مورقة . ازهاره سداسية البتلات المنتصبة ، جرسية الشكل ، صفراء اللون ، مهدبة الاطار || ازهاره يدوم من حزيران الى تموز .

٩٣٧٢ - خلتون Acéto (F). Acetone (E).

راجع ايتون .

٩٣٧٣ - خلتويات ، نوال Métazoaires (F).

Metazoa (E).

حيوانات مركبة تنمو بانقسام التويضة وهي تتركب من حجيرات عديدة مختلفة الشكل والوظيفة . كما انها

٩٣٩٠ - خُمَّاسِيَّيْ أَعْضَاءُ التَّأْنِيْثِ (F). Pentagyné (E).
نعت تعريفي يطلق على الازهار الخماسية المدقات اي
الاعضاء التناسلية الانثوية .

٩٣٩١ - خُمَّاسِيَّيْ الْأَجْزَاءِ (F). Pentamère (E).
نعت تعريفي يطلق على اللويحات والحشرات والنباتات
الخماسية الاجزاء .

٩٣٩٢ - خُمَّاسِيَّيْ الْأَزْهَارِ (F). Quiniflore (E).
نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره خماسية التجميع .

٩٣٩٣ - خُمَّاسِيَّيْ الْأَقْلَامِ (F). Pentastyle (E).
من النبات ما كانت مدقات ازهاره خماسية الاقلام .

٩٣٩٤ - خُمَّاسِيَّيْ الْبَتَلَاتِ (F). Pentapétale (E).
نعت تعريفي يطلق على الكأس الزهرية الخماسية البتلات .

٩٣٩٥ - خُمَّاسِيَّيْ الْبُزُورِ (F). Pentasperme (E).
نعت تعريفي يطلق على الثمار الخماسية البزور .

٩٣٩٦ - خُمَّاسِيَّيْ الصُّفُوفِ (F). Pentastique (E).
ما كان ترتيبه خماسي الصفوف .

٩٣٩٧ - خُمَّاسِيَّيْ الْفَصْلِ (F). Pentasépale (E).
من الازهار ما كان كأسها مركب من خمس فصل .

٩٣٩٨ - خُمَّاسِيَّيَاتِ الْفَوَاصِلِ ، فَكَّاسِيَّيَاتِ (F). Pentatomidae (S). Pentatomidés (F). Pentatomidae (E).
Stink bugs (E). Schildwanzen (D).

فصيلة حشرات من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفية
الجنح . عماراتها ١٥ ، اجناسها ٧٦٠ . انواعها عدة
آلاف . تتميز بقرونها الاستشعارية المركبة من خمس
فواصل . اجسامها مفلطحة مبططة . لها غدة او غدتان
تقذف منها بسائل كريحه الرائحة دفاعاً عن النفس .

٩٣٩٩ - خُمَّاسِيَّةُ الْإِسْدِيَّةِ (F). Pentstémon (E).
هي البنسون ، اطلبه .

٩٤٠٠ - خُمَّاسِيَّيْنِ (F). Dog-days (E).
وقت من الزمن يدوم ٥٠ يوماً يتميز بحمد الشديد للاهب .

٩٤٠١ - خُمَّال (F).
هو الاقطي ، اطلبه .

٩٤٠٢ - خُمَّان (F). Elder tree (E).
هو اليلسان ، اطلبه .

٩٤٠٣ - خُمَّانُ الْمَاءِ (F). Viorne lobé (E).
هو الأفلوس الأمد ، اطلبه .

٩٤٠٤ - خُمَّانُ صَغِيرٍ (F). Ground elder (E).
هو اليلسان الصغير ، اطلبه .

٩٤٠٥ - خُمَّانُ كَبِيرٍ (F). Boon tree (E).
هو اليلسان الاسود ، اطلبه .

٩٣٨١ - خَلِيُونُ أَخْضَرُ أَزْرَق * (F). Chellio cyanochloris (S). Chéllion vert bleu (F).

نوع من الخليون . اعطائه تمتد من شط العرب الى اطراف
الهند || جسمه مستطيل الشكل ، معتدل التبسيط ، يطول
من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه متراكب الاخضر والازرق .
ظهره مبقع بالاحمر . بطنه وردي اللون . زعانفه الى
الصفار الباهت تعلوه رقشة سمراء || لحمه متوسط الصنف ،
مأكول .



خليون اخضر ازرق

٩٣٨٢ - خَلِيُونُ * ، عِشْبَةُ الْخَلِيُونِ ، زَهْرَةُ
السَّلْحَفَةِ (F). Chelone (S).

Chélone, Galane (F). Balmony, Turtle head (E).
Kahler fünffaden, Schildblume (D). Galana (I).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الخنازيريات .
انواعه عديدة معظمها بري وبعضها تزييني . اوراقها
منقطة ، متقابلة . سنانية النصل المنشاري الحافة .
ازهارها سنبلية او عشكولية التجميع تاجية الارتكاز .
اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

٩٣٨٣ - خَلِيُونُ أَعْوَج (F). Chelone obliqua (S).
Galane oblique (F).

نوع من الخليون يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه اهليجية ،
سنانية معوجة النصل النعل السفل || ازهاره
خمرام اللون او بنفسجية ، سنبلية التجميع ، كؤوسها
زباء البشرة مهدبة الاطراف || ازهاره يستمر من تموز
الى ايلول .

٩٣٨٤ - خَلِيُونُ الْغَابِ (F). Chelone nemorosa (S).
Galane des bois (F).

نوع من الخليون يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه بيضية
القاعدة والزام الثاني ثم سنانية . نصلها كريحه الرائحة ،
خل السفل . ازهاره عشكولية طويلة المعاليق ،
لونها الى البنفسجي || ازهاره يستمر من تموز الى
تشرين الاول .

٩٣٨٥ - خَلِيُونُ أَمْرَطٍ (F). Chelone glabra (S).
Galane glabre (F).

نوع من الخليون يعلو من ٥٠ الى ١٣٠ سم . اوراقه
قصيرة العنق ، مستطيلة النصل المائل البشرة ، الزاهي
الخضار || ازهاره سنبلية التجميع كثيفة ، لونها الى
الابيض يعلو موج وردي || ازهاره يستمر من آب
الى تشرين الاول .

٩٣٨٦ - خَلِيُونِيَّيْ (F). Cellulaire (E). Cellular (E).
راجع حبيري .

٩٣٨٧ - خَلِيُونِيَّةٌ (F). Cellularisme (E).
Cellularism (E).
الخليوية مذهب تكوين الخلية وحياتها في النسيج الحية .

٩٣٨٨ - خَمِيم (F). Jardin inculte (E).
Uncultivated garden (E).
هو البستان المتروك غير المستعمل .


٩٣٨٩ - خَمٌّ * ، قُنٌّ ، مَدَّجَتَجَةٌ (F). Poulailier (E).
Hen-house (E).
هو مأوى الدجاج وسائر الطيور الالهية ما عدا الحمام
والمصافير .



خليون



خَم



خَمَج النَخِيل



خَل

٩٤١٩ - خَمَمَر الزَّيْبِب ، نَسِيد حُلُو

Vin de paille, V. doux (F). Sweet wine (E).
شراب كحولِي يستحصل من اختِيار عصير العنب الخفيف
بعض الوقت أو المذلي على النار .

٩٤٢٠ - خَمَمَر فَوَارَة

Vin mousseux (F).
Sparkling wine (E).
اسم شامل يطلق على جميع الخمر التي تفور عند انتزاع
سدادات قنانيها وذلك لانتفاخ الحامض الكربوني الذي
يولد تلك الفقاعات فتسبب الفوران || أشهر الخمر
الفوارة واجودها خمر شهبانيه .

٩٤٢١ - خَمَرَة ، ثَمَالَة

Lie de vin (F).
Dregs (E).
عكر النبيذ الراسب .

٩٤٢٢ - خَمَرِيَّة

Baccharide (F).
Ploughman's spikenard (E).
هي البخاريد ، اطلبها .

٩٤٢٣ - خَمَط

الخط : الحامض وقيل المر من كل شيء . وهو كل
نبت اخذ طعاماً من مرارة . وهو الحمل القليل من كل
شجر . وهو كل شجر لا شوك له . وهو ثمر الاراك .

٩٤٢٤ - خَمَط الخمر

Casse (F).
وصم يصيب الخمر فيبدل لونها الى الاسمر والازرق
والايض . سببه عفن يعتري الحب قبل اعتصامه واختاره .
يعالج الخمط الاسمر باستعمال بيسولفيت البوتاس بمعدل
٧ غ . لكل ١٠٠ ليتر نبيذ || ويعالج الخمط الازرق
باستعمال الحامض الترتري بمعدل ٢٠ غ من ٢٠ الى
٧٠ غ . لكل ١٠٠ ليتر || اما الخمط الابيض فيعالج
باستعمال الحامض الليموني بمعدل ٢٥ غ . لكل ١٠٠ ليتر .

٩٤٢٥ - خَمَل *

Salanx
جنس اسماك بحرية ونهرية من فصيلة السلمونيات .
موطنها شطوط وانهار الشرق . ترحل الى المياه العذبة في
زمن السراء فتقيم فيها نحو ٤ شهور ثم تعود فتركب البحر .
اجسامها ضيقة مستطيلة ، رؤوسها اسطوانية طويلة .
فلوسها دقيقة ، حولية الانسلاخ . انواجها الى السرة
الزيتونية تبق عند ثيج الظهر || لحومها متوسطة الصنف
سراء اللون .

٩٤٢٦ - خَمَل

Colchique d'automne (F).
Autumn crocus (E).
هو سورنجان الخريف ، اطلبه .

٩٤٢٧ - خَمَل

Plumes d'autruche (F).
Feathers of ostrich (E).
الحمل والحماله والخميلة : ريش النعام .

٩٤٢٨ - خَمَلِي

Duveté, Duveteux (F). Downy (E).
كل عمو ينشأ زغب دقيق لبد وقصير .

٩٤٢٩ - خَمَن

Estimer (F). To estimate (E).
خمن الشيء : حدد مقداره أو ثمنه .

٩٤٣٠ - خَمُود

Déferescence (F).
Defervescence (E).
هو انقطاع الفوران أو اقلعه الوقي .

٩٤٣١ - خَمُود صَيْفِي ، رُقَاد صَيْفِي

Estivation (F). Aestivation (E).
حالة وقوف النشط الانمائي في فصل الصيف من جراء
ارتفاع الحرارة أو من انحباس المطر مدة طويلة .

٩٤٠٦ - خَمَائِيَّات

Caprifoliacées (F).
Caprifoliaceae (E).
هي البيلسانيات فصيلة نباتية .

٩٤٠٧ - خَمَائِر أُمُونِيَاكِيَّة ، خَمَائِر نَشَادِيرِيَّة

Ferments ammoniacaux (F). Ammoniacal ferments (E).
هي الخمائر التي تحول البولة الى كربونات الامونياك ،
والأزوت العضوي الى أزوت امونياكي .

٩٤٠٨ - خَمَائِر شَحْمِيَّة

Lipases (F).
هي الخمائر المنحلة الموجودة في معظم العصارات الهضمية
والتي تمكن اماعة الدسيات .

٩٤٠٩ - خَمَائِر كِيمَاوِيَّة

Ferments chimiques, Ferments solubles (F). Chemical ferments (E).
خمائر تفرزها بعض الخلايا النباتية والحيوانية ، من ميزاتها
الخاصة الذوبان في الماء وتحويل بعض المواد .

٩٤١٠ - خَمَائِر لَبَنِيَّة

Ferments lactiques (F). Lacticus ferments (E).
هي الميكروبات الخاصة التي تحول سكر اللبن الى حامض
لبنِي .

٩٤١١ - خَمَج ٥

Mauginiella (S). Khamedj (F).
جنس فطور مجهرية ، وحيد النوع ، من التوسيات
وفصيلة الوطحيات . شيجه خارجي الانتشاح تعلوه
خيوط زغبية عمودية الارتكاز . كئائله اسطوانية وحيدة
أو متعددة الخلايا ، مؤثرة وغير مخنوقة . بويضاته
مستديرة الاطراف .

٩٤١٢ - خَمَج النَخِيل ٥ ، دَمَن ٥ ، أَدَمَان ٥

Mauginiella scaettae (S). Khamedj du dattier (F).
فطر مجهري يركب كافور النخل فيعطب الطلعة . مظهره
الخارجي يقع لاقامية الشكل والحجم تصيب الكافور
فتبدو شقراء اللون ثم تنحرف الى الصفرة العابقة تحيطها
هالات حنطية نتابعة وتعلوها نقط سمر مبعثرة || يكافح
عند ظهوره باستعمال سائل بوردو المحلول ١٥٪ أو
مسحوق النحاس والكلس بمعدل كيلو سلفات النحاس
مع ٢ كيلو كلس حراق تعفيراً على الطلعة أو ذراً على
الكافور .

٩٤١٣ - خَمَجَر ، خَمَجَر

Eau légèrement saumâtre (F).
الخمجرج والخماجر الماء الذي لا يبلغ الاجاج وتشربه
الدواب .

٩٤١٤ - خَمَخِيم

Giroflée livide (F).
Gilliflower (E).
هو المشتور البري ، اطلبه .

٩٤١٥ - خَمَخُم

Crabe, Cantre (F). Crab (E).
دورية بحرية تعرف بالسرطان .

٩٤١٦ - خَمَخَمَة

صوت الفرس اذا طلب العلف .

٩٤١٧ - خَمَر ، نَسِيد ، رَاح ، عَقَار ، مَدَام

Vin (F). Wine (E).
شراب كحولِي يحصل من اختِيار عصير العنب .

٩٤١٨ - خَمَر التَفَاح

Cidre (F). Cider (E).
هي السيدر عصير التفاح المختمر .

٩٤٤٤ - خميرة النتروجية

Ferment nitrificateur (F). Nitro bacteriz (E).

هي التي تحول الاملاح الامونياكية الى نيتريت ومنها الى نترات قابل التمثيل فالامتصاص من النبات .

٩٤٤٥ - خميرة إهليلجية * ، دردية

Saccharomyces ellipsoideus (S). Levure elliptique (F).

شكلها إهليلجي . من خمائر عصير العنب والنبيذ ، مقطوعيتها الكحولية جيدة تفوق مقطوعية الخميرة النحلية .

٩٤٤٦ - خميرة باستور

Saccharomyces pastorianus (S). Levure de Pasteur (F).

من خمائر العصير والنبيذ . شكلها قضيبى لا قياسي الالتحام والانشعاب . عملها بطيء تقوم به عند اقتراب التخمر من النهاية .

٩٤٤٧ - خميرة مخاطية ، ميكودرمة

Mycoderma (S). Mycoderme (F). Mycoderma (E).

اسم تعريفي يطلق على بعض الخمائر الطوائية النشاط التي تطفو وتتكاثر على سطوح العصارات المختمرة السكرية .

٩٤٤٨ - خميرة نحلية

Saccharomyces apiculatus (S). Levure apiculée (F).

خيرة الثمار الحلوة الناضجة . تبقى حتى التخمر اذا كان الوسط معتدل المادة السكرية لانها تحشى فرط السكر . وهي من خمائر النبيذ المعروفة || شكلها بيضي مستطيل تحمل في كل من قطبيها حمة مستدقة كحمة النحل .

٩٤٤٩ - خمير صلب

Levretté (F). Slim (E).

ضامر البطن كالسلوقي .

٩٤٥٠ - خمير الحميم : اللبن ساعة يحلب .

٩٤٥١ - خميرة

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الفويات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها حوض البحر المتوسط . جميعها جنية متسلقة دقيقة الفروع : اوراقها متقابلة صغيرة القد سنانية النصال . ازهارها شفعية التجميع ، خصية الشكل ، طرفية الارتكاز ، صغيرة القد ، مستطيلة ، بيضاء اللون او وردية || اوراقها وازهارها كريهة الرائحة المستهجنة .

٩٤٥٢ - خنابة

Narine (F). Nostril (E).

الخنابة هي سم الانف . والخنابتان : سما الانف .

٩٤٥٣ - خنابلة

Androgynie (F). Androgyny (E).

صفة الخنثى او الخنثى .

٩٤٥٤ - خنازر

Zonure (F).

جنس عظام من فصيلة الخنازريات . انواعه اربعة موطنها البلاد الحارة الافريقية والاسيوية . جميعها متوسطة القد . اثوابها الى السمرة الطحلاء . حراشفها صغيرة متراكبة . قوتها الحشرات والهوام .

٩٤٥٥ - خنازريات

Zonuridae (S).

Zonuridés (F). Zonuridae (E).

فصيلة حيوانات زحانة من رتبة اللفلانيات . اجناسها وانواعها قليلة العدد . اعرفها واشهرها الخناز .

٩٤٥٦ - خنازيريات

Scrophulariaceae (S).

Scrophulariacées, Personées (F). Scrophulariaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها عديدة .

٩٤٣٢ - خمير *

Evernia (S). Evernie (F). Evernia, Crottle lichen (E). Astflechte, Bandflechte (D). Evernia (I).

جنس من الخزاز انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . بعضها طيبى وصباغي يعيش على جذوع السديان والتنوب والخوخ || أشهره خير اذار Evernia furfuracea الذي ينفع داء النقطة وهو يركب الخوخ في المواقع الرطبة .

٩٤٣٣ - خميرة

Saccharomyces (S).

Ferment, Levure (F).

الخمائر فطور مجهرية مكونة من خلية كروية او بيضية الشكل متعضية قادرة على تحويل المواد العضوية . والخمائر عديدة منها العادية والكيماوية وخمائر الكحول والنتيجة .

٩٤٣٤ - خميرة الانحلال

Hydrogénase, Réductase (F). Reductase (E).

دياستاز هيدروجينية توجد في الحليب والكثاء تتمكن ، في بيئة خاصة وظروف معينة ، من تحويل الحليب وحله .

٩٤٣٥ - خميرة البيرة ، خميرة الجعة

Saccharomyces cerevisiae (S). Levure de bière (F).

Barm (E).

لها نوعان المرتفعة والمنحدرة فالمرتفعة تجتمع كالأكداس المتشعبة وتقوم بعملها التخمرى بين ١٢ و ٢٠ °سغ . خلاياها تطفو على سطح السوائل || اما المنحدرة فتجتمع اثنتين اثنتين وتقوم بعملها التخمرى بين ٤ و ٨ °سغ . خلاياها تركد في القعر .

٩٤٣٦ - خميرة التأكسد

Oxydase (F).

دياستاز (خميرة منحلة) تتميز بخاصيتها المؤكسدة في المواد العضوية .

٩٤٣٧ - خميرة الخل

Ferment acétique (F).

خميرة تحول الكحول الى حامض خلوي .

٩٤٣٨ - خميرة الخل المخاطية ، ميكودرمة

Mycoderma aceti (S).

Mycoderme du vinaigre (F). Mycoderma aceti,

Mother of vinegar (E).

تسبب مضر الخل وقد تأتي غالباً بعد ميكودرمه الخمر .

٩٤٣٩ - خميرة الخمر المخاطية *

Mycoderma vini (S). Mycoderme du vin (F). Myco-

derma vini (E).

نوع من الميكودرمه يركب الخمر فيفسدها .

٩٤٤٠ - خميرة الدار

Leontice commun (F).

هي عسلج الاسد ، اطلبه .

٩٤٤١ - خميرة السيلر

Saccharomyces mali (S).

Levure de cidre (F).

لها نوعان عملها يقوم على تخمير عصير التفاح بالاشتراك مع الخميرة النحلية .

٩٤٤٢ - خميرة العجين *

Levain (F). Leaven (E).

هي العجينة المختمرة التي تضاف الى العجين فيختمر .

٩٤٤٣ - خميرة اللبن


Ferment lactique (F).

Ferment lactic (E).


خميرة تحول سكر اللبن الى حامض لبني .




خير




خميرة البيرة



خميرة الخل المخاطية



خميرة الخمر المخاطية



خميرة العجين



خميرة اهليلجية



خنّازيرية الصحراء



خنّازيرية الكلاب



خنّازيرية المناقع



خنّازيرية عقدا



خنجر

٩٤٦٢ - خَنْسَاس

داء يصيب الزرع فيتجعش منه ولا يطول .

٩٤٦٣ - خَنْسَافَس

Escarbots (F). Histers (E).

اسم شامل يطلق على عدة حشرات من غمديات الاجنحة .
واحدھا خنفساء .

٩٤٦٤ - خَنْسَاقَة

Butteuse, Buttoir (F).

Ridging-plough (E).

هي المكنمة محراث خاص يستعمل لكم اي تخنيق المزروعات .

٩٤٦٥ - خَنْسَان ، خَنْسَاق الخليل

Gourme (F).

Strongles (E).

مرض ميكروبي سار يصيب جهاز التنفس في الخليل .

٩٤٦٦ - خَنْسِيث

Sybarite (F). Sybarite (E).

الخنث من كان مفهومه للحياة الترف والحمول .

٩٤٦٧ - خَنْشُوعَة

Renarde (F). She-fox, Vixen (E).

الانثى من الثعالب (الديري) .

٩٤٦٨ - خَنْشَى

Hermaphrodite

الخنثى من النبات ما كانت زهرته تحوى اعضاء الذكر
والتأنيث اي الاسدية والمدقة || والخنثى من الحيوان ما
كان يحمل في آن واحد اعضاء التناسل الذكورية والانثوية .
والخنثاء فوادى الا في بعض الحيوانات الدنيا كالحلزون
والبلق .

٩٤٦٩ - خَنْشَى كَدَّاب

Narthécia des marais (F).

Bog asphodel (E). هو الكرمدان المنقي ، اطلبه .

٩٤٧٠ - خَنْشَى

Sybaritique (F). Sybaritic (E).

نعت تعريفي يطلق على من يعيش حياة الخنث .

٩٤٧١ - خَنْشِيَّة

Hermaphrodisme (F).

Hermaphroditism (E).

هي وجود الاعضاء التناسلية للذكور والاناث في جسم واحد .

٩٤٧٢ - خَنْشِيَّة

Sybaritisme (F). Sybaritism (E).

الخنثية مذهب الذين يعيشون بالترف والحمول .

٩٤٧٣ - خَنْجَر * ، مِيكْرُوسْتُوم

Microstoma (S). Microstome, Serpe microstome (F). Microstome (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات . انواعه المعروفة
ثلاثة اعطائها بحار المناطق المعتدلة الحرارة . منها نوع
يكثّر وجوده في البحر الابيض المتوسط . جسمه مستطيل
الشكل كالخنجر بطول نحو ٢٠ سم . عيانه كبيرتان ،
بارزتان . زعنفته الذيلية فارقة . ثوبه الى الوردية الفضية .
زعانفه صفراء || لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٤ - خَنْجُولَة ٥

Megalops (S).

Mégalope (F). Megalops (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة البسميات . انواعها
المعروفة ثلاثة ، اعطائها بحار البلاد الحارة . مسرحها
الاغواط والمهادج والنقاف . وتدخل الاغوار . قوتها الاسماك
الصغيرة . تمخر الماء بسرعة وتقفز فوق سطحه || اجسامها
كبيرة ، اهليلجية ، تطول من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم .
رؤوسها مخروطية . اشدانها كبيرة . ألوانها الى الكهبة

معظمها جنبيات واعشاب معمرة . اوراقها متقابلة بيضية
لسنة . ازهارها عنقودي او عثكولي التجميع . الشجر
انواعها عشبة البواسير وعرف الديك وانف العجل وزهرة
القمع النخ .

٩٤٥٧ - خَنْنَازِيرِيَّة

Scrophularia (S).

Scrofulaire, Scrophulaire (F). Figwort (E).

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الخنازيريات .
انواعها نحو ١١٢ معظمها بري وبعضها تربييني . تكثر
فيها النباتات الحولية ثم الحولية والمعمرة . جميعها سبروتية
كريمة الرائحة . سوقها منتصبه مربعة الزوايا والصلوع .
اوراقها كاملة معتقة لاقياسية الترتيب . نصلها مسنن
الحافة ، مدبب العقصة . ازهارها ابطية وهامية الارتكاز ،
لاقياسية التجميع ، صغيرة القد عديدة الالوان يكثر فيها
الارجواني الاخضر الموج والاحمر والاصفر . تويجاتها
خماسية الفصوص الانظامية الترتيب || اشهر انواعها
ما يلي .

٩٤٥٨ - خَنْنَازِيرِيَّة الصَّحْرَاء * ، قَرْصَه ، زَيْتَه

Scrophularia saharae (S). Scrofulaire du désert (F).

Desert figwort (E). Arabischer braunwurz (D).

Scrophularia dei deserti (I).

عشبة برية حولية تعلق من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقها
معتقة متقابلة . نصلها سناني الشكل ، جامد الصفحة ،
متباعد التسنين . ازهارها هامية الارتكاز . قنوية التجميع ،
صغيرة القد ، صفراء اللون .

٩٤٥٩ - خَنْنَازِيرِيَّة الكِلَاب *

Scrophularia canina (S). Scrofulaire des chiens (F).

Dog's rue (E). Hundsbraunwurz (D). Ruta canina,

R. di cane (I).

عشبة برية حولية تثبت في البور والحقول تعلق من ٢/٥
الى ٤٠ سم . ساقها قليلة الفروع . اوراقها معتقة متقابلة .
نصلها اهليلجي الشكل مسنن الحافة . ازهارها ابطية
وهامية الارتكاز ، عذقية التجميع ، صغيرة القد ، حمراء اللون .

٩٤٦٠ - خَنْنَازِيرِيَّة المِنَاقِع * ، حَشِيَّة الخَنْنَازِير

Scrophularia aquatica (S). Scrofulaire aquatique,

Bétoine d'eau (F). Brook, Water figwort, Water

betony (E). Wasserbraunwurz (D). Scrophularia ac-

quatica, Erba del sedere (I).

عشبة برية معمرة تعلق من ٥٠ الى ٩٠ سم . ساقها فرعاء .
اوراقها السفلى متقابلة والعليا متعاقبة . نصلها اهليلجي
الشكل ، مدبب الزام الاخير ، متباعد التسنين . ازهارها
محورية وهامية الارتكاز ، عنقودية التجميع . صغيرة القد
حمراء اللون .

٩٤٦١ - خَنْنَازِيرِيَّة عَقْدَاء * ، عَشْبَة البَوَاسِير

Scrophularia nodosa (S).

Scrofulaire noueuse, S. des bois, Herbe du siège,

Herbe aux hémorroïdes (F) Figwort, Great pile-

wort, Knotted figwort (E). Knotige braunwurz (D).

Scrophularia maggiore, Erba da emorroidi,

Castagnola (I).

عشبة برية معمرة . اروعيتها عقدا . ساقها منتصبه . اوراقها
متقابلة ، نصلها قلبي الشكل ، مسنن الحمار ، مدبب
العقصة . ازهارها هامية الارتكاز قنوية التجميع لونها
الى الحمرة الخضراء الموج || يقال ان عصارة سوقها
واوراقها ومسحوق بزورها تقضي على البواسير اذا استعملت
تليخا .

الاراضي الزراعية وضفاف المنافع ومجاري الماء . عكديتها سعة متوسطة الرحابة تنسجها بين الحجارة أو بين اشطاء النبات || مسرحها دجوي يستمر طوال الليل . تسعى وراء قنصها ركضاً في البر وعلى صفحة الماء . قوتها الحشرات واساريها ويرقاتها والذباب والهلوم || ملجئها التناسلي لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب واللائثي تقضي على الذكر بعد الكرم || لسعتها مؤلمة لكنها قليلة الأذى .

٩٤٨١ - خَنْدَرَقِيَّات Lycosidae (S).
Lycosidés (F). Lycosidae, Wolf-spiders (E). Wolf-spinnen (D).

فصيلة من العناكب تشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع . جميعها قانصة . اناثها تحمل مكنتها في جراب شرجي يتسع الى اكثر من مئة مكنة تبقى الى حين نطقها . اشهر اجناسها الخندرق والرتلاء .

٩٤٨٢ - خَنْدَرُوس Epeautre (F). Speit wheat (E).
هو الخنطة الرومية ، اطلبها .

٩٤٨٣ - خَنْدَق ، مَشْبَرَة Fossé (F). Drain (E).

٩٤٨٤ - خَنْدَل Chute d'eau (F). Falls (E).
الخدل كالشلال منحدر مائي يعترض مجرى النهر .

٩٤٨٥ - خَنْدَوِيل * ، مَرِيرَة Chondrilla (S). Chondrille, Jxérís (F). Chondrilla, Gum succory (E). Grosser krümling, Krümelsalat (D). Condrilla, Lattaiola (I).

نبات عشبي بري طيب حولي مبدول من فصيلة المركبات . اعطائه الشرق الادنى واروبه الجنوبية والغربية . ساقه فراء . اوراقه تشبه اوراق الهندباء ، فصلها مسنن الختار . ازهاره الى الحمرة . اوراقه مرة الطعم مأكولة نافعة . سوقه تنضج مادة صمغية جامدة شفافة . عصارة سوقه حلابية لزجة || يقال ان صمغه يشفي من السل ويسقط البواسير والالجنة ويدبر الدم ويفتت الحصى .

٩٤٨٦ - خَنْدِيل ، طَوَاشِي Cheval castré, C. châtré, Hongre (F). Gelded (E).
هو الحصى من الخيل وهو ما انتزعت أو سلت خصيتاه .

٩٤٨٧ - خِنْزَارَة ، زَرْيَبَة الخَنْزِير Porcherie (F). Pigsty, Piggery (E).
بناء خاص بالخنازير عد حسب مقتضيات التربية وما توجيه العناية الصحية .

٩٤٨٨ - خَنْزُرَان Verrat (F). Boar (E).
هو الخنزير الذكر .

٩٤٨٩ - خِنْزِير Sus (S).
Porc (F). Pig, Swine, Hog (E).

جنس حيوان من فصيلة الخنزيريات منه الوحشي والداجن فالوحشي عديد الانواع اما الداجن فوحيد النوع عديد الضروب والسلالات || جسمه اسطواني الشكل ، عنقه قصيرة غليظة ، راسه ضخم اسفني الشكل ينتهي بفنطليسة مستطيلة مقطومة . له نبيان مستطيلان بارزان مرتفعان . قوائم قصيرة . يسافد عند بلوغه تسعة اشهر . اناثه تحمل نحو ثلاثة اشهر وثلاثة اسابيع وتضع من ٤ الى ١٤ خنوص . اطباؤها ٦ او ٧ ازواج || قوته الاعشاب والجذور والحبوب واللحوم والحيات يفترسها لا يخشى

الخنضراء الموج . تشتد سميتها عند الظهر المسطح وتصفر عند البطن . زعافها الظهرية والذيلية فارقة || اعرف انواعها واشهرها خنجولة الاطلسي وخنجولة الهادي .

٩٤٧٥ - خَنْجُولَةُ الْأَطْلَسِي *o

Megalops atlanticus (S).

Mégaloïpe de l'Atlantique, Tarpon (F).

نوع من الخنجولة . سمكة بحرية بيوض . طولها يراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . اعطائها المناطق الحارة من المحيط الاطلسي || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٦ - خَنْجُولَةُ الْهَادِي o

Megalops cyprinoides (S).

Mégaloïpe du Pacifique, Œil-de-bœuf (F).

نوع من الخنجولة . سمكة بحرية بيوض . طولها يراوح من ١٦٠ الى ٢٠٠ سم . اعطائها المناطق الحارة من المحيط الهادي والهندي . تتميز . بعينها الكبيرتين الجاحظتين || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٤٧٧ - خَنْدَاعَة كَبِيرَة الرَّأْس o

Platysternum megacephalum (S).

Platysterné mégacéphale, Tortue à grosse tête (F).

سلحفاة من فصيلة الخنداعيات . موطنها يمتد من الهند الى اطراف الصين || جسمها متوسط القد ، يطول من ٣٨ الى ٥٠ سم . ذبلها يغطي الشوزن ، معتدل الاحدياب ، يطول من ١٥ الى ٢٠ سم . كنفها منبسط الصفحة . رأسها كبير الجرم ، افطح الخطم . عنقها معتدل الغلاظة والطول . ذنبها عادم العرف طوله يضاهي طول الذبل || تعيش في مياه الجداول . قوتها كل ما تستطيع الوصول اليه من ضفادع وعطاء وثعابين وديدان وجيف في قعر الاغوار .

٩٤٧٨ - خَنْدَاعِيَّات o Platysternidae (S).

Platysternidés (F). Platysternidae (E).

فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . انواعها المتحجرة الغابرة عديدة اما المعاصر منها فواحد ، ويدعى خنداعة كبيرة الرأس .

٩٤٧٩ - خَنْدَرَق * ، عَنَكَبُوتَة ذُنَيْبَة


Lycosa (S). Lycose, Araignée-loup (F). Wolf-spider (E).

جنس عناكب قانصة مفترسة من فصيلة الخندرقيات . انواعه نحو ٤٠٠ اعطائها جميع البلاد المعتدلة الحرارة . تتميز باجسامها الربعة المتوسطة القد وبجرامزها النشيطة الرباعية الأزواج .

٩٤٨٠ - خَنْدَرَق قُرْصَان *o Lycosa piratica (S).

Lycose pirate, Araignée loup (F). Wolf-Spider (E).

دويبة من العناكب الذئبية الساعية القانصة من فصيلة الخندرقيات . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم || جسمها صغير القد ، يطول عند الذكر نحو ٧ سم . وعند الانثى نحو ١٢ سم . صدراسها مستطيل الجرم ، يغطي الشوزن ، حنطي اللون ، اسمر الموج ، عيناها زرقمتان . شيفافها صغيران ضليعان . فكاهما مرفقي الشكل ، معتدلا الطول . جرامزها مستطيلة ، مستدقة الاطراف . كثيرة الطلب . بطنها يرسمي الشكل ، ثنائي الروايا ، سداسي المشاتن ، حنطي اللون ، اكهب الموج تعلوه ست تزاويق سود اصغرهما قدماً اقربها من الطرف || تألف



خنجولة الاطلسي



خندرق



خندرق قرصان




خندويل




خنزير الأرض



خنزير الماء



خنزير بري



خنزير داجن



خنشار أصفر



خنشار أنثى

والفرنسية والاطالية والالمانية والبلفارية والرومانية والبولندية والتركية والاسبوية والامريكية || وهو حيوان مبشار ، اكول ، شره . جهازه الهضمي بسيط التركيب ، مذاخره متوسطة الطول . لذلك فهو يهضم جميع المواد الغذائية ويستفيد منها شرط ان لا تتوافر فيها نسبة السيلولوز . اعضاءه التناسلية الذكورية خالية من الحويصلات الشلخية لذلك فكوبه يطول بعض الوقت ريثما تفرز الغدد ما يلزم من شلخ . يسافد الذكر بعمد ١٢ شهر والانثى بعمد ٩ شهور . ودقاتها شهري حملها يستمر من ١١٠ الى ١٢٠ يوماً . يقولون ثلاثة اشهر وثلاثة اسابيع وثلاثة ايام .

٩٤٩٩ - خنزيرة
Truie (F). Sow (E).
انثى الخنزير .

٩٥٠٠ - خنزيرة
Treuil (F). Windlass (E).
هي الملفاف آلة بسيطة تستعمل لرفع بعض الاثقال .

٩٥٠١ - خنزيرة ، ذاء الخنازير
Ladrerie (F).
Mustiness (E).
مرض طفيل يعتبر من العيوب المبطله البيع . سببه الدودة الوحيدة .

٩٥٠٢ - خنزيريات
Suldés, Sétigères (F).
Suldae (E).
فصيلة الخنازير من رتبة مزدوجات الاصابع الجسديات اي صفيقات الجلد . اجناسها خمسة الخنزير والحلوف والبايروسة والحلاج والحلوف .

٩٥٠٣ - خنّس
Planètes (F). Planets (E).
الخنس الكواكب السيارة الثمانية التابعة لمجموعة النظام الشمسي . وهي بالنسبة الى ابتعادها عن الشمس عطارد الزهرة المريخ المشتري زحل اورانوس نبتون وبلطون يضاف اليها الارض لانها كوكب سيار اما مركزها فيأتي بعد الزهرة وقبل المريخ .

٩٥٠٤ - خنّسَاء الخنساء : البقرة الوحشية .

٩٥٠٥ - خنشار
Polypodium (S).
Polypode (F). Polypody (E).
نوع من السراخس البرية والبريانية المعمرة . اروعته مدادة لحمية حلوة الطعم . اوراقه غروية ، ثنائية الصنف ، متماثلة ، اهليلجية الشكل ، جامدة النصل ، كثيرة التفريش والتشريح || يرغب في الارربة الرطبة الظليلة .

٩٥٠٦ - خنشار أصفر
Polypodium aureum (S). Polypode doré, P. jaune (F). Golden polypody, Hares-foot fern (E). Gelber engelsüss (D). Polipodio (I).
نبات عشبي بري وزيتوني معمر من السراخس البسياسيات . يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . يرغب في الاماكن الظليلة الرطبة . يعيش في جميع الارربة . اوراقه مركبة فارشة شديدة التفريش والتشريح ، لونها الى الخضار الفسقي يعلو حواج اصفر .

٩٥٠٧ - خنشار أنثى
Polypodium filix-femina, Athyrium filix-femina (S). Polypode femelle, Fougère femelle (F). Lady fern, Female polypody (E). Waldstreifenfarn, Weiblicherschildfarn (D). Polipodio felce femmina (I).
نبات عشبي بري وزيتوني معمر من السراخس يعلو من

سمومها || كنيته عن الدميري : ابو جهم ، ابو زرع ، ابو دلف ابو عتبة ، ابو علي وابوقادم .

٩٤٩٠ - خنزير أبو قرن
Phacochoère (F).
African sanglier, Wart hog (E).
هو الحلوف من فصيلة الخنازير ، اطلبه .

٩٤٩١ - خنزير الأرض ، أبو أظلاف ، دوتيل
Orycteropus (S). Oryctérope, Cochon de terre (F).
Aard-vark, Earth pig (E).
جنس حيوانات افريقية لبونة من الناملات ورتبة الدرد . انواعه ثلاثة اشهرها الحبشي وهو كبير الجثة ، بطي الحركة ، صغير الرأس ، مستطيل الفمطية . اذنا كبيرتان مستطيلتان منتصبتان . جلده خشن سميك . عليه كثيف قصير . قوائمه قوية . مقاطعه حادة تمكنه من احتفر التربة مهيا صلبت . طوله نحو ١٤٠ سم . وذنيه ٥٠ . ثوبه اسمر حطلي سوي اللون تعلوه ماجة صهباء || قوته الارضة والنمل يلتقنها بلسانه الطويل . يعيش منفرداً مسرحه من الغروب الى الشروق . اناته تضع جرواً واحداً ترضعه بضعة اشهر .

٩٤٩٢ - خنزير البحر
Marsoulin (F). Porpoise (E).
هو النخس من الحيتان الدلفينية .

٩٤٩٣ - خنزير الماء
Hydrochœrus (S).
Cabiats, Capybara, Carpincho, Cochon d'eau (F).
Capybara (E).
حيوان لبون من القوارض وحيد الجنس والنوع . موطنه امريكا الجنوبية . ضمن الجثة ، ثقيل الحركة ، ابر الذيل . راسه مستطيل غليظ . شفته العليا مشرومة شارفة . عيناه بارزتان . اذناه مستديرتان ذلقتان . قوائمه قوية . طوله نحو ١١٥ سم . علوه ٥٠ وزله من ٤٥ الى ٥٥ كيلو . ثوبه الى الصبغة الخطية الصفراء || يألف المناقع وضفاف الانهر . يعيش جماعات متوسطة العدد . الانثى تضع نحو ٥ جراء مرة واحدة في العام . قوته الاعشاب المائية والجنود والارز والذره والبطيخ الخ .

٩٤٩٤ - خنزير النهر
Potamochœre (F).
River hog (E).
هو الحلوف ، اطلبه .

٩٤٩٥ - خنزير الهند
Cobaye (F). Cavia (E).
هو الكويبي ، اطلبه .

٩٤٩٦ - خنزير بحري
Sangler (F).
Boar-fish (E).
سمكة بحرية تدعى كبروس خنزيري ، اطلبها .

٩٤٩٧ - خنزير بري ، رت ، عفر
Sus (S). Sanglier (F). Wild boar (E).
انواعه عديدة جميعها من حيوانات العالم القديم . رؤوسها غروطية ، فنانطيسها مستطيلة مقطوعة . اذناها متوسطة القد منتصبه . قوائمها قصيرة . جلودها كثيفة اطلب . اذناها دقيقة مستطيلة ملتفة || تألف النباتات والمستنقعات تسرح في الليل . قوتها الجنود والكم والديدان والحلزون والبيض والفار والحبوب والبلوط والبطاطا واللفت والحيات على اختلافها || انواعه عديدة اطلبها في مادة رت .

٩٤٩٨ - خنزير داجن
Sus domesticus (S).
Cochon, Porc (F). Pig, Swine (E).
نوع من الخنزير عديد الصروب والسلالات منها الانكليزية

٩٥٢٠ - خُنْفُسَاءُ الْأَنْبَارِ (S). Tribolium castaneum (S).
Petit ver de la farine (F). Rust-red flour beetle (E).
Reismehlkäfer (D).

حشرة من الغبشيات . اطلب تريبوليوم .

٩٥٢١ - خُنْفُسَاءُ الْبَطَاطَا

هي دوريفور البطاطا . اطلبها .

٩٥٢٢ - خُنْفُسَاءُ التُّفَاحِ

Anthonome du pommier (F). Apple blossom weevil (E). Apfelblütenstecher (D).

هي أنتونوم التفاح حشرة من السوسيات . اطلبها .

٩٥٢٣ - خُنْفُسَاءُ الْجَزَرِ * ، مُوَلِيتُ قَرْنَاءَ

Molytus coronatus, Liparus coronatus (S). Molyte cornée (F).

حشرة من فصيلة السيسيات ورقية غمديات الاجنحة . طولها نحو ١٢ مم . لونها الى السواد اللامع تعلوه بقع صفراء . الانثى ترمي بمكها في التربة فينقذ عن يرقات تنقب جذور الجزر والشوندر وتخلد فيها الانفاق والسرايب .

٩٥٢٤ - خُنْفُسَاءُ الشُّوْتُوْدَرِ

Atomaire de la betterave (F).

حشرة مؤذية تتركب الشوندر وتدعى اتوماريه خطية . اطلبها .

٩٥٢٥ - خُنْفُسَاءُ الْفَصَّةِ * ، فَيْتُونُومُ الْفَصَّةِ

Phytonomus variabilis (S). Phytonome variable, P. de la luzerne, Babotte grise (F). Lucerne weevil, Alfalfa weevil (E). Luzerneblattnager (D).

حشرة من السوسيات طولها نحو ٥ مم . لونها كستني اغبر . تظهر في اذار تمتج مكها على سوق واوراق الفصة فينقذ عن يرقات تلتهم النصل وتبقى على المروق . وقد تركب النفل والملفوف والبطاطا .

٩٥٢٦ - خُنْفُسَاءُ الْوَرَقِ

Galéruque (F). Strawberry leaf beetle (E). Erdbeerblattkäfer (D).

حشرة من النضاريات تسمى الغرلوق .

٩٥٢٧ - خُنْفُسَاءُ بَبْرِيَّةِ

Cicindèle (F).

هي السيستيديل ، اطلبها .

٩٥٢٨ - خُنْفُسَاءُ بَرْغُولِيَّةِ

Puce de terre (F).

خنفساء صغيرة القد تركب الصليبيات ومشاغل الحس والتبع . اطلب خدوش .

٩٥٢٩ - خُنْفُسَاءُ كَاتِبَةِ

Ecrivain (F).

هي بروس الجفنة ، اطلبه .

٩٥٣٠ - خُنْفُسِيَّاتُ بَبْرِيَّةِ ، سَيْسَنْدِيلِيَّاتُ

Cicindélidés (F). Cicindelidae (E).

فصيلة الخنافس الببرية وهي حشرات من غمدات الاجنحة . اطلب سيستيديليات .

٩٥٣١ - خَنْق

Etouffage (F). Stifling (E).

هو خنق خادرات دود القز في الصلابة وذلك بواسطة الحرارة الرطبة او الناشفة .

٤٠ الى ١٢٠ سم . يعيش في الاماكن الظليلة الرطبة . اوراقه ضمية التجميع قمية الارتكاز جميلة الخضار الباهت كثيرة التفريض والتشريع . زكائمه كلوية الشكل مهدبة الفشاء || يزرع ويحصد في جميع الاودية ، يخشى المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس .

٩٥٠٨ - خُنْشَار كَبِير

Fougère commune (F). Eagle fern (E).

هو الديشار ، اطلبه .

٩٥٠٩ - خَنْشَع

Rousserole turdoïde (F). Great reed warbler (E).

هو هازجة القصب ، اطلبها .

٩٥١٠ - خَنْشَعُ الزَيْتُونِ

Hypolais des oliviers (F).

طائر من الذعاليق وفصيلة الشحروريات . اطلب ذعلوقة الزيتون .

٩٥١١ - خَنْشَعُ الْمَصْفَافِ

Hypolais icterine (F).

طائر مشهور باسم ذعلوقة المصفاة ، اطلبها .

٩٥١٢ - خَنْشَعُ ثُرَّارِ

Hypolais polyglotte (F).

اطلب ذعلوقة ثرارة .

٩٥١٣ - خُنْشُولُ *

Janthocincla ocellata (S). Janthocincla ocellé (F).

طائر يلفت النظر بحسن تقاطيعه من فصيلة التيمليات . موطنه بعض اصقاع الهند اخصها جبال خللا . يالف الادغال والبراري والاحراج المبعثرة الاشجار . ملجئه الحياتي جماعي ، جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والدويبات والبروز البرية || جسمه منسجم التكوين يطول نحو ٣٠ سم . رأسه معتدل الجرم . منقاده مخروطي صغير . جناحاه ذلقا الاطراف . ذنبه مروحي الشكل مستطيل . ساقاه معتدلتا الارتفاع . ثوبه متراكب الشقحة والصهبة والسمة السوداء . رأسه ومخسراه وزوره الى السواد اللامع . رداؤه وجناحاه منمشان بالابيض والاصفر . حنار ذنبه ابيض || يدثن عشه في الادغال القليلة الارتفاع عن سطح الارض . الانثى تحضن وحدها من ٥ الى ٧ بيضات بيضا الذكر يؤمن لها الغذاء .

٩٥١٤ - خِنْصِير

Auriculaire (F). Little finger (E).

الخنصر والخنصر الاصبع الصغرى من اليد . ج خناصر .

٩٥١٥ - خِنْصِيصُ

الخنصيص : ولد البير .

٩٥١٦ - خَنْطَلُ

Chat sauvage (F). Wild cat (E).

هو السنور الوحشي ، اطلبه .

٩٥١٧ - خَنْطَبَةُ

دوية (اللسان) .

٩٥١٨ - خُنْفُسَاءُ

Coléoptère (F). Coleopter (E).

كل حشرة من غمدات الاجنحة مها كانت فصيلتها .

٩٥١٩ - خُنْفُسَاءُ الْإِجَاصِ ، خُنْفُسَاءُ الْكُمْتَرِي

Anthonome du poirier (F). Apple bud weevil (E). Birnknochenstecher (D).


حشرة من السوسيات . راجع أنتونوم الاجاص .



خنشول



خنفساء الجزر



خنفساء الفصة



خُنْكَار

٩٥٤٢ - خَوَّاث ٥ Bousier (F). Dung-beetle (E).

نمت تعريفني يطلق على بعض اجناس الحشرات من سمكات الاجنحة تعيش على الخثي وغيره من المواد البرازية .

٩٥٤٣ - خَوَّار Mugissement (F). Bellowing (E).

صوت البقر وجزارها وعجيجها وتثيجها .

٩٥٤٤ - خَوَّارَة Meuble (F).

Light, Mellow soil, Loose ground (E).
التربة الخوارة : اللينة السهلة . ج خور .

٩٥٤٥ - خَوَّاف Eudromias (S).

Guignard (F). Eudromias (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة الزقازقيات . انواعه المعروفة اربعة جميعها صغيرة القد ، ثنائية الثوب ، ثوبها الريبي ابيض من الخريفى || تألف الحياة الجماعية . سرها يمد بعض المئات . وهي من الصوارب القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق اولاً ثم المشق . قوتها الحشرات والديدان || تدفن في افاحيص تعالجها في التربة بين الاعشاب وتبطنها بالقش والحزاز || اناثها تضع من ٣ الى ٤ بيضات اجاسية الشكل ، صغيرة القد ، زيتية اللون ، مرقوشة بالاسود ، تحضنها وحدها نحو ١٥ يوماً .
اما انواعه الاربعة فهي :

خَوَّاف اسيوي Eudromias asiaticus (S).

خَوَّاف جنوبي Eudromias australis (S).

خَوَّاف هندي Eudromias veredus (S).

خَوَّاف مبدول Eudromias morinellus (S).

٩٥٤٦ - خَوَّاف مَبْدُول *

Eudromias morinellus (S). Guignard commun, G. de Sibérie, Pluvier des Alpes (F).

طائر من الخواف الصوارب القواطع . اعطانه تمتد من سيبيريا الى الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية واروبه يحويها في طلب الرزق والمصيف والمشي || جسمه صغير القد . ثوبه الريبي يتميز برونق الخضاب . ظهره وجناحه الى السمرة الزيتية الموج ، ريشها مطوق بالصهبة . رأسه اسود . محسراه وحاجباه وزوره الى البياض الاغبر . اسفل عنقه واعلى جوفه الى الوردية المجددة بالاشقر يحدها عند اواسط الجوف خط اسود يعقبه طوق ابيض . بطنه ابيض الوسط ، صناعي الاطراف . ذنبه الى السمرة الزيتية ينتهي بالابيض . منقاده وحده عينه الى السمرة الخنطية . قائمته الى الوردية الخضراء || ثوبه الخريفى ينحرف الى الوردية المتفاوتة الاسمرار تعمق من الرأس الى الذنب وتزهر من المنق الى الافنيك . والاقسام البيض في الثوب الريبي تتحول الى صباية تملؤها رقشة مراء .

٩٥٤٧ - خَوَّافِي Points cardinaux (F).

هي الجهات الاربع الاصلية الشرق والغرب والشمال والجنوب .

٩٥٤٨ - خَوَّافِي Chocottes (F).

من ريش جناح الطائر ما يكسي القوادم والمناكب من حافتي السقط الداخلية والخارجية .

٩٥٤٩ - خَوَّاس Terre aride (F).

Barren ground (E).
ارض مدهاة لا نبت فيها .

٩٥٣٢ - خُنْكَار * Callistephus chinensis (S).

Callisthèphe, Reine-Marguerite commune (F). China aster, Queen Margaret (E).

نبات زهري تزييني حولي وحيد الجنس والنوع عديد الضروب من الاسطريات وفصيلة المركبات . يعلو من ٢٥ الى ٨٠ سم . ساقه منتصب . اوراقه متعاقبة غليظة التستين . ازهاره رؤسية ، فردية ، عريضة . قرصها اصفر ، لسيناتها مختلفة الالوان بالنسبة الى الضروب . يعيش في جميع التربة ويستمر ازهاره في فصلي الصيف والخريف .

٩٥٣٣ - خَنْتَوْر

كل شجرة رخوا الساق خوارة فهي خنورة .

٩٥٣٤ - خَنْشَوْرَة Echinorhine (F).

هي السنودة المشقة ، سمكة بحرية من القرشيات ، اطلبها .

٩٥٣٥ - خَنْشَوْر

Porcelet, Goret, Cochonnet, Lalton (F). Young pig, Dirty fellow, Sucking-pig (E).

هو جرو الخنزير في اول عمره . ج خناقص .

٩٥٣٦ - خَنْشَوْر وَخَنْشِي Marcassin (F).

Young wild boar (E).
جرو الخنزير الوشي .

٩٥٣٧ - خَنْشِي * Dolium (S).

Dolium, Tonne (F). Dolium (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الخنثنيات . انواعه المعاصرة المروفة نحو ١٧ منها ١٥ تعيش في المحيط الهندي والبحر الاحمر ونوعان في البحر الابيض المتوسط || جميع انواعه كبيرة القد بطينة اشهرها واحملها لونا الخنث الحجلي (Dolium perdix) لونه الى الصفار الاشقر المرقوش بالابيض والاطحل .

٩٥٣٨ - خَنْشِيَّات ٥ Dolidae (S).

Dolidae (F). Dolidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعاصرة قليلة العدد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها بطنية متتابعة الحلزونة المتقاربة الخفيفة التخديد الناعم . قواها مستطيلة مستعرضة الحثار الجانبى المحرز من الداخل والخارج || اجسامها معتدلة الحجم . رؤوسها مستعرضة ، مبطة ، ثنائية اللوامس المستطيلة المعبونة ، كبيرة الاخطام الاسطوانية النابضة . ارجلها راحة فضفاضة . ارجلها كبيرة اهليلجية الشكل ، تنفخ بالماء عند الحاجة تسهلاً للعمول وسرعة الحركة || اعرف اجناسها واشهرها الخنث والكعكة .

٩٥٣٩ - خَوَّ Miel (F). Honey (E).

الخمر هو الشرو اي العسل .

٩٥٤٠ - خَوَّاء ، خَمَّوْر Chaos (F). Chaos (E).

الخواء او الفجر اختلاط عناصر المادة عند تكوين الكرة الارضية وفي بداية عهدها .

٩٥٤١ - خَوَّانِم Pleuronecte zèbre (F).

سمكة بحرية تدعى بحباس مؤذر ، اطلبها .



خَنْثِي



خَوَّاف مَبْدُول

٩٥٦٠ - خَوْءَن ٥ ، فَوْزَارِيَوْم ٥
Fusarium
جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحاتيات وفصيلة الكنتنيات . وليمته سطحية الارتكاز ، كئائده عديدة الخلايا ، مستدقة الاطراف . كريمة قنزعية خلية لبدة . انواعه عديدة تركيب مختلف اعضاء النبات . اعرفها واشهرها ما يتبع .

٩٥٦١ - خَوْءَن الاسْطَر ٥

Fusarium conglutinans (S). Fusariose de l'aster (F).
فطر مجهرية يتطفل على الاسطر فيؤذيه || مظهره الخارجي ذبول في الاوراق والازهار يعقبه ظهور لطفة سمراء اللون قليلة العرض تركيب الساق من جنبها الى قتها . يكافح باستعمال اسيتات النحاس المحلول ٠,٥ ٪ .

٩٥٦٢ - خَوْءَن البطاطا ٥

Fusarium coeruleum (S). Pourriture sèche de la pomme de terre (F).
فطر مجهرية يتطفل على البطاطا المخدوشة فيعطبها في اثناء حفظها || مظهره الخارجي قروح لاقياسية الشكل والحجم يعملها ندف خفي ابيض اللون ، اطحل الموج يقودها الى الانفلاق والعفن يعقبه جفاف اللباب واسمراره . يكافح بتطهير الخزن قبل ادخال البطاطا عليه وقد يتم ذلك اما باستعمال الفورمول او سلفات النحاس المحلول ٢ ٪ .

٩٥٦٣ - خَوْءَن الخبازيات ٥

Fusarium vasinfectum (S). Fusariose des malvacées (F).
فطر مجهرية يتطفل على بعض الخبازيات منها القطن والياوية والعنبريون || مظهره الخارجي شحوب وانقباض وذبول في الاوراق يعقبها ارتخاء في الافنان يسبب لها نحو الترية . ثم تظهر على الجذور والسوق لطخ سمر كان سببها وصول المشيع الى الاوعية وغزوه خلايا اللحاء والشكير .

٩٥٦٤ - خَوْءَن العشب ٥ ، خَوْءَن الشوفان ٥

Fusarium herbarum, Fusarium avenaceum (S).
فطر مجهرية عميم الانتشار يركب مختلف النباتات والثمار الناضجة والبذور الناشئة والمواد النباتية والمضوية المحفوظة . مظهره الخارجي يقع منبهة لاقياسية الشكل والحجم حطية اللون سمراء الختار تركيب العضو المنحار ثم تمتطقه بفشاء من الحمل اللبد ، وردي اللون ، فضي الموج يتسع وينتشر بسرعة فيقضي على النسيج المنحارة بعد ان يعفها ويقودها الى الانحلال .

٩٥٦٥ - خَوْءَن العفن ٥ ، خَوْءَن صولاني ٥

Fusarium solani (S).
فطر مجهرية يعيش ريباً على عدة نباتات ويتطفل على غيرها . يركب الجذور والسوق والاغصان والاوراق والثمار لكنه يأتي بعد غيره فيتابع العمل الهدام الذي يشره سلفه || مظهره الخارجي يقع سمر لاقياسية الشكل والحجم تركيب بشرة النسيج ثم تتحول الى قروح تطلوها كتل من العفن تعطب الاعضاء المصابة وتقودها الى اليباس .

٩٥٦٦ - خَوْءَن القرنفل ٥

Fusarium d'ianchi (S). Fusariose de l'oeillet (F).
فطر مجهرية يتطفل على القرنفل فيؤذيه ويميته || مظهره الخارجي ذبول في نصل الاوراق يعقبه اصفرار وجفاف ثم سقوط الاوراق الواحدة تلو الاخرى الى ان ينوي

٩٥٥٠ - خَوْءَة
Terre inculte (F).
الخوا : الارض الخالية الجادسة .
Waste land (E).

٩٥٥١ - خَوْءَع ٥

Lyperosia (S).
Lyperosie, Mouche irritante (F). Lyperosia (E).
جنس ذباب لاسع من فصيلة الدبابيات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القد جشعة الى الدم . اثابها الى السمرة يعملوها توشيح وتبييض اصفر . متاكها رهيفة ناخزة وماصة . مكنها احمر اللون تمتحه في رجيع الحيوانات العاشية فينقف عن ذباب يعيش اول عهده على الرجيع ويكثر وجوده فوق اعشاب المراعي الرطبة . يقتحم الدواب والابقار والكلاب فيلسعها وينقل اليها الامراض المعدية .

٩٥٥٢ - خَوْء ٥

Prunus domestica (S).
Prunier (F). Prune tree, Plum tree (E). Hans-pflaume (D). Prugno, Susino (I).
جنس اشجار مثمرة من فصيلة الورديات . انواعه وضروبه عديدة جميعها شجيرات واشجار يراوح ارتفاعها من ٣ الى ٧ امتار . جذورها سطحية . سوقها ضخمة . اغصانها فارشة اوراقها معتقة متعاقبة ، نصلها بيضي مسنن الحافة ، خفي الصفة السفلى . ازهارها صغيرة القد مختلفة التجميع ، يتلاتها الى البياض الاصفر . ثمارها مأكولة لذيدة الطعم تجفف وتربب ويستخرج من عصيرها كمحول جيد الصنف . وهي خوخية ، بيضية او مستديرة ، سودقها لحمي لبي ، عجباتها مستطيلة مفلطحة قاسية تطف برة جامدة اللباب يبيض اللون مرة الطعم || تنمو في جميع المناطق المعتدلة الحرارة . ترغب في التربة المنسوبة التركيب ، السميقة الغور . تخشى الرطوبة المستحكمة والجفاف المضي . تتكاثر بالبذر والفسائل والتطعيم .

٩٥٥٣ - خَوْء الماء

Lysimaque commune (F).
Common yellow loosestrife (E).
هو السرمج الشائع ، اطلبه .

٩٥٥٤ - خَوْء بري

Prunier sauvage (F).
Wild prune tree (E).
هو البرقوق ، اطلبه .

٩٥٥٥ - خَوْء شائك

Prunier épineux (F).
Sloe tree (E).
هو البرقوق الشائك ، اطلبه .

٩٥٥٦ - خَوْء مجفف

Pruneaux (F).
French plum (E).
كل خوخ جفف وحفظ . اجوده ما فقد ازبمة اخناس مائته دون ان يفقد اللدانة والرهمة .

٩٥٥٧ - خَوْء ملابار


Jambosier (F). Jambosa (E).
هو تفاح الورد ، اطلبه .

٩٥٥٨ - خَوْءة ، بَرْقُوءَة

Prune (F). Plum (E).
ثمرة الخوخ والبرقوق .

٩٥٥٩ - خَوْءَل

Volvariella speciosa (S).
Volvaire remarquable (F).
قطر مأكول من فصيلة الغاريقونيات . يوجد في غابات الاشجار العروة اخصها السديان . يعيش على المواد النباتية المنحلة . ساقه رفيعة ، منتصبية ، مستضخنة القاعدة ، كبيرة اللحية ، لونها الى البياض الاغبر . نكمتة قلنسوية الشكل ، طحلاء اللون ، لزجة عند اللمس ، قطرها نحو ١٠ سم . اطراسها الى الصفرة الصناعية || لحميته جامدة المكسر ، جيدة الصنف ، مأكولة .




خَوْءَع




خَوْء



خَوْءَن البطاطا



خَوْءَن البطاطا




خَوْءَن العشب

٩٥٧٢ - خَوْدَنِيَّات ٥

Cassididae (S).

Cassidids (F). Cassididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالثة والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار العالم || تتميز دويبات هذه الفصيلة باصدافها الرافعة وبارجلها المستعرضة وباسقاطها الهلالية الشكل || اعرف اجناسها واشهرها الخوذية والعراط .



خودن لبني

٩٥٧٣ - خَوْدِيَّة ٥*

Cassidaria (S).

Cassidaria (F). Cassidaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وفصيلة الخوذيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المتوسطة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصدافها قلبية الشكل الشبه بالخوذة الرومانية . فوهات مستطيلة . اعقابها هرمية الشكل .

٩٥٧٤ - خَوْر

Embouchure, Estuaire (F).

Embouchure, Mouth, Estuary (E).

الخور هو مصب مياه النهر في البحر اذا اتسع وعرض . ج الخوار .

٩٥٧٥ - خَوْرَان


Anus des solipèdes (F).

Anus of solipeds (E).

٩٥٧٦ - خَوْرَمَة

Rocher crevassé (F).

خورمة ج خورم ، صخرة من حشاف البحر والنهر تكثر فيها الخروق والثقوب المتباينة الاشكال .



خوذية

٩٥٧٧ - خَوْرَنْق ، سِيدَا

Sidalcea (S).

Sidalcée, Sida, Side (F). Checker bloom, Greek mallow (E). Doppelmalve (D). Sida (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجيازيات . انواعه عديدة معظمها بري وبعضها زراعي تربي . سوقها فراء متشعبة . اوراقها متعاقبة مفصصة او مفرضة . ازهارها تاجي الارتكاز عنقودي او سنبلية التجميع . ازهارها لاطة او قصيرة الزناد ، متكها ازرق بثلاثية مختلفة الالوان . اعرف انواعه التزيينية الثلاثة التالية .

٩٥٧٨ - خَوْرَنْق اَبْيَض

Sidalcea candida (S).

Sidalcée blanche (F).

بجلة معمرة تعلق من ٨٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها لاقياسية التفصيص ، نصلها لامع البشرة الملساء . ازهارها عنقودية التجميع . بيضاء اللون ، زرق المياسم || ازهارها يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز .

٩٥٧٩ - خَوْرَنْق حُبَارِي

Sidalcea malvaeflora (S).

Sidalcée à fleurs de mauve (F).

جنية معمرة تعلق من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها صغيرة القد ، مفرضة ، نصلها ملس البشرة . بحري اللون . ازهارها كبيرة القد عنقودية التجميع ، لونها الى الاحمر الارجواني || ازهارها يستمر طوال الصيف .



خورنق

٩٥٨٠ - خَوْرَنْق سُنْبِلِي

Sidalcea spicata (S).

Sidalcée en épis (F).

عشبة معمرة تعلق من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقها لاقياسية التفصيص . نصلها خلي البشرة . ازهارها صغيرة القد ، سنبلية التجميع ، خراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

النبات || اما الفطر وهو مجموعة من الكتل الندية الحملية الصغيرة ، لونها الى البياض يعلوه موج وردي ، يظهر على السوق بعد بياضها || يكافح عند ظهوره برش التربة والنبات بسائل سلفات الحديد المحلول ٥ ٪ بمعدل ٣ لتر للمتر المربع الواحد .

٩٥٦٧ - خَوْدَن الْقَرْنِيَّات ٥

Fusarium redolens

فطر مجهري يتطفل على نباتات الفصيلة القرنية احصها الحصص والبرسيم والتفل || مظهره الخارجي اصفرار في الاوراق يعقبه ذبول وارتماء ثم ظهور بقع سمر مستطيلة على السوق والجذور تقضي على التبادل النسفي وتقود النبات الى الهلاك || يكثر في الاراضي الخصبة الرطبة لذلك يحسن اجتنابها .

٩٥٦٨ - خَوْدَن الْكُتَّان ٥

Fusarium lini (S).

Fusariose du lin (F).

فطر مجهري عيم الانتشار يتطفل على الكتان فيميته . مظهره الخارجي ذبول يحل بالنبات يقوده الى بياض الاوراق والسوق . سببه اختناق الجذور عن عرصات الفطر ومشيجه التي تبدو بيضاء اللون ثم تنحرف الى الوردي || يكافح باقتلاع وحرق النباتات الموصومة وبطهير البذار قبل استعماله بعد اجتناب التربة القوية الاندماج .

٩٥٦٩ - خَوْدَن النَّجِيلِيَّات ٥

Fusarium culmorum, Fusarium rubiginosum (S).

فطر مجهري يتطفل على معظم النجيليات الزراعية . احصها الشوفان والشعير والشيلم والحنطة والذرة || يركب الحب عند انتاشه في التربة فيقضي عليه . ويركب السوق عند الاشطاء فيذويها . ويصيب الزروع قرب اسباطها في سلامياتها واعقاد عصفها فيعطها وقد يحول دون تكوين الحب || يكافح بتطهير البذار و اجتناب المواقع الرطبة وتفتين عنصر الازوت الذي ينشط المواد الحضرية التي تلام انتشار الفطر .

٩٥٧٠ - خَوْدَن اُوكْسِيَسْبُورُم ٥ ، وَصَم بَنَمَا

Fusarium oxysporum (S). Maladie de Panama (F).

فطر مجهري شائع الانتشار يكثر في البلاد الاستوائية والحارة ، يركب عدة نباتات مختلفة الاجناس ويتطفل على الثمار الناضجة المخدوشة فيعطها || مظهره الخارجي يختلف باختلاف النبات المائل . فهو على التبغ اسوداد يحل بالجذور وبالزمام الاول من الساق في القسم المتجه نحو اشعة الشمس || وهو على الموز وصم يعثرى الارومة وجذورها فيمنعها عن القيام بعملها الحيوي على الوجه الاكل فتبدو النصوص ضعيفة هزيلة يعلوها طرخ صنير القد يستمر كضمة زهرية ، خراء اللون ، في قمة الجذع الى ان يذبل ويذوي على النصبة || يكافح باقتلاع النباتات الموصومة وبطهير التربة بسائل سلفات الحديد المحلول ٥ ٪ بمعدل ٥ لتر للمتر المربع الواحد .

٩٥٧١ - خَوْدَن لَبْنِي ٥*

Fusarium lactis

فطر مجهري يتطفل على التفاح والاجاص والسفرجل والحليب واللبن والزبدة || يركب الثمار الناضجة المشوهة التي عطها العفن فيسرع في انحلالها وهريانها || ويركب الحليب واللبن والزبدة عند فساد بعض الحماز فيذكي الفساد ويسبب مرارة الطعم .

٩٥٩٠ - خَوْق ° Phtiriose, Maladie de Jaffa (F).
ويسمى مرض يافا ومرض الكرم. وصم تحذره الدمة
البيضاء في سنخ الكرمة سببه وخز الحشرة الذي يهريق
العصارة فتعيش عليها بعض الفطور المجهرية الرمية التي
تلحف السنخ ثم تمتد شيئاً فشيئاً الى ان تقضي على الجذور.
يكافح بالقضاء على الدمة البيضاء. اطلبها.

٩٥٩١ - خَوْلَان Lyciet d'Arabie (F).
هو حوض الجزيرة، اطلبه.

٩٥٩٢ - خَوْلَنْجَان Alpinia (S).
Alpinie, Galanga (F).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزنجبيلات.
انواع عديدة منها الطبية والتزيينية والبرية. جذاميرها متشعبة
اوراقها مزدوجة التصفيف سنائية النصل الكبير القد.
ازهارها سنبلية هامي. ازهارها بيض. تويج الزهرة مستطيل
الشفيفة، قصير البتلة || اعرف واشهر انواعه الطبية
والتزيينية ما يلي.

٩٥٩٣ - خَوْلَنْجَان صِينِي Alpinia chinensis (S).
Alpinie de Chine (F).
نوع من الخولنجان يعلو نحو المتر. جذاميره اصمية
القد والشكل. اوراقه معنقة قصيرة الزناد، نصلها سنائي
الشكل يطول نحو ٢٥ سم. ازهاره صغيرة القد بتلاتها
تطول نحو ٦ مم. || يزرع للتزيين.

٩٥٩٤ - خَوْلَنْجَان كَبِير *، خَاوَلَنْجَان Alpinia galanga (S).
Galanga majeur (F). Galangal
major, Siamese ginger (E). Galgant, Grosse galgan
(D). Galanga maggiore (I).
نوع من الخولنجان الطبي. جذاميره عفية تستعمل استعمال
الخولنجان الخزني، لكنها اقل نفعا وقية || يعلو نحو
٢٠٠ سم. اوراقه كبيرة سنائية النصل. ازهاره مستعرضة
البتلات. خواصه المميزة قليلة الجوهر والمادة الفعالة.

٩٥٩٥ - خَوْلَنْجَان مَخْزَنِي * Alpinia officinarum, Galanga officinalis, Maranta
galanga (S). Galanga vrai, G. mineur, G. de la Chine
(F). Galangal, Lesser galangal (E). Galgantwurz, Pfeilwurz (D). Galanga, G. minore, Erba ginestrina (I).
نوع من الخولنجان الطبي مشهور بخواصه القوية النافعة
المستعملة لاستنفاض الشبق. يعلو نحو ٧٠ سم. اوراقه
سنائية النصل، ذلقة الزام الاخير المذهب المقصصة.
ازهاره سنبلية. جذاميره اصمية الشكل تطول نحو ٦ سم.
قطرها من ١٠ الى ١٢ مم. رائحتها عطرية مفلطلة، طعمها
حاد حريف. خواصها المميزة مواد صمغية راتنجية مع
بعض الجواهر الفعالة والادهان العطرية.

٩٥٩٦ - خَوْلَنْجَان مَلَقَّة Alpinia malaccensis (S).
Alpinie de Malacca (F).
نوع من الخولنجان يعلو من المترين الى الثلاثة امتار.
جذاميره غليظة، كبيرة القد. اوراقه سنائية النصل
الازغب، تطول من ٣٠ الى ٣٥ سم. ازهاره سنبلية
عنقودي يطول نحو ٤٠ سم. ازهاره خلية الاجزاء مستطيلة
الشفيفات، مستعرضة البتلات || يزرع للتزيين.

٩٥٩٧ - خَوْلَنْجَان مُعَوَّه * Alpinia speciosa (S).
Alpinie spéclause, Langose (F). Shell flower (E).
Alpinie (D). Alpinia (I).
نوع من الخولنجان الطبي المتوسط الخواص والمواد. يعلو

٩٥٨١ - خَوْزَب Enflure (F). Swelling (E).
الخوزب هو الورم في ضرع الناقة والبقرة والنعجة والعنز.
٩٥٨٢ - خَوْش Flanc (F). Side (E).
هي الحاصرة عند الدويبات والحشرات.

٩٥٨٣ - خَوْشَان *، خَانِقِ الْكَتَلَب Apocynum (S). Apocyn, Tue-chien, Apocin (F). In-
dian hemp, Dog's bane (E). Hundskohl, Indischen
hanf, Hanfhundsgift (D); Apocino (I).
جنس نبات عشبي طبي معمر من فصيلة الدفليات. ساقه
وفروعه ليفية منتصب. اوراقه كاملة متقابلة رهلة النصل.
ازهاره تاجي الارتكاز. ازهاره جرسية صغيرة القد،
ثمارة نخيلة مستطيلة بزورها دقيقة ناشرة العفرة || اوراقه
وبزوره تدخل في عدة مستحضرات طبية مسهلة وبقيشة.
يستخرج من اليافه خيوط كالقنب تستعمل استعماله.
انواعه عديدة منها البرية والزراعية والتزيينية، اشهرها
الثلاثة التالية.

٩٥٨٤ - خَوْشَان الذُّبَاب Apocynum androsaemifolium (S). Apocyn gobe-
mouches (F).
نوع من الخوشان يعلو من ٧٠ الى ١٢٠ سم. فروع
افقية الانتشاب، متباعدة، لاقياسية الارتكاز. اوراقه
بيضية الشكل تطول نحو ٧ سم. وتعرض ٤، نصلها
ازغب الصفحة السفلى. ازهاره وردية اللون يعلوها موج
ابيض || يزرع للتزيين. ازهاره يستمر من تموز الى
ايلول.

٩٥٨٥ - خَوْشَان قُنْبِي Apocynum cannabinum (S). Apocyn chanvrin (F).
نوع من الخوشان. يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فروع
شبه منتصب. اوراقه معنقة بيضية الشكل تطول نحو
١٠ سم. وتعرض ٥ ازهاره بيضاء اللون تعلوها مشعة
خضراء || يزرع للتزيين. ازهاره يستمر من حزيران
الى تموز.

٩٥٨٦ - خَوْشَان مُنْتَصِب Apocynum erectum (S). Apocyn dressé (F).
نوع من الخوشان البري الطبي يعلو نحو المتر. فروع
منتصب. اوراقه لائحة، حاضرة، اهليلجية تطول نحو
٥ سم. ازهاره قرمزية اللون || اوراقه وازهاره وبزوره
طبية.

٩٥٨٧ - خَوْشَل * Tétracère (F).
جنبه عارضة معمرة طبية من فصيلة الدلائيات. مهدا البلاد
الاfrيقية الاستوائية والحارة. ساقها تطول اكثر من ٥٠
متراً. اوراقها متناوبة، معنقة، اهليلجية النصال،
ازهارها ابطية الارتكاز، خمسية التجميع، بيضاء اللون
او صفراء. ثمارها جراء تفلح بعض البزور || اوراقها
وثمارها حفصة تستعمل في معالجة الجروح.

٩٥٨٨ - خَوْص Feuilles du dattier (F).
ورق التخليل. الواحدة خوصة. Leaves of date tree (E).


٩٥٨٩ - خَوْط * Lambourde (F). Soft (E).
قصيب صغير وقصير طوله يراوح من ١ الى ٣ سم.
ينتشب عمودياً في فروع التفاح والاجاص ويتحول الى
براعم ثمرية.



خوشان



خوشل



خوط




خولنجان كبير



خولنجان مخزني




خولنجان معوه



خونق



خويلدة



خيار



خيار منديرا



خيتل

٩٦٠٦ - خَيْتَارُ الْفَرَنْجِي Chayote (F).
هو السكيوم نبات زراعي من القرعيات ، اطلبه .

٩٦٠٧ - خَيْتَارُ الْبَحْرِ Holothurie (F).
Sea cucumber (E). هو قناء البحر ، اطلبه .

٩٦٠٨ - خَيْتَارُ الْكَبِيرِ Cornichon (F).
Gherkin (E).

كل خيار من اي ضرب كان نطف باكراً ، قبل اكتمال
بزره ، للاكل او للكبس .

٩٦٠٩ - خَيْتَارُ بَرِّي Echinocystis lobata (S).
Concombre sauvage (F). Bitter root, Wild cucum-
ber-vine (E). Wilder gurkenischt (D). Cocomero
salvatico (I).

نبات عشبي بري حولي مداد من فصيلة القرعيات .
ثمارة صغيرة القد حمراء اللون غير مأكولة . ينبت في
الآتربة الرطبة .

٩٦١٠ - خَيْتَارُ شَنْبَرِ Cassier (F).
هو الخرنوب الهندي ، اطلبه .

٩٦١١ - خَيْتَارُ مَسْدِيرَا * Cucumis sacleuxii (S).
Concombre de Mandéra (F). Cucumber of
Mandira (E).

نبات عشبي زراعي معبر من القرعيات . ساقه فرعاء
مدادة . اوراقه متعاقبة مستطيلة انزاد . نصلها نحش
الملس مهدب الصفحة . ثماره بيضية الشكل تطول من
٨ الى ١٠ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . لوها الى الخضار
الاصفر يعلوه تمشيع قائم قاطب . وهي جامدة المكسر
تستعمل في الخللات .

٩٦١٢ - خَيْتَالُ الْبَادِيَةِ Courvite (F).
هو الزغزغ ، من الزقزاقيات ، اطلبه .

٩٦١٣ - خَيْتَانَةُ الْأَمَانَةِ Abus de confiance (F).
Breach of trust (E).
جنحة يرتكها كل من بدد عهدة في ذمته فتصرف فيها
لغير القصد الذي تسلمها لاجله .

٩٦١٤ - خَيْتَانَةُ التَّوْقِيعِ عَلَى بَيَاضٍ Abus du blanc-seing (F).
Breach of signature to a
blank (E).
جنحة يرتكها المستأمن وذلك لخالفته العقد الذي استؤن
التوقيع عليه .

٩٦١٥ - خَيْتَعُورُ Hydromètre (F).
Water skipper, W. strider (E).

حشرة صغيرة القد من الزخارف مستطيلة القوائم تعيش
على سطح الماء الراكد تستن فيه ذهاباً واياباً ، راجع زخرف .

٩٦١٦ - خَيْتَلُ * ، مَنَعُ مُصْرَفُ Portunus (S). Portune, Etrille, Crabe à laine (F).
Swimming crab (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات وفصيلة الخيتليات .
انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد المعتدلة
الحرارة والباردة . اجسامها مبططة . دروعها قليلة الاحديداب
زباء القشار مما دعا الى تسميتها بالمنع المصوف . حشار

نحو ١٢٠ سم . اوراقه معتقة مستطيلة ، نصلها سناني
ازغب الصفحة السفلى . ازهاره متوسطة القد مستطيلة
الشيفات مستعرضة البتلات || تكثر زراعته في بعض
مناطق الشرق الاقصى نظراً لكثرة انتاج جذاميره التي
يغشون بها الخولنجان الحزني .

٩٥٩٨ - خُولَنْجَان يَابَانِي Alpinia japonica (S).
Alpinie du Japon (F).

نوع من الخولنجان يعلو من ٤ الى ٥٠ سم . جذاميره
نخيلة مستطيلة . اوراقه معتقة زناده يطول نحو ٢ سم .
نصلها سناني الشكل مستعرض طوله نحو ٣٠ سم . صفحته
السفلى خلية البشرة . ازهاره كبيرة القد || يزرع
للزينة .

٩٥٩٩ - خَوَيْي Rhynchée (F).
راجع جوفاء ، طائر من دجاجيات الارض .

٩٦٠٠ - خَوَيْي الرَّزْ Glaréole à collier (F).
هو أبو اليسر ، اطلبه .

٩٦٠١ - خَرْمَع Mouche bleue de la viande (F).
هو الصيدن الازرق ، اطلبه .

٩٦٠٢ - خَوَيْفُ * Gymnopilus penetrans (S).
Gymnopile pénétrant (F).

فطر كاعن الصنف لا يؤكل من فصيلة الفاريقونيات .
اعطائه اقليم الصنوبريات حيث يعيش على الاخشاب
النخوة . بوغه اخضر اللون . ساقه قصيرة . بيضاء القاعدة ،
عنابية القسم الآخر . ارسوسته شبه مخروطية الشكل ، بنية
اللون ، صفراء المواج ، قطرها نحو ٥ سم . اطراسه حادة ،
لبدة التجميع . رائحته ، عند لمس ، مستحبة .

٩٦٠٣ - خَوَيْلْدَةُ * Cucullaea (S). Cucullée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم
وفصيلة الفلوكيات . انواعها المعروفة ثلاثة موطنها اشوار
الانهر الهندية والصينية || اصداقها تزاوية الشكل قريبة
الشبه بالحوذة . مصاريهما متساوية . مفصلاتها مسننة .
اسنانها الداخلية قصيرة || تعيش في الاسمال والرمال .
لحومها كاعنة الصنف .

٩٦٠٤ - خَوَيْطُ ، خَيْطُ الْمَشْبَرِ Filet (F). Fillet (E).

الجزء الخيطي ، حامل المشبر ، من سداة الزهرة .

٩٦٠٥ - خَيْتَارُ * ، قَشْدُ Cucumis sativus (S).
Concombre (F). Cucumber (E). Echte gurke, Gur-
ken, Kukumer (D). Cocomero, Cetriolo (I).

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروبه
عديدة سوقه ليفية مدادة عارشة . اوراقه كبيرة القد .
كفية الشكل ، زناده منتصب مستطيل ، نصلها بارز
الضلع والعروق ازغب البشرة على صفحته . ازهاره
خشتوية كبيرة القد ، صفراء اللون . ثماره بطيخية اسطوانية
مستطيلة مأكولة مختلفة الاشكال والالوان . حصارة ثماره
صناعية تدخل في عدة تراكيب ومستحضرات صحية خاصة
بالبشرة || يزرع في جميع الآتربة المنسوبة العناصر
الغذائية . يفضل الخفيفة والمتوسطة الانساج اخصها
الانواع الباكورية التي ترغب في المواقع الدافئة والمعارض
المشمسة .

٩٦٢٩ - خَيْرَزَان ، جَنْهِي *Bambusa* (S).
Bambou (F).
 جنس نباتات قصبة برية وزراعية من عمارة الخيزرانيات
 وفصيلة النجيليات . انواعه عديدة ترغب في الاراضي
 الخفيفة الرطبة . اشهرها ما يلي .

٩٦٣٠ - خَيْرَزَان رُبَاعِي التَضْلِيْع *Bambusa quadrangularis* (S). *Bambou quadrangulaire* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٩ امتار سلامياته
 رباعية التضييع لونها الى الخضار الاصفر . اوراقه تطول
 من ١٥ الى ١٨ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها منشاري
 الحافة باهت الخضار || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية
 الرطبة .

٩٦٣١ - خَيْرَزَان ضَيْقُ الْوَرَق *Bambusa angustifolia* (S). *Bambou à feuilles étroites* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . سوقه نحيلة
 سلامياته الى الخضار الشبي . اوراقه ضيقة تطول نحو ١٠
 سم . وتعرض نحو ٦ سم . نصلها منشاري الحافة جميل
 الخضار || يرغب في الاتربة الخفيفة الغنية الرطبة .

٩٦٣٢ - خَيْرَزَان عَلْجَانِي * *Bambusa arundinacea* (S). *Bambou commun*, *Bambousier* (F). *Common bamboo* (E). *Bambusrohr* (D). *Bambie* (I).
 نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٢٠ م . سلامياته
 مستطيلة . ثلاثية او رباعية التضييع . عجره بارزة الختار .
 افئاده ثنائية الانتشاب . اوراقه تطول من ٣ الى ٩ سم .
 وتعرض من ٥ الى ١٥ م . نصلها مسن الحافة ، ذلق
 الزام الاخير ، لونه الى الخضار المابق الموج ثم ينحرف
 مع البلوغ الى الاصفر || يعتبر من النباتات السبروتية
 التي تجود في جميع الاتربة الخفيفة والمعتدلة الاندماج
 الممكن ربا .

٩٦٣٣ - خَيْرَزَان قَرْم *Bambusa pygmaea* (S). *Bambou pygmée* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم . سلامياته
 بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ٧ الى ٢٠ سم . نصلها
 خلي الصفحة العليا لبد السفلى || يرغب في الاتربة
 الخفيفة الغنية الرطبة .

٩٦٣٤ - خَيْرَزَان مَبْدُول *Bambusa vulgaris* (S). *Bambou vulgaire* (F). *Feathery bamboo* (E). *Bambus* (D). *Bambie* (I).
 نوع من الخيزران يعلو من ٦ الى ٨ امتار . سلامياته
 متوسطة الطول . عجره بارزة الختار . افئاده منفرجة
 الزوايا والانتشاب . اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم .
 نصلها مسن الحافة ، ذلق الزام الاخير ، اخضر الصفحة
 العليا ، بحري السفلى || يزرع ويجود في جميع الاتربة .
 يفضل الرطبة .

٩٦٣٥ - خَيْرَزَان مَبْهَرَج *Bambusa fastuosa* (S). *Bambou fastueux* (F).
 نوع من الخيزران يعلو من ٥ الى ٢٥ م . سلامياته
 اسطوانية مستطيلة لونها الى الاخضر الاصفر ينحرف
 مع البلوغ الى السمرة . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٧ سم .
 وتعرض نحو ٣ || يرغب في الاتربة العميقة الغور
 المتوسطة الاندماج الوافرة المواد العضوية والرطبة .

دروعها الامامية مسن الحافة . الزوج الخلفي من قوائمها
 مجدافي الفصل الطرفية . اثنائها تراوح من الشبهة الرصاصية
 الى الجؤرة || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

٩٦١٧ - خَيْتَلِيَّات ٥ *Portunidae* (S). *Portunides* (F). *Portunidae* (E).
 فصيلة من القشريات عشاريات الارجل نصيرات الذيل .
 اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اجسامها مبططة ،
 قليلة الاحديداب . الزوج الخلفي من قوائمها مجدافي الفصل
 الطرفية || اعرف اجناسها واشهرها الخيتل .

٩٦١٨ - خَيْتَمَة *Tigresse* (F). *Tigress* (E).
 الخيشمة : انثى الببر .

٩٦١٩ - خَيْدَع ، خَيْطَل *Chat* (F). *Cat* (E).
 هر السنور والهر والقط .

٩٦٢٠ - خَيْرَا *Catéchu* (F). *Khair tree* (E).
 هي الكاشور ، اطلبه .

٩٦٢١ - خَيْرَالله *Perce-feuille* (F). *Thorow-wax* (E).
 هر الخليلاب المستدير الورق ، اطلبه .

٩٦٢٢ - خَيْر بُوا *Meleguette* (F). *Meleguetta-pepper* (E).
 هو الهال الذكر ، اطلبه .

٩٦٢٣ - خَيْرُوط ٥ *Chirotes* (S). *Chirote* (F).
 جنس عطاء من فصيلة الخيروطيوات . انواعه المعروفة قليلة
 العدد . اعطانها المكسيك || اجسامها حديدية التركيب ،
 دودية الشكل ، تطول نحو ٢٠ سم . جميعها ثنائية القوائم
 الشديدة الصغر ، المنقية الانتشاب والارتكاز ، تبدو
 كأنها لا تصلح للعمل || اثنائها الى الصبهة تعلوها مشعة
 كستنية تمتد من العنق الى الذيل || قوتها الديدان والحشرات
 الصغيرة .

٩٦٢٤ - خَيْرُوطِيَّات ٥ *Chirotidae* (S). *Chirotidés* (F). *Chirotidae* (E).
 فصيلة زحافات من العظاليات . اجناسها وانواعها المعروفة
 قليلة العدد . اعطانها بمصر مناطق امريكة الشمالية والجنوبية
 اجسامها حديدية التركيب ، اسطوانية الشكل ، تطول من
 ١٨ الى ٢٦ سم . رؤوسها صغيرة ، مستديرة الاخطام .
 عيونها شديدة الصغر ، ماحصة . قوائمها ثنائية ، صغيرة
 تنشب بين مؤخر الرأس والعنق || قوتها الديدان والحشرات
 الصغيرة .

٩٦٢٥ - خَيْرِي *Giroflée* (F). *Garden stock* (E).
 هو المنشور ، اطلبه .

٩٦٢٦ - خَيْرِي أَصْفَر *Giroflée jaune* (F). *Yellow gillflower* (E).
 هو المنشور الاصفر ، اطلبه .

٩٦٢٧ - خَيْرِي الْبَر *Lavande femelle* (F). *True lavender* (E).
 هو الخزامى الحقيقية ، اطلبها .

٩٦٢٨ - خَيْرَزَان *اللاكر من فراخ النعام .*



خيزران علجاني



خيزران مبدول

٩٦٤٤ - خَيْرَات رَحْمَت

Malope malacoides (S). *Malope malacoides* (F).
نوع من الخيزل. عشبة حولية تزيينية هرمية الشكل، تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خماسية الفلق المسننة الحتار. نساها خلية البثرة على صفحتها العليا والسفل. ازهارها وردية اللون، معتدلة الحجم || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.

٩٦٤٥ - خَيْرَات رُب

Cylichna (S). *Cylichne* (F). *Cylichna* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الطائيات. انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اصداقها صغيرة القد، بيضاء اللون، شبه اسطوانية الشكل ملحوفة بالارضية الفضفاضة.

٩٦٤٦ - خَيْس

Tallis (F). *Copse* (E).
الخيس هي الحرجة او الغابة المكونة من اشجار ملحاه نمت فراخاً على اروم اشجار قطعت.

٩٦٤٧ - خَيْسْفُوج

Grains de coton (F). *Cotton seeds* (E).
هو حب القطن. ومنهم من قال الحشب البالي.

٩٦٤٨ - خَيْسْفَة

Scalenostoma (S). *Scalénostome* (F). *Scalenostoma* (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة الاوليبيات. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق المحيط الهندي || اصداقها صغيرة مخروطية الشوزن، رقاجية الحلزونة، محززة، لماعة، وحيدة اللون المتفاوت الماحات.

٩٦٤٩ - خَيْشُوم

Branchies (F). *Fish-gills* (E).
الخياشيم هي اعضاء التنفس عند السمك.

٩٦٥١ - خَيْشُومِي التَنَفُّس

Pneumobranch (F). *Pneumobranchial* (E).
نعت تعريف يطلق على كل حيوان يتنفس من خياشيمه.

٩٦٥٢ - خَيْشُومِيَّات

Branchiates (F). *Branchiata* (E).
احدى قسمي المفصليات وفيها صف القشريات.

٩٦٥٣ - خَيْشُومِيَّات الاطراف، وَرَقِيَّات الارْجُل

Branchiopodes, *Phyllopodes* (F). *Branchiopod*, *Phyllopod* (E).
رتبة من القشريات تتميز بكثرة ارجلها الدقيقة الورقية الشكل.

٩٦٥٤ - خَيْضَل

Orltes (S). *Orlto* (F). *Orltes* (E).
جنس طير من فصيلة القرقفيات. النوع المعروفة قليلة العدد، اعطائها بعض مناطق البلاد الاسيوية والاروبية || جميعها تتميز بقصر المنقار المخروطي الشكل، باستطالة الذنب الرقاجي الانتظام، باعتدال الاجنحة المنفرجة

Bambous (F). *Bamboo* (E).
عمارة نباتات قصية، معمرة، برية وتزيينية وصناعية من فصيلة النجيليات. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منبتها البلاد الحارة الرطبة || اصرف واشهر اجناسها الخيزران والمسطوس والمجان والغريف والنصي والهرداء.

Lavatera (S). *Lavatera* (F). *Sea-mallow* (E). *Bechermaive* (D).
جنس نباتات عشبية من الفصيلة الجبازية. انواعه نحو ٣٠ جميعها اعشاب بحلية وجنية زباء الملحاه. أوراقها متعاقبة، معنقة، مقرنة او مفصصة النصل. ازهارها وردية او بنفسجية اللون. معظمها نباتات برية وبعضها زراعي تزييني. اشهرها ما يلي.

Lavatera thuringiaca (S). *Lavatera de Thuringe* (F).
بجلة محولة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. أوراقها عريضة التفصيص القلبي الشكل. لون ازهارها الى الوردي الباهت يعلوه تشيخ عابق، بتلاتها ثنائية التفصيص مستعرضة. ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

Lavatera arborea (S). *Lavatera arborescent* (F).
جنية ليفية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. أوراقها قلبية التفصيص مدبية الاطراف. ازهارها محورية الارتكاز ضمية التجميع، كبيرة القد، قطرها نحو ٥ سم. لونها الى الاحمر البنفسجي. كرابنها محذدة. مرتفعة الخوافي. ازهارها يستمر من نيسان الى ايلول.

Lavatera olbia (S). *Lavatera d'Hyères* (F).
جنية ليفية معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أوراقها قلبية التفصيص. ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٥ سم. لونها الى البنفسجي او الاحمر القروي. كرابنها صفراء اللون، خلية البثرة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

Lavatera trimestris (S). *Lavatera royal*, *Mauve royale* (F).
بجلة حولية تملو نحو ١٢٠ سم. مبدولة على شواطئ البحر المتوسط. أوراقها مفصصة بجيلة الخضار الفستقي. ازهارها ابطية رقاجية يكثر فيها اللون الوردي وبعضها ابيض || ازهارها يستمر من تموز الى آواخر الخريف.

٩٦٤٢ - خَيْرَات

Malope (S). *Malope* (F). *Malope* (E).
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الجبازيات. سوقها فرعاء. أوراقها متباينة الاشكال. ازهارها كبيرة، وردية اللون او بنفسجية، مستطيلة المعاليق، محورية الارتكاز، فردية التجميع || انواعه المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

٩٦٤٣ - خَيْرَات لِّلَايِي الفَلَق

Malope trifida (S). *Malope trilobée* (F).
نوع من الخيزل. عشبة تزيينية حولية فرعاء تملو نحو ١٠٠ سم. أوراقها ثلاثية الفلق. نساها مرطاه لامة الخضار الاصفر. ازهارها بنفسجية اللون يعلوها مزاج ارجواني || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول.



خَيْرَات

٩٦٦٣ - خَيْضَلُود *
Elton (S).
Elton (F). Elton (E).
جنس حشرات ناهمة وأنجة من غشائيات الاجنحة الحمويات
وفصيلة النمليات . انواعه المعروفة سبعة منها خمسة باصرة
ونوعان كهان لا يبصران || موطنها معظم الاقاليم الاستوائية
الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها صغيرة .
قوائمها مستطيلة . قرونها الاستشعارية منكسرة الدوكل .
جنودها وحراسها مجهزة بمخاطم ضليمة مخبئة في اجنحة الاطراف
الذرية . وهي اكبر قدماً من عمادها || بلعجها الحياقي لا
يختلف عن غيرها من النمل الا انها لا تستكن في قري
معينة لانها جواله تجوب الغابات في طلب الثوت . والانواع
الكهية كذلك لا تستقر في مواقع معينة || عديد الزبية
يتجاوز المليون وقد يبلغ ثلاثة ملايين عند بعض الانواع
الافريقية || يقال انها لا تعف عن كل حيوان يعترض
طريقها ان صغيراً او كبيراً وانها تلتهم كل ما تصادف
من مواد نباتية وعضوية مخزونة وغير مخزونة .

٩٦٦٤ - خَيْبَل
Chevaux, Cahallins (F). Horses (E).
الخيل والخيل والخيول والاختيال هي جماعة الافراس .

٩٦٦٥ - خَيْبَل الرِّهَان ، خَيْبَل السِّبَاق ، خَيْبَل السِّبَاق
Chevaux de course (F). Race-horse (E).
هي الخيل التي صار تحضيرها للمباراة في ميدان السباق
وتدعى ايضاً جياد الرهان .

٩٦٦٦ - خَيْبَل العَرَبِيَّات
Carrossiers (F).
Coach-horse (E).
هي الخيل الصالحة لجر العربات فقاما .

٩٦٦٧ - خَيْبَلَانِيَّات
Siraniens (F). Sirania (E).
رتبة حيوانات لبونة بحرية منها الخيلان ، الذي انقرض ،
والاطوم وخروف البحر .

٩٦٦٨ - خَيْبَلُولِيَّة
Phénoménisme (F).
Phenomenism (E).
الخيولوجية مذهب فلسفي يدعى الظاهرية ، اطلبها .

٩٦٦٩ - خَيْبَلِي
Hippique (F). Hippic (E).
ما هو مختص بالخيل .

٩٦٧٠ - خَيْبَلِيَّات
Equidés (F). Equidae (E).
Equidae (S).
هي فصيلة الخيل من رتبة مفردات الاصابع منها الفرس
والحمار وحمار الزرد وحمار الوحش .

٩٦٧١ - خَيْبَمَة * ، خَيْبَمِيَّة
Ombelle (F).
Umbel (E).
شكل او بالاحرى نظام ازهار تكون فيه الازهار على
شكل مظلة محمولة على علاقات تنطلق جميعها من نقطة
واحدة .

٩٦٧٢ - خَيْبَمِيَّات ، خَيْبَمِيَّات
Umbelliferae (S). Umbellifères (F). Umbelliferae (E).
فصيلة نباتية من ذوات الفنتين كثيرة القعالات عالية
الاسدية . اسباطها ستة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد .
من نباتاتها المشهورة الجزر والكمون والكزبرة .

٩٦٧٣ - خَيْبُول الْجَرَّ الثَقِيل
Chevaux de gros trait (F). Carriage-horses (E).
هي الخيول المعدة لجر الاحمال الثقيلة فيقتضي ان تكون

الاطراف ، بنعومة ارياشها الصغيرة المفسخة وبدقة
ارساغها واصابعها النحيلة || اعرف انواعه واشهرها الخيصل
الطويل الذنب .

٩٦٥٥ - خَيْضَل طَوِيل الذَّنْب *
Orites caudatus (S).
Orite à longue queue, Queue de poêle (F).
طائر من الخيصل جميل الشكل ، صغير القد ، طوله الكامل
نحو ١٥ سم . منها ٥ سم . للجسم و ١٠ سم . للذنب . رأسه
وعنقه وجوشنه الى البياض العاجي . بطنه الى البياض . الاشهب
المواج . جناحاه والرداء والظهر متتابعة الالوان المركبة من
الاسود والازرق والرمادي والاحمر العنابي والابيض . ذنبه
اسود اللون يحف به من جهتي طوله حنار ابيض . منقاره
وحدة عينه ورجلاه الى السمر السوداء || اعطائه تمتد من
اروبة الى الصين . يألف الغابات المبعثرة الاشجار . قوته
الحشرات والهوم دون غيرها || يدثن عشه على جذوع
الاشجار عند انتشار الفروع . الانثى تضع من ١٢ الى
١٥ بيضة تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٩٦٥٦ - خَيْطَل
Chat (F). Cat (E).
هو السنور والهر والقط والخيدع .

٩٦٥٧ - خَيْطَلِي
Filiforme (F). Filiform (E).
شكل من الزبان قوامه فواصل اسطوانية مستطيلة متتابعة
مستقيمة او ملتوية .

٩٦٥٨ - خَيْطَلِيَّات
Némathelminthes (F).
Nemathelminthes (E).
شعبة الديدان الخيطية منظمها طفيلي .

٩٦٥٩ - خَيْطَلِيَّات الخَيْشَم
Filibranches (F).
Filibranchial (E).
رتبة من الرخويات . تتميز بخياشيمها الخيطية الملتوية او
المخبئة تجمعها الى بعضها البعض زرع عن الغلب او فصل
ضيقة .

٩٦٦٠ - خَيْطَلِيَّات الْقُرُون
Nématocères,
Némocères (F). Nemocera (E).
مرتبة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . فصائلها واجناسها
وانواعها نحو ١٥٠٠٠٠ متشرة في جميع اصقاع العالم ||
تتميز جملاتها باستطالة القرون الاستشعارية المركبة من
١٠ الى ٢٧ فصلة . ملامسها الفكية مستطيلة ، متدلية
او منتصبة ، مركبة من ٤ او ٦ عقل || يرقاتها بادية
الرؤوس . رؤوسها مدرة او جزئية التدريع . ناكشها
افقية الحركة . بعضها مجهزة بقرون استشعارية مهدبة ||
اشهر فصائلها البعوضيات والبيبيونيات والعليثاريات
والقرسيات والقمصيات .

٩٦٦١ - خَيْف
Fourreau du chameau (F).
Scabbard of camel (E).
الخيف : وعاء قضيب البعير . والخيف : جلد الضرع .
والخيفاء : الواسعة الضرع من البقر .

٩٦٦٢ - خَيْبَلَانِيَّات
Protoures (F).
رتبة حشرات من الثلاث الواثجات ، انواعها نحو ٥٠
تجمعها فصيلتان . جميعها صغيرة القد عديمة الجناح
والزباني . يكثر وجودها في السرجين والديال المضوي
والنباتي .




خيصل طويل الذنب



خيفود



خيمة



خييمة

٩٦٧٦ - خيول العربات Chevaux d'attelage (F).
Carriage-horses (E).

هي خيول الركوب التي ثقلت همها والجياد التي لا تصلح للسباق فتستعمل في جر العربات وما أشبه .

٩٦٧٧ - خيول النزو Chevaux de remonte (F).
Stallion blood-horses (E).

هي الخيول المعدة للأنزاء وقد يشترط فيها أن تتحلل بجميع الصفات النوعية الخاصة المميزة وأن تكون خالية من العيوب ، مرهفة الاحساس ، نشيطة .

٩٦٧٨ - خييمة * Ombellule (F).
Umbellula, Umbellet (E).

هي ، في التحلية النباتية ، كل خيمة صغيرة تؤلف مع رفيقاتها ، أي بمجموعها ، خيمة مركبة .

كبيرة القد ، ضخمة الجثة ، قوية العضلات ، متينة المفاصل شديدة القوامة ، بطيئة السير .

٩٦٧٤ - خيول الجر الخفيف





Chevaux de trait léger (F). Draught-horses (E).

هي الخيول المعدة لجر الاحمال المتوسطة الثقيل بأسرع وقت ممكن لذلك يقتضي أن تكون كبيرة الجثة ، نشيطة ، قوية ، لا يزيد وزنها على ٦٠٠ كيلو .

٩٦٧٥ - خيول الركوب ، جيئاد

Chevaux de selle (F). Saddle-horses (E).

هي الخيول المعدة لحمل فرسانها ونقلهم بسرعة لذلك يجب أن تكون خفيفة ، قوية المراس والعضلات ، نشيطة الهمة لتتمكن من السير السريع المستمر .



د

الزمرعات والنوامي والثمار . انماها تفصح جرواً واحداً تحمله وترضعه حتى القطام || اشهر انواعه داب اي .

٩٦٨٥ - دآبة آي* *Bradypus tridactylus* (S). *Bradype al, Al* (F). *Bradypus Al* (E).

اعرف واشهر انواع الداب . موطنه احراج البرازيل وفنزويلا وكولومبيا . طوله نحو ٥٥ سم . ذنبه ٤ سم . اما اظافره فن ٤ الى ٦ سم . ثوبه كثيف الوبر ، لونه الى الصهبة الغبراء ، كثفاه الى السمرة . بطنه فضي اللون . عيناء مطوقتان باطار اسود .

٩٦٨٦ - دآبات ، كسالي *Bradypodidae* (S). *Bradypodidés, Paresseux* (F). *Bradypodidae* (E). فصيلة حيوانات شجرة من رتبة الدرد تشمل جنسي الداب والكولب .

٩٦٨٧ - دآبركة *Ergot, Eperon* (F). *Spur* (E). زائدة قرنية قاسية تكون في مؤخر رجل الديك .

٩٦٨٨ - دآبركة *Talon* (F). *Heel* (E). هي عند الخيل ما يلي مؤخر الرنح من غلاف الحافر .

٩٦٨٩ - دآبرين *Ergotine* (F). *Ergotin* (E). شبه قلووي يستخلص من عاكوب الشيلم . راجع ارغوتين وعاكوبين .

٩٦٩٠ - دآثورة *Datura* (S). *Stramoine* (F). *Datura* (E). جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الباذنجانيات . انواعه نحو ٢٠ اقليمها المناطق الحارة والمعتدلة . منها الجنبات والاعشاب الطبية والسامة والزينة . اوراقها منعقة متعاقبة مزراقية النصل المفروض . ازهارها فردية ، كبيرة القد ، بوقية . منها الابيض والبنفسجي والاحمر . اشهر انواعه ما يتبع .

٩٦٧٩ - دآء ، مَرَض ، وَصَم *Maladie* (F). *Illness, Malady* (E).

تغير في النسجة الجسم او اعضائه يعقبه اضطراب موضعي او شامل يؤثر في حياة الكائن الحي او في طاقته الطبيعية . والامراض قد تكون حادة ، مزمنة ، وظيفية ، وراثية ، وبائية ، الخ . اما علم الامراض الذي يبحث في طبيعتها وتخليتها وتشخيصها فهو الوصامة . اطلبها .

٩٦٨٠ - دآء الشعاب ، ثعلبية *Alopécie, Pelade* (F). *Baldness, Fox's evil, Pelada* (E). مرض عضوي يصيب الحيوان والطير فيسبب انمعاط وبر الاول وسقوط ريش الثاني .

٩٦٨١ - دآء المفاصل ، رئية ، شوصة *Rhumatisme* (F). *Rheumatism* (E). علة مثلة طابعها ورم يحل بالمفاصل او العضلات او الاحشاء .

٩٦٨٢ - دآبة ، زاحيف ، قريش *Rampant* (F). *Creeping, Crawling* (E). نعت تعريفي يطلق على الحيوان الذي يدب او يزحف وعلى النبات المداد .

٩٦٨٣ - دآبة *Tichodrome de murailles* (F). *Wall creeper* (E). هو صر الصخور طائر من المتوقلات ، اطلبه .

٩٦٨٤ - دآبة* ، كسلان *Bradypus* (S). *Bradype* (F). *Bradypus* (E). جنس حيوان من فصيلة الدابات . موطنه امريكا الجنوبية . انواعه خمسة . جميعها بطيئة الحركة تسير على الارض بصعوبة . قوائمها ثلاثية الاصابع . اظافرها مستطيلة ، منعقة تمكنها من التسلق . تعيش على الاشجار قوتها



داب



داب اي



داتوره زاهية



داتوره شائكة



داتوره فاغية



داتيسكه قناية

٩٦٩٨ - دَاتُورَه فَاغِيَّة *

Datura suaveolens (S). *Stramoine odorante*, *Brugmannsia* (F). *Cow's-horn*, *Angel's trumpet plant* (E). *Trompetenstechapfel* (D). *Trombetta angelica* (I).

جنبه معمرة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . ساقها ليفية مخشوشة . اوراقها اهليلجية ، نصلها مالمس البشرة . ازهارها كبيرة ، متدلية ، عطرية ، بيضاء اللون . كعابرها سرحة . ازهارها يستمر من آب الى تشرين .

٩٦٩٩ - دَاتِيسِكِه

Datisca (S). *Datisque*, *Cannabine* (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الداتيسكيات . انواعه ثلاثة . اوراقه مركبة متعاقبة . ازهاره ابطي الارتكاز ، عنقودي التجميع ، متصب . ازهاره ثنائية المسكن . ثماره كعابر مستطيلة || اشهر انواعه الداتيسكه القناية .

٩٧٠٠ - دَاتِيسِكِه قَنَابِيَّة *

Datisca cannabina (S). *Cannabine faux-chanvre*, *Chanvre de Crète* (F). *Bastard hemp*, *Cretan hemp plant* (E). *Gelber scheinhanf*, *Bastardhanf* (D). *Cannapa di Creta* (I).

نوع من الداتيسكه . وهو نبات زراعي هيئته كهيئة القنب . ساقه منتصبه تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه متعاقبة مركبة . وريقاته سباعية او تساعية ، نصلها اهليلجي مدبب العقصة : منشاري الحافة ، بطول نحو ٥٠ سم ويعرض ١٢ || ازهاره عنقودية التجميع ، خضراء اللون ، عادمة التويج ، قصيرة الفصل . الذكورية منها تساعية الاسدية والانثوية بيضيه الكأس ثلاثية او خماسية السمت الخيطية الريشية || ثماره كعابر مستطيلة بزورها دقيقة وكثيرة العدد || يرغب في الاثربة الرطبة المتوسطة الاندماج . اوراقه صباغية نقيعها اصفر اللون . الياف سوقه صناعية .

٩٧٠١ - دَاتِيسِكِيَّات

Datisca (F). *Datisca* (E).

فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة ، عديمات القعالة ، منخفضة المبيض . اجناسها اربعة وانواعها سبعة فيها الاشجار والاعشاب . ازهارها ثنائية المسكن . ثمارها حقبة عديدة البزور || اعرف اجناسها واشهرها الداتيسكه .

٩٧٠٢ - دَاخِلِي

Endogène (F). *Endogenous* (E). صفة بعض الاعضاء النباتية ومنها الفطور التي تنمو من الداخل فيكون نموها عاماً ومنظماً في جميع الجهات .

٩٧٠٣ - دَاذِي

هو البوط المريض ، اطلبه .

٩٧٠٤ - دَاذِي ، هِيُورْقَارِيَقُون ، أَوْقَارِيَقُون

Hypericum (S). *Millepertuis* (F).

جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الداذيات . انواعه نحو ١٨٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . منها الاشجار والشجيرات والجنابات والاعشاب . اوراقها حاشنة ، متقابلة ، بسيطة ، نصلها كثير الجيوب الدهنية الشفافة التي تبدو كالثقوب . ازهارها عنقودية التجميع ، مختلفة الالوان يكثر فيها الاصفر والابيض . ثمارها جراء ثلاثية الفلق || اشهر انواعه ما يتبع .

٩٦٩١ - دَاتُورَه بَنْفَسَجِيَّة

Datura tatula (S). *Stramoine violette* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها ملساء البشرة . ساقها وازهارها وعروق اوراقها بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٩٦٩٢ - دَاتُورَه دَمَوِيَّة

Datura sanguinea (S). *Stramoine sanguine* (F).

جنبه معمرة تعلو من مترين الى اربعة امتار . ساقها ليفية مخشوشة . اوراقها كبيرة اللد ، نصلها مالمس البشرة . ازهارها مستطيلة متدلية تبدو صفراء اللون ثم تنحرف رويداً رويداً نحو الاحمر الدموي || ازهارها يستمر من آب الى ايلول .

٩٦٩٣ - دَاتُورَه زَاهِيَّة * ، دَاتُورَه مَصْرِيَّة

Datura fastuosa (S). *Datura fastueux*, *D. d'Egypte*, *Stramoine fastueuse* (F). *Purple flowered thorn-apple* (E). *Roter stechapfel* (D). *Stramonio fastoso*, *Mantello di Cristo* (I).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها منتصبه بنفسجية مرقشة بالابيض . اوراقها بيضيه ذلقة مسننة . ازهارها عطرية مكبة . بتلاتها بنفسجية الصفحة الخارجية ، بيض الداخلية . كعابرها كروية شائكة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٦٩٤ - دَاتُورَه سَامَّة

Datura ferox (S). *Stramoine féroce* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ساقها حمراء زياء . اوراقها مفصصة ، قلبية القاعدة ، ذلقة الزام الاخير . نصلها جزوي اللون خلي البشرة . ازهارها كبيرة القد لوناً الى البياض . كعابرها منتصبه كثيرة الشوك || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٩٦٩٥ - دَاتُورَه شَائِكَة * ، نَفِير

Datura stramonium, *D. spinosa* (S). *Stramoine commune*, *Herbe à la taupe*, *Pomme épineuse*, *P. du diable* (F). *Thorn-apple*, *Devil's apple*, *Devil's trumpet* (E). *Echter stechapfel* (D). *Stramonio*, *Mela spina*, *Pomo spinoso* (I).

جنبه حولية برية وزراعية تزيينية تعلو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقها ملساء واوراقها كذلك . ازهارها منتصبه بيضاء اللون . كعابرها شائكة بيضيه الشكل تطول نحو ٥ سم . || تعتبر من النباتات الطبية ذات السموم ويستعمل ورقها لفائف لتسكين الربو وقد يجوز خلطه بالتبغ || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٩٦٩٦ - دَاتُورَه شَمْعِيَّة

Datura ceratocaula (S). *Stramoine cirreuse* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقها جزوية اللون موشحة بغشاء شمعي اطحل . اوراقها اهليلجية ، نصلها ازغب الصفحة السفلى . ازهارها كبيرة القد ، بتلاتها بيض الداخلية بنفسجية الخارج تنفتح من الساعة الخامسة مساء الى العاشرة صباحاً . كعابرها متدلية سرحة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٦٩٧ - دَاتُورَه صَفْرَاء

Datura chlorantha (S). *Stramoine jaune* (F).

جنبه حولية تزيينية تعلو من ١١٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها بيضيه النصل المتمتع المسن الحافة . ازهارها متدلية تويجها خماسي التفريش ، بتلاتها صفراء || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين .

٥ سم. ازهارها لاطئة مستعرضة قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الذهبي اللامع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

٩٧١١ - دَاذِي مَرِيح ، هِيُوفَارِيَقُون مَرِيح

Hypericum prolificum (S). Millepertuis prolifère (F). نوع من الداذي وهو جنبة تزيينية معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها تطول من ٥ الى ٨ سم. وتعرض من ١ الى ٢ سم. ازهارها مستعرضة قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الصفار الزاهي الفضي الموج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

٩٧١٢ - دَاذِي مُنْتِن * ، هِيُوفَارِيَقُون مُنْتِن ، شَجَرَة التَّيْس ، دَمُوع البَيْسِن

Hypericum hircum (S). Millepertuis fétide, M. de bouc (F). Goat-scented St John's wort (E). Bockskraut, Stinkendes harthen (D). Iperico fetido, Ruta caprina (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر كرية الرائحة يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فروعها مستقيمة او مربعة الهيكل ، جزوية اللون . اوراقها اهليلجية مدببة الزام الاخير . ازهاره صفراء اللون قليلة العدد || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧١٣ - دَاذِي هُوَكِر ، هِيُوفَارِيَقُون هُوَكِر

Hypericum hookerianum (S). Millepertuis de Hooker (F).

نوع من الداذي وهو جنبة تزيينية معمرة تعلو نحو ٢٠٠ سم. فروعها اسطوانية . اوراقها بيضيه ، نصلها بحري الصفحة السفلى. اخضر العليا يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٥ سم. ازهارها كبيرة القد ، قطرها من ٥ الى ٦ سم. لونها الى الصفار التبي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

٩٧١٤ - دَاذِيَّات ، هِيُوفَارِيَقُونِيَّات

Hypericaceae (S). Hypéricacées (F). Hypericaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات المستقلة ، مرتفعة المبيض . اجناسها وانواعها كثيرة . سوقها وجذورها دهنية الاوعية . اوراقها متقابلة ، بسيطة ، كاملة ، نصلها مفعم بالجيوب الافرازية الدهنية . ازهارها خشوية ، عنقودية التجميع ، هامية الارتكاز || اشهر اجناسها الداذي والحفرد والدملوق .

٩٧١٥ - دَار شَيْشَعَان هو القندول ، اطلبه .

٩٧١٦ - دَار صُوص هو القرفة الصينية ، اطلبها .

٩٧١٧ - دَار صِيْنِي هو قرفة سرنديب ، اطلبها .

٩٧١٨ - دَار فِلْفَل * Capricum frutescens (S).

Piment enragé, P. d'oiseau (F). Bird pepper, Spur pepper (E). Vogelpfeffer, Ziegenpfeffer (D). Peperone rabbioso, Pepe d'uccello (I).

نوع من الفليفلة وهو نبات عشبي حولي زراعي من الفصيلة الباذنجانية . ثماره حريفة لاذعة ، مستطيلة الشكل ، جامدة القشرة المأكولة ان خضراء او جافة || يتكاثر بالبذر . زراعته مروية تنجح في معظم الارربة المعتدلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية .

٩٧١٩ - دَارِجَة Membre (F). Limb (E).

هي قائمة الدابة ج دوارج .

٩٧٠٥ - دَاذِي رُومِي * ، هِيُوفَارِيَقُون مَعْرُوف ،

حَشِيْشَة القلب ، عَصْبَة القلب ، مُنْسِيَة

Hypericum perforatum (S). Millepertuis perforé, Chasse diable, Herbe de St-Jean, H. aux piqures, Trucherau (F). Perfoliate St John's wort (E). Johanneskraut, Tüpfelharthen (D). Perforata, Iperico comune, Erba di San Giovanni (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر يعلو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقه بيضيه مستطيلة كثيرة الجيوب العطرية . ازهاره صفراء اللون مستعرضة قطرها نحو ٢ سم. || منافعها الصحية والطبية عديدة . يكثر في الاراضي البور وقرب السياجات || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٩٧٠٦ - دَاذِي صَخْرِي ، هِيُوفَارِيَقُون صَخْرِي

Hypericum empetrifolium (S). Millepertuis à feuilles de camarine (F).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري ، طبي ، معمر يعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقه عروية ، ضيقة النصل ، ثلاثية الفصمة . ازهاره صفراء اللون قطرها نحو ٢ سم. اسديتها ثمية ثلاثية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٩٧٠٧ - دَاذِي كَبِير الْوَرَق ، هِيُوفَارِيَقُون

كَبِير الْوَرَق Hypericum grandifolium (S).

Millepertuis à grandes feuilles (F).

نوع من الداذي وهو جنبة برية وزراعية تزيينية تعلو نحو ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية ، نصلها قلبي القاعدة ، مدبب العقصة ، لامع البشرة ، طوله نحو ٦ سم. عرضه ٤ سم. ازهارها عذقية التجميع مستحبة الرائحة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧٠٨ - دَاذِي كَثِيْف الزَّهَر ، هِيُوفَارِيَقُون

كَثِيْف الزَّهَر Hypericum densiflorum (S).

Millepertuis densiflora (F).

نوع من الداذي وهو جنبة معمرة تعلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عروية مستطيلة ضيقة النصل ، ثنائية الفصمة . ازهارها كثيفة التجميع صفراء اللون . قطرها نحو ١٠ سم. ثمارها جراء تطول نحو ٥ سم. || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

٩٧٠٩ - دَاذِي مَخْرِي * ، هِيُوفَارِيَقُون مَخْرِي ،

رُمَّان الْاَنْهَار ، اَنْدُرُوسَاْمُن


Hypericum androsaemum (S). Androsème, Millepertuis androsème, Toute saine (F). Park-leaves, All saint's-wort, Tutsan (E). Grundheil, Grosses Johanniskraut (D). Iperico tutto sano, Androsamo, Tuttasana (I).

نوع من الداذي وهو نبات عشبي بري طبي معمر يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه بيضيه مستطيلة . ازهاره زاهية الصفار . مستعرضة . قطرها نحو ٣ سم. ثماره عننية سوداء اللون || منافعها الطبية عديدة ويستخرج منه صباغ احمر يناع بالدهن والماء || ازهاره صبي يلدوم من حزيران الى تموز .

٩٧١٠ - دَاذِي مُذْهَب ، هِيُوفَارِيَقُون مُذْهَب

Hypericum aureum (S). Millepertuis doré (F).

نوع من الداذي وهو جنبة تزيينية معمرة تعلو نحو ١٢٠ سم. اوراقها بيضيه الشكل ، جلدية النصل ، تطول نحو



دَاذِي رُومِي



دَاذِي مَخْرِي



دَاذِي مُنْتِن



دَار فِلْفَل

٩٧٢٠ - دارم

الدراهم شجر شبيه بالغضا ولونه اسود يستاك به النساء فيحمر لثاتهن وشفاهن تحميراً شديداً وهو حريف . (اللسان) .

٩٧٢١ - داس

نعت تعريفي يطلق على كل نبات غير نام .

٩٧٢٢ - داسيع ، دوسع

الداسع والدوسع خط موجه ثابت المنشأ كمقرب الساعة يتحرك وفقاً لنظام دائري معين .

٩٧٢٣ - داسيعي ، دوسعي

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالداسع .

٩٧٢٤ - داص

داس المال ودئص : امتلا سناً .

٩٧٢٥ - داعرة

الداعرة هي كل نبتة من ثنائيات المسكن كالنخلة لم تقبل الاخصاب ج مداعير .

٩٧٢٦ - داغيش

اسم يطلق على كل زوج من الارثين او الجين يعلو النشبة اي الكروموزم .

٩٧٢٧ - دأغصة

هي الرضفة : العظم المدور المتحرك في رأس الركبة . ج دواغص .

٩٧٢٨ - دأغي

جنس حيوانات لبونة قاضية من فصيلة الدافيات انواعه عديدة قريبة الشبه من الجرذان . طولها نحو ١٨ سم . وأذناها ١٠ سم . رؤوسها صغيرة القد . مقاضها مقطوفة . أذناها معتدلة الكبر تطول نحو ٢ سم . || أثوابها الى الصهبة السمراء يعلوها موج اسود ، بطونها بيض ، اطراف اذناها سود || موطنها امريكا الجنوبية اخصها الشيلي والأند تألف الادغال والحقول والحدائق والبساتين . قوتها الاعشاب والجذور والحبوب .

٩٧٢٩ - دأغيات

فصيلة حيوانات لبونة قاضية من مرتبة شبيهيات الشوزب ورتبة القواضم . اجناسها وانواعها عديدة منها الارضية والجمامة والقازية . جحافلها شديدة الاذى تقصر جميع المزروعات || أشهر اجناسها الدأغي واليرنب والقباع والغندي والكبرميس .

٩٧٣٠ - دافع

هو الغاية الخاصة التي دفعت الى العمل .

٩٧٣١ - دافع

هو الذي يدفع المعقود عليه او ينقل الملكية .

٩٧٣٢ - دافع البرد

كل ما يستعمل لوقاية النبات من البرد كصواريخ البرد والشلالات الكهربائية والمناطيد المتفجرة .

٩٧٣٣ - دافع الجلد

كل ما يستعمل من ضروب الوقاية لاجتناب تأثير الوضء والجلد على النبات .

٩٧٣٤ - دافع الرطوبة

دافع الرطوبة وبائع الرطوبة وطارد الرطوبة . نعت تعريفي يطلق على كل طلاء واق من الرطوبة يطل به الخشب لمنع تأثير الرطوبة فيه .

٩٧٣٥ - دافع الصاعقة ، شاري ، حرقة ، مصعقة

جهاز خاص يستلبي الكهرباء الجوية ويفرغها يستعمل لوقاية البناء من شر الصاعقة . يلسب اختراعه الى بنيامين فرانكلين عام ١٧٥٥ . وهو مؤلف من قضيب طويل من الحديد الصلب مذهب الطرف يثبت رأسياً فوق ذروة البناء ويهبط عمودياً الى التربة ثم يغورها الى باطن الارض حيث ينتهي اما في بئر ماء او في حفرة اعمت بمسحوق الفحم المبلل بالماء .

٩٧٣٦ - دافنة

جنس حشرات من مغسفات الاجنحة وفصيلة الدرقيات . قوتها الجيف تبيض وتعيش عليها . انواعها كثيرة العدد ، لاقياسية القد ، مختلفة الالوان . تتميز باجسامها المستطيلة الشكل وبقرورها الاستشعارية الدبوسية .

٩٧٣٧ - دافنة مأكرة

حشرة وانحة من فصيلة الدرقيات ورتبة مغسفات الاجنحة . تألف البراري والحقول والاحراج والاماكن المأهولة . قوتها الجيف من القوازم الى الزحافات والحيوانات الصغيرة والكبيرة || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى ١٨ مم . ثوبها اسود اللون يعلوه تبقيع غدي احمر . رأسها معتدل الجرم ، مستدير . فكها قويان ذريبان . زباناها دبوسيا الاطراف . عيناها كبيرتان جاحظتان . ظهرها يلحف أكثر من نصف البطن . غداها ثلاثيتا الشخيد ، مبقجتان بالاحمر . ارساغها خاسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر الخريف . تسرح في الليل . وتمتص المكن في الجيف من الجهة التي تلامس التراب || اليرقة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول من ٢٠ الى ٣٦ مم . جسمها مستطيل الشكل ، مستغلظ المقدم ، مستدق المؤخر ، اسمر اللون اسود الرأس والشرح والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٢ الى ٢٨ يوماً ينقضي في التربة .

٩٧٣٨ - دافه

راجع حاكك .



دأغي



دافنة مأكرة

المخلولة هي منفصلة وتكون شوارد ايدروجينية || ترتيبه العملي يشمل ١١ فئة تحديدها ما يلي :

١ - من ٠ الى ٤ درجات : تربة حامضية صرفة لا تصلح للزراعة .

٢ - من ٤ درجات الى ٤ درجات و ٦ خطوط : تربة مفرطة الحامضية .

٣ - من ٤ درجات و ٦ خطوط الى ٥ درجات وخطين : تربة قوية الحامضية .

٤ - من ٥ درجات وخطين الى ٥ درجات و ٨ خطوط : تربة حامضية .

٥ - من ٥ درجات و ٨ خطوط الى ٦ درجات و ٤ خطوط : تربة متوسطة الحامضية .

٦ - من ٦ درجات و ٤ خطوط الى ٦ درجات و ٩ خطوط : تربة قليلة الحامضية .

٧ - من ٦ درجات و ٩ خطوط الى ٧ درجات وخط واحد : تربة حيودة .

٨ - من ٧ درجات وخط واحد الى ٧ درجات و ٥ خطوط : تربة قليلة الحرضية .

٩ - من ٧ درجات و ٥ خطوط الى ٨ درجات و ٣ خطوط : تربة حرضية .

١٠ - من ٨ درجات و ٣ خطوط الى ٩ درجات : تربة مفرطة الحرضية .

١١ - من ٩ درجات الى ١٤ درجة : تربة حرضية مطلقة لا تصلح للزراعة .

وقد لحصنا في المخطط الدائري التابع مجمل ما تقتضي معرفته عن مقاييس الدالف العادية ومسا يقابلها من امكانيات زراعية :

٩٧٤٨ - دَالِفْ مَهَبِطِي ، كاثيون Cation
عنصر موجب الكهربائية .

٩٧٤٩ - دَالِي Deltoïde (F). Deltoid (E).

٩٧٥٠ - دَامِير * Cloche en verre (F).
Bell-glass (E).

وعاء من زجاج جرمي الشكل يستعمل للغطية وهو شائع الاستعمال في الزراعات الباكورية .

٩٧٥١ - دَامِقُ ٥ Gibellina (S). Gibelline (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشويات اعسانها متحدة مستطيلة الاعناق ترتكز على وئمة رهلة تغرز في نسج النبات المنحار || تكاثفها مصحوبة بالنكات . بوعها حنطي اللون وشعي الشكل شفي الارتكاز معترض الوئمة || انواعه قليلة اعرفها واشهرها دامق الزرع .

٩٧٥٢ - دَامِقُ الزَّرْع ٥ Gibellina cerealis (S).
Gibelline du blé (F).

فطر مجهري يصيب الزرع فيمنعه عن الاسبال . مظهره الخارجي يقع حنطية تبدو مستديرة ثم تستطيل وتلتصق . تركيب قصب الزرع من مركز انتاش الجذور حتى ارتفاع ١٥ سم . ثم تتحول الى غشاء من العفن الاطحل . اضراره جسيمة لانه يوقف النمو ويمنع الاسبال بعد ان يسبب ذبول المصنف والتفافه ورياسه . يكافح بالحريق .

٩٧٣٩ - دَالِكْ Couvrir (F). To couple with (E).
دالك الحصان الحجر : علاما (التاج) .

٩٧٤٠ - دَال ، دِيل Chacal (F). Jackal (E).
اطلب ابن آوى .

٩٧٤١ - دَالَّة Fonction (F). Function (E).

٩٧٤٢ - دَالَّة مُشْتَقَّة Fonction dérivée (F).
Derived function (E).


٩٧٤٣ - دَالَّة مُولِّدَة Fonction génératrice (F).
Generating function (E).

٩٧٤٤ - دَالِج Hérisson (F). Hedgehog (E).
هو القنفذ ، اطلبه .


٩٧٤٥ - دَالِج الدالح والدلوح : السحاب الكثير الماء .

٩٧٤٦ - دَالِيس ٥ ، دَامِيس ٥ ، دَالِش ٥ Lucifuge (F). Lucifugous (E).
نعت تعريبي يطلق على كل حشرة تخشى النور فتتخذ فيه الى السكينة وتنشط وترسخ في الظلام .


٩٧٤٧ - دَالِفْ pH
الدالف هو التعبير الرمزي العددي عن درجة التفاعل الشاردي في التربة . مقياسه التقني يراوح من الحامضية الصرفة التي تبتدئ بدرجة صفر الى الحرضية المطلقة التي تنتهي بدرجة ١٤ تتوسطها الحيودة || وهو من الوجهة الحكمية - الكيماوية . يعبر عن مقدار ايونات اي شوارد الايدروجين عملاً بالنظرية العلمية القائلة ان جميع الحوامض



دامر



دامق الزرع



٩٧٦٥ - دَائِرَةُ التَّشَابُهْ ، دَائِرَةُ الْمُحَاكَاةِ

Cercle de similitude (F). Circle of similitude (E).

٩٧٦٦ - دَائِرَةُ الْجَدْيِ

Tropique du capricorne (F). Capricorn tropic (E).

دائرة الانقلاب الشتوي .

٩٧٦٧ - دَائِرَةُ السَّرَطَانِ

Tropique du cancer (F). Cancer tropic (E).

دائرة الانقلاب الصيفي .

٩٧٦٨ - دَائِرَةُ السَّمْتِ

Colure (F).

٩٧٦٩ - دَائِرَةُ السَّمْتِ الإِعْتِدَالِيَّةِ

Colure des équinoxes (F). Colure of equinox (E).

٩٧٧٠ - دَائِرَةُ السَّمْتِ الإِنْقِلَابِيَّةِ

Colure des solstices (F). Colure of solstice (E).

٩٧٧١ - دَائِرَةُ اللَّتَامِ

Cercle osculateur (F).

Osculatory circle (E).

٩٧٧٢ - دَائِرَةُ مُحَاطَةِ

Cercle inscrit (F).

Inscribed circle (E).

٩٧٧٣ - دَائِرَةُ مُحِيطَةِ

Cercle circonscrit (F).

Circumscribed circle (E).

٩٧٧٤ - دَائِرِيٌّ ، دَوَّارٌ

Giratoire (F). Gyratory (E).

٩٧٧٥ - دَائِرِيٌّ

Circulaire (F). Circular (E).

٩٧٧٦ - دَائِنٌ

Créancier (F). Creditor (E).

هو الذي يكون الدين مطلوباً له . والدائن قد يكون :

- دائنٌ عادي وهو من ليس لديه ضمانٌ عيني خاص .

- دائنٌ مداعي هو الذي رفع الدعوى طالباً تسديد دينه .

- دائنٌ مرهون وهو الذي يضمن دينه بالرهن العيني .

- دائنٌ ممتاز هو الذي يتخذ لدينه الصفة الخاصة التي يقرها

القانون فيكون مفضلاً على سائر الدائنين عند قبض دينه .

٩٧٧٧ - دُبْ

Ursus (S). Ours (F). Bear (E).

كنيته أبو جهينة وأبو الحلاج وأبو سلمة وأبو حميد

وأبو قتادة وأبو اللباس . والآنثى تسمى دبة والجمع دببة .

وأدباب || جنس حيوانات من الثدييات اللواحم وفصيلة

الدببات . أنواعه عديدة جميعها كبيرة أو متوسطة القد ،

ثقيلة الجثة . رؤوسها غليظة مستطيلة . أذناها صغيرة

منتصب . قوائمها قصيرة قوية . تمشي على مناسمها وتقف

على قوائمها الخلفية . برائنها خماسية ، أطرافها كبيرة قوية

قليلة الانعكاف . أذناها متناهية القصر . أصوافها

جشلة . ألوانها متعددة الألوان || أأنها تضع من

جروين إلى ستة جراء || أشهر أنواعه ما يتبع .

٩٧٧٨ - دُبْ أَبْقَع * ، دُبْ الْخَيْرَانِ

Alluropus, Ursus melanoleucus (S). Ailuropus, Ours du Père David, O. des bambous (F). Aeluropus, Parti-coloured bear (E).

نوع من الدببة قليل الوجود موطنه التبت الشرقية . يألف

مقاصب الخيران . قوته الأعشاب والجذور والرمعات

٩٧٥٣ - دَابِلْ

Sarcotique (F). Sarcotic (E).

يساعد على اندمال الجرح .

٩٧٥٤ - دَامِنٌ هَوَّالٌ

Saprophage (F).

Saprophagous (E).

الدائمة والهاوكة : الحشرة التي تعيش على المواد النباتية المنحلة .

٩٧٥٥ - دَامِيٌّ

Sanguivore (F). Sanguinivorous (E).

الدامي والدائمة ج داميات هي الحيوانات والحشرات التي تعيش من امتصاص الدم .

٩٧٥٦ - دَاهِفَةٌ ، دِيلُوفِيَا

Dilophia (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة العشويات .

أعصابها متحدة ضخمة مستطيلة ترتكز على وئمة سوداء .

بوغها وشعي الشكل عديد الاقسام الوثيرية المعترضة .

أنواعه الاقتصادية قليلة . أعرفها داهفة النجيليات .

٩٧٥٧ - دَاهِفَةُ النَجِيلِيَّاتِ *

Dilophia graminis, Dilophospora graminis, D. alopecuri, Sphaeria alopecuri (S).

فطر مجهرية يركب الزروع وجميع النباتات النجيلية

فيغطها ويمنعها عن الاسبال || مظهره الخارجي بقع

سود تصيب قصب الزرع وأغماره ، قبل الاسبال وعنده

فتسنعه أو تحول دون اكتماله بعد أن تمتلئه بوشاح من

العصيفات السود ينشأها الففار الفحمي || ومن العلماء

من قال أن انتشار الداهفة يعود إلى الديدان الثعبانية

التي تنقلها || يكافح بالحريق وبتطهير البذار قبل

نثره بمذوب كلوريد الصوديوم المحلول ٢٠ ٪ أو بمذوب

كلوريد البوتاسيوم المحلول ١٧ ٪ على أن يغسل البذار ،

بعد تطهيره بالماء العذب .

٩٧٥٨ - دَالِدٌ

Vermivore (F). Vermivorous (E).

نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو طير قوته /الديدان

أو يأكل الديدان .

٩٧٥٩ - دَائِرَةٌ ، نَيْشَانٌ

Epi (Zoot.) (F). Tuft (E).

نكتة من الشعر مستديرة صغيرة يختلف اتجاهها عن اتجاه

سائر الشعر . يعدون منها في الخيل أكثر من ١٤ أما

أشهرها فدائرة الحيتا بأسفل الناصية ودائرة اللطاة في وسط

الجبهة ودائرة السامة في وسط العنق .

٩٧٦٠ - دَائِرَةٌ ، مُحِيطٌ

Circonférence, Cercle (F). Circumference, Circle, Circuit (E).

الدائرة هي المنحنى المقفل المحدد لسطح مستدير .

٩٧٦١ - دَائِرَةٌ أُسَاسِيَّةٌ

Cercle de base (F).

Base circle (E).

٩٧٦٢ - دَائِرَةُ الإِسْتِدْلَالِ ، دَائِرَةُ مُوجَّهَةٍ

Cercle de directeur (F). Director circle (E).

٩٧٦٣ - دَائِرَةُ الإِنْقِلَابِ

Tropique (F). Tropic (E).


٩٧٦٤ - دَائِرَةُ الْبُرُوجِ

Cercle du Zodiaque (F).

Zodiac circle (E).

هي فلك البروج أي مجرى الشمس في الفضاء . اطلب

فلك البروج .



داهفة النجيليات



دب أبقع

الثالثة ، وجنوبي القفزة الاولى ، وجنوبي القفزة الثانية ،
وشمالى القفزة الاولى ، وشمالى القفزة الثانية .

٩٧٨٤ - دُبَّ الْبَحْرِ *
Otaria ursina (S).

Otarie ourson (F). Sea bear (E).

نوع من الاتارية الزباء . يعيش في بعض مناطق المحيط
اهادي قرب الشواطئ الامريكية والاسيوية . ذكوره
كبيرة الجثة طولها من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . وزنها من
٣٥٠ الى ٤٠٠ كيلو . انثاه رشيقه نحيلة طولها نحو
١٢٠ سم . وزنها من ٤٠ الى ٥٩ كيلو . راجع اناريه .

٩٧٨٥ - دُبَّ التَّبَت * ، دُبَّ حَمَلَايَا ، دُبَّ

مَطْرَق
Ursus thibetanus (S).

Ours à collier de l'Himalaya (F). Himalayan bear (E).

نوع من الدب شرس الاخلاق والطباع موطنه التبت وحلابة
من ارتفاع ٢٦٠٠ م . وما فوق . ثوبه الى السمرة العابقة .
عنقه مطوق بهلال ابيض ينتهي عند الكتف . طولهُ من
١٤٠ الى ١٧٠ سم . قوته الحبوب والثمار والجذور والغم
والماعز والبقر والجيف .

٩٧٨٦ - دُبَّ الشَّمْس * ، دُبَّ مَلَقَّة

Ursus helarctos malayanus (S). Bruan, Ours du so-
leil, Ours malais (F). Malayan bear, Sun bear (E).

نوع من الدب موطنه ملقه ومليزا والهند الصينية . لا يستلّي
او يرتاح او ينام الا معرضاً لاشعة الشمس . جسمه
مستطيل الشكل طولهُ يراوح من ١٢٠ الى ١٤٠ سم .
ثوبه الى السواد اللامع . صوفه لبد قصير . صدره مطوق
بالابيض . رأسه ضخم . شدقه عريض . اذناه صغيرتان .
قوائمه قوية . اظافره طويلة حادة . يالف الاشجار
الخرجية . قوته الثمار والعسل والطيور والحشرات .

٩٧٨٧ - دُبَّ امْرِيكِي * ، بَرِيْبَال

Ursus americanus (S). Baribal, Ours noir d'Amé-
rique (F). American black bear, Baribal (E).

نوع من الدب موطنه امريكة الشمالية من كندا حتى
المكسيك ثوبه الى السواد الفحمي العابق . صوفه جمل
خشن . طولهُ يراوح من ١٣٠ الى ١٥٠ سم . وزنه نحو
٣٠٠ كيلو . قوته الثمل والعسل والاعشاب والجذور
والحبوب والثمار والاسماك والضفادع والجردان والطيور
الداجنة والغم والخنزير .

٩٧٨٨ - دُبَّ سُورِي *
Ursus syriacus (S).

Ours de Syrie (F). Syrian bear (E).

نوع من الدب موطنه الشرق الادنى يمتد من الافغان الى
ايران وخراسان والقفقاز وجبال طورس ولبنان . ثوبه
الى الصهبة السمراء يعلوها موج اشقر . طولهُ من ١٢٠
الى ١٥٠ سم . قوته الثمار والحبوب والنبات . لا يتعدى
على الغم والماعز الا عند الجوع القاهر .

٩٧٨٩ - دُبَّ كَسْلَان * ، دُبَّ الْعَسَل

Melursus ursinus (S). Melurse, Ours jongleur, O.
lippu (F). Sloth bear (E).

نوع من الدبة موطنه الهند وسرنديب يألف المنافع وضياف
الانهر والادغال الرطبة . جسمه مستطيل القد طولهُ يراوح
من ١٣٥ الى ١٧٥ سم . وزنه نحو ١٥٠ كيلو . ثوبه
الى السواد اللامع خطمه حتى الجبهة ابيض اللون . شدقه
كبير مستعرض . اظافره بيض . قوته الثمار والحشرات
والعسل .

والثمار . طولهُ نحو ١٧٠ سم . ثقل الجثة . قصير القوائم .
ثوبه الى البياض الثلجي . قوائمه وكتفاه واذناه وعينه
سود .

٩٧٧٩ - دُبَّ أَبْيَض *
Ursus maritimus (S).

Ours polaire, O. blanc (F). Polar bear (E).

نوع من الدب موطنه البلاد القطبية المجلدة . جثته كبيرة
غليظة طولها نحو ٢٧٠ سم . وزنها من ٣٠٠ الى ٤٠٠
كيلو . رأسه مستطيل . جبهته منبسطة . اذناه صغيرتان
مستديرتان . فوهة شدقه متوسطة الانفراج . صوفه كثيف ،
قط ، مستطيل . ثوبه الى البياض الفضي . عيناه مكحلستان
بالاسود . حنار شدقه واظافيره سود . يجيد السباحة
والغوص . قوته الفقمه والفظ والحيتان الصغيرة والسلمون
والاعشاب والحزاز والفوتس .

٩٧٨٠ - دُبَّ اُسْمَر *
Ursus arctos (S).

Ours brun (F). Brown bear (E).

اشهر انواع الدبة واكثرها ضرراً وانتشاراً . موطنه
احراج وجبال البلاد الاسيوية والاروبية . جثته غليظة .
طولها يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . وزنها من ١٠٠
الى ٣٠٠ كيلو . قوته الاعشاب والجذور والزعمات
والثمار على اختلافها والعسل واللحم . يتعدى على الغم
والماعز والبقر والخنزير الداجنة والوحشية .

٩٧٨١ - دُبَّ اُسْمَط * ، دُبَّ فَطِيم

Ursus horribilis (S). Ours gris, Ephraïm, Grizzly (F).
Grizzly bear (E).

نوع من الدب كبير الجثة شرس الاخلاق موطنه امريكة
الشمالية من الاسكا حتى جبال المكسيك . ثوبه الى
السمرة الطحلاء الفضية الموج . طولهُ يراوح من ٢٥٠
الى ٣٣٠ سم . وزنه من ٦٠٠ الى ٩٠٠ كيلو . قوته
الثمار والحبوب والجذور وما صادف من حيوان مها كان
نوعه وجنسه .

٩٧٨٢ - دُبَّ اصْفَر ، بَنَات نَعَش الصُغْرَى

La Petite Ourse (F).

the lesser Bear, Ursa minor (E).

الدب الاصفر اقرب كوكبة نجوم الى القطب الشمالي .
نجومها من نفس الصورة سبعة واخراج عن الصورة خمسة .
والعرب تسمي هذه السبعة بنات نعش الصغرى ، فالاربعة
التي على المربع نعش والثلاثة التي على الذنب بنات . وتسمي
النيرين من الاربعة « الفرقدين » والنير الذي على طرف
الذنب « الجددي » ويدعى ايضاً جدي الفرقة ونجم القطب
وسمار الفلك . وتسمي ايضاً جميع النجوم الداخلة في
الصورة والخارجة عنها « الفأس » لشبهها بفأس الرماح .

٩٧٨٣ - دُبَّ اكْبَر ، بَنَات نَعَش الكُبْرَى

La Grande Ourse (F).

the great Bear, Ursa major (E).

الدب الاكبر كوكبة شمالية تقابل الدب الاصفر . نجومها
سبعة وثلاثون . والعرب تسمي الاربعة النيرة التي على المربع
المستطيل « نعش » والثلاثة التي على الذنب « بنات » .
وتسمي النجم الذي على طرف الذنب « القائد » والذي في
وسطه « العناق » والذي يلاصق النعش « الخور » . اما
الاربعة التي تمثل النعش فهي « الدبة » ، و « المراق » ،
و « فخذ الدب » ، و « المفرز » او « مفرز الذنب » .
وهناك انجم عديدة اغصها السها ، والقفزة الثانية ، والقفزة



دب ابيض



دب اسمر



دب اشيط



دب البحر



دب التبت



دب الشمس



٩٧٩٠ - دَبَّاء هو القرع ، اطلبه .

٩٧٩١ - دَبَّاء البَقَر اطلب فرنع البقر .

٩٧٩٢ - دَبَّاء الحَمِير اطلب فرنع اخمير .

٩٧٩٣ - دَبَّاء الهِنْد هو البيايا ، اطلبها .

٩٧٩٤ - دَبَّاب هو نفع الحقل ، اطلبه .

٩٧٩٥ - دَبَّاقَة ، دَبَّاقَة Sauterelle (F). Locust (E).

الجرادة عند نفقها وخروجها من السراة . والجراد دبا . وهو اصهب اللون ابيض او اخضر . فاذا اصفر واسودت خطوطه فهو برقان والواحدة برقانة . فاذا صار فيه خطوط صفر وبيض وسود فهو السلح . فاذا بدأ حجم جناحه فذلك لكثفان لانه حينئذ يكثف المشي والواحدة كثفانة .

٩٧٩٦ - دَبَّارَة ، دَبَّرَة ، كُرْدَة Rigole (F).

Trench (E).

هي انشارة في المزرعة والساقية بين الزروع ج دبار ودبارات ودبر .

٩٧٩٧ - دُبَّاسِي Gouras

جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه قليلة جميعها كبيرة القد ، مستطيلة الذنب ، عارية الارياح الغليظة ، طويلة الاصابع والاطافر . ثوبها ادبس اللون يعلوه موج جفوي . اشهر انواعه الدبسي المتوج . اطلبه .

٩٧٩٨ - دَبَّاش * Phyllorhina (S). Phyllorhine (F).

جنس حيوان من فصيلة الماشيات . انواعه ٢٢ تتميز بزوائدها المنخرية النضوية المستديرة . اذنانها بوقية لا وتدية . ثنائياها العليا دقيقة الخد فارقة . اجسامها صغيرة القد ، يراوح طولها من ٩ الى ١١ سم . وبسطها من ٣٥ الى ٥٠ سم . اثارها من السمرة الكستنائية الى الصهبة الصنابية || موطنها جميع البلاد الحارة الاسيوية والافريقية والاسترالية . تألف الكهوف والمغاور . تعيش جماعات متوسطة العدد . ذكورها لا تقرب اناثها الا عند الكرم . مسرحها من الغسق الى فحة الليل . قوتها الحشرات على اختلاف انواعها .

٩٧٩٩ - دَبَّاغ ، دَبَّاغَة ، دَبَّغ Tannage (F).

Tanning (E).

عملية اعداد الجلود المصبوغة من اهاب بعض الحيوانات . قوامها اشباع الجلود من العطان وغيره من المواد القابضة المأخوذة من لحاء واخشاب وثمار بعض النباتات .

٩٨٠٠ - دَبَّاقَة Viscose

سيلوز اشناني يستعمل في صناعة الردن والسرقي والسيلوفان .

٩٨٠١ - دَبَّاقَة Roridulus (S).

Roridula (F). Roridulus (E).

جنس نباتات عشبية ، برية ، معمرة من فصيلة الدباقيات . انواعها المعروفة ثلاثة اعطانها بعض مناطق افريقية الجنوبية والشرقية || اعشابها مخشوشبة صغيرة الحجم . اوراقها لاطنة سنانية النصال الكثيفة الرغب اللزج الدابق الذي يثصر كل حشرة تقترب منه فيعض عليها ويمتصها . ازهارها صفراء اللون ، سنبلية التجميع ، طرفية الارتكاز .

٩٨٠٢ - دَبَّاقِيَّات Roridulaceae (S).

Roridulacées (F). Roridulaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القعالات مرتفعات المبيض . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . منتبها بعض المناطق الحارة ، اخصها افريقية الجنوبية || نباتاتها اعشاب صغيرة لينة معمرة . سوقها مخشوشبة فرعاء . اوراقها متعاقبة لاطنة ، نصالها هدية ، لزجة ، دابقة تثصر كل حشرة تلامسها . ازهارها سنبلية التجميع ، طرفي الارتكاز . كؤوس ازهارها خماسية الاجزاء . تويجها خماسية البتلات اللامنفصلة والاسدية المتلاصقة . ثمارها كعابر خذروفية الشكل ، ثلاثية الاخبية والبذور الحرة || اشهر اجناسها الدباقَة .

٩٨٠٣ - دُبَّال ، دَجَّال ، هُومُس Humus

مادة عضوية سمراء اللون ، لاقياسية التركيب ونسب العناصر الغذائية ، تنجم عن انحلال المواد العضوية في التربة . يقال دبل التربة . وتربة مدبولة .

٩٨٠٤ - دُبَّالِي Humique (F). Humic (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو دبالي التركيب .

٩٨٠٥ - دَبَّب Duvet (F). Down (E).

هو الرغب الناعم الدقيق الذي يلحف معظم الطيور عند نفقها من البيض .

٩٨٠٦ - دُبَّة Ourse (F). She-bear (E).

انثى الدب وتدعى جهبر .

٩٨٠٧ - دَبَّح Cernier (F).

الدبح سمكة بحرية تدعى قباب ، اطلبه .

٩٨٠٨ - دَبَّح Scorzonera (S).

Scorzonère (F). Scorzonera (E).

جنس نباتات عشبية برية وزراعية معمرة من فصيلة المركبات اللسنيات الزهر . جذورها وتدية غليظة . سوقها مصمتة . اوراقها عصفية الشكل ضيقة النصل . ازهارها رؤسية مركبة . يزورها مستطيلة لا منقارية . اشهر انواعه ما يلي :


٩٨٠٩ - دَبَّح أَرْجَوَانِي Scorzonera purpurea (S). Scorzonère pourprée (F).

نوع من الدبح الزراعي التريبي المعمر . ساقه تعلو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراقه محددة النصل الباهت الخضار . ازهاره خماسية الرؤيسات . ارجوانية اللون || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٩٨١٠ - دَبَّح زَرَاعِي * سَلَسْفِيل أسود ، قَعْبَارُون ، قَوْمِي أسود

Scorzonera hispanica (S). Scorzonère d'Espagne, Salsifis noir (F). Black salsify, Spanish salsify (E). Echte schwarzwurzel (D). Scorzonera hispanica, Salsifica nera (I).

نوع من الدبح البقلي المأكول الجذور والاوراق . جذره غليظ مستطيل . لونه الى البنفسجي الاسود . ساقه شمراخية مصمتة يعلوها الازهار . اوراقه قرصية ضمية ، زباء النصل || يرغب في الاتربة العبيقة الغور ، المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية والعناصر المعدنية .



دب سوري



دب كسلان



دباش



دبح زراعي

منها باطنية تعود الى عوامل الامعاء وافرازات الغدد ومنها خارجية تعود الى شتى العوارض .

٩٨٤٠ - دَبَقُ
Bergerie (F). Sheepfold (E).

حظيرة الغنم المخاطة المسقوفة للوقاية من البرد والرياح .

٩٨٤١ - دَبَوَاء *
Daboia elegans (S).

Daboia (F). Daboia (E).

حبة خبيثة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الافاعي . جسمها متوسط الغلاظة بطول من ٢٠٠ الى ٢٢٠ سم . الاثنى اطول من الذكر . رأسها مستعرض القاعدة غليظ الخطم . عنقها دقيق الجرم . ثوبها الى الغيرة السمراء يعلوها تبقيع اصفر ورقشة حنطية || اعطائها الهند والبلاد المجاورة . مسرحها دجوي . تدخل البيوت الآهلة في طلب الفأر والجردان . لسعتها تقضي على الثور بعد ثلاث ساعات وتقضي على الانسان بعد ساعتين وعسل الطير كالدجاجة بعد ثلاثين ثانية || تعتبر من الافاعي السامة الشديدة الاذى .

٩٨٤٢ - دَبُور
Vent d'ouest (F). West wind (E).

هي الريح الغربية .

٩٨٤٣ - دَبُور
هو الزنبور ، اطلبه .

٩٨٤٤ - دَبُوسِيَّات
Clavariaceae (S).

Clavariacées (F). Clavariaceae (E).

فصيلة الفطور الدبوسية من رتبة الدعاميات . تتميز ببساطة تركيبها . تحبها لحمي التكوين ، مستقيم الانتشاب رزني التجميع او فردية . تلحفه نكهة مخددة الصفحة او ملساء || اجناسها وانواعها عديدة معظمها من الفطور الدائمة التي تعيش على الدبال وعلى المواد الخشبية المنحلة . ومنها جنسان يعيشان على الاعضاء النباتية الحية هما التيفولا والفرطوش .

٩٨٤٥ - دَبُوسِيَّات القُرُون
Clavicornes (F).

Clavicornis (E).

قسم من رتبة مغمدات الاجنحة يشمل جميع فصائل الخنافس من ذوات القرون الاستشعارية الدبوسية الشكل .

٩٨٤٦ - دَبُوسِيَّة ، فَطَرُ المَرَجَّان
Clavaria (S).

Clavaire (F). Goat's beard fungus. Club-topped mushroom (E). Kentenschamm (D). Ditola (I).

جنس فطور من فصيلة الدبوسيات ورتبة الدعاميات . انواعه عديدة معظمها مؤذ وسام وبعضها مأكول للذيذ الطعم . جميعها منتصبة القامة فوارقها الشكل والقند واللون . اشهر انواعها ما يتبع :

٩٨٤٧ - دَبُوسِيَّة صَفْرَاء *
Clavaria flava (S).

Clavaire jaune (F). Yellow clavaria (E).

نوع من الدبوسية المأكولة وهي متوسطة القند ، مقطوعة العسقلان ، صفراء اللون . ترغب في المواقع الظليلة الرطبة .

٩٨٤٨ - دَبُوسِيَّة مَبْدُولَة *

Clavaria formosa (S). Clavaire commune (F). Common clavaria (E).

نوع من الدبوسية كبيرة القند . نكهتها تشبه زهرة القنبط لونها الى الياض الاصفر يملوه موج وردي . مأكولة مستحبة الطعم .

Sebesten's plum, Cordia, Assyrian plum (E). Sebestenbaum, Brustbeerbaum (D). Sebesto (I).

جنس اشجار وشجيرات برية من فصيلة الحمحميات الخيطيات . انواعه سبعة اوراقها معنقة متعاقبة . نصلها جلدي الصفحة الكاملة المسننة الخافة . ازهارها بيض او صفراء . ثمارها نورية ، لبابية مخاطية كانت ولا تزال تستعمل في الطب لتلين الصدر وفي صناعة دبق الطير . اخشابها تستعمل في صناعة السروج || اعرف انواعها واشهرها .

٩٨٢٩ - دَبَقُ الحَبَشَةِ
Cordia abyssinica (S).

Sébestier d'Abyssinie (F).

٩٨٣٠ - دَبَقُ مَبْدُول
Cordia mynae (S).

Sébestier domestique (F).

٩٨٣١ - دَبَقُ مَخْزَنِي
Cordia officinalis (S).

Sébestier officinal (F).

٩٨٣٢ - دَبَقُ السِّنْدِيَّان
هو البنتموه ، اطلبها .

٩٨٣٣ - دَبَقِيَّات
Loranthées (F). Loranthus (E).

سبط من فصيلة الغمديات اجناسه وانواعه نحو ٣٠٠ جميعها نباتات طفيلية معمرة عروة تعيش على عوائلها من الاشجار بواسطة براشفيها التي تمكنها من امتصاص النسغ . راجع حضاليات .

٩٨٣٤ - دَبَقِيَّة *
Viscaria (S). Viscaire (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرنفلديات . اوراقها متعاقبة ضيقة النصل اللزج . ازهارها عثكوية تاجية حواء اللون وبعضها ابيض || انواعها قليلة العدد بعضها تزييني . اشهرها ما يتبع .

٩٨٣٥ - دَبَقِيَّة جَبَلِيَّة
Viscaria alpina (S).

Viscaire alpine (F).

عشبة معمرة تملو نحو ١٥ سم . ساقها لا دابة تحمل ثلاثة ازواج من الورق اللاطي المستطيل النصل . ازهارها وردية اللون قطرها نحو ١٢ مم || ترغب في التربة الرملية الجبلية . ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

٩٨٣٦ - دَبَقِيَّة جُرُوءِيَّة
Viscaria atropurpurea (S).

Viscaire pourpre foncé (F).

عشبة معمرة تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . ساقها زباء لزجة . اوراقها قرصية التجميع خيطية النصل . ازهارها زغبية التويج ، خلية النصل ، لونها الى الجؤوة العابقة الزاهية . ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

٩٨٣٧ - دَبَقِيَّة دَابِقَة *
Viscaria viscosa (S).

Viscaire visqueuse, Lychnide visqueuse, Attrape-mouches, Eillet de Janséniste, Bourbonnalse (F).

عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها دابق السلاميات العليا ، لزج السفلى . اوراقها خيطية ، شبه قرصية التجميع . ازهارها ضيقة ارجوانية اللون || ضررها عديدة فوارقها الرائحة . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

٩٨٣٨ - دَبَل
Anon (F). Young ass (E).


الدبل هو الخمار الصغير .

٩٨٣٩ - دُبَلَة
Tumeur (F). Tumor, Tumeur (E).

ورم سلمي الشكل يظهر في الجسم اسبابه عديدة متباينة




دَبَقِيَّة



دَبَقِيَّة دَابِقَة



دَبَوَاء



دَبُوسِيَّة صَفْرَاء



دَبُوسِيَّة مَبْدُولَة



دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ




دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ



دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ



دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ



دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ



دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ



دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ

٩٨٦١ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Deutzie
جنس نباتات جنبية من القليبات تدعى الاشجار ، اطلبه .
٩٨٦٢ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Ditonus (S). Ditome (F).
جنس حشرات من فصيلة الهربلوسيات . انواعه عديدة
جميعها صغيرة الحجم مفضورة القد طوطها يراوح من ١١
الى ١٤ مم . اثوابها الى السواد القاتم رؤوسها بيضية
الشكل مقطوعة القاعدة . تركيب النجيليات والخيشيات
فتتزع ما بر ازهارها وبزورها وتخزنها في دهايز فسيحة
تحتفرها وتحرس عليها .

٩٨٦٣ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Ditonus capito (S).
Ditome à grande tête (F). Ditonus capito (E).
حشرة خاضعة مفترسة من فصيلة الهربلوسيات ورتبة مغمدات
الاجنحة . تألف البراري والاراضي المذحاة حيث تكثر
النجيليات والصيوانيات || جسمها متوسط القد يطول من
١٢ الى ١٤ مم . ثوبها الى السواد العابق . رأسها كبير
الجرم . فكها ضليعان . زباناها خطيان . عينها صغيرتان
بارزتان . ظهرانها مستدير الطرف اللاحف ، متتابع
التحزيز الغمدي . ارساغها خماسية العقيل || لها جيل واحد
في الحول . تظهر الحشرة الجمالانة في اواخر ايار وتعيش
حتى اواخر آب . تسرح في الليل وتبيت في النهار في
الدهاليز التي تحتفرها في التربة وتخزن فيها ما تنزعه من
ما بر ازهار النجيليات والصيوانيات ومن البزور بعد عقدھا .
اليرقة عند الادراك التام تطول من ١٨ الى ٢٢ مم . جسمها
اسطواني الشكل ، سداسي الرواجب ، اسمر اللون ، اسود
الرأس || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع
ينقضي في التربة حيث تنغمن اليرقة على عمق ٥ او ٦ سم .

٩٨٦٤ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Plute fine (F).
Little rain (E).
هو المطر الضعيف .

٩٨٦٥ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
هو دثر الشجر : اوراق وتشعبت خضرته .

٩٨٦٦ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Nicher (F). To nestle (E).
دثن الطائر في الشجرة : اتخذ فيها عشاً .

٩٨٦٧ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Exhyménine (F).
الدثيرة الغلاف الخارجي لجذرة الطلع وهو غالباً كثير
المسام تملوه بعض التتواتات .

٩٨٦٨ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Mus sylvaticus (S). Mulot, Souris des bois (F).
Fieldmouse, Long-tailed field mouse (E). Wald-
maus, Kleine waldmaus (D).
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها الشرق الاوسط واروبه .
ثوبها الى الصهبة اسمرام يملوها موج اصفر يعبق ويربد
مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنها الى البياض التبي . طوطها
نحو ١٢ سم . وذنبها كذلك . اذنانها كبيرتان . ارساغها
طويلة . سراسف ذنبها تبلغ ١٥٠ . اطباء الانثى ٦ .
تألف الحراج وجميع الاماكن المشجرة . تقترب من
المساكن . قوتها الحشرات والديدان والعصافير والثار على
اختلافها والبلوط ولحاء الاشجار || الانثى تضع ثلاث
مرات في السنة وكل مرة من ٤ الى ٦ ادراص تبصر
وتكتسي بعد وضعها باسبوعين .

٩٨٤٩ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Clavaria aurea (S).
Clavaire dorée (F). Golden clavaria (E).
نوع من الدبوسية ذهبية اللون متوسطة القد مؤذية . لبابها
مر الطعم . مرارته تذهب بالغلي . لا ينصح بأكلها .
٩٨٥٠ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Clavaria coralloides (S). Clavaire corail, Trlpette,
Barbe de chèvre (F). Goat's beard fungus (E).
نوع من الدبوسية . متوسطة القد ، كثيفة التجميع ، مرجانية
اللون ، سامة .

٩٨٥١ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Clavaria botrytis (S).
Clavaire rosée (F). Roseate clavaria (E).
نوع من الدبوسية المأكولة وهي كبيرة القد ، عنقودية
الشكل تعلوها رقشة وردية .

٩٨٥٢ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
هو الانشورزا المخزنية ، اطلبها .

٩٨٥٣ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
الدبي اصفر الجراد وقيل الجراد ساعة نقفه وخروجه
من المروء .

٩٨٥٤ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Ursidae (S). Ursidés (F). Ursidae (E).
فصيلة حيوانات لبونة من رتبة اللوامح تشمل اجناس وانواع
الدبة الاسيوية والاروبية والامريكية .

٩٨٥٥ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Reptation (F). Creeping (E).
الانثقال دبا او زحفاً على البطن .

٩٨٥٦ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Ceratodus (S).
جنس أسماك نهريه وبحيرية تعيش في المياه الراكدة السملة .
تتميز بازواجية اعضائها التنفسية . انواعها قليلة
جميعها كبيرة القد ، صغيرة الرأس ، مستعرضة المؤخر ،
طوطها يراوح من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . لحمها متوسط
الصنف مأكول

٩٨٥٧ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Dabocia (S).
Dabocia (F). Dabocia (E).
بجلة مغمرة من فصيلة الخلنجيات . مهدا الشرق الاوسط
واروبه الجنوبية . ساقها وفروعها مخشوشة . اوراقها عروء ،
متعاقبة ، صغيرة القد . ناصها خلية الصفحات السفلى ||
ازهارها عنقودي التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها
وردية او بيضاء اللون ، قبيعية الشكل || تزور للترزين .
تنويرها يستمر من حزيران الى تشرين .

٩٨٥٨ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Velezia (S).
Vélézie (F). Velezia (E).
جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة القرنفليات .
انواعها المعروفة قليلة العدد . منبتها بعض المواقع الجبلية
البنانية والسورية || سوقها قليلة الفروع منتصبه . اوراقها
لحمية ، خطية . ازهارها فردي او ثنائي التجميع ، طرفي
الارتكاز . ازهارها بحيلة وردية اللون او بيضاء .
اعرف انواعها :

٩٨٥٩ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Velezia fasciculata (S).
Vélézie fasciculée (F).

٩٨٦٠ - دَبُوسِيَّةٌ مُذْهَبَةٌ
Velezia rigida (S).
Vélézie rigide (F).

٩٨٦٩ - دُج

Petrocincla (S).

Pétrocincle (F). Fieldfare (E).

جنس طير من القواطع وفصيلة الشحوريات . انواعه قليلة تتميز بتفريدها الشجي ، باثوابها المتراكبة الالوان وبارساها الدقيقة المستطيلة التي تمكنها من سرعة الانتقال على الارض || قوتها الحشرات والثمار . تألف الاراضي الصخرية المذخاة . الانثى تبيض من ٤ الى ٦ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو الاسبوعين || اعرف انواعه ما يلي .

٩٨٧٠ - دُج أَزْرَق * ، سَكَلَة

Turdus cyaneus, Monticola solitarius (S). Merle bleu, Pétrocincle bleu (F). Blue fieldfare (E).

طائر من الدج طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الزرق العاقبة الجميلة ، جناحه وذنبه الى السواد الفحمي اللامع . يألف الاماكن الصخرية النائية . قوته الحشرات والثمار . يدشن عشه في صدوع الصخور || يقبل التهذيب ويقلد الاصوات .

٩٨٧١ - دُجَ اسْفَع

Juida (F).

هو الجداس ، اطلبه .

٩٨٧٢ - دُجَ الصُّخُور *

Petrocincla saxatilis, Monticola saxatilis (S). Merle de roche, Pétrocincle de roche (F). Ring ouzel (E).

طائر من الدج طوله من ٢٠ الى ٢٣ سم . ثوبه جميل الالوان المتراكبة . رأسه وعنقه الى الرمادي الازرق . ظهره الى السواد الموشم بالابيض . صدره وبعنه الى الصهبة الزاهية . ذنبه الى السمرة السوداء . منقاره اسود ، ورجلاه رصاصية اللون || يألف الجبال والهضاب والتهام الصخرية . قوته الحشرات والديدان والحلزونات والثمار . يدشن عشه في صدوع الصخور وشقوقها || يقبل التهذيب ويقلد الاصوات والانغام بسهولة .

٩٨٧٣ - دُجَاج

Grondin (F).

الدجاج سمكة بحرية تدعى طريق ، اطلبها .

٩٨٧٤ - دُجَاجِ احْمَر

Trigle pin (F).

سمكة بحرية تدعى طريق احمر ، اطلبها .

٩٨٧٥ - دُجَاجِ الارض

Scolopaciens (f).

Scolopax, Woodcocks (E).

عمارة من فصيلة دجاجيات الارض . اجناسها ١٩ . اما انواعها فكثيرة العدد . تتميز برؤوسها الصغيرة . محاسرها جالسة ، عمودية . عيونها كبيرة بارزة . اجنحتها مستديرة . مناقيرها تحمل اخدوداً وسطياً واحداً || جميعها من القواطع . قوتها الديدان والرخويات والحلزونات والحشرات . تألف المناطق والشواطئ البحرية وضياف الانهر والبحيرات .

٩٨٧٦ - دُجَاجِ اعْلِي

Trigle gornard (F).

٩٨٧٧ - دُجَاجِ رَمَادِي

سمكة بحرية تدعى طريق رمادي ، اطلبها .

٩٨٧٨ - دُجَاجِ سِنْدِي ، دُجَاجِ فِيرَعُولِي

هو الفرغر ، اطلبه .

٩٨٧٩ - دُجَاجِ مَرَجَانِي

Trigle morrude (F).

سمكة بحرية تدعى طريق مرجاني ، اطلبها .

٩٨٨٠ - دُجَاجَة

le Cygne (F).

Cygnus, Swan (E).

قالوا الدجاجة في حين ان الصحيح هو اليم او القنوس . والدجاجة كوكبة نجوم موقعا الشمال . مركزها بين القيثارة والعقاية . وهي كثيرة النجوم اخصها المزدوجة التي لا يقل عددها عن ٣٥ || والعرب تسمي الاربعة المصطفة « الفوارس » وقد قطعت الهجرة عرضاً . والنير الذي على الذنب « الردف » . ومن نجومها المشهورة « الصدر » و« الجناح الايمن » و« منقار الدجاجة » و« ظلف الفرس » .

٩٨٨١ - دُجَاجَة

Poule (F). Hen (E).

انثى الديك .

٩٨٨٢ - دُجَاجَة الارض *

Scolopax (S).

Bécasse (F). Woodcock (E).

طائر من دجاج الارض طوله نحو ٤٠ سم . منقاره جالس مستطيل . جناحه رحب ذلق . ذنبه صغير اقطم . راسه قصير . اصابعه منفردة . ثوبه الى الصهبة الطحلاء تعلوه رقشة بيضاء وتوشم اسود || قوته الحشرات والديدان . يدشن في افصوص بين العوسج والنباتات الشائكة . الانثى تضع نحو ٤ بيضات تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع .

٩٨٨٣ - دُجَاجَة الحِرَاج

هي السلكان ، اطلبه .

٩٨٨٤ - دُجَاجَة الماء

Gallinula (S). Gallinule,

Poule d'eau (F). Moor hen, Water hen (E).

جنس طير من فصيلة التفلقيات . انواعه قليلة صغيرة القد تتميز بطول مناقيرها الذي يعادل طول رؤوسها . اجنحتها ضعيفة ذلقة . قوادمها عريضة جالسة . اذنانها مستديرة قصيرة . ارساها قصيرة حافية الجهة الصدرية الامامية ، سرديّة الجهة البطنية الخلفية . اصابعها الامامية جالسة الملص || اعرف واشهر انواعه دجاجة الماء المبدولة .

٩٨٨٥ - دُجَاجَة الماء المَبْدُولَة *

Gallinula chloropus (S). Gallinule commune, Poule d'eau ordinaire (F). Common moor hen, Vulgar water hen (E).

نوع من دجاج الماء . طولها نحو ٣٥ سم . ثوبها الى السمرة الزيتونية يعبق عند ظهرها يطحل في جوانبها وينحرف الى الربعة عند بطنها . افيكها وحثار اجنحتها بيض . جبهتها وعيناها ومنقارها حر . رجلاها الى الخضار الزيتوني || الانثى اصغر من الذكر تدشن عشها في الاسل فوق سطح الماء . تبيض من ٧ الى ١٠ بيضات تحضنها وحدها . قوتها الحشرات والديدان . تألف المناطق الظليلة وضياف الانهار والبحيرات حيث يوجد الاسل وتكثر المقاصب || موطنها فسيح الارجاء . تعتبر من اوابد المناطق الحارة ومن قواطع المناطق الاستوائية والمعتدلة .

٩٨٨٦ - دُجَاجَة حَبَشِيَّة ، دُجَاجَة رُؤُوسِيَّة

Dinde (F). Turkey hen (E).

٩٨٨٧ - دُجَاجِيَّات

Gallinaceae (S).

Gallinacées (F). Gallinaceae (E).


رتبة من الطير تتميز بجثتها الربعة وصغر رأسها واستدارة




دج أزرق



دج الصخور



دجاجة الأرض



دجاجة الماء المبدولة

عديدة . تعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . قرونها ثنائية متقابلة مستطيلة متدلية . يوجد في الاتربة الخصبة المتوسطة الاندماج . يرغب في كثرة الري . محصوله وافر الانتاج .

٩٨٩٦ - دَجَر كَتَجَان Vigna catjang (S).
Dolique à cell noir (F). Black-eyepoa, Catjang (E).
Bohnenwinde (D). Fagiolina, Faginolo (I).

نوع من الدجر الزراعي القليل الارتفاع عن الارض يوجد في جميع الاتربة الزراعية . لا يخشى سوى الرطوبة المستحكمة . محصوله وافر الانتاج . ضروبه تختلف بموافقها الاقليم ونوع التربة .

٩٨٩٧ - دَجَوَاة Rame (F). Stick (E).
مسند او قصبة يفرز في التربة تتسلى عليه النباتات المعتشرة ج دجران .

٩٨٩٨ - دَجَل Amender (F).
To improve, to manure (E).
دجل ارضه : اصلحها بالسرجين .

٩٨٩٩ - دَجَلَة الدجلة : الموضع الذي يعمل فيه النحل البري .

٩٩٠٠ - دَجَم Catégorie (F). Category (E).
الدجم من الشيء : الفئة المصنفة منه . ج دجام .

٩٩٠١ - دَجْن Nébulosité (F). Patch of haze (E).
الدجن والدجون والدجان والأدجان والسدوم : ظل الغيم وملى حجب اشعة الشمس .

٩٩٠٢ - دَجَن Domestiquer (F).
To domesticate, to tame (E).
دجن وأدجن حول الحيوان الوحشي الى حيوان اليق داجن .

٩٩٠٣ - دَجَنَة ، مُخْبِلَة ، مُعْصِرَة Nimbus
نوع من الغيوم المتوسطة البعد الماطرة . تبدو لبدة كثيفة قائمة مترامية الاطراف المستديرة .

٩٩٠٤ - دَجَوِي ، رَامِس Nocturne (F).
Nocturnal, Nightly (E).
كل دابة مسرحها الليل هي دجوية .

٩٩٠٥ - دَجِينَة ، بَنِين Larve d'abeille (F).
Larva bee (E).
الدجينة هي يرقة النحلة . ج دجى . قيل : « ديبب الدجى وسط الضريب المعسل » وبعض النحالة يسمونها بنين للمفرد والجمع .

٩٩٠٦ - دَحَا ، دَحَى Etendre la terre (F).
To extend the soil (E).
دحا دحوا ودحى دحياً التربة : بسطها .

٩٩٠٧ - دُحَاب Copulation des insectes (F).
Copulation of insects (E).
تسافد الحشرات اي تذيئها .

٩٩٠٨ - دَحَّاس * Hyperoodon (S).
Hyperoodon (F). Hyperoodon (E).
جنس حيوانات بحرية لبونة من الحويثيات وفصيلة الدجاسيات انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم بحار العالم ، اغصها الشمالية || اجسامها كبيرة شبه مردنية الشكل ،

شكل سقطها وذيلها || فصائلها تسع : التدرجيات والجنونيات والحشيات والشقبانيات والطيوجيات والعرناسيات والفريجات والنفوقيات والهدايات .

٩٨٨٨ - دُجَاجِيَّات الأرض Scolopacidae (S).
Scolopacidés (F). Scolopacidae (E).

فصيلة طير من رتبة طوال الساق اجناسها وانواعها كثيرة العدد تجمعها سبع عمارات . جميعها من القواطع . قوتها الرخويات والديدان . الحشرات . تألف المناقع وضفاف الانهر الموحلة الكثيرة الغشاء || اما عماراتها فهي دجاج الارض والبوققيات والطوطانيات والعلمانيات والكروانيات والككسيات والنكاليات .

٩٨٨٩ - دَجَالَة Zootechnie (F). Zootechnics (E).
الدجالة او علم الدواجن . علم يبحث في انسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها وطرق استغلالها . الخ

٩٨٩٠ - دَجَّة الامير هي القطيفة الثلاثية اللون ، اطلبها .

٩٨٩١ - دُجْدُجَة Brunchorstia
جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكنيداته جامية شارفة لاقياسية الانفلاق . شقيراته سباعية . بويغاته خيطية شفافة عديدة الخلايا الشفعية || انواعه كثيرة اعرفها دجداجة الصنوبر .


٩٨٩٢ - دُجْدُجَة الصنوبر Brunchorstia pinea
فطر مجهرى يركب اوراق ونوامي بعض انواع الصنوبر فيذبلها بعد ان يوشمها بغطوره الطفيلية || اغصانه زهيدة لا تستوجب العناية .

٩٨٩٣ - دَجَر * Vigna (S).
جنس نباتات عشبية حولية زراعية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة منها الصغيره القد ومنها العارشة . جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها كاملة مركبة ثلاثية طويلة الزناد . ثمارها قرون منتصبه او متدلية . بزورها كلوية الشكل صغيرة القد . قشورها ماله صلبة ، لبابها يحوي :
٢٤ ٪ من المواد الازوتية .
٢ ٪ « المواد الدهنية » .
٥٧ ٪ « المواد الهيدروكربونية » .
اشهر انواعه واعمها زراعة الثلاثة التالية .

٩٨٩٤ - دَجَر امريكي ، قَلْت Vigna biflorus (S). Dolique biflore, Grain de cheval (F). Gram, Horse-gram (E). Pferdeträn (D). Dolico cavalino (I).

نوع من الدجر مهدد امريكية الجنوبية وقد عمت زراعتها جميع مناطق العالم الحارة والمعتدلة . نباته منتصب السوق الفرعاء القليلة الارتفاع . قرونها ثنائية متقابلة منتصبه . يرغب في الاتربة القليلة والمتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد العضوية ، القليلة بالعنصر الازوتي .

٩٨٩٥ - دَجَر صيني ، ماش شرقي Vigna sinensis (S). Dolique de Chine (F). Cow-pea, Cherry-bean (E). Chinesische fasel (D). Occhilato (I).
نوع من الدجر . الزراعي الشرقي العارش . ضروبه



دجر



دحَّاس



دَحْدَاح

تطول من ٧ إلى ١٠ امتار . رؤوسها ضخمة ، شبه مكورة تشرف على الأعظام الشبيهة بالناقيد . ومن ميزات هذا الجنس انه يحتمل في فكه الاسفل سنان ثابتان لا يتبدلان كسائر الاسنان . اثوابها الى الطحلة البحرية الموج تسمر وتبقى في الرأس والظهر وتغير في البطن || قوتها الرخويات ، انحصارها رأسيات الارجل . ملجئها الحيائي جماعي : افواجها تعد من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً .

٩٩١٥ - دَحْرِيَج * *Vicia calcarata* (S).

Vesce éperonnée (F). Spurred vetch (E).
نوع من الباقية وهو نبات حشبي بري حولي يكثر بين زروع العدس والبقايع والكروسة حبه كروي الشكل شديد الصلابة .

٩٩١٦ - دَحْس *Grener* (F). To seed (E).

دحس وأدحس السنبل : امتلأت أكنته من الحب . والدحس : الزرع اذا امتلأ حباً .

٩٩١٧ - دَحْسُوم *Spermestes* (S).

Spermeste (F).
جنس عصافير صغيرة القند ملونة من فصيلة التنوطيات . اقواحه المعزوفة قليلة موطنها البلاد الافريقية الحارة جميعها صغيرة الحجم . اطوالها تراوح من ٨ الى ٩ سم . اثوابها جميلة الالوان الزاهية المتراكبة . تألف الحياة الجماعية . اسرابها كثيرة العدد . تأوى الى الاحراج وتسرح في السباسب والمراعي والحقول . قوتها البزور البرية انحصارها بزور النجيليات وبعض الهوام والحشرات الصغيرة || تألف حياة الاسر وتتكاثر بسهولة . اعرف انواعه واشهرها الدحسوم الحكم .

٩٩١٨ - دَحْسُومُ مَكَمَمٌ ، قَطُوش *Spermestes cucullata* (S).

Spermeste à capuchon, Nonette de Calcutta (F).
نوع من الدحسوم . طولها تراوح من ٨ الى ٩ سم . ثوبه العلوي الى السواد الاغبر اللامع . ثوبه السفلي الى البياض العاجي الوردي الموج . رأسه وعنقه الى السواد العالق . صدره الى الخضار الزيتي . خاصرته مؤذرتان بالاسود والاطحلى || يألف حياة الاسر . يعيش ويتكاثر بسهولة فائقة ، لكنه يخشى البرد || انشاء ترخم اربع مرات في الحول . حضنتها تستمر نحو ١٣ يوماً وتراوح من ٤ الى ٥ بيضات . الذكر يؤمن قوت الانثى والجلابيط .

٩٩١٩ - دَحَل *Réservoir* (F). Reservoir (E).

مصنع يجمع فيه الماء .

٩٩٢٠ - دَحْلُول * ، قَنَازَة جَبَّارَة *Prionothea coronata* (S).

Prionotheque géante, Pimélie géante (F).
حشرة من غديات الاجنحة وفصيلة الغيشيات . موطنها شاسع الاطراف يمتد من صحارى السودان الى مصر وليبيا وتونس والجزائر . تعيش في الغياي القاحلة قوتها ما تقتوسه من هوام وذباب || جسمها كبير القند مجني الشكل . غمداها مجهزان بمناعس حنارية حادة . جرامزها مستطيلة . ثوبها الى السواد الفحشي اللامع .

٩٩٢١ - دَحْم *Géniteur* (mâle) (F).

Begetter (male) (E).
هو في النبات ما استعمل وليع متكه في تنبيغ ميسم غيره لاختصاصه || فالدسم هو الذكر العاطي والعدف هي الانثى اللافطة .



دَحْلُول

تطول من ٧ الى ١٠ امتار . رؤوسها ضخمة ، شبه مكورة تشرف على الأعظام الشبيهة بالناقيد . ومن ميزات هذا الجنس انه يحتمل في فكه الاسفل سنان ثابتان لا يتبدلان كسائر الاسنان . اثوابها الى الطحلة البحرية الموج تسمر وتبقى في الرأس والظهر وتغير في البطن || قوتها الرخويات ، انحصارها رأسيات الارجل . ملجئها الحيائي جماعي : افواجها تعد من ٢٠ الى ٥٠ زوجاً .

٩٩٠٩ - دَحَاسِيَّات *Hyperoodontidae* (S).

Hyperoodontidés (F). *Hyperoodontidae* (E).
فصيلة حيوانات بحرية لبونة من الحوتيات متاثلاث الاسنان . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم انحصارها الشمالية والقطبية || اجسامها كبيرة شبه وشمية الشكل ، مستضخمة الرؤوس عادمة الاعناق ، صغيرة الزعانف الظهرية المؤخرة الى الوراء || جميعها تألف الحياة الجماعية . قوتها الرخويات .

٩٩١٠ - دَحْدَاحٌ ، زَنْبَقِيَّة *Crinum* (S).

Crinole, Lis asphodèle (F). White lily, Lily asphodel (E). *Lilliendolde, Liliennarcisse* (D). *Crino* (I).
جنس نباتات بصلية برية وزراعية تزيينية من فصيلة النرجسيات . موطنها البلاد الحارة . انواعها نحو ٥٠ معظمها بري . اوراقه قرصية التجميع شرفانية مستطيلة . شماريخها ملتكة اللب ، منتصبه ، تحمل في رؤوسها بين شرعائها مجموعة من الازهار الصيوانية الارتكاز العديدة الالوان . اعرف واشهر انواعه التزيينية الاربعة التالية .

٩٩١١ - دَحْدَاحُ أُسَيَّوِي *Crinum asiaticum* (S).

Crinole asiatique (F).
نوع من الدحداح السام الشديد الذعاق . اوراقه من ٢٠ الى ٣٠ نصلها جميل الخضار الزاهي يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ويعرض من ٧ الى ١٠ سم . || شمراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . صيوانه الزهري يعد من ٢٠ الى ٥٠ زهرة . ازهاره مستطيلة ، ضيقة ، نجمية الانبساط ، بيضاء اللون || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

٩٩١٢ - دَحْدَاحُ الْقُدْرَان *Crinum campanulatum* (S).

Crinole aquatique, C. des étangs (F).
نوع من الدحداح يرغب في الاتربة العضوية الغنية الرطبة . اوراقه ضيقة النصل جميلة الخضار العالق تطول من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . وتعرض نحو ٢ سم || شمراخه يعلو نحو ٣٠ سم . صيوانه الزهري يعد من ٥ الى ٦ ازهار عادمة الرائحة ، قمرزية اللون ، تطول نحو ١٠ سم . ازهاره صيني .

٩٩١٣ - دَحْدَاحُ مُسْتَطِيلُ الْوَرَق *Crinum longifolium* (S).

Crinole à longues feuilles (F).
نوع من الدحداح . اوراقه نحو ٢٠ نصلها بحري الخضار يطول من ٩٠ الى ١٥٠ سم . ويعرض من ٥ الى ٧ سم . شمراخه يعلو نحو ٤٠ سم . صيوانه الزهري يعد من ٦ الى ١٢ زهرة . ازهاره عرقية الرائحة ، قمية الشكل ، تطول نحو ١٠ سم . لونها الى البياض الناصع || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

٩٩١٤ - دَحْدَاحُ مُور *Crinum moorei* (S).

Crinole de Moore (F).
نوع من الدحداح الامريكي المنبت . بصلته كبيرة القند ،

المرجان والرجان حيث يكثر الفوقس والسرفاس || جسمها اهليلجي الشكل ، عادم الحراشف ، شديد اللزوجة ، يطول من ٢٠ الى ٢٤ سم. ثوبها يماثل البيئة التي تعيش فيها وهو غالباً الى الخضار الاطلحل يعلوه تجذيع معترض اسود واسمر || تتميز بلامسة تملو مقدم الفك وبقرنين غصروفيين الواحد تلو الآخر . زعنفتها الظهرية كبيرة ، قاطبة ، شائكة المناخس الحادة .

٩٩٢٩ - دَحِيَّة (F). She-monkey (E).
انثى الفرد وتدعى إلقة وقردة .

٩٩٣٠ - دُحْيَس *
Drilus (S).
Drile (F). Drilus (E).
جنس حشرات من فصيلة الدحيسيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة نحو ١٥ اعطانها تمتد من الشرق الادنى الى اوروبا وافريقية الشرقية || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ١٠ مم. رؤوسها مستعرضة . عيونها ناشرة . تأشيرها وفكوكها وملامسها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية الشكل . كواسلها شبه مربعة . اغمارها لاحفة . قوائمها نشيطة اثوابها ثنائية اللون || اناثها عادمة الجناح . مستضخمة الجرم . صغيرة الرؤوس والعيون . قصيرة القرون الاستشعارية الخيطية . ضليعة الملامس الفكية . نحيلة القوائم القصيرة || ذكورها خاضعة واشعة . اناثها مفترسة تعيش على القواقع الصغيرة .

٩٩٣١ - دُحْيَسِيَّات *
Drilidae (S).
Drilidés (F). Drilidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم حراج البلاد الممتدة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة التبسيط ، تطول من ٥ الى ١٠ مم. ذكورها مجنحة . رؤوسها مستعرضة . عيونها كبيرة ، ناشرة . تأشيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية مشطية الشكل ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها شبه مربعة . اغمارها لاحفة . قوائمها نشيطة . اثوابها ملونة || اناثها اضخم حجراً من ذكورها . وهي عادمة الجناح ، صغيرة الرؤوس والعيون . ضليعة الملامس الفكية . قصيرة القرون الاستشعارية الخيطية الشكل . قصيرة القوائم النحيلة || ذكورها خاضعة واشعة تعيش على اوراق النبات وازهاره . اناثها مفترسة تعيش على القواقع وتقيم في اصداقها حتى الاكمال . اشهر اجناسها الدحيس .

٩٩٣٢ - دُخَاس *
Eumenes (S). Eumène (F).
جنس حشرات نافعة من فصيلة الدخاسيات . انواعه نحو ٥٠ معظمها من حشرات المناطق الحارة . تتميز باجسامها المخسورة . طولها من ١٠ الى ٣٠ مم. بطونها اجاصية الشكل مقلوبة . اناثها سود يملوها تأذير اصهب واصفر واحمر || عيشتها عيشة الدخاسيات واخلقها كذلك .

٩٩٣٣ - دُخَاسِيَّات *
Eumenidae (S).
Eumenidés (F). Eumenidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة المخسورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . معظمها كبير القد . يرجح في الوانها الاسود والاصفر . تبني اوكارها بالطين على الارض وفي الحيطان والاخشاب والاشجار . تفترس ديدان حوشفيات الاجنحة وقد تقتنصها وتخرنها في اوكارها لغوت يرقاتها .

٩٩٢٢ - دُحْمُور الأرق *
Aphidius avenae (S).
حشرة صغيرة من الدحوريات تمتح مكنها في ظهور الارق فينقف عن يرقات تعيش على احشاء عائلها وتقتضي عليه .

٩٩٢٣ - دُحْمُور الخرشيسات *
الكبيرون *
Aphidius avenae (S).
حشرة صغيرة من الدحوريات طولها من ٤ الى ٥ مم. لونها الى الحمرة يعلوها موج اصفر . تمتح مكنها في جميع انواع الخرشيات . اخصها حشرة الزيتون (ذباب الزيتون) فتقتضي عليها .


٩٩٢٤ - دُحْمُور الكرنسيات *
Apanteles glomeratus (S).
حشرة صغيرة من الدحوريات طولها من ٢ الى ٤ مم . تمتح مكنها بكثرة في اجسام مختلف ديدان حوشفيات الاجنحة اخصها الكرنسيات فينقف عن يرقات تعيش داخل اجسام عوائلها لا تلبث ان تقتضي عليها .

٩٩٢٥ - دُحْمُورِيَّات *
Braconidae (S). Braconidés (F). Braconidae (E).
فصيلة حشرات نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة المخسورة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد تضم بضعة آلاف . جميعها صغيرة القد ، غليظة الجسم ، مختلفة الالوان ، يغللب فيها الاسود وبعضها يحمل مرزاً خارق الطول || يرقاتها طفيلية تتركب حوشفيات الاجنحة وبعض الغمديات . تعيش داخل عوائلها لا تخرج منها الا عند انسلاخها الاخير قبل تحويلها الى عذارى .


٩٩٢٦ - دَحَنَانَة *
Psettes (S).
Psette (F). Psettes (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الشيميات ورتبة شائكات الزعانف . اعطانها بحار البلاد الحارة والاستوائية . يكثر وجودها في البحر الاحمر والخليج العربي والمحيط الهندي || جسمها مبسط الجرم ، شبه مربع الشكل ، يطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. سفنها صغبر مستدق يغللب الجسم والقسم الاكبر من الزعنفة الظهرية . زعنفتها الذيلية فارقة . زعانفها الخوضية والشرجية شديدة الصغر . ثوبها الى الطحلة السمراء الرصاصية الموج يملوها في مقدم الجسم ضمن محيط الرأس ثلاثة خطوط معترضة سوداء اللون || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

٩٩٢٧ - دُحْنَس *
Histrio (S).
Antennaire (F). Antennarius (E).
جنس اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من الاسماك اليمية تألف البضع المغسورة بالماء || اجسامها لزجة ، عادمة الحراشف ، صغيرة القد ، معتدلة التبسيط ، كبيرة الرؤوس والاشداق || اعرف انواعه واشهرها الدحنسة المجذعة .


٩٩٢٨ - دُحْنَسَة مُجَذَّعَة *
Histrio histrio (S). Antennaire marbré (F).
Marbled antennarius (E).
نوع من الدحنس . سمكة بحرية يكثر وجودها في بعض بحار المناطق الاستوائية والحارة قرب البضع المغسورة وحشاف




دحور الارق



دحور الخرشيات



دحور الكرنسيات




دحانة



دحنسة مجذعة



دحيس



دخاس




دخاشة



دخدخ



دخدخ البساتين



دخلة البساتين



دخلة الغَزَّار

٩٩٣٩ - دُخَّاش ، نَبَج Exostose (F).

Exostosis (E).

نوع من التزيدات وهو انتفاخ في سطح العظم يمتري الخيل في السلاهي الثانية اي في الصفحة الداخلية من أطرة الحافر .

٩٩٤٠ - دُخَّاش هو الدلفين ، اطلبه .

٩٩٤١ - دُخْل ، عَالِدَة Rente (F).

Rent, Yearly income (E).

هو ايراد دوري يدفعه من اقترض مالا او اكتسب ملكية عقار مقابل اقراضه او امتلاكه .

٩٩٤٢ - دُخْل ، رَيْع Revenu (F).

Revenue, Income (E).

هو مجموع الثمار المدنية والطبيعية التي تنتج دورياً عن اموال المرم .

٩٩٤٣ - دُخْل عِقَارِي Rente foncière (F).

Ground-rent (E).

هي الغلة العقارية الصافية اي ما يدخل من الارض والابنية من فوائد .

٩٩٤٤ - دُخْلَة Sylvia (S).

Fauvette (F). Warbler (E).

جنس طير من العصافير وفصيلة الدخليات . انواعه عديدة معظمها غريد يأوى الى الادغال والغابات والحدائق . مناقيرها قصيرة ، جالسة ، ذلقة . اجنتها متوسطة القد طوطا يلحف الزام الاول من الذنب . اذنانها مقطوعة . ارساها قوية . اظايفها منعقة ضعيفة || اشهر انواعه ما يتبع .

٩٩٤٥ - دُخْلَة البَسَاتِين *

Sylvia hortensis, S. borin (S). Fauvette des jardins (F). Garden warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٢ سم . ثوبه العلوي الى الربعة الزيتونية العابقة والسفلي الى الربعة الزاهية . زوره ربطته الى البياض . قوادمه وذنبه الى السمرة . منقاره ورجلاه الى الزرقة الرصاصية || يألف الحدائق والجنائن . قوته الحشرات والحوام وبعض الثمار الناضجة اخصها التين . يدر في الاشجار . الانثى تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها بمنوبة الذكر نحو اسبوعين .

٩٩٤٦ - دُخْلَة الصُرُود Sylvia subalpina (S).

Fauvette subalpine, F. passerinette (F). Subalpine warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٣ سم . ثوبه رمادي يعبق وينحرف الى الرصاصي في الرأس والظهر || يألف الهضاب والجبال الصخرية القليلة الاشجار . قوته الحشرات والثمار العنبية البرية . يدر في تجاويف الاشجار الهمة وبين صدوع الصخور . انثاه تبيض ٥ بيضات تحضنها بمنوبة مع الذكر .

٩٩٤٧ - دُخْلَة الغَزَّار * Salicaria arundinacea,

Calamoharpe arundinacea (S). Effarvate, Fauvette des roseaux (F). Sedge-Warbler (E).

طائر من الدخيل ، وهو من عصافير لبنان الآبدة . جسمه صغير القد بطول من ١٤ الى ١٥ سم . ثوبه اصهب الصفحة العليا ، اسمر الرأس والرداء ، ابيض الصفحة

٩٩٣٤ - دُخَّاش ، دُخَّاشَة * Orchestia (S).

Orchestie (F). Orchestia (E).

جنس دوبيات بحرية من القشريات العليا وفصيلة الدخاشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها معتدلة القد ، مستضيقة الجوانب ، تطول من ٧ الى ٩ سم . زباناها مركبة ثلاثية الفصل . الزوج الاول من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط فكية ، الزوجان الثاني والثالث ينتهيان بكلايات قابضة . اثوابها تراوح بين الحمرة الارجوانية والصفرة المرجانية الموج . جميع انواعها مأكولة مرغوب فيها .

٩٩٣٥ - دُخَّاشِيَّات ، بَرَاغِيْث الِيَم

Orchestiidae (S). Orchestiids (F).

Orchestiidae (E).

فصيلة دوبيات مائية من القشريات العليا مزدوجات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها عادمة اللعاف . عيونها بسيطة . زوج من قوائمها الصدرية ينتهي بملاقط || اعرف اجناسها واشهرها الدخاش والشبدوع .

٩٩٣٦ - دُخْدُوح * ، دُخْدُوح

lula (S). lule, lulus (F). Catkin, Galley worm (E).

جنس حيوانات دنيا من كثرات الارجل شفويات الاحناك . انواعه كثيرة منتشرة في جميع اقطار العالم . اجسامها اسطوانية مستطيلة كثيرة المفاصل عديدة الارجل الخيطية النحيلة . اثوابها مختلفة الالوان تستقر بين الصهبة والسواد تتخللها الحمرة . قوتها المواد العضوية الحيوانية المنحلة والنباتية وقد تقرض الجذور والمساقل والثمار القائمة على التربة كالشيلك وتوقع اشد الاذى بالبذور والحبوب الناشئة لانها تلتهم بوادرها || تسرح في الليل وتبيت في النهار ملتفة على ذاتها . تفرز عند شعورها بالخطر مادة حمضية كريهة الرائحة || تكافح بنضج التربة الموبوءة بمحاييل الددت او الباراثيون .

٩٩٣٧ - دُخْدُوح البَسَاتِين * lulus albipes (S).

lule terrestre (F). lulus, Galley-worm (E).

دوبية من الدخدخيات كثرات الارجل ، شفويات الاحناك . موطنها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || جسمها حيدوي التركيب اسطوانى الشكل بطول نحو ٢٥ سم . عند الذكر ونحو ٩٠ سم . عند الانثى . رأسها صغير الجرم ، مستدير . عيناها زيمتان . زباناها صغيران مستدقان . تأشيرها قاضية . جوامزها نحيلة كثيرة العدد . ثوبها الى الصهبة الخنطية السوداء الموج ، يعبق في الظهر ويژهو في الجانبين ويغير في البطن والمذب || تسرح في الليل وتبيت في النهار ملتفة على ذاتها تحت الحجارة والاعشاب . انتقلها بطيء وتفرز عند الشعور بالخطر مادة حمضية كريهة الرائحة || قوتها المواد العضوية المنحلة وتقرض الجذور والمساقل والثمار ، وتغضم البذور الناشئة وتلتهم رثمها وبوادرها || يكثر وجودها قرب المساكن الريفية || تعتبر من الدوبيات الضارة المؤذية .

٩٩٣٨ - دُخْدُوحِيَّات ، دُخْدُوحِيَّات

Myriapoda (S). Myriapodes (F). Myriapoda (E).

صف حيوانات مفصلية عديد الفصائل والاجناس والانواع تجمعها وتبتان : شفويات الاحناك وشفويات الارجل .




دخلة ثرثارة



دخلة رأساء



دخلة سودقية



دخلة شائعة



دخلة شواله



دخول



دخن احمر

السفل من الزور الى الافليك || يألف المقاصب والآجام
وبجاري الماء . قوته الحشرات والهوماء || يدن عشه بين
الغزار والقصب . حضنته من ٤ الى ٦ بيضات ترخها
الانثى بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

٩٩٤٨ - دُخْلَة ثَرْثَارَة *

Sylvia garrula, *S. curruca* (S). Fauvette babillarde,
Babillarde (F). Prattle warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٣ سم . ثوبه العلوي الى
الرمادي العايق والسفلي الى الرمادي الفاتح . جناحاه
وذنبه الى السمرة . موطنه فسيح الارحاء . يألف الحدائق
والسياجات والادغال والاحراج . يكثر من الصداح
يلقيه جاثماً وطائراً وخائفاً ومقاتلاً || قوته الحشرات
والهوماء وبعض الثمار الناضجة السكرية || يدن في
الاشجار . انشاء لها موسمان في السنة . تبيض في كل مرة
من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر .

٩٩٤٩ - دُخْلَة رَأْسَاء *

Sylvia melanocephala (S). Fauvette mélanocéphale (F). Sardinian warbler (E).

طائر من الدخيل صغير القد . رأسه اسود . دوحه عينه
حراء . ظهره اطحل . بطنه اغبر . جناحاه وذنبه سمر .
يألف ضفاف الانهر والجداول . قوته الحشرات والهوماء
وبعض الحبوب . يدن في العوسج وفي الجنبات الشائكة
الفناء . انشاء لها موسمان في الحول تبيض كل مرة ٤
بيضات تحضنها بمناوبة مع الذكر .

٩٩٥٠ - دُخْلَة سَوْدَاء الرَأْس

Fauvette à tête noire (F). Black cap (E).

اطلب ابو قلنسوه .

٩٩٥١ - دُخْلَة سَوْدَقِيَّة * ، زُرْبَقَة

Sylvia nisoria (S). Fauvette épervière (F). Lesser
whitethroat (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٦ سم . رأسه اسمر اللون
ظهره رصاصي . جناحاه وذنبه الى السمرة . صدره الى
البياض الاشهب المنق . بطنه اطحل ابيض .
يألف الحدائق والغابات الرطبة والسيجات والمراعي .
قوته الحشرات والهوماء وبعض الحبوب والثمار العنينة البرية .
يدن في الادغال والعوسج . انشاء لها موسمان في الحول تبيض
كل مرة ٤ بيضات تحضنها بمناوبة مع الذكر .

٩٩٥٢ - دُخْلَة شَائِعَة * ، جَمَلَانَة

Sylvia cinerea, *S. communis* (S). Fauvette grisette,
Grisette (F). Whitethroat (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٥ سم . ثوبه رمادي اللون
يعبق مع اقترابه من ثبيج الظهر . جناحاه وذنبه الى السمرة .
بطنه وزوره الى البياض الوردي . موطنه فسيح الارحاء
وهو مبدول في لبنان . يألف الحدائق والغابات الرطبة
والسيجات والمراعي الطبيعية . قوته الحشرات وبعض
الحبوب . يدن في الادغال والعوسج . الانثى لها موسمان
في الحول . تبيض كل مرة اربع بيضات تحضنها بمناوبة
مع الذكر .

٩٩٥٣ - دُخْلَة شَوَالَة * ، شَوَالَة

Sylvia undata (S). Fauvette pitchou, Pitchou (F).
Desert warbler (E).

طائر من الدخيل صغير القد قصير الجناح طويل الذنب .
قال فيه ابن سيده : « الشواله دخلة كدراء اذا وقعت
على شجرة او حجر خطلت بزكاهما خطران الفحل

وسميت شواله لانها تشول بذنبها وفي بطنها وسفلتها شيء
من حرة . » || قوته الحشرات على اختلافها وبعض
الثمار العنينة البرية . يدن في العوسج انشاء لها ثلاثة مواسم
في الحول تبيض كل مرة ثلاث بيضات تحضنها بمناوبة
مع الذكر .

٩٩٥٤ - دُخْلَة غَرِيْدَة ، قَرَقَفَنَة ، كَحْبَحِيلَة

Sylvia orphea (S). Fauvette orphée, Orphée (F).
Orphean warbler (E).

طائر من الدخيل طوله نحو ١٥ سم . ثوبه رمادي اللون
يعبق وينحرف الى السمرة مع اقترابه من قمة الرأس وثبيج
الظهر || موطنه حوض البحر المتوسط وهو مبدول في
لبنان || يألف الاشجار الرقيقة ويغرد طول النهار .
قوته الحشرات والهوماء وبعض الثمار الناضجة كالتين .
يدن في الاشجار الكثيفة العالية . انشاء وحيدة الموسم تبيض
٥ بيضات تحضنها وحدها .

٩٩٥٥ - دُخْلَة نَضَارَة ، أَمُ نَضَارَة

Sylvia conspicillata (S). Fauvette à lunettes (F).
Spectacled warbler (E).

طائر من الدخيل صغير القد ارمي اللون رصاصي الرأس .
اسود دوحه العين . ابيض العنق والاجفان يأوى الغابات
والادغال . قوته الحشرات وبعض الثمار والحبوب . يدن
في العوسج . انشاء لها موسمان في الحول تبيض كل مرة
٤ بيضات تحضنها بمناوبة مع الذكر .

٩٩٥٦ - دُخْلُول * ، مَغَالُور

Megalurus (S). *Mégature* (F). *Megalurus* (E).

جلس طير من الجواثم مشرومات المناقير وفصيلة الدخليات .
انواعه المعروفة نحو ١٥ . اعطائها المناطق الحارة من العالم
القديم . ملجئها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد .
تألف الغابات والرياح وضفاف مجاري الماء والمنابع .
قوتها الحشرات والديدان والثمار العنينة البرية وبعض البزور .
اجسامها صغيرة القد تطول من ١٢ الى ١٥ سم . اثوابها
تختلف مع الانواع يكثر فيها الاشقق الاسمر المواج والاطحل
الصنابي || تدن اشواها في الاشجار الرقيقة . اناثها
تحضن من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحول . والذكور
تناوب الاناث في الترخيم الذي يستمر نحو ١٣ يوماً .

٩٩٥٧ - دُخْلِيَّات ، هَوَازِج

Sylviidae (S). *Sylviidae*, Warblers (E).

فصيلة طير من رتبة الجواثم المشرومات المناقير . معظم
طيورها مفيدة صداحة . مناقيرها صغيرة وتدية ارساغها
نخيلة حشفية البشرة . اصابعها دقيقة مستطيلة . اظافيرها
منقطة || تألف الادغال والغابات قوتها الحشرات .

٩٩٥٨ - دُخْن


Panicum (S). Millet (F).

Wood millet-grass (E).


جلس نباتات عشبية حولية من فصيلة التجيليات . انواعه
عديدة منها البرية والزراعية الاقتصادية والزينية .
جميعها منتصبه السوق . اوراقها عصفية . ازهارها عشكولي
او عنقودي التجميع . ثمارها حبوب صغيرة مختلفة الاشكال
والالوان . اعرف انواعه واشهرها ما يتبع .

٩٩٥٩ - دُخْن أَحْمَر * ، عِرْق التَجِيل

Panicum sanguinale (S). *Panic sanguin*, Sanguinole,
Manne terrestre (F). *Panic grass*, Crab grass, Fin-



دُخْنُ أَزْغَب



دُخْنُ المَصَافِير دُخْنُ جِرْمَانِي



دُخْنُ حَرِيرِي



دُخْنُ شَائِع



دُخْنُ صَغِير



دُخْنُ كَبِير



دُخْنُ

٩٩٦٦ - دُخْنُ كَبِير * ، دُخْنُ غَيْلِيَّة

Panicum maximum (S). Panic élevé, Herbe de Guinée (F). Guinea grass (E). Guineagrass (D). Erba di Guinea (I).

نوع من الدُخْن مَهْدَة أفريقية الاستوائية. يعلو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. تصل عصفه إلى الخضار البحري. عثكوله كبير الحجم يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. || يزرع كنبات كلالتي تمتلئه الماشية ومنهم من استعمل حبه.

٩٩٦٧ - دُخْنُ كُزْبُرِي

Panicum capillare (S).

Panic capillaire (F).

نوع من الدُخْن الزراعي التزييني مَهْدَة أمريكية الشالية. يعلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. تصل عصفه زيتوني اللون، كثيف الأزغب المستطيل الناعم. عثكوله صغير الحجم متصب || يقاوم الذبول. شائع الاستعمال التزييني.

٩٩٦٨ - دُخْنَاء * ، دُخْنَان ، أْبُر دُخْنَة

Calamagrostis arundinacea, *Aerocarpus scirpaceus* (S). Rousserolle effarvate, Rossignol d'eau (F). Reed warbler (E).

طائر من الدُخْنِيَّات صغير القد. طولُه نحو ٢٠ سم. لونه إلى الغيرة يعيش بين القصب وفي الأدغال وعلى ضفاف الأنهار. مبدوك في لبنان || قوته الحشرات الصغيرة والذباب والهُوَام. يذبح على علو ٤٠ أو ٥٠ سم. في النباتات المنمورة بالماء كالاسل والغزار، يجمع ثلاثة منها إلى بعضها ويحبك عشه القمي الشكل فوق مركز اجتماعها || أنشاه تبيض ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٤ إلى ١٥ يوماً.

٩٩٦٩ - دُخُولِيَّة

Octrol (F).

Town dues, *City toll* (E).

ضريبة غير مباشرة أو رسم تجبئيه البلديات عن بعض الأشياء التي تدخل على البلدة.

٩٩٧٠ - دُخِيَّات ٥

Amersporées (F).

Amerspora (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات. تتميز ببيوتاتها الوحيدة الخلية. اجناسها ثمانية: البرقونية، الرزوان، الزميمة، السراف، السليفة، الطرولة، المشحارة والهرميسيوم.

٩٩٧١ - دُخِيلَة ، عَكَرِيَّة

Adventice (F).

Adventitious (E).

هي الاعشاب التي تنبت تلقائياً في الزروع وقد تعتبر من النباتات الطوعية الضارة.

٩٩٧٢ - د. د. ت.

حاشور جزيل النفع شائع الاستعمال المنزلي والزراعي يرتكز على مادة فعالة شديدة الوقع والتأثير تقضي على جميع أنواع الهوام وعلى الكثير من الحشرات الضارة. له نوعان تجاريان: المساحيق والسوائل. فالمساحيق تستعمل تعفيراً والسوائل نفساً.

٩٩٧٣ - دَدَنْقُول ٥

Didunculus strigirostris (S).

Diduncule strigirostre (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الددقوليَّات. موطنه جزيرة ساموا حيث يدعونه «منوميه». يألف الإخراج ملجئه الخياني جماعي. جماعته قليلة العدد. يسرح في

gered panicum (E). Bluthirse, Finger-hirse (D). *Panico sanguigno*, *Sanguinella* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي التزييني والكلالتي. ساقه واغمار عصفه موشحة بالاحمر. تصله عابق الخضار. عثكوله لبد التجميع متصب. حبه احمر النقيير.

٩٩٦٠ - دُخْنُ أَزْغَب *

Panicum crus-galli (S). *Panic pied de coq*, *Mil des rizières* (F). Small millet, Cockspur panicum, Barn-yard grass (E). Hühner-hirse (D). *Panico pié di gallina*, *Panicastrella* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي الكلالتي. يعلو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ساقه عقداء قصيرة السلاحيات. عصفه كثير العدد. تصله أزغب البثرة. عثكوله سنابل مجمعة على محور واحد يراوح عددها من ٣ إلى ٥.

٩٩٦١ - دُخْنُ المَصَافِير * ، دُخْنُ إِيْطَالِي

Setaria Italica (S). Millet des oiseaux, M. d'Italie, M. à grappes (F). Italian millet, Bengal grass (E). Welsche hirse (D). Miglio d'Italia (I).

نبات من النجيليات قريب الشبه من الدُخْن مَهْدَة الاصلية الصين تكثر زراعته في إيطاليا. يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. عصفه غليظ الصلح الجامدة التنية اللون. تصله ضيق الشقة مسنن الحافة فستق اللون. ازهاره عنقودي الشكل عثكولي التجميع متدلي الاطراف || يزرع للتزيين وللعلف ولحبه الصدير المستطيل المأكول من الطيور الداجنة اخصها المصافير.

٩٩٦٢ - دُخْنُ جِرْمَانِي * ، مُوْهَا

Panicum germanicum (S). Moha de Hongrie (F). German panick grass (E). Moha (D). *Panico moha* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي والكلالتي. يعلو من ٨٠ إلى ١٢٥ سم. عصفه كثيف التجميع سناني الشكل مستعرض القاعدة ذلق القمة. تصله عابق الخضار، جامد اللسيح. عثكوله سننلي الشكل لبد التجميع حبه ابيض اللون.

٩٩٦٣ - دُخْنُ حَرِيرِي * ، شَعْرُ الفَار

Setaria glauca (S). Setaire glauque, Pennisète glauque (F). Bristle grass, Fox-tail (E). Fennich, Gilb-hirse (D). *Panico liçio*, *Panicastrella* (I).

نبات من النجيليات قريب الشبه من الدُخْن يعلو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. اوراقه كثيرة العدد بحيلة الخضار الاطمل تصلها كثيف الأزغب المستطيل الرهل. ازهاره عنقودي فارش || يزرع للتزيين. يقاوم الذبول.

٩٩٦٤ - دُخْنُ شَائِع * ، دُخْنُ أَصْفَر

Panicum millaceum (S). Millet commun, Panic millet (F). Millet (E). Echte hirse (D). *Panico miglio*, *Miglio* (I).

نوع من الدُخْن مَهْدَة آسية الوسطى يعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. تصل عصفه أزغب البثرة مسنن الحافة. عثكوله متوسط التجميع مائل الارتكاز الى جهة واحدة || زراعته واسعة الانتشار يزرع لحبه الشائع الاستعمال.

٩٩٦٥ - دُخْنُ صَغِير *

Panicum miliare (S). *Petit panic*, *P. millet* (F). Little millet (E). Kleine hirse (D). *Piccolo miglio a spiga* (I).

نوع من الدُخْن الزراعي الكلالتي. يعلو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. ساقه عديدة السلاحيات النحيلة القصيرة. عصفه مستطيل الصلح الضيق الباهت الخضار. عثكوله لبسد التجميع كروي الشكل. علفه لا بأس به تقبله الماشية بسهولة.

٩٩٨١ - دُرَّابَة رَمَادِيَّة Draba cinerea (S).
Drave cendrée (F).

٩٩٨٢ - دُرَّابَة شَرْقِيَّة Draba cuspidata (S).
Drave cuspidée (F).

٩٩٨٣ - دُرَّابَة صَخْرِيَّة Draba rupestris (S).
Drave des rochers (F).

٩٩٨٤ - دُرَّابَة مَدَّادَة Draba repens (S).
Drave rampante (F).

٩٩٨٥ - دُرَّاج ، دُرَّجُوج Francolinus (S).
Francolin (F), Francolin (E).

كنيته ابو الحجاج وابو خطار وابو ضبة . جنس طير من عمارة الحجلبيات وفصيلة الطيوريات . قريب الشبه من الحجل يتميز بقوة ودقة منقاره ، بقصر ذنبه واستطالة رصنه الاملط || انشاء تدن افعوصها في الارض ترصه بالعجل والحشيش الناعم . تبيض من ١٢ الى ١٤ بيضة تحضنها وحدها ثلاثة اسابيع || قوته الاعشاب والحبوب والجذامير . يألف الخضاب والسهول الرطبة قرب مجاري الماء . اسرايه قليلة العدد || موطنه فسيح الارحاء يمتد من الهند الى اروبة وافريقية الشمالية والشرقية . انواعها ٤٠ اشهرها الدراج الشائع والحيقطان .

٩٩٨٦ - دُرَّاج شَائِع * ، نَيْسَت Francolinus vulgaris (S). Francolin vulgaire (F).
Common francolin (E).

طائر من الدراج طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متراكب الالوان . قمة رأسه وزوره وجوشنه الى السواد العابق . قفنه مشق بالاسود والابيض . عنقه كستني الطوق . بطنه وجناحاه الى السمرة المؤذرة والمرقطة بالصهبة . منقاره اسمر . رجلاه الى الجؤرة || الانثى اصغر قدأ من الذكر وازهى ثوباً . يألف المراعي ومجاري الماء . سريه قليل العدد . يراوح من ٦ الى ٢٤ .

٩٩٨٧ - دِرَّاس ، دِرَّس Battage (F).
Threshing (E). هو فصل الحب عن السنابل والقش .

٩٩٨٨ - دِرَّاس حَيْلِي Battage mécanique (F).
Mechanical threshing (E).

هو الدراس الآلي الذي يتم بواسطة المدرس .

٩٩٨٩ - دِرَّاع هو مرزة المناقع ، اطلبها .

٩٩٩٠ - دُرَّاق * ، دُرَّاقِين ، دُرَّاقِين ، فِرْسِيك Persica vulgaris, Prunus persica, Amygdalus persica (S). Pêcher (F). Peach tree (E). Echter pfirsich (D).
Pesco, Persico (I).

شجرة مثمرة من الفصيلة الوردية . ضرورها الزراعية تفوق ١٣٠٠ جميعها من نباتات الاقاليم المعتدلة المنحرفة نحو الحارة || يقال ان مهدا كان الشرق والاربع الصين ومنهم من قال بلاد فارس وهي الآن منتشرة في جميع بلاد المعمورة || شجرته تملو من ٣ الى ٨ امتار . جذورها وتدية ساقها فرعاء . فروعها منتصب . اوراقها متعاقبة معنقة ، اذينية ، نصلها رمحي الشكل ، حاد الزام الاخير ، جلي المروق ، منشاري الحافة . زعماتها الورقية والحشوية مستدقة ثنائية او ثلاثية التجميع . براعمها الشرية غليظة فردية . ازهارها وردية اللون او مرجانية تنور قبل الاوراق . ثمارها لحمية كروية الهيئة عديدة

النهار ، يتنقل على الارض كالدجاج ، لا يجثم على الاشجار الا في الليل ولا يطير الا عند الضرورة القصوى . طيرانه شاق عادم الرشاقة ، كثير الضجيج . قوته الجلود وبعض النباتات الدوفصية التي يلتهم بصلها || جسمه قريب الشبه بالحمام ، يطول نحو ٣٠ سم . رأسه معتدل الجرم . عيناه كبيرتان ناشزتان . حدقة عينه ياقوتية اللون . منقاده ضخم ، غليظ ، احجن البهرة . افكه الادنى مسنن الطرف الامامي . جناحاه مقعران ، مستديرا الاطراف . ذنبه معتدل الطول ، شبه مقطوم الطرف . رأسه وعنقه وصدره وبطنه الى السواد الاخضر المواجه . رداؤه وسائر ظهره وذنبه الى السمرة الكستنية السفهاء . زفده وجفونه ومنقاده الى الصفار الوردى المواجه . ساقاه واصابعه الى الحمرة || يدثن افعوصه في التربة كالدجاج . الانثى تحضن من ١٦ الى ٢٠ بيضة . زمن الترخيم يستمر نحو ثلاثة اسابيع تقوم به الانثى دون الذكر الذي يؤمن لها الغذاء .

٩٩٧٤ - دَدُنْقُولِيَّات Didunculidae (S).
Didunculidés (F), Didunculidae (E).

فصيلة طير من الحماميات . اجناسها المعروفة اثنان الددُنْقُول والديدس . طيورها قريبة الشبه من الحمام ومن الدجاج في آن واحد . شكلها الخارجي شكل الحمام باستثناء المنقار . اخلاقها وعاداتها وطريقة عيشها لا تختلف عن الدجاج . تعيش على الارض ولا تطير الا عند مسيس الحاجة وتبيت في الليل على مجاثم لا ترتفع عن سطح الارض اكثر من ثلاثة امتار || اجسامها ضخمة . مناقيدها كبيرة ، غليظة ، محججة . ارتفاع افافها العليا يفوق عرضها . افافها السفلى مسننة الاطراف الامامية . قوائمها شديدة النشط . اصابعها غليظة . مخالبها كبيرة ، ضليعة ، منعقة الاطراف . الذرية || اعرف اجناسها الددُنْقُول اما الديدس فقد انقرض منذ اكثر من قرنين .

٩٩٧٥ - دَرَّ ، إلبَّان Lactation
هو تكوين وافراز وابراز الحليب .

٩٩٧٦ - دُرَّابَة * Draba (S).
Drave, Draba (F). Withlow grass (E). Hunger blume (D). Draba, Drava (I).

جنس نباتات عشبية ممررة صغيرة القد من فصيلة الصليبيات . انواعه عديدة معظمها بري من نبات الاقاليم المعتدلة وبعضها تزييني . سوقها مدادة او منتصبه تملو من ٥ الى ٣٠ سم . اوراقها ضمية صغيرة مستطيلة الشكل ، نصلها خلي البشرة . ازهارها عنقودي التجميع هامي الارتكاز . ازهارها بيض او صفر . اعرف واشهر انواعها ما يلي :

٩٩٧٧ - دُرَّابَة إِسْبَانِيَّة Draba mawi (S).
Drave de Maw (F).

٩٩٧٨ - دُرَّابَة بَنَفْسَجِيَّة Draba violacea (S).
Drave violette (F).

٩٩٧٩ - دُرَّابَة جَامِيَّة Draba rigida (S).
Drave rigide (F).

٩٩٨٠ - دُرَّابَة ذَهَبِيَّة Draba aurea (S).
Drave dorée (F).



ددنقول



درايه



دراج شائع



دراق




دُرَّاقَة



دُرْب



دُرْبَانَة مَنجَلِيَّة



دُرْبَانِي



دُرْبَس

الجُرم . عيناها صغيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، خيطيان عند الانثى . جوشنها ويطنبا الى الخنطلي || روشنها الاماميان الى الخنطلي الاكلف الموج تعلوه خطوط ورقشة وبعض النقط والبقع جميعها الى السمرة . روشنها الخلفيان الى البياض التبي يشقر مع الاقتراب من الطرف وتعلوه خطوط متعرجة سمراء اللون || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في مطلع نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في اواخر تموز . تسرح في الليل ، تعاظم بعد ظهورها بنحو ثلاثة اسابيع . تمتع المكن على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرفة عند بلوغها الكمال الجسموري تطول نحو ٢٢ سم . جسها شبه اسطواني الشكل ، ثنائي الشعول الجانبية . ثوبها الى الخنطلي الاسمر يعلوه خط ثنجي احمر وتسعة خطوط متعرجة صفراء . ثوبها مطوقة بالاسود . مدنها ورواسجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي ضمن صلجة تحببها السرفة في شقوق لحاء الاشجار .

٩٩٩٩ - دُرْبَانِي * ، سُنْمَة Bos indicus (S). Zébu (F). Zebu, Humped cattle of India (E).

الابقار الدربانية جنس حيوانات لبونة من البقرات . واحدها درباني والجمع دراب . انواعها عديدة مهلهها الهند . منها الابقار المقدسة التي لا تمس . اشكالها متباينة تميز باسمها الرفيعة التي تعلو الحواك . اثنائها فائحة يغلب فيها اللون اثنجي . بعضها كبير الجثة مستطيل القوائم يضاهي الثور ويعلوه وبعضها صغير الجثة حجمه حجم النيس الكبير .

١٠٠٠٠ - دُرْبَانِيَّات ٥ Drepanidae (S). Drépanidés (F) Drepanidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٧٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم . تسرح في الليل . طيرانها خفيف الحركة ، معتدل الشوط || اجسامها صغيرة ، قصيفة . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها كبيرة جرداء . قرونها الاستشعارية مشطية مزدوجة عند الذكور ، خيطية او مشطية بسيطة عند الاناث . ملامسها صغيرة . مراشفاها قصيرة . بطونها سهفية الحمل . حذائتها في جانبي السكة البطنية الاول . رواشها صغيرة الحجم ، قليلة التخفيض ، تنسطة الاسترسال عند الراحة . جراسمها تامة النمر . ظنايبها الخلفية ثنائية المناخن القصيرة || اساريها عريضة ، مبعثرة الشعول ، عادمة الرواجب الشرجية . سكتها الشرجية تنتهي بسن قرنية المادة ، معتدلة الطول || خادراتها تلتحف بفياالج رقيقة النسيج || اشهر اجناسها الدربانة والسيلكة .

١٠٠٠١ - دُرْبَة Bosse (F). Boss, Hump (E). سنام الثور اذا ارتفع عن الحاروك .

١٠٠٠٢ - دُرْبَجَة الدرجة : انصباغ اثنان الطير للسفاد من دربجت الحامة لذكرها . طاروته للسفاد .

١٠٠٠٣ - دُرْبُس ٥ Drapetes (S). Drapetes (F). Drapetes (E). جنس حشرات من فصيلة الورايات ورتبة غحديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ٩٠ معظمها من عظم المناطق الاستوائية والحارة || اجسامها صغيرة ، شبه اهليلجية الشكل ، تطول من ٤ الى ٨ سم . رؤوسها صغيرة ، قليلة النشور .

الاشكال والالوان والاحجام . جميعها قصيرة الاهن ، خلية او زباء القشور . لبانها غزير العصارة ، اللذيذ الطعم : ذكي العرف والنكهة . نواتها بيضية الشكل ، صلبة ، قاسية ، كثيرة التثروات والتجاويف . برزتها لوزية مرة الطعم غنية ببعض الحوامض الجحالية . يرغب في الاتربة العميقة ، الحصبية ، الرغاب ، القليلة او المتوسطة الاندماج ، الغنية بالمواد الغذائية وبجميع العناصر المعدنية الرئيسية والثانوية والثلاثية . يخشى الرطوبة المستحكة والجفاف المضي . يفضل المعارض الجنوبية والغربية || يتكاثر بالبذر والتطعيم . وهو من النباتات السريعة النمو والاثمار التي تتطلب عناية خاصة ومستمرة ترتكز على التشذيب النظمي والتقليم الصحيح وعلى حسن معاملة التربة وتنظيم الري ومكافحة الحشرات والامراض الفطرية .

٩٩٩١ - دُرَّاقَة * ، دُرَّاقِيَّة Pêche (F). Peach (E).

ثمرة الدراق او الدراقن . خصائصها المذاقية وميزاتها الصنفية واشكالها واحجامها والوانها عديدة . يفضل فيها اللباب الغزير العصارة ، اللذيذ الطعم ، الذكي العرف والنكهة .

٩٩٩٢ - دَرَّام

هو القنفذ ، اطلبه . وهو السنديان الاخضر ، راجعه .

٩٩٩٣ - دَرَّامَة Lièvre femelle (F). She hare (E). انثى القواع اي الارنب الوحشي .

٩٩٩٤ - دُرَّالَة ، دَرِيْن Fenasses

هي حطام الكلاء اليابس مع بقية الحب والمصافة تبقى في ارض المتبنة .

٩٩٩٥ - دُرْب * ، لِسَان Chirocentrus dorab (S). Chirocentre (F). Chirocentrus (E).

سمكة بحرية من فصيلة الصابوغيات . وحيدة الجنس والنوع كبيرة القد ، مستطيلة الشكل ، ذهبية اللون ، لذيلة اللحم . اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي والاسترالي .

٩٩٩٦ - دُرْب التَّبَان Vole lactée (F). Milky Way (E).

درب التبان ودرب التبانة وباب السماء وشرح السماء جميعها تعني الهجرة . اطلب هجرة .

٩٩٩٧ - دُرْبَاب Geai lancéolé (F). Jay (E).

هو القيق اطلبه . قال في وصفه الدميري : « طائر مركب من الشفراق والغراب وذلك بين في لونه وهو كما قال ارسطاطاليس انه طائر يحب الانس ويقبل التأديب والتربية وغداؤه من الثبت والفاكهة واللحم وغير ذلك ومألفه الفياض والاشجار الملتفة . »

٩٩٩٨ - دُرْبَانَة مَنجَلِيَّة ٥

Drepana falcatoria (S). Platypéryx faucille, Fauille (F). Drepana falcatoria (E).

حشرة من فصيلة الدربانيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة قوتها اوراق الاشجار الحرجية || جسها صغير القد يطول نحو ٩ سم . بسطتها تراوح من ٢٢ الى ٣٦ سم . رأسها مستعرض

١٠٠٠٩ - دَرَجِيَّة ، دِيَارِيَّة (S). Diartema (F). Diartema (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الأرجل وفصيلة الكنبيات. أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد. أعطانها بعض مناطق المحيط الاطلسي انحصاراً بحار البلاد السكندرية || اصداؤها صغيرة، وشعبة الشكل، محزنة. فوهات قليلة الانفراج، ثلاثية الاضلاع الامتساوية التي تبدو كارجل البط شكلاً وحظاً.

١٠٠١٠ - دَرَج ، أَبَت (F). Graduer (F).
قسم الى درجات. To graduate (E).

١٠٠١١ - دَرَجَة (F). Degree (E).
اصطلاح تقني يستعمل في عدة علوم اخصها الهندسة والجغرافية والطبيعة.
١ - فالدرجة في الهندسة هي الوحدة القياسية المستعملة لقياس الزوايا والاقواس. الدائرة الكاملة تتكون من ٣٦٠ درجة. ربعها الذي يعتبر زاوية قائمة يتكون من ٩٠ درجة. وتنقسم الدرجة الى ٦٠ دقيقة والدقيقة الى ٦٠ ثانية.

ب - اما الدرجة في الجغرافية فهي الوحدة التي تقسم اليها خطوط الطول والعرض على سطح الكرة الارضية. رسم خطوط العرض على هيئة ٩٠ دائرة موازية خط الاستواء شمالاً وجنوباً. ورسم خطوط الطول على هيئة انصاف دوائر تبدأ من خط صفر وهو الخط المار بكرينيتش الى خط ١٨٠ وهو المقابل له في نصف الكرة الغربي.

ج - والدرجة في الحرارة هي الوحدة التي تقسم اليها مسافة حرارية، ثابتة البداية والنهاية، تقسماً متساوياً كتقسيم المسافة بين تجدد الماء وغليانه الى مائة درجة. فنقطة التجمد تعرف بالصفر ونقطة الغليان بالمائة. هذا في المقياس المئوي المعروف، بالسنتيفراد || وهناك مقياس اخر اقل شيوعاً واستعمالاً منها مقياس ريويمير الذي يقسم ذات المسافة الى ٨٠ درجة. ومقياس فارنهایت الذي يقسم ايضاً ذات المسافة الى ١٨٠ درجة مع العلم ان درجة صفر سنتيفراد تقابل درجة ٣٢ فارنهایت. وفي سبيل الايضاح نورد في الجدول التالي مقابلات درجات هذه المقاييس الثلاثة :

سنتيفراد	ريو مير	فارنهایت
٠	٠	٣٢
١	٠.٤٨	٣٣.٨
٢	١.٠٤	٣٥.٦
٣	١.٠٤	٣٧.٤
٤	١.٠٤	٣٩.٢
٥	١.٠٤	٤١
٦	١.٠٤	٤٢.٨
٧	١.٠٤	٤٤.٦
٨	١.٠٤	٤٦.٤
٩	١.٠٤	٤٨.٢
١٠	١.٠٤	٥٠
١١	١.٠٤	٥١.٨
١٢	١.٠٤	٥٣.٦
١٣	١.٠٤	٥٥.٤
١٤	١.٠٤	٥٧.٢
١٥	١.٠٤	٥٩

يلحفها الكوسل. عيونها صغيرة. تأشيرها وملامسها نظامية. قرونها الاستشعارية خيطية. كواسلها مستطيلة، مقببة. اغدادها لاحفة، ضيقة المؤخر. قوائمها نشيطة. اثنائها ملونة، اكثرها ثنائي اللون || تألف الحراج والادغال. الحشرة الجمالنة واشعة وخاضعة. البرقة دامت تعيش في الجنوح النخرة.

١٠٠٠٤ - دُرَّة (F). Pearl (great) (E). Perl (grande) (F).
هي اللؤلؤ العظيمة. ج در ودر ودرات.

١٠٠٠٥ - دُرَّة (F). Rut des caprins (F).
هي استحرام المعز. Rut of caprine (E).

١٠٠٠٦ - دُرَّة * (S). Psittacula (S).
Perruche (F). Parakeet (E).
جنس طير من فصيلة الببغاوات. انواعه عديدة. اثنائها متراكبة الالوان المختلفة الزاهية الجميلة. موطنها شاسع الارحاء يمتد من آسيا الى افريقية وامريكا || معظمها يقبل العلم لكنه يقتبسه بشقة وعناء خلافاً لجنس الببغاة السريعة الادراك والانتباس.



دُرَّة

١٠٠٠٧ - دُرَّة الْبَحْر (S). Scarus purpurus (S).
Scare pourpré, Perroquet de mer (F). Parrot-wrasse (E).
سمكة بحرية من بنات مصفار موطنها المتوسط والاطلسي على حدود خط الاستواء. اجسامها مفلطحة اعليجية. اسنانها ملحومة. زعنفتها الظهرية مستطيلة شائكة. قلوبها مربعات ومستطيلات. ثوبها اشهب ارجواني يعبق مع ثبج الظهر || لحمها لذيد الطعم لكنه سام في بعض فصول السنة وذلك عندما يكون مرعاباً براغم المرجان.

١٠٠٠٨ - دَرَجِيَّة ثَلَاثِيَّة الْبُقْج *

Derthisa trimacula (S). Derthisa trimaculée (F).
Derthisa trimacula (E).
حشرة من فصيلة الفسقيات ورثة حرشقيات الاجنحة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط. فراشتها جارية قوتها وحيق الازهار. سرفتها ناهمة قوتها اوراق الزنابق وازهارها واسفاطها || جسمها متوسط القد، بطول نحو ١٤ مم. بسطتها نحو ٣٦ مم. رأسها مخروطي الشكل. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان عند الاثنى، مشطيان عند الذكر. جوشها مستطيل البدة، تبني اللون اشقر الموج. بطنها كثيف النمل، حنطي اللون، اسمر الحيد، اشقر الموج || رواشنها، عند الشقين، الى التبي الاشقر الموج تعلو في الزوج الامامي ثلاث بقع لامتساوية الحجم وثلاثة خطوط متعرجة جيمها الى الحنطي الاسمر الموج. لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في اوائل آب وتبقى حتى اواخر ايلول. تسرح في الليل. تعاظم بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع وتمتص المكن لطخاً على الصفحات السفلى من نصال الاوراق التي تلامس التربة || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٨ مم. جسمها اسطواني الشكل، مالمس القشار، اسمر اللون تعلو اربعة خطوط جانبية مزدوجة قاطبة من الاسمر والجوري، وخط ثبجي اسمر. رأسها اسود. مدبها اسمر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينفضي في التربة حيث تنمن السرفة على عمق ٤ سم.



دَرَجِيَّة ثَلَاثِيَّة الْبُقْج

١٥٩٠٨	٥٦٠٨	٧١	٦٠٠٨	١٢٠٨	١٦
١٦١٠٦	٥٧٠٦	٧٢	٦٢٠٦	١٣٠٦	١٧
١٦٣٠٤	٥٨٠٤	٧٣	٦٤٠٤	١٤٠٤	١٨
١٦٥٠٢	٥٩٠٢	٧٤	٦٦٠٢	١٥٠٢	١٩
١٦٧	٦٠	٧٥	٦٨	١٦	٢٠
١٦٨٠٨	٦٠٠٨	٧٦	٦٩٠٨	١٦٠٨	٢١
١٧٠٠٦	٦١٠٦	٧٧	٧١٠٦	١٧٠٦	٢٢
١٧٢٠٤	٦٢٠٤	٧٨	٧٣٠٤	١٨٠٤	٢٣
١٧٤٠٢	٦٣٠٢	٧٩	٧٥٠٢	١٩٠٢	٢٤
١٧٦	٦٤	٨٠	٧٧	٢٠	٢٥
١٧٧٠٨	٦٤٠٨	٨١	٧٨٠٨	٢٠٠٨	٢٦
١٧٩٠٦	٦٥٠٦	٨٢	٨٠٠٦	٢١٠٦	٢٧
١٨١٠٤	٦٦٠٤	٨٣	٨٢٠٤	٢٢٠٤	٢٨
١٨٣٠٢	٦٧٠٢	٨٤	٨٤٠٢	٢٣٠٢	٢٩
١٨٥	٦٨	٨٥	٨٦	٢٤	٣٠
١٨٦٠٨	٦٨٠٨	٨٦	٨٧٠٨	٢٤٠٨	٣١
١٨٨٠٦	٦٩٠٦	٨٧	٨٩٠٦	٢٥٠٦	٣٢
١٩٠٠٤	٧٠٠٤	٨٨	٩١٠٤	٢٦٠٤	٣٣
١٩٢٠٢	٧١٠٢	٨٩	٩٣٠٢	٢٧٠٢	٣٤
١٩٤	٧٢	٩٠	٩٥	٢٨	٣٥
١٩٥٠٨	٧٢٠٨	٩١	٩٦٠٨	٢٨٠٨	٣٦
١٩٧٠٦	٧٣٠٦	٩٢	٩٨٠٦	٢٩٠٦	٣٧
١٩٩٠٤	٧٤٠٤	٩٣	١٠٠٠٤	٣٠٠٤	٣٨
٢٠١٠٢	٧٥٠٢	٩٤	١٠٢٠٢	٣١٠٢	٣٩
٢٠٣	٧٦	٩٥	١٠٤	٣٢	٤٠
٢٠٤٠٨	٧٦٠٨	٩٦	١٠٥٠٨	٣٢٠٨	٤١
٢٠٦٠٦	٧٧٠٦	٩٧	١٠٧٠٦	٣٣٠٦	٤٢
٢٠٨٠٤	٧٨٠٤	٩٨	١٠٩٠٤	٣٤٠٤	٤٣
٢١٠٠٢	٧٩٠٢	٩٩	١١١٠٢	٣٥٠٢	٤٤
٢١٢	٨٠	١٠٠	١١٣	٣٦	٤٥

اما عملية معادلة درجات المقاييس بين بعضها

فهي :

$$\text{درجة سنتيفراد} = \frac{\Delta}{1} \times \text{درجة ريومير}$$

$$\frac{1}{18} = \text{» » (درجة فارنهایت - ٣٢)}$$

$$\text{درجة ريومير} = \frac{\Delta}{1} \times \text{درجة سنتيفراد}$$

$$\frac{\Delta}{18} = \text{» » (درجة فارنهایت - ٣٢)}$$

$$\text{درجة فارنهایت} = \frac{18}{1} \times \text{درجة سنتيفراد} + ٣٢$$

$$\frac{\Delta}{18} + ٣٢ = \text{» » (درجة ريومير)}$$

١٠٠١٢ - درّجّة *، درّنجّة، فطيرة

Calidris (S). Sanderling (F).

طائر طويل الساق من الزقزاقيات وصيد الجنس والنوع
عديد الضروب المنتشرة في جميع الاصقاع. جسده صغيرة
القد، رجله ثلاثية الاصابع، ثوبه وظاهر جناحيه الى
الغبرة المنمقة بالاسود باطنها الى السمرة الحالكة || يالّف
الشواطىء وضفاف الانهار. قوته الحشرات وبعض
الاعشاب.



درّجّة

Francolin

١٠٠١٣ - درّججوج

هو الدراج اطلبه.

Edentés (F). Edentate (E).

١٠٠١٤ - درّد

هي الثرم رتبة من الثدييات.

١٠٠١٥ - درّدار هو البقيصا، اطلبه.

١٢٠٨	١٦
١٣٠٦	١٧
١٤٠٤	١٨
١٥٠٢	١٩
١٦	٢٠
١٦٠٨	٢١
١٧٠٦	٢٢
١٨٠٤	٢٣
١٩٠٢	٢٤
٢٠	٢٥
٢٠٠٨	٢٦
٢١٠٦	٢٧
٢٢٠٤	٢٨
٢٣٠٢	٢٩
٢٤	٣٠
٢٤٠٨	٣١
٢٥٠٦	٣٢
٢٦٠٤	٣٣
٢٧٠٢	٣٤
٢٨	٣٥
٢٨٠٨	٣٦
٢٩٠٦	٣٧
٣٠٠٤	٣٨
٣١٠٢	٣٩
٣٢	٤٠
٣٢٠٨	٤١
٣٣٠٦	٤٢
٣٤٠٤	٤٣
٣٥٠٢	٤٤
٣٦	٤٥
٣٦٠٨	٤٦
٣٧٠٦	٤٧
٣٨٠٤	٤٨
٣٩٠٢	٤٩
٤٠	٥٠
٤٠٠٨	٥١
٤١٠٦	٥٢
٤٢٠٤	٥٣
٤٣٠٢	٥٤
٤٤	٥٥
٤٤٠٨	٥٦
٤٥٠٦	٥٧
٤٦٠٤	٥٨
٤٧٠٢	٥٩
٤٨	٦٠
٤٨٠٨	٦١
٤٩٠٦	٦٢
٥٠٠٤	٦٣
٥١٠٢	٦٤
٥٢	٦٥
٥٢٠٨	٦٦
٥٣٠٦	٦٧
٥٤٠٤	٦٨
٥٥٠٢	٦٩
٥٦	٧٠




دردار السامرة



دردون التفاح




دردون مرجاني



دردون ناعظ



دردية



دردية

دردية

١٠٠١٦ - دردّار السامرة *

Ptelea (S).

Ptélee, Orme de Samarie (F). Ptelea (E).

جنس جنّيات وشجيرات برية وتربّينية من فصيلة السذابيات. انواعه ستة تعلو من مترين الى ستة امتار. اوراقه مركبة، عابلة، وتربية التجميع، ثلاثية او خماسية التركيب. وريقاتها بيضية، زباء انضلع والعروق، راتنجية الرائحة. ازهاره عثكولي التجميع. ازهاره رباعية الانتظام. ثماره صغيرة مستطيلة مجنحة || اعرف انواعه الثلاثي الوريقات.

١٠٠١٧ - دردّار السامرة الثلاثي الوريقات

Ptelea trifoliata (S). Orme de Samarie à 3 folioles, Ptélee trifoliée (F). Hop tree, Shubby trefoil, Wafer ash (E). Pfennigbanner (D). Olmo di Samaria, O. a tre foglie (I).

نوع من دردّار السامرة بري ويزرع للتزيين. شجيرة تنمو نحو ٤ امتار. اوراقه مركبة طويلة الزناد ثلاثية الوريقات. ازهاره كثيرة العدد لونها الى البياض الاخضر عرفها قريب الشبه من عرف الجنجل.

١٠٠١٨ - دردّاريات هي البوقصيات، اطلبها.

Dryodon

١٠٠١٩ - دردّون

جنس فطور من الابريات تعيش طفيلية على بعض النباتات الحرجية والزراعية فتؤذيها || اشهر انواعه الثلاثة التالية.

١٠٠٢٠ - دردّون التفاح، أصبّه سيثوزة

Dryodon luteo-carneum, Acia setosa (S).

فطر من الابريات قليل الانتشار كبير الحجم قطر نكته يبلغ ٥ سم. وسماكها نحو ١٠ سم. لونه يبدو اصفر كبريتي ثم ينحرف نحو الخنطي الزاهي. ابره السفلية مدلاة صفراء اللون || يتطفل على جذوع الاشجار المعمرة اذا كان فيها بعض الياس فيعطب الخشب مع اليافه ويحوّله الى مادة مرنة رخوة يفوح منها عند لمسها رائحة مستحبة كرائحة الاليسون.

١٠٠٢١ - دردّون مرجاني

Dryodon coralloides (S).

فطر من الابريات، يكثر وجوده في الخريف والشتاء يركب العروق والاغصان والجذوع اليابسة في كل من الزان والتنوب والخور || مظهره الخارجي فطر متوسط الحجم والقدر. قصير الساق الغليظة، رمي التخت المتشعب المتراكب. نكته مستديرة مفلطحة تحمل على صفحتها السفلى بالاضافة الى ابرها الصغيرة المرصوفة ابراً دقيقة مستطيلة مدلاة لونها كالمرجان.

١٠٠٢٢ - دردّون ناعظ

Dryodon erinaceus, Hericium erinaceum (S).

فطر من الابريات يركب جذوع السديان المعمرة ويرقى بمشيج الى القلب بعد ان يعطب الخلايا والالياف الخشبية ويحوّلها الى تجاويف فسيحة || مظهره الخارجي فطر متوسط الحجم والقدر، قصير الساق الغليظة، مستدير التخت والنكته. نكته مغطاة السطح العلوي بوشاح خفي ابيض اللون ثم ينحرف الى الشبي تعلوه ابر دقيقة مستطيلة عاقرة. اما سطحها السفلي فرصوف بالابر الخصبه. بويقاتها شفافة مردنية او بيضية الشكل طولها من ٥ الى ١٢ ميكرون.

١٠٠٢٣ - دردي

Détrit (F). Detritus (E).

دردي الزيت وغيره : ما يبقى راسباً في اسفله من الكدر.

١٠٠٢٤ - درديّة

Levure elliptique (F).

Elliptical leaven (E).

من خائر عصير العنب والتبذ. تدعى الخميرة الاهليلجية.

١٠٠٢٥ - درديّة

Anodonta (S).

Anadonte (F). Anodonta (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة النياحات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحيرات وناقص العالم القديم || اصداؤها كبيرة القد او متوسطة، شبه قصبة الشكل، متساوية المصاريح، لامتناهية الاضلع. مفصلاتها عادمة الاسنان || تعيش في الاسمال. رقادها الشتوي يستمر من ١٦ الى ٢٠ اسبوعاً || لحومها مأكولة، مبدلة الصنف.

١٠٠٢٦ - درر

Direction du vent (F).

Direction of wind, Weather-side (E).

الدردر جهة مهب الريح.

١٠٠٢٧ - دررة، فرقة

Girouette (F).

Weathercock (E).

آلة او جهاز بسيط لا قياسي الشكل والحجم خفيف الحركة ينصب في موقع طلق يستعمل للدلالة على جهة مهب الريح.

١٠٠٢٨ - درر

Suture

خط الالتصاق او الانفصال المصراعي في الثمرة وغيرها.

١٠٠٢٩ - درزان

Triguère ambrosie (F).

نبات عشبي حولي بري وزراعي من فصيلة الباذنجانيات مهدد بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. تكثر زراعته الصناعية في جنوب اسبانيا حيث يستخرجون من بزوره مادة زيتية صناعية || ساقه منتصبه تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه متعاقبة، بيضية النصل الازغب المفرض الخافة. ازهاره ابطية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع، خماسية البتلات اللامتنسمة. ثماره كعابر خماسية الغريفات تغلف العديد من البزور الرقيقة الكستنية اللون.

١٠٠٣٠ - درس الوصاصة

Phyto-pathologie (F).

Phyto-pathology (E).

هو درس الامراض النباتية. علم يرتكز على بحث الالوصام وباهيتها وخصائصها واسبابها ومؤثراتها. لذلك فهو يتطرق الى ابحاث عديدة اخصها البحث الميكولوجي والجسموري والفيزيولوجي والعلاجي والوقائي.


١٠٠٣١ - درسة

Dircaea (S).

Dircée (F). Dircaea (E).


جنس حشرات من فصيلة الشرهونيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز سبعة. اعطائها بعض حراج وغابات المناطق المعتدلة الحرارة والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها مستطيلة الشكل، معتدلة التبسيط، تطول من ٧ الى ١٠ سم. رؤوسها مستعرضة، قليلة النشور. عيونها صغيرة، بارزة. تأشيرها متوسطة القد. ملاسها كبيرة. قرونها الامتصاصية صولطانية. كواسلها مقببة.

١٠٠٣٦ - دُرْسَة صَفْرَاء (F). Bruant jaune (F).
راجع صفح ٥.



درزان

١٠٠٣٧ - دُرْسَة صَفْرَاء العُنُق (F). Bruant ortolan (F).
عصفور من الدرس . اطلب اوتلان .



درسة

١٠٠٣٨ - دُرْسَة كَبِيرَة (F). Bruant proyer (F).
عصفور من الدرس مشهور باسم اكحل ، اطلبه .

١٠٠٣٩ - دَرْص

الدرص ولد الفارة واليربور والقنفذ والهرة ونحوها ج درصة
وادراص ودرصان ودروص والدرص هو جنين الاتان .

١٠٠٤٠ - دَرْعَاء

هي الشاة التي رأسها اسود وسايرها ابيض .

١٠٠٤١ - دَرْعَام *٥

Armadillo officinarum, Armadillidium vulgare (S).
Armadillo officinal, Armadille vulgaire (F).
Armadillo Wood-Louse (E).




درسة رمداء

دورية من القشريات متساويات الارجل تنتمي الى فصيلة
الظرموطيات . موطنها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من العالم
القديم . كانت فيما مضى شائعة الاستعمال الطبي وتدخل
خاصة في علاج اليرقان || جسمها قليل الصلابة ، سلمي
التركيب ، محذب الصفحة العليا ، يتألف من ١٢ سكة .
يطول عند الذكر نحو ١٠ سم . ويطول عند الانثى نحو ١٢ سم
رأسها صغير الجرم ، مستعرض الشكل . عيناها زرقاوتان .
متكهما قاضم قارض . قرونها الاستشعارية اربعة منها اثنان
علويان ، مقوسان ، يتألفان من ٨ عقل . واثنان سفليان
يتألفان من ٤ عقل . جرامها سبعة ازواج صغيرة متساوية
الطول . شرجها ينتهي بزائدتين منعقتين || ثوبها العلوي
الى الطلحة القائمة ، مذهبها اخضر اسمر . تألف الاماكن
الرطبة اغصنها الاقبية والمساكن الارضية . تسرح في الليل
وتبيت في النهار وتتكرر عند الشعور بالخطر . قوتها المواد
المعضوية المنحلة .



دُرْسَة سواد الرأس



درعام

١٠٠٤٢ - دَرْعَة (F). Fibre du palmier (F).
Fibre of palm-tree (E).
الدرعة ما اكتسى الليف من الجمار في النخل . ج درع .



درعوسة

١٠٠٤٣ - دَرْعُوسَة *٥ Phasianella (S).
Phasianelle (F). Phasianella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل
وفصيلة المديعيات . انواعها المعاصرة المعروفة عديدة منتشرة
في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها
جميلة ، مزخرفة ، كبيرة القد ، واضحة الخلقة وسبعة
الفوهة القلبية الشكل || اجسامها اهليلجية . رؤوسها
خامسة الزوائد المسنة الاطراف ، مستطيلة الاخطام
الخروطية الشكل ، ثنائية اللوامس المبيونة . لوامسها الجانبية
خيطية الشكل ، سداسية .



درفور

١٠٠٤٤ - دَرْفُور *٥ Doryphorus (S).
Doryphore (F). Doryphorus (E).

جنس حيوانات زحافة من العظائيات لحميات الالسة
وفصيلة الحرفونيات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها

الشكل . بطونها مستطيلة ، مدببة الطرف . اغمارها لاحقة
قوائمها نشيطة . اثارها ملونة وبيقة || جميعها خاضلة
ودامة . يرقاتها شكاكة وخاشبة .

١٠٠٣٧ - دَرْسَت حو الدرياس ، اطلبه .

١٠٠٣٨ - دُرْسَة الْقَصَبِ الْمُطَوَّقَة

Bruant des roseaux (F).
طائر من الشرشوريات مشهور باسم طربال مطوق ، اطلبه .

١٠٠٣٩ - دُرْسَة رَمْدَاء *٥ ، صُفْرَايَة الشَّعِير

السُّورِيَّة (S). Emberiza cineracea (S).
Bruant cendré, Bruant de Syrie, B. de Perse (F).
Cinereous Bunting (E).

عصفور من الدرس وفصيلة الشرشوريات . موطنه بلاد
الشرق الادنى واغصنها ايران وسورية ولبنان || جسمه
مشوق . طوله نحو ١٧ سم . وبسطته نحو ٢٠ سم . ثوبه
الى الصفار الارمد الموج . رأسه وعنقه الى الصفرة الخضراء
تعلوها مشحة بنية . رداؤه وظهره وصجزه الى الخفسار الاصفر
الخططي الموج . جناحاه الى الربرة الطحلاء الخططية . ذنبه
الى الخفسار الاسمر يحوقه وشم ابيض . زوره وصدره وبطنه
وايطلاه الى الصفار الارمد يعلوه في الصدر ترقيط اسمر .
عيناه مطوقتان بالاصفر . حدقة عينه كستنية اللون .
منقاده ورسغاه الى السمرة || الانثى اصفر قدأ من الذكر
وادكن ثوباً منه || يألف السهول والجبال والادغال والمراعي
والرياض . قوته الحشرات واساريها ويرقاتها والديدان
والبرور البرية || يدثن عشه في الادغال والسياجات على
ارتفاع ٤٠ او ٦٠ سم . عن سطح التربة . الانثى تحضن
من مرتين الى ثلاث مرات في العام . حضنتها نحو ٤
بيضات ترخها بمنوبة الذكر نحو ١٣ يوماً || يعتبر من
العصافير النافعة القليلة الاذى .

١٠٠٣٥ - دُرْسَة سَوْدَاء الرَّأْس *٥ ، صُفْرَايَة
الشَّعِير سَوْدَاء الرَّأْس

Emberiza melanocephala, Passerina melanocephala (S). Embérize à capuchon, Bruant mélanocéphale, Passérine mélanocéphale, Roi des ortolans, Crocote (F). Black-headed Bunting (E).

نوع من الدرس وفصيلة الشرشوريات . موطنه يمتد من
الهند الى اطراف اروبة . يعتبر من ضوارب لبنان ، يقم
في ربوعه بعض الوقت || جسمه يطول نحو ١٨ سم . وبسطته
نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الصفرة تعلوها ماجات مختلفة .
رأسه اسود . قفنه وردائه وظهره وعجزه الى الكستني الاحمر
المواج . جناحاه الى البني الاحمر يغبر عند الاطراف .
ذنبه بني قلعفه ماجة كستنية . صدره وبطنه وايطلاه
وافنيكه الى الصفار الباهت يملوه في الصدر فقط موج
كستني لامع . حدقة عينه كستنية . منقاده ورسغاه الى
السمرة الخططية || الانثى اصفر قدأ من الذكر وادكن
ثوباً منه || يألف السهول والخصاب والجبال وكروم العنب .
تغريده زقزقة لطيفة || يدثن عشه في الادغال والسياجات .
الانثى تحضن مرة واحدة في العام . حضنتها تراوح من ٥
الى ٧ بيضات ترخها بمنوبة الذكر نحو ١٣ يوماً || قوته
الحشرات المختلفة والاساريح والديدان والبرور البرية .
يعتبر من العصافير النافعة القليلة الاذى .

الجملانة ابتداء من نيسان . تسرح في النهار . تسطو على زراعات الشوندر فتتضم النصال وتشرمها || تسافد بعد ظهورها باربعة اسابيع وتباشر متع الممكن بعد الكوم بأسبوع وتستمر عليه نحو ثلاثة اسابيع ، وتلقيه مكنة مكنة تغمرها في التربة قرب اسناخ العوائل || يتقف الممكن بعد متحه بأسبوع فتتوجه البرقة منذ اليوم الاول نحو النبات العائل للاغتذاء . وهي سريعة النمو تبلغ الادراك بعمر ٢٢ او ٢٤ يوماً . جسمها اسفيني الشكل ، شبه مبعط الجرم . سكتها الشرجية مجهزة بـسركين صغيرين . لونها الى الكلبة السمراء . طولها عند الادراك التام يراوح من ٢٢ الى ٢٥ مم طور الاكمال ينقضي في التربة ويستغرق من ١٠ الى ١٢ يوماً . والحشرة الجملانة تنغم في الجلالة او في التربة طول مدة البيات الشتوي الذي يستمر حتى اوائل نيسان .

١٠٠٥١ - دُرُقْدِيُون * Dorcadion (S).
Dorcadion (F), Dorcadion (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنبيات ورتبة غمديات الاجنحة انواعه المعروفة نحو ١٥٠ اعطانها تمتد من اطراف الصين الى اطراف اوروبا . جميعها صغيرة القد او متوسطة . اطولها تراوح من ٨ الى ٢٤ مم . اثنائها مختلفة الالوان السوية تتفوق فيها السمرة ثم الطحلة ثم الصهبة ثم السواد وقد يعلوها تخطيط قاطب ابيض || تسرح في النهار . تظهر في اوائل الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف . مرتعها ازهار النباتات الطوعية || يرقاتها مؤذية تعيش على جذور النجيليات ومنها القمع والشعير والشوفان والذرة ...

١٠٠٥٢ - دُرُقُس * ، عُنْطُوب الصَفَصَاف *
Dorcus parallelipipedus (S), Dorque des saules (F).
حشرة من فصيلة العنطوبيات ثوبها الى السواد الشاحب طولها من ١٥ الى ٣٠ مم . تسرح في الليل . يرقاتها خاشبة تركب كل ما هو يابس من اشجار الصمصاف || الحشرة الكاملة تظهر من نيسان الى تموز وهي من الحشرات النافعة التي تقتس الضارة .

١٠٠٥٣ - دُرُقْنَة ، دُرُقْنِي * Vive petite (F).
سمكة بحرية تدعى ترخون صغير . اطلبها . اما درقني فهو الاسم الشائع في لبنان .

١٠٠٥٤ - دُرُقُوس * Odontaspis (S).
Odontaspe (F), Odontaspis (E).

جنس اسماك بحرية سرلودة من فصيلة الدرقوسيات ورتبة الاشلاق . انواعه المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في معظم بحار العالم . جميعها كبيرة القد ، مفترسة ، شرسة ، بطاشة || اجسامها شبه وشية الشكل تطول من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم . اثنائها الى الطحلة الصفراء او الطحلة الحمراء تعلوها في بعض الانواع رقة سوداء . مسكها مغشي بحجف ثلاثية الاغاديد ، قرنية المادة || رؤوسها كبيرة ، اسفينية الاخطام الذلقة . اشداها مستعرضة . فكوكها السفلية متأخرة . اسنانها مستطيلة مخززية الشكل ، ذرية . عيونها كبيرة . نياستها فلولج ضيقة قريبة من الحواجب || زعانفها الظهرية والبطنية والشرجية متماثلة . زعانفها الذيلية غارقة الطول ، ثنائية التقرين في الفلق السفلي || تعيش نحو ٤٠ سنة وتضع من مرة الى مرتين في الحول . اعرف انواعها واشهرها :

بعض مناطق امريكة الجنوبية || اجسامها قريبة الشبه بالفسب . رؤوسها متوسطة الحجم اعناقها قصيرة . اثنائها مستطيلة ، حرشة ، مخددة ومعقدة . اثنائها الى الزرقة العابقة يعلوها تجذيع معترض اسود . بطونها الى البياض الاغبر او الاصفر || تدفن الانثى بيضها في الرمل فينتفج بعد ستة اسابيع . قوتها الحشرات والديدان والاعشاب والجذور .

١٠٠٤٥ - دُرُقَة ، سِيلْفَة Silpha (S).
Silphe, Bouclier (F), Silpha (E).
جنس حشرات من فصيلة الدرقيات . انواعه عديدة . معظمها نافع وبعضها ضار يسطو على الشوندر والفريز وغيرها . ج درق || اشهر انواعه ما يتبع .

١٠٠٤٦ - دُرُقَة الشَوَاطِي * ، نَكْرُود الشَط *
Necrodes littoralis (S), Silphe des rivages (F).
حشرة نافعة من الدرق . طولها نحو ٢٢ مم . كوتلها اسود لامع ، غمدتها الى الشبهة السمراء . زباناها الى الصفار المذهب . تعيش قرب الشواطئ . يكثر وجودها في اثناء الصيف .


١٠٠٤٧ - دُرُقَة الشَوَندَر * ، دُرُقَة مُعْثِمَة ، سِيلْفَة الشَوَندَر

Silpha opaca, Aclypea opaca, Blitophaga opaca (S).
Silphe des betteraves, S. opaque (F), Beetcarrion beetle (E), Buckelstreifflger, Rübenaskäfer (D).
حشرة مؤذية من الدرق . طولها نحو ١٢ مم . ثوبها الى السواد الحلي . تسطو على الشوندر والملفوف واللفت . تكافح باستعمال الحواشير الفعالة تعفيراً على النبات والتربة .


١٠٠٤٨ - دُرُقَة رُبَاعِيَة النُقَط *
Xylodrepa quadripunctata (S), Silphe à quatre points (F).
حشرة نافعة من الدرق . طولها نحو ١٢ مم . كوتلها اسود . ظهرها اصفر يعلوه اربع نقط سود . يكثر وجودها في احراج السنديان لانها تقتس يرقات الفاتلات وغيرها .

١٠٠٤٩ - دُرُقَة سَوْدَاء * ، سِيلْفَة سَوْدَاء
Silpha obscura, Phosphuga atrata (S), Silphe noir (F).
نوع من الدرق وهي حشرة مؤذية تطول نحو ١٣ مم . ثوبها الى السواد اللامع . رأسها مستطيل الشكل . تسطو على شماميل الشيلك فتعطبها || تكافح باستعمال الحواشير التي لا تضر بالثمار .


١٠٠٥٠ - دُرُقَة مُشْبَكَة *
Aclypea undata, A. reticulata, Blitophaga undata, B. reticulata, Silpha undata, S. reticulata (S).
Silphe réticulé (F).
حشرة خاضلة مؤذية من فصيلة الدرقيات . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا الوسطى والشمالية . اعطانها اللبانية محصورة ببعض مناطق البقاع . تألف المواقع التي تكثر فيها زراعات الشوندر . خنانها ويرقاتها تسطو على الاوراق فتؤذيها || جسمها متوسط القد ، منقطع الشكل ، يطول من ١٢ الى ١٤ مم . ثوبها الى الكستني الشديد السمرة . رأسها مستعرض القاعدة يغور بمعظمه تحت الكوسل . ازارها مغرورس المقدم . زباناها صولجانيان . فكاهما نشيطان || الانثى اميز قدماً من الذكر واغلظ بطناً منه واقصر زبانا . لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة




درقة الشواطئ *



درقة الشوندر




درقة رباعية النقط




درقة سوداء



درقة مشبكة



درقديون



دوقس

١٠٠٦٠ - دُرُقُوسِيَّةٌ *، خَشَبُوس المُوَس
Dirca palustris (S). Dirce, Bois de cuir, B. de plomb (F). Leather wood (E). Lederholz, Lederbaum (D). Legno di cuoio, Legno di piombo (I).
جنبة برية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة المازريونيات . مهدها مناطق امريكة الشمالية وكندا . تعلق نحو ١٥٠ سم . اوراقها عابلة ، بيضية ، خلية النصل ، طولها نحو ٨ سم . وعرضها ٤ . ازهارها زلادية منحنية ، لونها الى الصفرة . خشبها رخو لدن . قشورها ثنية الطي متينة كالجلد تستعمل في صناعة الخبال .

١٠٠٦١ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
Darluca
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفييات . بكثافتها كروية ، ضمية التجميع ، حنطية اللون ، ناعمة الملمس . بوبنتها مخروطية ، مستطيلة ، ثنائية الخلايا يعلوها من جهتي استطالها كشة من الحلب الشفاف | انواعها قليلة واضرارها كذلك .

١٠٠٦٢ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
Dorylides (F). Dorylides (E).
جنس نمل افريقي جوال . ذكوره مجنحة ، انثاه عديمة الجناح . انواعه المعروفة نحو ٢٠ اشهرها الدرينين .

١٠٠٦٣ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
Dorylus (S).
Doryline (F). Doryline (E).
نوع من النمل الافريقي الجوال ينتمي الى جنس الدريليد . قافلته ، عند انتقاله من مكان الى مكان تعد عدة ملايين وتنساب كانيوب اسود قطره من ٢٥ الى ٤٠ سم . وطوله يراوح من ١٠٠ الى ٣٠٠ م . فتقضي على كل شيء يعترض سبيلها ولا تعف عن الحيوان والانسان اذا كان غافلاً او نائماً .

١٠٠٦٤ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
الدرماء نبات سهلي دسقي ليس بشجر ولا عشب ، ينبت على هيئة الكبد وهو من الحمض . وقال ابو حنيفة : لها ورق احمر . وقال مرة : ورقها اخضر ولها نور احمر وهي تشبه الحلمة . (اللسان) .

١٠٠٦٥ - دُرُقُوسِيَّةٌ ، حَمِيَّة
Charnua (F).
Fleshy, Pulpy (E).
نمت ثمريني يستعمل للدلالة على كثرة اللحم في بعض الاعضاء الحيوانية وعلى غزارة اللباب في بعض الثمار .

١٠٠٦٦ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
Dermatose (F). Dermatosi (E).
اسم يطلق على جميع الامراض الجلدية منها كان سببها .

١٠٠٦٧ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
Dromia (S).
Dromie (F). Dromia (E).
جنس دوبيات بحرية من القشرييات عشاريات الارجل ، قصيرات الذيل ، حاملات القوائم وفصيلة الدرموسيات . انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة يكثر وجودها حيث يكثر الاسفنج لانها تعيش بين شعابه | اجسامها صغيرة القد ، منعية الشكل ، كثيفة الحلب الدقيق . قوائمها قصيرة ونشيطة ، الزوجان الخلفيان رفيحا الارتكاز الذي يبدو بمستوى سطح الظهر وهما مجهزان بملاقط ثنائية الاصابع ، مسننة الاطراف | اعرف انواعه واشهرها الدرموس المبلول (D. vulgaris)

الدوقس الخوري
Odontaspis taurus (S).
الدوقس الشكس
Odontaspis ferox (S).


١٠٠٥٥ - دُرُقُوسِيَّات ٥
Odontaspidae (S).
Odontaspidés (F). Odontaspidae (E).
فصيلة اسماك بحرية سرلودة مفترسة من السنفقيات ورثة الاشلاق . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها جميع بحار العالم . مسرحها يمي ، لا تقترب من النفاث والمجادح الا في بعض الحالات الخاصة | اجسامها وشمية تطول من ٣٠٠ الى ٤٥٠ سم . اثوابها تختلف مع الاجناس والانواع . رؤوسها شبه مخروطية الشكل . اشداقها كبيرة . اسنانها مستطيلة ، ذرية | تتميز بخلو زعانفها الذيلية من الاتحاديد البارزة وبالمساواة في الحجم بين الزعانف الظهرية الامامية والخلفية ، وباستطالة الزعانف الذيلية | انثاه معتدلة النشار ، تضع من ٣٥ الى ٤٥ مجراً . اشهر اجناسها الدوقوس .

١٠٠٥٦ - دُرُقُوسِيَّةٌ *
Pristiurus melanostomus (S). Pristure bardoulin (F).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة السليديات . اعطائها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي | جسمها وشبي الشكل يطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ثوبها الى الشبهة الحمراء الموج تشتد حمرة وتسمر في الظهر وتنقلص في البطن . ابطلاها مبقعان بالاسمر الحادق . رأسها اسفني الشكل . عظمها ذلق مستطيل . فيها سفلي الارتكاز . فكها الاسفل صغير الحجم ، مقوس الختار . شدقها معتدل الانفراج | تتميز بزعنفتها الذيلية الحارقة الطول ، الشائكة الحافة العليا . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٠٥٧ - دُرُقُوسِيَّات
Silphidae (S). Silphidés (F).
Silphidae, Carrion beetles, Burying beetles (E).
Aaskäfer (D).
فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة معظمها نافع وبعضها ضار . جميعها دائنة متوسطة او كبيرة القد ، قليلة الاحديداد ، مخددة او ملساء الاغمدة . زباناها مركبة من ١١ فاصلة . فواصلها الطرفية مفلطحة دبوسية الشكل | الانثى تتمتع مكنها في جثث الحيوانات والطيور والافاعي فينقف عن يرقات تعيش اول عهدها في صديد المواد العضوية السائلة الى الانحلال .

١٠٠٥٨ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
Dorcatoma (S). Dorcatome (F).
جنس حشرات نحاشبة من فصيلة الغفريات انواعه نحو ٢٠ منتشرة في جميع بلاد العالم . جميعها صغيرة القد . اجسامها ترسية الشكل مفلطحة . اثوابها الى السمرة . قرونها الامتشارية مروحية مركبة | يرقاتها تعيش على الفطور والاشخاب الميتة . اشهر انواعها دركتوم الصوفان .


١٠٠٥٩ - دُرُقُوسِيَّةٌ ٥
Dorcatoma chrysomelina (S). Dorcatome des polypores (F).
حشرة من الدركتوم طولها نحو ٢ سم . ثوبها الى السمرة الفحمية الموج . زباناها مروحية فرعاء . يرقاتها تعيش على الفطور انحصها الصوفان .



دوقس



دوقلة



دركتوم الصوفان



دركه

١٠٠٧٤ - دَرَنَّةُ أَزُونِيَّة (Nodosité(F). Nodosity(E).
الدرنات الازونية عقد صغيرة القد مستديرة الشكل تعلو
جذور معظم النباتات القطنية . وظيفتها امتصاص
وخزن ازوت الهواء . وقد يتم ذلك بواسطة الجراثيم الحية
المائشة في هذه الدرنات .

١٠٠٧٥ - دَرَنَسَةُ (Murmidius (S).
Murmidius (F). Murmidius (E).

جنس حشرات من فصيلة الدرنسيات ورتبة غمديات
الاجنحة . انواعها المعروفة ثلاثة اعطائها الاصلية بعض
مناطق البلاد الحارة وقد اصبحت الآن من الحشرات العكاطية
الموجودة في معظم عنابر مرقا العالم || اجسامها صغيرة
تطول من ٢ الى ٣ سم . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة .
تأثيرها وفكوكها ضليعة . قرونها الاستشعارية غيطية ،
قصيرة . كواسلها مستعرضة ، محدبة . اغمادها لاحفة
مستديرة الطرف . قوائمها نشيطة . اثوابها الى الجؤوة ||
الحشرة الجمالنة قرضابة . اليرقة حابية يكثر وجودها على
الارز المكسور او المعطوب .

١٠٠٧٦ - دَرَنَسِيَّات (Murmidiidae (S).
Murmidiidés (F). Murmididae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها
المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة ||
اجسامها صغيرة ، شبه اسطوانية الشكل ، تطول من ٢
الى ٥ سم . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تأثيرها وفكوكها
نظامية . قرونها الاستشعارية غيطية ، قصيرة ، عشارية
الفصل || كواسلها مستعرضة . اغمادها لاحفة . قوائمها
نشيطة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها ملونة || حشرات
الجمالنة قرضابة . يرقاتها حابية تثقب الحبوب وتنخرها
وتعيش على محتوياتها || اشهر اجناسها الدرنة .

١٠٠٧٧ - دُرُنُوقُ ، دَرُونِكُ ، دَرُونَجُ

Doronicum (S). Doronic (F). Doronic (E).
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة المركبات
الشعاعية . انواعه عديدة بعضها حشولي الجذور . اوراقه
متعاقبة ، السفلية منها محنقة والعلوية حاضنة . ازهاره هامية
الارتكاز يكثر فيها اللون الاصفر || اعرف انواعه واشهرها
ما يتبع .

١٠٠٧٨ - دُرُنُوقُ بَلْقَانِي

Doronicum wulfenianum (S). Doronic de Wulfen (F).
Wulfen doronic (E).

نوع من الدرنوق البري والتريبي . ضروريه عديدة .
مهده الشرق الاوسط والبلقان . يعلو من ٢٠ الى ٦٠ سم .
اوراقه السفلى صغيرة القد ، قلبية او كلوية الشكل ،
دقيقة العنق . الوسطى كبيرة قلبية حاضنة . ازهاره هامية
لاقياسية التجميع . قطر الزهرة نحو ٤ سم . لونها الى
الصفار الذهبي الزاهي || ازهاره يستمر من ايار الى
تموز .

١٠٠٧٩ - دُرُنُوقُ خَائِقُ النَّمِر * ، خَائِقُ النَّمِر

Doronicum pardalianches, D. cordatum (S). Doronic
tue-panthère, Herbe aux panthères (F). Leopard's-bane,
Panther strangler (E). Echte gemswurz, Leopardenwurz (D).
Doronicosospetto (I).

نوع من الدرنوق البري والزراعي التريبي يعلو من ٣٠
الى ٨٠ سم . ساقه زباء . اوراقه السفلى معنقة كثيرة التفريض
اما الوسطى فحاضنة وعريضة الاذينات . ازهاره هامية

الذي يمش في البحر الابيض المتوسط والذي يشاهد قرب
الشطوط عند الانقلاب الصيفي اي في زمن التمرة عند
الاناث .

١٠٠٦٨ - دُرْمُوسِيَّات (Dromiidae (S).
Dromiidés (F). Dromiidae (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل ،
قصيرات الذيل ، حاملات القوائم || اجناسها وانواعها
المعروفة متوسطة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمتدلة
الحارة || اجسامها صغيرة القد ، مربعة الشكل او
مستطيلة . تتميز بقصر قوائمها وبارتفاع الخلفية منها الى
مستوى سطح الظهر || اشهر اجناسها الدرموس .

١٠٠٦٩ - دَرْمِيَّت (Dermite (F). Poll-eil (E).
مرض البشر الساري يصيب الخيل والبقر .

١٠٠٧٠ - دَرْمِيْس (Dendromys (S).
Dendromys (F). Dendromys (E).

جنس حيوانات لبونة قاضمة من فصيلة الفأريات . انواعه
المعروفة سبعة موطنها بعض اقاليم افريقية الاستوائية والحارة ||
اجسامها صغيرة تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . رؤوسها شبه
مخروطية الشكل . سبالها كثيفة . اذانها شبه مستديرة .
اثوابها الى الرتبة الشهباء تغبر وتبيض في البطن . ظهورها
من القفن الى قاعدة الذيل سوداء الخط الشجي || تتسلق
الاشجار بخفة ومهارة . قوتها البرور والثار والبراعم والجذور .
اناثها تضع من ٤ الى ٥ مرات في الحول وكل مرة من ٤
الى ٥ ادراس تبصر النور بعد اسبوع .

١٠٠٧١ - دَرْنَس (Dentex (S).
Denté (F). Dentex (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات ورتبة شائكات
الزعانف || انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم بحار
العالم . اجسامها كبيرة او متوسطة القد ، مستطيلة الزعانف
الظهرية والشرجية ، فارقة الزعانف الذيلية . اثوابها الى
الرتبة الرصاصية السفعاء المواج || جميعها بطاشة قوية
الاستنان الذرية || اشهر انواعها واعرفها الدرناسة الشائعة
لو : المبدولة .

١٠٠٧٢ - دَرْنَسَة مَبْدُولَة *

Dentex vulgaris (S). Denté commun (F).
Sea rough (E).

نوع من الدرناس . سمكة بحرية بيوض من الاسبوريات .
اعطائها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط . تعتبر من
اسماك المياه الاقليمية || جسمها اهليلجي الشكل يطول
من ٦٠ الى ٨٠ سم . ثوبها يتبدل مع العمر ركيزته الشبهة
يعلوها تمشيع اخضر ثم احمر ارجواني . رأسها كبير الجرم ،
قصير الخطم . شذقها معتدل الانفراج . فكها متعادلان .
اسنانها ثلاثية الصفوف . عيناها متقاربتان ، ناشرتان .
اعكاسها الخيشومية ثلاثية الاسقاط . زعنفتها الظهرية سنامية
الشكل . زعنفتها الصدرية رمية حمراء اللون . زعنفتها الذيلية
هلالية الشكل حمراء الختار || لحمها متوسط الصنف ،
مأكول .


١٠٠٧٣ - دَرَنَة ، عَسَقَسَل ، عَسَقُول

Tubercule (F). Tubercle (E).


كل جزء نباتي مصدره الساق او الجذر منتفخ الشكل
لبابي التركيب يدخر بعض المواد الغذائية .



درميس



درناسة مبدولة



درونق خائق النمر



دُرُنُوقٌ عَقْرَبِي



دُرُنُوقٌ مِزْمَارِي



دُرُونِيَّة



دُرُونِيَّة

القدر ربة . رؤوسها مستديرة . قوائمها قوية ، أصابعها طويلة . أذناها شديدة الطول . أثوابها سوية الألوان . تكثر فيها الربة . وجوهها بيض الجهة والحدود . شعورها ناعمة قصيرة ووثيرة . أذناها جثة || تألف الاحراج والغابات الرطبة الظليلة . موطنها الاشجار . مسرحها دجوي يستمر من الغروب الى انبلاج الفجر . قوتها الحشرات والعصافير والثمار .

١٠٠٨٧ - دُرُونِيَّة * Diervillaea (S). Diervillée (F).

جنس نباتات معقودة الهوية على اسم العلامة النباتي (Dierville 1708) . انواعها نحو ١٠ جميعها جنبات معمرة برية وتربينية من فصيلة الالهيات . اوراقها متقابلة ، عابطة ، مسننة النصل . ازهارها قمية او جرسية الشكل خماسية التفريضة || اشهر انواعه ما يلي .

١٠٠٨٨ - دُرُونِيَّة عَدِيدَةُ الزَّهَرِ

Diervillaea florida (S). Diervillée multiflore (F).

نوع من الدرونيلة مهنها الصين . ضروبها عديدة تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها معنقة بيضية . نصلها ازغب الصفحة السفلى مسنن الحافة . ازهارها كثيرة العدد وتريه التجميع . قطر الزهرة نحو ٢ سم . لونها يختلف مع الضرب منها الابيض والاحمر والارجواني والموشع بالاصفر || ازهارها يدوم من ايار الى حزيران .

١٠٠٨٩ - دُرُونِيَّة كَبِيرَةُ الزَّهَرِ

Diervillaea grandiflora (S). Diervillée à grandes fleurs (F).

نوع من الدرونيلة مهنها اليابان تعلو من متر الى مترين اوراقها اهليلجية ذلقة الزام الاخضر . نصلها خلي المروق مسنن الحافة . ازهارها وتريه التجميع كبيرة القدر قطر الزهرة نحو ٤ سم . لونها ال الوردي الزاهي . ازهارها يدوم شهراً واحداً ينتدئ في اواخر ايار .

١٠٠٩٠ - دُرُونِيَّة كَنْدِيَّة

Diervillaea canadensis (S). Diervillée du Canada (F).

نوع من الدرونيلة مهنها كندا . ضروبها عديدة . تعلو نحو ١٥٠ سم . اوراقها بيضية الشكل مدببة العقصة . نصلها مالمس البشرة مسنن الحافة . ازهارها صفر . قطر الزهرة من ١ الى ٢ سم || ازهارها يدوم من حزيران الى تموز .

١٠٠٩١ - دُرُونِيَّة لَاطِئَة

Diervillaea sessilifolia (S). Diervillée à feuilles sessiles (F).

نوع من الدرونيلة مهنها امريكا الشمالية تعلو نحو ١٠٠ سم . ساقها وفروعها زغبية اللحاء . اوراقها لاطئة . ازهارها نورية التجميع هامة الارتكاز لونها الى الصفرة الكبريتية || ازهارها يدوم من تموز الى آب .

١٠٠٩٢ - دُرُونِيَّة يَابَانِيَّة

Diervillaea japonica (S). Diervillée du Japon (F).

نوع من الدرونيلة التريينية مهنها اليابان تعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها بيضية الشكل نصلها خلي الصفحة السفلى ازغب العليا . ازهارها وتريه التجميع ، صغيرة القدر ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٠٩٣ - دُرُونِيَّة Darwinia (S). Darwinie (F).

جنس نبات من فصيلة الآسيات معقود الهوية على اسم العلامة دروين . انواعها المعروفة ٢٠ مهنها شرقي استراليا

الارتكاز ، شفمية التجميع ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى الصفرة الذهبية . بزوره سود . يقال انه من الاعشاب السامة التي تقتضي على الحيوانات المفترسة || ازهاره يستمر من حزيران الى آب . يرغب في المعارض الشمالية لانه يخشى الشمس .

١٠٠٨٠ - دُرُنُوقٌ عَقْرَبِي * Doronicum scorpioides, D. grandiflorum (S). Do-

ronic scorpioide, D. à grandes fleurs (F). Scorpoid doronic (E). Alpengemswurz (D). Doronico italiano, Falso doronico (I).

نوع من الدرونوق الترييني تعلو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ارومته سكرية الطعم . ساقه قليلة الزغب . اوراقه مقطوعة القاعدة . نصلها قليل التفريضة مسنن الحافة . ازهارها ذهبية اللون ، كبيرة القدر ، قطرها نحو ٦ سم . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول . يرغب في الاتربة المندمجة المتوسطة الرطوبة . يخشى المعارض الجنوبية الكثيرة الشمس .

١٠٠٨١ - دُرُنُوقٌ قَلْبَقَازِي

Doronicum orientale (S). Doronic du Caucase (F). Oriental doronic (E).

نوع من الدرونوق البري والترييني مهنه بلاد القفقاز . تعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقه قوية قليلة الزغب . اوراقه السفلى مستديرة القاعدة معنقة اما الوسطى فقلبية حاصنة . ازهاره فردية التجميع قطرها نحو ٥ سم . لونها الى البرتقالي || ازهاره ربيعي . يرغب في الاتربة المندمجة التي لا تقتصر الى الكلس والرطوبة .

١٠٠٨٢ - دُرُنُوقٌ مِجْرِي

Doronicum austriacum (S). Doronic d'Autriche (F). Austrian doronic (E).

نوع من الدرونوق تعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه لا عكيس لها . اوراقه بيضية الشكل ، قلبية القاعدة ، مدببة العقصة ، مستديرة الاذينات . ازهاره الى الصفرة البرتقالية . قطرها من ٥ الى ٦ سم || يزرع للتزيين . يرغب في المعارض الشمالية والمواضع الرطبة . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

١٠٠٨٣ - دُرُنُوقٌ مِزْمَارِي *

Doronicum plantagineum (S). Doronic-plantain (F). Plantain-doronic (E).

نوع من الدرونوق عديد الضروب . تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه السفلى والوسطى بارزة العروق كاوراق لسان الحمل . ازهاره وتريه التجميع ، فردية او ثلاثية قطرها ، نحو ٤ سم . لونها الى الصفار الزاهي || يزرع للتزيين . يرغب في الاتربة المتوسطة الرطوبة والاندماج || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

١٠٠٨٤ - دَرَنِي ، مُدَرَن Tuberculeux (F). Tubercular (E).

ما كان شكله كالدرنة .

١٠٠٨٥ - دُرُونِي Chien à grosse tête

الدرواس ج درواس : الكبير الرأس من الكلاب .

١٠٠٨٦ - دُرُونِي * Nyctipithecus (S). Douroucoul, Singe de nuit (F). Douroucoul (E). Mirikina (D).

جنس قروود امريكية من فصيلة السبوسيات . انواعه ٥ موطنها يمتد من البرازيل الى الكيرو || اجسامها صغيرة

يزرع في المراكن داخل البيوت . ازهاره يدوم من شباط الى آذار .

١٠١٠٦ - **دُرَيْقَة مُوسَّحَة** (S). *Aspidistra elatior* (S).
Alpidistre panaché (F).

نوع من الدريقة اوراقه كبيرة القد مرشحة تطول من ٤٠ الى ٦٥ سم. وتعرض نحو ١٠ . ازهاره ارجوانية عابقة الوسط زاهية الاطراف || يزرع في المراكن داخل البيوت . ازهاره يدوم من آذار الى ايار .

١٠١٠٧ - **دَرِيْمَة ٥*** (S). *Piptanthus* (S).
Piptanthe (F). Piptanthus (E).

جنتة معمرة تزيينية من فصيلة السنفليات . ساقها منتصبه تملو نحو ثلاثة امتار . اوراقها عابطة ، مركبة ، ثلاثية الوريقات . نصالها ستانية الشكل ، خلية الصفحات السفلى ، تطول نحو ٨ سم. وتعرض نحو ٢ سم. ازهارها عنقودي التجميع . طرفي الارتكاز . ازهارها كبيرة القد ، صفراء اللون ، قليلة العرف || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠١٠٨ - **دَرِيْمُس ، دريميد** (S). *Drimys* (S).
Drimyde (F).

جنس نباتات برية طبية وزراعية تزيينية من فصيلة المغنوليات . انواعه ستة مهندها بعض الاصقاع الامريكية من المكسيك الى مضيق مجلان . جميعها اشجار وشجيرات دائمة الخضار جميلة الازهار . اوراقها طيبة . قشورها عطرية الرائحة يستخرج منها مادة راتنجية عديدة المنافع مقوية ومنهضة كما تستعمل في مكافحة داء الحفر . اشهر انواعه دريمس مجلان .

١٠١٠٩ - **دَرِيْمُس مَجْلَان *** ، قَرْفَة كَذِبَة (S). *Drimys winteri* (S). *Drimyde de Winter*, D. de Magellan, Fausse cannelle (F). Winter's bark, Winter's cinnamon (E). Wintersgewürzrinde (D). *Drimis di Winter* (I).

نوع من الدريمس الطبي والتزييني . شجيرة تملو من ٣ الى ٤ امتار . اوراقه زاهية الخضار . ازهاره بيض يملوها مواج وردي || اوراقه وقشوره طيبة مقوية منهضة .

١٠١١٠ - **دَرِين** (F). *Fenasses* (F).
هو الدرائنة . قال عمر بن كلثوم ، الدرين : « حطام المرعى اذا قدم وهو ما يلي من الحشيش وقلمًا تلتفع به الابل . »

١٠١١١ - **دُرَيْقَة** (F). *Nodule*
هي الدرة الصغيرة القد .

١٠١١٢ - **دُرَيْوب باهت ٥*** (S). *Dryops luridus* (S).
Dryop pâle (F). *Pallid dryops* (E).

حشرة مائية قانصة من فصيلة الدريوبيات ورقبة مفدمات الاجنحة . تألف المناقع ومجاري الماء . خنافسها ويرقاتها تعيش في الماء قوتها الحشرات الدنيا والاوليات || جسمها صغير القد يطول نحو ٥ سم. ثوبها الى الشقحة السمراء يملوها مواج اكلس واخل دقيق كثيف يدفع الرزغ ويمنع البلل . رأسها يرسمي الشكل . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها مركبان ، منشعبان . ظهرانها معتدل الاحديداب .

جميعها جنات وشجيرات معظمها بري وبعضها تزييني . اعرف انواعها التزيينية ثلاثة الارجوانية والسعترية واليمونية .

١٠٠٩٤ - **دُرَيْاس *** ، دَرُوس ، دَرَسْت ، إدرياس (S). *Thapsia garganica* (S).

Thapsia, Faux fenouil, Faux turbith (F). *Drias plant*, Smooth thapsia (E). Falsche turbith (D). *Tassia*, Turbitto di Puglia (I).

نبات عشبي بري طبي معمر من فصيلة الخيميات مهنده حوض البحر المتوسط . اوراقه مركبة ريشية . ازهاره بيض . يستخرج من جذوره عصارة راتنجية نافطة ومهيجة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية ذات الاستعمال الخارجي .

١٠٠٩٥ - **دُرَيْجَة** (S). *Sanderling*
راجع درجة .

١٠٠٩٦ - **دَرِيخَة** (F). *Marcotte* (F). *Layar* (E).
القضيب الذي يعكس ويرقد .

١٠٠٩٧ - **دُرَيْدَار أَبْيَض** هو الدقتون ، اطنبه .

١٠٠٩٨ - **دَرِيْس** (F). *Queue de chameau* (F).
هو ذنب البعير .

١٠٠٩٩ - **دُرَيْس** هو الاسطراغالوس القزي ، اطنبه .

١٠١٠٠ - **دَرِيْس** (S). *Derris* (S).
Derris, Deguëlle (F). *Derris* (E).

جنس جنات برية وزراعية صناعية من فصيلة القرنيات الفراشية . انواعه عديدة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية . فروعها جرزونية مستلقية . يستخرج من جذورها مادة الروتينون التي تستعمل في اباد الحشرات . اشهر انواعه المزروعة لاستخراج الروتينون يلي .

١٠١٠١ - **دَرِيْس اهلياجي** (S). *Derris elliptica* (S).

١٠١٠٢ - **دَرِيْس مَلَقِي** (S). *Derris malaccensis* (S).

١٠١٠٣ - **دَرِيْس مَنَقِي** (S). *Derris uliginosa* (S).
زراعتها تكثر في الهند وفي بعض مناطق الشرق الاقصى انحصها جزر الزابج || جذورها تدعى بلغة الملايو (Akar teeba) وتدعى بالانكليزية (Tuba root) .

١٠١١٤ - **دُرَيْقَة *** ، أسبيديسترا (S). *Aspidistra* (S). *Aspidistra*, *Aspidistre* (F). *Parlour palm* (E). *Aspidisterfarn* (D). *Aspidistra* (I).

جنس نباتات عشبية جذمورية مدادة من فصيلة الزنبقيات . انواعها قليلة . سوقها عكائس مدادة . اوراقها قرصية عروية ، منققة ، نصالها جلدي عابق الخضار وقد يكون شاحباً او موشحاً في بعض الانواع || ازهارها جميلة الشكل ارجوانية اللون تتركز على التراب || اعرف واشهر انواعه ما يلي .

١٠١١٥ - **دُرَيْقَة شاحبة** (S). *Aspidistra lurida* (S).
Aspidistre pâle (F).

نوع من الدريقة اوراقه شاحبة الخضار تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. وتعرض نحو ٤ . ازهاره ارجوانية جميلة .



درياس



دريقة



درعة



دريمس مجلان



دريوب باهت

انواعها خمسة اثوابها الى الصهبة المرقطة بالجؤوة والسمرة .
اطرافها مدببة تعيش في الرمال وتندس فيها بسرعة فائقة .

١٠١١٨ - دَسَّاسَة *، سَبَس (F), Seps (S), Chalcides
جنس عطاء من فصيلة السقنقوريات. انواعه عديدة جميعها
مستطيلة الجسم ، دقيقة الذنب ، قصيرة الجرامز . اثوابها
الى الرعدة السفعية الموج ، بطونها بيض . من ميزاتها
انها تفوص في الرمل كما يفوص السك في الماء .



دزير

١٠١١٩ - دَسَّاسَة مُخَطَّطَة *، سَبَس مُخَطَّط
Chalcides striatus (S), Seps chalcide (F), Seps (E).
حيوان بيوض من العطاء وفصيلة السقنقوريات قابعات
الاسنان، مكتسيات اللسنة، رباعيات القوائم، ثلاثيات
الاصابع . اثنائها اكبر قدماً من ذكورها || جسمها رشيق
القوام بطول من ٢٢ الى ٢٥ سم. رأسها لوزي الشكل .
عينها صغيرتان تلحفها اجفان شفافة متحركة . لسانها
ذلق الطرف ، مشعل الصفحة . عنقها قصيرة . ذنبها
مستدق الطرف ، سريع الانقسام || ثوبها الى الرعدة
الخضيلة السفعاء الموج تعلوها خطوط قاطبة تمتد من الرأس
الى الذنب || بياتها الشتوي يستمر نحو اربعة اشهر .
الانثى تبيض من ٦ الى ١٢ شلقة تطورها في التربة ||
تألف الاتربة الرملية لانها تفوص فيها عند الشعور بالخطر .
تسرح في النهار . قوتها الحشرات والديدان والذباب .
تعتبر من الزحافات المفيدة .



دساس

١٠١٢٠ - دَسَّاسَة نَمِرَة *، سَبَس أُنْمَر ،
دُقَّان ، غَنَجِيل

Chalcides ocellatus (S), Gongyle ocellé (F).
Chalcides ocellatus (E).

حيوان سرلود من العطاء وفصيلة السقنقوريات قابعات
الاسنان، مكتسيات اللسنة، رباعيات القوائم، خماسيات
الاصابع . الذكر اصغر قدماً من الانثى || جسمها متوسط
القد بطول من ٢٤ الى ٢٧ سم. رأسها مخروطي الشوزن .
عينها صغيرتان . اذناها خائفتا الغشاء الصبواني . لسانها
ذلق الطرف ، عادم التفريش . تسنيها يلتزم في فنة
القابعات . قوائمها قصيرة ، خاسية الاصابع المجهزة باظافر
محجنة . ظهرها متتابع الشعابيل الدقيقة . بطنها مائل المدب .
ذنبها معتدل الطول ، سريع الانقسام || ثوبها الى الصهبة
الخضيلة السفعاء الموج تعلوها تنمير اسود وابيض يمتد من
الرأس الى اواسط الذنب || بياتها الشتوي يستمر نحو
اربعة اشهر . تألف الخرائب والاماكن الكثيرة الحجارة .
تسرح في النهار وتستكن في الليل ، الذكر برفقة انثاه ||
قوتها الحشرات ، اخصها غمديات الاجنحة والديدان .
تعتبر من الزحافات المفيدة .



دساسة



دساسة مخططة

١٠١٢١ - دَسَّام
Bouchon à l'émeri (F).
سدادة من الزجاج تحكم السد تماماً . Emery stopper (E).

١٠١٢٢ - دُسْبُوس الثُقَّاح هو قرمزية التفاح ، اطلبها .

١٠١٢٣ - دُسْبُوس الثُوت هو قرمزية الثوت ، اطلبها .



دساسة نمرة

١٠١٢٤ - دُسْبُوس الوَرْد هو قرمزية الورد ، اطلبها .

١٠١٢٥ - دِسْبُوسَة البَصَل هي قتع البصل ، اطلبها .

مستدير الطرف للاحف . غمداها متتابعين التحزير المتوازي
المخطوط ، القاطب . ارساغها خماسية العقل || جيلها ثنائي
الحول . تظهر الحشرة الجمالنة في نيسان وتعيش حتى تشرين
الثاني ، تسرح في الليل وتستكن في النهار اما على الصخور
البارزة فوق الماء او على الاعشاب || الانثى تمتع المكن
في التربة الرطبة تحت الجشالة . البرقة بطيئة النمو ، تسمى
الى الماء فور نطقها . جسمها ، عند بلوغها الادراك التام ،
يطول نحو ٧ م . وهو اهليلجي الشكل ، سداسي الرواجب ،
مهدب الاطراف ، اطحل اللون || طور الاكمال الذي
يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي في التربة ضمن صلجة
مركبة من مواد عضوية ونباتية معجونة بالريال .

١٠١١٢ - دُرِّيَّات °
Dryopidae (S).
Dryopidés (F), Dryopidae (E).

فصيلة حشرات مائية قانصة من رتبة غمديات الاجنحة ||
اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد مهددا معظم مناطق
البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المناقع والاهوار والبحيرات
والانهر . تعيش في الماء وتنتقل فيه متمسكة بالجذور
والصخور المغمورة لانها لا تحسن السباحة . قوتها الحشرات
الدنيا والاوليات || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة
الشكل ، مستعرضة الرؤوس ، لانظامية الزباني المتباينة
الاشكال . جرامزها قوية . ارساغها خماسية العقل . قشارها
ملحوف بخمل دقيق يدفع الرزغ ويمنع البلل .
اشهر اجناسها الدريوب والهللميس .

١٠١١٤ - دُرِّيُور °
Dasyurus (S), Dasyure (F).
جنس حيوانات جرابية من فصيلة الدزيريات . انواعه
خسة جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، قريبة
الشبه من الرياح . اخطامها واذناها ذلقة . اثوابها مبقجة
بالابيض . اذناها جثلة مستطيلة . تألف الاحراج .
تعيش على الاشجار ، تسرح في الليل قوتها الدويبات
والطيور والاغنام وسائر الحيوانات الصغيرة التي تتمكن
منها .

١٠١١٥ - دُرِّيُور يَّات °
Dasyuridae (S).
Dasyuridés (F), Dasyuridae (E).
فصيلة حيوانات لبونة مفترسة تعرف بمجئلات الذنب ،
اطلبها .

١٠١١٦ - دَسَّاجَة °
Latrodectus (S).
Latrodecte, Malmignate (F), Latrodectus (E).
جنس عناكب ساعية قانصة مؤذية ثنائية الروايا سداسية
المشائن من فصيلة الشهاذيات . انواعها المعروفة عديدة
منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة من
العالم القديم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة . بطونها
ضخمة ، شبه بيضية الشكل ، يكثر فيها اللون الاسود
والرقشة الحمراء او الالكهف الاسمر المرقوش بالاغبر او
الابيض || تألف البراري والمواقع الدغلة . تسرح في
النهار . قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوم || لسعتها
مؤذية تسبب ورماً موضعياً وحى خفيفة تستمر من
يومين الى ثلاثة ايام .

١٠١١٧ - دَسَّاس *
Eryx (S), Eryx, javelot (F).
Eryx, Sand boa (E).

من اسمائه الاعرج والدفانة والتكاز الهندي والتكاز
المصري || جنس حيات غير سامة متوسطة الطول

١٠١٣١ - دَسْبِيرُس لُوطُس °
Diospyros lotus (S).
Diospyre lotus (F). Date plum (E).
نوع من الدسبيرس مهددة الشرق الأدنى وأروبة الجنوبية .
شجرتها متوسطة القد . ثماره حامضة الطعم ، عديمة النفع ،
كرزية الشكل والحجم || يستعمل كطعم للكواكي لأنه
يوجد في جميع الأتربة الزراعية ولا يخشى البرد وقلة الماء .

١٠١٣٢ - دَسْبِيرُس دِسْقَارِيَّة °
Diospyros discolor (S). Diospyre discolor (F).
نوع من الدسبيرس مهددة الفيليبين وقد عمت زراعته معظم
البلاد الاستوائية . شجرتها متوسطة القد بحيلة الشكل .
أوراقها اهليلجية مدببة الزام الأخير . نصلها جامد النسيج ،
اخضر الصفحة العليا ، خلي السفلى . ثماره كروية
مقطوعة الاعقاب قطرها يراوح من ٦ إلى ٧ سم . قشورها
ناعمة ، خلية ، جؤوية اللون . لبها عاجي اللون ،
جامد المادة ، سكري الطعم ، عوفي الرائحة المستحبة .
يزورها تراوح من ٤ إلى ٨ || يرغب في الأتربة
الدبالية المتوسطة الرطوبة .

١٠١٣٣ - دَسْتُومَة °
Diastoma (S).
Diastome (F). Diastoma (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأرجل
وفصيلة السريتات . أنواعها المعروفة قليلة العدد معظمها
من متحجرات الاحقاب الايسونية وبعضها معاصر تنتشر
في بحار البلاد المعتدلة الحارة || اصداؤها صغيرة مردنية
الشكل متتابعة الخلزنة والتحرير يكثُر فيها اللون الكستني .

١٠١٣٤ - دَسْتِي °
Topique (F). Topic (E).
نعت تعريفي يطلق على ما هو مختص بالمكان أو الموقع ||
الاصنام في العصر الجاهلي كانت جميعها دسّية .

١٠١٣٥ - دِسْتِيَكِي ، ذُو صَفَيْن °
Distique (F).
Distichous (E).
صفة الازهار والاوراق والسنبيلات القائمة على صفين
متقابلين .

١٠١٣٦ - دَسْتِيَنِيَّة *
Dorstenia (S).
Dorsténie (F).
جنس نباتات طيبة جنية وعشبية معمرة من فصيلة التوتيات .
أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددة بعض مناطق امريكا
الاستوائية || اشهر انواعها الدسطينية البرازيلية (D. Bra-
siliensis) أوراقها قرصية الانتشاب ، معنقة ، بيضية
النصال الغائرة العروق . ازهارها تحوت مستطيلة الشكل
مقرنة الزوايا . جذورها طيبة تستعمل كمنهضة ومعرفة
ومضادة للعقوة .

١٠١٣٧ - دَسْق ، طَفَح °
Déborder (F).
To overflow (E).
دسق الخوض : امتلاء وساح مائه . والدسق امتلاء الخوض
حتى يفيض .

١٠١٣٨ - دِسْقَارِيَّة °
Discaria longispina (S).
Discaire à longues épines (F).
جنية معمرة وحيدة الجنس والنوع من فصيلة النقيات .
مهددة بلاد الاربعين . ساقها فرعاء تملو من ١٠٠ إلى
٢٠٠ سم . فروعها متعاقبة ، دقيقة ، منفصلة ، كثيرة

١٠١٣٦ - دَسْبِيرُس °
Diospyros (S). Diospyre (F).
جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة
الابنوسيات انواعه نحو ١٨٠ معظمها من نباتات المناطق
الحارة . سوقها منتصبه عديمة الخلاب . اخشابها صلبة
قاسية ثقيلة الوزن يكثُر فيها الاسمر والاسود . أوراقها
متعاقبة بسيطة جامدة النصل . ازهارها نظامية وحيدة أو
ثنائية المسكن ، خماسية أو رباعية أو ثلاثية التركيب .
ثمارها عنبية لا قياسية الشكل والحجم معظمها حامض الطعم .
يزورها صغيرة مستطيلة آحية المادة || اعرف انواعه
وأشهرها ما يليق .

١٠١٣٧ - دَسْبِيرُس أَبْنُوسِي °
Diospyros ebenaster (S). Diospyre ébenin (F).
نوع من الدسبيرس ضرره الزراعية عديدة . اعطائه فسيحة
الارجاء تشمل بعض مناطق المكسيك والانتيل وهاواي
وفلوريدا والفيليبين والهند . شجرتها تملو من ١٥ إلى ٢٠ م .
أوراقها اهليلجية بحيلة الخضار الزاهي . ازهارها صغيرة
القد ، بيضاء اللون ، خمرية : الذكورية منها مجموعة اسدية
والانثوية خشوية كاملة . ثمارها كروية الشكل أو
مفلطحة ، قطرها يراوح من ٥ إلى ١٢ سم . تتميز بكثورتها
الخضر الابيدة . قشورها رقيقة ناعمة زيتونية اللون .
لبها دسمي المادة الرخوة . سكري الطعم ، جوزي اللون .
يزورها تراوح من ١ إلى ١٠ || وهذا النوع من
الدسبيرس مع كامل ضرره يرغب في الاقاليم الحارة
المنحرفة نحو الامتوائية .

١٠١٣٨ - دَسْبِيرُس صِينِي °
Diospyros chinensis (S). Diospyre de Chine (F).
نوع من الدسبيرس مهددة الصين وقد عمت زراعته معظم
البلاد الحارة . ضرره كثيرة العدد . اشجاره صغيرة القد
تملو من ٤ إلى ٨ امتار . سوقها بيضاء اللحاء أوراقها
سنانية مزغبة النصل . ازهارها صغيرة القد ثنائية المسكن .
الذكورية منها عديدة وكثيرة الاسدية . الانثوية قليلة
العدد ، خلية المبيض . ثمارها كروية أو بيضية الشكل ،
قطرها يراوح من ٤ إلى ٥ سم . لونها عند الادراك إلى
الصبغة الصفراء . لبها شديد الصفرة العافية ، سكري
الطعم ، نيرجي العرف ، ثنائي الفلق وكل فلقة تحضن
بذرة صغيرة سمراء اللون . وثمرته هذه تدعى تين الكاك
(Figue caque) وقد تحفظ زمناً طويلاً فيجود طعمها .
يرغب في الأتربة الخفيفة المتوسطة الاندماج وهو لا
يتأثر بالديدان الثعبانية لذلك يحسن استعماله كطعم
للكاكي الذي يخشى هذه الديدان .

١٠١٣٩ - دَسْبِيرُس فِيرْجِينِي °
Diospyros virginiana (S). Diospyre de Virginie,
Plaqueminier de Virginie, Persimmon (F).
نوع من الدسبيرس السبروتي مهددة امريكا الشمالية .
ضرره الزراعية عديدة لا تخشى الحر والقر . اشجاره
تملو من ١٢ إلى ٣٠ م . أوراقها كبيرة القد نصلها جامد
الصفحة اللامعة الجميلة الخضار . ثماره مأكولة لكنها
لا قياسية الشكل والحجم واللون لأنها تختلف باختلاف
الضرور . اصفرها قدر الكرزة واكبرها قدر المونجة
الكبيرة || يوجد في جميع الأتربة الزراعية ويستعمل
كطعم للكواكي .

١٠١٣٠ - دَسْبِيرُس كَاكِي °
Diospyre kaki
هو الكاكي ، اطلبه .



دسّية

العقد الشائكة . شوكة مستطيل الجرم ، مخززي الشكل ، ذرب الحمة . أوراقها شديدة الصغر سميكة النصال ، لامعة الخضار . أزهارها صغيرة ، فردية تبينة اللون .

١٠١٣٩ - دَسَم (F). Suppuratif (F). Suppurative (E).
دسم الجرح : جعل فيه فتيلة .

١٠١٤٠ - دَسَمَنُوس (S). Desmanthus (S). Desmanthe (F). Desmanthus (E). Büschelblume (D). Desmanto (I).

جنس نباتات عشبية ليفية من فصيلة القرنيات . أنواعه المعروفة ثمانية معظمها بري وبعضها زراعي تزييني . أوراقها متعاقبة ريشية مشطية . أزهارها عثكولية التجميع زاهية الألوان . مستحبة العرف الخافت .

١٠١٤١ - دَسَمُودِيُوم هو الارقيس الهندي ، اطلبه .

١٠١٤٢ - دَسَمُوس (S). Didesmus (S). Didesme, Rapistre (F). Didesmus (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . أنواعها المعروفة سبعة جميعها من نبوت حوض البحر الابيض المتوسط || سوقها منتصبه فرعاء . أوراقها كاملة او ريشية مخرمة . أزهارها طرفي الارتكاز . أزهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

اعرف أنواعه وأشهرها الثلاثة التالية :

١٠١٤٣ - دَسَمُوس مِصْرِي (S). Didesmus aegyptius (S). Didesme d'Egypte (F).
الاوراق كاملة مستطيلة ، والسفلى منها قيسارية النصال .

١٠١٤٤ - دَسَمُوس مِيقَارِي (S). Didesmus rostratus (S). Didesme rostré (F).
الاوراق ريشية مخرمة ، طوعية في بادية سيناء .

١٠١٤٥ - دَسَمُوس نَحِيل الْوَرَق (S). Didesmus tenuifolius (S). Didesme à petites feuilles (F).
الاوراق صغيرة ريشية مخرمة . طوعية في بعض مناطق الساحل اللبناني .

١٠١٤٦ - دَسَمِيَّات (F). Lipides (F). Lipoides (E).
هي المواد العضوية المركزة على الحوامض الدهنية والمعروفة عادة بالشحوم غير المنحلة بالماء .

١٠١٤٧ - دَسْمِيد (S). Desmidium (S). Desmide, Desmidie (F). Desmidium (E).
جنس نباتات مائية من الخثيات الخضرة وفصيلة المدغمت وحيدات الخلية . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة . تتميز باشكالها الخيطية المعقدة الفروع .

١٠١٤٨ - دَسُو ، دَسِي (F). Rabougrissement (F). Stuntedness (E).
حالة او صفة النباتات المثبوتة المعادة النمو .

١٠١٤٩ - دَسِي (F). Base du cou (F). Basis of neck (E).
مغرز العنق في الكاهل .

١٠١٥٠ - دِش (S). Discina (S). Discine (F).

جنس فطور من فصيلة الخشاريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق إقليم الصنوبر . جميع انواعه شبه بيضية العسقلان المحدودب الصفحة المتجمدة . سوقها شديدة القصر او جدعة . لحميتها كاعنة الصنف غير مرغوب فيها || اعرف انواعه اطلاقاً دش الصنوبر المشهور بالدش اللؤلؤي .

١٠١٥١ - دِش لُؤْلُؤِي * (S). Discina perlata (S). Discine perlée (F).

نوع من الدش يعيش على اروعيات الصنوبر وجذوعه المقطوعة . ساقه جدعة . فولف عسقلانه متتابع التتوات والتجاعيد يطول نحو ١٠ سم . ويرتفع نحو ٥ سم . لونه كاللؤلؤ يعملوه موج بني .

١٠١٥٢ - دَشَامِيَّات (S). Erycinidae (S). Erycinidés (F). Erycinidae (E).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشفيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منها الصغيرة القد والوسطى والكبيرة || اجسامها كثيفة الخمل . رواشنها محرمة الزرايا ، متراكبة الخراشف البدة . ملامسها منتصبه ، اطول من الرأس نحو ثلاث مرات . قرونها الاستشعارية صولجانية . طيرانها مزيج من الحوم والسيف والعرقصة || مكنها قاروري الشكل ، تحدد السطح . اساريها اسطوانية الجرم ، خلية القشار ، خاضلة . تعيش على اوراق النباتات البرية || اشهر اجناسها الدشامة والبيته والنمبوس .

١٠١٥٣ - دِشْلُوس (S). Dichillus (S).
جنس خنافس صغيرة القد من فصيلة الغبشيات اجسامها مستطيلة طولها يراوح من ٣ الى ٥ مم . لونها الى السرة السوداء زباناها مركبة من ١١ فاصلة . تعيش تحت العبل والاشخاب والحجارة وبعضها مع النمل في قراها || قوتها المواد العضوية المنحلة وقد تؤدي البزور الناقشة .

١٠١٥٤ - دِشْلُوس صَغِير * (S). Dichillus minutus (S). Dichille minuscule (F). Dichillus minutus (E).

حشرة دامة من فصيلة الغبشيات ورتبة مغمدات الاجنحة . تألف البراري والاحراج الدفلة . تعيش تحت الجفالة والحجارة . قوتها المواد النباتية والعضوية المنحلة . مسرحها دجوي || جسمها صغير القد يطول من ٣ الى ٥ مم . ثوبها الى السمرة السوداء . رأسها مكور الشكل ، قوي التأثير . عينها صغيرتان . زباناها صغيران جالسان . ظهرانها ضيق القاعدة ، مستدير الطرف اللاحف ، قليل التعزيز النمدي || لها ثلاثة اجيال في الحول . الجيل الربيعي يستمر نحو ١٢٠ يوماً والجيل الصيفي نحو ١٠٠ يوم ويستمر الجيل الخريفي نحو ١٤٥ يوماً || البرقة عند الادراك التام تطول من ٨ الى ٩ مم . جسمها دودي الشكل ، مستطيل الرأس ، سداسي الرواجب ، ثنائي السرك الشرجي ، اسمر اللون || طور الاكمال الذي يستمر من ١٢ الى ١٥ يوماً يتقضي في التربة تحت الجفالة طليقاً من كل غلاف .

١٠١٥٥ - دَشَم (F). Oolithe (F). Oolite (E).
الدشم ضرب من التربة الجصية يتكون من حبيبات مستديرة شبيهة بدعبل الصقاراد وبره السمك .



دش لؤلؤي



دشلوس



دشلوس صغير

١٠١٦٢ - دُشْمَة الكَرَز *، لَفْحَة حَمْرَاء ٥

Gnomonia erythrostoma, *Libertina stipata* (S). *Maladie des taches rouges du cerisier* (F). *Leaf scorch of cherry* (E). *Blattbraune der kirschen* (D). فطر مجهري يصيب الكرز على اختلاف أنواعه فيعطب الأوراق ويؤذي الشجرة || مظهره الخارجي يقع فسيحة لاقياسية الشكل لونها الى الصهبة تظهر على النصل في ايار ثم تنتشر بعد ان تطلوها بقع اخرى صغيرة القد قائمة اللون تسبب جفاف النسيج والتفاف النصل. ومن لخصائص هذا الفطر انه يحول دون الاعبال الطبيعي في الاوراق المصابة فتبقى على الشجرة الى ان تنزعها الرياح والامطار || يكافح بجمع الاوراق وحرقها وباستعمال احد الفواظير المخرقة.

١٠١٦٣ - دُشْمِي * *Oolithique* (F). *Oolitic* (E). نمت تعريفي يطلق على ما كانت طبيعته الدشم او ما كان يحتوي على الدشم.

١٠١٦٤ - دُشْمِيَّات ٥ *Gnomoniaceae* (F). *Gnomoniaceae* (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشريات ورتبة الزقيات تتميز باعسانها الناشبة في نسج النبات المنحار. تكاثرها صقية، مقها واضح جلي، بوعها شفاف، ثنائي الخلية، خيطي او اهليلجي الشكل || اجناسها عديدة اما الضارة منها فالدشمة والذثار.

١٠١٦٥ - دُشِيرَة ٥ *Dasychira* جنس حشرات فراشية من فصيلة القزيات اجسامها ربعة مفلطحة لونها الى السمرة زغها حرشني كثيف. يرقاتها ناهمة مؤذية تعيش على اوراق النبات || اعرفها واضرها ما يلي:

١٠١٦٦ - دُشِيرَة الحِرَاج * *Dasychira pudibunda* (S). *Dasychira polyphage*, *Patte étendue Bombyx pudibond* (F). *Dasychira pudibonda* (E). *Streckfuss*, *Rotschwanz* (D). نوع من الدشيرة ثوبها الى الرمادي الالبيض تعلوه غبرة حطية. اجنحتها الامامية مستعرضة الخط الاوسط. يرقاتها تركب الملحوات على اختلاف انواعها فتؤذي الاوراق وقد تعبلها.

١٠١٦٧ - دُشِيرَة الخَوْخ * *Dasychira fascelina* (S). *Dasychira du prunier* (F). نوع من الدشيرة ثوبها الى الريدة الطحلاء تعلوه غبرة حطية. اجنحتها مزركشة. يرقاتها تركب الخوخ والمشش والزعزور فتؤذي الاوراق الفتية لانها تعيش عليها.

١٠١٦٨ - دُشِيرَة خَجُولَة *، دُشِيرَة الحِرَاج ٥ *Dasychira pudibunda* (S).

Dasychira confuse, *D. polyphage*, *Bombyx pudibond*, *Patte étendue* (F). *Dasychira pudibunda* (E). حشرة من فصيلة القزيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراشتها عجفة تعيش على مخزونها الامعاني. سرقها ناهمة تسطو على اوراق الاشجار النفضية والمثمرة وعلى السنديان والجوز والورد والعوسج ... || جسمها متوسط القد يطول من ١٧ الى ٢٠ مم. بسطها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ مم. رأسها معتدل

١٠١٥٦ - دُشْمَة ٥ *Gnomonia*

جنس فطور مجهرية من الدشيمات. اعسانها مستطيلة، تكاثرها ضخمة القنة المخروقة، بوعها شفاف ثنائي الخلية. انواعها المؤذية المشهورة ستة وهي:

١٠١٥٧ - دُشْمَة الجُوز ٥ *Gnomonia leptostyla*, *Marssonina juglandis*, *Leptothyrium juglandis*, *Cryptosporium nigrum* (S).

Anthrachnose du noyer, *Taches des feuilles et fruits du noyer* (F). *Anthrachnose of walnut* (E). *Blattfleckenkrankheit der walnuss* (D).

فطر مجهري يصيب الجوز باوراقه وثماره. مظهره الخارجي يقع مستديرة، مبعثرة، لاقياسية، لونها الى السمرة تركب نصل الاوراق وقشور الثمار فتؤذيها وقد تعطب النوامي. تظهر من حزيران الى آب || تكافح باستعمال سائل بور دو المحلول ١٪ توال بعد اكتمال الاوراق.

١٠١٥٨ - دُشْمَة الدَلْب ٥ *Gnomonia (apiognomonina) veneta*, *Laestadia veneta*, *Gloeosporium nervisequum*, *G. platani*, *Discula platani*, *Sporonema platani*, *Microstroma platani* (S).

Anthrachnose du platane, *Maladie des feuilles du platane* (F). *Anthrachnose of sycamore* (E). *Blattfallkrankheit und zweigkrebs der platane* (D).

فطر مجهري يصيب اوراق الدلب وافنانه فيعطبها. مظهره الخارجي يقع سم تركب عروق وشرابين الاوراق فتسبب يباسها والاعبال الباكر. وهي على الافنان تقع مستطيلة لاقياسية لونها الى السمرة الداكنة تسبب جفاف اللحاء وعطب الشجرة || يكافح بقطع الاعضاء المصابة وجمعها وحرقها مع الاوراق ثم تطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد مع حامض السلفوريك (كيلو سلفات الحديد يضاف اليه ٢٠ سم ٤ حامض سلفوريك عيار ٥٢ درجة بومه، يضاف اليه ١٠ لتر ماء) || ومن المستحسن استعمال سائل بور دو المحلول ١٪ عند الاوراق.

١٠١٥٩ - دُشْمَة الزَيْزْفُون ٥ *Gnomonia tillae*, *Gloeosporium tillae* (S).


فطر مجهري يصيب اوراق الزيزفون فيعطبها. مظهره الخارجي يقع لاقياسية قطرها يراوح من ٢ الى ٤ مم. تركب نصل الاوراق فتتمعجه وتعطبه. تبدو في اول عيدها حراء اللون ثم بنفسجية وتستقر على السمرة الحطية || اضرارها تنحصر بعرقلة نمو الشجرة واعبالها الباكر.

١٠١٦٠ - دُشْمَة السِنْدِيَان * *Gnomonia quercina*, *Gloeosporium quercinum*, *G. umbrineillum* (S).

فطر مجهري يصيب اوراق ونوامي السنديان. مظهره الخارجي يقع لاقياسية، صناعية اللون، تركب نصل الاوراق والنوامي فتسبب ذبولها ويباسها.

١٠١٦١ - دُشْمَة الشِيلِك *، دُشْمَة الفَرِيز ٥ *Gnomonia fragariae*, *G. fructicola*, *Gloeosporium fragariae* (S).

فطر مجهري يصيب الشيلك في زناد اوراقه وفي ثماره. مظهره الخارجي يقع صغيرة لونها الى الجؤوة العابقة تركب زناد الاوراق فتعرقل التبادل النسفي وتعلو الثمار فتبدو كالشور الصغيرة لونها الى السمرة الزاهية || اضرارها محدودة لانها قليلة الاذى وانتشارها منوط ببيئة خاصة قوامها رطوبة التربة وحرارة الجو.



دُشْمَة الجُوز



دُشْمَة الدَلْب



دُشْمَة الزَيْزْفُون




دُشْمَة السِنْدِيَان




دُشْمَة الشِيلِك



دُشْمَة الكَرَز




دَشِيْرَة الحَرَاَج




دَشِيْرَة الخَوَخ



دَشِيْرَة خُجُوْلَة



دَشِيْلَة



دُعْشُوْقَة الشَّام



دُعْشُوْقَة القَطَانِيَّات



دُعْشُوْقَة المَنَاقِع



دُعْشُوْقَة سَبَاعِيَّة النُقْط

السوداويات ، الشصبيات ، الغاريقونيات ، الفلوسيات ، الكودانيات ، والنخريات .

١٠١٧٦ - دُعْشِيل
Œufs de grenouille (F).
Eggs of frogs (E).
هو بيض الضفدع .

١٠١٧٧ - دُعْشُوب هو الدعابة ، اطلبها .

١٠١٧٨ - دُعْث
Epiphyte (F), Epiphyty (E).
اسم يطلق على جميع علل النبات راوصامها وأدوائها من أي مصدر كانت . ج دعوث .

١٠١٧٩ - دُعْثَرَة
Larve de la zeuzère (F).
Grub of zeuzera (E).
دعرة ج دعر : دود القتع يعيش في الالتاق والدهاليز التي يحفرها داخل الشكير والخشب .

١٠١٨٠ - دُعْش
Kapoquier (F).
Cabbage wood (E).
هو الكابوك ، اطلبه .

١٠١٨١ - دُعْشُوْقَة الشَّمَام *

Epilachna argus, E. chrysomelina (S). Coccinelle du melon (F).
حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٨ مم . لونها إلى الحمرة المرجانية . غمدها منقطان بالأسود ، كل غمد يحمل ٦ نقط || تركيب مع يرقاتها جميع نباتات الفصيلة القرعية اخصها الشام . تكافح عند ظهورها بتغير الأوراق بإحد الحواشير الفعالة .

١٠١٨٢ - دُعْشُوْقَة القَطَانِيَّات *

Lasia globosa, Subcoccinella 24-punctata (S). Lasie globuleuse, Coccinelle à 24 points, Coccinelle des légumineuses (F) Lagume lady bug (E).
Luzernemarienkäfer (D).

حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٤ مم . ثوبها وردي اللون . غمدها منقطان بالأسود كل غمد يحمل ١٢ نقطة . الحشرة و يرقاتها خاضلة تركيب القطانيات والقرنفل . تكافح عند ظهورها بنضج النبات أو تغيره بإحد الحواشير المجربة .

١٠١٨٣ - دُعْشُوْقَة المَنَاقِع *

Coccidula scutellata (S). Coccinelle à 4 points (F).
حشرة من الدعسوقيات طولها نحو ٣ مم . شكلها مستطيل . لونها إلى الصبغة . يوجد على غمدها ٤ نقط سود || تركيب مع يرقاتها مختلف أعشاب ونباتات المناقع فتؤذيها بعض الشيء .

١٠١٨٤ - دُعْشُوْقَة سَبَاعِيَّة النُقْط *

Coccinella septempunctata (S).
Coccinelle à 7 points (F). Lady-bird (E).

حشرة خاتلة من فصيلة الدعسوقيات ورقبة مغمدة الاجنحة تألف المواقع التي يكثر فيها الارق والقرمزيات . خنافسها و يرقاتها تعيش على ما تقتنصه من الارق والوعف والمغفرات والقرمزيات ... || جسمها صغير القد ، بيضي الشوزن ، يطول من ٥ إلى ٨ مم . ثوبها إلى الحمرة المرجانية الصفراء الموج يعلوه في غمدها سبع نقط سود منها نقطة درقية على هامش التمددين . رأسها كبير الجرم . عينها كبيرتان جاحظتان . زباناها صقيان منفرجان . فكاهما ذريان ضليمان . غمدها كثيفتا الحمل الدقيق . أرساغها رباعية العقل || أجيالها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من

الجرم . عينها صغيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، خيطيان قصيران عند الانثى . جوشها وبطنها إلى الطحلة يعلوهما موج حنطي || رواشها إلى الرمادي الاغبر تعلوه في الزوج الامامي جددة وسطى سمراء ، وتعلوه في الزوج الخلفي بقبجة حنطية || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في أوائل ايار . تسرح في النهار . تعاغل بعد ظهورها بيومين وتمتص الحنك لطخاً على سوق الاشجار || السرفة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٣٢ إلى ٤٠ مم . جسمها اسطواني الشكل منشي بالهلب المتفاوت الطول . ثوبها إلى الخضار الباهت يعلوه موج اصفر . هلبها اصفر من السكمة الصدرية إلى السابعة وأحر اللون من السكمة الثامنة إلى الشرج ويعلوه في السكمة الحادية عشر ضمة من الهلب المستطيل تبدو كالمرد تطول نحو ١٠ مم . || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ اسبوعاً يتقضي ضمن صلجة حريرية المحيط تحببها السرفة بين طيات الاوراق ار تحت القشور .

١٠١٦٩ - دَشِيْلَة *

Scatophagus (S).
Scatophage (F). Scatophagous (E).
سكة بحرية بيوض من فصيلة السحليات ورتبة شائكات الزعانف . أعطانها تمتد من البحر الأحمر إلى مدغشكر واستراليا || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبطط الجرم ، يطول من ١٥ إلى ٢٠ سم . رأسها صغير القد ، مخروطي الشكل . خطمها بالغ الصغر . زعنفتها الظهرية الامامية ثلاثكة تحمل ١٢ منخساً ذرياً . زعنفتها الشرجية تحمل أيضاً ثلاثة مناخس ذرية || ثوبها إلى الطحلة القضية تعلوها رقعة شديدة السمرة منسوبة التوزيع الذي يمتد إلى الرأس والزعانف الظهرية والذيلية || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠١٧٠ - دُعْشُوب ، دُعْشُوبَة

Fourminoire ailée (F).
Winged black ant (E).
نملة سوداء مجنحة . ج دعاب .

١٠١٧١ - دُعْشَاة

عشبة تعطن وتخبز وهي ذات قطب وورق متسطحة النبتة ومنبتها الصحاري والسهل وجناتها حبة سوداء ج دعاع (لسان العرب) .

١٠١٧٢ - دُعْشَاة

Etai (F). Stay (E).
خشبة كبيرة غليظة يدعم بها الشيء ليستقر .

١٠١٧٣ - دُعْشَاة ، دُعْشَاة ، دُعْشَاة ، دُعْشَاة

Soutènement (F). Support (E).
اسم شامل يطلق على كل شيء يستعمل لدعم شيء آخر كالجدار لدعم التراب والدعامة لدعم الحائط الخ .

١٠١٧٤ - دُعْشَاة

Baside (F). Basidium (E).
الخلية العليا التي ينشأ فيها البوغ عند الفطور الدعامية .

١٠١٧٥ - دُعْشَاة

Basidiomycètes (F).
Basidiomycetes (E).

رتبة من الفطور فصائلها واجناسها وانواعها كثيرة العدد مختلفة الاشكال والاحجام منها الفطور المجهرية ومنها الصوفانية الكبيرة || تتميز بدعائمتها الخارجية المنتصبة القائمة على صفن كروية او بيضية الشكل || اشهر فصائلها الاربيات ، الدبوسيات ، الدعشيات ، الدفريات ، الدندميات ، الراهوبيات ، الرعشيات ، الزحاليات ، الزموليات ، السحاميات ، السحفيات ، السميات ،

١٠١٨٨ - دُعُفُوص أنْكُولَا °

Galago montei (S). Galago d'Angola (F).

١٠١٨٩ - دُعُفُوص جَنَل الذَنب °

Galago crassicauda (S).

Galago à queue touffue (F).

١٠١٩٠ - دُعُفُوص مَبْدُول Galago galago (S).

Galago commun (F).

١٠١٩١ - دَعَكْر * Pomacanthus (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات. انواعه المعروفة ٤٠. اعطانها بحار البلاد الحارة. جميعها مأكولة صغيرة القد، مستطيلة الشكل، مفلطحة الجسم، فارقة الزعنفة الشرجية. اثنائها متباينة الالوان الزاهية.

١٠١٩٢ - دَعَكْر مَسِيك *

Pomacanthus sordidus (S).

Pomacanthus sordide (F). Pomacanthus sordidus (E).

نوع من الدعكر. سمكة بحرية بيوض من فصيلة السحليات شائكات الزعانف. اعطانها البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر والخليج العربي. مسرحها حشاش المجاذع والنقاف || جسمها اهليلجي الشكل يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ثوبها الى الرعدة الدنسة يعلوها تمشيح معترض باهت الخضاب. ظهرها عاتق السمرة. بطنها الى الغبرة. زعانفها الى الشبهة السمره الموج باستثناء الظهرية والشرجية فانها الى الصفرة ويعلو الظهرية بقجة سوداء، رأسها خذروني الشكل، ذلق الخطم. شدقها قليل الانفراج. فكها السفلي يتقدم العلوي. اسنانها كثيرة، صغيرة، ذرية، متحركة عيناها مستديرتان، ناشزتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة. زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها جيد الصنف، مرغوب فيه.

١٠١٩٣ - دَعَلْبَة ° Gastrostège (F).

الدعلبة هي الصفحة الواحدة من الصفائح التي تغلف مدب بطن الحية من العنق الى اول الذنب. ج دعالب. اما صفحة الذنب فتدعى ذيلبة.

١٠١٩٤ - دُعَلَة Apnée (F). Apnoea (E).

الدعلة انقطاع التنفس الموقت، ويدعى البُهر.

١٠١٩٥ - دُعُلُوج ° Symphyandra (S).

Symphyandre (F). Symphyandra (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الجريسيات. سوقها فرعاء تملو من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها معتقة، الجذعية منها متعاقبة، العليا متقابلة. نصلها سنانية الشكل، مسننة الحتار. ازهارها كبيرة القد عنقودية التجميع او عشكولية || تزرع للتزيين في المراكن والحدايق. انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية.

١٠١٩٦ - دُعُلُوج أُرْمَنِي °

Symphyandra armena (S).

Symphyandre d'Arménie (F).

نوع من الدعلوج. مهدد بلاد ارمينية. ساقه تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم. افناده منتصبه، خلية اللحاء. ازهاره محورية، فردية. لونها الى الزرقة الباهتة. تويجاتها انبوية قصيرة الفلق || تنويره يستمر من تموز الى آب.

بياتها الشتوي في اوائل الربيع وتساعد بعد ظهورها باربعة أسابيع. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ١٠ مم. تتميز بفلاظة البطن وبشكله الجمولي. ثوبها الى الخضار الازرق يشوبه موج احمر.

١٠١٨٥ - دُعُشُوقِيَّات ، بَنَات العِيَد

Coccinellidae (S). Coccinellidés, Catherines, Bêtes à bon Dieu (F). Coccinellidae, Lady beetles, Lady bugs (E). Marienkäferchen, Marienkäfer (D).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة. جميعها شبه كروية السطح. جميلة الالوان الزاهية. قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة. ارساغها رباعية. مخالبها مسننة || مكنها دقيق مستطيل، تبني اللون او حنطي تمتحه الانثى عن غير قياس انما يغلب فيه التجميع || يرقاتها اهليلجية الشكل ملونة معظمها هليبي البشرة || اجناسها وانواعها باكثريتها مفترسة جزيلة النفع، وبعضها خاضل يركب النبات.

١٠١٨٦ - دُعُشُوقَة مَبْقَجَة ° Cardiophorus

biguttatus (S). Cardiophore à 2 taches (F).

Cardiophorus biguttatus (E).

حشرة خاضلة هواكة مفترسة من السالوليات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف الاحراج والادغال ولكنها لا تقترب من النباتات الراتنجية والصنوبر. خفافسها تعيش على اوراق الصيوانيات والنسرين والزعرور والسنديان. يرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار النخرة قوتها المواد النباتية المنحلة وكل ما تستطيع افتراسه من الحشرات الخاضبة || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ٩ مم. ثوبها الى الجقوة الخضارية الى السواد الاسفع يعلوها في كل غمد من غمدتها بقجة حمراء. رأسها مستعرض. الشكل. زباناها خيطيان. عيناها لوزيتان. ظهرانها اهليلجي الشكل، تساعي التخديد الغمدي القاطب. ارساغها خاسية العقل || جيلها رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملافة في ايار وتعيش حتى آب. تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة بطيئة النمو سلكية الجسم تعيش نحو اربع سنوات وتطول من ١٦ الى ٢٠ مم. ثوبها في اول عهدها الى الصفار الباهت ثم يعمق وينحرف مع تقادم العمر الى الصفرة المتايبة الموج || الطور الاكمالي الذي ينتضي في التربة يستمر نحو ٥٠ يوماً.

١٠١٨٧ - دُعُفُوص °، غَلْفُو ° Galago (S).

Galago (F). Galago (E).


الاسم العلمي «غلغو» هو الاسم الشائع في لغة السنغال. جنس حيوانات لبونة من الليموريات. انواعه المعروفة تسعة. موطنها بعض المناطق الافريقية. تألف الغابات والحراج والسباسب. ملجئها الحياتي جماعي. جماعاتها متوسطة العدد. تسرح في الليل وتبيت في النهار || اجسامها متباينة الاحجام، اكبرها بحجم السور. تتميز بأذانها الكبيرة التي تمتد وتنقلص وتنطبق على الاصداع. اذنانها مستطيلة، كثيفة الوبر الجلل || اناثها رباعية الاطباء، اثنان صدريان واثنان كاذبان. حمل الانثى نحو ١٤٠ يوماً تضع في تمامه من جروين الى ثلاثة جراء || اثنائها تختلف مع اختلاف الانواع. اوبارها لينة، ناعمة، حريرية الملمس || قوتها الثمار والحبوب والحشرات. اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية.



دعشوقة بقجة



دعفوص



دعكر



دعكر مسيك

١٠١٩٧ - دُعْلُوج بَلْقَانِي °

Symphyandra Hofmanni (S).
Symphyandre des Balkans (F).

نوع من الدعلوج . مهدد بلاد البلقان . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . افناده كثيفة الخمل ، متدلية . ازهاره عنقودي التجميع . ازهاره بيضاء اللون ، مستطيلة المصليق ، متدلية ، قطرها نحو ٤ سم . || تنويره يستمر من تموز الى تشرين الاول .

١٠١٩٨ - دُعْلُوج مُحَجَّن °

Symphyandra pendula (S).
Symphyandre pendant (F).

نوع من الدعلوج . مهدد الشرق الادنى . ساقه فرعاء تعلو من ٤٠ الى ٦٠ سم . افناده محججة ، متدلية ، خلية اللحاء . ازهاره عاجية اللون ، كبيرة القد . توريحاتها قمية الشكل || تنويرها يستمر من تموز الى آب .

١٠١٩٩ - دُعْمُوص °

Larve (F). Larva (E).
شكل انتقالي تكون فيه بعض الحيوانات كالحشرات بعد نفضها من المكينة وقبل بلوغها شكلها الكامل النهائي .

١٠٢٠٠ - دُعْمُوصِي ، يَرْقِي °

Larvaire (F).
Larval, immature (E).
نعت تعريفية يطلق ، في علم الحشرات ، على طور معين من الاطوار الحياتية ، تكون فيه الحشرة في طورها الثاني الذي يمتد من النقف الى الانسلاخ الاخير .

١٠٢٠١ - دَعْوَة °

Convocation
هي الدعوة الى الاجتماع اسبابها ومفاهيمها عديدة .
Acte subsidiaire (F). دَعْوَى إِحْتِيَاظِيَّة °
Subsidiary deed (E).
هي الدعوى التي لا يخول القانون وسيلة غيرها لحماية حق منازع فيه .

١٠٢٠٣ - دَعْوَى الْخُلُول °

Acte subrogatoire (F).
Subrogation deed (E).
هي الدعوى غير المباشرة .

١٠٢٠٤ - دَعْوِيَّة °

هي الصعوة ، اطلبها .

١٠٢٠٥ - دَعِيرَة ° ، تَرِيكُوتِسِيُوم °

Trichothecium
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . جريه الكنديية شجرية الهشة ، عديدة الفروع المتشعبة . كنانده شفافة مقوسة المكارن . مستطيلة او مردنية الشكل . ملساء السطح || انواعه قليلة اعرفها الدعيرة الوردية .

١٠٢٠٦ - دَعِيرَة وَرْدِيَّة ° ، عَقْن وَرْدِي °

Trichothecium roseum (S). Moisissure rose, Pourriture amère (F). Pink rot (E). Schalenfäule, Bitterfäule (D).

فطر مجهري عيم الانتشار يركب الثمار الناضجة والمحفظة على اختلاف اجناسها وانواعها . يعتري التفاح والاحاص والسفرجل والخوخ والمشمش والكرز والموز والبندورة . مظهره الخارجي عفن وردي اللون يركب القشور المقروحة والمخدوشة فيمطها ويعطب اللب الذي يفسده || يدارك باجتناح حفظ الثمار المقروحة او المخدوشة .

١٠٢٠٧ - دَعِيم °

Stereome (F). Stereoma (E).
الدعيم النسيج الداعم عند النبات .

١٠٢٠٨ - دَغْبِر °

هو الحرشنة الصغيرة ، اطلبها .

١٠٢٠٩ - دَغْر °

Dermatea
جنس فطور مجهرية من الزميجيات وفصيلة الحشاريات وهو من الفطور المشلاخية يتميز بسدائه الصلبة الرقعة ، القروصية او المخروطية الشكل ، العابقة اللون الحنطي . تكاثره متشابكة مع نكاته . بوغه اهليلجي او مردني الشكل وثيري الانقسام المعترض ، عديد الخلايا . انواعه عديدة اشهرها الثلاثة التالية :

١٠٢١٠ - دَغْر الْإِجَاص °

Dermatea corticola, Neofabraea corticola, Myxosporium corticolum (S).

فطر مجهري يركب لحاء الافناد والاعصان فيمطها . مظهره الخارجي يقع فسيحة منخفضة الوسط الاسمر اللون ، بارزة الاطار المهدب الاحمر . تعلو لحاء الافناد المحولة والمعمرة فتسبب جفاف القشرة وتقطع على الاوعية طريق التبادل النسفي || يصيب الاشجار الضعيفة التي عطلها الصقيع والتي تعرضت الى لفحة الشمس || يكافح اولا بقطع وحرق الاعضاء الموبوءة . ثانياً بتطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد . ثالثاً بمد الشجرة بالاسمدة الازوتية وخصبها النيترات .

١٠٢١١ - دَغْر الْخَوْخ °

Dermatea prunastri, Cenangium prunastri, Micropera spurium, Sphaeronema spurium (S).

فطر مجهري يركب افناد الخوخ فيمطها || مظهره الخارجي تصدع خيطي عرضي يحل بادمة لحاء الافناد فيسبب انمراقها وانفلاقها وجفافها || يصيب افناد الاشجار الضعيفة دون سواها . يكافح بقطع وحرق الاعضاء الموبوءة ، بتطهير الجروح بمحلول سلفات الحديد ، ومد الشجرة ببعض الاسمدة الازوتية وخصبها النيترات .

١٠٢١٢ - دَغْر الْكَرَز °

Dermatea cerasi, Micropera drupacearum (S).

فطر مجهري قليل الاذى يركب الكرز وبعض اللوزيات كالموز والمشمش والدراقن || مظهره الخارجي بشور عدسية قرحية لاقياسية الحجم ، لونها الى الخضار الزيتي ثم يتحرف نحو السمرة ، يركب لحاء الاعصان والافناد فتشوها || يكافح بالكشط والتطهير ومد الاشجار بعنصر الازوت .

١٠٢١٣ - دَغْفَل °

Eléphantéau (F).
Young elephant (E).
صغير الفيل يتبع امه .

١٠٢١٤ - دَغْل °

Hallier (F). Thicket (E).
هو السياج اليابس او السياج الذي جف .

١٠٢١٥ - دَغْل الْعَلِيْق ، هَيْشَة °


Ronceraie, Roncier (F). Brake, Brambly ground (E).
هو منبت العليق وكل ارض كثر فيها هذا النبات .

١٠٢١٦ - دَغْلَة °

Bulsson (F). Bush (E).
كل جنية او جنية فرعاء متراكبة الافناد والافنان .

١٠٢١٧ - دِغْلُوس °

Diglossa (S).
Diglosse (F). Diglossa (E).
جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة المغثريات .



دعيرة وردية



دغلوس

فيمنعها من النمو ثم يقودها الى الذبول . وهو في الجذوع يقع ثعلولية ينضج منها مادة صمغية شفافة . اما في الثمار فهو عفن زغبى اطحل اللون يعلو الاذن عند اتصالها بالشر فيؤبها بعد ان يفرضها ويوشمها ببقع سمراء ثم سوداء اللون . يكافح عند ظهوره باستعمال مزيج مركب من سائل بوردو المحلول ١٪ ومن زيت صيني محلول ١٪ .

١٠٢٢٤ - دَغِيْلَة الدَّمْدَمَة *

Diaporthe batatatis, Phomopsis batatae (S). فطر مجهرى يصيب درنات الدمدمامة (البطاطا الحلوة) في اثناء حفظها وخزنها || مظهره الخارجى بقع سمر فسيحة تمنطق الدرنه فتفرضها وتسبب التحلل لها وعفنه الناشف تشبهو كأنها محتلة خالية من الاحشاء || العلاج الوقى يقوم على حفظ الدرنات وخزنها في مكان نظيف منخفض الحرارة والرطوبة .

١٠٢٢٥ - دَغِيْلَة فَاسِدَة *

Diaporthe pernicioso, Phomopsis mali, Fusicoccum malorum (S). *Diaporthe perniciosus* (F). فطر مجهرى يصيب الاشجار المثمرة في افناده وثمارها اخصها التفاح والاجاص والخوخ والكروز والشمش والدراقن || مظهره الخارجى قروح مستديرة تصيب الافناده فتسبب يباس البشرة وانفصالها ثم جفاف اللحاء واسمراره || وهو على الثمار بقع سمر تركب الخوخ والدراقن والشمش فتفرض قشورها وتسبب جفافها وسقوطها || اما على التفاح والاجاص فهو على شكلين شكل يصيب الثمار عند انتصاف عمرها فيمنطقها بوشاح من الاوشم الفطري يقودها الى العفن . وشكل يصيب الثمار قبيل ادراكها ولا يظهر عليها الا بعد خزنها في بيئة كثرت رطوبتها وصلحت حرارتها ببلوغها حد الحيات السلبى || يكافح عند ظهوره على الاشجار باستعمال احد الفوطير الفعالة الكثيرة العدد .

١٠٢٢٦ - دَفِير Ados (F), Warm border (E).

الدف هو حرف التلم المحدث .

١٠٢٢٧ - دَفَّان Gongyle ocellé (F).

حيوان سرلود من العطاء يدعى دساسة نمرة ، اطلبها .

١٠٢٢٨ - دَفَّان * Platycephalus insidiator (S).

نوع من الراقد وهو سمكة بحرية مقلية الشكل ، متوسطة القد ، مقلطة الرأس ، كبيرة الزعانف المستطيلة المرقوشة ، مقطومة الزعنفة الشرجية . تعيش في بحار البلاد الحارة تستتب في الرمال وقد تغور فيها بكاملها دون رأسها تتربص فريستها .

١٠٢٢٩ - دَفْتَر الشُّرُوط Cahier des charges (F).

Specifications (E).

هو دفتر شروط الصفقة المطلوب انجازها يعرض للاطلاع والالتزام على كل راغب توفرت فيه العناصر اللازمة .

١٠٢٣٠ - دَفْدُوف * Heniochus (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات انواعه المعروفة قليلة جميعها صغيرة القد مستديرة الشكل ، مبططة الجسم ، زاهية الالوان الجميلة . اعطانها بحار المناطق الحارة ..

١٠٢٣١ - دَفِير الحِرَاج Puant de la forêt (F).

حيوان لبون ادره مشهور باسم تمندهو ، اطلبه .

انواعه المعروفة عشرة جميعها من طيور امريكا الجنوبية . تألف الغابات والاحراج والحدائق . ملجئها الحياتى زوجي . قوتها رحيق الازهار والحشرات المختلفة اخصها الفراش || اجسامها هيفاء تعلو من ٢١ الى ٢٤ سم . اناها تختلف مع الانواع يكثر فيها الاسود والشقعة السمراء والتبقيج والتجذيع بالابيض . اجنحتها معتدلة الطول ، ذلقسة الاطراف . اذناها ضيقة مستطيلة || تدن اعشاشها في الاشجار الرقيقة عند اطراف الاغصان . اناها تحضن بمنوبة الذكور من ٣ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول .

١٠٢١٨ - دُغْمُور Laccolite, Laccolithe (F). Laccolite (E).

كل كتلة صخر ثوار ، طافحة ، نائفة ، دخيلة بين طبقات الصخور الرسوبية تدعى دغموراً ج دغامر .

١٠٢١٩ - دَغْنَش Pyrrhula (S).

Bouvreuil (F). Bullfinch (E).

جنس عصافير من فصيلة الشرشوريات انواعه ٧ منها واحد امريكى وآخر افريقى وخسة اسيوية اربية . جميعها زاهية الالوان المتداخلة . مناقيرها قصيرة محدبة . اجنحتها مسترصة الشكل ، ذلقة الاطراف . اذناها متوسطة الطول . ارساغها قصيرة ومخالبها ايضاً . منها القواطع والاوايد . تألف الاحراج والحدائق . قوتها الحشرات والديدان والدعاميص والنمل وبعض الثمار العنية البرية . تدن في الاشجار الباسقة الكثيفة الافنان . اناها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو اسبوعين . اعرف انواعه واشهرها الدغناش المبدول .

١٠٢٢٠ - دَغْنَش مَبْدُول * Pyrrhula vulgaris (S).

Bouvreuil commun (F). Common bullfinch (E).

Gimpel, Dompfall (D).

نوع من الدغناش . طوله يراوح بين ١٥ و ١٧ سم . رأسه ومحسره وجناحه وذنبه الى السواد القاتم يعلوه موج بنفسجي . ظهره رمادي اللون ازرق الموج . صدره وبطنه الى الجؤوة الزاهية . افيكه ابيض || يألف القفص ويسافد بعض عصافير فصيلته اخصها النعار والنغر .

١٠٢٢١ - دَغِيْلَة Diaporthe

جنس فطور مجهرية من الذعلليات . تتميز بونيستها الضخمة التي تحضن بعض الاعسان الغليظة المستطيلة المتعرجة . بونها ثنائى الخلية شففى الوثيرة || اشهر انواعه الاربعة التالية .


١٠٢٢٢ - دَغِيْلَة التَّيْن * Diaporthe cinerascens, Phomopsis cinerascens, Phoma cinerascens (S).

Chancre du tronc du figuier (F). فطر مجهرى يصيب التين في جذوعه واغصانه . مظهره الخارجى بقع قرحية تبدو مستطيلة ثم تميل الى الاستدارة تصيب السوق والاغصان الجروحة فتعطب القشور واللحاء وقد تعلق الساق فتسبب يباسها || يكافح بتنظيف الساق والاغصان من البقع القرحية ثم تطهير الجروح ومرحها بالمستيك .


١٠٢٢٣ - دَغِيْلَة الحَمْضِيَّات * Diaporthe citri, Phomopsis citri (S).

Mélanose des citrus (F).


فطر مجهرى يصيب الحمضيات واخصها الليمون الحامض والخلو واليوسنى || مظهره الخارجى تجمعن يحل بالافنان




دغناش مبدول




دغيلة التين



دغيلة الحمضيات




دغيلة الدمدمامة



دغيلة فاسدة



دغان



دغدوف



دفلج

Diffuge (F).

١٠٢٤٣ - دِفْلُوج *٥

جنس حويئات مجهرية مائية من المنخربات وفصيلة الدفلوجيات . انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها بحري المسكن وبعضها يعيش في المياه العذبة || جسده اسطواني الشكل تغلفه صدفه شبه القارورة كيتينية او شيتينية المادة تعلوها بعض الاجسام الغريبة اللاصقة بها . فوهة القارورة ضيقة العنق تخرج منها خمسة ملاس خيطية الشكل مبطة يستعملها الدفلوج لتلمس الاشياء وللاعتداء .

Diffugiidae (S).

١٠٢٤٤ - دِفْلُوجِيَّات ٥

Diffugiidés (F). Diffugiidae (E).

فصيلة حويئات مجهرية مائية من الاوالي الجذريات المنخربات الغضاضات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها بحري يعيش في المواقع المستكنة وبعضها يعيش في المياه العذبة اغصها البحيرات || اعرف انواعها واشهرها الدفلوج .

Nerium (S).

١٠٢٤٥ - دِفْلِيّ، سَمِ الحمار

Laurier-rose (F).

جنس جنبات برية وزينية معمرة من فصيلة الدفليات . انواعه عديدة . سوقها فرعاء . اوراقها عروية متقابلة او ضمية التجميع ، مستطيلة النصل . ازهارها كبيرة القد ، بحيلة الشكل || ترغب في الارربة الرطبة القليلة الاندماج . اشهر انواعه ما يتبع .

١٠٢٤٦ - دِفْلِيّ عَطِرَة ، حَبْنِ هِنْدِي

Nerium odorum (S). Laurier-rose d'Inde (F).

نوع من الدفلي عديد الضروب . مهده بلاد الهند . يعلو من مترين الى ستة امتار . ساقه فرعاء . اوراقه ضمية ثلاثية او رباعية التجميع . نصلها جامد النسيج بحري الخضار . ازهاره عطرة ، عادية او مكبسة منها البيض والاحمر والصففر والارجوانية والموشحة || يرغب في المواقع الجنوية الحارة وفي الارربة الحفيفة الرطبة || ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

١٠٢٤٧ - دِفْلِيّ مَبْدُولَة *، حَبْنِ ، حَبِين

Nerium oleander (S). Laurier rose d'Europe, Oléandre (F). Oleander, Rose-bay, South sea rose (E). Echter oleander, Lorbeerrosen (D). Oleandro, Oleandrio, Lauro roseo, Nerio comune (I).

نوع من الدفلي عديد الضروب موطنه حوض البحر المتوسط . يعلو من مترين الى اربعة . ساقه فرعاء . اوراقه ثنائية او ثلاثية التجميع تطول من ٦ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٢ . نصلها جامد النسيج اطحل الخضار . ازهاره عديدة الالوان تختلف باختلاف الضروب . فيها الابيض والاحمر والوردي ومنها العادية والمكبسة . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

Apocynaceae (S).

١٠٢٤٨ - دِفْلِيَّات

Apocynacées (F). Apocynaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين . اجناسها وانواعها عديدة تجمعها ثلاثة اسباط : العرييات والابوسينات وعود الحيات نباتاتها مختلفة الاشكال والاحجام منها الاشجار والشجيرات والجنابات والاعشاب . معظمها بري وبعضها طبي او زيني . اوراقها لاقياسية الارتكاز فيها المتقابلة والمتعاقبة والضمية . ازهارها عشكولي . ازهارها خماسية التركيب . طلعا منظور الجذرة . ثمارها قرون مزدوجة كثيرة البزور .

Scoparia (S).

١٠٢٣٢ - دَفْرَاء ، دَقَر

جنس نباتات عشبية وجنبية من فصيلة الحنازيريات . انواعها المعروفة خمسة منها الحولية والمعمرة . جميعها فرعاء متشعبة . اعطائها البلاد الحارة . اوراقها كاملة متقابلة او ضمية . ازهارها صغيرة القد ، فردية او ثنائية التجميع ، ابطية او محورية الارتكاز يكثر فيها الابيض والازرق والاصفر . تتكاثر بالبزور وترغب في الارربة الدبالية . اشهر انواعها الدفراء الحلوة .

Scoparia dulcis (S).

١٠٢٣٣ - دَفْرَاء حُلْوَة

Scopaire doux (F). Sweet broom weed (E). Süßes besenkrout (D). Scopa dolce (I).

نوع من الدفراء وهي بحلة عذبة تملو من ٤٠ الى ١٠٠ سم . ساقها منتصبه كثيفة الفروع . اوراقها ضمية ثلاثية الانتشاب . نصلها اهليلجي الشكل ، سنن الحافة ، يطول من ٢ الى ٤ سم . ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، مستطيلة المعاليق الدقيقة . ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول . يقال ان نقيع ازهارها يدر البول .

١٠٢٣٤ - دَفْرَان هو العرعر النووي ، اطلبه .

١٠٢٣٥ - دَقَرِيَّات ٥، أَذْيَنِيَّات

Auriculariaceae (S). Auriculariacées (F).

Auriculariaceae (E).

فصيلة فطور من رتبة الدعاميات عديدة الاجناس والانواع المختلفة الاشكال والاحجام . تتميز بدعاماتها الاسطوانية المستقيمة وبذمائها الرمية المستديرة || من فطورها جنس واحد يدعى الزقية يتطفل على النباتات الزراعية فيؤذيها .

Répulsion (F). Repulsion (E).

١٠٢٣٦ - دَفْع

حصيلة القوى المعرضة الساعية لانفصال جرمين عن بعضهما .

Alibi

١٠٢٣٧ - دَفْع بِالْغَيْبَةِ

هو دفع التهمة بالثبات وجود المتهم ساعة حدوث الجريمة في مكان ما غير الذي ارتكبت فيه .

١٠٢٣٨ - دَفْع بَعْدَمِ الاختصاص

Déclinatoire (F). Taking exception (E).

هو احد وجوه الدفع التي يثيرها المدعى عليه ليحيل الدعوى الى محكمة غير التي طرحت عليها .

١٠٢٣٩ - دَفْع تَسْوِيْفِي

Exception dilatoire (F). Dilatory exception (E).

هو الدفع المقصود به كسب الوقت والمماطلة .

١٠٢٤٠ - دَفْع قَطْعِي

Exception péremptoire (F). Peremptory exception (E).

هو الدفع الذي لا يقبل جدلا .

١٠٢٤١ - دَقْعَة عَلَى الحساب

Acompte (F). Partial payment (E).

هو ان يدفع المدين جزءا مما عليه الى دائته محتسبا من الاصل .

١٠٢٤٢ - دَفْعِيَّة

Cinétique (F). Kinetics (E).

الدفعية علم يبحث في الحركة .



دفل مبذولة

نصلها مالمس البشرة بحيل الخضار العابق. ازهارها ضمية التجميع لونها الى البياض تعلو مشحة بنفسجية. عرفها فواح الرائحة المستحبة || ازهارها ربيعي .

١٠٢٥٧ - دَقْنَة عُرْدُ الْغَسَار *

Daphne laureola (S). *Daphné lauréole*, *Laurier des bois* (F). *Dwarf bay*, *Spurge laurel* (E). *Lorbeerseidelbast*, *Immergrüner seidelbast* (D). *Laureola comune*, *L. maschio*, *Caccabasso* (I).

نوع من الدفنة التزيينية والطبية. تعلو من ٥٠ سم الى ١٢٠ سم. فروعها منبسطة متدلية. اوراقها جلدية، جامدة، عروية. ازهارها صغيرة القد، عنقودية التجميع، فسقية اللون، لا عرف لها.

١٠٢٥٨ - دَقْنَة قَاتِلَة *Daphné tartonraire* (F). نوع من الدفنة يعرف بالكرد، اطلبه .

Daphne cannabina (S). *Daphné de Ceylan*, *Lauréole chanvreux* (F). *Indian paper tree* (E). *Hanfseidelbast* (D). *Dafne del Ceylan* (I).

نوع من الدفنة الزراعية الصناعية. تعلو من ٨٠ الى ١٥٠ سم. فروعها عديدة منتصبه. اوراقها مستطيلة ضيقة، نصلها عابق الخضار. ازهارها عنقودية، صغيرة الحجم، هامة الارتكاز، فسقية اللون. لحاء فروعها تستعمل في عدة صناعات اخصها صناعة القبعات.

١٠٢٦٠ - دَقْنَة لَاحِفَة *Daphné gnidium* (F). هو المثنان، اطلبه . *Spurge flax* (E).

Daphne genkwa (S). *Daphné genkwa* (F). نوع من الدفنة التزيينية مهدا اليابان. تعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها متقابلة، عابطة، اهليلجية، نصلها خلي الصفحة السفلى. ازهارها ليلكية عطرية. ازهارها يستمر من نيسان الى آب.

Dracaena (S). *Dracène* (F). *Dracaena* (E). جنس حيوانات زحافة قازبة من المظاء وفصيلة التيديات. انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها حوض الامازون. قوتها الاعشاب والحشرات والديدان والبلاغيط... || اجسامها كبيرة القد تطول من ٧٥ الى ٨٥ سم. اذناها مستطيلة، دقيقة الاطراف. اثوابها متباينة الالوان يكثر فيها الاخضر الاصفر الموج.

١٠٢٦٣ - دَقْنَة ه *Exotisme* (F). *Exotism* (E). طابع ما هو حاكل او دافه .

Davillea (S). *Davillea* (F). *Davillea* (E). جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الدلانيات. انواعه المعروفة ١٢ منبتها البرازيل || سوقها سرعية او ملتفة. اوراقها متعاقبة، معنقة، ساخدة، نصالها جامدة، شبه بيضية الشوزن. ازهارها طرفي الارتكاز او محوري، عنقودي التجميع. ازهارها صفراء اللون، عطرية العرف المستحب.

١٠٢٤٩ - دَقْن *Enfouissement* (F). *Burying* (E). هو طمر الشيء الذي وضع في التربة كالبذار والاسمدة.

١٠٢٥٠ - دَقْنَائِيَّات *Daphniphyllaceae* (S). *Daphniphyllacées* (F). *Daphniphyllaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القعالات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، اعطائها المناطق الاستوائية من العالمين القديم والجديد || جميع نباتاتها اشجار حرجية متفاوتة الارتفاع والدوحة. اوراقها لاقياسية التشكيل، منها البسيطة والمركبة. ازهارها ابوية الارتكاز، منها الخشوية ومنها الثنائية المسكن. ثمارها لحمية لا تؤكل وبعضها جعالي المادة الشديدة الاذى.

١٠٢٥١ - دَقْنَة *Daphne* (S). *Daphné* (F). *Daphne* (E). جنس نباتات معمرة برية وتزيينية من فصيلة المازريونيات انواعه المعروفة نحو ٣٠ جميعها جنبات صغيرة ومتوسطة القد. اوراقها لاقياسية الارتكاز. نصلها جلدي مستطيل. ازهارها مختلفة الالوان توججها انبوبية الشكل، رباعية التخصيص الطرقي. اسديتها ثمانية || قشورها واوراقها وازهارها حاملة الطعم خطرة تحوي بعض المواد السامة. معظمها من النباتات الجصاصية التي تألف الاتربة الكلسية. اعرفها واشهرها ما يلي.

١٠٢٥٢ - دَقْنَة أَلْبِيَّة ، مَازَرِيُون جَبَلِي *Daphne alpina* (S). *Daphné alpestre* (F). *Alpine daphne*, *Alpine chamelea* (E). *Alpen seidelbast*, *Weisser seidelbast* (D). *Daphne collina*, *Olivella alpina* (I). نوع من الدفنة الطبية والتزيينية تعلو نحو ٥٠ سم. فروعها معقدة معوجة. اوراقها لاطئة شبه ضمية. نصلها ازغب البشرة على صفحتيه يطول نحو ٣ سم. ويعرض نحو ١. ازهارها نورية التجميع، عطرية العرف، يبيض || يستخرج منها مادة فعالة تدعى دفتين.

١٠٢٥٣ - دَقْنَة زَيْتُونِيَّة * ، زَيْتُون الْبَر *Daphne Oleoides* (S). *Daphné-olivier* (F). نوع من الدفنة البرية والتزيينية صغيرة القد تعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم. ساقها فروع. فروعها منتصبه زباء اللحاء. اوراقها تشبه ورق الزيتون، نصلها خلي البشرة. ازهارها يبيض يعلوها قوشيح جزوي ومواج اخضر || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٠٢٥٤ - دَقْنَة سَامَة *Daphné mézéréon* (F). اطلب مازريون. *Dwarf laurel* (E).

١٠٢٥٥ - دَقْنَة صَغِيرَة * ، مَازَرِيُون مُكَبَّس *Daphne cneorum*, *Thymelaea cneorum* (S). *Daphné camélee*, *Petite thymelée* (F). *Garland flower* (E). *Rosmarinseidelbast* (D). *Cneoro*, *Timelea odorosa*, *Laureola odorosa* (I).

نوع من الدفنة التزيينية تعلو نحو ٤٠ سم. فروعها زباء اللحاء. اوراقها جلدية النصل، زاهية الخضار. ازهارها هامة الارتكاز، عطرية العرف، يبيضاء اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى آب.

١٠٢٥٦ - دَقْنَة عَطِرَة *Daphne odora* (S). *Daphné odorant* (F). نوع من الدفنة مهدا الشرق. اوراقها مستطيلة ذلقة،



دفنة زيتونية



دفنة صغيرة




دفنة عود النار



دليل



دَفِيلَة




دَفِيلَة



دَقَام قَرْمَزِي



دَقْتَمُون اَبِيض



دَقْرَان

الشمالية . يألف الغابات وضيافات البحيرات ومجاري الماء .
ملجته الحياتي جماعي . فوجه يعد من ١٠ الى ٢٠ زوجاً ||
جسمه صغير القند يتطول نحو ١٢ سم . ثوبه عديد الالوان ،
رأسه اصفر . محسراه وقذاله ورداؤه وذنبه الى السواد
الجذوي الموج . جناحاه الى الجؤرة ، لواحف الجناح
، رقوشة بالحنطي . زوره وصدره وبعطنه الى الحمرية القرمزية .
فخذه وزمكاه الى الحنطي . متقاربه شديد السمرة . حدقة
عينه كستنية اللون . رسفاه الى الطحلة || قوته الحشرات
والاساريع والديدان والبزور البرية || يدثن عشه في
الادغال . الانثى تضع من ٢ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها
نحو ١٣ يوماً بينما الذكر يؤمن لها الغذاء .

Dictamnus (S).

١٠٢٧٤ - دَقْتَمُون

Fraxinelle (F). Fraxinella (E).

جنس نباتات عشبية طبية معمرة من فصيلة السدابيات
اوراقها مركبة متقابلة . وريقاتها بيضيه براوح عددها
من ٧ الى ١١ . ازهارها عطرية الرائحة سنبلية التجميع
مترابكة الالوان || انواعه قليلة العدد اعرفها الدقتمون
الابيض .

١١٠٢٧٥ - دَقْتَمُون اَبِيض * ، دُرَيْدَار اَبِيض

Dictamnus alba (S). Fraxinelle blanche (F). White
fraxinella, Candle plant, Gasplant (E). Echter dip-
tam, Weisser diptam (D). Dittamno bianco, Frax-
sinello (I).

نوع من الدقتمون المعطري الطلي والتزييني يعلو من ٩٠
الى ١٢٠ سم . اوراقه مركبة تطول نحو ٢٠ سم . وريقاتها
بيضية طولها براوح من ٤ الى ٦ سم . نصلها باهت الخضار
سنة الحافة . ازهاره سنبلية لونها الى الابيض المصلم
بالارجواني . جذوره نافعة مقوية . وهو نبات طوعي
في لبنان يوجد في غابات الجبل الاقارع || ازهاره
يستمر من ايار الى تموز .

١٠٢٧٦ - دَقْر الدقر: الروضة الحسناء العميمة النبات .

١٠٢٧٧ - دَقْرَان * Treillis (F). Trellis (E).

وشية من خشب ار حديد ناطبة العوارض .

١٠٢٧٨ - دُقْسَة هي الاليز ، اطلها .

١٠٢٧٩ - دُقْسَة البَقُول Altise potagère (F).

راجع التيز البقول .

١٠٢٨٠ - دُقْسَة التَبغ Altise du tabac (F).

راجع التيز التبغ .

١٠٢٨١ - دُقْسَة الزَّرْع Altise des céréales (F).

راجع التيز الزرع .

١٠٢٨٢ - دُقْسَة الكَرْمَة Altise de la vigne (F).

راجع التيز الكرمة .

١٠٢٨٣ - دُقْسَة زَرْقَاء Altise bleue (F).

راجع التيز زرقاء .

١٠٢٨٤ - دُقْسَة Bestiole (F). Little animal (E).

كل دويبة رقطاء رقطاء صغيرة القند اصغر من العظاءة .

Dafila (S).

١٠٢٦٥ - دَفِيلَة *

Pilet (F). Pintail (E).

جنس طير من البطيات . انواعها ثلاثة جميعها من القواطع .
اجسامها كبيرة تطول من ٦٠ الى ٦٥ سم . تتميز باثوابها
المبقعة المترابكة الالوان وبمناقيدها المنقاشية الاطراف
وباذنابها المخروطية المستطيلة . مناقشها صغيرة متباعدة .
اجنحتها مستطيلة ذلقة || الانثى اصغر قدماً من الذكر
واهت ثوباً منه . قوتها الاعشاب وجميع الدويبات المائية .
تألف الدجن اذا اخذت صغيرة وتتصالب مع البط ||
تدثن اعشاشها في العشب على ضفاف مجاري الماء . الاناث
تبيض وتحضن من ١٠ الى ١٢ بيضة || تعيش جماعات
متفاوتة العدد . سرها يراوح من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً ||
تعتبر من الطرائد المستحبة . لحمها جيد الصنف مرغوب
فيه .

اما انواعها الثلاثة فهي :

Dafila oxyura (S).

١٠٢٦٦ - دَفِيلَة الشَّيْلِي *

Pilet de Chili (F).

Dafila bahamensis (S).

١٠٢٦٧ - دَفِيلَة بَهَامَا *

Pilet de Bahama (F).

١٠٢٦٨ - دَفِيلَة مُسْتَطِيلَة اللَّتَب *

Dafila acuta (S). Pilet acuticaude (F).

Couche (F). Hotbed (E).

١٠٢٦٩ - دَفِيْشَة *

هي الجهاز المد للحصول على زراعات باكورية بواسطة
الحرارة المصطنعة . والدفيشة قد تكون على ثلاثة اشكال :

Couche chaude (F). Warm hotbed (E).

دَفِيْشَة حَارَة

Couche tiède (F). Tepid hotbed (E).

دَفِيْشَة فَاتِرَة

Couche sourde (F). Dead hotbed (E).

دَفِيْشَة ضَعِيْفَة

Forcerie (F).

١٠٢٧٠ - دَفِيْشَة البَوَاكِيْر ، بَكَارَة

Forcing-house (E).

هي البَكَارَة . بناء زجاجي او نصف زجاجي يستعمل

لزراعة البواكير .

Grapperie (F).

١٠٢٧١ - دَفِيْشَة العِنَب ، مِعْنَبَة

Vinery (E).

دَفِيْشَة خاصة بالكرومة تستعمل لانتاج العنب من اواسط

فصل الشتاء الى اواسط فصل الربيع .

Laniarius (S). Gonolek (F).

١٠٢٧٢ - دَقَام *

جنس طير من فصيلة السرديات . انواعه المعروفة نحو ٤٠

موطنها يمتد من افريقية الشرقية الى الشمالية والجنوبية .

تألف الغابات وضيافات مجاري الماء والادغال . ملجتها

الحياتي جماعي . جماعاتها متفاوتة العدد الذي يراوح من

اربعة ازواج الى مئة زوج واكثر || اجسامها ربعة

صغيرة القند تطول من ١٠ الى ١٤ سم . اثوابها متداخلة

الالوان الزاهرة . تتميز بقصر اجنحتها وباستطالة اذنانها

المستديرة الاطراف || قوتها الحشرات والاساريع والديدان

وبعض البزور البرية || اعرف انواعه واشهرها الدقام

القرمزي .

١٠٢٧٣ - دَقَام قَرْمَزِي *

Laniarius barbarus (S).

Gonolek écarlate, G. de Barbarie (F).

طائر من الدقام . موطنه يمتد من افريقية الشرقية الى

أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أعطائها بعض اقاليم امريكة الجنوبية || اجسامها صغيرة تطول من ١٥ الى ١٨ سم. اثنائها جميلة الالوان الزاهية ، فيها الاحمر والاخضر والازرق والاصفر || ملجتها الحياتي جماعي . جماعاتها لا تتجاوز ٣٠ زوجاً || قوتها الحشرات والديدان والثمار اليابسة .

١٠٢٩٢ - دُقَيْش *
Tanysiptera (S).
Tanysiptère, Halcyon de paradis (F).
جنس طير من المازوريات . انواعه قليلة العدد . اجسامها متوسطة القد . اثنائها متراكبة الالوان . رؤوسها واجنحتها الى الزرقة الزاهية . محاسرها وظهورها وجوانب اعناقها سود . صدورها وبطنها الى الصبغة الورداء . افانيكها وثنيج ظهورها بيض . وهي تألف الاحراج والغابات . قوتها الحشرات (راجع مازوريات) .

١٠٢٩٣ - دُقَيْق ، طَحِين *
Farine (F). Flour (E).
مسحوق ناعم يحصل من طحن حبوب القمح والذرة والشعير . الخ ... وهو يستعمل بعد اصلطاعه طعاماً للانسان والحيوان .

١٠٢٩٤ - دُقَيْلَة *
Doassansia
جنس فطور مجهرية من فصيلة النخريات يلاكب بعض النباتات البرية من مختلف الفصائل || يصيب النسيج النباتية في الميزوفيل حيث ينمو ويشكأ فيسبب انفجار بشرة النصل وظهور بؤغه الفحشي الهباني || ذميخته البوشية مغلقة بغشاء دقيق تكسوه البويضات العاقرة .

١٠٢٩٥ - دُكَاع *
داء يأخذ الخيل والابل في صدورهما . فالمصاب به مدكوع .

١٠٢٩٦ - دُكُوتَة *
Dictyota (S).
Dictyote (F). Dictyota (E).
نبات بحري من الخفيات البسر . اعطانه بحار البلاد المعتدلة الحرارة || كلاليتها قصيرة . ساقها فرقة متوالية الانشعاب .

١٠٢٩٧ - دُكُتِيل *
Dactylis (S).
Dactyle (F). Dactylis (E).
جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات . انواعه المعروفة ٣٠ معظمها علني ترعاه الماشية . اشهر انواعه واعمها الدكيتيل المكبب .

١٠٢٩٨ - دُكُتِيل مُكَبِّب * ، تَيْل عمران
Dactylis glomerata (S). Dactyle pelotonné, Herbe des vergers (F). Cock's-foot, Orchard grass, Hard grass (E). Gemeines knänelgras (D). Dattilo aggomitolato, Erba mazzolina (I).

سماء الامير مصطفى الشهابي «اصبغة مجتمعة» || نبات عشبي بري كلاتي معمر من فصيلة النجيليات يعلو من ٤٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه كثيفة التجميع ضمية لونها الى الاخضر العابق الازرق الموج . نصلها مستطيل الشكل جامد النسيج ، اصفر الختار || سنبله كباب مستطيلة لينة || وهو من النباتات المبذولة التي تكثر في الجنائن والحدائق وقد يزرع كنبات كلاتي وعلني كما يصلح للخاضير والغضاري .

١٠٢٨٥ - دُقل *
Ducula (S).
Ducule (F). Ducula (E).
الواحدة دقلة . جنس طير من فصيلة الحماميات . انواعه المعروفة نحو عشرة . اعطائها بعض مناطق الشرق الاقصى . تألف البراري والاكمام . ملجتها الحياتي جماعي . جماعاتها قليلة العدد الذي يراوح من ٥ الى ٢٠ زوجاً . قوتها البزور والحبوب والحشرات || اجسامها متوسطة القد تطول من ٢٥ الى ٣٢ سم . اثنائها سوية الالوان . رؤوسها وظهورها واجنحتها واذناتها اعبق من صدورها وبطنها . الالوان السائدة هي الشقحة السمراء والطحلة الزرقاء الموج . عيونها مكحلة بالاسود . اجنحتها معتدلة الحجم ذلقة الاطراف . اذناها كبيرة مستديرة الاطراف || تدثن اعشاشها في الاشجار الداسية . الاناث تحضن من ٣ الى ٤ بيضات على ثلاث او اربع مرات في الحول بينها الذكور تؤمن لها الغذاء .

١٠٢٨٦ - دُقْبَارَة *
Decumaria (S). Décumaire (F).
جنس نباتات جنبيه معمرة متسلقة من فصيلة السفريات . انواعها المعروفة ثلاثة منبتها بعض اصقاع امريكة الشمالية . زراعتها التزيينية شائعة في حدائق البلاد المعتدلة الحرارة . مرقها سريعة ، متسلقة ، فراء . اوراقها متعاقبة ، صغيرة التصال المتسامكة الحملية البشرة . ازهارها فردية ، محورية ، بيضاء اللون ، عطرية العرف .

١٠٢٨٧ - دُقَمَاق ، دُقَمَاقَة *
Bagrus docmac
سمكة نهريه من فصيلة السلوريات تكثر في الفرات وتوجد في النيل والنيجر .

١٠٢٨٨ - دُقَنَاش *
هو الصرد الوردى ، اطلبه .

١٠٢٨٩ - دُقَنِيد *
Dacne (S).
Dacné (F). Dacne (E).
جنس حشرات من فصيلة الدقنيدات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعها المعروفة ١٢ منتشرة في بعض مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، اهليلجية الشكل ، تطول نحو ٦ مم . رؤوسها مستعرضة ، صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف . كواسلها كبيرة محدبة . اغمادها لاحفة ، مخددة . قوائمها صغيرة . اثنائها ثنائية اللون || تعيش مع يرقاتها على الفطور وعلى النباتات الخفية الزهر .

١٠٢٩٠ - دُقَنِيدِيَّات *
Dacnidae (S).
Dacnides (F). Dacnidae (E).
فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد ، اعطائها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل او اهليلجية ، تطول من ٢ الى ٧ مم . رؤوسها صغيرة . عيونها بارزة . تأثيرها ولامسها نظامية . قرونها الاستشعارية دبوسية الاطراف ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها كبيرة ، محدبة . اغمادها لاحفة . قوائمها نشيطة . ارساغها خاسية العقل . اثنائها ملونة || تعيش على الفطور وعلى مختلف النباتات الخفية الزهر || اشهر اجناسها الدقيد .

١٠٢٩١ - دُقَنِيس *
Dacnis (S).
Dachis (F). Dacnis (E).
جنس طير من الجوائم سنيات المناقير وفصيلة المغنريات .



دقل



دقيد



دقيس



دقش



دقيلة



دكوتة



دكيتيل مكبب

الغذاء والحماية || يألف القفص ويقلد الاصوات والنهات التي يسمها .

١٠٣٠٥ - دَكْرُورِيَّات ٥
Dicruridae (S). Dicruridés (F). Dicruridae (E).

فصيلة طير من الجواثم سنيات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة اعطائها المناطق الحارة من العالم القديم || اجسامها متوسطة القد . اثنائها متباينة الالوان يغلب فيها الاسود الاسفع الموج . بعض انواعها متوج الرأس ، كثيف السبال . اذناها فارقة مؤلفة من اثني عشرة رقعة . اشهر اجناسها الدكروور والصلب والكسطان .

١٠٣٠٦ - دَكْرِيد
Dacryde (F).

الدكريد نبات شجري طقسوبي دائم الخضار يدعى دماة اطلبها .

١٠٣٠٧ - دَكْرِيزَة الْقُرَاص ٥

Diocrisia urticae (S). Diocrise des orties (F).
Diocrisia urticae (E).

حشرة من فصيلة الحرمديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية واخصها القراص || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ مم . بسطتها نحو ٤٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان ، زباناها حساسيا الشكل ، مشطيا التركيب . جوشنها حنطي اللون اصفر الموج . بطنها بني اللون تملوه ثلاثة صفوف من النقط الكستنية || رواشن الذكر الى البياض التني يعلوه في الزوج الامامي ثلاث نقط كستنية . رواشن الانثى الى البياض التني يعلوه مشحة سمراء || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتج الممكن ميعاديا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || المرفة عند الادراك التام تطول نحو ٢٤ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسمر اللون ، اطحل الموج ، تملوه مجموعات من اللمب الدقيق الاشقر تكتنف كامل الجسم باستثناء الرأس والشرح . رأسها اسود اللون . مدنها ودواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينقضي داخل صليجة .

١٠٣٠٨ - دَكْرِيزَة صَفْرَاء ٥

Diocrisia lutea (S). Diocrise jaune (F).
Diocrisia lutea (E).

حشرة من فصيلة الحرمديات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة قوتها اوراق النباتات البرية || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٤ مم . بسطتها تراوح من ٢٨ الى ٤٠ مم . رأسها معتدل الجرم عينها كبيرتان . زباناها مشطيان مستطيلان . جوشنها كثيف الخمل اصفر اللون . بطنها بني اللون . اصفر الموج تملوه ثلاثة صفوف من النقط الكستنية المستطيلة || رواشن الذكر الى الصفار التني يعلوه في الزوج الامامي موج اشقر وتنقيط كستني ويعلوه في الزوج الخلفي مشحة شقراء وخمس نقط كستنية . رواشن الانثى ابهر خضابا والزوج الامامي يعلوه تسع نقط بدلا من ١٥ عند الذكر . اما الزوج الخلفي فمادم النقط || لها جيل واحد في الحول .

١٠٢٩٩ - دِكْتِينَة ثَوِيَّة ٥
Dictyna civica (S). Dictyne civique (F).

دويبة من العناكب وفصيلة الدكتينيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٣ مم . سدراسها مبسط الجرم ، مخروطي الشوزن ، اسمر اللون . عينها زئمتان . شيسفاها دقيقان . جرامزها مستطيلة ، كثيفة اللمب . بطنها بيضي الشكل ، اطحل اللون ، تملوه زركشة سوداء تشبه الصليب || تألف جميع الاماكن . شعها قمعي الشكل ، متهدل الحبك ، منفرج النواطب ، يتوسطه أنبوب متين || قوتها الحشرات الصغيرة اخصها الذباب والهوم . بياتها الشتوي يستمر نحو خمسة اشهر ينقضي ضمن صليجة صغيرة تنسجها بين الحجارة التي لا يغمرها الماء || ملجئها التناسل لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب || تعتبر من الدويبات اللامؤذية النافعة .

١٠٣٠٠ - دِكْتِينِيَّات ٥

Dictynidae (S). Dictynidés (F). Dictynidae (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في جميع بلاد العالم || جميعها مفترة ، صغيرة القد ، ثنائية الروايا ، سداسية المشاقن ، مجهزة الشيايف بمخاف محججة نحو الداخل || اثنائها متباينة الالوان والزركشة . شعها متهدل الحبك ، منفرجة النواطب تقيمها على مختلف النباتات وبين الصخور وفي كل مكان تتوقع فيه كثرة الصيد . اشهر انواعها الدكتينة .

١٠٣٠١ - دِكْرَان ٥

دِكْرَان ٥
Placosphaeria (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . بكنيداتها كثيرة العدد تحضنها ونيمة لبدة سمراء اللون تتمركز في الميزوفيل . شقيراتها خيطية ، بويضاتها مستطيلة . انواعها عديدة تعيش على الخشب واللحاء وبعضها يتطفل على الاوراق فيوشها ببقع سود قليا تكون سيئة المواقب .

١٠٣٠٣ - دَكْرُور ٥

Dicrurus (S). Drongo (F). Drongo (E).

جنس طير من الجواثم سنيات المناقير وفصيلة الدكرووريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ موطنها بعض المناطق الاسيوية اخصها مناطق الجنوب الشرقي . ملجئها الحياتي زوجي . مسرحها الحراج . قوتها الحشرات والديدان . تألف حياة الاسر وتقلد الاصوات التي تسمعها || اجسامها تطول من ٢٠ الى ٣٨ سم . اثنائها سوداء اللون ، زرقاء الموج او خضراء . مناقيدها صليعة ، حادة الاطراف . اذناها فارقة . اشهر انواعه الدكروور المخداف .


١٠٣٠٤ - دَكْرُور مِخْدَاف ٥

Dicrurus remifer (S). Drongo à rames (F).

نوع من الدكروور . موطنه جزيرة جاوا . طوله نحو ٢٨ سم . رقعا ذنبه الخارجيتان مستطيلتان قلتيان ينصلين ، شبه المخداف ، طولها نحو ٢٠ سم . ثوبه الى السواد العابق يعلوه موج ازرق . رأسه صغير القزعة || قوته الحشرات والزبابير والنحل || يدثن عشه على اغصان الاشجار الفارشة . الانثى تحضن من ٢ الى ٤ بيضات بينها الذكر يؤمن لها



دكتينة ثوية



دكرانية



دكروور مخداف



دكريزة القراص



دكريزة صفراء

١٠٣١٦ - دُكَيْنَاء سَمَرَاء الْبَطْن *٥

Dipœna melanogaster (S). *Dipœne mélanogaster* (F). *Dipœna melanogaster* (E).

نوع من الدكيناء وفصيلة الشبازيات . جسمها صغير القد يطول نحو ٧ مم . عند العنكب ونحو ١٢ مم . عند العنكبة . صدراسها مزواني الشوزن ، اسود اللون تتوسطه بقعة دائرية بيضاء تعلوها نقطة سوداء . عيناها زُميتان . شيفافها صغيران ذريان . فكاهما دقيقتان يحلان في طرف كل منهما كتلة صغيرة لوزية الشكل ، مبعثرة الحلب . جرامزها قوية مستدقة . بطنها بيضي الشكل ، حطلي اللون ، اسمر المولج ، تعلوه عشر نقط بيض || تألف البراري وغابات الصنوبر والشربين . شعثها لا قياسي الشكل والرحابة ، كثير الشراك اللامتساوية تلتسج بين الاغصان والافئاد والافئان || قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والهوم . تعتبر من الدوبيات المفيدة اللامؤذية .

١٠٣١٧ - دَلَاخ *٥

Regalecus (S). *Régalec, Gymnètre* (F) *Regalecus* (E).

جنس اسماك بحرية ببوضة من فصيلة العنجيليات ورتبة شائكات الزعانف . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها تشمل بحار البلاد الحارة وبعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها سوطية الشكل تطول من ١٥٠ الى ٢٢٥ سم . رؤوسها متوجة بكشتين جالستين وهي مستغلظة الشكل مقطومة الفك الاسفل الجالس الشدق . ازوارها تحمل ارياش غضروفية مستطيلة . زعانفها الظهرية تمتد من القفن الى طرف الذنب وتنتهي بقضام من المناخص || اثوابها الى الطحلة المتباينة الماجات . اشهر انواعها الدلاخ الفضي .

١٠٣١٨ - دَلَاخ فِضِي *٥

Regalecus gladius (S). *Régalec épée, Roi des harengs* (F).

Regalecus gladius (E).

نوع من الدلاخ . اعطانه تمتد من شمال البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي . ثوبه الى الطحلة الفضية المولج . جسمه يطول من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . || لحمه كاعن الصنف ، قل من يرغب فيه .

١٠٣١٩ - دَلَاغ *٥

Strombus (S). *Strombe*

جنس حلازين كبيرة القد . انواعه عديدة يكثر وجودها في البحر الاحمر وبحر الهند وفارس . واحده دولعة ودلاعة . اشهر انواعه السرنباقي والقهبان والطار . والدلاغ ايضاً هو البطيخ ، اطلبه .

١٠٣٢٠ - دَلَاغِيَّات *٥

Strombidae (S).

Strombidae (F). *Strombidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات الاحقاب الطباشيرية والثالسية والبعض الآخر معاصر منتشر في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعرف اجناسها واشهرها الدلاغ والجلاهب والصيكم والظهور والمشعبة .

١٠٣٢١ - دَلَاق *٥

Evagination (F).

Evagination (E).

الدلاقة نشوز الشيء من غده تلقائياً .

تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاغل بعد ظهورها باربعة اسابيع . تمتح المكن ميحادياً على فصائل الاوراق || السرفة تطول نحو ٢٢ مم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اطحل اللون ، زيتي المولج ، تعلوه مجموعات من الحلب . الاغبر . رأسها اسود . مذهبها ورواجهها الى الطحلة الشديدة السمرة || طور الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع وينقضي ضمن صلجة مركبة من حنات النبات والحلب مع ما تفرزه السرفة لهذه الغاية .

١٠٣٠٩ - دِكْستروز

Dextrose

هو سكر العنب .

١٠٣١٠ - دِكْسترين

Dextrine (F). *Dextrin* (E).

مادة صمغية تُستخرج من النشا .

١٠٣١١ - دِكْسمين *٥

Dexamena (S).

Dexamène, Dexamine (F). *Dexamène* (E).

جنس دربيات بحرية من الفشريات مزدوجات الارجل وفصيلة الغمروسيات . انواعه المعروفة نحو عشرة بعضها لحي يعيش في الاعماق السحيقة والبعض الآخر مجداحي . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد . ملاسها الفكبة مجهزة بطبقيات شائكة .

١٠٣١٢ - دِكْسيّة *٥

Dexia (S).

Dexie (F). *Dexia* (E).

جنس حشرات ذبابة من ذوات الجناحين وفصيلة النقيريات انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها معتدلة الجرم ، مستطيلة الشكل والقوائم ، قصيرة الممصات المتكاثفة الحلب . اثوابها تختلف مع الانواع . تكثر فيها الكهبة والشقحة || اشهر انواعها واعماها الدكسية السبروقية التي تدعى ايضاً فقير سبروتي .

١٠٣١٣ - دِكْسييد

Dixides (F). *Dixa* (E).

عمارة من البعوضيات اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد . اجسامها واجنحتها خالية من الحراشف والحلب . اخطامها قصيرة . متاكها رخوة . اناتها لا تقوى على امتصاص الدم . وهي تعيش قرب الماء وفوقه وعلى جميع انواع النباتات المائية والمنقعية والنهرية .

١٠٣١٤ - دِكْسيمّة *٥

Atropa, Orthotrope (F).

Atropous (E).

اسم يطلق على كل بويضة مستقيمة النسيلة الواقعة في امتداد الفنقل .

١٠٣١٥ - دُكَيْنَاء *٥

Dipœna (S).

Dipœne (F). *Dipœna* (E).


جنس عناكب صغيرة من ثنائيات الروايا ، سداسيات المشائن وفصيلة الشبازيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ اعطائها البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش بين الاشجار وعليها واخصها اشجار الفصيلة الصنوبرية . ومنها انواع تعيش بين النباتات العشبية وتخلد عكادها تحت الحجارة والطحالب والشبا . شعثها لاقياسي الشكل يختلف مع اختلاف الانواع || اجسامها صغيرة القد . بطونها رقيقة الشكل . قرونها الاستشعارية مدبسة الاطراف . اثوابها الى الربدة ، بطونها مبقجة بالاصفر ، عدد البقع يختلف من نوع الى نوع ويراوح من ٤ الى ١٢ || جميع انواعها مفيدة لامؤذية .



دكسين



دكسية



دكيناء سمراء البطن



دلاخ فضي



دلاغ

اضواج فصوصها عيقة تبلغ الضلع. ازهاره عنقودي،
عناقيد خاسية او سباعية الثمار || يزرع للتزيين كسائر
انواع الدلب.

١٠٣٣٠ - دُلب غربي، دُلب أمريكي

Platanus occidentalis (S). *Platane d'Occident* (F).
American plane tree (E).

نوع من الدلب مهدد امريكه الشمالية يعلو من ٢٠ الى
٤٠ م. نفاضة قشوره صغيرة القد مستطيلة. اوراقه
ثلاثية التفصيص متساوية الطول والعرض || يزرع
ويستعمل كسائر انواع الدلب.



دلانية

١٠٣٣١ - دُلب قيقبي، صرا، عيشام

Platanus acerifolia (S). *Platane à feuilles d'érable* (F).

نوع من الدلب مهدد الشرق. يعلو من ٢٠ الى
٤٠ م. نفاضة قشوره مستطيلة الصفائح. اوراقه خاسية
التفصيص. فصوصها ذلقة الزام الطرفي. اضواجها قليلة
العمق. نصلها متساوي الطول والعرض || تكثر زراعته
على جوانب الطرقات وضيافاً الأنهر.



دلب

١٠٣٣٢ - دُلب هندي، حر الساج، اطلبه.

Dalbergia (S). *Dalbergie* (F).

جنس نباتات معمرة من فصيلة القرنيات الغراشية. انواعه
كثيرة العدد معظمها جنبات. عارضة وبعضها اشجار
وشجيرات منبها البلاد الاستوائية والحارة. اوراقها مركبة،
ريشية، متعاقبة. ازهارها عنقودية التجميع يغلب فيها
اللون الابيض. ثمارها سفية، بزورها قليلة العدد.
اخشابها ناعمة الرقعة، شديدة الصلابة، فاخرة الصنف.
اعرف انواعه واشهرها دلبرجية سيسو ودلبرجية شنف
الديك

١٠٣٣٤ - دُلبرجية سيسو، سيسو، ساسم أصفر

Dalbergia sissoo (S). *Dalbergie sissoo*, *Ebenier jaune*
(F). *Sisso tree*, *Shisham*, *Back wood* (E). *Sissoobaum*
(D). *Sissie*, *Ebano giallo* (I).

نوع من الدلبرجية شجرته تملو من ٦ الى ١٠ أمتار
منبها البلاد الحارة الاستوائية. خشبها اصفر اللون فاخر
الصنف عزيز الوجود.




دلبرجية سيسو

١٠٣٣٥ - دُلبرجية شنف الديك، شنف الديك

Dalbergia arborea, *Pongamia glabra* (S). *Dalbergie*
du Guadeloupe, *Arbre de Pongalote*, *Pongamie*
(F). *Indian beech*, *Ponga oil plant* (E). *Mondboh-*
ne (D). *Pongamia* (I).

نوع من الدلبرجية شجرته تملو من ٦ الى ١٢ م. منبها
البلاد الحارة. خشبها احمر اللون، فاخر الصنف.



دلبوث

١٠٣٣٦ - دُلبوث، سيف الغراب، غلديول

Gladiolus (S). *Gladiol*, *Glaïeul* (F). *Gladiol*, *Sword*
lily (E). *Gladiol*, *Siegwurz* (D). *Gladiolo*, *Giaggino-*
lo, *Iride* (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات انواعه وضروبه
وهجنه عديدة. اوراقه سيفية الشكل وحيدة او مزدوجة
التصنيف. ازهاره متتابعة هامية جميلة الشكل زاهية
الالوان ترتكز على شراخ ثنائي الحرف ينبطط الشكل
منتصب القامة || اشهر انواعه وهما له ما يتبع :

١٠٣٣٣ - دلالة *Crée* (F). *Auction* (E).
المناداة عالياً عند البيع بالمزاد العلني.

١٠٣٣٤ - دُلاميات

Excipulaceae (S).

Excipulacées (F). *Excipulaceae* (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الزوميات. اجناسها وانواعها
عديدة تتميز ببيكنيداتهما الجامية الشكل، الفحسية اللون.
اجناسها عديدة معظمها لا علاقة له بالاقتصاد الزراعي.
اعرفها واشهرها: الدجاجة، الدتشيروا، الديسكوله،
الديسللا، السبورونيمه والظنية.

١٠٣٣٥ - دلانيات

Dilleniaceae (S).

Dillénacées (F). *Dilleniaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العقالات اجناسها
١٦ وانواعها ٢٨٠ جميعها اشجار وشجيرات وجنبات.
جنباتها عارضة. اوراقها بسيطة، متعاقبة، مستطيلة
النصل. ثمارها عنبية لحمية غير مأكولة. بزورها غنية
بالمواد التشوية || اشهر اجناسها الدلانية.

١٠٣٣٦ - دلانية

Dillenia (S). *Dillénie* (F).

Showy dillenia (E). *Rosenapfel* (D). *Dillania* (I).

جنس نباتات برية وزينية من فصيلة الدلانيات معقودة
الهوية على اسم العالم دلائوس. انواعه المعروفة ثمانية
جميعها اشجار هنديّة وصينية المنبت تملو من ٦ الى ١٥ م.
واوراقها متعاقبة، معتقة، اهليلجية، نصلها مائل
البشرة جميل الخضار الزاهي. ازهارها ابضية الارتكاز،
خاسية البتلات، قرصية الاسدية. ثمارها عنبية حامزة
مرذولة. اما رحيق زهرها فغزير المادة، مستحب الطعم،
عطري العرف، قابل الامتصاص.

١٠٣٣٧ - دُلب

Platanus (S). *Platane* (F).

Plane tree (E). *Platane* (D). *Platano* (I).

جنس اشجار كبيرة القد من فصيلة الدليات. انواعه
سته جميعها اشجار ضخمة، منتصبه الساق، دائمة
الاغصان، مستديرة القنة. تملو من ٢٠ الى ٤٠ م.
قشور جذوعها صافحة نافضة. اخشابها صلبة خشنة
الرقعة تتشقق مع العمر. اوراقها متعاقبة، معتقة،
عابلة، نصلها كفي مفصص. ازهارها قدي التجميع.
ازهارها وحيدة السكن || ترعب في المواقع الرطبة.
تجود على ضفاف الأنهر والجداول || اشهر انواعه
واعمها زراعة ما يلي

١٠٣٣٨ - دُلب شرقي، صنار، جُنَّار

Platanus orientalis (S). *Platane d'Orient* (F). *Orien-*
tal plane tree (E).

نوع من الدلب يشمل بعض الضروب. مهدد الشرق
الاوصل يعلو من ٢٠ الى ٤٠ م. نفاضة قشوره كبيرة
الصفائح. اوراقه خاسية اوسباعية التفصيص. طولها
وعرضها متساويان يراوحان من ١٨ الى ٢٥ سم. اضواج
فصوص الاوراق عميقة التفريص، رجة الزاوي || تكثر
زراعته على جوانب الطرقات وقرب الماء.

١٠٣٣٩ - دُلب عنقودي

Platanus racemosa (S).

Platane à grappes (F).

نوع من الدلب مهدد بلاد كليفورنية. يعلو نحو ٢٥ م.
نفاضة قشوره صغيرة القد بيضية الشكل. اوراقه خاسية
او ثلاثية التفصيص، نصلها ازغب الصفحة السفلى،

١٠٣٤٤ - دَلْبُوثُ شَائِع. *Gladiolus communis* (S). *Glaïeul commun* (F).

نوع من الدلبوث البري يعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية تطول من ٢٠ إلى ٤٠ سم. سنبلة الزهرية تعد من ٦ إلى ١٠ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة لونها إلى الحمرة البنفسجية الباهتة. بتلاتها منفرجة مستعرضة، مثك سداتها أقصر من خويطها || يكثر في الجبال وفي الحقول وبين الزروع. أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٠٣٤٥ - دَلْبُوثُ فَرَّاشِي. *Gladiolus papilio* (S). *Glaïeul papillon* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية مستطيلة ومعتدلة العرض. أزهاره كبيرة القدر. بتلاتها العليا صفراء اللون، قرمزية أو بنفسجية الطوق. بتلاتها السفلى بيضاء اللون تعلوها لطخة حمراء تمتد من اواسط البتلة إلى قاعدة انتشائها || أزهاره يستمر طوال الصيف.

١٠٣٤٦ - دَلْبُوثُ قَرَوِي. *Gladiolus byzantinus* (S). *Glaïeul de Constantinople* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ إلى ٨٠ سم. أوراقه سيفية. سنبلة الزهرية تعد من ٦ إلى ١٠ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة لونها إلى الحمرة البنفسجية العابقة. بتلاتها الثلاث العليا متقاربة متساوية أما الثلاث السفلى فتعرضة ومجنحة. مثك سداتها يعادل خويطها. بزورها مجنحة || أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار.

١٠٣٤٧ - دَلْبُوثُ كَرْدِيَنَاي

Gladiolus cardinalis (S). *Glaïeul cardinal* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية مستطيلة. سنبلة الزهرية تعد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة متتابة الارتكاز على جهة واحدة. لونها إلى الحمرة القرمزية اللامعة يعلوها توشيح أبيض. بتلاتها ضيقة تطول نحو ٥ سم. || أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٠٣٤٨ - دَلْبُوثُ كَلْفِيل. *Gladiolus colvillei* (S). *Glaïeul de Colleville* (F).

ضرب من الدلبوث الهجين. أزهاره صغيرة القدر وحيدة الصف. بتلاتها أرجوانية اللون يعلوها تلطخ أصفر وأبيض || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٠٣٤٩ - دَلْبُوثُ مُشَعَّب

Gladiolus ramosus (S). *Glaïeul ramifié* (F).

ضرب من الدلبوث الهجين. سواخه عديد الشعب السبيلية النحيلة. أزهاره متوسطة القدر كثيرة العدد. بتلاتها إلى الحمرة الزاهية يعلوها عند قاعدتها لطخة خمرية عابقة. أزهاره يستمر من تموز إلى آب.

١٠٣٥٠ - دَلْبُوثُ مُتَقَابِلُ الزَّهَر

Gladiolus oppositiflorus (S). *Glaïeul à fleurs opposées* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية معتدلة العرض. سنبلة الزهرية مستطيلة تعد من ٣٠ إلى ٤٠ زهرة متقابلة الصف. بتلاتها ذلقة الطرف لونها إلى البياض الشبي عروقها حمراء. مثك سداتها فستق وخويطها كذلك || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

١٠٣٣٧ - دَلْبُوثُ أَرْغَب. *Gladiolus hirsutus* (S). *Glaïeul hérissé* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه سيفية قصيرة زباء النصل. أزهاره وردية البتلات الزلقة المنعقدة. ألبابها إلى الصفار الباهت. اسديتها فستقية. أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

١٠٣٣٨ - دَلْبُوثُ أَفْغَانِي

Gladiolus kotschyanus (S). *Glaïeul de Kotschy* (F).

نوع من الدلبوث مهدد بلاد الأفغان يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه مستطيلة ضيقة النصل. سنبلة الزهرية صغيرة. أزهاره قصيرة الأنبوب، رهلة، تطول نحو ٤ سم. لونها إلى البنفسجي الزاهي || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٠٣٣٩ - دَلْبُوثُ الْحَصَاد

Gladiolus segetum (S). *Glaïeul des moissons* (F).

نوع من الدلبوث البري يعلو من ٥٠ إلى ٨٠ سم. أوراقه سيفية تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم. سنبلة الزهرية تعد من ٦ إلى ١٠ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة. لونها إلى الحمرة البنفسجية || يكثر بين الزروع وفي الحقول. أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

١٠٣٤٠ - دَلْبُوثُ بَبْغِي

Gladiolus psittacinus (S). *Glaïeul perroquet* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية معتدلة العرض خلية النصل. أزهاره مستعرضة البتلات المقطومة لونها إلى الصفرة الموشحة بالحمرة البنفسجية. أزهاره يستمر من آب إلى تشرين.

١٠٣٤١ - دَلْبُوثُ دَمَوِيّ

Gladiolus cruentus (S). *Glaïeul rouge sang* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية قليلة العرض جامدة النصل. أزهاره ثنائية التصنيف كبيرة القدر قطرها نحو ١٠ سم. بتلاتها مستعرضة لونها إلى الأحمر الدموي العابق تعلوه خيوط بيض || أزهاره يستمر من أيلول إلى تشرين.

١٠٣٤٢ - دَلْبُوثُ دَوَيْكِي

Gladiolus primulinus (S). *Glaïeul jaune primevère* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه سيفية مستطيلة محددة النصل. سنبلة الزهرية تعد من ٣ إلى ٧ أزهار متتابة الارتكاز على جهة واحدة بتلاتها مستطيلة ضيقة صفراء اللون || يعتبر من الأنواع القوية المناعة الشائعة الاستعمال في التهجين. أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

١٠٣٤٣ - دَلْبُوثُ سَحَلْبِي

Gladiolus orchidiflora (S). *Glaïeul orchidée* (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ١٠ إلى ٤٠ سم. أوراقه خيطية كثيرة العدد صغيرة القدر. أزهاره قصيرة الأنبوب ظهريه البتلات. بتلاتها العليا خضراء اللون، جؤرية التلطخ. بتلاتها السفلى صفراء الانتشاب خضر الظاهر، حر الباطن يطلوحتها حنار جؤوي الداغل جوزي الخارج. أزهاره يستمر من نيسان إلى حزيران.

١٠٣٥١ - دَلْبُوثٌ مِزْهَارٌ

Gladiolus Floribundus (S). Glaëul florifère (F).

نوع من الدلبوث يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه سيفية معتدلة العرض. سنبلكته الزهرية تعد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة. أزهاره كبيرة القند منتصبه. بتلاتها بيض النصل، حمر المروق. ساداتها حمراء المشك، بنفسجية الخويط. أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

١٠٣٥٢ - دَلْبُوثٌ مُسْتَحَبٌّ

Gladiolus blandus (S). Glaëul aimable (F).

نوع من الدلبوث عديد الضروب يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه سيفية معتدلة العرض، جامدة النصل الاملط البشرة. أزهاره متراكبة الالوان تختلف مع الضرب. يكثر فيها الانبوب الاصفر والبتلة البيضاء الملطخة بالاحمر والمطوقة بالازرق || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

١٠٣٥٣ - دَلْبُوثٌ مُلَطَّخٌ

Gladiolus gandavensis (S). Glaëul de Gand (F).

ضرب من الدلبوث الهجين ساقه منتصبه تعلو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه سيفية مستعرضة. أزهاره كبيرة القند مستطيلة. بتلاتها قمرزية اللون يعلوها تلطخ اصفر. أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين.

١٠٣٥٤ - دَلْبُوثٌ نَنْسِيٌّ

Gladiolus nanceianus (S). Glaëul nancéien (F).

ضرب من الدلبوث الهجين يعلو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. سنبلكته الزهرية تعد من ١٥ إلى ٢٢ زهرة. زهرته كبيرة القند قطرها يراوح من ١٥ إلى ٢٠ سم. بتلاتها مختلفة الالوان الزاهية منها الاحمر والقرمزي والارجواني والوردي والازرق والبنفسجي والابيض والاصفر والموشح || أزهاره يستمر من حزيران إلى آب.

١٠٣٥٥ - دِلْفَاسِيَّات

Platanaceae (S).

Platanacées (F). Platanaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقين تشمل جنس الدلب. أزهارها وحيدة المسكن. أزهارها قدي التجميع ثمارها مجموعة كروية من البزور.

Enoplosus (S).

Enoplose (F). Enoplosus (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الفرغيات ورتبة شائكيات الزعانف. انواعها المعروفة لا تتجاوز الخمسة. جميعها صغيرة القند، مبططة الجرم، رفيعة الظهر، كبيرة الزعانف انحصها الظهرية والشرجية || اعطائها بحار البلاد الحارة وانحصها شطوط البلاد الافريقية. أشهر انواعها الدلثة المسلحة.

١٠٣٥٦ - دِلْثَمَةٌ مُسَلَّحَةٌ *

Enoplosus armatus (S). Enoplose armé (F).

Enoplosus armatus (E).

سمكة من الدلائم. اعطائها بحار البلاد الحارة || جسمها صغير القند، مبطط الجرم، رفيع الظهر، يطول من ١٥ إلى ١٧ سم. رأسها منخفض الارتكاز، مخروطي الشكل، صغير الجرم والخطم. عيناها مستديرتان، ناشرتان. ثوبها الى الشبهة الفضية تطوقه ثمانية خطوط سود متباعدة المرض. زعانفها الظهرية والشرجية ناشزة حادة المناخس. زعنفتها الذيلية فارقة، هلالية التقعير || لحبها متوسط الصنف، مأكول.

١٠٣٥٨ - دَلْدَلٌ

Dules (S).

Doule (F). Dules (E).

جنس اسماك نهريه من العظليات شائكيات الزعانف وفصيلة الفرغيات. انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها شبه اهليلجية الشكل تطول من ٢٠ إلى ٣٢ سم. تتميز بزعانفها الظهرية الفردية القاطبة المجهزة بمناخس حادة يعلوها دوقل خيطي مستطيل. رؤوسها كبيرة مخروطية الشوزن، صغيرة الاخطام الدلقة. زعانفها الذيلية مقطوعة الاطراف. اثنائها تختلف مع الانواع جميعها مجذعة بالاخضر الاليس القاتم. لحومها مأكولة متوسطة الصنف لكنها كثيرة الحسك الدقيق.

١٠٣٦٠ - دِلْسَةٌ مَأْكُولَةٌ

Dilsea edulis (S).

Dilsée comestible (F).

نبات بحري من الخثيات الحمر. اعطائه معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || كلالبيه طوقية صغيرة. ساقه قصيرة ثنائية الفرق الدرقية. أوراقه كبيرة غشروفية المادة مأكولة.

١٠٣٦١ - دِلْغَانٌ

Glaise (F). Clay, Loam (E).

هو الغضار تراب طيني شديد الاندماج والصلابة.

١٠٣٦٢ - دِلْغَانِيٌّ

Glaiseux (F). Clayey, Loamy (E).

صفة التراب الذي يحوي الدلغان اي الغضار.

١٠٣٦٣ - دِلْفٌ

Lophaetes

جنس طير من العقبان وفصيلة الصقريات. موطنه افريقية الشرقية والاستوائية. يألف الغابات وبحاري الماء. قوته الطير والحيوان. اعرف انواعه الدلوف.

١٠٣٦٤ - دِلْفٌ

Dalf

حاشور منزلي يستعمل في مكافحة الجدايد وبنات وردان (الصراصير) واللاحسات والبراغيث والنسل وثاقبات الاذن وغير قبان || وهو مسحوق ناعم وردي اللون يذر في الاماكن التي تكثر فيها هذه الحشرات فيقضي عليها || ومن الحيلة الضرورية اجتناب لثر الدلف على المواد الغذائية

١٠٣٦٥ - دِلْفَاسٌ غَلِيظُ الزُبَانِي

Delphax crassicornis (S).

Delphax crassicorne (F).

حشرة من فصيلة الدلفاسيات. جسمها صغير القند، يطول من ٦ إلى ٨ مم. || ثوبها خطي يعلوه تمشيخ كستني. رأسها عريض. عيناها كبيرتان، بارزتان. زباناتها مستغلا الفصل الاولى والثانية، مستدقا الطرفية. كوسلها قصير. حجفتها مخروطية. ظهراتها كامل الحنجبة، شارف، فاروق الطرف. روشناها غشائيان، شفافان. بطنها مبطط. الزوج الخلفي من قوائمها مجهز بمنخس حاد ينشب في نمرة الظنوب || سرحها ضفاف بحاري الماء وكل مكان يكثر فيه القصب.

١٠٣٦٦ - دِلْفَاسِيَّات

Delphacidae (S). Delphacids (F). Delphacidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم



دلثة مسلحة



دلّس

١٠٣٧٣ - دلفينيات Delphinidae (S).
Delphinidés (F). Delphinidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية ليونة من مرتبة متاثلاث الاسنان
ورتبة الحوتيات || انواعها المعروفة عديدة نحو ٦٠ .
تتميز باستطالة الرأس وبالزعانف الصدرية المنجلية الشكل.
اشهر انواعها الدلفين والتخنس والتخنس الاسود والاركة
والجراقة .

١٠٣٧٤ - دلقق * Mustella foina (S).
Fouine, Marte fouine (F). Marten (E).
حيوان من فصيلة السموريات ورتبة اللوامح . قال القزويني
« انه حيوان وحشي عدو الحمام اذا دخل البرج لا يترك
فيه واحداً وتقطع الثعابين عند صوته . » || جسمه
مستطيل الشكل طوله يراوح من ٤٦ الى ٥٠ سم . وذنبه
نحو ٢٤ . قوائمه قصيرة . ثوبه كثيف الصوف الناعم لونه
الى الكهبة السمر . عنقه وصدره الى البياض النقي . موطنه
فسيح الارحاء يمتد من الصين الى الهند والشرق الاوسط
واروبة || يألف الدسائر والقرى . يأوى المقالع
المروكة والبيوت المهجورة والخرائب واكوام الخشب .
قوته الطير والحيوان والثمار والعسل || الانثى تضع من
ثلاثة الى خمسة جراء تبصر بعد وضعها بأسبوعين || فروته
متوسطة الصنف قيمتها التجارية زهيدة .

١٠٣٧٥ - دلقنوس Dolichonyx (F).
Dolichonyx (S). Dolichonyx (E).
جنس طير من فصيلة الكاروجيات . انواعه المعروفة خمسة
جميعها من القواطع . موطنها القارة الامريكية ، مشتاتها
الاقليم الدافئة مصيفها المناطق الجبلية . نظامها الحياتي
جماعي . اسرابها وافرة العدد || اجسامها رشيقة القوام تطول
من ١٨ الى ٢٠ سم . مناقبها مخروطية الشكل ، معتدلة
الطول ، مخاطبها أسفل اعرض من العليا . اجنحتها
مستطيلة ذرية . اذانها مستعرضة الاطراف . ارساغها
دقيقة ، متوسطة الارتفاع . اثوابها ملونة او مبلقة . الاناث
اصغر قدماً من الذكور وابهر خضاباً || تألف الغابات
والمستنقعات والحقول المزروعة . قوتها الحشرات والحبوب
والبذور ومنها الحنطة والارز . تعتبر من الطيور المؤذية
كالغربان || اعرف انواعها واشهرها دلقنوس رنار .

١٠٣٧٦ - دلقنوس رنار * Dolichonyx
oryzivorus (S). Dolichonyx oryzivore (F).
طائر من الدلقنوس يصيف في بعض مناطق امريكا الشمالية
ويشتي في امريكا الوسطى والجنوبية . يألف الاجام
والمستنقعات . سربه وافر العدد || جسمه معتدل القد
يطول نحو ٢٢ سم . خضاب ثوبه يختلف مع فصول السنة ،
وهو في الربيع ، عند الذكر ، اسود الثوب باستثناء مؤخر
الظهر والافنيك فانها الى البياض العاجي . ويعملوه في
جناحيه جد صغراء تمتد من المنكبين الى اواسط القوادم .
ذنبه مروحي الطرف المنشاري الشكل . حذقة عينه سوداء .
منقاده ورسماء الى السمرة السوداء . الانثى اصغر قدماً من
الذكر . ثوبها الى الكهبة الخنطية الموج . صدرها وافنيكها
مرقوشان بالاسود الباهت || قوته الحشرات والحبوب انحصارها
الارز ولذا نعتوه بالرنار اي آكل الارز || يدثن افصوصه
في المراعي وفي الحقول المزروعة . الانثى تضع من ٤ الى
٦ بيضات تحضنها بمنابذة الذكر نحو ١٥ يوماً .

اقطار العالم انحصارها البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها
صغيرة . رؤوسها مكظرة . اعظامها صغيرة او معتدلة .
عينها غالباً كبيرة . قروتها الاستشعارية غليظة الفصل
الاول ، نحيلة الطرفية ، تنشب تحت النيون . كواسلها
قصيرة . اجنحتها لامتناهية الاشكال . قوائمها نشيطة .
الخلفية منها مجهزة بمناعس حادة .

١٠٣٦٧ - دلقنوس * Dilophus (S). Dilophe (F).
جنس حشرات من فصيلة البيبونييات . انواعه عديدة جميعها
صغيرة القد طوطا يراوح بين ٣ و ٧ مم . يكثر وجودها
في الحقول المزروعة . ترمي بمكنها على التراب فينقف
عن يرقات دقيقة همة تلثم جذور الزرع .


١٠٣٦٨ - دلقنوس عسدر Dilophus vulgaris (S). Dilophe vulgaire (F).
Common dilophus (E).
حشرة من فصيلة البيبونييات . جسمها صغير يطول من ٥
الى ٩ مم . || الذكر اصغر قدماً من الانثى ، ثوبه الى
السمرة السوداء . اما الانثى فالى الخنطية الاحمر الموج ||
راسها مكور . عينها زُميتان . زباناها وملسها شديداً
القصر . روشناها شبه شفافان . عروق الروشن ، عند
الذكر ، سود . قوائمها الى السمرة عند الشقين || تظهر
الحشرة الجمالانة من نيسان الى تشرين الاول . تألف الحقول
المزروعة والمروج || يرقها سمراء اللون تركيب جذور النبات .

١٠٣٦٩ - دلقنوس اطلب صمل الكرمه المخطط .

١٠٣٧٠ - دلقين Dauphin (F). Delphinus (E).
الدلفين كوكبة نجوم شمالية . مركزها بين الثعلب الاصفر
والعقاب والفرس الاصفر . عدد نجومها ٢٠ اجملها من
المرتبة الرابعة . اشهر نجومها النير الذي على الذنب ويدعى
« ذنب الدلفين » و « عمود الصليب » . اما الاربعة التي
في وسط العنق فتدعى « الصليب » .

١٠٣٧١ - دلقين ، دخنس ، دخنس Dauphin (S). Dauphin (F). Dolphin (E).
جنس حيوانات ليونة من الحوتيات . انواعه نحو ١٢
اجسامها مستطيلة الشكل طوطا يراوح من ١٥٠ الى ٣٥٠
سم . اعظامها مستطيلة ذلقة . اثوابها تختلف باختلاف
النوع . تعيش في بحار المناطق الحارة والمعتدلة . سربها
يعد من ٦ الى ٣٠ . قوتها الاسماك والقشريات والرخويات .
اناثه تضع جروراً واحداً . اعرف واشهر انواعه الدلفين
الشائع .

١٠٣٧٢ - دلقين شائع * ، دخنس شائع ،
دخنس شائع Delphinus delphis (S).
Dauphin commun, D. vulgaire (F). Common
dolphin (E).
نوع من الدلفين طوله نحو ٢٥٠ سم . زعانفه الصدرية
والظهرية منجلية الشكل . زعنفته الشرجية هلالية . ثوبه
الى الاربدة السمراء يعلوها موج اخضر يعبق ويسود مع
اقتربه من ثبج الظهر . يألف بحار المناطق الحارة
والاستوائية . سربه يعد من خمسة الى عشرة ازواج . قوته
الاسماك الصغيرة على اختلافها انحصارها السردين والرنكة
وجراد الماء .



دلقنوس



دلفين شائع



دلق



دلقنوس رنار




دلقون



دلكة



دل



دلسة فضية



دلوف



دلوق

كبيرة ؛ الظهرية مستطيلة ، شائكة القسم الامامي المؤلف من ١٢ منخساً ، مقطوعة القسم الخلفي العادم المناخس . الشرجية تحمل ثلاثة مناخس ذرية . الذيلية مقعرة || يكثر وجودها في نهر الكنج . لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٣٨٣ - دلَهَقَان (F). Safran (F). Saffron (E).
هو الزعفران ، اطلبه .

١٠٣٨٤ - دلهم (F). Ganga rayé (F).
طائر من القطا يعرف بالقطاة الموشحة .

١٠٣٨٥ - دَهْمَة ثُعْبَانِيَّة (F). Chelydra serpentina (S). Chélydre serpentine, Emysaure (F).
سلحفاة من فصيلة الدُمِيَّات . موطنها امريكا الشمالية .

جسمها كبير القد ، طولها يناهز المتر . رأسها كبير غليظ . فكها قويان ، قاطعان . عنقها غليظ الجرم ، معتدل الطول . ذيلها متراكب القتر اللامتساوية الشكل والحجم . زعنفا كامل الصفحة . ذنبها أعرف الشج ، عرقه محرم الشكل || قوتها الحيوان والاسماك وبعض النباتات البحرية .

١٠٣٨٦ - دَهْمِيَّات (F). Chelydridae (E). Chélydridae (F).
فصيلة حيوانات بيوضة من رتبة السلاحف . اجناسها

وانواعها المعروفة قليلة العدد . اعطائها بعض مناطق امريكا الشمالية || تعيش في المياه العذبة وفي الاسمال . قوتها الاسماك والضفادع والعطاء والشعابين وبعض النباتات المائية || اعرف انواعها واشهرها الدهمة الثعبانية والدهمة التمساحية والدهمة تامينك التي تعتبر اكبر انواع هذه الفصيلة .

١٠٣٨٧ - دَلُوق (F). Dattier prolifique (F).
النخلة الكثيرة الحمل ج دلخ . Prolific date tree (E).

١٠٣٨٨ - دَلُوف (F). Lophæte huppé (F).
طائر من الدلف ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة

الصقريات . طوله نحو ٥٥ سم . وبسطته ١٢٥ يتميز بقنبرته الناجية المنتصبة الكبيرة الريش . ثوبه الى السمرة العابقة بطه الى السواد . ذنبه ثلاثي الخطوط المعترضة البيضاء اللون . عيناه ورجلاه الى الصفرة . منقاره بني . يألف الغابات والاحراج القريبة من الماء . قوته كل ما استطاع اقتناصه من الطير والحيوان . يدن في اشجار السنط انشاء تبيض من رفنتين الى ثلاث رفئات تحضنها وحدها نحو ٤ اسابيع .

١٠٣٨٩ - دَلُوق * ، سُوَيْدَة (F). Suaeda fruticosa (S). Salsola d'Afrique, Soude annulaire (F). African salsola, Shrubby sea-bite (E). Afrikanische seifenstande (D). Salsola d'Africa (I).

نبات عشي بري حولي من فصيلة السرمقيات يكثر في الاراضي المالحة . كانوا يستخرجون منه الصودا . يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعه عديدة هيكليها هرمي الشكل . اوراقه متعاقبة نصلها اسطوانتي الشكل ، جامد النسيج ، ملس البشرة ، باهت الخضار . ازهاره لا بتلية محورية الارثكاز ، مزدوجة التجميع لونها الى الخضرة .

١٠٣٧٧ - دِلُقُون * (S). Delichon nepalensis (S).

Delichon du Népal (F).
طائر من الجواثم وفصيلة الخطاقيات . اعطائه الهند || جسمه صغير القد ، بطول نحو ١٢ سم . بسطته نحو ١٨ سم . يتميز بقصر منقاره الصغير النشط وبصغر ذنبه المقطوم الطرف . جناحاه لاحقتان ، ذربتا الاطراف . ثوبه الى الزرقة البنفسجية العابقة السعفاء الموج . زوره وصدره وبطنه وزمكاه بيش || يألف الغابات . قوته الهوام والحشرات الصغيرة والديدان . يدن عشه في الاشجار الباسقة الانثى تحضن من ٤ الى ٥ بيضات بيها الذكرا يؤمن لها الغذاء .

١٠٣٧٨ - دِلْكَة (S). Evanla (S).

جنس حشرات من فصيلة الدلكيات انواعه عديدة جميعها صغيرة القد طولها من ٦ الى ١٠ مم . لونها الى السمرة والسواد . تمتح مكنها في مكن بعض الحشرات اخصها بنات وردان فينقف عن يرقات تلهم محتويات عوائلها وتقضي عليها .

١٠٣٧٩ - دِلْكِيَّات (S). Evaniidae (S).

Evaniidés (F). Evaniidae (E).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المخصوصة اجناسها وانواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على عدة حشرات مؤذية اخصها بنات وردان || اوصانها العامة : حشرات صغيرة القد . رؤوسها كبيرة مفلطحة . جواشها غليظة . ترجاتها البطنية الاولى مندمجة مع الصدور . خصورها انبوبية نحيلة . زيانها خيطية . ارجلها مستطيلة . ارساغها خماسية . ألوانها الى السمرة يغلب فيها الاسود || موطنها البلاد الحارة والمعتدلة . تمتح مكنها في مكن ويرقات سائر الحشرات فينقف عن يرقات صغيرة تنفذ من محتويات مكن ويرقات الحشرات العائلة وتقضي عليها .

١٠٣٨٠ - دَلَم (F). هو الفيل ، اطلبه . والدلة : لون الفيل.

١٠٣٨١ - دَلَم * (S). Columba cenas (S).

Colombe colombin (F). Stock dove (E).
نوع من الحمام البري طوله نحو ٣٥ سم . رأسه وعنقه وظهره الى الرمادي الأزرق يملوه موج أسفع . منقاره احمر اللون اصفر اللواقط . صدره الى الجؤوة وجانباه الى الخضار البنفسجي . اقبكه اسود الزام الاول والثاني ازرق الثالث والرابع || ضروره قليلة جميعها من القواطع لها مشتاه ومضيفها || موطنه حوض البحر المتوسط . يألف الاحراج والغابات . يعيش اسراباً صغيرة يراوح عددها من ٤٠ الى ١٠٠ . قوته الثمار والحبوب والبدور . يدن عشه في تجاويف وتخاريف الاشجار . انائه تبيض من مرتين الى ثلاث مرات في السنة .

١٠٣٨٢ - دَلْكْسَة فِضِيَّة * (F). Datnia argentata (S). Datnié argencée (F).

سمكة نهريّة من شائكات الزعانف وفصيلة الفرخيات . موطنها بعض انهر الهند والهند الصينية وماليزية || جسمها مسطح الجرم ، شبه اهليلجي الشكل ، مخصص المؤخر ، بطول نحو ٢٣ سم . ثوبها الى الزرقة الفضية الموج . رأسها مخروطي الشكل . شدقها معتدل الانفراج . اسنانها صغيرة ذرية . عينها ماحتان ، متقاربتان . جميع زعانفها



دليس



دليك



دليوم

١٠٣٩٨ - دَم Sang (F). Blood (E).
الدم سائل احمر يملأ تجويف القلب والاوعية الدموية المتصلة به . وهو مركب من سائل اصفر يدعى اثلة (بلاسما) تتكون بدورها من ماء واملاح قلووية التأثير ومواد بروتينية وسكرية تنسج فيها اجسام ذرية تعرف بالكريات والكريات هذه تقسم الى مجموعتين تعرفان بالكريات الحمر والكريات البيض . فالحمر حجيرات حيوانية من ذوات الجيلة وقد تبلغ نسبتها الى البيض نسبة ٥٠٠ الى ١ اما لونها الاحمر فيعزى الى المادة الملونة المعروفة بالهيموغلوبين ويحوي المليمتر المكعب من الدم ما يراوح عدده من ٤ الى ٥ ملايين من الكريات الحمر التي تمتد حياتها الى بضعة اسابيع ثم تلتشط وتفتت وتمضحل . وظيفتها الرئيسية نقل الاكسجين من الرئة الى جميع اجزاء الجسم || اما الكريات البيض فهي على خمسة اشكال جميعها متحركة وظيفتها القضاء على البكتيريا السابحة في الدم .

١٠٣٩٩ - دَم الاخوين
هو التور الخزي . وهو القاطر الجبار ، اطلبها .

١٠٤٠٠ - دَم التنين ، دَم الشعبان
هو القاطر ، اطلبه .

١٠٤٠١ - دَم العاشق هو المخلدة ، اطلبها .

١٠٤٠٢ - دَم الغزال هو الكرسفية الحمراء ، اطلبها .

١٠٤٠٣ - دَم النعمان راجع ادونيس صغير .

١٠٤٠٤ - دَماس Leclidurus (S). Diclidure (F).
جنس خفافيش من عمارة الراسات . موطنه امريكا الجنوبية . انواعه قليلة العدد تتميز ببشاعة رؤوسها وبقصر اذنانها الدقيقة || يعيش جماعات كثيرة العدد . يسرح طوال الليل . قوته الحشرات ، يألف الاشجار الحرجية . لا يخشى المطر .

١٠٤٠٥ - دَماسيات Leptotyphlopidae (S).
Leptotyphlopidae (F). Leptotyphlopidae (E).
فصيلة حيات بيوضة ، جاسة ، عديمة الاذى . انواعها المعروفة قليلة العدد . اعطانها بعض المناطق الاستوائية والحارة من البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية || اجسامها دودية الشكل ، تطول من ١٨ الى ٢٥ سم . قشارها ملس السهف المتماثل في جميع انحاء الجسم . رؤوسها شبه مقطوعة ، قطرها قطر الجسم . عيونها صغيرة ، ماسحة ، يغلفها غشاء سهفي المادة . فكوكها السفلى مسنة ، اما العليا فعديمة الاسنان || قوتها الحشرات والديدان . بعض انواعها يعيش في قري النمل ونبات الارضة ولا يخشاها لانها لا تستطيع عضه .

١١٤٠٦ - دَماع Pleurs (F). Tears (E).
ما يسيل من سروع الكرومة اذا قطعت في ايام الربيع .

١١٤٠٧ - دَماع Lactescent
نعت تعريفي يطلق على كل نبات يسيل منه اللسع بغزارة اذا جرح .

١٠٣٩٠ - دليس Delesseria (S).
Delesserie (F). Delesseria (E).

جنس نباتات بحرية من الخثيات الحمر . انواعه المعروفة نحو ١٢ اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || كلاليتها قصيرة . سوقها اسطوانية تنسج الى عراجيد ورقية الشكل وردية اللون او حمراء تجتازها ضلوع رئيسية وعروق جانبية متقابلة الانتشاب ، متوازية الابعاد .

١٠٣٩١ - دليس Strophomena (S).
Strophomène (F). Strophomena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة النفديات || انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من متحجرات الاباج القديم .

١٠٣٩٢ - دليك Gamolepis (S).
Gamolépis (F). Gamolepis (E).

جنس نباتات جنبية معمرة من الشرونيات وفصيلة المركبات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، مهدا افريقية الجنوبية || سوقها فرعاء . اوراقها متعاقبة اهليلجية النصال . ازهارها ابضية ، كبيرة القد ، جميلة الشكل ، صفراء اللون ، عادمة العرف .

١٠٣٩٣ - دليك Cynorrhodon, Fruit de l'églantier (F). Hlp (E).
الدليك : ثمر النسر ين يحمر حتى يكون كالبر فينضج فيحلو فيؤكل .

١٠٣٩٤ - دليل « باير » Indicateur « Bayer »
مركب كيمائي ، معروض بشكل اقراص صغيرة مستديرة ، يستعمل لمعرفة حموضة الحليب . يذوب القرص الواحد في لتر ماء ويؤخذ من هذا المحلول مقدار فنجان او نصف فنجان يضاف الى فنجان او نصف فنجان من الحليب فان بقي الحليب على لونه الطبيعي كان خيرا وان اصفر لونه فانه لا يصلح لحموضته . وقد يجوز سحق القرص واستعمال مسحوقه رشاً على الحليب فان اصفر لونه فهو حامض لا يصلح للاستعمال .

١٠٣٩٥ - دليس Telline (F). Tellin (E).
هو الطلنس جنس محار من الرخويات .

١٠٣٩٦ - دليس Thyrsite (F).
الدليس سمكة بحرية تدعى ترسيت ، اطلبها .

١٠٣٩٧ - دليوم Dialium (S).
Diali, Dialion (F).

جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة السنفيات العندميات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبوت المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية || سوقها جالسة منتصب ترتفع من ١٢ الى ٢٥ متراً . اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وثرية ، خماسية او سباعية الوريقات المنقطة . نصالها اهليلجية الشكل ، جامدة الوثل . ازهارها عنقودي التجميع ، محوري او هامى الارتكاز . ازهارها صغيرة ، خماسية التركيب . سنفاتها دقيقة مستطيلة تستعمل استعمال الصابون في تنظيف الثياب ذلك لانها تحوي مادة تماثل الصابونين .

المتقابلة . أوراقها العليا بسيطة ترتكز على صماميخ صغيرة تنشب في الأباط . أزهارها ليلكية ، ضيقة البتلات . تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .

١٠٤١٧ - دَمَام رِيْشِي Dentaria pinnata (S).
Dentaire pennée (F).

نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها يمتد من الشرق الأدنى إلى أوروبا . حراشف أرومتها مستديرة الأطراف . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها خاسية أو تساعية الوريقات المتقابلة . أزهارها كبيرة القد ، وردية اللون أو ليلكية ، فصلها خضراء اللون . تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .



دَمَامَة

١٠٤١٨ - دَمَامَة * Sanguinolaria (S).
Sanguinaire (F). Sanguinolaria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الساليات . أنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة من سواطي الهند إلى سواطي جزر الزابج وأوقيانية وأمريكا الشمالية || أصدافها شبه صيوانية الشكل . لامعة ، يكثر فيها الأحمر الجؤوي يتخلله الأخضر والأصفر . أجسامها متوسطة القد ، مستطيلة المشاعب الطليقة || تعيش في الرمال والاسمال القليلة الغور || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .



دَمَالِي

١٠٤١٩ - دَمَان * ، وَهْر Hyrax, Proavia (S).
Daman (F). Daman, Coney of the Bible (E).

جنس حيوانات قاضمة لبونة من فصيلة الدماييات . أنواعه ١٣ موطنها البلاد الحارة . تألف الجبال الصخرية . أجسامها ربعة كائزة تطول من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أثوابها إلى الصهبة الصنابية تعبق مع اقترابها من قمة الرأس وثبيج الظهر . وبرها ناعم وقصير . قوتها الأعشاب والجذور والثمار والحبوب . أشهر أنواعه ما يلي .

١٠٤٢٠ - دَمَان النُوبَة Hyrax ruficeps (S).
Daman de Nubie (F). Nubian daman (E).

نوع من الدمان موطنه النوبة والصومال . طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه إلى الصهبة الصنابية الصفراء المواج .

١٠٤٢١ - دَمَان حَبَشِي Hyrax abyssinica (S).
Daman d'Abyssinie (F). Abyssinian daman (E).

نوع من الدمان موطنه الحبشة حيث يعرف باسم اشكوكو . ثوبه قليل السمرة . طوله نحو ٤٠ سم .

١٠٤٢٢ - دَمَان سُورِي ، طُبْسُون Hyrax syriacus (S). Daman de Syrie, Saphan (F).
Syrian daman (E).

نوع من الدمان موطنه لبنان وسورية وفلسطين وسينا والحجاز . جسمه بطول من ٤٠ إلى ٥٠ سم . ثوبه إلى الصهبة الصفراء المواج .

١٠٤٢٣ - دَمَان قُطْبِي Hyrax capensis (S).
Daman du Cap (F). Daman of Cape (E).

نوع من الدمان موطنه القطب الجنوبي . جسمه يطول نحو ٣٥ سم . ثوبه إلى الصهبة الفضية المواج .

١٠٤٢٤ - دَمَائِيَّات Hyracidae, Procaviidae (S).
Hyracidae, Damans, Procaviidae (F). Hyracidae, Procaviidae (E).

فصيلة حيوانات لبونة قاضمة . أنواعها ١٩ تنضم إلى جنسين : الدمان والزم . جميعها صغيرة القد حجمها حجم

١٠٤٠٨ - دَمَامَة * ، دَكْرِيْد Dacrydium (S).
Dacryde, Dacrydion (F). Dacrydium (E).

جنس شجيرات طقسوسية من فصيلة الصنوبريات . مهدا الهند . أنواعها المعروفة ١٢ سوقها متوسطة الارتفاع . فروعها متشعبة ، تبدو في أول عهدها منتصب ثم أفقية فتدلية . أوراقها ابيدة ، دائمة الخضار ، حرشفية النصال السنانية الشكل . فروعها تقطر عصارة راتنجية شائعة الاستعمال الصناعي والكحولي || من متطلبات زراعتها المواقع المعتدلة الحرارة والرطوبة .

أشهر أنواعها :

١٠٤٠٩ - دَمَامَة رَفِيْعَة Dacryde élevé (F).

١٠٤١٠ - دَمَامَة سَرُوبِيَة Dacryde cyprès (F).

١٠٤١١ - دَمَاكَة Vernalsation

هي معالجة البذور والشتول بالبرد لتنشيط خاصية الانتاش وتقديم زمنه وللإسراع في نمو الشتول وأدراكها .

١٠٤١٢ - دَمَال

الدمال : التمر العفن الأسود القديم .

» : ما رمى به البحر من خشاره .

» : السرقين .

» : ما وطنته الدواب من البعر والذراب .

» : فساد الطلع قبل أدراكه حتى يسود .

١٠٤١٣ - دَمَالِي * Lyophyllum

aggregatum (S). Lyophylle en touffe (F).

فطر مأكول من فصيلة الغاريقونيات . أعطانه الغابات الظليلة في المناطق المعتدلة الحرارة . يعيش على الدبال . ساقه غضروفية المادة ، شطئية ، ضخمتها تعد من ٧ أزواج إلى ١٥ زوجاً . أرسوته مظلية الشكل قطرها يراوح ، عند الإدراك التام ، من ٤ إلى ١٠ سم . لونها إلى الكهبة يعلوها مواج تبني || لحيمته جيدة الصنف مرغوب فيها .

١٠٤١٤ - دَمَام ، عَشْبَة الاسْنَان Dentaria (S).
Dentaire (F). Toothwort, Bulbous coral-root (E).

جنس نباتات عشبية ، جذمورية ، معمرة من فصيلة الصليبيات . جذاميرها لحمية مدادة . أرومتها مغلفة بحراشف تشبه الاسنان . سوقها دقيقة . أوراقها متباينة الأشكال . أزهارها مختلفة الألوان || أنواعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية .

١٠٤١٥ - دَمَام إَصْبَعِي Dentaria digitata (S).
Dentaire digitée (F).

نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها الشرق الأدنى وأروبة . حراشف أرومتها ذرية الأطراف . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها ثلاثية أو خماسية الأصابع . أزهارها بنفسجية اللون مخضبة الفصل || تنويرها يستمر من أيار إلى تموز .

١٠٤١٦ - دَمَام دَوْقِصِي Dentaria bulbifera (S).
Dentaire bulbifère (F).

نوع من الدمام . عشبة سبروتية معمرة . منبتها يمتد من الشرق الأدنى إلى أروبة . جذاميرها دوفصية الشكل . ساقها فرعاء تعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها السفلى مركبة ، وثرية التجميع ، خاسية أو سباعية الوريقات



دَمَامَة



دَمَان

١٠٤٢٩ - دَمَشَّة ٥ Dope, Doping (F).
Doping (E).
مادة اذا استعمالها الانسان تؤثر على جهازه العصبي فيؤدي مجهوداً جسدياً يفوق طاقة امكانياته الطبيعية .

١٠٤٤٠ - دَمَشَق هو الزقراق ، اطلبه .

١٠٤٤١ - دَمَشَقِيَّة هي المرموزة ، اطلبها .

١٠٤٤٢ - دَمَص Rangée de pierres d'un mur (F).
الدمص : كل عرق من اعراق الحائط ما خلا العرق الاسفل فانه رخص . العامة تقول دمس .

١٠٤٤٣ - دَمَع أُيُوب راجع أندريان .

١٠٤٤٤ - دَمْعِي Larmaire (F).
نعت تعريفي توصف به كل بذرة صغيرة شكلها كالدمعة .

١٠٤٤٥ - دَمَل Amendement (F). Improvement (E).
الدمل هو ان يضاف الى التربة ما يصلح خواصها لذلك فالدمل قد يكون باستعمال الرمل او الكلس او الجص او السباد الخ .

١٠٤٤٦ - دُمَل Furoncle (F). Furuncle (E).
ورم قاس مؤلم حار سببه ميكروب يعترى جلد الحيوان ويصيب بعض الاسماك في امعائها فيحدث قروحاً في جلودها .

١٠٤٤٧ - دُمْلَة الْبَحْر * Balanus (S).
Balane, Gland de mer (F). Balanus (E).
جلس دوبيات بحرية من القشريات هدايات الارجل وفصيلة الدمليات . انواعها المعروفة عديدة تعيش في اول عهدا طليقة ثم لاصقة بالصخور وبكل شيء يعوم في البحر || اصداؤها شبه بلوطية الشكل سداسية التركيب ، رباعية الاسقاط المتحركة المتساوية .

١٠٤٤٨ - دَمْلَجَة Cerbere (F). Cerberus (E).
كوكبة شمالية الموضع تتألف من اربعة نجوم تطوق يد الجاني .

١٠٤٤٩ - دُمْلُوح ٥ Anthops ornatus (S).
Anthops orné (F).

جلس حيوان وحيد النوع من العماشيات . يتميز بزوائده المنخرية القائمة كثورة الزهرة بين الشفة العليا والعين . جبهته مستعرضة تحمل ثلاث كرات معلاقية القاعدة . جسمه صغير القد طوله نحو ٨ سم . بسطته ٣٢ . ثوبه الى الريدة الصهباء . رأسه وظهره وبساطه اعبق من عنقه وبطنه || موطنه جزر المحيط الهادي والهندي والبحر الاحمر . يألف الكهوف والمغاور . يعيش جماعات صغيرة العدد . ذكره لا تقرب اناثها الا عند الكوم . سرجه من الغسق الى فحة الليل . قوته الحشرات والدوبيات والهوام .

١٠٤٥٠ - دُمْلُوق Vismie
جنس نباتات شجرية وجنبية برية معمرة من فصيلة الداذيات . انواعه نحو ٧ منها البلاد الاستوائية والحرارة .

الارنب . اثنائها الى الصبهة المختلفة السمرة والمواج . ورؤوسها صغيرة اسفينية الشكل . عيونها كبيرة ، اذانها مستديرة . اذانها قصيرة وقوائمها كذلك . اناثها سداسية الاطباء تضع من ٤ الى ٦ جراء . قوتها الاعشاب والثمار والحبوب على اختلاف انواعها .

١٠٤٢٥ - دُمْبَرَا Rohita (F).
هي الرهيطة من الاسماك النهرية ، اطلبها . والدمبرا من اسمائها الهندية .

١٠٤٢٦ - دَمْبُوز Dambose
الدمبوز او الينوزيت مادة سكرية توجد في عضلات الجسم وفي اوراق بعض النباتات . (راجع ينوزيت) .

١٠٤٢٧ - دِمَّة * ، قُمْلَة ، قُمْلَة الجسم Pediculus corporis (S). Pou du corps (F). Louse (E).
نوع من الفرعيات . طولها نحو ٣ مم . ثوبها الى السمرة . قوتها الدم تمتصه من جسم الانسان والحيوان . مكها يدعى ثيباناً تمتحه الانثى على الشعر فيلصق به الى ان ينقف وذلك بعد وضعه بنحو ثمانية ايام .

١٠٤٢٨ - دِمَّة بَيْضَاء
هي قرمزية الكرمة البيضاء ، اطلبها .

١٠٤٢٩ - دَمَج Incorporer (F). To incorporate (E).
مزج الشيء بشيء آخر فتجانسا .

١٠٤٣٠ - دَمَجَانَة ، بَاطِيَة ، نَاجُور Dame-jeanne (F). Demi-john (E).
وعاء من زجاج مغلف بالقش يستعمل لحفظ الكحول والخمور والسوائل .

١٠٤٣١ - دَمْدَامَة
هي البطاطا الحلوة ، ج دمدم .

١٠٤٣٢ - دَمْلَه مُون
هو اليبلسان الاسود ، اطلبه .

١٠٤٣٣ - دَمْرَاء
الدمراء : الشاة القليلة اللبن .

١٠٤٣٤ - دَمَس
دمس الحمر : اغلق عليها دنها .

١٠٤٣٥ - دَمْسِي
هو جربيل الاهرام ، اطلبه .


١٠٤٣٦ - دَمْسِيْس
هو الامبروسيا ، اطلبها .

١٠٤٣٧ - دَمْسِيْسَة * Achimenes (S). Achimène (F).
Achimenes (E). Schiefteller (D). Accimene (I).

جنس نباتات زراعية تزيينية معمرة من فصيلة الجسنديات انواعه سبعة جميعها من نباتات المناطق الاستوائية التي تحشى البرد || تزرع في المراكن والبيوت . اوراقها متعاقبة قلبية الشكل زنادية العنق . نصلها فارش الصفحة الحولية البشرة المتموجة المرقطة . ازهارها بوقية الشكل ، زائفة الالوان ، مستطيلة المعاليق المنتصبة .

١٠٤٣٨ - دَمَشَش ٥ Doper (F). To dope (E).

دمش الانسان او الحيوان حثه على زيادة النشاط والاقدام بالقاحه او بتجريمه فثمة جد قليلة من مادة معينة تثير الهمة .




دِمَّة




دَمْسِيْسَة



دَمْلَة الْبَحْر




دملوكة مبدولة



دمن الجلود



دمية



دميجة شائعة



دميص

١٠٤٥٩ - دُمَيْبَة *، بَطَّ قُطَيْبِي (S). Oedemia (S).
Macreuse (F). Scoter (E).

جنس طير من البطيات . انواعه المعروفة ستة جميعها من القواطع تجوب البلاد الباردة والمعتدلة . تألف الشطوط والاشجار والمناقع قوتها الاعشاب والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة . اجسامها متوسطة الحجم . مناقيدها مستعرضة . اجنحتها ذرية . اذناها منحروطة الشكل قصيرة القد || اشهر انواعه التي تجوب بعض مناطق المتوسط :

دمية سمراء Oedemia fusca (S).
Macreuse brune, M. vraie (F). Velvet scoter (E).
دمية مبدولة ، دمية سوداء Oedemia nigra (S).
Macreuse noire, M. commune (F). Common scoter (E).

١٠٤٦٠ - دَمِيْجَة *، فَيَاثُورِيْكُم

Phymatotrichum
جنس فطور مجهرية من الطليسيات وفصيلة الوطحيات .
انواعه قليلة قريبة الشبه من الطلسة . جرابه البويغي رافع الطرف وكثير الشعب التي ترتكز عليها الكائنات || اعرف
انواعه واشهرها الدميجه الشائعة .

١٠٤٦١ - دَمِيْجَة شَائِعَة *، مَرَضُ التَّكْسَّاس
Phymatotrichum omnivorum, Ozonium omnivorum, O. auricomum (S). Maladie du Texas du cotonnier (F).

فطر مجهري عيم الانتشار يعيش على ٧٧٠ نبات من مختلف الفصائل والاجناس . من الاشجار المثمرة والخرجية الى الجنبات الصناعية والزينية ومن النباتات البقلية الى الاعشاب العلفية والبرية || مظهره الخارجي ، على النباتات الحولية ، ذبول يحل باطرافها يقودها الى اليباس . سببه قروح حنطية اللون غائرة السطح ، جووية الخثار تركب الجلود بعد ان ينطقها مشيج الفطر بنواسه البلد الاسمر . يكافح بتطهير التربة الموبوءة او بالاقلع عن زرعها وبالكثار من الاسمدة العضوية مع اجتناب الاسمدة والمصلعات الكلسية .

١٠٤٦٢ - دُمَيْص *، وَرَيْقُ جَبَلِي (S). Dryas (S).
Dryade (F). Dryas, Avens, Wild betony (E). Echte silberwurz (D). Erba del cervo (I).

جنس نباتات عشبية ليفية مدادة معمرة من سبط الدميصيات وفصيلة الورديات . اوراقها ضمية التجميع معتقة اهليلجية . ازهارها فردية طويلة الزناد تستعمل في عدة مستحضرات طبية || له نوعان فقط تحديدهما ما يلي .

١٠٤٦٣ - دُمَيْصُ أَصْفَر (S). Dryas drummondii (S).
Dryade de Drummond (F).

نوع من الدميص يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . اوراقه عرو مستطيلة ، نصلها مسنن الحافة ، بارز العروق ، خلي البشرة . ازهاره رباعية البتلات قطرها نحو ٣ سم . لونها الى الصفار الذهبي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٠٤٦٤ - دُمَيْصُ ثَمَانِي البَتَلَات ، حَمَامْدُ رَيْس جَبَلِي
Dryas octopetala.

Chamaedrys alpina (S). Dryade à 8 pétales (F).

نوع من الدميص . منبته الجبال . يعلو نحو ١٥ سم . اوراقه عرو تطول نحو ٣ سم . نصلها مسنن الحافة ، ابيض الصفحة السفلى . ازهاره مستعرضة البتلات قطرها

١٠٤٥١ - دُمْلُوك * Flesus (S).

Flet (F). Flounder (E).

جنس اسماك بحرية من الملساوات وفصيلة جانبيات العموم .
انواعه المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة . سرسحها اساطم الاغواط والمجادح || جميعها بيضيه الشوزن ، صغيرة السهف الدقيق . مبطة الجسم . تتميز بزعانفها الظهرية والبطنية المتقابلة الممتدة من الرأس الى قاعدة الذيل . زعانفها الذيلية محدبة الاطراف || اعرف
انواعه واشهرها الدملوك المبدولة ودملوك المتوسط .

١٠٤٥٢ - دُمْلُوكَة الْمُتَوَسِّطَة * Flesus passer (S).

Flet moineau (F). Passer Flounder (E).

سمكة من الدملوك . اعطانها تمتد من جبل طارق الى البحر الاسود . يكثر وجودها عند اشجار الانهار لانها تسرع في المياه العذبة || جسمها يضي الشوزن ، مبطة الجرم ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى السرة الحنطية يعلوها موج اصفر || لحمها فاخر الصنف لذيق الطعم مرغوب فيه .

١٠٤٥٣ - دُمْلُوكَة مَبْدُولَة * Flesus vulgaris (S).

Flet commun (F).

Common Flounder (E).

سمكة من الدملوك . اعطانها تشمل معظم بحار الشمال وتمتد من الدنيمرك الى الجزر البريطانية وفرنسه واسبانيا حتى جبل طارق وقد شوهدت في مياه مالطه وسردينيه || ثوبها الى السرة الحنطية السفماء الموج . جسمها يضي الشوزن ، مبطة الجرم يطول نحو ٤٠ سم . || لحمها لذيق الطعم مرغوب فيه .

١٠٤٥٤ - دُمَلِيَّات * Balanidae (S).

Balanidés (F). Balanidae (E).

فصيلة دربيات بحرية من القشريات هدايات الارجل .
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها صغيرة القد تتميز باصدافها القرية الشبه بالبلوط وباسقاطها المتحركة || اشهر اجناسها دملة البحر .

١٠٤٥٥ - دَمْنُ الْجُدُور * Thielavia basicola (S).

فطر مجهري من المهبويات وفصيلة الرقسيات . يتميز بعن كروي الشكل اسمر اللون يحمل ازقافاً مستطيلة تشتمل على تككات بسيطة شفعية التجميع يبلغ عددها الثمانية . مظهره الخارجي عفن اسود يحرق بالجلود فيعطبها ويعطب السوق . يركب معظم البقول والنباتات الزينية اذا وافقته حرارة البيئة ورطوبتها . ويقضي على شتلات التبغ في المشتل واذا اصاب الشتول في الحقل سبب ذبول الاوراق وازربابها اللاتيممي || يكافح باقتلاع وحرق النباتات المصابة وبتطهير التربة المعدة للمشائل بمحلول الفورمول المركز ١٪ قبل البذر بثلاثين يوماً .

١٠٤٥٦ - دُمْنَة Fosse à fumier (F). Dung heap (E).

الدمنة هي المزبلة . والدمن هو ما تلبد من السرقين والروث والبحر .

١٠٤٥٧ - دُمُوعُ البُسَيْصِن

نبات عشبي طبي يعرف بالداذي المنن ، اطلبه .

١٠٤٥٨ - دَمِيَّالَة Damiana

نبات طبي شايق يعرف بالزراع الشايق ، اطلبه

١٠٤٧٤ - دُمَيْصِمَةٌ ٥
Systemema (S).
جنس فطور مجهرية من البيبايات وفصيلة العشوفيات .
اعسانها مركبة مجوفة قائمة على ونيمة بلسنية الشكل سوداء .
بوغها ثنائي الخلية اسمر اللون || انواعه الاقتصادية قليلة
اعرفها دميمة الدردار .

١٠٤٧٥ - دُمَيْصِمَةُ الدَّرْدَارِ ٥
Systemema ulmi, Euryachora ulmi, Dothidella ulmi,
Piggotia astroidea (S). Maladie des croutes noires
de l'orme (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق الدردار . مظهره الخارجى يقع
بلسنية الشكل تبدو سمراء اللون ثم تسود تركيب نصل الاوراق
على صفحاتها العليا فتسبب جفاف النسج المعطوبة .
اضراره زهيدة لانها لا تؤثر في نمو النبات وحياته .

١٠٤٧٦ - دَن ٥
Cuve (F). Vat (E).
وعاء كبير يخمر فيه العصير ، ج دنان .

١٠٤٧٧ - دَنَارَةٌ مُطَوَّقَةٌ * ، دَنَارَةٌ مُذَهَبَةٌ
Philodromus aureolus (S). Philodrome doré (F).
دويبة من العناكب الساعية القانصة ثنائيات الروايا ،
سداسيات المشاتين ، تنتمي الى فصيلة الذوطيات || جسمها
يطول نحو ٤ سم . عند الذكر ونحو ٨ سم . عند الانثى .
صدراسها احمر اللون صناعي الموج يعلوه رباط ابيض .
عينها زيمتان . شيفها صغيران محببان . فكاه دقيقان .
جرامزها مستطيلة . بطنها مبسط الجرم ، اصفر اللون ،
حطلي التدنير والزخرفة || تألف البراري . قوتها الحشرات
الصغيرة والذباب والهوم . مسرحها دجوي . تسمى وراء
قنصها ركضاً وقفزاً || عكديتها يبش في التربة تحتفره قرب
النبات او في كنف الحجارة الكبيرة وتظلله بسعة مظلية
الشكل || يباتها الشتوي يستمر نحو ٢٠ اسبوعاً وينقضي
ضمن صلجة بلوطية الشكل . طليقة القمر ، تنسجها
داخل البيش || تعتبر من الدويبات المفيدة اللامؤذية .

١٠٤٧٨ - دَنَاصِير
Dinosauriens (F).
Dinosaurians (E).
رتبة من الزحافات المنقرضة . احافيرها تعود الى الحقبين
الجوروية والطباشيرية من الاباج الثاني اي الاوسط . فصائلها
واجناسها وانواعها عديدة . طابعها الجسموري مزيج من
الاشكال والصفات تتمثل فيها الطير والزحافات والضرعيات .
بعض انواعها كالدينصور الجبار (Atlantosaure) كان
طوله ٤٠ متراً . اما الدينصور المبلول فكان طوله من ٢٥
الى ٢٨ متراً .

١٠٤٧٩ - دَنَاطَةٌ ٥
Périhélie (F). Perihellon (E).
الدنابة آخر حدود الاقتراب لسيارة من الشمس . الكرة
الارضية تكون في دنابتها في اول كانون الثاني من كل عام .

١٠٤٨٠ - دَنَّةُ الْأَزْهَارِ ٥
Anthobium ophthalmicum (S).
حشرة من الدنابات صغيرة القد تطول نحو ٢ مم . ثوبها
الى الشبهة . ظهرانها مالم الصفحة مقطوم الطرف .
تركب الازهار وتعيش عليها || تكافح كسائر حشرات
نمديات الاجنحة .

١٠٤٨١ - دَنَّةُ الْأَمِير ٥
Staphylinus caesareus (S).
Staphylin à raies d'or (F).
حشرة من الدنابات طولها نحو ٢٠ مم . جسمها اسود .

نحو ٤ سم . عددها ثمانية ، لونها الى البياض الحليبي .
ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

١٠٤٦٥ - دُمَيْصِيَّات
Dryadées (F).
سبط نباتات عشبية وجنية من فصيلة الورديات .

١٠٤٦٦ - دُمَيْغَةٌ ٥
Zooglyphite, Zootypolithe (F).
دميغ ج دماغ . الدماغ اثار المتحجرات الحيوانية .

١٠٤٦٧ - دُمَيْقِي ٥
Introrse (F). Introrse (E).
نعت تعريفي يطلق على كل سداة تحمل مثبراً ينفلق من
الجهة الداخلية ازاء مركز الزهرة .

١٠٤٦٨ - دُمَيْك ٥
Névé (F).
Firn, Granular Ice (E).
هر الثلج المللكد .




١٠٤٦٩ - دُمَيْكَةٌ * ، زَهْرَةُ الثَّلَج ، زَهْرَةُ الدَّيْن
Galanthus (S). Perce-neige, Galanthe, Galantine,
Clochette d'hiver (F). Purification flower (E). Echte
scheneeglockchen (D). Galantino, Lacrime della
madona, Foraneve (I).
جنس نباتات بصلية من فصيلة النرجسيات . انواعه عديدة
معظمها بري . يعيش في الجبال لا يخشى الثلج . بصلته
قرصية الشكل جؤوية اللون . اوراقه اثنتان او ثلاث ،
قرصية الانشباب ، ضيقة النصل . شراخه الزهري اجوف
الجسم نحيله ينتهي بشراغف بسيط تعلوه زهرة واحدة .
اشهر انواعه التزيينية المعروفة ما يتبع .

١٠٤٧٠ - دُمَيْكَةُ الْمَلِكَةِ أُولُكَا
Galanthus
Olgae (S). Perce-neige de la reine Olga (F).
نوع من الدميكة اوراقها ثلاث ضيقة مستطيلة وحيدة
الكظر . شراخها يعلو نحو ١٥ سم . زهرتها بيضاء .
بتلاتها الخارجية مستطيلة اما الداخلية فستديرة وقصيرة .
تزهري في تشرين الاول .


١٠٤٧١ - دُمَيْكَةُ الْوَيْس
Galanthus Elwesii (S).
Perce-neige d'Elwes (F).
نوع من الدميكة لها ورقتان مالمستان عادمنا التخذيد
والكظر . شراخها يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرتها
كبيرة القد ، كروية الشكل ، بيضاء اللون ، قواعد اطراف
بتلاتها الداخلية موشحة بالاخضر || تزهري في شباط .

١٠٤٧٢ - دُمَيْكَةُ شَائِعَةٍ
Galanthus nivalis (S).
Perce-neige commun (F).
نوع من الدميكة اوراقها ضيقة ، مستطيلة ، محددة النصل
الوحيد الكظر ، لونها الى الخضار الازرق || شراخها يعلو
من ١٠ الى ٢٠ سم . زهرتها بيضاء . بتلاتها الداخلية منمشة
بالاخضر || ازهارها يستمر من شباط الى نيسان .


١٠٤٧٣ - دُمَيْكَةُ مَغْبُونَةٍ
Galanthus plicatus (S).
Perce-neige plissé (F).
نوع من الدميكة اوراقها ثلاث . نصلها ثنائي التخذيد
والكظر يبدو كانه مغبون ، طولها نحو ٣٠ سم وعرضه ٣ .
شراخها يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . زهرتها كبيرة القد
بيضاء اللون يعلوها موج اصفر . بتلاتها الداخلية منمشة
بالاخضر || ازهارها يستمر من اذار الى نيسان .




دَنَارَةٌ مُطَوَّقَةٌ




دَنَّةُ الْأَزْهَارِ




دَنَّةُ الْأَمِير



دَنَّةُ الْغَارِيْقُون دَنَّةُ اللَّحَاء



دَنَّةُ النَّمْلِ دَنَّةُ رَوَاحَةِ



دَنَّةُ شَائِكَةِ دَنَّةُ عَطْرَةِ



دَنَّةُ مَذْبَةِ



دَنْدُ الْمُلُوكِ



دَنْدُ بَرِي



دَنْدَرُوب

مستغلف الرأس الاسود ، اسمر المدب والرواحب ، اطحل اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٤٠ يوماً يتقضي في التربة تحت الجشالة .

١٠٤٨٩ - دَنْج Propolis(F). Propolis Bee-glue(E).

صمغ رائنجي يلتقطه النحل ويستعمله لسد شقوق القفير ولستر الاساخ التي لا يتسكن من نقلها الى خارج المباءة .

١٠٤٩٠ - دَنْد Médiciner (F). Jatropha (E).

جنس جنبات ونباتات عشبية معمرة من فصيلة الفربيوليات . مهدها المناطق الحارة . اوراقها مركبة قرصية متعاقبة معنقة طويلة الزناد ومنها زغنية النصل . ازهارها مظلية التجسج ، هامية الارتكاز ، طويلة الشمراخ || انواعه عديدة اشهرها دند الملوك .

١٠٤٩١ - دَنْدُ الْمُلُوكِ * ، جَنْرُوفَتِه ، حَبُّ الْمُلُوكِ

Jatropha curcas (S). Médiciner cathartique, Gros pignon d'Inde (F). Jatropha, Physic-nut, Spurge nettle (E). Brechnussbaum, Purglernussbaum (D). Fagiolo d'India, Giatrofa catarica (I).

نوع من الدند وهو جنبة مستقيمة الساق جميلة الشكل تملر من ٨٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها معنقة متعاقبة مركبة اصبعية مفرصة || يستخرج من ساقها واوراقها عصارة لبنية طيبة ومن بزورها مادة زيتية فعالة نسبياً نحو ٣٠ ٪ . بزورها مسهلة نافعة اذا استعملت برؤية وقد تصبح مقبنة سامة عند الاكثار منها .

١٠٤٩٢ - دَنْدُ بَرِي * ، قَرْقُس Curcas (S).

Curcas, Pignon d'Inde, Noix des Barbades (F).

جنبة طبية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة الفربيوليات . مهدها البلاد الحارة . ساقها زباء لبنة العصارة . اوراقها معنقة مركبة مفرصة . ازهارها قرصية تاجية ، ثمارها حبوب كروية || حبوبها طيبة وعصارتها كذلك .

١٠٤٩٣ - دَنْدُ آم Dendrodochium

جنس فطور مجهرية من عمارة الوطحانيات وفصيلة الكشيات . جربه الكندية كثيرة الفروع العادمة الارتفاع . كئائده وحيدة الخلية ، اسطوانية الشكل ، مستطيلة الاطراف . ساداته مجنية دقيقة الزغب || انواعه قليلة العدد والاذى .

١٠٤٩٤ - دَنْدُ آلَة Pépinière (F).

Nursery (of trees) (E).

هو مكان استنبات الغراس الشجرية .

١٠٤٩٥ - دَنْدُ رَانَ هو الآفاق ، اطلبه .

١٠٤٩٦ - دَنْدَرُوب * Dendrobium (S).

Dendrobe (F). Dendrobium (E).

جنس نباتات اوعية جذمورية معمرة من فصيلة السحليات . منتها بعض مناطق الشرق الاقصى || سوقها مفصلي . اوراقها متباينة الاشكال ، جلدية النصال . ازهارها كبيرة . مقسوية الفصل والبتلات ، مختلفة الالوان ، رائعة الجمال ، عطرية العرف || انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٤٩٧ - دَنْدَرُوبُ أَفْرُودَيْت

Dendrobium Aphrodite (S).

Dendrobe Aphrodite (F).

نوع من الدندروب . منتها بيرمانية . ساقها تملر من ١٠ الى ٢٥ سم . اوراقها جلدية النصال ، اهليجية الشكل ،

نمداها عنابية اللون ، يملوها من ترجة صدرها حتى شرجها خيوط ذهبية دقيقة . ارجلها وقرونها الاستشعارية برتقالية . تعيش في الاحراج تحت الحجارة . لا ضرر منها .

١٠٤٨٢ - دَنَّةُ الْغَارِيْقُون * Oxyporus rufus (S).

Oxyore roux (F).

حشرة من الدنيات طولها نحو ١٠ مم . رأسها اسود . صدرها احمر . بطنها برتقالي المدب اسود الجانب . نمداها الى السواد تملوها ماجة زرقاء || تعيش على معظم الفطور اخصها الغاريقونيات .

١٠٤٨٣ - دَنَّةُ اللَّحَاء * Siagonium quadricorne (S).

حشرة من الدنيات طولها من ٥ الى ٦ مم . لونها اسود او بني . قرونها الاستشعارية طويلة . الذكر يحمل على رأسه أربعة قرون || تعيش تحت لحاء الاشجار الضعيفة والمريضة .

١٠٤٨٤ - دَنَّةُ النَّمْلِ * Othius myrmecophilus (S).

حشرة من الدنيات طولها نحو ٥ مم . لونها اسود نمداها الى الزرق . تعيش مع النمل .

١٠٤٨٥ - دَنَّةُ رَوَاحَةِ * Paederus riparius (S).

حشرة من الدنيات صغيرة القد طولها نحو ٨ مم . رأسها اسود ، صدرها اصهب صناعي . بطنها الى الصبهة الزاهية . طرفها اسمر . نمداها الى الزرق || تعيش قرب الماء وعلى الزراعات المروية تفترس الارق ويمكن مختلف الحشرات .

١٠٤٨٦ - دَنَّةُ شَائِكَةِ * Emus hirtus (S).

Staphylin bourdon (F).

حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٦ مم . جسمها شائك . هلبها ذهبي اللون دقيق الحمة . رأسها وجسمها الى الصفار البني . نمداها الى الزرق السمر || تعيش تحت الحجارة وفي المزابيل .

١٠٤٨٧ - دَنَّةُ عَطْرَةِ * Staphylinus olens (S).

Staphylin odorant (F).

حشرة من الدنيات طولها نحو ٢٥ مم . لونها الى السواد الداكن . تعيش تحت الحجارة تألف الاحراج والحقول والبساتين . يفوح منها عند لمسها رائحة عطرية مستحبة .

١٠٤٨٨ - دَنَّةُ مَذْبَةِ * Paederus fuscipes (S).

Paedère fourchu (F). Paederus fuscipes (E).

حشرة فانصة من فصيلة الدنيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف الزراعات المروية والمواقع التي يكثر فيها العشب . قوتها الارق ثم مكن الحشرات || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ مم . ثوبها ثلاثي الالوان . رأسها والزمام الاخير من بطنها سود ، كوسلها والباقي من بطنها وجرامزها الى الشقحة الصنابية الموج . نمداها الى الزرق البحرية . رأسها مستدير الجرم ، قصير الخطم ، ضليح الفكين . عيناها صغيرتان ماحتان . زباناها شطيان مستطيلان . ظهرانها يلحف الزمام الاول من البطن . بطنها ذلق المؤخر ينتهي بشرج مذهب ثنائي السرك . ارسافها خاسية العقل || الذكر اكبر قدأ من الانثى والمع ثوباً منها واطول زبناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجمالاة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر تشرين الاول . تسرح في النهار . تسافد في اواخر آب . تجمع المكن على سطح التربة تحت الاوراق اليابسة والعلبل || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ١٦ الى ٢٠ مم . جسمها مستطيل الشكل ،

١٠٥٠٣ - دندل *، ميملولس، مقنعة

Mimulus (S). Mimule (F). Monkey-flower (E). Ganklerblume (D). Mimolo, Mimulo (I).

مقنعة تسمية الامير مصطفى الشهاني. جنس نباتات عشبية ونحشوشية من فصيلة الخنازيريات. انواعه نحو ٣٠ معظمها بري وبعضها زراعي تزييني. اوراقها متقابلة لاطحة ضيقة النصل. ازهارها ابطية معلاقية فردية كبيرة الحجم، تويجها يشبه قناع مثلي الروايات الهزلية. الوانها زامية متعددة || اشهر انواعه ما يتبع.

١٠٥٠٤ - دندل أشدق Mimulus ringens (S).

Mimule à gueule béante (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. ساقها فرعاء. اوراقها مستطيلة حاضنة، نصلها ملس البشرة، متشاري الخافة. ازهارها متوسطة القد، مشدقة، بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٠٥٠٥ - دندل أصفر Mimulus luteus (S).

Mimule jaune (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تملو من ٢٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها اهليلجية مستطيلة. نصلها مسنن الخافة. ازهارها الى الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٠٥٠٦ - دندل ثنائي اللون Mimulus bicolor (S).

Mimule bicolore (F).

نوع من الدندل وهو عشبة حولية تملو من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقها مستطيلة نصلها ملس البشرة لامع الخضار. ازهارها قصيرة المعاليق كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم. لونها ابيض واصفر || ازهارها صيفي.

١٠٥٠٧ - دندل دويكي Mimulus primuloides (S).

Mimule-Primevère (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تملو من ٨ الى ١٥ سم. اوراقها قرصية ضمية اهليلجية الشكل، نصلها ازغب البشرة. ازهارها فردية طويلة المعاليق الخيطية، لونها الى الصفار الذهبي || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين.

١٠٥٠٨ - دندل شقيقي، دندل كرودينالي Mimulus cardinalis (S).

Mimule cardinal, M. écarlate (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. ساقها منتصب فرعاء. اوراقها بيضيه حاضنة، نصلها بارز المروق مسنن الخافة. ازهارها كبيرة القد ارجوانية اللون مسكية الرائحة || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٠٥٠٩ - دندل لرج Mimulus glutinosus (S).

Mimule visqueux (F).

نوع من الدندل وهو جنبه معمرة عديدة الضروب. ساقها لرجة تملو من ٥٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها مستطيلة حاضنة، نصلها ملس البشرة مسنن الخافة. ازهارها قصيرة المعاليق، كبيرة القد، مختلفة الالوان الزاهية || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول.

١٠٥١٠ - دندل مسكي Mimulus moschatus (S).

Mimule musqué (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة لرجة مسكية الرائحة تملو من ٢٥ الى ٣٥ سم. ساقها منبسطة منبطحة. اوراقها

معتدلة الحجم. ازهارها تنشب في اباط مفاصل الساق وهي صفراء اللون، برتقالية الشفيفة المطوقة بمحار ابيض. تنويرها يستمر طوال شهر تموز.

١٠٤٩٨ - دندروب فاخير Dendrobium speciosum (S).

Dendrobe superbe (F).

نوع من الدندروب. منبتها الهند والافغان. ساقها غليظة ترتفع من ٢٥ الى ٣٥ سم. اوراقها تعد من ٢ الى ٣، نصلها اهليلجية، جلدية النسيج. ازهارها عقودي التجميع. ازهارها عاجية اللون. شفيفاتها مرقوشة بالاسود. تنويرها يستمر طوال فصل الخريف.

١٠٤٩٩ - دندروب نبيل Dendrobium nobile (S).

Dendrobe noble (F).

نوع من الدندروب. منبتها الصين. ساقها ترتفع من ٦٠ الى ١٨٠ سم. اوراقها عديدة، من ١٢ الى ١٨، نصلها اهليلجية بحيلة الخضار. ازهارها عقودي التجميع. ازهارها وردية المحار، عاجية الوسط. شفيفاتها قلبية الشكل، بيضاء اللون تعلوها بقع قرمزية || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران.

١٠٥٠٠ - دندروبوات * Dendrobates (S).

Dendrobate (F). Dendrobates (E).

جنس ضفادع قازقة من فصيلة الرئائيات. انواعه المعروفة قليلة العدد مهدها بعض مناطق امريكا الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد. ذكورها تطول من ٥ الى ٦ سم. واناثها تطول من ٦ الى ٧ سم. رؤوسها معتدلة الشكل لامستعرضة. اخطامها شبه مخروطية. فكوكها العليا والسفلى عادمة الاسنان. اصابعها طليقة في القوائم الامامية ومثبته بحظاب ضيق لا يتجاوز الزام الاول في القوائم الخلفية || جلودها مبعثرة الثمول والغدد الفارزة. فرزها قلوي المادة، نشيط السم، كان ولا يزال يستعمل في تسميم نبال بعض القبائل || اثوابها الى السمرة البنفسجية الخضراء المواج يعلوها تخطيط قاطب اغبر ورقشة دقيقة متباعدة بيضاء || تعيش من ١٠ الى ١٢ سنة. تألف المواقع القريبة من المناقع وبحاري الماء. سعيها على الارض قفز رشيق معتدل المجال. قوتها الحشرات والديدان || اناثها تسرا من ١٠٠ الى ١٢٠ دعبلة ضمن شلة متشعبة تطرحها عند اطراف المناقع في المياه الضحلة.

١٠٥٠١ - دندروبوفوم Dendrophoma

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات. بكتيدات لا قياسية النشوء منها ادمية ومنها سطحية، جميعها كروية سمكة الجول حلبيية المتق. شفيراتها متشعبة. بويضاتها اسطوانية شفافة || انواعه قليلة بعضها يعثر في النباتات الحرجية فيركب الاغصان والافناد دون أن يؤذيها.

١٠٥٠٢ - دندوك * Dendroica (S).

Dendroica (F). جنس طير من الجوائم سنيات المناقير وفصيلة المنطليات. انواعه المعروفة نحو ٥٠ منتشرة من الهند الى امريكا الجنوبية والشمالية || اجسامها صغيرة تطول من ١٢ الى ١٦ سم. اثوابها متباينة الالوان تختلف مع اختلاف الانواع رؤوسها وارديتها واجنحتها وازوارها واذنابها دائماً ملونة. محاسرها وصدرها واباطلها وبطنها غبراء اللون او بيضاء او متمشة || قوتها الحشرات والثمار اليانعة والبزود.



دندروبوات



دندك



دندل

معنقة بيضية ذلقة الزام الاخير. نصلها خلي البشرة. ازهارها الى الصفار الفاقع يعلوه توشيم اسمر || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٠٥١١ - دُنْدُلُ نَحَاسِي (S). *Mimulus cupreus* (S).
١٠٥١٢ - دُنْدُلُ وَرْدِي (F). *Mimule cuivr  * (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تملو من ١٥ الى ٢٥ سم . ساقها فرعاء منبسطة كثيرة الورق . اوراقها ثلاثية العروق البارزة . نصلها مالس البشرة مسنن الحافة . ازهارها نحاسية اللون يعلوها موج اصفر . ضروبها عديدة تختلف بالوانها || ازهارها صبي .

١٠٥١٢ - دُنْدُلُ وَرْدِي (S). *Mimulus Lewisii* (S).
١٠٥١٣ - دُنْدُلُ وَرْدِي (F). *Mimule rose* (F).

نوع من الدندل وهو عشبة معمرة تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها اهليلجية حاضنة . ازهارها وردية اللون كبيرة القد فارشة . ازهارها صبي .

١٠٥١٣ - دُنْدُلُ وَرْدِي (S). *Stereum, Thelephora* (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدندميات ، انواعه عديدة منها طفيلية تعيش على النسيج النباتية المجروحة ومنها رمية تعيش على الاخشاب اليابسة والمقطوعة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٠٥١٤ - دُنْدُلُ السِّنْدِيَّانِ*، عَفَنُ نُخْرُوبِي*
Stereum frustulosum, Thelephora perdrix (S).
١٠٥١٥ - دُنْدُلُ خَشَبِي* (S). *Stereum rugosum* (S).

فطر مجهرى رمي يركب اخشاب السنديان اليابسة والمقطوعة فيعطها || مظهره الخارجى دمايل فطرية طحاء اللون لا قياسية الشكل والحجم كثيفة التجميع تتركب صفحة الخشب الخارجية فتسبب نخوها بعد انحلال نسجها . يكافح باستعمال مركبات النحاس .

١٠٥١٥ - دُنْدُلُ خَشَبِي* (S). *Stereum rugosum* (S).
١٠٥١٦ - دُنْدُلُ شَالِك* (S). *Stereum hirsutum* (S).
فطر رمي مجهرى يركب البندق وبعض الاشجار الخرجية اخصها الزان والسنديان . ومنهم من اعتبره الودج الرئيسى للآكلة التي تعطب جلوع واغصان السنديان || مظهره الخارجى دملة تملو الاعضاء المقطوعة في مستوى اللحاء والشكير ثم تقضي على الحواجز الحليوية طبقة بعد طبقة حتى القلب . اما الفطر فايض اللون تتوسطه بقعة حنطية وتفوح منه عند اللمس رائحة عطرية مستحبة كانها الويلا .

١٠٥١٦ - دُنْدُلُ شَالِك* (S). *Stereum hirsutum* (S).
١٠٥١٧ - دُنْدُلُ قِرْمَزِي*، وَرَزَاز*
Stereum purpureum, Thelephora purpurea (S).
١٠٥١٨ - دُنْدُلُ قِرْمَزِي* (F). *Maladie du plomb* (F).
فطر مجهرى يتطفل على عدة نباتات اخصها الاجاص

والافلوس والتفاح والخور والحنان والحوخ والدراقن والدلب والزند والزهروور والسفندر والسوقم والصفصاف والنيراء والقيقب والكرز والكرمة واللوز والمشش والمضاخ . مظهره الخارجى على الاوراق التي يصلها من اي جرح كان في الشجرة ، مشحة رصاصية اللون تملو النصل على صفحته العليا فتدوم عدة اسابيع ثم تنحرف الى اللون الحنطى بعد ان تجمع صفحة النصل السفلى فتسبب الاعبال الباكر || وهو على الاثنان والنوامي مشحة خلية رصاصية تدوم بعض الوقت وتسبب ، عند تفشيها ، املاص الازهار قبل عقدتها || يكافح باقتطاع الاثنان المصابة ويتطهير الجروح بمحلول زيت الكتان مع الزيرقون .

١٠٥١٨ - دُنْدُمِيَّات* (S). *Thelephoraceae* (S).

١٠٥١٩ - دَقَف (F). *Cachexia* (F).
١٠٥٢٠ - دَقَف الكبد ، دُوْدَة الكبد (S). *Distoma hepatica* (S).
١٠٥٢١ - دَقَف عَظْمِي (F). *Cachexie osseuse, Ost  oclastie, Ost  omalacie* (F).
١٠٥٢٢ - دُنْفُصَة الزَنَابِير* (S). *Melittobia acosta* (S).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدعاميات . تتميز بدعاماتها غير المثورة . نكاعها تلحف كميات جامدة ، صفحاتها الخسبة سفلية الاتجاه || اجناسها وانواعها قليلة العدد منها جنس واحد يهيم الاقتصاد الزراعى يدعى دندم .

١٠٥٢٠ - دَقَف الكبد ، دُوْدَة الكبد (S). *Distoma hepatica* (S).
١٠٥٢١ - دَقَف عَظْمِي (F). *Cachexie osseuse, Ost  oclastie, Ost  omalacie* (F).
١٠٥٢٢ - دُنْفُصَة الزَنَابِير* (S). *Melittobia acosta* (S).
مرض يصيب البقر والضأن فيؤذيها . سببه دزيدات طفيلية من العريضات تستقر في الكبد بعد ان تكون يويضات ذرية تبتلمها الابقار والاغنام مع الاعشاب المربوبة بهذه الديدان .

١٠٥٢١ - دَقَف عَظْمِي (F). *Cachexie osseuse, Ost  oclastie, Ost  omalacie* (F).
١٠٥٢٢ - دُنْفُصَة الزَنَابِير* (S). *Melittobia acosta* (S).

مرض يعترى الماعز سببه نقص في تمثيل الغذاء ينتج عنه ضعف ظاهر في بعض اجزاء الهيكل العظمي يعود الى قلة الفسفات وعدم اتزان العناصر الكلسية في جسم الحيوان .

١٠٥٢٢ - دُنْفُصَة الزَنَابِير* (S). *Melittobia acosta* (S).
١٠٥٢٣ - دُنْفُصَة المَن*، أَفْلُونُسُ التَّفَاح* (S). *Aphelinus mali* (S).

١٠٥٢٤ - دُنْفُصِيَّات* (S). *Eulophidae* (S).
١٠٥٢٥ - دُنْفُصَة المَن (F). *Eulophid  s* (F).
١٠٥٢٦ - دُنْفُصَة المَن (F). *Eulophid  s* (F).

١٠٥٢٣ - دُنْفُصَة المَن*، أَفْلُونُسُ التَّفَاح* (S). *Aphelinus mali* (S).
١٠٥٢٤ - دُنْفُصِيَّات* (S). *Eulophidae* (S).
١٠٥٢٥ - دُنْفُصَة المَن (F). *Eulophid  s* (F).
١٠٥٢٦ - دُنْفُصَة المَن (F). *Eulophid  s* (F).
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نافعة تتطفل على عدة حشرات ضارة اخصها الزنابير والمن القطني . حشرات صغيرة طولها دون المليمتر الواحد . زباناها صغيرة ودقيقة . ارساغها رباعية العقل . اثوابها متباينة الالوان . اشكال ذكورها تختلف عن اشكال انثائها || اشهرها دنفصة المن القطني ودنفصة الزنابير .



دندم السنديان



دندم قرمزي



دنفصة الزنابير



دنفصة المن

مربع . وكان في الماضي يساوي ٩١٩ متراً مربعاً وثلاث أمتار المربع .

١٠٥٣٥ - دَنِيغَات ٥ Staphylinidae (S).
Staphylinidés (F). Staphylinidae, Rove beetles (E).
Kurzflügler, Kurzflügelkäfer (D).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها تبلغ ٢٠٠٠ معظمها صغير القد . قرونها الاستشعارية مختلفة الاشكال والقواصل . اجنحتها لا قياسية الحجم والشكل || تعيش في مختلف البيئات وعلى مختلف الاشياء . منها مفترسة وغيرها يركب الزهور وبعضها يعيش مع النمل وفي الزبل وعلى الفطور وتحت لحاء الاشجار اليابسة .

١٠٥٣٦ - دَنِيديَّة ٥ Danaidia (S).
Danaidia (F). Danaidia (E).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة البهشيات . اوراقها متعاقبة سنانية النصل الجامد الصفحة . ازهارها تاجسية الارتكاز ، ذكية العرف ، برتقالية اللون . زراعتها التزيينية شائعة الاستعمال . ترغب في المواقع الظليلة .

١٠٥٣٧ - دَنِيْسَة ٥ Heterosporium
جنس فطور مجهرية من الريدانيات وفصيلة اللطحيات . جريه الكندية نجيلة مستطيلة ملونة . كئانده اسطوانية مضمة ، مستديرة الطرف ، ثلولية الغلاف || انواعه المؤذية قليلة اعرفها ما يتبع .

١٠٥٣٨ - دَنِيْسَة الاسبانج ٥ Heterosporium variabile (S).

فطر مجهري يتطفل على الاوراق فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ١٠ مم . تركب نصل الاوراق . تبدو شقراء اللون ثم تنحرف الى السمرة فيغشاها خلل كثيف التجميع اسود المواج يقضي على النسيج المنحارة فيؤذي النبات بعد ان يعطب كامل النصل || يكافح عند ظهوره باستعمال بعض املاح النحاس الخفيفة .

١٠٥٣٩ - دَنِيْسَة الاغروان ٥ Heterosporium lilacis (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الاغروان . مظهره الخارجي يقع صغيرة ، مبثرة ، لا قياسية الشكل ، سمراء اللون ، عابقة الحتار ، تركب نصل الاوراق على صفحته . يسبب يباس الاوراق ويؤذي النمو والازهار || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية الخفيفة .

١٠٥٤٠ - دَنِيْسَة الثوم ٥ Heterosporium alli (S).
فطر مجهري يتطفل على اوراق الثوم . مظهره الخارجي يقع مبثرة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها الى الصفرة تركب الاوراق فتسبب ذبولها .

١٠٥٤١ - دَنِيْسَة الشوفان ٥ Heterosporium avenae (S).

فطر مجهري يتطفل على عصف الشوفان في الازمنة والمواقع الرطبة || مظهره الخارجي يقع مستطيلة تركب العصف بموازية اعصابه ، تكثر عند حافة النصل ، لونها الى السمرة ، تسبب يباس النسيج المنحارة .

١٠٥٤٢ - دَنِيْسَة ٥ Didymella (S).
جنس فطور مجهرية من السخاسيات وفصيلة المشويات . اعصابها مضمة ، بوفها مستطيل شفاف ، ثنائي الخلية

١٠٥٢٥ - دَنَق هو الحرق ، اطلبه .

١٠٥٢٦ - دَنَقَار ٥ Dinocarsis (S).

Dinocarsis (F). Dinocarsis (E).

جنس حشرات نافعة من فصيلة الشرافيات ورثة غشائيات الاجنحة المصنوعة . انواعه عديدة موطنها معظم مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو المعتدلة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الحرشنيات وذوات الجناحين || اجسامها صغيرة القد تطول نحو ١ مم . رؤوسها مستعرضة ، قرونها الاستشعارية خيطية مستطيلة . جواشها كبيرة . بطونها محروطة المؤخر . اناثها مجنحة . ذكورها صغيرة الاجنحة القصيرة . اناثها تراوح بين الاسود والاخضر الاليس . اجنحة الاثني موشمة بالبي .

١٠٥٢٧ - دَنَقَة * ، زُوَان مُسَكِر Lolium temulentum, Bromus temulentus, Crepaea temulentum (S). Ivraie, Lolium, Zizania, Ivraie envrante (F). Ivray, Cheat, Darnel (E). Dolik, Taumel-lolch (D). Lollo, Loglio, Zizzania, Pane vino (I).

نبات عشبي حولي من النجيليات ينبت بين الزروع فيفسدها . حبه مسكر سام للانسان والحيوان ما عدا الدجاج .

١٠٥٢٨ - دَنَقَلَة * ، جُنُقَلَة Cincus cincus aquaticus (S). Cincle plongeur (F). Water-ouzel, Dipper (E).

طائر من دجاج الماء وفصيلة التفلقيات . يعيش قرب المياه العذبة . صغير القد بحجم البليل ، ابيض الصدر ، والبطن وسائر اسود . يسبح ويغوص ويصطاد احوام .

١٠٥٢٩ - دَنَقُول ٥ Donacicola (S).

Donacicole (F). Donacicola (E).

جنس طير من الجواثم محروطيات المناقير وفصيلة التنوطيات . انواعه المعروفة ستة اعطائها تمتد من جزر الزابج الى استرالية || اجسامها صغيرة مكثلة . رؤوسها كبيرة محروطة المناقير . اذناها صغيرة مدببة الاطراف . اناثها الى الشقعة . رؤوسها سود . بطونها بيض . صدورها مرفرفة او متمشة || قوتها الحشرات والثمار اليانعة والبروز .

١٠٥٣٠ - دَنَكْسَة Anaerobiose (F).

Anaerobiosis (E).

الدنكس حياة الكائنات الدنكسية اي الكائنات اللاهوائية .

١٠٥٣١ - دَنَكْسِي ، لاهوائي ، أنيروبي

Anaerobique (F). Anaerobic (E).

نعت تعريفية يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي تستطيع الحياة بعيداً عن الهواء .

١٠٥٣٢ - دَنَكْسِيَّة ، لاهوائية ، أنيروبيَّة

Anaerobie (F). Anaerobe (E).


صفة الكائنات الحية المجهرية التي تستطيع العيش منعطمة عن الهواء مستمدة طاقتها الحياتية من العناصر العضوية التي تفسخها .

١٠٥٣٣ - دَنَكُو Dingo

هو ذئب استراليه ، اطلبه .

١٠٥٣٤ - دُنُم ، دُونُم Donum, Décare


الدنم مقياس سطحي يساوي بالعرف الحالي الف متر




دنقار



دنقة




دنقلة



دنقول




دنديه



دنيسة الاسبانج

١٠٥٥٤ - دَهْم ٥ Effectif (F). Effective (E).

الدهم ج دهوم. مجموع الافراد الذين ينتمون الى فئة معينة او فصيلة او قبيلة... راجع عداد.



دَبِيغَةُ الْبَنْدُورَةِ

١٠٥٥٥ - دُهْن Hulle essentielle (F). Essential oil (E).

مادة زيتية دسمة تستخلص من النبات او الحيوان وهي تدعى زيتاً اذا كان مصدرها النبات وشحماً اذا كان مصدرها الحيوان. وهي تتكون اساساً من الكربون والاكسجين والهيدروجين، وقد تنحل عند تسخينها الى مجموعتين مجموعة الغليسرين ومجموعة الحوامض العضوية || والدهن الذي يعتبر من الاغذية الضرورية للجسام الحيوانية لانه يمدّها بالحرارة اللازمة للنشاط، يوجد بنسب متفاوتة في بزور معظم النباتات وفي لحوم والبان الحيوانات.

١٠٥٥٦ - دُهْن الْقَدَاح Nérol (F). Neroli (E). هو عطر القداح الذي يستحصل من تقطير زهر النارج.

١٠٥٥٧ - دُهْن الْقَطْرَان Huile de goudron (F). Tar oil (E). مزيج من القطران والدهن الثقيل.

١٠٥٥٨ - دُهْن الْكِتَان، زَيْت الْكِتَان Huile de lin (F). Linseed oil (E). هو عصير بزر الكتان.

١٠٥٥٩ - دُهْن اللوز Huile d'amandes (F). Oil of almonds (E). هو عصير لباب اللوز.

١٠٥٦٠ - دُهْن النَّارِجِيل، سَمْن نَبَاتِي Cocose هو عصير ثمار النارجيل.

١٠٥٦١ - دُهْن النَّخِيل Huile de palme (F). Palm-oil (E).

دهن اصفر اللون يستخرج من ثمرة نخل الدهن وهو دهن غير مأكول يستعمل في صناعة الشمع والصابون.

١٠٥٦٢ - دَهْنَج Malaxide جنس نباتات عشبية برية متعقبة من فصيلة السحليات. ازهارها عنقودية. يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية.

١٠٥٦٣ - دَهْنَج Malachite هو كربونات النحاس الطبيعي المهترت. لونه جميل الخضار خملي الموج. تبلوره لا قياسي الشكل يكثر فيه التصفيح الثمن والموشور المعيني القائم. يقطع ويصقل بسهولة. يذوب في الحوامض وفي الامونياك. ثقله النوعي يراوح من ٣.٧ الى ٤.١ صلابته يراوح من ٣.٥ الى ٤.

١٠٥٦٤ - دُهْنِي، شَحْمِي Sébacé (F). Sebaceous (E). صفة ما كان تركيبه كالشحم او كانت طبيعته طبيعية الشحم.

١٠٥٦٥ - دُهْنِين Oléine (F). Oleine (E). اصل دهني لا لون له يتكون في الاجسام الدهنية.

١٠٥٦٦ - دَوَاء Médicament (F). Medicament (E). هو العلاج الموصوف لمرض معين.

١٠٥٦٧ - دَوَاء الْحَبَّة راجع جنطيانا صفراء.

شغبي الارتكاز الزقي || انواعه المؤذية قليلة اعرفها الثلاثة التالية.

١٠٥٤٣ - دَبِيغَةُ الْبَنْدُورَةِ ٥

Didymella lycopersici, Diplodina lycopersici (S). فطر مجهري يصيب شتول البندورة والباذنجان فيؤذيها. مظهره الخارجي يكون على شكلين اما بقع سمر متلاصقة مستطيلة يبلغ طولها نحو ٦ سم. تركب الساق على ارتفاع قليل عن التربة، واما اطواق من البقع المتراسة تحيط بالساق كالسوار || اضراره جسيمة ان استحکم الزراعة لانه يعطب الشتول ويؤذيها || يكافح باستعمال الفواطير المرتكزة على النحاس.

١٠٥٤٤ - دَبِيغَةُ الثَّمَّاح ٥

Didymella mali, Didymella voglinoi, Sphaeropsis pseudo-diplodia (S).

فطر مجهري ثانوي قليل الإذى يركب قشور الاغصان والافناد الموصومة ولا يقرب القشور السليمة || مظهره الخارجي بقع بيضية الشكل مهدبة حنطية اللون.

١٠٥٤٥ - دَبِيغَةُ الْكَيْشْمِش ٥

Didymella applanata, Didymosphaeria applanata, Mycosphaerella rubina, Sphaerella rubina, Coniothyrium (S).

فطر مجهري يصيب الفروع والبراعم والاوراق. مظهره الخارجي بقع بنفسجية اللون تركب البراعم الابضية ثم ينتشر على الاوراق من جانبي الضلع فيبدو بقعاً مقترنة الزوايا لونها الى السمرة. وهو على الفروع فقط سود متلاصقة تسبب جفاف البشرة وسقوطها || يفتك ويعطب في المناطق الرطبة الباردة || يكافح باستعمال سائل بوردو وغيره من الفواطير الفعالة.

١٠٥٤٦ - دَهَامِين هو الجذاب، اطلبه.

١٠٥٤٧ - دَهَامِين شُكْرَانِي راجع ابرة العجوز.

١٠٥٤٨ - دَهَانَج Chameau (F). Camel (E). الجمل الضخم ذو السنامين.

١٠٥٤٩ - دَهَب Nécrose (F). Necrosis (E). هو النخر، اطلبه.

١٠٥٥٠ - دَهْبَل * Casarca (S). Casarca (F). جنس طيور مائية من البطيات صفحيات المناقيد كفيات القدم. انواعه ستة جميعها من القواطع. اعطائها تشمل البلاد الاسيوية والارربية والافريقية. جميعها كبيرة الجفة قصيرة القوائم متباينة الالوان الزاهية، اطواقها وافانيكها واطراف سواقطها سود. اشهر انواعها الشهرمان المعروف بأبي فرة.

١٠٥٥١ - دَهْنِي Compression forte (F). Strong compression (E).

الدهق : شدة الضغط. ادعت الحجارة : اشتد تلازها ودخل بعضها في بعض.

١٠٥٥٢ - دَهَق هو السوسن الابيض، اطلبه.

١٠٥٥٣ - دَهْلِيَّة هي الاضاليه، اطلبها.



دَبِيغَةُ الْكَيْشْمِش



دهبل

من القارة الافريقية . تألف الفياثي والبراري . عذوها قفز مستمر . قوتها الحشرات واساريها || اجسامها صغيرة تطول من ٢٤ الى ٣٢ سم . بما فيه الخنابة والذنب . رؤوسها مستفلطة . عيونها كبيرة جاحظة . خناباتها تطول من ٢ الى ٣ سم . اذناها ملقبة كبيرة . اذناها مستطيلة . ارجلها رباعية الاصابع . اثوابها الى الشقحة المتفاوتة السمرة . بطونها وصدرها تبنية اللون . اناثها عشارية الاطباء .

١٠٥٨١ - دَوَام (F). Perennality (E).
حالة الاستمرار الطويل .

١٠٥٨٢ - دَوَامَات (S).
Gyrinidae (S).
هي الجرنوسيات ، اطلبها .

١٠٥٨٣ - دَوَامَة * (S).
Cleodora (S).
Cléodore (F). Cleodora (E).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الارجل وفصيلة القشريات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية والبعض الآخر يمي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة ولا يقترب من الشطوط . اسرارها وافرة العدد . اجسامها صغيرة . ارجلها مجهزة بزوائد جانبية زعنفية الشكل . اصداؤها مخروطية ، شفافة ، سريعة العطب .

١٠٥٨٤ - دَوَائِر الطُول (F). Cercles de longitude
Longitude circles (E).

١٠٥٨٥ - دَوَائِر * (S).
Asellus (S).
Aselle (F). Asellus (E).
جنس دوبيات مائية من القشريات العليا ، متساويات الارجل ، وفصيلة الدوبيات . انواعها المعروفة عديدة معظمها من عظم البلاد الباردة وبعضها يعيش في بحيرات وغدران البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها اهليلجية مبطلة . قرونها الاستشعارية دقيقة ، مستطيلة . عيونها ناشزة صغيرة . قوائمها مهدبة منعقفة الاطراف المجهزة بمقاطم ذرية .

١٠٥٨٦ - دَوَائِرَات (S).
Asellidae (S).
Asellidés (F). Asellidae (E).
فصيلة دوبيات مائية من القشريات العليا متساويات الارجل . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في مياه الاقطار الباردة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مبطلة عادية الخاف ، واضحة الخلفات السككية متساوية القوائم || اعرف اجناسها واشهرها الدوبر والجيرة والمئة واللمنورية .

١٠٥٨٧ - دَوَبَل (F).
Ane de petite taille (F).
Young ass (E).
هو الحمار الصغير لا يكبر . جاء ان معاوية كتب الى ملك الروم : « لاردنك اربسا من الارارسسة ترعى الدوابل » || والدوابل ايضاً هو نخزير الارض (راجه).

١٠٥٨٨ - دَوَيْشِيْزَا * (S).
Dothichiza
جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . انواعه قليلة لا مؤذية . بكنيداته سطحية الارتكاز شاردة وفارشة . بويغاته بيضية الشكل بسيطة التركيب شفافة .

١٠٥٦٨ - دَوَاء سَائِل (F).
Brevage (F).
Beverage, Drench (E).
ماء يضاف اليه بعض الادوية وتسقاه الحيوانات الداجنة المريضة .

١٠٥٦٩ - دَوَاجِن ، رَوَاجِن ، حَيَوَانَات أَهْلِيَّة (F).
Animaux domestiques (F). Domestic animal (E).
هي الحيوانات الاليفة المستأنسة . اعرفها واشهرها الخيل والحمير والابل والفيلة والبقر والجمال والضان والمعر والخنزير والكلاب والسنائر والارانب والدجاج والبط والاوز والحمام والغرغر والتم والطاووس .

١٠٥٧٠ - دَوَاجِن قَرْنَاء (F).
Aumailles (F).
Horned cattle (E).
هي كبار الدواجن من ذوات الظلف كالابقار والجماليس .

١٠٥٧١ - دَوَاجِنِي (F).
Zootechnicien (F).
Zootechnician (E).
من تخصص بعلم الدواجن .

١٠٥٧٢ - دَوَّار (F). Rotary (E).
ما كان يعمل بالحركة الدورية .

١٠٥٧٣ - دَوَّار الشَّمْسِ هو عباد الشمس ، اطلبه .

١٠٥٧٤ - دَوَّارَات ، دَوَّلَابِيَّات (F).
Rotateurs, Rotifères (F). Rotifer, Wheel-animalcule (E).
صف حيوانات من شعبة اشباه الديدان .

١٠٥٧٥ - دَوَّارَات * (S).
Orbicular (S).
Orbiculés (F). Orbicular (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من متحجرات الاحقاب القديمة . جميعها شبه بيضية الشوزن ، معتدلة التبطيط ، ملتحمة باصداؤها بسويقات طينية قصيرة تخترق المصاريح السفلية الارتكاز || اعرف اجناسها واشهرها النواة والديسيتة .

١٠٥٧٦ - دَوَّارَة (F). Verticille (F). Verticili (E).
جماع اعضاء متشابهة متحلقة حول محور .

١٠٥٧٧ - دَوَّارَة * (S).
Orbícula (S).
Orbicule (F). Orbicula (E).


جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الدوارات . انواعها المعاصرة قليلة العدد يكثر وجودها في بحار البلاد الباردة والمنحرفة نحوها || تعيش على الصخور المغورة المتوسطة الغور . اصداؤها قرنية المادة ، بيضية الشوزن ، منبسطة المصاريح السفلى الرقيقة ، محدبة المصاريح العليا المتتابعة التحزير المستدير .

١٠٥٧٨ - دَوَّارِي ، ضُمِّي (F).
Verticillé (F).
Verticillate (E).
نمت تعريفي يطلق على ما كان شكله ، من الاعضاء النباتية ، كالدوارة .


١٠٥٧٩ - دَوَّاس (F).
هو الملاقي الابيض ، اطلبه .

١٠٥٨٠ - دَوَّالْ * (S).
Rhynchocyon (S).
Rhynchocyon (F).


جنس حيوانات لبونة حاشرة جاسة من فصيلة الحداديات . انواعه المعروفة خمسة منتشرة في معظم المناطق الشرقية والوسطى




دَوَّارَة




دَوَّارَة



دَوَّار



دوخر النعاج



دودة الحرير



دودة الحرير



دودة الحرير



فراشة دودة الدقيق

الدور الثاني : يبدأ بالانسلخ الاول اي الصومة الاولى التي تدوم نحو ٢٤ ساعة تمتنع فيها اليرقة عن الأكل ثم تعود فتتغذى مدة اربعة ايام .

الدور الثالث : يبدأ بالانسلخ الثاني اي الصومة الثانية التي تدوم نحو ٤٨ ساعة ثم تعقبها التغذية على مدة اربعة ايام .

الدور الرابع : يبدأ بالانسلخ الثالث اي الصومة الثالثة التي تدوم من ٣٦ الى ٤٠ ساعة ثم تعقبها التغذية لمدة اربعة ايام تأكل فيها اليرقة بشراهة لأنها تكون في مرحلة نموها السريع .

الدور الخامس : يبدأ بالانسلخ الرابع اي الصومة الرابعة التي تدوم من ٤٠ الى ٤٨ ساعة تعقبها التغذية النشطة مدة ثمانية او عشرة ايام تأكل اليرقة في خلالها اربعة اضعاف ما تأكله في ادوارها السابقة .

الدور السادس : وهو الدور الصلجي يبتدئ عندما تتوقف اليرقات نهائياً عن التغذية فتتساقط الشيج وتحول الشرائق . يدوم هذا الدور طبيعياً من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع تتحول فيه اليرقة الى عذراء ثم تخرج فراشة كاملة بعد ان تفرز مادة قلوية بنية اللون ترطب بها احد قطبي الشرنقة وتسبب تلف الحرير .

لذلك تقطف الشرائق بعد تساقط الشيج بعشرة ايام ويصار الى نشرها في الشمس نحو ٤ ساعات لتفطيس العذارى ومنعها من عطب الحرير . ثم تباع من يقوم بحلها . اما الحرير فهو مادة عضوية لزجة تفرزها غدتان مستطيلتان قائمتان على جانبي الجزء الامامي من القناة الهضمية ثم تتصلان عند الرأس فتكونان انبوبة واحدة تنفتح على الشفة السفلى فيسيل منها الحرير الذي يجمد قوامه عند ملامسته الهواء فتوجهه اليرقة حيث تشاء || نسج الشرنقة يستمر نحو ٣ ايام بطول المحيط نحو ٦٥٠ م . ينسج من قم اليرقة بمعدل ١٥ سم . بالدقيقة الواحدة .

١٠٥٩٧ - دُوْدَةُ الخِنْزِير * ، تريخين ، ترويشين Trichina spiralis (S). Trichine (F). Trichina, Thread-worm (E).

دودة من السلكيات الطفيلية تكثر في الخنازير والجرذان . تنتقل الى الانسان والحيوان حيث تعيش وتتكاثر في الامعاء ثم تنتقل مع الدم الى سائر اعضاء الجسم .

١٠٥٩٨ - دُوْدَةُ الخَوْخ هي كاربوكس الخوخ ، اطلبه .

١٠٥٩٩ - دُوْدَةُ الدَّقِيق * ، نَارِيَّة الدَّقِيق Asopia farinalis (S). Asople, Teigne des farines (F).

يرقة تعيش على الشارات النباتية والقش والثمار الجافة والدقيق والكسب والفلين ... فراشتها صغيرة القد من فصيلة الناريات تظهر من ايار الى تشرين تألف البيوت والافران والمطاحن . اجيالها الحولية ثلاثة .

١٠٦٠٠ - دُوْدَةُ الذَّرَّة هي غسقية الذرة الصفراء ، اطلبها .

١٠٦٠١ - دُوْدَةُ الزَّرْع ، سِثْرِيس الزَّرْع Scythris temperatella (S).

يرقة دودية غيطية تدخل تحت بشرة فصل النصف فتمتص عصارة النسج وتميتها . تركب الزرع لا سيما القمح فتؤذي . تظهر من ايار الى حزيران || فراشتها صغيرة القد سمراء

١٠٥٨٩ - دُوْدَةُ النِّعَاج * Dothiorella

جلس فطور مجهرية من فصيلة الصغيات . بكنيداتها ادمية محضونة ، تجمعها ونية ترقى بها حتى البشرة فتصدعها . جول القصمة جلدي التركيب يعلوه مق حليمي . بويغاتها بيضية او مستطيلة || انواعه عديدة تعيش على اللحاء والخشب دون ان تؤذي النبات .

١٠٥٩٠ - دُوْدَةُ النِّعَاج * Caloporus ovinus (S). Calopore des brébis (F).

فطر مأكل مستحب الطعم من فصيلة السميات ورتبة الدعاميات . يكثر وجوده في احراج السنوبر . يعيش على المواد النباتية المنحلة . نكته فارشة ، شبه قعبة الشكل ، تنفلق عند الادراك ، لونها الى البياض الاغبر يعلوه موج اصفر ، قطرها نحو ١٠ سم . ساقه قصيرة ، ضخمة . لحيتها سمكية ، غبراء اللون . رائحته رائحة اللوز .

١٠٥٩١ - دُوْدَةُ Ver (F). Worm (E).

دودة ج دود وديدان . والدود في علم الحيوان شعبة من عديمات الفقار عديدة الفصائل والاجناس والانواع معظمها طفيلي يعيش على المواد العضوية في الاجسام الحية وفي الجيف || وفي الاصطلاح يطلقون لفظة الدود ايضاً على يرقات ودعاميص واساريع الحشرات . ويقال لصغار الدود : دواد .

١٠٥٩٢ - دُوْدَةُ الأَرْض Ver de terre (F).

Earth-Worm (E). هي الخرطون ، اطلبه .

١٠٥٩٣ - دُوْدَةُ الأمْعَاء Helminthe (F).

Helminth, Intestinal worm (E). اسم شامل يطلق على الديدان الطفيلية التي تعيش في امعاء الانسان والحيوان كالصفر والعريضة الخ .

١٠٥٩٤ - دُوْدَةُ التَّفَاح هي كاربوكس التفاح ، اطلبه .

١٠٥٩٥ - دُوْدَةُ الجُدُور الثُّعْبَانِيَّة هي ثعبانية الجدور ، اطلبها .

١٠٥٩٦ - دُوْدَةُ الحرير * ، دُوْدَةُ القَز Ver à soie (F). Silkworm (E).

هي يرقة قزيرة الحرير . عرفها الصينيون من نحو ٣٥٠٠ سنة واحتفظوا بسر تربيتها وانتاج الحرير ما استطاعوا من الزمن لانهم كانوا يعاقبون بالاعدام كل من حاول اخراج مكن الحشرة من بلادهم . اما الآن وبعد ان عمت تربيتها جميع اقطار العالم ، يقدر متوسط انتاج الحرير الخام السنوي بنحو ٥٠ مليون كيلو . ومتى عرفنا ان كيلو الحرير الخام يحتاج الى ٦٧٥٠ شرنقة نستنتج ان الخمسين مليون كيلو تحتاج الى ٣٣٧,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ شرنقة تنتجها بعض البلاد اخصها الصين واليابان والهند وأمريكا وإيطاليا وفنسه وتركيه واسبانيه || لا نذكر شيئاً عن المكن (بدور القز) لأنها تستورد من الخارج في شروط صعبة معينة وضمن علب خاصة || بعد نفق المكن الذي يتم عادة بطرف اربعة ايام ، تعيش الدودة حياتها اليرقية التي تدوم نحو خمسة اسابيع حسب التطور النسبي التالي :

الدور الاول : من النفق الى ٥ او ٦ ايام . توضع الديدانات الصغيرة في مكان دافئ تراوح حرارته بين ٢٢ و ٢٥ درجة سنتيفراد ويوضع فوقها وبمناورها هامة ورق التوت لتتغذى بها .

١٠٦١١ - دودة القطن الشوكية*، دودة اللوز الشوكية، دودة لوز القطن، فراشة كنافيج القطن، إرياس إينسولانا

Earias Insulana (S). Chenille épineuse du cotonnier (F). Spiny bollworm (E). Stengelspitzbohrer (D).

يرقة يبلغ طولها عند اكتمال نموها نحو ١٥ مم. مقدمها ومؤخرها مستدقان. وسطها غليظ. لونها الى السمرة الخطية يعلوها موج جوي. جسمها مكسو بدرنات برتقالية اللون ترتكز على كل منها هلبة سمراء || تسرح في الليل. تسطو على النواصي واللوزيات الناشئة والكنافج الفتية فتثقبها وتتغذى من مواد بزورها الرخوة وتيلها المائع. فراشها صغيرة القد من فصيلة الليليات تدعى إرياس إينسولانا، اطلبها.

١٠٦١٢ - دودة القمح الثعبانية هي ثعبانية الخطه، اطلبها.

١٠٦١٣ - دودة الكبد راجع دنف الكبد.

١٠٦١٤ - دودة اللوز الشوكية

هي دودة القطن الشوكية، اطلبها.

١٠٦١٥ - دودة اللوز القرنفلية، دودة قرنفلية

هي يرقة عنجول القطن تسطو على اللوزيات فتعطبها وتؤذيها اشد الأذى (راجع عنجول القطن).

١٠٦١٦ - دودة بيضاء*

Ver blanc, Meunier, Mau (F). Grub (E).

هي يرقة الجمل الشائع اي الهنتون. تعيش من ٣ الى ٤ اعوام. جسمها مقوس الشكل، غليظ الطرف. لونها الى البياض اللؤلؤي. تسطو في اول عهدا على جذور بعض النباتات ثم يتفاجم شرها مع تقدم عمرها وكبر حجمها فيصبح عظيماً في عامها الثالث والرابع اذ انها لا تعف عن قرص اي نبات مهما كان جنسه او نوعه.

١٠٦١٧ - دودة ثعبانية

Anguillule (F). هي الثعبانية، اطلبها.

١٠٦١٨ - دودة حرير آريا

هي قزبة الخروع، اطلبها.

١٠٦١٩ - دودة حلزونية

Spiroptère (F). Spiropterus (E).

دودة سلكية طفيلية تعيش في امعاء بعض الفقريات.

١٠٦٢٠ - دودة حمراء هي السنغام، اطلبها.

١٠٦٢١ - دودة خضراء اطلب دودة القطن الخضراء.

١٠٦٢٢ - دودة زبّاء

هي يرقة أرجيا أنثيكا تلثم اوراق الاشجار اخصها الاجاص والتفاح والزعرور والورد والسنديان (راجع أرجيا أنثيكا).

١٠٦٢٣ - دودة غمّا*، دودة مقوسة

Noctuelle gamma (F). Gamma noctua (E).

هي يرقة فيتوميرا نما. لونها الى الخضار الباهت. طولها نحو ٣ سم. أرجلها البطنية طرفية الارتكاز مما يحدها

اللون، مهدبة الاجنحة، وحيدة الجبل الحولي تظهر من تموز الى آب. اطلب سبتريس الزرع.

١٠٦٠٢ - دودة الساق الثعبانية

هي ثعبانية لساق، اطلبها.

١٠٦٠٣ - دودة السمسم، دودة قرون السمسم

فراشة السمسم

Antigastra catalannalis (S).

يرقة خضراء اللون تعلوها بقع سود. طولها نحو ١٢ مم. تسطو على سوق السمسم وبزاعمه الزهرية وازهاره وثماره وتنسج خيوطاً تشبك بها اوراق النواصي حيث تخلد وتتحول الى عذراء || فراشها صغيرة القد من فصيلة الناريات طولها نحو ٧ مم. ثوبها الى البني يعلوه موج اصفر. زباناها حنطية مستطيلة جيلها الحولي واحد.

١٠٦٠٤ - دودة السنط الصغيرة

Nadiasa obsoleta (S).

يرقة سمراء اللون هلبية الجلد تركب اوراق السنط. فراشها تدعى نديازة مبدولة. اطلبها.

١٠٦٠٥ - دودة الشكير

هي كاربوكس الشكير، اطلبه.

١٠٦٠٦ - دودة الشوندر الثعبانية

هي ثعبانية الشوندر، اطلبها.

١٠٦٠٧ - دودة القصب الصغيرة

هي يرقة فراشة شيلو القصب تسطو على المصان والارز والذره، اطلب شيلو القصب.

١٠٦٠٨ - دودة القصب الكبيرة

هي السيزاميا، اطلبها.

١٠٦٠٩ - دودة القرمز*

Coccus cacti (S).


Cochinille du Nopal (F). Cochineal of Nopal (E).

حشرة من القرمزيات صغيرة القد طولها نحو ٨ مم. ثوبها الى الجؤوة. مهدها المكسيك ومنها انتقلت الى الهند والجزائر واسبانيه. تعيش على صبار الهند. يربونها لاستخلاص خضابها الاحمر القافى المشهور.

١٠٦١٠ - دودة القطن الخضراء*، دودة ورق القطن الصغرى، دودة خضراء

Laphygma exigua (S). Chenille défoliante, Noctuelle de la betterave (F). Sugar beet armyworm, Lesser armyworm (E). Heerwurm (D).

يرقة يبلغ طولها عند اكتمال طورها البرقي نحو ٢٥ مم. تبدو خضراء اللون ثم تنحرف تدريجياً مع السلاخاتها الى الاخضر الزيتوني فالزيتوني العابق. يعلوها من جانبيها خطان دقيقان لونهما الى السمرة يتوسطهما خط اصفر. تسرح في الليل. تسطو على ورق القطن والذره والبرسيم والشوندر الخ... فتثقب الاوراق وقد تلثم كامل النصل دون المروق || فراشها صغيرة القد من فصيلة الليليات تدعى لفيغمة، اطلبها.




فراشة دودة السمسم



دودة القرمز



دودة القطن الخضراء وفراشها



دودة القطن الشوكية وفراشها



الدودة البيضاء



دودة غمّا وفراشها

١٠٦٣٣ - دَوْرَان Rotation
الحركة حول محور أو دورة محورية .

١٠٦٣٤ - دَوْرَانِي ، دَوْرِي Rotatoire (F).
Rotatory (E).

١٠٦٣٥ - دَوْرَة Session
هي الفترة من الزمن التي تكون فيها اجتماعات إحدى الجمعيات التداولية صحيحة . وإذا انعقدت الاجتماعات في المدة المعينة قانوناً فهي الدورة العادية وإذا انعقدت بحكم الظروف في غير مدتها فهي الدورة غير العادية .

١٠٦٣٦ - دَوْرَة Cycle
سلسلة ظواهر تتساق بترتيب دقيق وانتظام مسير .

١٠٦٣٧ - دَوْرَة ثَلَاثِيَّة Assolement triennal (F).
Triennial rotation of crops (E).
هي الدورة الزراعية الثلاثية الاقطاع التي تتناوب فيها الزراعات على ثلاثة اعوام اي ان زراعة الحنطة لا تعود الى ذات القطم الا بعد زراعتين وحولين .

١٠٦٣٨ - دَوْرَة ثَنَائِيَّة Assolement biennal (F).
Biennial rotation of crops (E).
هي الدورة الزراعية الثنائية القطم اي التي تتناوب فيها زراعتان في حولين متتاليين .

١٠٦٣٩ - دَوْرَة دَمَوِيَّة Circulation du sang (F).
Systemic circulation (E).
الدورة الدموية هي حركة الدم في الجسم تحدث باندفاع الدم من البطين الايمن الى الشريان الذي يدفعه الى الرئتين حيث يتأكسد فيتحول من دم وريدي الى شرياني ويعود بواسطة الاوردة الرئوية الى الاذين الايسر الذي يدفعه الى البطين الايسر وهذا يدفعه بدوره الى الاجهر الذي يقوم بتوزيعه على جميع اجزاء الجسم || يقال ان اول من ذكر او اكتشف الدورة الدموية في الجسم كان الطبيب العربي ابن النفيس وذلك في اواخر الجيل الثالث عشر .

١٠٦٤٠ - دَوْرَة زِرَاعِيَّة Assolement (F).
Rotation of crops (E).
الدورة الزراعية معناها تقسيم المزرعة او الارض الى اقطاع تتعاقب فيها الزروع المختلفة . غايتها الحد من استنزاف العناصر الغذائية في التربة . اكثرها شيوعاً الدورة الثنائية والدورة الثلاثية . (راجعها) .

١٠٦٤١ - دَوْرَة سَلَامِيَّة Cycle mérital (F).
Internode cycle (E).
هي الخط القياسي الذي يرسمه اللولب البرعي حول القضيب الى ان يستقر في الخط المستقيم القائم بين برعة المنشأ (ا) التي سار منها اللولب وبرعة الاستقرار (ب) التي انتهت فيها الدورة كما يبدو من الرسم .

١٠٦٤٢ - دَوْرَة فَلَكيَّة Rotation sidérale (F).
Sidereal rotation (E).
الدورة الفلكية اي الدورة الكاملة حول الشمس تختلف مدتها بالنسبة الى الكوكب . فلدورة الارض تستغرق ٢٣ ساعة و٦٥ دقيقة و٤ ثوان ، ودورة المريخ تستغرق ٢٤ ساعة و٣٧ دقيقة و٢٣ ثانية في حين ان دورة زحل لا

الى تقويس بطنها عند السير وذلك لتقارب ارجلها البطنية من الصدرية || تعتبر من الديدان القياسة النهمة التي تسطو على الخس والملفوف والشوندر والبطاطا واللوبياء والبق والكتان والبرسيم والتفل وبعض النباتات التريينية .

١٠٦٢٤ - دَوْدَة قَارِضَة * Agrotis ypsilon (S).
هي يرقة أغروتيس إبسيلون ، اطلبها . طولها عند اكتمال نموها يبلغ نحو ٥ سم . لونها يتغير مع انسلاخاتها . يبتدىء اخضر ثم اخضر زيتوني وينتهي بالرمصاصي . جسمها مشدود الجلد لامع البشرة . درقتها الصدرية واضحة . مدنها الى السمرة الباهتة . رأسها يميل الى الجفوة . تحمل على كل حلقة من حلقات جسمها الاثني عشرة اربع درنات سود تنوسطها هلبة سماء || تسرح في الليل ومن عاداتها التكور عندما تشعر بالخطر || تسطو على سوق العديد من النباتات فتقضي عليها ، منها التبغ والقطن والذرة والقمح والشعير والعدس والخص والفول ومختلف البقول والنباتات التريينية والمرعوية .

١٠٦٢٥ - دَوْدَة لَوَز القُطْن هي دودة القطن الشوكية.

١٠٦٢٦ - دَوْدَة مُزْدَوِجَة هي السنغام ، اطلبها .

١٠٦٢٧ - دَوْدَة مُقْوَسَة هي دودة نعا ، اطلبها .

١٠٦٢٨ - دَوْدَة وَحِيدَة Ver solitaire (F).
Tape worm (E).
هي التينيا المسلحة ، راجعها .

١٠٦٢٩ - دَوْدَة وَرَق القُطْن * Prodenia litura (S).
هي يرقة برودينيا ليتورا ، اطلبها . طولها البرقي يدوم من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع في الصيف ومن ستة الى ثمانية اسابيع في الشتاء || طولها عند اكتمال نموها يبلغ نحو ٤ سم . لونها يتغير مع انسلاخاتها الخمسة يتحول من الخضار الاصفر الى الزيتوني العايق . رأسها الى الجفوة السمر . ظهرها وجانباها مقطوبة بخمسة خطوط صفير تعترضها اشربة جانبية لوها الى الخضار العايق . مدنها تبني اللون . تحمل على ظهرها بعض البقع السود وعلى جانبيها درنات صغيرة ترتكز على كل منها هلبة دقيقة || تسرح في الليل . تسطو على الاوراق والنوامي والثمار الفتية فتؤذيها اشد الأذى || عوائلها عديدة تنتمي الى مختلف الفصائل النباتية نخس منها بالذكر القطن والبرسيم والذرة والهاميا واللوبياء والبطاطا والبادنجان والبندورة والتبغ والبطيخ والشام والخيار والبصل والشوم والزنايق والملفوف واللفت والكرمة والتين والجميز والحمضيات والتفاح والاجاص والخوخ والموز والتوت . الخ || تكافح عند ظهورها ، تعفراً على النبات والتربة ، باستعمال بعض الحواشير الفعالة المرتكزة على مادة الروتينون او غيرها من المواد النشيطة الاكيدة الفاعلية .

١٠٦٣٠ - دَوْدَة وَرَق القُطْن الصُّغْرَى


اطلب دودة القطن الخضراء .

١٠٦٣١ - دَوْدِيَّات الأَلْسَنَة Vermilingues (F).
رتيبة من العظائيات تشل فصيلة الحراي وغيرها .


١٠٦٣٢ - دَوْر ظُرَّائِي ، دَوْر ظُرِّي Age de la pierre taillée (F).
Freestone age (E).
هو عصر الحجر المشنول .



دودة قارضة وفراشها



دودة ورق القطن وفراشها



دورة سلامية

بطنه وافنيكه الى الرمادي الباهت . جانبا صدره وبطنه منمشان بالاسود . جناحه موشان بالابيض . منقاره اسود . رجلاه الى الجؤوة .

١٠٦٤٨ - دُورِي البَيَادِر *، دُورِي جَبَلِي

Passer montanus (S). Moineau friquet, Friquet (F). Tree-sparrow (E).

نوع من الدوري موطنه الشرق الاوسط واروبة وافريقية الشمالية . طوله نحو ١٣ سم . رأسه الى الجؤوة . محسراه الى اليباض الاغبر . ظهره الى السمرة الكستنية تعلوها مشحة سوداء . جناحه موشان بالابيض . منقاره اسمر . رجلاه الى الصبغة || يألف المراعي والسيجات والحقول والاشجار المنفردة .

١٠٦٤٩ - دُورِي البَيُوت *، دُورِي مَبْدُول

Passer domesticus (S). دُورِي مَعْرُوف Moineau commun, M. domestique, Pierrot (F). House-sparrow (E). Haussperling, Spatz (D).

نوع من الدوري كان موطنه العالم القديم الى عام ١٨٥٠ حيث ادخل الى امريكا ومن ثم الى اوستراليه || طوله نحو ١٥ سم . رأسه رمادي اللون ازرق الموج . ظهره وقفته الى السمرة الكستنية الموشحة بالاسود . زوره وعنقه وصدره الى السمرة السوداء . بطنه وافنيكه الى الرمادي . جناحه موشحة بخط ابيض . منقاره اسود . رجلاه الى السمرة الخنطية . يألف المدن والداكر والقرى ، قوته الحشرات والحبوب والثمار .

١٠٦٥٠ - دُورِي الغَاب

Passer petronia (S). Moineau soucie, M. des bois, Soucie des rochers (F). Hedge-sparrow (E).

نوع من الدوري موطنه الشرق الاقصى والادنى واروبة الجنوبية وافريقية الشمالية . طوله نحو ١٥ سم . ثوبه الى الرمادي الاسمر . رأسه موشح بخطين جانبيين لونهما الى السمرة المابقة . ظهره مخطط بالاسود . زوره اصفر كبيرتي . اطراف قوادمه مبقجة بالابيض || يألف الغابات والاحراج ومجاري الماء والحقول الزراعية يدن في صدوع الصخور .

١٠٦٥١ - دُورِيَّة

Périodicité (F). Periodicity (E). الدورية كون الشيء دورياً اي انه يعاود بانتظام .

١٠٦٥٢ - دُورِيس *

Doris (S). Doris (F). Doris (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم . انواعه المعروفة كثيرة العدد منتشرة في جميع بحار العالم . تعيش قرب الشطوط . تزحف ببطء || اجسامها عريضة متوسطة القد او كبيرة ، اهليلجية الشكل او شبه مستديرة ، جملونية الاحديداب . رؤوسها صغيرة ، رباعية اللوامس القصيرة ، الزوج الظاهر منها صولجاني الشكل ، الزوج المغلف بالرداء قصبي الشكل . خياشيمها كالنجوم النباتية تغلف المنافذ الشرجية . ألوانها متباينة الالوان الزاهية .

١٠٦٥٣ - دُورِيسِيَّات

Dorididae (S). Dorididae (F). Dorididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم جلديات التنفس . اجناسها وانواعها

تستغرق اكثر من ١٠ ساعات و ١٤ دقيقة . اما دورة القمر فتستغرق ٢٧ يوماً و ٧ ساعات و ٤٣ دقيقة و ١٢ ثانية .

١٠٦٤٣ - دُورَس *

Doras (S). Doras (F). Doras (E).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطانها معظم انهر امريكا الجنوبية || اجسامها مستطيلة الشكل ، قليلة العرض ، تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . رؤوسها اسفينية مقطومة . اعطامها رباعية العذبات الدقيقة . اشداقها متوسطة الانفراج . عيونها صغيرة ماسحة . زعانفها الظهرية الاولى شراعية الشكل ، قريبة من الرأس . الثانية جداع قريبة من الذيل . زعانفها الصدرية والحوضية والبطنية والشرجية صغيرة القد ، ضيقة . زعانفها الذيلية فارقة . تتميز بخط جانبي من الصفائح العظمية الشائكة الاطراف يمتد من قاعدة الزعنفة الصدرية الى قاعدة الذيلية من الجانبين الايسر واليمن . اثوابها تختلف مع الانواع منها الاسمر والاكهف والارمك والاخضر البحري والاشهب الفضي || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١٠٦٤٤ - دُورَق *

Matras (F). Matrass (E). وعاء من زجاج مستطيل العتق يستعمل في الاختبارات الكيميائية .

١٠٦٤٥ - دُورَم *

Dorema (S). Dorème (F). أشق Dorema (E). Ammoniakpflanze (D). Dorema (I). جنس نباتات عشبية برية محولة من فصيلة الخيميات . انواعه قليلة اشهرها الدورم الخزفي وهو نبات بري طبي هذه العجم يستخرج منه صمغ الأمونياك المشهور في معالجة التشنج والامراض العصبية || اوراقه متعاقبة مركبة ، نصلها بحري الخضار الباهت ازهاره سداسية التركيب ، لونها الى الابيض العاجي الاصفر الموج .

١٠٦٤٦ - دُورِي

Passer (S). Moineau, Passerien (F). Sparrow (E).

جنس طير من الجواثم الخروطيات المناقير وفصيلة الشرشوريات . انواعه نحو ٣٠ معظمها افريقي الموطن وبعضها اسيوي واروبي || اجسامها ربعة ، رؤوسها منسوبة منسجمة . مناقيرها مخروطية قصيرة ، اجنحتها صغيرة ، اذناها معتدلة . ارساغها نحيلة || جميعها حاشرة وحابية تقتنص مختلف اجناس الفراش والديدان والجنادب والجمل ... وتأكل مختلف الحبوب والبزور والثمار || يدن عشه في البيوت وصدوع الصخور وفي الاشجار . اناته تبض ثلاث مرات في السنة . تضع وتحضن في المرة الاولى من ٥ الى ٦ بيضات وفي المرة الثانية من ٤ الى ٥ بيضات وفي المرة الثالثة من ٣ الى ٤ بيضات . حضن البيض يدوم نحو ١٤ يوماً تقوم به الانثى بمناوبة الذكر || اعرف انواعه واشهرها ما يلي :


١٠٦٤٧ - دُورِي إسباني

Passer hispaniolensis (S). Moineau espagnol (F). Spanish-sparrow (E).

نوع من الدوري موطنه اسبانيه وايطاليه وشمال افريقية . طوله نحو ١٤ سم . رأسه رمادي اللون ازرق الموج . قفنه وظهره وذنبه الى السمرة الكستنية الجؤرية الموج تعلوها نمشة سوداء . زوره وعنقه وصدره الى الرمادي الباقق السمرة .



دورس



دورق



دورم



دوري البيادر



دوري البيوت



دوريس

المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار العالم وأخصها بحار البلاد الحارة || اعرف اجناسها وأشهرها الدوريس والسرثومة والهلكية ، جميعها عريضة عادية الاصداف .

١٠٦٥٤ - دُورِيْفُور * ، حُتْفَسَاء البَطَاطَا

Leptinotarsa decemlineata (S). Doryphore (F). Colorado potato-beetle (E). Kartoffelkäfer (D).
حُتْفَسَاء محدودة الشكل من فصيلة البضاريات. تركيب نباتات الفصيلة الباذنجانية أخصها البطاطا فتوقع بها اشد الاذى || طولها نحو ٩ مم. غلافها اصفر. كوسلها مزركش بالاسود. درقتها سوداء اللون صفراء المواجه. غمدتها موشحة بخطوط سود ، كل غمد يحمل خمسة خطوط. زبانها صولجانية الشكل || اناثها اكبر من ذكورها تمتح مكنتها الاصفر الخططي المستطيل على صفحات الاوراق السفلى نجيات متفرقة ، كل نجبة تعد من ٣٠ الى ٥٠ مكنة مجموعها نحو ٢٠٠٠ تنقف المكنة بعد متحتها بأسبوعين عن يرقة صغيرة القد ضخمة الشكل مستدقة الاطراف لونها الى الحمرة الخمرية . رأسها اسود . طرفها مدبب . تركيب الاوراق والسوق فتتابع اذى الحشرة الكاملة وقد تقضي على النبات || تكافح باستعمال الحواشير والمواكين الفعالة .

١٠٦٥٥ - دُورِيْكُنْيُوم *

Dorycnium (S).
Dorycnie, Dorycnion (F). Venemous trefoil (E). Backenklees (D). Erba velia, Trafogline (I).
جنس اعشاب وانجم برية معمرة من فصيلة القرنبيات الفراشية . انواعه المعروفة نحو ٢٠ مهدا الشرق الاوسط واروبة الجنوبية . اوراقها مركبة ثلاثية الوريقات . ازهارها صغيرة عديدة متفحة خيمية التجميع هامية الارتكاز. تكثر في الجبال الجرداء وفي الاراضي المذحاة . جميعها كلاثية ترغب فيها الماشية .

١٠٦٥٦ - دُورِيْمُو *

Durio zibetinus (S).
Dourian, Durian (F). Durlan (E).
دوريو هو الاسم الماليزي . شجرة زراعية مشمرة من فصيلة البرازيات منبتها ماليزية والهند الصينية والجزر . ثمرورها المشهورة اربعة اجودها دوريو ماليزية || ثمرتها كبيرة القد قريبة الشبه من الدردار ، تعلو نحو ٢٥ م. اوراقها متعاقبة ، اهليلجية النصال الجامدة . ازهارها خشوية ، سلامية الانتشاب ، فردية التجميع او ثنائية ، خماسية البتلات ، كثيرة الاسدية الدقيقة اللاحدة العدد . ثمارها كبيرة ، شبه بيضية الشكل . حجمها حجم الشام . قشورها مدروزة بالشوك الخروطي الشكل ، الحاد الاطراف . لبانها مأكول رغم استهجان طعمه ويقال انه لا يخلو من الفوائد الصحية والطبية ، بزورها مأكولة طازجة ومجمصة .

١٠٦٥٧ - دُوسَر

Fromental (F). False oat (E).
هو الحوطال الرفيع ، اطلبه .

١٠٦٥٨ - دُوسَرَج * ، اَبُو حَادِيْج ، شَعِير اِبْلِيْس

Aegilops, Triticum ovatum (S). Egilope, Aegilops (F). Hard grass, Goat grass, Oat grass (E). Walchweizen Bartgrass, Gerstenwack (D). Egilopa, Egilope, Occhio di capra (I).
نبات عشبي بري حولي مرعوي من فصيلة النجيليات . يظن ان القمح يتحدر منه . وهو من النباتات العادمة القيمة الاقتصادية . كثرته في الزروع ضارة . قصبه دقيقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه عصفية صغيرة وقصيرة النصل . سبلته ثنائية او وحيدة الحبة .

١٠٦٥٩ - دُوسَرَجِيَّات

Aegilopinées (F).
Aegilopinae (E).
سبط من فصيلة النجيليات . نباتاته عشبية برية حولية . اعرفها واشهرها الدوسرج المقول ان القمح يتحدر منه .

١٠٦٦٠ - دُوسَع

Scopelus (S).
Scopèle (F). Scopelus (E).
جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الدوسيات مفتوحات المثانة . انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرة . اعطانها معظم بحار العالم باستثناء القطبية والاستوائية || اجسامها متوسطة القد ، مردنية الشكل ، ثنائية الزعانف الظهرية . تتميز برؤوسها الضخمة المستديرة وبرحابة اشدائها . حراشفها صغيرة ، نحيلة ، نافضة تنحسر كل عام || اثوابها الى الربدة الفضية المواجه تعبق مع اقترابها من الظهر وتغير عند البطن || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة || اشهر انواعها الدوسعة السورية .

١٠٦٦١ - دُوسَعَة سُورِيَّة *

Scopelus syriacus (S). Scopèle syrien (F).
Syrian scopelus (E).
سمكة بحرية بيوض من فصيلة الدوسيات مفتوحات المثانة . اعطانها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط اخصها المنطقة المحاذية للشواطئ اللبنانية السورية || جسمها مردني الشكل يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الربدة الفضية المواجه يعبق في الرأس والظهر ويغير في البطن ويعلوها في جانبيها تنقيط خفيف اسمر || رأسها مستضخم الشكل ، قصير الخطم المستدير . شدتها رحب الانفراج ، منحرف الارتكاز . اسنانها صغيرة ، كثيرة العدد ، ثلاثية الصفوف في الفكين . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، ناشزتان . زعانفها الظهرية اثنتان ، الاولى كبيرة شراعية الشكل والثانية صغيرة ، دقيقة ، وتدنية . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٠٦٦٢ - دُوسَعِيَّات


Scopelidae (S).
Scopelidés (F). Scopelidae (E).
فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات المثانة . اجناسها وانوعها قليلة العدد . اعطانها معظم بحار العالم . مسرحها المياه الاقليمية || اجسامها متفاوتة الاحجام بين الصغير والوسط . معظمها مردني الشكل . رؤوسها ضخمة شبه مستديرة . اشدائها كبيرة منحرفة . زعانفها الظهرية اثنتان ، كبيرة وصغيرة . حراشفها صغيرة ، رقيقة ، نافضة . اثوابها تراوح بين الربدة والشبهة يعلوها موجه فضي || لحومها مأكولة ، متوسطة الصنف || اعرف اجناسها واشهرها الدوسج والحترش والشرودج .

١٠٦٦٣ - دُوسَقَة زَرْقَاء *


Dasytes coeruleus (S). Dasyte bleu (F).
Dasytes coeruleus (E).
حشرة واسعة قانصة من فصيلة الملخيات ورتبة غمديات الاجنحة . تألف البراري والمراعي والحدائق والاحراج . غنافسها واسعة قوتها رحيق الازهار وبتلاتها . يرقاتها قانصة تعيش تحت لحاء الاشجار وفي الاخشاب النخرة ساعية وزاء اسازيع الحشرات الخاشبة || جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٧ مم. ثوبها الى الزرقة اللامعة . رأسها صغير الحرم . عيناها صغيرتان . زبانها غيظيان . ظهراتها مستعرض المؤخر الفارق اللامع ، نحيل التعزيز



دوريفور



دوريكنيوم



دوسرج



دوسعة سورية



دوسقة زرقاء

١٠٦٧٠ - دُوع شائع *
Carassius vulgaris (S).
Carassin commun (F). Common carassin, Cyprine (E).
نوع من الدوع كبير القد . طوله يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . ثوبه الى الحمرة . يرغب في المياه الجارية .

١٠٦٧١ - دُوع صيني *
Cyprinus gibelio (S).
Cyprin doré, Gibèle (F). Gold fish (E).
نوع من الدوع . ضروبه عديدة جميعها صغيرة القد ذهبية اللون . يربى في الاحواض والاكواريوم .

١٠٦٧٢ - دُوعمة *
Stylidium (S).
Stylidie (F). Stylidium (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الدلانيات . مهدا بعض مناطق استرالية . سوقها شراخية . اوراقها متبائية الاشكال . ازهارها مختلفة الالوان . اسديتها واقلامها ملتصمة كالدعامة .

انواعها المعروفة عديدة ، اشهرها التالية :

١٠٦٧٣ - دُوعمة زبء *

Stylidium piliferum (S). Stylidie pilifère (F).
نوع من الدوعمة . شراخها كثيف الزغب يعملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها صغيرة تطول نحو ٤ سم . وتنتهي بهلبة شائكة . ازهارها سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها صفراء اللون || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٦٧٤ - دُوعمة عصفية الورقي *

Stylidium graminifolium (S).
Stylidie à feuilles de graminées (F).
نوع من الدوعمة . شراخها يرتفع من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، قرصية التجميع تطول نحو ١٥ سم . وتعرض نحو ٥ سم . ازهارها سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز . ازهارها وردية اللون || تنويرها يستمر من نيسان الى آب .

١٠٦٧٥ - دُوعمة كدنة *

Stylidium fruticosum (S). Stylidie frutescente (F).
نوع من الدوعمة . ساقها ليفية مخشوشة تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقها خطية جرداء النصال . ازهارها عنقودي التجميع . ازهارها صغيرة القد ، بنفسجية اللون ، يملوها موج وردي || تنويرها يستمر من ايار الى تشرين الاول .

١٠٦٧٦ - دُوع *
Caséine (F). Casein (E).
المادة الازوتية البيضاء اللون الموجودة في حليب الثدييات . تعرف ايضاً بالجبين والكازين .

١٠٦٧٧ - دُوعغل *
Bessornis (S).
Bessornis (F). Bessornis (E).

جنس طير من الجوائم سنيات المناقير وفصيلة الشحوريات . انواعه المعروفة نحو عشرة اعطانها تمتد من الشرق الاوسط الى افريقية الشرقية والجنوبية || جميعها قريبة الشبه بالدج . اثوابها ملونة ومقرشة . لوانها تختلف مع اختلاف الانواع . جميعها مكحلة العيون ، مستديرة الاذنان || قوتها البزور والثار والحشرات || اشهر انواعها واعمها انتشاراً الدوغل الأشنع (B. gutturalis) والدوغل النريد (B. semirufa).

١٠٦٧٨ - دُوقصة *
Bulbe (F). Bulb (E).
الدوقصة وتسمى البصلة . ساق ارضية مستديرة مركبة من

الغمدي . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في التبار . تسافد بعد ظهورها بنحو خمسة اسابيع . تمتح الممكن تحت لحاء الاشجار وتثورها وتحت الانقاض || اليرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٩ الى ١١ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مستغلظ الرأس المستطيل ، مستدق الطرف النحيل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الطحلة النبراء . رأسها اسمر || طور الاكمال يستمر نحو ٣٠ يوماً وينقضي في آخر سرداب دخلته اليرقة .

١٠٦٦٤ - دُوسينية ، شبل ، سفسرجل هندي
Docynia (S). Docynie, Cognassier des Indes (F).
Docynia (E).

جنس شجيرات مشمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة مهدا الهند . تعلو نحو اربعة امتار سوقها قصيرة الجذع . اغصانها فارشة افقية . اوراقها معنقة ، متعاقبة ، مفرصة كأوراق الزعرور . ثمارها كروية صغيرة القد مأكولة ، مستحبة الطعم .

١٠٦٦٥ - دُوصر *
Dasycerus (S).
Dasycerus (F). Dasycerus (E).

جنس حشرات من فصيلة الصمليات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المعروفة خمسة اعطانها بعض مناطق البلاد الممتدة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى ٣ سم . رؤوسها مخروطية الشكل ، صغيرة القد . عيونها كبيرة ، ناشزة . تاشيرها نظامية . ملامسها مستطيلة . قرونها الاستشعارية شديدة الطول ، مهدبة الفصل . كواسلها مكورة ، مضلعة ومقرنة . اغصانها مضلعة ، لاحفة ، شبه مجنية الشكل . قوائمها نشيطة . اثوابها سوية اللون منها الاطلح والاربد والاسمر القطراني والاديس || جميعها دامتة تعيش في الجثالة وتحت الجذام والقشور .

١٠٦٦٦ - دُوصر *
Ximénia (S).
Ximénie (F). Ximénia (E).

شجيرة شائكة معمرة برية وزراعية من فصيلة الزيتونيات . موطنها بعض المناطق الافريقية || ساقها واقنادها شائكة . اوراقها متعاقبة ، معنقة . نصالحا سنائية ، جامدة ، بحرية الخضار . ازهارها ضمي التجميع ابطي الارتكاز . ازهارها صغيرة ، سباعية البتلات الحملية الصفحات العليا . ثمارها مأكولة تدعى « الخوخ البحري » « Prunes de mer ».

١٠٦٦٧ - دُوع *
Carassius (S). Carassin (F).
جنس سمك من الشبوطيات يعيش في المياه العذبة وفي الاحواض . انواعه عديدة مختلفة الاشكال والاحجام والالوان . تطول من ٧ الى ٣٥ سم . اعرفها ما يلي .

١٠٦٦٨ - دُوع أحمر * ، سَمَك أحمر
Clprinus carassius (S). Poisson rouge (F). Red fish (E).


نوع من الدوع احمر اللون سهل التناسل سريع النمو يربى في الاحواض والاكواريوم .

١٠٦٦٩ - دُوع ذهبي * ، سَبُوط ذهبي
Carassius auratus (S). Carassin doré (F). Gold carassin (E).

نوع من الدوع عديد الضروب والاشكال . جميعها متوسطة القد ذهبية اللون تربى في الاحواض والاكواريوم .




دوشر




دوصر



دوع احمر



دوع ذهبي



دوع شائع




دوع صبي



دوعمة عصفية الورق



دوغل



دوقصة

قرص واسقاط لحمية النسيج متراصة متراكبة تحضن برعمة رئيسية ترتكز على القرص . ج دوفص .

١٠٦٧٩ - دَوْقَصِيّ (F). Bulbifera (F). Bulbiferous (E).

نمت تعريفياً يطلق على كل نبات يحمل دوفصة او ينتج دوفصة .

١٠٦٨٠ - دَوْقُس هو جزر الرعاة ، اطلبه .

١٠٦٨١ - دَوْقُل

Antenne (F).

Aerial, Antenna (E).

الدوقل ناقل معدني يسمح ببيت الذبذبات المتمنطة الكهربائية و بالتقاطها ، وهو على اشكال اخصصها :

Antenne en cadre (F).

دوقل إطارى

Antenne en nappe (F).

دوقل سماطى

Antenne en cage (F).

دوقل قفصى

Antenne de radio (F).

دوقل مذياعى

Antenne en éventail (F).

دوقل مروحي

اما دوقل الحشرة (A. d'insecte) فيدعى قرن استشعاري وزبان ، اطلبها .

Ephippus (S).

١٠٦٨٢ - دَوْقَم *٥

Ephippe (F). Ephippus (E).

الواحدة دوقمة . جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة السحليات . انواعه المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار المناطق الحارة || اجسامها مبطة ، شبه مستديرة الشكل تطول من ٣٠ الى ٧٠ سم . اثوابها تختلف مع الانواع تكثر فيها الربدة الفضية والشبهة . رؤوسها شديدة القصر وتبدو كأنها عادمة المخاطم . اشدافها صغيرة قليلة الانفراج . زعانفها الظهرية خلفية الارتكار تقتلها امشاط سباعية او تساعية المناخس اللامتساوية الارتفاع ومنها ثلاثة مستطيلة منقفة الى الوراء . زعانفها الذيلية مزوانية الشكل || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب فيها || اشهر انواعها الدوقمة الماردة (Ep. gigas) التي يبلغ طولها نحو ٧٠ سم . والتي يكثر وجودها قرب جزر الاتيل .

Vulsella ruga (S).

١٠٦٨٣ - دَوْلَك

Vulselle ridée (F).

نوع من الاصبمية . حيوان بحري من الرخويات صفيحيات الخياشيم يكثر وجوده في البحر الاحمر || صدفته مستطيلة الشكل ، مخددة المصاريح اللامتساوية . ضليعة الملقط . صفحتها الخارجية الى الصنابي المصلع بالارجواني ، داخلها لؤلؤي المادة .

Douc

١٠٦٨٤ - دَوْلَك

هو هبار دوك نوع من القروء المقدسة ، اطلبه .

Pheidola (S). Pheidole (F).

١٠٦٨٥ - دَوْلَكَمَة *٥

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة النمليات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بعض مناطق البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || ملجئها الحياتي بحامي كغيرها من النمل . تربيها الطبقي يشمل الاناث وهي مجنحة كاملة الشوار الشقي . ثم الذكور وهي ايضاً مجنحة كاملة الشوار الشقي . ثم الرعية وهي عادمة الجناح والشوار الشقي . وطبقة رابعة تدعى الحرس القومي او الجند وهي ايضاً عادمة

الجناح والشوار الشقي لكنها تتميز بفلاظة الرأس المسلح بفكين ضليعين قاضمين نخبتهما مؤلفة دامية . وظيفة الجند المحافظة على سلامة الرعية وسلامة العمل اليومي خارج الزريبة || تقيم قراها في التربة او في جذوع الاشجار النخرة .

١٠٦٨٦ - دَوْلَابِيَّات هي الدورات ، اطلبها .

Planorbis (S).

١٠٦٨٧ - دَوْلَب *٥

Planorbe (F). Planorbis (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات معديات الارجل وفصيلة اللمنيات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحيرات ومناقع البلاد المعتدلة الحرارة . قوتها النبوت المائية || اصدافها قرنية المادة ، مبطة ، شفاء اللوب ، سمراء اللون او خضراء او صفراء . اجسامها مستطيلة نحيلة . رؤوسها واضحة . لوامسها مستطيلة قرنية الشكل . عيونها قاعدية . ارجلها وحيدة ، بيضية الشوزن ، مبطة ، عادمة السقاط .

Dolabella (S).

١٠٦٨٨ - دَوْلَبَة *٥

Dolabelle (F). Dolabella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل خلفيات الخياشيم السقفية وفصيلة ارانب البحر . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بحار البلاد الحارة اخصها المحيط الهندي || اصدافها كلسية المادة ، صغيرة ، داخلية ، منقفة المؤخر ، يكثر فيها اللون الاخضر . اجسامها كبيرة مستطيلة قريبة الشبه بأرانب البحر ، وقد تفرز مثلها مادة حريفة كريهة الرائحة .

١٠٦٨٩ - دَوْلَة هي الاخطبوط الشائع ، اطلبه .

Gîte (F). Lair, Form (E).

١٠٦٩٠ - دَوْلَج

هو كناس الطير وغيره من الهم ، راجع تولج .

١٠٦٩١ - دَوْلَسَة كَبِيرَة ٥

Xenosaurus grandis (S). Xénosaure grand (F).

حيوان بيوض وحيد الجنس والنوع من فصيلة الدولسيات . اعطائه بعض مناطق جنوب المكسيك || جسمه نحيل الشكل يطول نحو ٢٥ سم . يتميز باستطالة القوائم والذنب ، وبمطاي ابطليه التي تبدو كاخاديد مستطيلة || قوته الحشرات والوزغ .

Xenosauridae (S).

١٠٦٩٢ - دَوْلَسِيَّات ٥

Xénosauridés (F). Xenosauridae (E).


فصيلة حيوانات زحافة ، بيوضة ، وحيدة الجنس والنوع من رتبة المظائيات . موطنها بعض مناطق بلاد المكسيك . مركزها ، من الوجهتين الجسمية والشوزية ، يأتي بين العيدشونيات والخنجوييات || النوع الوحيد المعاصر يدعى دولسة كبيرة .

Protoma (S).



١٠٦٩٣ - دَوْلَع *٥

Protome (F). Protoma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات معديات الارجل اماميات الخياشيم وفصيلة البراميات . انواعه المعروفة عديدة معظمها من متحجرات الاباج الثالثي . المعاصر منها يكثر وجوده في بعض مناطق المتوسط والمحيط الاطلسي الموازي لافريقية الشمالية || اصدافها برجية ، ملوكة ، مدببة الاعقاب ، منبسطة الدورة الخلزوية ، بيضية الفوهة المقعرة المخددة . جواصمها ملتوية ومنقفة .



درفم



دوكمة



دولب



دولة



دولع

تمكنها من القفز . مسافة وثبتها لا تقل عن ٣٠ سم . || تعيش بين الحصى والرمال والاسمال المنصورة بالماء عند مصبات الانهر واخوارها || اعرف اجناسها واشهرها دونس ولافيجينية .

١٠٧٠٣ - دُونِيْجَة ٥
Downingia (S).
Downingie (F). Downingia (E).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة اللويليات . منبتها بعض مناطق امريكا الشمالية . سوقها قصيرة تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها لاطئة كاملة ، شبه بيضية الشكل ، صغيرة القد . ازهارها لبيثة ملونة || لها نوعان معروفان الاثنية والرشيقة .

١٠٧٠٤ - دُونِيْجَة اُنِيْقَة ٥

Downingia elegans (S). Downingie élégante (F).

نوع من الدونيجة . ساقها تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم . اوراقها صغيرة ، ضيقة ، ذرية ، تطول من ٢ الى ٣ سم . ازهارها لبيثة كبيرة القد ، زرقاء اللون ، مبقجة بالابيض || تنويرها يستمر من تموز الى ايلول .

١٠٧٠٥ - دُونِيْجَة رَشِيْقَة ٥

Downingia pulchella (S). Downingie gracieuse (F).

نوع من الدونيجة . ساقها نحيلة مرنة تعلو نحو ٢٠ سم . اوراقها صغيرة ، مستديرة الاطراف . ازهارها لبيثة كبيرة القد ، زرقاء اللون ، مبقجة بالاصفر المطوق بالابيض || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١٠٧٠٦ - دُوَيْدِيَّة ٥
Vermicularia (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفييات . تكاثرها سطحي ، اعضاءها كروية او مفلطحة تملوها اهداب هليية منتصبة سباعية التركيب لونها الى السرة . بويضاتها اسطوانية شفافة || انواعه عديدة معظمها رمي لا مؤذي .

١٠٧٠٧ - دُوَيْدِيَّة العُشْب ٥ *

Vermicularia herbarum (S).

فطر مجهري رمي يعتري اعشاب كثيرة اخصها القرنفل . مظهره الخارجي فساد عفن يركب اصول القرنفل عند سطح التربة فينش الحركه النسفية ويقضي على الاجزاء المصابة || يكافح عند ظهوره باستعمال السائل البورغوني المحلول ١٪ .

١٠٧٠٨ - دُوَيْدِيَّة الفُلفُل ٥ *

Vermicularia capsici (S).

فطر مجهري يصيب الفلفل في ثماره ونواميه . مظهره الخارجي بطور مستديرة تركب الثمار قرب ادراكها ، تبدو صغيرة ثم تتسع وتحول من الاسمر الى الحنطي ، تشبه الثمار وقد تسبب تلفها || وعندما يصيب النوامي يمنعا عن متابعة نشاطها الحيوي || يكافح باستعمال السائل البورغوني المحلول ١٪ .

١٠٧٠٩ - دُوَيْشَلَة ٥ *

Modiolaria (S).

Modiolaire (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الميديات . انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداقها شبه معينة الشكل ، مستديرة الاطراف ، متساوية المصاريح ، نحيلة التحزيز القاطب والمعرض || تعيش منخفضة في الرمال المنصورة بالماء . لحومها مأكولة جيدة الصنف .

١٠٦٩٤ - دَوْلَمَة
Tapinoma erraticum (S).

Tapinome (F).

الدولم نمل اسود صغير القد طوله نحو ٣ مم . جسمه دقيق الزغب متوسط المعان . موقه يطول نحو ٧ مم . || اعطائه العالم . يتميز برفع بطنه عند السير . سيره مستقيم الاتجاه لا تعرج فيه || زباه كبيرة يقيمها في المواقع الناشئة والمعارض الجنوبية .

١٠٦٩٥ - دَوْلَمِي ٥ ، دَوْلُمِي
Dolomie, Dolomite

صخر حجري مركب من كربونات الكلس والمغنيزيا . اشكاله عديدة ، بعضها يصلح للبناء .

١٠٦٩٦ - دَوْم *
Douma thebaïca, Hyphaene crinita, Corypha thebaïca, Coccifera thebaïca (S). Doum, Palmier doum, Cucifère thebaïque (F). Doum-palm, Ginger bread tree (E). Dumpalme (D). Palma doma, P. cucl (I).

نخلة فرعاء مهدها الجزيرة العربية وبلاد النوبة . تعلو نحو ١٠ امتار . جذعها قصيرة الساق . قطرها نحو ٤٠ سم . فروعها عديدة . اوراقها هامة مروحية . ازهارها عنقودية التجميع يحضنها كافور ابطي الارتكاز . ثمارها نوية جافة || تزرع لتثبيت الرمال . اخشابها تصلح للاستعمال . اوراقها صناعية تستعمل في حبك الحبال والخصر وما اشبه .

١٠٦٩٧ - دَوْم تَدْمُر هو التال ، اطلبه .

١٠٦٩٨ - دَوَمَة
Testicula (F). Testicle (E).

هي الخصية المتدلية كما في الثور والكبش .

١٠٦٩٩ - دَوْمَس ٥
Furia (S). Furia (F).

جنس خفافيش من عمارة الرماصات ، موطنه امريكا الجنوبية والغويان . يتميز ببشاعة رأسه وبكبر اسرابه التي يبلغ عدد افرادها عدة مئات || يسرح كامل الليل . قوة الحشرات . يألف المغاور والكهوف واوقاب الصخور .

١٠٧٠٠ - دُون الاحمر
Infra-rouge (F). Infra-red (E).

راجع الطيف الشمسي .

١٠٧٠١ - دَوْنَس ٥
Donax (S).

Donax, Donace, Clovisse (F). Donax (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الدونسيات . انواعه المعروفة نحو ١٠٠ بعضها من متحجرات الاراضي الثالثية ، والانواع المعاصرة منتشرة في بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها مثلثة الزوايا ، متساوية المصاريح ، لامتساوية الاضلاع . مشاعها انبوية الشكل شديدة الطول ، ثنائية ، طليقة . ارجلها مستطيلة تمكنها من القفز || تعيش بين الحصى والرمال المنصورة بالماء عند مصبات الانهر || لحومها مأكولة جيدة الصنف .

١٠٧٠٢ - دَوْنَسِيَّات ٥
Donacidae (S).

Donacides (F). Donacidae (E).


فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداقها صغيرة مثلثة الزوايا متساوية المصاريح لامتساوية الاضلاع . مشاعها ثنائية ، انبوية ، طليقة ، مستطيلة . ارجلها طويلة




دوم



دونس



دويدية العشب



دويدية الفلفل



دووشلة

١٠٧٢١ - دِيوتريون الكرز * ٥

Dibotryon morbosum, Plowrightia morbosa (S).

فطر مجهري يصيب الكرز والخوخ . مظهره الخارجي بشور متراصة متتابعة تركب الاقان والافناد على مساحات يراوح طولها من ١٠ الى ٣٠ سم . وعرضها من ٢ الى ٦ سم . وهذه البشور تبدو في اول عهدها خضراء اللون ثم تنحرف الى الجوزي وتنتهي بالسمرة الفحمية فتعرقل النمو بعد ان تشل الحركة النسجية وتسبب انمقاف الافناد والافنان ثم يياس القشور المعطوبة وانفلاتها حتى الشكير والخشب || يكافح بقطع الاجزاء المصابة وينضغ الاشجار بأحد الفواطير الفعالة .



ديلودينه البندورة


١٠٧٢٢ - دِيترِمَة (F). Ditrème

سمكة من المندوليات تدعى تريمَة ، اطلبها .

١٠٧٢٣ - دِيَشْمَة ٥ Opisthognathus (S).

Opisthognathe (F). Opisthognathus (E).

جنس اسماك بحرية من العظميات شائكات الزعانف وفصيلة الترخشويات . انواعه المعروفة خمسة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة || ملجئها الحيائي جماعي . مرتعا المواقع التي تكثر فيها حشاش المرجان والرجان || اجسامها صغيرة القد ، معتدلة التبليط ، تطول من ١٢ الى ١٦ سم . تتميز باستطالة اسفاطها التي تشبه المجاذيف . وتتميز ايضاً بالاجسام الانبوبية الشكل التي تحتفرها في القاع لتبيت فيها .



ديوتريون الكرز

١٠٧٢٤ - دِيَجُور (F). Black ground (E). Terre noire

هو التراب الاغبر الضارب الى السواد .

١٠٧٢٥ - دِيَجِيْتَالُ ، إصْبَعُ الْعَذْرَاءِ ، زَهْرُ الْكَشْسَاتِيْن ، قُمْعِيَّة

Digitalis (S). Digitale, Doigtier, Gantelet, Queue de loup (F). Finger flower, Bloody finger, Foxglove (E). Fingerhut (D). Digitale, Guancelli, Coda di lupo (I).

جنس نباتات عشبية او ليفية من فصيلة الخنازيريات . انواعه عديدة منها البرية والترزيبية . اوراقها متعاقبة بسيطة ازهارها عنقودي هامي . ازهارها انبوية الشكل تشبه الاصابع || اشهر انواعه التزيبية ما يتبع .



ديجيتال ارجواني

١٠٧٢٦ - دِيَجِيْتَالُ أَرْجَوَانِي * Digitalis purpurea (S).

Digitale pourpre, D. commune, Gants de Notre-Dame (F).

نبات عشبي محول يرغب في الارربة الرملية . يعلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه سرحة . اوراقه محددة النصل ، خلية البشرة ، والجلدية منها صغيرة القد لبدة الحمل || ازهاره مستعرضة القمع ، أرجوانية الصفحة الخارجية مرقشة الداخلية . يستخرج منه مادة الديجيتالين || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

١٠٧٢٧ - دِيَجِيْتَالُ أَصْفَرُ Digitalis futea (S).

Digitale jaune (F).

نبات عشبي معمر يرغب في الارربة الكلسية ، يعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ساقه سرحة . اوراقه عادية الزغب ، نصلها جميل الخضار اللامع . ازهاره صفراء اللون . ازهاره يستمر من خزيان الى آب .

١٠٧٢٨ - دِيَجِيْتَالُ الْجَبَلِ Huppe commune (F).

طائر يدعى هدهد شائع ، من اوابد لبنان ، اطلبه .

١٠٧٢٩ - دَوِيلُ ، ذَوِيلُ Desséché (F). Dried (E).

البابس من النباتات وغيره .

١٠٧٣٠ - دِيَتَاسُ ، دِيَتَاسَة Dépiquage (F).

Threshing (E).

هو الدوس اي الدراس بارجل الدواب والنورج .

١٠٧٣١ - دِيَسَاسْتَاز Diastase

نوع من الخماز الكهوية المحللة ، تذوب في الماء ، تفرزها بعض النسيج الحيوانية والنباتية .

١٠٧٣٢ - دِيَاغْرَامُ ، بِيَتَالُ Diagramme (F).

رسم خطي بياني يمثل دراسة معينة . Diagram (E).

١٠٧٣٣ - دِيَانَا Diane (F). Diana (E).

كوكب سيار مرقبي يحمل رقم ٧٨ اكتشفه « لوثر » عام ١٨٦٣ .

١٠٧٣٤ - دِيَبِلُودِيْنَة ٥ Diplodina

جنس فطور مجهرية من فصيلة الصغبيات . بكنياتها كروية / او مقطوعة القاعدة تجمعها ونيمة تنشأ محصورة في الطبقة الادمية ثم ترقى مع نموها حتى البشرة . جوفها سميك النسيج ، اسمر اللون . مقعها ضيق الشق ، بوبناتها شفافة ، مستطيلة ، ثنائية الخلايا || انواعه قليلة اشهرها ما يتبع .

١٠٧٣٥ - دِيَبِلُودِيْنَة الْبَسْدُورَة * Diplodina destructina (S).

فطر مجهري يصيب ثمار البندورة في طوري نشوئها وكالها . مظهره الخارجي يقع لا قياسية تركب الثمار في عواتها او عند نقطة اتصالها بمعالقها . تبدو مبعثرة حنطية اللون ثم تسمر وتتراكم وينتهي بها المطاف الى السواد العابق بينما العفن يقضي عليها من الداخل . يكافح باستعمال مركبات النحاس على عدة مرات منسد ظهور عوارض الوصم .

١٠٧٣٦ - دِيَبِلُودِيْنَة الْكَسْتَانَا Diplodina castaneae (S).

فطر مجهري يصيب لحاء السوق الفتية على ارتفاع متر من التربة . مظهره الخارجي لطخة سماء اللون بطيئة الانتشار والاتساع ، تركب القشرة فتسبب جفافها وسقوطها . يكافح في فصل الشتاء باستعمال احد الفواطير الفعالة مزوجاً مع بعض الزيوت الشنوية .

١٠٧٣٧ - دِيَبُوبُ Rapporteur (F). Protactor (E).

دائرة مدرجة او نصف دائرة مدرجة تستعمل لقياس الزوايا او لتخطيطها .

١٠٧٣٨ - دِيوتريون ٥ Dibotryon, Plowrightia (S).

جنس فطور مجهرية من اليبابيات وفصيلة العشويات . اعصابها مركبة مجوفة قائمة على ونيمة بترية الشكل سماء اللون . ثكاتها دبوسية . بوغها يبضي شفاف ، ثنائي الخلية لا متساوي الويرة || انواعه قليلة منها واحد مؤذ يصيب الكرز والخوخ .

١٠٧٢٨ - ديجيتال درياسي *

Didymaria ١٠٧٣٧ - ديديماريه
جنس فطور مجهرية من فصيلة الوطحيات . جربه الكنيديه
بسيطة التركيب ، حزمية الانتشاب ، سمية المسالك .
كنائده بيضية او مستطيلة الشكل ، شفافة ، ثنائية
الخلية || اعرف انواعه ديديماريه الخوخ .

١٠٧٣٨ - ديديماريه الخوخ
Didymaria prunicola
فطر مجهري يركب اوراق الخوخ واللوز والتفاح .
مظهره الخارجي يقع مبعثرة ، خلية ، مستديرة ، سمراء
اللون ، قطرها نحو ٥ مم . تركب نصل الاوراق فتعطب
النسيج المنحارة دون ان يمتد اذاها الى غيرها .

١٠٧٣٩ - ديرامة
Dierama (S).
Diérane (F). Dierama (E).
جنس نباتات عشبية دوفصية من فصيلة السوسنيات . منبتها
بعض المناطق الافريقية . سوقها دقيقة فرعاء . اوراقها
ضيقة النصال ، سيفية الشكل . ازهارها عشكولي التجميع
او سنيلي . ازهارها ملونة ، متدلية || تزرع للترزين في
الحداائق التي لا تخشى شدة القر .
انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٧٤٠ - ديرامة فاخرة
Dierama pulcherrimum (S).
Diérane splendide (F).
نوع من الديرامة التريينية . ساقها فرعاء ترتفع من ١٥٠
الى ٢٠٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، عددها من ٧
الى ٨ . نصالها تطول نحو ٧٠ سم . ازهارها سنيلي التجميع .
ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٦ سم . لونها الى الحمرة
العابقة السفعاء الموج || تنويرها يستمر طوال شهر تشرين
الاول .

١٠٧٤١ - ديرامة متدلية الزهر
Dierama pendulum (S).
Diérane à fleurs pendantes (F).
نوع من الديرامة التريينية . ساقها فرعاء يرتفع من ١٠٠
الى ١٢٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاب ، عددها ٥ او ٦ .
نصالها جامدة النسيج تطول نحو ٥٠ سم . ازهارها عشكولي
التجميع . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم . لونها
ابيض او بنفسجي || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٧٤٢ - ديس
Ampelodesma tenax (S).
Diss (F). Diss, Vine-tie (E). Südliches rebenrohr (D).
Saracchi, Saracchio (I).
نبات عشبي بري معمر من فصيلة التيجليات يكثر في
المنابع والمواقع الرطبة . يستعمل في صناعة الحصر والتفشيح
وما أشبه .

١٠٧٤٣ - ديس الحصر هو حلال الحصر ، راجعه .
١٠٧٤٤ - ديس ، جنفلة
Jungle
الغابة الكثيفة الاشجار المتلبدة . اما كلمة جنفلة فهي
من وضع الامير مصطفى الشهابي .

١٠٧٤٥ - ديسع
Echocerus cornutus (S).
Echocère cornu (F). Echocerus cornutus (E).
حشرة خنفسية من فصيلة الغبشيات ورقبة غمديات الجناح .
جسمها صغير القد . طولها نحو ٤ مم . ثوبها الى الحمرة

Digitalis thapsi (S). Digitale-Bouillon blanc (F).

نبات عشبي معمر يوجد في جميع الاثربة . يعلو من ٥٠
الى ٧٠ سم . ساقه خلية اللحاء . اوراقه محددة النصل
الحملي البشرة . خله كثيف التجميع ، فضي اللون .
ازهاره صغيرة ، قليلة العدد ، ارجوانية اللون || يستخرج
منه مادة الديجيتالين || ازهاره يستمر من ايار الى آب .

١٠٧٢٩ - ديجيتال زبرجي
Digitalis aurea, D. Digitale ferrugineuse (F).
Digitalis ferruginea (S).

نبات عشبي معمر يوجد في جميع الاثربة . يعلو من ٦٠
الى ١٥٠ سم . ساقه سرحة . اوراقه مألسة النصل الزاهي
الخضار . ازهاره كبيرة القد ، خلية النصل ، لونها الى
الصفرة الزبرجدية الجؤوية الموج || ازهاره يستمر من
تموز الى آب .

١٠٧٣٠ - ديجيتال صوفي
Digitalis lanata (S).
Digitale laineuse (F).

نبات عشبي محول يوجد في جميع الاثربة . يعلو من ٥٠
الى ١٠٠ سم . ساقه زباء اللحاء . اوراقه عابقة الخضار
كثيفة الزغب الصوفي . ازهاره كثيفة التجميع ، خلية
البشرة ، لونها الى البياض التي يعلوه موج حنطي وتوشيح
اسمر او بنفسجي || ازهاره يستمر من حزيران الى آب .

١٠٧٣١ - ديجيتال صولجاني
Digitalis sceptrum, Isolepis sceptrum (S). Digitale
sceptre (F).

نبات لبني معمر يوجد في جميع الاثربة . يعلو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه زباء اللحاء . اوراقه اهليلجية
مستطيلة خلية النصل . ازهاره كثيفة التجميع لونها الى
الصفرة يعلوها موج احمر || ازهاره يستمر من حزيران
الى آب .

١٠٧٣٢ - ديجيتال كبير الزهر
Digitalis grandiflora (S). Digitale à grandes fleurs (F).
نبات عشبي معمر يوجد في جميع الاثربة . يعلو من ٥٠
الى ١٢٥ سم . ساقه زباء اللحاء . اوراقه خلية النصل
على صفحته السفلى . ازهاره كبيرة القد ، خلية البشرة ،
صفراء اللون ، صناعية التوشيح || ازهاره يستمر من
حزيران الى آب .

١٠٧٣٣ - ديجيتال كنارية
Digitalis canariensis (S). Digitale des Canaries (F).

نبات لبني معمر يوجد في جميع الاثربة . يعلو من ١٠٠
الى ١٥٠ سم . ساقه وفروعه زباء اللحاء . اوراقه سنانية
النصل المسن الحافة ، صفحته السفلى خلية البشرة .
ازهاره صغيرة القد لونها الى الصفار المذهب || ازهاره
يستمر من حزيران الى آب .

١٠٧٣٤ - ديجيتالين
Digitaline (F). Digitalin (E).
مادة جمالية فعالة ممتدة تستخرج من الديجيتال الارجواني
والدرياسي .

١٠٧٣٥ - ديدان ثعبانية
هي الثعبانيات ، اطلبها .

١٠٧٣٦ - ديدب
هو حمار الوحش ، اطلبه .




ديجيتال درياسي



ديجيتال كبير الزهر



ديس



ديس

السفاه الموج . غمداها متقاربة التضليح الدقيق || يرقها غبراء الثوب ، سماء الرأس ، دقيقة الجسم تطول نحو ٥ مم . || الحشرة الجملاء ويرقها تعيشان على دقيق الحنطة .

١٠٧٤٦ - ديسكوريا هو الانيام ، اطلبه .

١٠٧٤٧ - ديسك هو الطياب ، اطلبه .

١٠٧٤٨ - ديسكوريزيه ٥ Discosia

جنس فطور مجهرية من فصيلة الهدكيات . انواعه قليلة عديمة القيمة الاقتصادية . بكتيدات مغلقة ، سوداء اللون . شيفراته حية ، بويقاته مستطيلة ، شفافة او زيتية اللون ، هليبية الاطراف ، ثنائية او ثلاثية المفاصل المؤثرة .

١٠٧٤٩ - ديسكوتيه ٥ Discula

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكتيدات تنشأ محضونة بالادمة ثم ترقى حتى السطح فتسبب انصداع البشرة بعد انزاق النسيج الادمية || انواعه قليلة تركب اوراق بعض النباتات الحرجية دون ان تلحق بها الاذى .

١٠٧٥٠ - ديسللا ٥ Discella

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلاميات . بكتيدات لا قياسية الشكل والحجم تبدو محضونة خفية ثم ترقى وتشرى . بويقاته وشعية ملونة ثنائية الخلية || انواعه المؤذية قليلة يعرفها النوعان التاليان :

١٠٧٥١ - ديسللا الكاكاو ٥ Discella cacaoicola

فطر من الديسللا يركب الكاكاو ، يوجد وينشط في المواقع الرطبة ، اضراره زهيدة لا تستحق المكافحة .

١٠٧٥٢ - ديسللا فحمية ٥ Discella carbonacea

فطر يركب قصبان الصفصاف فيوشم القشرة ببقع فحمية اللون لا قياسية الشكل والحجم تسبب ارتفاع وانصداع البشرة || اضراره زهيدة لانها لا تؤثر في النمو .

١٠٧٥٣ - ديسيم Essaim (F). Warm (E).

هو ثول النحل من الهجرة الاولى . اما الثول من الهجرة الثانية والثالثة فيدعى لوثاً .

١٠٧٥٤ - ديسيمه ٥ Ruizia (S). Ruizia (F).

جنية سمرة برية وتزيينية من فصيلة الخبازيات . مهدا البلاد الحارة الاسيوية والافريقية || ساقها منتصبه فرعاء . فروعها جالسة . اوراقها متقابلة ، معتقة ، بيضية النصال الجامدة . ازهارها عكوكي التجميع ، ابطي الارتكاز وطرفي || ازهارها ليلية اللون ، عشارية البتلات المتراكبة . ثمارها صغيرة ، مستديرة ، عشارية الاحقاق الاحادية البزور || تنويرها يستمر من اواسط الربيع الى اواخر الصيف .

١٠٧٥٥ - ديسمولوجية ٥ Desmologie (F).

Desmology (E). الديسمولوجية علم يبحث في خصائص ربط الهيكل العظمي .

١٠٧٥٦ - ديسوس ٥ Stenopterus (S).

Stenoptera (F). Stenopterus (E). جنس حشرات من فصيلة القرنييات ورقبة غديسات الاجنحة . اجناسه المعروفة عديدة معظمها من حشرات حوض البحر المتوسط . اجسامها صغيرة القد ، شبه

مخروطية الشكل . قرونها الاستشعارية وجرامزها الخلفية مستطيلة . اغمادها لا تلحف كامل الجسم . تظهر من ايار الى اواخر ايلول . قوتها رحيق الازهار || يرقاتها مؤذية تركب الاخشاب المقطوعة اليابسة فتتخرها وتمطبها .

١٠٧٥٧ - ديسوس اكلف ٥

Stenopterus rufus (S). Stenoptera fauve (F).

Stenopterus rufus (E).

نوع من الديسوس . اعطائه بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . جسمه صغير القد ، يطول من ٩ الى ١٠ مم ، عند الذكر ومن ١٢ الى ١٤ مم . عند الانثى . رأسه وكوسله الى السمرة السوداء . غمداه الى الكلفة . افخاذ قوائم الامامية والوسطى سود . فمخاذه الخلفيتان الى الصهبة || يظهر من ايار الى ايلول . مسرعه يستمر طوال النهار . مرتعه الازهار واخصها ازهار الفصيلة الصيرانية || يرقته غبراء اللون ، حنطية الرأس ، تركب الاخشاب المقطوعة اليابسة ومنها السنط والجوز والكستناء فتتخر الشكير وتسرده وتمطبه .

١٠٧٥٨ - ديسوق ثلاثي النقط ٥

Dysauxes tripunctata (S). Dysauxe triponctué (E). Dysauxes tripunctata (E).

حشرة من فصيلة الهاتيات ورقبة حشرغيات الاجنحة . موطنها بعض اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم . فراشها جارية قوتها رحيق الازهار . سرقها خاضعة تعيش على الطحالب والسراخس والحزاز والخشاش || جسمها صغير القد يطول نحو ٨ مم . بسطتها نحو ٢٣ مم . رأسها صغير الجرم . عيناها كبيرتان . زباناها خيطيان . جوشها كثيف الحمل الاصفر الاصفر . بطنها اصفر اللون ، بني الملاقى السكية || رواشن الذكر الى الحنطي الاصفر الموج تعلوه في الزوج الامامي ثلاث نقط بيض . رواشن الانثى الى الحنطي الاصهب يطوقه اطار اشقر ويعلوه في الزوج الامامي بقعة صغيرة صناعية اللون || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في النهار . تعاظم بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتمتع المكن ميحادياً على جدوع وفروع النبات العائل || السرفة عند بلوغها الكمال تطول نحو ١٨ مم . بجسمها اسطواني الشكل . ثوبها الى الحنطي الاسمر تعلوه ثعول جانبية تمتد من السكة الثالثة الى التاسعة . ثعولها الى الحمرة القرمزية يتوجها هلب قصير . رأسها جزوي . مدنها ورواجها الى السمرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع ينتضي داخل صلجة تحجبها السرفة على النبات العائل .


١٠٧٥٩ - ديسوم ٥ Dicceum (S).

Dicée (F). Dicceum (E).

جنس طير من الجواثم رقيقات المناقير وفصيلة المغتريات . انواعه المعروفة نحو ٢٠ جميعها من عصافير الهند والبرية والفلين . تألف الغابات والحراج والادغال . ملجنسا الحياتي جماعي . افواجها تعد من ٣٠ الى ٦٠ زوجاً . قوتها الحشرات ورحيق الازهار وبعض البزور البرية || اجسامها ربعة صغيرة القد تطول من ١٠ الى ١٤ سم . اذانها قصيرة ، مقطوعة . اثواب ذكورها مبلقة فيها الاحمر والاسود والابيض والبرتقالي والاخضر الاليس والاطحل ... اثواب اناثها عادمة التليق تغلب فيها الشقمة والخضرة الزيتية || تدفن اعشاشها في الادغال . اناثها



ديسمة



ديسوس اكلف



ديسوق ثلاثي النقط



ديسوم

وترية التجميع يراوح عددها من ١٩ الى ٢٣ طولها نحو ٤ سم وعرضها من ١ الى ٢ . نصلها مهدب الخنار . هذب احمر اللون || الجراء جؤوية والبزور سود . اما الخشب فال صفار البرتقالي .

١٠٧٦٦ - ديش مشوك

Xanthoxylon americanum (S). Clavallier à feuilles de frêne, Frêne épineux (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٦ امتار . اوراقه كبيرة نحو ٢٠ سم . وريقاتها وترية التجميع يراوح عددها من ٥ الى ١١ ، طول الوريقة نحو ٦ سم . وعرضها ٣ . نصلها ازغب البشرة السفلى تعلوه غدد شفافة عطرية الرائحة يتوسطها هذب شائك . الجراء سوداء اللون والبزور كذلك . الخشب الى الصفرة الليمونية .

١٠٧٦٧ - ديشكار * ، خنشكار كسيبر

Pteridium aquilinum, *Pteris aquilina* (S). Fougère-aigle, F. commune, F. à cerises, Grande fougère (F). Bracken, Brack fern, Eagle fern (E). Echter adlerfarn, Farn (D). Pteride, Pteris aquilina, Felce (I).

نبات عشبي معمر من السرخسيات الاسباجيات يكثر في الاماكن الرطبة ، يرغب في الاتربة الرملية والطينية ، يخشى الكلسية . سوقيه مدادة . اوراقه مركبة ، قليلة التجميع تطول من متر الى مترين .

١٠٧٦٨ - ديشلي

Dishley سلالة من الضأن الاروبي مشهورة بوفرة لحمها وبجودته .

١٠٧٦٩ - ديشلي مرييني * ، ديشلي مريئوس

Dishley mérinos (F). *Dishley merino* (E).

سلالة من الضأن حصلت من تهجين وتأصيل ضأن ديشلي بضأن بني مرين او الضأن المريي . وهي مشهورة بغزارة وجودة صوفها ولحمها .

١٠٧٧٠ - ديفتريا ، ذباح ، خائوق

Diphtherie (F). *Diphtheria* (E).

مرض جرثومي وبائي يصيب الحيوان .

١٠٧٧١ - ديفتريا الطير

Diphtherie variolique (F). *Variole diphtheria* (E).

هو جدري الطير مرض خبيث .

١٠٧٧٢ - ديففوني

Dévonien (F). *Devonian* (E).

نعت تعريفي يطلق على الحقبة الثالثة من الاباج القديم . فيقال العصر الديفوني والاراضي الديفونية ، وهي تتميز باحتوائها على متحجرات التريلوبيت والنفيديات وصدفيات الجلود . وبظهور الشلقيات ومزدوجسات التنفس والامسوخيات وعريانات البذور .

١٠٧٧٣ - ديك

Coq (F). *Cock* (E).

هو ذكر الدجاج . جمه ديوك وديكة . كنيته : ابو حسان وابو حماد وابو سليمان وابو عقبة وابو مدليج وابو المنذر وابو نهان وابو يقظان وابو برائل .

قال ابو بكر الصنوبري في مدحه :

مفرد الليل مسا يالوك تغريدا

مل الكرى فهو يدعو الصبح مجهودا

لما تطرب هز العطف من طرب

ومد للصوت لما مده الجيدا

كلايس مطرفا مرخ ذوائبه

تضاحك البيض من اطرافه السودا

حالى المقلد لو قيس قلائده

بالورد قصر عنها الورد توريدا

تخصن بمنابرة الذكور من ٣ الى ٤ بيضات على مرتين في الحول .

١٠٧٦٠ - ديسومة

Choriospora (S). *Choriospora* (F). *Choriospora* (E).

جنس نباتات عشبية حولية برية من الهيفمانيات وفصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منبتها بعض اصقاع الشرق الادنى واروبة الجنوبية || سوقها معتدلة الارتفاع ، فرعاء . اوراقها متعاقبة ، السفلى قيثارية النصال ، العليا مسننة الاطراف . ازهارها كبيرة القد ، رباعية البتلات ، منها الابيض والاصفر والارجواني . تنويرها ربيعي . ثمارها خرينبات شبه مخروطية الشكل تغلف بمض البزور المكورة الجؤوية اللون || اعرف انواعها الديسومة السورية (*C. Syriaca*) التي يكثر وجودها في المنطقة الممتدة من جبل الشيخ في لبنان الى تدمر في سورية .

١٠٧٦١ - ديسينة *

Discina (S). *Discine* (F). *Discina* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عضديات الارجل وفصيلة الدوارات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد تعيش على الصخور المنمورة البعيدة الغور في بحار البلاد الباردة || اصداقها قرنية المادة ، لامتناهية المصارع ، شبه بيضية الشوزن ، مسطحة الصفحات السفلى . مصاريعها مجهزة بطباب مستديرة . طباب المصراع العلوي عادم الثقوب يتوسطه نشوز كالشندوة اما طباب المصراع السفلي فأبيض اللون يتوسطه كظمر مستطيل الفلق .

١٠٧٦٢ - ديش *

Xanthoxylon, *Zanthoxylum* (S). *Clavallier*, *Xanthoxyle* (F). *Prickly ash*, *Tooth-ash tree* (E). *Zahnwehgelbholz* (D). *Clava erculea* (I).

جنس اشجار وجنبات برية وزارعية تزيينية من فصيلة السذابيات . انواعه نحو ١٢ جميعها فرعاء . اوراقها مركبة ، وريقاتها خلية او زباء النصل . ازهارها ثنائية المسكن ، عطرة ، وترية التركيب ، ثلاثية او خماسية البتلات والاسدية والمبايض والجراء . بزورها سود . اخشابها ناعمة الرقعة ، جيدة الصنف ، لونها الى الصفار الباق . تستعمل في الصناعات الدقيقة || اعرف انواعه ما يتبع .

١٠٧٦٣ - ديش بنجي

Xanthoxylon bungei (S). *Clavallier de Bunge* (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٨ امتار . فروعه وافناده شائكة . اوراقه تطول نحو ١٥ سم . وريقاتها وترية التجميع خماسية او سباعية العدد ، طولها نحو ٤ سم . نصلها لامع البشرة ، خلي الخنار . جراؤها جؤوية ، بزورها سود . خشبها جميل الصفار الزيتوني .

١٠٧٦٤ - ديش فلفلي


Xanthoxylon piperitum (S). *Clavallier-poirvri* (F).

نوع من الديش يعلو نحو ٥ امتار . فروعه وافناده قليلة الشوك . اوراقه مركبة من ١١ او ١٣ او ١٥ وريقة طول الواحدة نحو ٤ سم . وعرضها ٢ . نصلها خلي البشرة مسنن الحافة . الجراء حنطية اللون . البزور سود والخشب الى الصفار الكبريتي يعلوه توشيع حنطي وماجة جؤوية .

١٠٧٦٥ - ديش مسطح الشوك

Xanthoxylon planispinum (S). *Clavallier à épines plates* (F).


نوع من الديش يعلو نحو ١٢ م . فروعه وافناده قليلة الشوك المسطح . اوراقه تطول نحو ٣٥ سم . وريقاتها




ديسينة



ديش



ديشار



ديشلي مريي



ديك الشمس

١٠٧٨١ - ديلاريات ° Dilaridae (S).

Dilaridés (F). Dilaridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة ، معظمها من عظم البلاد الامريكية وبعضها منتشر في حوض البحر الابيض المتوسط وفي الهند واسيا الجنوبية || اجسامها صغيرة القد ومتوسطة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٢ الى ٤٠ مم . رؤوسها شبه مكورة . عيونها كبيرة جاحظة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، دقيقة ، عديدة الفصل ، مشطية عند الذكور . كواسلها شبه عمودية الاتجاه بالنسبة الى محور الجسم ، يعلوها طوق من الدريئات المشوجة بهلب دقيق . اجنحتها مستديرة الاطراف ، مرقوشة بالاسمر . بطونها اسطوانية الشكل ، مبعثرة الهلب . اناثها مستطيلة المرزات || يرقاتها مفترسة ، صغيرة القد ، اعليجية الشكل ، يكثر فيها الثوب الاسمر . اشهر اجناسها الديلار واليدار .

١٠٧٨٢ - ديئلم هو قطاة الرمل ، اطلبها .

١٠٧٨٣ - ديئلوبه زرقاء الرأس °

Diloba caeruleocephala (S). Dilobe à tête bleue, Double oméga (F). Diloba caeruleocephala (E).

حشرة من فصيلة الفسقيات ورتبة حرشقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة وافريقية الشمالية . فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة تعيش على اوراق الزعرور واللوز والدراق والخوخ والمشمش ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ مم . بسطتها تراوح من ٣٤ الى ٤٠ مم . رأسها معتدل الجرم ، ازرق اللون . عينها صغيرتان . زباناها خيطيان ، مهدبان عند الذكر . حرشفها معتدل الجرم والطول . جوشنها كبير القد ، سبوري اللون ، ازرق الموج . بطنها كثيف الحمل ، اطحل اللون ، بني الموج || روشناها الاماميان الى النبي الاحمر الموج نملوه بقع ممتدة الى الشبهة الزرقاء وزركشة وزوزقة يغلب فيها الخططي . روشناها الخلفيان الى الخططي الاغبر العاجي الموج يعلوه تبقيج اشهب ازرق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في مطلع ايلول . تعاظم بعد ظهورها بنحو ثلاثة ايام وتمتج المكن بين شقوق اللحاء او تحت القشور . يتقف المكن في الربيع بعد ابلال النبات العائل || السرفة تطول من ٣٢ الى ٣٨ مم . جسمها مائل القشار ازرق اللون اكهب الموج يعلوه خط ثنجي اصفر وخطان جانبيين الى الصفار الكبيرتي . سكمها منقطة بالاسود . رأسها ازرق . مدها ورواجهسا الى السمرة الفاتحة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٨ اسابيع ينقضي ضمن صلجة متينة تحببها السرفة بين طيات الازراق او في شقوق اللحاء .



ديلوبه زرقاء الرأس

١٠٧٨٤ - ديئلوس ° Dilus fugax (S).

Dilus fuyard (F). Dilus fugax (E).

حشرة من فصيلة القرنييات ورتبة غمديات الاجنحة . الذكر اصفر قدأ من الالتي يطول نحو ٧ مم . والالتي تطول نحو ١٠ مم . جسمه مستطيل الشكل اطحل الثوب ، حنطي الموج الاسفع || اعطانه البلاد المعتدلة الحرارة والحارة . يسرح في النهار . يظهر في نيسان ويبقى حتى تموز . مرتبه ازهار النباتات الحرجية || يرقته تركب قضبان اللزان والوزال والهدسكان والشيع فتتغريها وتؤذيها اشد الاذى .

Halcyon

١٠٧٧٤ - ديك البحر

هو القيون ، اطلبه .

Scarus gallus (S).

١٠٧٧٥ - ديك البحر

هو المخرد ، سمكة بحرية من بنات مصقار .

Alecthella (S).

١٠٧٧٦ - ديك الشمس °

Alecthelle (F).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى ديك الشمس . جنس طير من فصيلة الشقبانيات . انواعه المعروفة قليلة العدد . موطنها المناطق الاستوائية . ملجئها الحياتي جماعي . افواجها قليلة العدد . قوتها البذور والحشرات . تعدو بسرعة فائقة وتطير بخفة . طيراتها معتدل الشوط || اجسامها صغيرة . اذناها شديدة القصر تلحفها الاجنحة || لحمها فاخر الصنف .

١٠٧٧٧ - ديكرانوره فرقاء الدتب °

Dicranura vinula (S). Dicranura lie de vin,

Queue fourchue (F). Dicranura vinula (E).

حشرة من فصيلة الشوحليات ورتبة حرشقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اروبة . فراشها جارسة قوتها رحيق الازهار . سرفتها خاضعة تعيش على اوراق الصفصاف والحور || جسمها كبير القد يطول نحو ٢٦ مم . بسطتها تراوح من ٦٤ الى ٧٠ مم . رأسها معتدل الجرم . عينها كبيرتان . زباناها مشطيان مزدوجان عند الذكر ، مشطيان بيطان عند الانثى . جوشنها اكهب اللون . بطنها الى الكهبة يعلوه خط ثنجي قاطب وقسمه خطوط معتمة جميعها سمراء قاتمة || رواشنها الى البياض الاغبر الخططي الموج تعلوه خطوط وتزاويق قاتمة || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في نيسان وتبقى حتى حزيران . تسرح في الليل . تعاظم بعد ظهورها بسبعة اسابيع || السرفة عند ادراكها الكمال الجسموري تطول نحو ٥٠ مم . جسمها مستعجن الشكل اللامألوف . شرحها مجهز بزائدتين قرنيتين . وهي عند الدفاع عن النفس تقذف مادة حريفة تفرزها خيوط صدرية وشرجية حمراء اللون فياجة || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٤ الى ٢٦ اسبوعاً ينقضي ضمن صلجة متينة تحببها السرفة تحت القشور او بين اللحاء .

Dicksonia (S).

١٠٧٧٨ - ديكسونيه

Dicksonia (F). Dicksonia, Tree fern (E). Dicksonie (D). Dicksonia (I).

شجرة من السيتاسيات السرخسيات معقودة الهوية على اسم العالم الانكليزي جيمس ديكسون . مهدا استراليه . جذعها يعلو نحو ٢٠ م . قشورها ليفية سود القاعدة خضر الطرف . اوراقها هامة التجميع اعليجية الشكل طولها يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . عرضها من ٦٠ الى ١٠٠ سم . فصلها ثلاثي التفريغ اخضر الصفحة العليا ، زيتوني السفلى .

Pécarl (F). Peccary (E).

١٠٧٧٩ - ديكنويل

هو الخلاح ، حيوان امريكي من فصيلة الخنازير .

Daikon

١٠٧٨٠ - ديكون

نوع من الفجل يعرف بالفجل الياباني ، اطلبه .

١٠٧٩٤ - دَيْن ثَابِت ، دَيْن صَحِيح
Créance certaine (F). Undoubted credit (E).
هو الدين الذي لا نزاع في صحته .

١٠٧٩٥ - دَيْن شَكِيَّت
Dette flottante (F).
Wavering debt (E).
هو دين حكومي قصير الاجل تعقده الخزنة العامة مباشرة .

١٠٧٩٦ - دَيْن طَوِيل الاجَل
Dette à long terme (F). Long-dated debt (E).
من انواع الديون الشئبة المستطيلة الاجل المطلوبة من الحكومة .

١٠٧٩٧ - دَيْن عُمَرِي ، دَيْن مَعَاشِي
Dette viagère (F). Life debt (E).
هو الدين المتوجب على الدولة الى ارباب المعاشات .

١٠٧٩٨ - دَيْن قَصِير الاجَل
Dette à court terme (F). Short-dated debt (E).
من انواع الديون الشئبة المطلوبة من الحكومة .

١٠٧٩٩ - دَيْن مُوَسَّخ
Dette consolidée (F).
Funded debt (E).
دين طويل الاجل يطلب رأساً من الحكومة . وفي العرف يصبح الدين مرتجاً اذا اضيفت متأخراته الى الباقي من رأسماله ومدد اجل دفعه .

١٠٨٠٠ - دَيْن مَطْلُوب
Dette passive (F).
Liabilities (E).
هو كل دين مطلوب من المرم .

١٠٨٠١ - دَيْن مُعَيَّن
Créance liquide (F).
Liquid credit (E).
هو كل دين عين مقداره تعييناً صحيحاً .

١٠٨٠٢ - دَيْن مَقْدُور الإِسْتِهْلَاك
Dette amortissable (F). Redeemable debt (E).
نوع من الدين يلتزم المرم بدفع اصله مجزئاً على اجمال معينة وبشروط مقررة .

١٠٨٠٣ - دَيْن مَقْبَد
Dette inscrite (F).
Inscribed debt (E).
هو الدين الذي يقيد في السجل العقاري .

١٠٨٠٤ - دَيْن مُوَلَّق
Dette gagée (F).
Pledge debt (E).
دين عام مضمون اما بعين مرهونة او بتخصيص بعض الموارد المالية . لدفعه .

١٠٨٠٥ - دَيْن وَاجِب الاداء
Créance exigible (F).
Demandable credit (E).
هو الذي يمكن الدائن من ارقام المدين على ادائه .

١٠٨٠٦ - دِينَارِيَّة
Clypeola (S). Clypéole (F).
جنس نباتات عشبية حولية ومحولة من فصيلة الصليبيات .
انواعها المعروفة عديدة منبتها يشمل حوض البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق اوروبا والشرق الادنى || سوقها عادة الفروع ، كثيفة الزغب المستطيل . اوراقها متعاقبة منها السنانية الضيقة والمصفية والخيطية || ازهارها ضمية التجميع ، هامة الازكاز ، متباينة الاحجام ، قريبة الشبه بالدنانير ، لونها الى الصفار الذهبي . تنويرها ربيعي .

١٠٧٨٥ - دِيمَاسِي
Souterrain (F).
Underground (E).
نعت تعريفي يطلق على كل عضو نباتي كالجذر والسرخ وما اشبه يعيش داخل التربة . وهو ايضاً صفة كل كائن يوجد في بطن الارض .

١٠٧٨٦ - دِيمَمَة
الديممة ، مطر يهطل ويستمر في سكون بلا رعد ولا برق .
ج ديم وديوم .

١٠٧٨٧ - دِيمُور
Diomorus (S).
Diomore (F).

جنس حشرات من فصيلة الطرميديات ورقبة غشائيات الاجنحة المخصورة . انواعه المعروفة لا تتجاوز العشرة . اعطائها البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها تتطفل على مختلف انواع الزناوير والذباب || اجسامها متوسطة القد النسبي تطول من ٥ الى ٧ مم . تتميز بانواعها اللاعة السفماء الموج وبرزاتها الدقيقة الحارقة الطول .

١٠٧٨٨ - دِيمُول
Dimol
حاشور زراعي قوي الفاعلية شديد الوقع يقضي على معظم الحشرات الضارة . وهو سائل لزج يتركز على بعض المواد السامة . يستعمل محلولاً بالماء بمعدل يراوح من الواحد الى الاثنين بالالف .


١٠٧٨٩ - دِيمِي
Dimidié (F).
نعت يطلق على كل عضو في النبات والحيوان ممي وتطور قسم منه وهزل واستقر القسم الآخر .

١٠٧٩٠ - دِيمِيَّات
Dimyidés (F). Dimyidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم الرباعية عادات المتاعب . اجناسها وانوعها المعاصرة قليلة العدد اعطائها بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها شبه مستديرة الشكل ، مخددة المصاريح اللانساوية . اغشيتها الداخلية سمكة المادة اللؤلؤية || تعيش طليقة في رمال الاغوار البعيدة .

١٠٧٩١ - دِيمِيَّة
Dimya (S). Dimya (F).
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة الديميات . انواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها متوسطة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مخددة المصاريح اللانساوية ، جووذية اللون غالباً . اغشيتها الداخلية وافة المادة اللؤلؤية || تعيش على سطح الرمال البعيدة الغور التي تراوح اعماقها بين ٥٠ و ١٥٠ متراً .

١٠٧٩٢ - دَيْن
Créance, Dette (F). Credit, Debt (E).
لفظة شاملة تستعمل للدلالة على المطلوب للمرم وصل المطلوب منه .

١٠٧٩٣ - دَيْن تجَارِي
Dette commerciale (F).
Commercial debt (E).
الدين التجاري في القانون المالي هو القرض الذي تعقده الحكومة في الاسواق الخارجية او الالتزامات التي تقطعها على نفسها للمصارف الاجنبية .



ديمور



دينردّه

١٠٨١١ - ديوسمّة ، جنبّة عطيرة Diosma (S).

Diosme (F), Diosma (E).

الاسم من اليوناني بمعنى «عطر ألهي» جنس جنبات معمرة من فصيلة السذابيات. أنواعه عشرة جميعها جنبات صغيرة القد ترتفع من ٥٠ إلى ٨٠ سم. تشبه الخلدنج. أوراقها عروّة خيطية متقابلة ومتعاقبة، نصلها يطول نحو ٣ سم. يحمل صسل صفحته السفلى بعض الغدد الدهنية التي تفرز مادة عطرية فواحة العرف الذي يقال أنها من المقويات الجزيلة النفع ومن منشطات الباه غير المؤذية || أزهارها صغيرة جميلة. ألوانها تختلف مع الأنواع. يكثر فيها الأبيض والوردي والأحمر || أزهارها يستمر طوال السنة. تزرع في المراكن وفي البيوت.

١٠٨١٢ - ديوسمّة الشبق * Diosma ericoïdes (S).

Diosme, Buchu (F), Diosma, Bucku plant (E), Götterduft, Bukkostrauch (D), Diosma (I).

نوع من الديوسمّة البرية والزراعية الزينية. أوراقها غزيرة المادة الدهنية الشديدة الفاعلية في الشبق والباء.

١٠٨١٣ - ديونّ Passif (F), Passive; On debit side (E).

هو كل مطلوب إلى الغير من الذمة المالية.

١٠٨١٤ - ديونّة هي خائق الذباب، اطلبه.

١٠٨٠٧ - دينردّه * Dinarda dentata (S).

حشرة صغيرة القد من فصيلة الدنيات طولها نحو ٤ سم. ثوبها إلى الصهبة العابقة، تعيش في قرى النمل تفترس الهوام وجثث النمل.

١٠٨٠٨ - دينورنيس ° Dinornis (F), Dinornis (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى «طائر رهيب». طائر من الرواكض يبلغ ارتفاعه ٣٥٠ سم. يعود عهده إلى أرائل الألباج الرابعي. وجدت أحافيره في طمى جزيرة زيلندا الجديدة.

١٠٨٠٩ - ديوان المحاسبة Cour des comptes (F).

Audit office (E).

هو الديوان الصالح الخاص بمراقبة واردات الدولة وصرفياتها.






١٠٨١٠ - ديوسقوريّات Dioscoréacées (F).

Dioscoreaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة. أجناسها ٢٩، أنواعها ١٧٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. سوقها ليفية ملتفة، جذورها عسقلية. أوراقها معنقة كفية أو مركبة. أزهارها صغيرة نظامية وبعضها ثنائي المسكن. الأزهار الذكرية سداسية الاسدية. صاقلها ديماسية لبابية مأكولة مختلفة الأشكال والأحجام || أشهر أجناسها الانيام والفاشرشين.



ديوسمّة الشبق



١٠٨٢٢ - ذَاذِي هو الداذي من النبات ، اطلبه .

١٠٨١٥ - ذَاب ، ذِيم Dépréciation (F).
التقص في قيمة الشيء من جراء عيب . Depreciation (E).

١٠٨٢٣ - ذَارِعَات هي الارفيات من الحشرات ، اطلبها .

١٠٨١٦ - ذَات الْأَجْرَاس ، ذَات الصَّلَاحِيل
هي الصنحية من الحيات السامة ، اطلبها .

١٠٨٢٥ - ذَاعِفٌ ، ذَاعِقٌ Léthal (F). Lethal (E).
نمت تعريف يطلق على المواد آسامة القتالة المستعملة في
مكافحة الحشرات وغيرها .

١٠٨١٧ - ذَات الْحَدَّة Monôme (F). Monomial (E).
هي العبارة الجبرية الحيدة التي لا يستجها تعريف ايجابي
أو سلبي .

١٠٨٢٦ - ذَافٍ Mélanger (F).
To mingle, To bland (E).
خلط الشيء فانقص من قيمته الصنفية .

١٠٨١٨ - ذَات الرِّقَّة السَّارِيَة Pleuro-pneumonia,
Pneumonie infectieuse (F). Pleuropneumonia (E).
مرض معد يصيب الخيل والخيترات اخصها البقر فيؤذيها
أشد الاذى وقد يميتها في حال الإهمال .

١٠٨٢٧ - ذَا فِينْدَاس Daphné mézéréon (F).
Mezereon (E).

راجع مازريون . قال داود الانطاكي : « يسمى بالمغرب
مازريون ويقال له مازره وهو نبات عريض الاوراق
ابيض الزهر له حب دون الغار وأصله كأنما تولد بين
زيتون وغار عليه قشر شديد السواد ينقشر عن غصن نضر
لطيف الملمس إلا انه حاد لذاع ويكثر بلبنان والمغرب
ويقطع بحزيران . يستعمل من خارج فيأكل اللحم
الرائد ، ويسقط التآليل ويقطع الآثار كالوشم ولا يجوز
استعماله من داخل لانه يحرق » .

١٠٨١٩ - ذَات الْقَرْنَيْن

هي القرناء من الحيات الخبيثة ، اطلبها .

١٠٨٢٠ - ذَات الْكَرْسِيِّ

Cassiope, la Chaise, le Trône (F).
Cassiope, Cassiopeia's chair (E).


كوكبة نجوم موقها بالقرب من القطب الشمالي . وهي تمثل
امراة جالسة على كرسي أو عرش . وهي دائماً تماكس
الدب الأكبر بالنسبة الى نجمة القطب || نجومها كثيرة ،
عددتها لا يقل عن ٥٥ وبعضها مزدوج . والعرب تسمي
النيرة من هذه النجوم « الكف المنضب » ودركة ذات
الكرسي « و » السدير « (Schedir) .

١٠٨٢٨ - ذَاق Déguster (F). To taste (E).
ذاق الشيء : تذوق طعمه .


١٠٨٢١ - ذَات النَّفْسَيْنِ

من اسماء المياه العذبة لها غياثيم ورثان . تعرف بدييب
الحوت ، اطلبه .


١٠٨٢٩ - ذَاوَةٌ Mouton décharné (F).
Fleshless sheep (E).
الذَاوَة هي المهزولة من الغنم




ذبابة البساتين ذبابة الاصطبلات




ذبابة الحماس




ذبابة الحنطة




ذبابة الدم



ذبابة الشوادر ذبابة الشوادر



ذبابة الطير



ذبابة القرفل

مستندق لونها رمادي اصفر. تظهر في الربيع، تلقي بمكثها على التربة في آب فينتف عن يرقات صغيرة تركب جميع الاعشاب اخصها النجيل بانتظار الحنطة. فتى قصمت الحنطة وطالت تركبها اليرقة وتدخل بين غمد العصف والقصب وتستقر عند اول كعبرة فتتخرها وتعطها.

١٠٨٤٤ - ذبابة الدم * Hématopate (F).

Hématopate (E). جنس ذباب من النمرات. انواعه قليلة. اجسامها مستطيلة. اثارها الى اربعة الذراع يملوها موج اسمر. جناحها مستطيل منمش بالابيض. تعيش على المواد العضوية والدم الذي تمتصه من ابي حيوان كان وقد تلسع الانسان || توجد في الصيف. تكثر قرب مجاري الماء.

١٠٨٤٥ - ذبابة الزيتون هي خنشة الزيتون، اطلبها.

١٠٨٤٦ - ذبابة الشحم هي اريسة الشحم، اطلبها.

١٠٨٤٧ - ذبابة الشواطىء *

Fucellia maritima (S). Fucellie maritime (F). حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة الذبابيات. جسمها صغير القد، بيض الحلب، يطول من ٤ الى ٦ سم. ثوبها الى الشقرة السمر السفاء. رأسها معتدل الجرم، اصفر اللون. عظمها معتدل الطول. زباناها دقيقان، قصيران. عينها صغيرتان، قريزيتان. صدرها وبطنها مستطيلان. روثناها كبيران، شفافان. قوائمها نشيطة، قصيرة الملب الشائك || مبدولة على جميع الشواطىء. طيرانها سريع الحركة. تركب ما يلفظه البحر من خث اخصها الضريع || يرقاتها وانجحة.

١٠٨٤٨ - ذبابة الشوادر *

Pegomyia betae, P. hyoscyami (S). Mouche de la betterave (F). Spinach leaf miner, Beet fly, Mangold fly (E). Rübenfliege, Runkelfliege (D).

حشرة من الذبابيات، طولها يراوح من ٥ الى ٦ سم. مرتعها من نيسان الى تشرين. تمتح مكثها خلال شهر ايار على اوراق الشوادر فوق صفحاته السفلى فينتف عن يرقات دقيقة تنقب النصل وتسربه طولاً وعرضاً فتسبب ذبوله.

١٠٨٤٩ - ذبابة الطير *، أنطومة الطير

Anthomyia pluvialis (S). Anthomyie pluviale (F). حشرة من الذبابيات، طولها من ٤ الى ٦ سم. ترتفع من ايار الى تشرين. يرقاتها هراكة تعيش في اوكن الطير.

١٠٨٥٠ - ذبابة الغاب هي اريسة الغاب، اطلبها.

١٠٨٥١ - ذبابة القرفل *، هيلمة رصاصية

Hylemyia brunescens, Phorbia brunescens (S). Mouche de l'oeillet (F). Carnation maggot (E). Braune Neikenfliege (D).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٦ الى ٧ سم. لونها رصاصي تظهر في ايار. تمتح مكثها على اوراق القرفل فينتف عن يرقات صغيرة دقيقة تدخل نصل الاوراق فتلفه بين البشرتين وقد تركب سلاميات السوق فتقضي عليها.

١٠٨٥٢ - ذبابة الكرز هي خنشة الكرز، اطلبها.

١٠٨٣٠ - ذباب الأرض Phallus هر الفلوس، اطلبه.

١٠٨٣١ - ذباب البحر Holothurie (F). Sea-slug (E). جنس حيوانات بحرية مشهورة باسم قشاة البحر، اطلبه.

١٠٨٣٢ - ذباب الرياء Taureau sauvage (F). هو الثور الوحشي ويدعى الذب والاذب. Wild bull (E).

١٠٨٣٣ - ذباب Muscivore (F). Muscivorous (E). نعت تعريفي يطلق على كل طائر او حشرة تأكل الذباب. ويقال ايضاً مذباب.

١٠٨٣٤ - ذباب هندي هو الذراع، اطلبه.

١٠٨٣٥ - ذبابة Mouche (F). Musca (E).

الذبابة كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها فوق برج الحمل || نجومها قليلة العدد اشهرها يحمل الرقم ٤١ وهو نجم مزدوج من المرتبة الرابعة.

١٠٨٣٦ - ذبابة Mouche (F). Fly (E).

الذبابة واحدة الذباب والذبان والاذبة والذب. فتقول ارض مذبة ومذبوبة اي كثيرة الذباب. وكلمة ذباب تطلق في علم الحيوان، على حشرات فصيلة الذبابيات وهي في العرف او الاصطلاح تعني كل حشرة من رتبة ذوات الجناحين.

١٠٨٣٧ - ذبابة الاصطبلات *

Muscina stabulans (S). Muscine des étables, Mouche inerne des étables (F).

حشرة من الذبابيات، طولها يراوح من ٧ الى ٩ سم. يكثر وجودها في الاصطبلات. تركب الخيل والابقار. تعيش على ما تمتصه من جلودها. وهي تنقل العدوى في حالة المرض || يرقاتها مبشرة مؤذية.

١٠٨٣٨ - ذبابة البحر المتوسط

هي خنشة الهار، اطلبها.

١٠٨٣٩ - ذبابة البساتين * Morellia hortorum (S).

Mouche des jardins (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٧ الى ٩ سم. تعيش على الازهار والمواد العضوية المختمة والزبل... يكثر وجودها من ايار الى تشرين || يرقاتها نائلة.

١٠٨٤٠ - ذبابة البيوت راجع ذبابة أهلية.

١٠٨٤١ - ذبابة التين هي السمران، اطلبه.

١٠٨٤٢ - ذبابة الحماس * Pegomyia bicolor (S).

Mouche de l'oseille (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٥ الى ٧ سم. يكثر وجودها من اذار الى تشرين الاول. مرتعها المراعي والاعشاب الحقلية وبعض البقول. تمتح مكثها على اوراق الحماس فينتف عن يرقات تلثم الاوراق وتقضي عليها.

١٠٨٤٣ - ذبابة الحنطة *، هيلمة القمح

Hylemyia coarctata (S). Mouche du blé (F).

حشرة من الذبابيات، طولها من ٦ الى ٧ سم. جسمها

الطول . زباناها صغيران ، نحيلان . عيناها كبيرتان ، جؤجؤيتان . روثناها كبيران ، قسطانيا الحصاب . قوائمها نشيطة || تظهر الحشرة الجملانة من حزيران الى ايلول . مسرحها البراري والحقول || تمتع الانثى مكثا في زبل المحترات فينتف عن يرقات نائلة تعيش في مكانها حتى الاكمال .

١٠٨٦٢ - ذبابة شائعة راجع ذبابة اهلية .

١٠٨٦٣ - ذبابة غبراء * ، أنطومة غبراء ،

هيلمسة غبراء * Hylemyia cana (S). Anthomyie blanchâtre (F). Wheat bulb fly (E). Getreideblumenfliege (D).

حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم . تسرح من نيسان الى كانون . مرتعها الازهار والاعشاب البرية والحقلية . تمتع مكثا على مختلف النباتات اخصها القرصية الاوراق والبصلية وعلى بعض الجنادب فينتف عن يرقات وأجنة تنطفل على الحشرات العائلة فتتغذى عليها ، وخاصة ثلثم النجس النباتية فتؤذيها .

١٠٨٦٤ - ذبابة قانصة * ، لزبة *

Lispa tentaculata (S). Lispe tentaculée (F). حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٦ الى ٧ مم . ملامسها صفر . مخالبها قوية . تسرح من اذار الى كانون مرتعها مجاري الماء وضفاف الانهار . قوتها الهوام والحشرات الصغيرة تقتنصها بالمطاردة .

١٠٨٦٥ - ذبابة منشكارية * هي المنشارية ، اطلبها .

١٠٨٦٦ - ذبابة يقطعة *

Mylospila mediatunda (S). Mouche attentive (F). حشرة من الذبابيات طولها نحو ٧ مم . زباناها ولامسها بنية اللون ، متكها اسمر . تسرح من نيسان الى كانون . مرتعها الازهار والاوراق ومختلف المواد المختمة . يرقاتها نائلة .

١٠٨٦٧ - ذبابيات Muscidae (S). Muscides (F). Muscidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين ، اجناسها وانواعها زهاء ٢٠٠٠ جميعها صغيرة القد او متوسطه . عويناتها كبيرة ، متقاربة في الذكور متباعدة في الاناث . زباناها مهدبة الاطراف ، بطونها قليلة الحلب او عادمه . اجيالها الحولية كثيرة يختلف عددها باختلاف البيئة والاقليم . مكثها لؤلؤي اللون ، وشعي الشكل ، لا قياسي التجميع ، تمتع الانثى في مختلف انواع الزبل والبراز والمواد العضوية الثالفة الرطبة فينتف بعد وقت قصير ، تراوح مدته بين ٨ و ٣ ساعة ، عن يرقات مدبة الرأس ، غليظة الطرف المقطوم ، غبراء اللون ، يراوح طولها عند بلوغها كامل نموها من ٨ الى ١٢ مم . || كزودها برميكية الشكل لونها الى البني الاسمر ، طولها من ٣ الى ٦ مم . طورها العذري يلوم من ثلاثة ايام الى اسبوعين .

١٠٨٦٨ - ذبباح Diphthérie (F). Diphtheria (E). هو الديفترى مرض وبائي .

١٠٨٦٩ - ذبالة * Dorippus (S).

Dorippe (F). Dorippus (E). جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الارجل

١٠٨٥٣ - ذبابة اللحم * ، سركوفيل *

Sarcophila (S). Sarcophile (F). جنس حشرات من الذبابيات القصيرات القرون . انواعها قليلة منتشرة في جميع اقطار العالم . اجسامها غليظة زباء . اقربها الى الكهبة المخططة بالاسود والاسمر . دعابيصها لاحة تركب النجس الحية فتؤذيها .

١٠٨٥٤ - ذبابة اللحم الخضراء

هي الخشفة الخضراء ، اطلبها .

١٠٨٥٥ - ذبابة الملفوف * ، أنطومة الملفوف ،

هيلمسة الملفوف

Hylemyia brassicae (S). Anthomyie du chou, Mouche du chou (F). Cabbage maggot (E). Kohlflye (D). حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٦ مم . تسرح من ايار الى تشرين . مرتعها الاعشاب والازهار البرية والحقلية . تمتع مكثا على النباتات الصليبية اخصها الملفوف فينتف عن يرقات صغيرة دقيقة تلغم اخلاص الاوراق وتعطبها .

١٠٨٥٦ - ذبابة اهلية * ، ذبابة البوت ،

ذبابة شائعة Musca domestica (S). Mouche domestique (F). House fly (E). Stubenfliege (D).

حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٤ الى ٨ مم . وهي مبدولة شائعة توجد في كل مكان ، داخل المساكن وخارجها . قوتها جمع المواد الغذائية السائلة والقابلة للذوبان وقد لا تعف عن الدم لانها بحاجة اليه || تمتع مكثا في مختلف انواع الزبل والبراز والمواد العضوية والنباتية . وحيث ان الذباب يفتش الزبل والبراز والبصاق والجيف والافتار والاطعمة والحيوان والانسان . لذلك فهو من اخبث الحشرات واضرها بالصحة العامة .

١٠٨٥٧ - ذبابة نسي نسي

هي الشاة اللاسعة ، اطلبها .

١٠٨٥٨ - ذبابة خاتلة * هي الاريسة الخاتلة ، اطلبها .

١٠٨٥٩ - ذبابة مخبيشة * Stomoxys calcitrans (S). Stomoxe, Mouche charbonneuse (F). Stinging fly (E).

حشرة من الذبابيات ، طولها يراوح من ٥ الى ٨ مم . ثوبها الى السرة يعلوها تبقيع اسود مستدير الشكل ، منتظم الترتيب ، مدارور ارجلها صفر . تتميز باستطالة متكها الثاقب الماص وبصغر زباناها . تسرح من حزيران الى تشرين . تلسع البقر والخيول وقد تهجم الانسان . تنقل عدة امراض خبيثة اخصها الحمى الجبرية .







١٠٨٦٠ - ذبابة راقصة * Fannia canicularis (S).

Fannia caniculaire (F). حشرة من الذبابيات ، طولها من ٤ الى ٦ مم . يكثر وجودها في المساكن . حركاتها سريعة ومختلفة الاتجاهات يرقاتها هواكة نائلة .

١٠٨٦١ - ذبابة رواغة *

Mesembrina callida (S). Mésebrine rusée (F).

حشرة من ذوات الجناحين وفصيلة الذبابيات . جسمها متوسط القد ، متكاثف الحلب ، يطول من ٩ الى ١٢ مم . ثوبها الى السمرة السوداء . رأسها مفلطح . خطمها مستدل



ازهارها كبيرة القد خاسية الاضلاع . ازهارها الى البياض الاغبر ، عطرية العرف || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

١٠٨٨٠ - ذَحَّحَ Pourfendre (F). To cleave (E).

ذح الحطب : شقه . والذح : عمل الحطاب من تفجير وشق .

١٠٨٨١ - ذَحِيَّيَّ Morettia (S). Morettie (F).

جنس نباتات عشبية ، مدادة ، معمرة ، برية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة خمسة اعطانها بعض مناطق البلاد الحارة والمنحرفة نحو الاستوائية || سوقها مدادة . متشعبة ، متكاثفة الزغب الكوكبي الشكل . اوراقها متعاقبة ، متقاربة ، صغيرة النصال الشخية . ازهارها صغيرة ، ابطية الارتكاز وطرفية ، وردية اللون او بيضاء .

١٠٨٨٢ - ذَحِيَّان Koniga (S).

Koniga (F). Koniga (E).

جنس نباتات نجمية معمرة او عشبية حولية من فصيلة الصليبيات . انواعه المعروفة عديدة منبتها يمتد من الشرق الاقصى الى الادنى || جميعها نباتات مستلقية تتميز باوراقها وازهارها المستعجة العرف الفواح || اعرف انواعها واشهرها الذحيان العربي والبحري .

١٠٨٨٣ - ذَحِيَّان بَحْرِيَّ Koniga (S).

Koniga maritima (S). Koniga maritime (F).

نوع من الذحيان منبته بعض سواحل البحر الاحمر والبحر الابيض المتوسط || نجمة معمرة كثيرة الفروع المستلقية . اوراقها رحيمة النصال الحادة الاطراف . ازهارها طرفي . ازهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

١٠٨٨٤ - ذَحِيَّان عَرَبِيَّ Koniga (S).

Koniga arabe (F).

نوع من الذحيان . عشبة حولية برية . منبتها السواحل الممتدة من فلسطين الى مصر وليبيا . ساقها مستلقية ، قليلة الفروع . اوراقها ملوقة مستطيلة . ازهارها طرفي . ازهارها بيضاء اللون . تنويرها ربيعي .

١٠٨٨٥ - ذَحِيَّحَة * Epicanta (S).

Epicante (F). Epicanta (E).

جنس حشرات نافطة من غديات الاجنحة وفصيلة الملوذيات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها المناطق الحارة في معظم اقطار العالم . تعيش على الازهار البرية اما يرقاتها ففترسة وتقضي على مكن الحشرات ودبابها ومنها الجراد || اجسامها مستطيلة الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها دائماً حمراء اللون . كواسلها وبطنها الى السواد الفحشي او الطحلة الرمداء . اغنادها شبه لاحقة يكثر فيها الاسود الاسفع وبعضها مشيز بالابيض || اناثها اكبر قدراً من ذكورها . جميعها طيبة نافطة تستعمل استعمال الذراح الناعظ .

١٠٨٨٦ - ذُخْر Réserve (F). Réserve (E).

هي الاشجار الحرجية التي استقيت بعد فرع الحرج .

١٠٨٨٧ - ذُخَيْرَة ، مَوْوَنَة Provision (F).

Provision, Stock (E).

جماع المواد الغذائية التي تسترجعها الحياة الحيوانية والنباتية .

قصار الذيل وفصيلة الذباليات . انواعها المعروفة عديدة اعطانها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ، مستعرضة المؤخر . دروعها معتدلة الاحديداب . افوها محرمة . تتميز بما تلتصقه بدروعها من فتات الاصداف وغيرها ليخفيها عن الاعداء وعما تطارده من دويبات .

١٠٨٧٠ - ذَبَالِيَّات Dorippidae (S).

Dorippidés (F). Dorippidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل قصار الذيل . اجناسها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، جميعها لجة منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر اجناسها واعرفها الذبالة والعطوز .

١٠٨٧١ - ذُبَح

الذبح : ضرب من الكساء . وهو الجوز البري . وهو نبت حلو يؤكل له قشر اسود ونور احمر (عن أبي حنيفة) ، واحدته ذبحة .

١٠٨٧٢ - ذُبَحُ النَّبِيَّ

هو الزعيم المطوق عصفور من الجواثم ، اطلبه .

١٠٨٧٣ - ذُبْحَة هي الأنجين ، اطلبها .

١٠٨٧٤ - ذَبْل Carapace (F). Turtle-shell (E).

الذبل : غلاف غضروفي ، عظمي رصدي ، عديد الاشكال والالوان ، يلحف ظهور بعض الحيوانات ، اخصها السلاحف والدرود .

١٠٨٧٥ - ذَبْلَة Crotte (F). Dung (E).

هي بكرة الضأن والماعز والخيول والابل ...

١٠٨٧٦ - ذُبُول Flétrissement (F). Withering (E).

ذهاب نضارة الورق في النبات .

١٠٨٧٧ - ذُبَيْبِيَّة * Moluccella (S).

Molucelle, Moluque (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الشفويات . منبتها الشرق الاوسط ، انواعها قليلة برية وزرع للتزيين . سوقها قرعاء . اوراقها معنقة متقابلة ، نصلها سناني الشكل مالمس البشرة مسنن الحافة || ازهارها غريبة التركيب تتكون من كأس قيمة الشكل ترتكز في اسفلها الداخلي اعضاء الزهرة وتوحياتها || اعرف انواعه ما يلي .

١٠٨٧٨ - ذُبَيْبِيَّة شَائِكَة Moluccella spinosa (S).

Molucelle épineuse, Moluque épineuse (F). Spiny molucca (E). Molukkische (D). Molucella spinosa, Melessa spinosa (I).

نوع من الذببيينة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . كؤوس ازهارها صغيرة القد ، اطرافها ثمانية التسنين ، اسنانها مهدبة حادة . ازهارها وردية اللون عطرية العرف . ازهارها يستمر من تموز الى آب .


١٠٨٧٩ - ذُبَيْبِيَّة مَلَسَاء Moluccella laevis (S).

Molucelle lisse, Moluque lisse (F). Molucca balm, Shell flower (E). Molukkenlippe, Molukkische melisse (D). Melessa delle molucche (I).

نوع من الذببيينة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . كؤوس



ذَبِيْبِيَّة



ذَحِيَّحَة

صغیرتان . ظهرانها مستطیل الشكل ، مستدير الطرف الفارق بين النمدین . ارساغها خماسية العقل || لها جیل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند الادراك التام تطول نحو ٢٦ مم . جسمها مبسط الجرم ، سداسي الراجب ، ضلیع انتشار ، مبعثر الهلب . ثوبها الى الطحلة السمراء العابقة || تعتبر من الحشرات الطبية التي تحوي من ٠.٦٠ الى ٠.٧٠٪ من مادة الذراحين .

١٠٨٩٥ - ذَرَّاح نَاعِظٌ ، ذُبَاب هِنْدِي ، أَخْبَضَر

Lytta vesicatoria, Cantharis vesicatorius (S). Cantharide vésicante, Mouche d'Espagne, M. de Milan (F). Spanish fly (E). Spanische Fliege (D).

نوع من الذرايح جسمه مستدق الشكل يطول نحو ٢٠ مم . ثوبه الى الخضار الالامع يعلوه موج ازرق . زبانه خيطية مستطيلة منعطفة الى الوراء . مرتعه الاحراج حيث يركب ويلتهم اوراق عدة نباتات حرجية اخصها المزان والياسم والليلك || وهو من الحشرات الطبية المشهورة يؤخذ ويحفف ويسحق ويستخدم في عدة مستحضرات اخصها الناعظة التي تنشط الباه والايلاع .

١٠٨٩٦ - ذَرَّاحِيَّات *Cantharididae (S). Cantharididés (F). Cantharidae, Soldier beetles (E). Weichkäfer, Weichflügler (D).*

فصيلة حشرات من رتبة نمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باستطالة اجسامها وبقلة صلابة اعمادها . قرونها الاستشعارية مركبة من ١١ فاصلة . ارساغها خماسية العقل تعيش على ازهار ونوامي النباتات البرية . يرقاتها مفترسة لاحة تعيش على التربة .

١٠٨٩٧ - ذِرَاع *Avant-bras (F). Forearm (E).*

عضو من اعضاء الجسم مركزه بين التروقة واصابع اليدين . تتكون الذراع اساساً من عدة عظام اهمها العضد والكعبرة والزند والرسغ . وهي تتحرك بواسطة المفاصل والعضلات التي تكتنفها من كل صوب .

١٠٨٩٨ - ذِرَاع *Pic*

مقياس طولي كان ولا يزال شائع الاستعمال في البلاد العربية . وهو عسل نوعين : الذراع العامي الذي يقدر بشبرين ونصف الشبر اي نحو ٥٨ سم . ويستخدم في قياس المنسوجات || والذراع المعاري الذي يبلغ طوله ٧٥ سم . ويستخدم في قياس الاراضي والبناء .

١٠٨٩٩ - ذِرَاع

الذراع او ذراع الاسد منزل من منازل القمر الشامية ينزله في الليلة السابعة من الشهر . وهما كوكبان نيران ممرضان بين الشمال والجنوب . وللاسد ذراعان ، ذراع مقبوضة وهي الشامية واخرى مبسوطة ، تلي اليمن ، وهي نجم احمر يسمى مرزم الذراع || رقيب الذراع يدعى البلدة .

١٠٩٠٠ - ذِرَاع مَبْسُوطَة *Mabsuta*

الذراع المبسوطة اسم لنجمين نيرين من كوكبة برج التوامين مركزهما على رأسهما .

١٠٩٠١ - ذَرَاوَة ، نُسْكَالَة *Vannée (F). Winnow (E).*

حصيلة نصف الحب .

١٠٨٨٨ - ذَّار * *Paederia (S).*

Paedérie (F). Paederia (E).

الذدار هو الاسم الهندي . جنس نباتات متسلقة معمرة من فصيلة الفويبات . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من نبت الهند وافغانستان || سوقها مدادة ، عارشة ومتسلقة . اوراقها متقابلة ، معنقة ، قلبية النصال الجامدة الناشزة العروق . ازهارها صغيرة ، بيضاء اللون ، تتركز على معاليق محورية || يقال ان اوراقها وجذورها تدر البول وتدفع الحمى .

١٠٨٨٩ - ذَرَّ

النباء المنبث في الهواء اخذت منه الذرارة الواحدة ذرة . والذر : صغار النمل .

١٠٨٩٠ - ذَرَّ الْأَسْمِدَة *Epandage des engrais (F).*

Scattering of fertilizer (E).

هو نثر الاسمدة الكيماوية على التربة وقد يتم اما باليد او بواسطة منائر آلية تنفثه بدقة وانتظام .

١٠٨٩١ - ذَرَّاب *Poison végétal (F).*

Vegetable poison (E). الذراب هو السم النباتي

١٠٨٩٢ - ذَرَّاح ، ذَرَّوَح ، ذَرَّنُوح

Cantharis, Lytta (S). Cantharide (F). Cantharis, Blister beetle (E).

الانثى ذراحة والجمع ذرايح . جنس حشرات صغيرة القد مستطيلة الجسم من فصيلة الملوديات . انواعه عديدة معظمها من حشرات الهند وحوض البحر المتوسط . اثوابها متداخلة الالوان يكثر فيها الزهرجدي والنحاسي والجوزي والجوزي المنمش بالاسود || اشهر انواعه الذراع الناعظ .

١٠٨٩٣ - ذَرَّاح أَزْرَق * *Cantharis livida (S).*


Cantharide livida (F). Livid Blister-fly (E).

حشرة واشعة خاضعة من فصيلة الذراحيات ورتبة مغمذات الاجنحة . تألف الاحراج والبراري التي تكثر فيها الرياحين . خنافسها تعيش على بتلات الازهار ونوامي النبات . يرقاتها مفترسة || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٤ مم . ثوبها الى الزرقة يعلوها موج زيتي . زباناها خيطيان . عينها صغيرتان . ظهرانها مستطيل الشكل ، مستدير الطرف الفارق اللاحف . ارساغها خماسية العقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواخر آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة تطول نحو ٢٤ مم . جسمها مبسط الشكل . ثوبها الى السمرة العابقة . رأسها اسود . فكاهها ضليمان . تعيش في اول عهدا على المواد العضوية ثم على ما تستطيع اقتراضه من الحشرات الدنيا || وهي من الحشرات الطبية التي تحوي ٠.٦٠٪ من مادة الذراحين (الكانتاريدين) .


١٠٨٩٤ - ذَرَّاح أَسْوَد * *Cantharis fusca (S).*

Cantharide noir (F). Black Blister-fly (E).

حشرة واشعة خاضعة طيبة من الذراحيات مغمذات الاجنحة . تألف البراري والاحراج والحدائق . خنافسها تعيش على ازهار النبات ونواميه واوراقه الريانة . يرقاتها مفترسة قوتها الهوام والحشرات || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٥ الى ١٧ مم . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهران والجرايمز ، احمر الكوسل والخطم . رأسها كبير الجرم ، مستعرض الشكل . زباناها خيطيان ، مستطيلان . عينها




ذدار



ذراع ازرق




ذراع اسود



ذراع ناعظ

ذُرْب - ذُرَّة بَيْضَاء




ذرب الابيسة



ذربوب اصفر



ذربوب سورنجاني الزهرة



ذرة



ذرة بيضاء

الزهرة ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٥ م. شراخها يرتفع نحو ١٥ سم. زهرتها صفراء اللون ، ذهبية المواج ، تطول نحو ٥ سم. || تنويرها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٠٩٠٩ - ذُرْبُوبُ سُرْنَجَانِي الزَّهْرَةِ *

Sternbergia colchiciflora (S).

Sternbergia à fleur de colchique (F).

نوع من الذربوب . عشبة دوفسية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل ، تظهر في الربيع ، تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٥ م. شراخها يرتفع نحو ٦ سم. زهرتها صفراء اللون ، مستحبة العرف ، تطول نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

١٠٩١٠ - ذُرْبُوبُ فِيشَر *

Sternbergia fischeriana (S).

Sternbergie de Fischer (F).

نوع من الذربوب . عشبة دوفسية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل تطول نحو ١٠ سم. وتعرض نحو ٢٥ م. فصلها منبسط الصفحة ، عديم التقيد ، جميل الخضار العابق . شراخها يرتفع نحو ٢٠ سم. زهرتها تطول نحو ٣٥ م. لونها الى الصفار الكبريتي الباهت || تنويرها ربيعي .

١٠٩١١ - ذُرْبُوبِيَّة

كل سمكة سامة المتأخس تدعى ذربوبية .

١٠٩١٢ - ذُرْبِيَّات *

Oxyrhynques (F).

لمة من القشريات عشاريات الارجل تنتمي الى رتبة قصار الذيل . اجناسها المعروفة عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها متفاوتة الاحجام والاشكال يكثر فيها المزواني . اجهزتها العصبية صدرية المركز . دروعها قوية ومجهزة بمناخس حادة او بهلب جامد دقيق . قوائمها مستطيلة . بعض انواعها مجهزة بملاقط نشيطة .

١٠٩١٣ - ذُرَّة *

Andropogon sorghum (S). *Sorgho vulgaire* (F). Foxtail millet (E). *Sorgho-gras* (D). *Miglio d'uccello* (I).

نبات عشبي حولي زراعي من النجيليات تكثر زراعته في المناطق الحارة وفي الاثرية غير المروية . ضرره عديدة . ساقه ليفية منتصبة جامدة . اوراقه عصفية سنانية الشكل متدللة الزام الاخير . ازهاره عتقودي عثكولي . ثماره حيوب تكتنف رباطها العصفيات . اما الحبة فستديرة ، تطرها يراوح بين ٤ و ٥ م. || يستعمل استعمال الذرة الصفراء عند بعض شعوب افريقية والهند .

١٠٩١٤ - ذُرَّة الماء اطلب فيكتوريا رجا .

١٠٩١٥ - ذُرَّة بَيْضَاء * ، ذُرَّة صَبْفِيَّة

Sorghum durra, *Holcus durra* (S). *Sorgho commun*, *Grand millet*, *Gros mil*, *Dari*, *Doura*, *Durrha*, *Kafir* (F). *Great millet*, *Guinea corn* (E). *Mohrenbartgras*, *Reiskorn* (D). *Sorgo a scope* (I).

نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي حولي . زراعته صيفية عذبة واسعة الانتشار جيدة الانتاج . حبه غذائي كثير الاستعمال . يوجد في جميع الاثرية المتوسطة الاندماج والخصب .

١٠٩٠٢ - ذُرْب ، ذَلِيق *Cuspidé* (F). *Cuspidate* (E). تمت تعريفه وصفي يطلق على بعض الاشكال المستطيلة الاطراف المدببة .

١٠٩٠٣ - ذُرْب *

Lophodermium (S). جنس فطور مجهرية من الريشيات ، يتميز بتكاثره الشفعية الثانية التجميع وبوغه الخيطي الشكل الوحيد الخلية . يعيش طفيلياً على اهداب الصنوبر وريماً على الاعضاء النباتية اليابسة || اشهر انواعه الثلاثة التالية .

١٠٩٠٤ - ذُرْبُ الأَبَيْسَةِ *

Lophodermium macrosporum, *Hypodermia hartigii* (S). *Maladie du brun de l'épicéa* (F).

فطر مجهري يصيب هذب الابيسة فيؤذيها . مظهره الخارجي يقع ضيقة مستطيلة تعلو نصال اهدب الحولية ، تبدو صفراء اللون ثم تنحرف نحو البني || وهو يؤذي الشجرة ويؤخر نموها من جراء انتقال مشيجه مع اللسع في الاوعية ، وقد يسبب في ظروف خاصة سقوط اهدب || اضراره محدودة لكنها تستوجب المكافحة .

١٠٩٠٥ - ذُرْبُ التَّنُوب *

Lophodermium nervisequum (S). *Maladie du brun du sapin* (F).

فطر مجهري يصيب هذب التنوب فيؤذيه . يظهر في ايار بقعاً ضيقة مستطيلة تبدو صفراء اللون ثم جنطية تركب نصال اهدب الحولية فتذبلها وتسبب سقوطها في الخريف . اضراره زهيدة لا تستوجب المكافحة .

١٠٩٠٦ - ذُرْبُ الصَّنُوبَر *

Lophodermium pinastri, *Leptostroma pinastri* (S). *Maladie du rouge du pin*, *Chute des aiguilles* (F). *Leaf cast of pine and fir* (E). *Kiefernritzenschorf* (D).

فطر مجهري يصيب هذب الصنوبر فيؤذله ويطرح به . مظهره الخارجي اصفرار ينحرف تدريجياً نحو الجؤوة يعلو اوراق الصنوبر منذ ايلول ويستمر في نشاطه البطيء حتى يتم كامل النصل الهدي في اواخر نيسان فيسبب جفافه وسقوطه وقد يعطب النوامي ويؤذيها || اضراره منوطة برطوبة الجو التي تساعد على التمرکز والانتشار وهو شديد الفتك بنصب المشائل وبالاغراس الفتية التي تراوح اعمارها من سنتين الى خمس سنوات || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية او سائل يوردو عند ظهور الاوراق الجديدة وذلك من ايار الى حزيران ثم ينضخ مرة ثانية بعد الاولى باربعة ايام .

١٠٩٠٧ - ذُرْبُوب *

Sternbergia (S). *Sternbergie* (F). *Sternbergia* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية صغيرة القدر من فصيلة النرجسيات . قريبة الشبه بالزعفران . مهدا بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . شراخها مصمتة ، قليلة الارتفاع ، وحيدة الزهرة القمية الشكل . اوراقها صغيرة ضيقة النصال || تزرع للزينة في المراكن والحدائق . ترغب في الاثرية المتوسطة الاندماج الوافرة الخصب .

انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٠٩٠٨ - ذُرْبُوبُ أَصْفَر *

Sternbergia lutea (S). *Sternbergie jaune* (F).

نوع من الذربوب . عشبة دوفسية سبروتية . اوراقها سنانية الشكل ، مخددة الصفحة ، كبيرة القدر ، تظهر مع

١٠٩٢٣ - ذرة نيلية * ، ذرة بلديّة ، ذرة

عُرْبَجَة Sorghum vulgare cernuum (S). Sorgho penché, Millet d'Egypte (F). Egyptian millet (E). Nickende mohrenhirze (D). Miglio (I). نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي حولي تكثر زراعته في البلاد المصرية حيث يأكلون حبه . يوجد في جميع الأتربة الخصبة ، المتوسطة والقليلة الاندماج .

١٠٩٢٤ - ذرة ، جُزَي * Molécule (F). Molecule (E).

(كلمة جزئي من مجمع مصر) والذرة هي الجوهر المنصري الفرد يتكون من نواة تطوقها الكهارب . وهي متناهية في الصغر ، لا منظورة ، تستحيل رؤيتها تحت المجهر .

١٠٩٢٥ - ذرة حكيمة Micelle (F). Micella (E).

مجموعة من الذرات المائلة المتساوية والمتجانسة المحلول ، حجمها يراوح من ٠.٠٠١ الى ٠.٢ من الميكرون .

١٠٩٢٦ - ذرح شجر تتخذ منه الرحالة .

١٠٩٢٧ - ذرة * ، زنبق الوادي

Convallaria maialis (S). Convallaire, Muguet de Mai, Lis des vallées (F). Muguet, May lily, Lily of the valley (E). Lilienkonnvallen, Maiblume, Maiglöckchen (D). Mughetto, Fioralisco, Giglio di maggio (I). نبات عشبي جذموري مداد معمر من فصيلة الزنبقيات . أوراقه بيضية سنانية الزام الأخير تطول من ١٥ الى ٢٠ سم || شراخه يقوم بين ورقتين يعلو من ١٠ الى ١٥ سم . يحمل باتجاه واحد بعض الأزهار الجلجالية الشكل ، البيضاء اللون المستحبة العرف العطري || ازهاره يستمر من أيار الى تموز .

١٠٩٢٨ - ذرق Colombine (F). Columbine (E).

هو هيص الحمام . من الاسمدة العضوية الحارة الشديدة النشاط والغنية بعنصر الأزوت . متوسط تركيبه الكيميائي :
أزوت عضوي حامض فسفوري عناصر مختلفة
٪ ٩,٥ ٪ ١,٢ ٪ ٤,٠

١٠٩٢٩ - ذرق

هو الحلبة القرنية وهو الخندقوق ، اطلبها .

١٠٩٣٠ - ذرق أبيض Pullarose

مرض خبيث معد يصيب الطيور الداجنة اخضها الصيصان . عوارضه ذرق مائع أبيض اللون . يكافح باستعمال الادوية المطهرة للامعاء .

١٠٩٣١ - ذرمتيات Clypeosphaeriaceae (S).

Clypeosphaeriacées (F). Clypeosphaeriaceae (E). عمارة فطور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . تتميز بونيمة مجنية الشكل تغلف الاعسان الفردية الانتشاب . بوغها بيضي الشكل اسمر اللون عديد الخلايا او وحيدها . انواعها عديدة تجمعها بضعة اجناس لا صلة لها بالاقتصاد الزراعي ومنها نوع واحد يعترى النبات يدعى الذنيخة .

١٠٩٣٢ - ذرنوح هو الذراح ، اطلبه .

١٠٩٣٣ - ذروة Sommet (F). Summit (E).

ذروة الشيء : اعلاه فهي قته وقلته وقته . وذروة الزاوية هي رأسها .

١٠٩١٦ - ذرة حليّة ، حشيش الفرس

Andropogon halepensis, Sorghum haepense, Holcus halepensis (S). Sorgho d'Alep, Houque d'Alep (F). Aleppo millet grass (E). Aleppobartgras (D). Saggina d'Aleppo, Alco d'Aleppo (I).

نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي علوي محصوله الخصري متوسط القيمة الغذائية ، وقد يمكن حفظه سليماً في المطامير نحو أربعة اشهر . زراعته حذية صيفية يوجد في الأتربة المتوسطة الخصب .

١٠٩١٧ - ذرة سكرية

Sorghum saccharatum, Holcus saccharatus (S). Sorgho sucré, Sorgho à sucre (F). Sugar sorghum, Sweet sorghum (E). Zuckerhirse (D). Saggina a spazzola, Sorgho zuccherino (I).

نوع من الذرة وهو نبات عشبي زراعي علوي وصناعي يستخرج من عصارة سوقه مادة سكرية تخضر وتستعمل كالسكر . زراعته مروية ، ينشط في الاقاليم الحارة ، يوجد في الأتربة المتوسطة الاندماج .

١٠٩١٨ - ذرة سودانية

Andropogon sorghum sudanensis, Holcus sudanensis (S). Sorgho menu, Sorgho soudanais (F). Sudan grass (E). Soudanische sorghogras (D). Erba di Sudan (I).

ضرب من الذرة وهو نبات عشبي حولي زراعي تكثر زراعته في السودان حيث يستعمل حبه للأكل .

١٠٩١٩ - ذرة صفراء ، ذرة شامية

Zea mays (S). Maïs, Blé de Turquie (F). Maize, Indian corn, Turkey wheat (E). Echter mais, Türkisches korn (D). Maïs, Gran-turco, Formentone (I).

نبات عشبي حولي زراعي من النجيليات ضروبه عديدة . زراعته منتشرة في جميع أصقاع العالم . يرغب في الأتربة المروية المتوسطة الاندماج . انتاجه وافر المحصول عديد الفوائد الاقتصادية .

١٠٩٢٠ - ذرة صفراء سكرية

Zea saccharata (S). Maïs sucré (F). Sugar corn, Sweet corn (E). Zuckermals (D). Frumentone zuccherino (I).

نوع من الذرة الصفراء العلفية والصناعية الغنية بالمواد السكرية . انتاجها وافر المحصول . ترغب في الأتربة المروية القليلة الاندماج الوفرة الخصب .

١٠٩٢١ - ذرة ميكسيكية * ، ميكليس

Andropogon sorghum technicus (S). Sorgho à balais, Mil d'Inde (F). Broom corn (E). Moorthirse, Sorghohirse (D). Saggina da scope (I).

ضرب من الذرة وهو نبات عشبي زراعي حولي يستعمل في صناعة المكناس . بزوره دقيقة مستطيلة حطية اللون صناعية المواجه مسحوقها وافر المادة الغذائية يستعمل لطعام الطير .


١٠٩٢٢ - ذرة ناب الجمل

Zea indentata (S). Maïs dent de cheval (F). Dent corn, Dent maize (E). Pferdezahnmais (D). Frumentone, Dente di cavallo (I).


نوع من الذرة الصفراء شائع الزراعة والاستعمال . حبه مبسط مفلطح جامد اللباب ، أبيض المكسر . يوجد في معظم الأتربة ولا يخشى المندمجة إنما يتطلب وفرة العناصر الغذائية .



ذرة سكرية



ذرة صفراء



ذرة مكسية



ذرة ناب الجمل




ذرة نيلية




ذُرْفَة




ذُعْرَة الرَّبِيع



ذُعْرَة الْغَنَم



ذُعْرَة بَلْقَاء



ذُعْرَة رَمْدَاء

١٠٩٤٧ - ذُعْرَة مُهْدَبَة ٥ Buphone ciliaris (S).

Buphone ciliée (F).

نوع من الذعاق. قليلة المادة الجمالية. أوراقها سنائية الشكل. طول نحو ٢٥ سم. نصالها خضراء اللون، وطوقه يحترق من الحدب التنبني اللون. أزهارها صيواني التجميع يرتكز على شراخ يرتفع نحو ٣٠ سم. أزهارها أرجوانية اللون، فستقية الوسط، قليلة العرف، طول نحو ٣ سم. تنويرها يستمر من حزيران إلى آب.

١٠٩٤٨ - ذُعْبَان الفتي من الذئاب.

١٠٩٤٩ - ذُعْرَة Motacilla (S).

Bergeronnette (F). Wagtail (F).

جنس طير من فصيلة الذعريات ورثة الجوامث المشرومات المناقير. أنواعه عديدة نحو ٣٢ جميعها عصافير صغيرة القد، بلقاء الثوب، سريعة الانتقال، شياكة الذنب الكثير الحركة. تعيش قرب الماء، قوتها الحشرات والموام. تدنق في صدوع وأوكاف الصخور، في فلرج الخيطان وفي شقوق الأشجار. أناتها تحضن وحدها في نيسان من ٦ إلى ٨ بيضات ثم تحضن عن جديد في حزيران من ٤ إلى ٦ بيضات. أشهر أنواعه ما يتبع:

١٠٩٥٠ - ذُعْرَة الرَّبِيع *، فَتَّاح، قُوبَع،

مِرْطِيزَة

Motacilla flava, Budytes flava (S). Bergeronnette printanière, Flavéole (F). Willow wagtail (E).

طائر من ضواري لبنان، طوله نحو ١٧ سم. رأسه إلى الرمادي الأزرق الموج. ظهره أصفر أخضر. سقاطه وذنبه إلى الريدة البلقاء. عنقه أبيض. بطنه أصفر كبريتي منقاره ورجلاه سود. يألف المراعي والحقول المزروعة ومجاري الماء.

١٠٩٥١ - ذُعْرَة الْغَنَم *، ابرقصاده

Motacilla aricapilla (S). Bergeronnette à tête noire (F).

طائر من الذعرة، يألف المراعي والحقول. يرافق الغنم والماعز. طوله نحو ٢٠ سم. رأسه أسود. ظهره أبيض أسمر. بطنه أبيض. سقاطه وذنبه بلق. أفنيكه أبيض.

١٠٩٥٢ - ذُعْرَة بَلْقَاء *، أم سَكَّعَك، أم عَجَلَان

Motacilla alba (S). Bergeronnette grise, Hoche-queue grise, Lavandière grise (F). White wagtail (E).

طائر من القواطع لكنه من أوابد لبنان. طوله نحو ١٩ سم. قفنه وزوره وصدرة إلى السواد الحلي. ظهره أبيض. جبهته وخضراء وبطنه أبيض. سقاطه وذنبه إلى السمرة البلقاء. أفنيكه أبيض. يألف الحقول المزروعة والمراعي ومجاري الماء.

١٠٩٥٣ - ذُعْرَة رَمْدَاء *، زِبْطَة، أم صُفَيْدَة

Motacilla cinerea, M. sulphurea (S). Bergeronnette jaune, Hochequeue boarule, Lavandière jaune (F).

طائر من القواطع، طوله نحو ٢٠ سم. لونه إلى الريدة السمراء يعلو موج أصفر. عنقه وسقاطه سود. محسراء إلى الرمادي. بطنه إلى السمرة يعلو موج كبريتي. يألف المناقع وضفاف الأنهار.

١٠٩٥٤ - ذُعْرَة لَيْمُونِيَّة Budytes citreola (S).

Bergeronnette citrine (F).

طائر من الذعرة. موطنها يمتد من الشرق الأوسط إلى أروبة

١٠٩٣٤ - ذُرْوِيَّة هي الكرفنة، اطلبها.

١٠٩٣٥ - ذُرْيِي Abri (F). Cover, Shelter (E).

هو كل ما يتخذ من أدوات لوقاية النباتات المزروعة من الرياح أو الشمس أو الصقيع، الخ.

١٠٩٣٦ - ذُرْيِي

ذري الشاة: جز صوفها وترك فوق ظهرها شيئاً منه لتعرف به.

١٠٩٣٧ - ذُرْيَب Jaunâtre (F). Yellowish (E).

هو الأصفر من الزهر وغيره.

١٠٩٣٨ - ذُرْيَبَة Cuspide (F). Cusp (E).

الذرية الطرف المستطيل الذرب من الورقة وغيرها.

١٠٩٣٩ - ذُرْيَرَة Hemarthria (S).

Hemarthrie (F).

جنس نباتات عشبية، برية، مرعوية، حولية من فصيلة النجيليات. أنواعها المعروفة قليلة العدد منبتها يمتد من الشرق الأدنى إلى الهند. سوقها متصببة، وحيدة أو شطية. أوراقها عصفية، مستطيلة، مسنة الختار. أزهارها سنبلات شبه عشكولية التجميع.

١٠٩٤٠ - ذُرْيَرَة، أُنُوم Atome (F). Atom (E).

هي الجوهر الفرد. راجع ذرة.

١٠٩٤١ - ذُرْيَرَة هي الأروم الايطالي، اطلبه.

١٠٩٤٢ - ذُعَاع Interligne (F).

Interlining, Space-line (E).

الذعاع هو الفاصل ما بين خطين من النبات ويدعى المسافة البينية.

١٠٩٤٣ - ذُعَاف، ذُعَاق Toxique (F). Toxic (E).

نعت تعريبي يطلق على المواد السامة القاتلة من أي مصدر كانت.

١٠٩٤٤ - ذُعَافَة، ذُعُف Toxicité (F).

Toxicity (E).

صفة الشيء السام.

١٠٩٤٥ - ذُعَافَة ٥ Buphone (S).

Buphone (F). Buphone (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى قاتل الثور. جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة التريسيات. مهدا بعض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية. أوراقها سنائية النصل الجامد. أزهارها صيواني التجميع. أزهارها شبه قمية الشكل. شراعيها ثنائية المصراع.

أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية:

١٠٩٤٦ - ذُعَافَة سَامَة ٥ Buphone toxicaria (S).

Buphone toxique (F).

نوع من الذعاق. كانت تستعمل في تسميم حراب الزنوج. أوراقها مالة، مستطيلة، بحرية الخضار، طول نحو ٥٠ سم. أزهارها صيواني التجميع يرتكز على شراخ يرتفع نحو ٣٠ سم. أزهارها وردية اللون، عرقية الأريج طول نحو ٤ سم. تنويرها يستمر من أيلول إلى تشرين الأول.

التشذيب والتقليم التي لم تظهر ولم تخرج بالمستطك لان الفطر يدخل منها ويفعل فعله || لا علاج له حتى الآن رغم شدة اذاه لانه قليل الانتشار لا يوحى الاهتمام من قبل اصحاب الشأن .

١٠٩٦٣ - دُعْلُوقَات ° Valsacées (F). Valsaceae (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشاريات ورتبة الزقيات تتميز بونية مجنحة تحضن اصنافاً فردية الانتشار كثيفة التجميع || معظم انواعها من الفطور الرمية التي تعيش على المواد العضوية المنحلة . اشهر اجناسها الذعلب والذغيلة .

١٠٩٦٤ - دُعْلُوق ° Cytinus hypocistis (S).

Cytinelle, Cytinet, Hypociste (F). Hypocist (E). Hypocist, Echte blutschuppe (D). Ipcisto, Mucchignero (I).

نبات عشبي طفيلي من فصيلة الذعلوقيات . مهدد حوض البحر المتوسط . اوراقه لحمية . ازهاره ثمانية الاسدية ، سداسية التلات . ثماره عنبية || يستخرج من ساقه المادة عصارة لزجة سمراء اللون تدخل في تركيب بعض المستحضرات الطبية .

١٠٩٦٥ - دُعْلُوق ° ، خَنْشَع ° Hypolais (S).

Hypolais (F). Warbler (E).

جنس طير من فصيلة الحشوريات . انواعه المعروفة قليلة العدد . تتميز باستطالة الاجنحة وقوة الارباع ودقة الاصابع . مناقيرها مستعرضة القاعدة ، ذلقة الطرف ، مسننة المحاطم العليا القليلة الاحديداب || اعطائها العالم القديم . تألف اطراف الغابات والحدائق والبساتين . قوتها الحشرات المجنحة وبعض الثمار اللينة . اعرف انواعه واشهرها الثلاثة التالية :

١٠٩٦٦ - دُعْلُوقَةُ الزَيْتُون ° ، خَنْشَع الزَيْتُون °

Hypolais olivorum (S). Hypolais des oliviers (F). Olive-tree warbler (E).

طائر من الذعاليق . اعطائه تمتد من الشرق الاوسط الى اروبة الجنوبية والغربية . يحجب بعض المناطق ويأيد في البعض الآخر . يألف الزواطين والخصاب المبعثرة الاشجار . قوته الحشرات المجنحة وبعض الثمار البرية || جسمه صغير القد يطول من ١٣ الى ١٤ سم . ثوبه منسجم الالوان القليلة التباين . ظهره الى الطحلة الخضراء الموحج . بطنه الى الصفار الكبريتي الباهت . جناحاه وذنبه وافنيكه الى السمرة الخنطية . رسغاه الى الربدة السمراء .

١٠٩٦٧ - دُعْلُوقَةُ الصَّفَصَاف ° ، خَنْشَع

Hypolais icterina (S).

Hypolais icterine, H. des saules, Rossignol bâtard, Contrefaisant (F). Icterine warbler (E).

طائر من الذعاليق الضوارب يحجب معظم مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . قوته الحشرات والثمار البرية وبعض انواع الكرز . يألف حراج السنديان وضفاف مجاري الماء حيث يكثر الصفصاف ولا يقترب من حراج الصنوبر ايما كان موقعها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٣ سم . ظهره الى الربدة الخضراء . بطنه الى الصفار الباهت . قوادمه وافنيكه الى السمرة يطوقها إطار اخضر . حدقة عينه كستنية اللون . متقاربه الى السمرة الخنطية . رسغاه الى الزرقة البحرية || يتميز بتروديد زقزقة كل طائر

الشرقية . تألف المراعي والحقول || جسمها معتدل القد . طولها نحو ٢١ سم . رأسها وصدرها وبطنها الى الصفار اليموني . ظهرها وسقطها وذنبها الى الربدة الرمضاء || قوتها الحشرات والحوام .

١٠٩٥٥ - دُعْرَبَات Motacillidae (S).

Motacillidés (F). Motacillidae (E).

فصيلة طيور من رتبة الجوائم المشرومات المناقير . اجناسها وانواعها عديدة . اجسامها صغيرة القد مشوقة ، رشيقة ، مستطيلة الذنب . مناقيرها دقيقة جالسة . عيونها كبيرة مكحلة . ارساغها طويلة || اشهر اجناسها الذعرة .

١٠٩٥٦ - دُعْفَافِي ° Toxicologiste (F).

Toxicologist (E).

الدعفاني من تعامل الذعفة اي علم خصائص السموم .

١٠٩٥٧ - دُعْفَنَة ° Toxicologie (F).

Toxicology (E).

الذعفة علم يبحث في خصائص السموم .

١٠٩٥٨ - دُعْلِب ° ، قَلَسَا ° Valsa

جنس فطور مجهرية من الذعلقيات . اعطائها قسم ضخام تقوم داخل ونية غليظة . بيوغها مخروطي الشكل ثماني التجميع احادي الخلية || انواعه المؤذية الضارة اربعة وهي .

١٠٩٥٩ - دُعْلِب الخَوْخ °

Valsa (Eutypella) prunastri cytosporina (S).

فطر مجهري يركب الخوخ والدراقن والمشمش . مظهره الخارجي يقع سمر بلسمية الشكل تركب افناد وافناد الاشجار الهرمة السقيمة فتستعجل دور قحاشتها وتسبق زمن پياسها .

١٠٩٦٠ - دُعْلِب الكَرَز °

Valsa leucostoma, Leucostoma persoonii, Cytospora leucostoma, Cytospora nivea (S). Apoplexie des cerisiers, Maladie rhénane (F). Dieback of cherry (E). Baumsterben des steinobotes, Kirschbaums-sterben (D).

فطر مجهري يصيب الكرز فيؤذيه . مظهره الخارجي اصفرار يحل بنصل الاوراق فيسبب جفافها والتفافها ويباسها وسقوطها . وهو على السوق والاغصان والافناد والافناد يقع عدسية الشكل كثيفة التجميع ينضج منها مادة صمغية . يكافح باقتلاع الاشجار الموصومة التي لا امل في نجاتها وبقطع وحرق الاغصان المصابة ، حيث الامل بالنجاة لا يزال كبيراً ، وتطهير الجروح تواتر بعد الاقتطاع بحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١٠٩٦١ - دُعْلِب المشْمِش ° Valsa cincta,

Leucostoma cincta, Cytospora cincta (S).

فطر مجهري يصيب اشجار المشمش اللاذوية فيستعجل پياسها || مظهره الخارجي لا يختلف عن مظهر دُعْلِب الخوخ الا ان البقع فيه اقل عدداً وافصح قطراً واشد سمرة .

١٠٩٦٢ - دُعْلِب الهَمْْلُوش °

Eutypa lata, Phomopsis ribis (S).

فطر مجهري يصيب الهملوش فيسبب پياسها . مظهره الخارجي تجمش . يحل بافناد الشجرة فيمنعها عن النمو ثم يذبلها ويطوح بها . يشاهد مشيج الفطر في الاوعية الليفية والخشبية وبين اللحاء والشكير || تعذى الاصابة الى جروح



ذعلوق



دُعْلُوقَةُ الزَيْتُون



دُعْلُوقَةُ الصَّفَصَاف

يسمى . يدثن في الشجيرات الوارفة الظل . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات ، وردية اللون مرقوشة بالاسمر ، تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً .

١٠٩٦٨ - دُعْلُوقة ثَرْثَارَة * ، خَشْع ثَرْثَار ٥

Hypolaïs polyglotta (S). Hypolaïs polyglotte (F).
Melodious warbler (E).

طائر من الذعاليق الاوابد . اعطانه تمتد من الشرق الاوسط الى اروية الجنوبية وافريقية الشمالية . يألف المصايب والجلال المتوسطة الارتفاع . يحوي الكروم وجنائن الاشجار المشجرة عند الصباح وقرب الغروب حيث تكثر الحشرات التي يرغب فيها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٣ سم . ثوبه قريب الشبه بثوب دُعْلُوقة الصفصاف الا انه اقل اخضراراً واشد سمرة ، اما رسغاه فالى الطحلة السماء || يتميز بكثرة الزققة وبترديد تغاريد الطيور التي يسميها || يدثن عشه في الشجيرات القليلة الارتفاع . انشاء تضع من ٤ الى ٥ بيضات تبينة اللون مرقوشة بالاسمر والاحمر ، تحضنها نحو ١٣ يوماً بمناوبة الذكر .

١٠٩٦٩ - دُعْلُوقيات Cytinae (S).

Cytinées (F). Cytinae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها اعشاب طفيلية . اوراقها لحمية . ازهارها وحيدة او ثنائية المسكن || اشهر اجناسها الذعْلوق .

١٠٩٧٠ - دُعْمَاط ٥ Scotophilus (S). Scotophile (F).

جنس حيوان من فصيلة الحفاشيات . انواعه قليلة العدد ، رؤوسها مستعرضة ، فراطيسها قصيرة مقطومة . آذانها متوسطة الكبر . ألسنتها مستطيلة || اجسامها صغيرة ربة طوطها يراوح من ٧٠ الى ٨٠ مم . واذناتها من ٤٠ الى ٥٠ مم . اثوابها ترتكز على الخططي الاسمر يعلوها موج ذهبي او كستنائي او رمادي يختلف باختلاف الانواع . بطونها وخوافها الى الصفرة الداكنة || موطنها فسيح الارجاء يعم العالم القديم وامريكة واسترالية || طيراتها متوسط السرعة . مسرحها من النسق العائم الى الفجر العميق . تعيش ازواجاً او سباعيات قليلة العدد . تألف البيوت والمعابد والسقائف وتجاويف الاشجار واوقاب الصخور . قوتها الحشرات على اختلافها اغصها القرصة والنمل .

١٠٩٧١ - دُعْمَل ، عُش ، مَدَق Frelage (F).

Adulteration (E).

مزج الشيء او خلطه بمواد تنقص من فعاليته الموصوفة او من نسبة عناصره المقررة .

١٠٩٧٢ - دُعْفَافَة ٥ Lepidosiren (S).

Lépidosirène (F).

جنس اسماك نهريّة من مزدوجات التنفس وفصيلة الرحاشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها افريقية تعيش في مستنقعات النيجر والستمال والنيل ومنها امريكية تعيش في مستنقعات الامازون || اجسامها شبه اسطوانية الشكل تطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . حراشفها مستديرة . رؤوسها معتدلة القد ، صغيرة الاخطام القصيرة . عيونها صغيرة ماسحة . زعانفها الظهرية قليلة العرض قاطبة تتصل بالشرجية عند اطراف الاذيال . زعانفها الصدرية والحوضية تشبه الذبذبات المستطيلة . اثوابها الى الرعدة الرصاصية تشبه سميتها في الظهر وتحف في البطن || تعيش في الاسماك حتى البروض ، اي نحو ثمانية اشهر ثم تنغم في الغرين وتبقى على هذه

الحالة من الاستكثان الى ان تعود المياه فتفتر المستنقع || لحومها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

١٠٩٧٣ - دُعْقَالَة ٥ Brodiaea (S).

Brodiée (F). Brodiaea (E).

جنس نباتات دوفسية سبروتية من فصيلة الزنبقيات قريبة الشبه بالجوثن . اوراقها ضيقة النصال المخددة . ازهارها بحيلة الشكل يكثر فيها اللون الازرق || تزرع للزينة حسن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الاقربة القليلة الاندماج الوافرة المواد الغذائية من عضوية ومعديّة اخه الازوت .

انواعها المعروفة عديدة ، شهرها التالية :

١٠٩٧٤ - دُعْقَالَة حُمْراء * Brodiaea coccinea (S).

Brodiée rouge (F).

نوع من الدُقالة . اوراقها خضراء اللون زيتية الموج . شراخها يرتفع نحو ٤٥ سم . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلية تعد من ٥ الى ١٥ وتطول نحو ٤ سم . لونها من الخارج الى الحمرة الدامية ، ومن الداخل الى الخضار الاصفر || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٩٧٥ - دُعْقَالَة رَشِيْقَة ٥

Brodiaea pulchella (S). Brodiée élégante (F).

نوع من الدُقالة . اوراقها ضيقة النصال المخددة ، بحيلة الخضار انزاهي . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلية ، قصيرة الاهدن ، تعد من ٤ الى ٨ لونها الى الزرقة البنفسجية الموج || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

١٠٩٧٦ - دُعْقَالَة كَبِيرَة الزَهْر ٥

Brodiaea grandiflora (S).

Brodiée à grandes fleurs (F).

نوع من الدُقالة . اوراقها ضيقة النصال المخددة الجميلة الخضار العابق . شراخها يرتفع من ٣٠ الى ٤٠ سم . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها متدلية ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم . وعددها من ٧ الى ١٥ لونها الى الزرقة البنفسجية اللامعة || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٠٩٧٧ - دُعْقَالَة وَحِيدَة الزَهْرَة ٥

Brodiaea uniflora (S). Brodiée uniflore (F).

نوع من الدُقالة . اوراقها ضيقة النصال المخددة ، بحرية الخضار ، تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ مم . شراخها يعلو نحو ٣٥ سم . ازهارها صيواني . خيمتها الزهرية تتألف من زهرة واحدة طولها نحو ٤ سم . وقطرها نحو ٥ سم . لونها الى الزرقة الليلية الموج . عرفها مستحب الاربج || تنويرها يكون بين اواخر نيسان واوائل ايار .

١٠٩٧٨ - دُعْفَر Sperma des ovins et caprins (F).

Sperm of ovine and caprine (E).

هو شلخ الفحل من الفأن والمعر .

١٠٩٧٩ - دُعْفَرَاء هي سذاب البر ، اطلبه .

١٠٩٨٠ - دُعْفَرَة ، كَلْبُومَة ، زُفِرَة Cleome (S).

Cléome (F). Spider flower (E). Kleome, Pillen-blume (D). Cleome (I).

جنس نباتات برية وزينية من سبط الذفريات وفصيلة



دُعْلُوقة ثَرْثَارَة



دُعْقَالَة



دُعْقَالَة حُمْراء



دُعْقَالَة كَبِيرَة الزَهْر



دُعْقَالَة وَحِيدَة الزَهْرَة

١٠٩٩٠ - ذُقَط

هو الذباب الصغير. ج ذقطن. والذقط: زبل الذباب.

١٠٩٩١ - ذَقْن البَاشَا هو ألبيزيا اللبخ، اطلبها.

١٠٩٩٢ - ذَقْن الحَيَّة *، لَحْيَة الحَيَّة

Ophiopogon (S). Ophiopogon (F). Snake's beard (E). Schlangenhbart (D). Ophiopogon (I).

جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من الزنبقيات، أوراقها متتابة تشب في الجذمور. أزهارها سنبلية التجميع يرتكز على شمراخ جذموري الانتشاح || أنواعه قليلة مهدا اليابان، أشهرها ما يلي.

١٠٩٩٣ - ذَقْن الحَيَّة الأزرق

Ophiopogon jaburan (S). Ophiopogon jaburan (F).

نوع من ذقن الحية مهدا اليابان أوراقه تطول من ٥٠ سم إلى ١٠٠ سم. وتعرض نحو ١٢ مم. نصلها جميل الخضار تقطبه خطوط تنية. شمراخه الزهري يعلو من ١٥ إلى ٦٠ سم. أزهاره تطول من ٨ إلى ١٥ مم. لوئها الى البنفسجي الجميل || أزهاره يستمر طوال شهر تموز. ثماره عنبية الشكل لوئها الى الزرق العابقة تدوم من آب الى تشرين الثاني.

١٠٩٩٤ - ذَقْن الحَيَّة الفَيروزي

هو زنبق الفيروزج، اطلبه.

١٠٩٩٥ - ذَقْن الشَّيْخ *، شَيْبَة، رِيحَان أَبْيَض

Artemisia arborescens (S). Armoise en arbre (F). Tree wormwood (E). Wermuthbäumchen (D). Assenzio arboreo, Erva bianca (I).

جنية معمرة برية وزينية من فصيلة المركبات الانجوبية الزهر. تملو من ٥٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقها ريشية مقلقة. أزهارها كبير الرؤيسات المستطيلة المعاليق. رؤيساتها تظهر متدللة نحو الارض ثم تلتصب مع العمر فتبدو كثيفة الزغب الاطحل الابيض || أزهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٠٩٩٦ - ذَقْن المَعْرَى اطلب عراوة حية التيس.

١٠٩٩٧ - ذَقِيمَة ٥، نِيْمُوفِيل ٥ Nemophila (S).

Némophile (F). Nemophila (E).

الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « نبات حرجي ». جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الشجنيات. سوقها نحيلة قصيرة او معتدلة الارتفاع. أوراقها مشرمة ثنائية الصنف، قدية الشكل او فلقية. أزهارها مختلفة الالوان. أنواعها المعروفة عديدة، أشهرها التالية:

١٠٩٩٨ - ذَقِيمَة مَبْدُولَة *

Nemophila insignis (S).

Némophile commune (F).

نوع من الذقمية. ساقها تملو من ٢٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها سباعية او تساعية الوريقات الاهليلجية الشكل. نصلها مستطلة الاطراف، مسننة الحتار. أزهارها معتدلة الحجم، زرقاء اللون، مطوقة بالابيض. ضرورها الزراعية عديدة الالوان || تنويرها يستمر من حزيران الى آب.

الكبريات. انواعه نحو ١٠٠ معظمها من نباتات المناطق الحارة وبعضها مهدا حوض البحر المتوسط. جميعها أعشاب وجنبات متعاقبة الاوراق المركبة البثرية التجميع. أزهارها جميلة الشكل، مختلفة الالوان || أشهر انواعه التريينية ما يلي.

١٠٩٨١ - ذَقِيرَة بَنْفَسَجِيَّة Cleome pungens (S).

Cléome violet, C. piquant (F).

جنية شائكة تملو من ٦٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها خلية اللحاء، غدية، لزجة. أوراقها خماسية او سباعية التركيب، نصلها مالمس البشرة. أزهارها بنفسجية اللون. أزهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٠٩٨٢ - ذَقِيرَة شَائِكَة Cleome spinosa (S).

Cléome épineux (F).

جنية معمرة تملو من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. ساقها شائكة. أوراقها خماسية او سباعية التركيب. وريقاتها مالمسة. أزهارها بيض || أزهارها يستمر نحو ٩ اسابيع ابتداء من اوائل حزيران.

١٠٩٨٣ - ذَقِيرَة عَرَبِيَّة، أم رُمَيْل

Cleome arabica (S). Cléome d'Arabie (F).

جنية معمرة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها زباء، غدية، لزجة. أوراقها ثلاثية التركيب. وريقاتها مستطيلة. أزهارها سداسية الاسدية. بتلاتها بيض. بزورها صوفية. أزهارها ربيعي، ترطب في الاتربة الرملية.

١٠٩٨٤ - ذَقِيرَة وَرْدِيَّة Cleome rosea (S).

Cléome rose (F).

جنية محولة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها مرطاء اللحاء. أوراقها الوسطى خماسية التركيب اما السفلى والعليا قتلثية. أزهارها وردية اللون || أزهارها يدوم شهراً واحداً وذلك في حزيران.

١٠٩٨٥ - ذَقِيرَات، زَقِيرَات Cléomées (F).

سبط من الكبريات. اجناسه وأنواعه عديدة جميعها جنبات وأعشاب معمرة او حولية. أوراقها مركبة وثرية التجميع، وريقاتها اصبعية. أزهارها رباعية الفصلات والبتلات، شفعية الاسدية الرباعية او السداسية. ثمارها خرنوبية الشكل جافة البزور.

١٠٩٨٦ - ذُقَط ذنط الطائر اثناء: سفدها.

١٠٩٨٧ - ذَقْل، ذَقْل Goudron (F). Tar (E).

هو القطران الرقيق.

١٠٩٨٨ - ذَقِيف Hérisson (mâle) (F).

هو ذكر القنفذ. Hedgehog (male) (E).

١٠٩٨٩ - ذَقَالَة * Acalles (S). Acalie (F).

جنس حشرات دامتة من غديات الاجنحة وفصيلة السوسيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم القديم. تألف الغابات والاحراج والمراعي الطبيعية. تعيش تحت الجشاة. قوتها المواد النباتية المنحلة || اجسامها صغيرة القد، شبه بيضية الشكل، تطول من ٢ إلى ٦ مم. اخطامها ثاقبة. قرونها الاستشعارية مرفقية الشكل، صقية الاطراف. اغمارها محززة، اثوابها متباينة الالوان الداكنة يكثر فيها الجوزي.



ذَقَالَة



ذَقْن الحَيَّة



ذَقْن الشَّيْخ



ذَقِيمَة مَبْدُولَة

البراري والكروم والمباقل ، تقضي على معظم انواع القدان والمذفوط والكرونييات وعلى يرقات خنفساء البطاطا || رانحتها كريمة .

١١٠٠٧ - ذَكْوَة ، ذَكْبَة Combustible
كل مادة محترقة تستعمل لتوليد الحرارة .

١١٠٠٨ - ذُكُور البَقْل
ما غلف منه ضارباً الى المראה وهي خلاف الاحرار التي تؤكل || ارض مذكور : تنبت ذكُور البقل .

١١٠٠٩ - ذُلُوح اللبن المزوج بالماء .

١١٠١٠ - ذَلَّاحَة جَنْوَبِيَّة
Corixa meridionalis (S). Corixe méridionale (F).
حشرة مائية من فصيلة الدلاخيات . جسمها صغير القد ، يطول نحو ٦ سم . رأسها مزواني ، مبطط ، اصفر اللون صنابي الموج ، مخطط بالبني . خطمها قصير ملحوف . عيناها كبيرتان . كوسلها قصير ، بني اللون . حجفتها شديدة الصغر . ظهراتها غضروفي المادة كامل الخنجية ، لاحف ، بني اللون . بطنها الى الخنطي الاسمر . قوائمها نشيطة مجهزة للسباحة || يوجد منها في مستنقعات البقاع ، خاصة في عميق .

١١٠١١ - ذَلَّاحِيَّات
Corisidae, Corixidae (S). Corisidés, Corixidés (F). Corisidae, Corixidae (E).
فصيلة حشرات مائية من رتبة مختلفات الاجنحة وطبقة نصفيات الجناح . اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في جميع اقطار العالم اخصها المناطق الباردة || اجسامها لاقياسية القد . رؤوسها مستعرضة . اخطامها قصيرة . قرونها الاستشعارية رباعية الفصل . كواسلها لانظامية . اجنحتها كاملة الخناجب . رواشها غشائية شفافة . قوائمها معدة للسباحة || اناثها تسره المكن على النباتات المغورة فيلتصق بها ويبقى لاصقاً حتى النشف || تعيش في المياه الراكدة . قوتها المواد النباتية والمضوية المنحلة وبعض الكلويينات الدنيا اخصها قليلات الهلب .



ذَلَّاف

١١٠١٢ - ذَلَّاف *
Penaeus (S). Pénée (F). Penaeus (E).
جنس حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل وفصيلة الدلافينات . انواعه المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار البلاد الاستوائية والحارة ومنها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها كبيرة القد جميلة الالوان القسطنائية . تتميز بمتكها المذشارية التفليج || لحمها مأكولة فاخرة الصنف .

١١٠١٣ - ذَلَّافِيَّات
Peneidae (S). Pénéidés (F). Peneidae (E).
فصيلة حيوانات بحرية من القشريات عشاريات الارجل طوال الذيل . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد اعطانها بحار المناطق الاستوائية والحارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، متوسطة القد او صغيرة ، محجنة المؤخر ، جميلة الالوان القسطنائية الزاهرة || اعرف اجناسها واشهرها الدلاف والجنادة .

١٠٩٩٩ - ذَقِيمَة مُطَطَّخَة

Nemophila maculata (S).
Némophile maculée (F).

نوع من الذقيمة . ساقها خلية اللحاء تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها متقابلة ، سباعية او تساعية الفلق ، تطول نحو ٨ سم . نصالها خلية البشرة . ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٤ سم . لونها الى البياض الناصع تعلو في طرف كل يتلة لطخة بنفسجية عابقة || تنويرها يستمر طوال فصل الصيف .

١١٠٠٠ - ذَقِيمَة مُنْقَطَعَة

Nemophila atomaria (S).
Némophile ponctuée (F).

نوع من الذقيمة . ساقها تعلو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها خاسية او سباعية الفلق . نصالها شبه بيضية الشكل ، مهدبة الخشار . ازهارها صغيرة القد ، بيضاء اللون ، يعلوها تنقيط اسود . ضرورها التريينية عديدة || تنويرها يستمر من حزيران الى آب .

١١٠٠١ - ذُكَّار ، تَيْسَن بَرِّي Caprificus (S).
Caprifiguler, Figuier sauvage (F). Wild fig (E). Wilder feigenbaum (D). Caprifico (I).
كانوا يعتبرونه ذكر التين المحصب وهو نوع من التين البري المجعش الكثير الفروع ، يعيش بين الصخور وفي البراري القاحلة .

١١٠٠٢ - ذُكَّار Androgène (F).
Androgenic (E).
نعت تعريفية يطلق على كل ما من شأنه الحث على انتاج الذكور .

١١٠٠٣ - ذُكَّار التين

Blastophaga psenes (S).
Blastophage des figues (F).
حشرة من الغوانيات ورتبة غشائيات الاجنحة المحصورة . تعمل على تأخير زهر التين فاخصابه وذلك بنقلها للويج من زهر التين البري الذكري الى المزدرع الانثوي || الانثى مجنحة سوداء اللون تطول نحو ١ سم . الذكر عديم الجناح ، اصغر اللون ، مستطيل الطنايب الامامية والخلفية ، مقوس البطن ، يطول نحو ١ سم .

١١٠٠٤ - ذُكَّارَة Androgenèse.
Androgénie (F). Androgeny (E).
الذكارة تماقب الذكور . وهي ايضاً عملية تجريبية صار اختبارها على بعض الحيوانات الدنيا فكانت نتائجها ايجابية .

١١٠٠٥ - ذُكَّارَة الذكارة : حمل النخل .

١١٠٠٦ - ذِكْرُونَة زَرْقَاء

Zicrona coerulea (S). Zicrone bleue (F).

حشرة ناهمة من فصيلة الفاسيائيات . جسمها صغير القد ، مفلطح الجرم ، شبه بيضي الشكل ، بطول نحو ٨ مم . || ثوبها الى الزرقة البنفسجية الموج . رأسها مخروطي مقطوم . خطمها معتدل الطول . عيناها صغيرتان بارزتان . زباناها مستطيلان . حنار بطنها مجذع بالاسود . حجفتها تتقدم طرف الحنجب . قوائمها الى الزرقة السمراء || مسرحها

١١٣١ - ذَنَابَةُ حَقِيرَةٍ *

Stenocranus minutus (S). *Stenocrane fluet* (F).
حشرة من فصيلة الدلفاسيات ورتبة متجانسات الاجنحة .
جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ سم . || ثوبها الى
الحنطي الاصفر يعلو تمشيح اسمر . ظهرها قسطنطي
اللون ، اسمر العروق النشرة ، اسود الخثار في زامه الاخير .
رأسها ناشز الياقوخ الذي يبلو كالقرن المقطوم . خطمها
معتدل الطول . عينها صغيرتان . زبانها مستغلفا الفصل
الاول والثانية . كوسلها معتدل الحجم . حنفتها كبيرة
محرسمة . ظهرها كامل الحنجبة ، شارف . روثانها
غشائيان ، شفافان . بطنها معتدل الجرم والتبليط ||
قوائمها نشيطة . الزوج الخلفي مجهز بمنخنخ حاد ||
مسرحتها الغابات وكل موقع تكثر فيه الاعشاب البرية .

١١٣٢ - ذَنَابِي *Queue d'oiseau* (F).
Tail of bird (E).

الذناي : ذنب الطائر او منبت ذنبه . ويقال ذنب القرس
وذناي الطائر || وفي جناح الطائر اربع ذناي بعد
الحواف .

١١٣٣ - ذَنَانُ الخيل ، جَفِيلُ الخيل ، سَرَاجَةُ
Lymphangitis epizootica (S). *Lymphangite épizootique*, *Farcin cryptococcique* (F).
مرض وخيم يصيب الخيل في اوعيتها اللفافوية فيؤذيها ان
لم يتدارك ويعالج بالسرعة اللازمة .

١١٣٤ - ذَنَب ، ذَيْل *Queue* (F). *Tail* (E).
عضو من اعضاء الجسم الحيواني موقعه في العقب اي المؤخر .

١١٣٥ - ذَنَب *Apparier* (F). *To pair* (E).
ذنب الجراد والفراس اذا اراد التعاقل .

١١٣٦ - ذَنَب *Térébrer, Déposer* (F).
To deposit (E).
ذنبت الجرادة : غرزت اشترتها في التربة لوز السرة .

١١٣٧ - ذَنَبُ الأَيْل هو الجريس الأعجن ، اطلبه .

١١٣٨ - ذَنَبُ الثعلب ، ذَنَبُ المُرُوج ، سُبَيْلَة
Alopecurus pratensis (S). *Alopecure, Vulpin des près, Queue de renard* (F). *Meadow foxtail grass* (E).
Weisenfuchsschwanz, Falsches kanariengras (D).
Coda di volpe, C. di topo, Codolino dei prati (I).
نبات عشبي بري كلافي من النجيليات يكثر في المراعي
وفي الاراضي المروية . ازهاره يشبه ذنب الثعلب وهو
طرفي الارتكاز ، اسطواني التجميع ، متراكب السبلات
الدقيقة الكثيفة .

١١٣٩ - ذَنَبُ الجَدْي *Deneb Algedi* (F).
Deneb Algedi (E).
ذنب الجدي نيجان نيران مركزها على ذنب الجدي . رابع
برج الجدي .

١١٤٠ - ذَنَبُ الحِدَاة
هو السرخس الخزفي من النباتات الطيبة ، اطلبه .

١١٤١ - ذَنَبُ الحِرْدُونِ * ، ذَنَبُ الحِرْدُونِ
ذَنَبُ الفَصْب *Saururus* (S).

Saurure (F). *Lizard's tail* (E).
هو الصروة نبات عشبي بري طيب دقيق الاصل كثير

الفروع ، مر الطعم ، يسكن المغص ويقطع الدم .
عصارته تقلع البياض تقطيراً .

١١٤٢ - ذَنَبُ الخَيْل هو الاسوخ ، اطلبه .

١١٤٣ - ذَنَبُ الدِّلْفَيْن *Deneb*
ذنب الدلفين ويسى عمود الصليب نجم نير من كوكبة
الدلفين .

١١٤٤ - ذَنَبُ السَّبْعِ *

Cirsium rhizocephalum (S). *Cirse, Cnicus* (F). *Horse thistle* (E). *Kratzdistel* (D). *Cirsio* (I).
نبات عشبي بري طيب من القصوران وفصيلة المركبات .
ساقه مثلكة الزوايا تستدير كلها ارتفعت . تعلو من ٦٠
الى ١٢٠ سم . اوراقه مهدبة النصل يحف بها الشوك .
يقال انه ترياق الورم وعصارته تشد الاجفان المسترخية ،
ويستعمل ضماداً ولصوقاً على الاورام والمفاصل فيسكن
ألمها .

١١٤٥ - ذَنَبُ الفَصْب هو الصروة ، اطلبها .

١١٤٦ - ذَنَبُ العُقَاب *Deneb*
ذنب العقاب او ذنب العقاب الطائر نجم نير من كوكبة
العقاب مركزه في الذنب بالقرب من أنور الظلمين .

١١٤٧ - ذَنَبُ العَقْرَب هو العقرية ، اطلبها .

١١٤٨ - ذَنَبُ الفَار *Myosurus minimus* (S).
Myosure nain, Ratoncule, Queue de souris (F).
Blood strange, Mouse-tail (E). *Kleines mäueschwän- zchen* (D). *Coda di sorcio* (I).

نبات عشبي بري من فصيلة الشقاربيات يعلو نحو ١٥ سم .
اوراقه ضيقة النصل خطية . ازهاره فردية هامية ، لونها
الى الصفرة الخضراء . تحتها مستطيل الشكل يشبه ذنب
الفار .

١١٤٩ - ذَنَبُ الفَرَس

هو الاسوخ الشوي ، اطلبه .

١١٥٠ - ذَنَبُ القَط ، كَرِيرُوكُومِه

Chrysocoma (S). *Chrysocome* (F). *Goldyllocks* (E).
Goldhaar (D). *Chrysocoma, Chiomadora* (I).

جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة المركبات
الاسطريات . انواعه عديدة جميعها جنبات صغيرة ومتوسطة
القد . سوقها مخشوشة تعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها
متعاقبة ، خيطية ، كثيرة العدد تطول نحو ٢٠ سم . وتعرض
١ مم . رؤسائها الزهرية تجمع من ٨٠ الى ١٥٠ زهرة ،
لونها الى الصفرة على اختلاف ما جاتها || ازهارها يستمر
من ايار الى تموز .

١١٥١ - ذَنَبُ قَيْطَسِ الجنوبي

Deneb Kaitos
ذنب قيطس الجنوبي ويدعى الضفدع الثاني ، نجوم نيرة
من كوكبة قيطس مركزها على الشعبة الجنوبية .

١١٥٢ - ذَنَبُ قَيْطَسِ الشمالي *Dheneb*
ذنب قيطس الشمالي نجم نير من كوكبة قيطس مركزه على
الشعبة الشمالية من الذنب .



ذنب الثعلب



ذنب الحردون



ذنب السبع



ذنب الفار

١١٠٦١ - ذُبَاب عَصَلِيّ

Eremurus robustus (S). *Erémure robuste*, Nez de Cléopâtre (F).
نوع من الذببان أوراقه خيطية نصلها مالمس البشرة بحري اللون ، يطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . شراخه الزهري يعلو من ٢٥٠ الى ٣٠٠ سم . سنبلة كبيرة القد متوسطة الكثافة . أزهاره وردية اللون الشاحب .

١١٠٦٢ - ذُبَاب كُرُولِكُوف

Eremurus korolkowi (S). *Erémure de Korolkow* (F).
نوع من الذببان أوراقه خيطية مستطيلة . شراخه الزهري يعلو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم . سنبلة قليلة الكثافة . أزهاره وردية اللون يعلوها سواج احمر .

١١٠٦٣ - ذُبَاب
Buffle (F). *Buffalo* (E).
هو الجاموس ، اطلبه .

١١٠٦٤ - ذُبَابِي
Caudal
نعت تعريبي يطلق على كل ما له علاقة بذنب الحيوان .

١١٠٦٥ - ذُبُون * ، ذُبُون الجَن
Cistanchus
جنس نباتات طفيلية من فصيلة الجعفيليات . مهددا المناطق الحارة من البلاد الاسيوية والاروية والافريقية . انواعه قليلة متشابهة يفرقها لون الازهار الذي يغلب فيه الاصفر والاحمر والبفسجي .

١١٠٦٦ - ذُبَيَان *
Leontopodium (S). *Edelweiss* (F).
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى رجل الاسد الصغيرة . جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات . سوقها وأوراقها وأزهارها زغبية البشرة ندفيتها . أوراقها الجلدية كبيرة القد . أزهارها رؤسي صغير الحجم || اعرف انواعه الخمسة التالية .

١١٠٦٧ - ذُبَيَان أَصْفَر

Leontopodium leontopodium (S). *Edelweiss jaune* (F).
نوع من الذببان موطنه الشرق الاوسط . يعلو نحو ٣٠ سم . أوراقه الجلدية العلوية لاطئة الانتشاب خلية البشرة . أزهاره مركب من ١٠ الى ١٥ رؤسة قطر الواحدة نحو ٦ مم .

١١٠٦٨ - ذُبَيَان جَبَلِي ، رَجُلُ الْأَسَد

Leontopodium alpinum (S). *Edelweiss alpin*, *Pied de lion* (F). *Edelweiss*, *Lion's-foot*, *Live-ever* (E). *Echtes edelweiss* (D). *Leontopodio*, *Piè di leone* (I).
نوع من الذببان موطنه الشرق الاوسط واروية . يعلو من ١٠ الى ٤٠ سم . أوراقه كثيفة التجميع ، نصلها أبيض خل الصفحة العليا ، أربد السفلى . أزهاره مركب من ٨ الى ١٢ رؤسة . قطر الواحدة نحو ٦ مم .

١١٠٦٩ - ذُبَيَان حَمَلَايَا

Leontopodium himalayanaum (S). *Edelweiss de l'Himalaya* (F).
نوع من الذببان اعطاه بعض مناطق حملايا والتبت ، يعلو من ١٥ الى ٢٥ سم . أوراقه الجلدية نحو ١٠ ، نصلها مستعرضة واطئة تنفر الساق . أزهاره مركب من ٣ الى ١٠ رؤسات قطر الواحدة منها نحو ٧ مم .

١١٠٧٠ - ذُبَيَان سيبيري

Leontopodium sibiricum (S). *Edelweiss de Sibérie* (F).
نوع من الذببان موطنه سيبيرية ومنشورية . يعلو من ٣٠

١١٠٥٣ - ذُبَاب ٥

Coriops (S). *Cœlops* (F).
جنس حيوان وحيد النوع من الماشيات . يتميز بزوائده المنخرية الورقية التركيب ، النضوية الشكل ، المفصصة المتدلية . جسمه صغير القد طوله نحو ٧ سم . بسطته ٢٩ . جلده رمادي اللون ، شعره أشقر || موطنه بلاد فارس والهند وجاوا . يألف الكهوف والمقار . يعيش جماعات قليلة العدد . منفرجة من الفسق الى فحمة الليل . قوة الحشرات والدويبات والحسوم .

١١٠٥٤ - ذُبَاب * ، ذُبَابِي ، أُمُور ٥

Eremurus (S). *Erémure* (F).
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعه نحو ١٥ معظمها تزييني وبعضها بري . جميعها كبيرة القد ، جماتها لحمية ، أوراقها قرصية التجميع مستطيلة النصل الضيق . أزهارها سنبلية ترتكز على شراخ هي مستطيل . أشهر انواعه التزيينية ما يتبع .

١١٠٥٥ - ذُبَاب إلْوَيْس

Eremurus alwesi (S). *Erémure d'Elwès* (F).
نوع من الذببان أوراقه عصفية سنانية لونها الى الخضار الباهت . شراخه الزهري يعلو نحو ٣٠٠ سم . سنبلة كبيرة القد تبلغ نحو ١٠٠ سم . أزهاره وردية اللون .

١١٠٥٦ - ذُبَاب بُرْتُقَالِي

Eremurus aurantiacus (S). *Erémure orangé* (F).
نوع من الذببان أوراقه حنطية تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض من ٦ الى ١٠ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٥٠ سم . سنبلة متوسطة الكثافة تطول نحو ١٥ سم . قطرها نحو ٤ . أزهاره الى الصفرة البرتقالية .

١١٠٥٧ - ذُبَاب بُنْجِي

Eremurus bungei (S). *Erémure de Bunge* (F).
نوع من الذببان أوراقه حنطية ضمية تطول نحو ٣٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . شراخه الزهري يعلو نحو ٤٠ سم . سنبلة كثيفة لبدة تطول نحو ١٢ سم . أزهاره الى الصفار الزاهي .

١١٠٥٨ - ذُبَاب بَهِيّ

Eremurus spectabilis (S). *Erémure élégant* (F).
نوع من الذببان أوراقه قدية الشكل شراكية تطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . نصلها جامد الاطراف لونه الى الخضار الازرق . شراخه الزهري يعلو نحو ٧٠ سم . سنبلة متوسطة الكثافة . أزهاره نجمية الشكل ، لونها الى الصفرة الكبريتية .

١١٠٥٩ - ذُبَاب تَرْكِسْتَانِي

Eremurus turkestanicus (S). *Erémure du Turkestan* (F).
نوع من الذببان أوراقه هدية لونها الى الخضار البحري . شراخه الزهري يعلو من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . سنبلة مستطيلة كثيفة الزهر . أزهاره الى الجزوة يحوق تبالها اطار أبيض .

١١٠٦٠ - ذُبَاب حَمَلَايَا


Eremurus himalaicus (S). *Erémure de l'Himalaya* (F).
نوع من الذببان أوراقه ملساء مدببة العقصة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . شراخه الزهري يعلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . سنبلة كثيفة التجميع . أزهاره كالنجوم لونها الى الأبيض .



ذُبَاب



ذُبَاب كُرُولِكُوف



ذُبُون



ذُبَيَان

على المنكب الايسر يدعى « العيوق » ورقب الثريا ، والذي على المرفق الايسر « العنز » . والاثنين اللذين على المعصم الايسر « الجديين » . ويسمى الذي على المنكب الايمن والاثنين اللذان على الكمين « توابع العيوق » .

١١٠٨١ - ذُو الرُّمَيْح

هو اليربوع ذو رميح ، اطلبه . سمي هكذا نسبة الى ذنبه الذي يشبه الرمح . وهو طويل الرجلين في وسط كل وظيف من أوظفته فضل ظفر .

١١٠٨٢ - ذُو جَنَاحَيْن (F). Bipennate (E). Bipenne (F). هو من الحيوان من كان له جناحان .

١١٠٨٣ - ذُو رِجْلَيْن (F). Bipède (F). Bipéd (E). نعت تعريفي يطلق على كل حيوان له رجلان او يسير على رجلين .

١١٠٨٤ - ذُو صَفَيْن (F). Distique (F). Distichous (E). نعت وصفي يطلق على الازهار والاوراق والسبيلات القائمة على صفين متقابلين .

١١٠٨٥ - ذُو قَصَيْن (F). Didyme (F). Didymous (E). نعت تعريفي يطلق على كل عضو نباتي او حيواني ثنائي الاجزاء القصية الشكل .

١١٠٨٦ - ذُو مَنَقَارَيْن (F). Birostré (F). Birostrated (E). من كان مجهزاً بمنقارين .

١١٠٨٧ - ذُوَابَةٌ (F). Chevelure de Bérénice (F). Coma Berenices (E).

الذؤابة كوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين العواء والاسد . نجوميها الواضحة عشرة منها تسعة مزدوجة ونجم واحد مثلث .

١١٠٨٨ - ذَوَات الجَنَاحَيْن (F). Diptères (F). Diptera (E).

رتبة حشرات تنتمي الى طبقة سدنيات الجناح فشعبة الخراطيط فطائفة المجنحات اصلاً | فصائلها واجناسها وانواعها تعد بعض مئات الالوف . جميعها من الحشرات الثامة التطور . خطمها ثاقب لاقع او ماص . تحمل زوجاً من الاجنحة الكاملة ولها زوج آخر صغير القدي يدعى رقااص التوازن . ارساعها خاسية المعقل | قوتها رحيق الزهور وبعضها يتغذى على المواد العضوية ومنها الدامية التي تمتص دم الحيوانات الفقيرة دون الاسماك | يرقاتها صغيرة دودية الشكل ، غبراء اللون ، منها المفترسة ومنها المتطفلة ومنها التي تعيش على المواد العضوية المختمرة القالفة . كزودها برميكية الشكل قليلة الحركة او عديمتها تسترها غشاوة خاوية وبعضها عار لا ستر له | اشهر فصائلها : البعوضيات ، الحرشيات ، الذبابيات ، السرفديات ، الشعراويات ، الشوشيات ، الضفديات ، الطيثاريات ، العنتريات ، القدوحيات ، القرمسيات ، اللاعنات ، النبريات ، النعريات ، الهفيات ، الهبيات ، والتقيريات .

١١٠٨٩ - ذَوَات الخُفِّ (F). Tylopodes (F).

فئة من الحيوان تشمل الجمل واللامة والنعامة . تتميز بناسمها المستعرضة الهدبة الكائبة وبصغر اطلاقها الشبيهة بالخابب الغليظة العادمة التحجيج .

١١٠٩٠ - ذَوَات الرِّجَمَيْن

رتبة حيوانات تعرف بالجراريات ، راجعها .

الى ٤٥ سم . ساقه غليظة قوية . اوراقه الجذعية نحو ٣٠ جميعها لاطئة تطول نحو ٢٥ سم . ازهاره مركب من نحو ٣٠ رويضة . قطر الواحدة نحو ٥ مم .

١١٠٧١ - ذُبَّان يَابَانِي *

Leontopodium japonicum (S). Edelweiss du Japon (F).

نوع من الذبان موطنه اليابان والصين . يملو نحو ٥٠ سم . ساقه ليفية كثيفة الورق . اوراقه الجذعية لاطئة ، تصلها لامع بشرة الصفحة العليا . ازهاره مركب من ٦ الى ٨ رويسات قطر الواحدة منها نحو ٤ مم .

١١٠٧٢ - ذُبَيْب (F). Pétiole (E). Pétiole (F).

هو العلاقة ، جزء دقيق من ضلع الورقة يوصل النصل بالقصيب ويؤمن له النسخ .

١١٠٧٣ - ذُبَيْخَةٌ *

Anthostomella pullulans , Aureobasidium pullulans , Dematium pullulans , Aureobasidium vitis , Exobasidium vitis , Pullularia pullulans (S). Anthostomella (F).

فطر مجهرى يصيب عدة نباتات اخصها الكرمة والدراق واللوز والخوخ وبعض الاشجار الحرجية | يركب اوراق النباتات المصابة بالعثان والمجعدات . مظهره الخارجي بقع صغيرة حنطية اللون تتخلل بقع الفطور الاخرى فتسبب جفاف النسج المتحار ثم الاعبال الباكر | اضراره محدودة لا توجب المكافحة .

١١٠٧٤ - ذُبَيْن ٥ (F). Sperme des ruminants (F).

Sperm of ruminants (E). هو افراز الغدد التناسلية الذكرية عند المجترات كالبقر والغنم والماعز والابل .

١١٠٧٥ - ذَهَب (F). Or (F). Gold (E).

هو التبر وقد يؤث . معدن ليس عرفه الانسان من قديم الزمان لونه الى صفرة الشمس يشحب اذا مزج بالفضة ويحمر اذا مزج بالنحاس . لا يتأثر بالماء والهواء والحوامض والقلويات | رمزه (Au - ذ) وزنه الاتومي ١٩٧,٢ ثقله النوعي ١٩,٣ وهو كثير الليونة قابل التمديد والتصفيح . ينصهر في ١٠٨٤ °سغ . ويغلي في ٢٥٣٠ °سغ . يوجد في الطبيعة مختللاً بالصخور على شكل عروق فيستخلص بالسحق والطحن والفصل . او راسباً في قاع بعض الانهار الجارية او الجافة . اشهر مناجمه في جنوب افريقية وروسية وكندا والولايات المتحدة واستراليا والمكسيك واليابان والهند .

١١٠٧٦ - ذَهَب أبيض هو البلاتين ، اطلبه .

١١٠٧٧ - ذَهَب الشَّمْس هي الخالدة القنابية ، اطلبها .

١١٠٧٨ - ذُهْلُول

الذحلول من الخيل : الجواد الدقيق الاصيل .

١١٠٧٩ - ذُو إصْبَعَيْن (F). Didactyle (F). Didactyl (E).

هو من الحيوان من كان له اصبعان .

١١٠٨٠ - ذُو الأَعْنَةِ ، مُمَسِّكُ الأَعْنَةِ ، عَنَّاَز


le Cocher, Phaéton (F).

Auriga, the Charioteer, the Waggoner (E).

ذو الأعنة ومسك الأعنة وعناز ثلاثة اسماء لكوكبة نجوم شمالية الموقع مركزها بين الدب الاكبر وبرج الثور . عدد نجومها ٦٦ منها ٢٤ مزدوجة ومثلثة | الكواكب الموجودة في وسط الصورة تدعى « الجباء » . والنير الذي



ذبان ياباني



ذبيخة

١١١٠٠ - ذَوْبَل الكَشْمِش *^٥

Pseudopeziza ribis, Gloeosporidiella ribis, Gloeosporium ribis, G. curvatum (S). Anthracnose du groseillier, Gloeosporiose du groseillier (F). Leaf spot (E). Blattfallkrankheit der Stachelund Johannisbeere (D).

فطر مجهرى يصيب الكشمش على اختلاف أنواعه فيذبل الأوراق ويقضي على الثمار || مظهره الخارجي يقع صغيرة قطرها نحو ملليمتر لونها البنية المحورها نقطة بيضاء، تركيب النصل وتوسعه ابتداء من أيار فتسبب يباس نسجه ثم الاعمال الباكر. و تركيب الأمن فتعرقل الدورة الغذائية فتضمحل الثمار وتذوى || يكافح أولا في زمن الرقاد وذلك في الشتاء حيث تنضج الاشجار بأحد المركبات السلفوكلسية المركزة نحو ١٠٪ ثم تنضج عند الاكحاح بذات المركبات المركزة ٢٠٪ وتنضج بعد الاوراق في فترة الازهار، بسائل بوردو المحلول ١٪

Pseudopeziza trifolii (S). *^٥ ذَوْبَل النَفَل Anthracnose du trèfle (F).

فطر مجهرى يركب أوراق النفل على صفحتها العليا فيعطها ويذويها || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة صفراء اللون ثم حنطية تركيب نصل الأوراق فتعطب وتسبب يباسه || يكافح باحتشاش النفل الموصوم حتى ولو كان قبل أوانه.

Jabot (F). Crop (E). ١١١٠٢ - ذَوْرَة

مقدم حوصلة الطائر يحمل فيها الماء، ج ذور

Thomisus (S). Thomise (F). *^٥ ١١١٠٣ - ذَوْطَة نوع من العنكبوت صغيرة الجثة صفراء الظهر. الذكر منها يطول نحو ٦ مم. والانثى ١٠ مم. || يكثر وجودها على الازهار تكمن وترقب قدم الحشرات اللاحقة فتتغص عليها وتفترسها. ج أدراط.

Thomisus onustus, T. abbreviatus (S). Thomise chargé, Araignée crabe (F). Crab-Spider (E). ١١١٠٤ - ذَوْطَة الأزهار *^٥، عَنَكَبُوت سَلَطَعُونِي

نوع من العناكب القانصة ثنائيات الروايا، سداسيات المشاقن، تنتمي الى فصيلة الذوطيات || جسمها صغير القد يطول نحو ٤ مم. عند الذكر ونحو ١٠ مم. عند الانثى. صدراسها صغير الحجم، مقطوم الطرف، احمر اللون عند الذكر، اصفره عند الانثى. عيناها زُمَيَّتان. شيفها صغيران ذريان. فكها مستدقان قصيران. جرامزها الامامية نشيطة مستطيلة، جرامزها الخلفية قصيرة مستدقة. بطنها يرمي الشكل، اصفر اللون تعلوه خمس نقط سود || تألف المواقع التي تكثر فيها النباتات المغترية. قوتها الحشرات المجنحة الصغيرة التي تمتص رحيق الازهار. تسرح في النهار. سمها جانبي كسمي السلطعون ولذا سميت عنكبوت سلطعوني || عكدهتها جراب صغير القد تنسجه بين الغضبان اليابسة تأوي اليه في الليل وفي زمن بياتها الشتوي الذي يستمر نحو خمسة اشهر || ملجئ تطوراتها الحياتية وتناسلها لا يختلف عن ملجئ سائر العناكب || تعتبر من الدويبات اللامؤدية لانها لا تتعرض للنحل.

Thomisidae (S). ١١١٠٥ - ذَوْطِيَّات *^٥

Thomisidés (F). Thomisidae (E). فصيلة عناكب من الرتيلاوات. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة من العالم

Agnelle (F). Ewe-lamb (E). ١١٠٩١ - ذَوَاة

البنجة الصغيرة، ج ذوى.

Goût (F). Taste (E). ١١٠٩٢ - ذَوَاة

قشرة البطيخة والحنظلة والعنب. الذواق هو طعم الشيء. تقول ذواقه طيب.

Jars (F). Gander (E). ١١٠٩٣ - ذَوَاق

الذواق هو ذكر الاز.

Fusibilité (F). Fusibility (E). ١١٠٩٤ - ذَوْبَان

قابلية التذويب.

Heterobranchus (S). ١١٠٩٦ - ذَوْبَر *^٥

Hétérobranche (F).

جنس اسماك نهريه من مفتوحات المثانة وفصيلة السلوريات. انواعه المعروفة خمسة اعطانها نهر القارة الافريقية انحصها النيل والنيجر والسنگال والنمبي || اجسامها مستطيلة الشكل، معتدلة التبطين، تطول من ٢٥ الى ٤٥ سم. تتميز برؤوسها المفلطحة وباعظامها المستديرة الاطراف، الساسية العذبات الكبيرة. زعانفها الظهرية والشرجية تنتهي عند قواعد الاذنان. اثوابها تراوح من الكهبة السمر الى الشبه الزرقاء. بطونها دائما فضية الموج. زعانفها سمر اللون || لحمها متوسطة الصنف، مأكولة.

Pseudopeziza ١١٠٩٧ - ذَوْبَل *^٥

جنس فطور مجهرية من السقديات وفصيلة الحشاريات يتميز بسدائنه الصغيرة الحجم التي تتكون وتلتصق داخل سافة النصل الادمية ثم تنطلق نحو الخارج. بريداتها بسيطة شفافة شفعية الارتكاز تحضنها التكاثر المتشابهة بالنكت الحيطية || اشهر انواعه المؤذية الاربعة التالية.

Pseudopeziza medicaginis (S). ١١٠٩٨ - ذَوْبَل الفَصَّة *^٥

فطر مجهرى يركب أوراق الفصة على صفحتها العليا فيعطها || مظهره الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم تغلب فيها الاستدارة، لونها الى الشقرة الصفراء ثم تتحول نحو الجوزة الحنطية المهدبة بالسرة. تركيب نصال الأوراق القرية من التربة فتعطب وتسبب يباسها. ومن خصائصه انه ينتشر في الخريف لان البرد يوافق مزاجه. يكافح بتأخير الري لان الجفاف يضيئه ويقضي على نشاطه.

Pseudopeziza tracheiphila (S). Rougeot, Brenner (F). Rot-Brenner (E). ١١٠٩٩ - ذَوْبَل الكَرْمَة *^٥

فطر مجهرى يصيب الاوراق البالغة فيعطها ويؤذي الجفنة. يظهر في الربيع على الاوراق البالغة، وهي اوراق الزام الاول من السرع، من البقتين الى الثلاث يقع تركيب النصل على صفحته العليا ثم تمتد وتنتشر الى ان يبلغ قطرها نحو ٣ سم. لونها منوط بنوع الجفنة فهو اصعب اطحل في الجفان البيض العنب وهو الى الجوزة في الجفان الحمر. يبلغ كامل انتشاره بسرعة فيسبب جفاف النسيج المنحار ويمجع نصل الورقة ويقودها الى الذبول والاعمال الباكر. فهو اذا يؤثر في المحصول لانه يحرمه الغذاء الناتج عن الاوراق الساقطة || يكافح مكافحة التسنه (الميلديو) على ان تكون الرشة الاولى بعد الازهار مباشرة.




ذور




ذوبل الفصة



ذوبل الكرمة



ذوبل الكشمش



ذوبل النفل




ذوطة




ذوطة الازهار




ذؤلف جوتني




ذؤلف



ذئار البندورة



ذئار البئر



ذئار البئر



ذئار القرعيات

الاخير وتقوده الى العفن والهرمان || يكافح وقائياً مكافحة غيره من الفطور وذلك باستعمال سائل بورديو او غيره من الفوطير الكيماوية عند تبشير الادراك .

١١١١٣ - ذئار الشمكار *

Glomerella cingulata, *G. fructigena*, *Gloeosporium fructigenum*, *G. rufomaculans*, *G. cingulatum*, *G. versicolor*, *Colletotrichum coffeanum*, *Septoria rufomaculans*, *Gnomoniopsis cingulata* (S). Pourriture amère des fruits (F). Bitter rot (E). Bitter-fäule (D).

فطر مجهري شديد الاذى يصيب الياسم وثمار بعض الاشجار وفنديها منها التفاح والاجاص والسفرجل والدراق والخرخ والكرز والكرمة والتين والمنغا والقشدة والموز والحوخ والبن والكاكادو والشاي || مظهره الخارجي على ثمار التفاح والاجاص وغيرها يقع سمر مستديرة منخفضة تركيب الثمار عند ادراكها وتغور في لبها فتكسبه بعض المراتة ثم تتحول الى عفن ينتشر على بشرة الثمرة وفي داخلها فيقضي عليها ويسبب سقوطها على التربة او تحيطها على الشجرة . اما في الكرز فالثمرة الملوثة تجف وتبقى على الشجرة حتى الحريق حيث تسقط من امانها تاركة هذا الاخير عالماً حيث كان || وهو على الافئاد والافئان لطخ سمر داكنة لا قياسية الشكل والحجم تصيب الافئان في مراكز انتشارها على الفسود فتعطب البشرة واللحاء والشكير والخشب لانها ترقى وتجول من الخارج الى الداخل || اضراره محدودة رغم شدة وقعها لان انتشاره منوط بالعوامل الجوية المواتية وخصه ارتفاع الحرارة وكثرة الرطوبة || يكافح مبدئياً من حزيران الى آب باستعمال سائل بورديو نصفاً على الاشجار من ثلاث الى اربع مرات .

١١١١٤ - ذئار القرعيات * بشرة الخيار

Glomerella lagenarium, *Colletotrichum lagenarium*, *C. oligochaetum*, *Gloeosporium lagenarium*, *G. orbiculare* (S). Anthracnose des cucurbitacées, Nulle des cucurbitacées (F). Anthracnose of cucurbits (E). Anthracnose der gürkengewächse (D).

فطر مجهري يركب نباتات الفصيلة القرعية اخصها الخيار والبطيخ والشمام والقشاة والقرع || يركب القرعيات في مختلف ادوار حياتها وعلى اختلاف اعضائها . يصيب السويق في اول عهده فيذبل ويميته بعد ان يكسوه بلطخ حنطية اللون ثم سمراء تجول نحو الداخل فتفسد الخلايا والوعية وتوقف التبادل النسبي || وهو على الاوراق يقع زيتية الموج لونها الى الخضار الباهت ثم يتحول الى الجرؤة فالسمة الداكنة فالذبول فالبياس . والبقع على النصل تبقى مستديرة حتى اقترابها من العروق حيث تصبح مقرنة الزوايا . وهو على المعاليق والسوق يقع لا قياسية تبدو خضراء صباء ثم تميل الى السمة || وهو على الثمار ، وقد يعتريها من الجهة المعرضة للرطوبة ، بقع سطحية بارزة لا قياسية الشكل والحجم تظهر شديدة الخضار ثم تميل الى الحنطية وتجول نحو الداخل فتسبب العفن والعطب || يكافح وقائياً وشفائياً باستعمال اما سائل بورديو المركب (٤/٤/٥٠) والمخلول ١٪ او احد الفوطير الكيماوية الشديدة النشاط على ان تنضخ صفحات النصل من جهتيها العليا والسفلى . وقد يحسن استعمال النضخة الاولى عندما يكون النبات في دور النشوء السريع . اما الثانية فبعد العقد بأسبوع والثالثة بعد الثانية بأسبوعين || ومن الطرق الوقائية المستحسنة اجتناب الزراعة في المواقع الرطبة وفي الآترة الكتومة وتطهير البذار بالفرمول عيار ٤٠ المركز ٢٪

القديم || جميعها صغيرة القد ، معتدلة الجرامز . تسمى وراة قنصها ركضاً وتغزاً || اشهر اجناسها الذؤلة .

١١١٠٦ - ذؤلف *

Griffinia (S).

Griffinie (F). *Griffinia* (E).

جنس نباتات عشبية دوفسية من فصيلة النرجسيات . مهدا البرازيل . اوراقها معتقة ، سنانية النصل . ازهارها صيواني التجميع . ازهارها ثنائية اللون || تزرع للزينة ضمن البيوت وفي الحدائق . ترغب في الآتربة المعتدلة الاندماج الوفرة المواد الغذائية . من عضوية ومعدنية . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١١١٠٧ - ذؤلف بلومينيو *

Griffinia Blumenavia (S).

Griffinie de Blumenau (F).

نوع من الذؤلف . اوراقه تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم . ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شراخ يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ازهاره بيضاء اللون ، مشيرة بالوردي || تنويره صيفي .

١١١٠٨ - ذؤلف جوتني *

Griffinia hyacinthina (S). *Griffinie jacinthe* (F).

نوع من الذؤلف . اوراقه تطول من ١٢ الى ١٨ سم . وتعرض من ٤ الى ٦ سم . نصلها جميلة الخضار الزيتي الموج . ازهاره صيواني التجميع يرتكز على شراخ يرتفع من ٢٥ الى ٥٠ سم . ازهاره بيض الوسط ، زرق الاطراف || تنويره صيفي .

١١١٠٩ - ذؤون *

Lathraea (S).

Lathrée, *Clandestine*, *Madrade*, *Herbe à la matrice* (F). *Common tooth-wort* (E). *Echte schuppenwurz* (D). *Fuoco de boschi* (I).

جنس نباتات طفيلية من فصيلة الجعفيليات . انواعه ثلاثة تعيش في التراب على جذور بعض الاشجار والاعشاب فتؤذيها وتوقع بها الاضرار . جميعها عديمة الخصب صغيرة القد تعلق من ٥ الى ٣٠ سم . سوقها منتضبة ، ضنية الانتشاب متراكبة الحراشف الورقية الملونة . ازهارها عنقودي التجميع ، لون ازهارها يختلف مع النوع منه الابيض والاصفر والازرق الموشح بالوردي والبنفسجي . قيل ان غسيل المهبل بعصارته قبل ادراك زهره تفيد النساء العواقر .

١١١١٠ - ذؤويل *

Macrescence

ذبول جاف يحل بفصل وتويجات بعض الازهار فيمنعها عن السقوط .

١١١١١ - ذئار *

Glomerella

جنس فطور مجهرية من الدثميات وقصيلة الخشاريات . اعسانه سمر خضرة او اجاصية الهيئة . قصباته زميرية التجميع تحضنها زيمة وسادية الشكل . تكاته شفافة صقية مستطيلة || انواعه عديدة اشهرها ما يتبع .

١١١١٢ - ذئار البندورة *

Glomerella lycopersici, *Gloeosporium lycopersici* (S). *Anthracnose de la tomate* (F). *Anthracnose of tomato* (E).

فطر مجهري يصيب ثمار البندورة فيعقرها ويعرضها الى العفن والهرمان . مظهره الخارجي يقع مستديرة حنطية اللون تركيب الثمار الناضجة فتسبب البثرة واللب ثم تقعر هذا

وأبو العطلس وأبو كاسب وأبو سيلة || ومن الامثال الضرورية به : أسرصر وأغدر وأظلم وأعق من ذئب .

١١١١٩ - ذئب أسود
Canis niger (S).
Loup noir (F). Black wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه أمريكا الشمالية . يعيش قرب مجاري الماء . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم . يتميز باستطالة ذنبه الجلل . ثوبه الى السمرة السوداء .

١١١٢٠ - ذئب أغبر ، ذئب هندي
Canis pallipes (S). Loup indien (F). Indian wolf (E).
نوع من الذئاب موطنه الهند يألف السهل والقفور . ثوبه الى السمرة الخطية يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر . بطنه ابيض اغبر . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٤٥ سم .

١١١٢١ - ذئب أغبس* ، ذئب حضرموت ،
أغبس
Canis hadramauticus (S).
Loup du Hedjaz (F). Hadramautwoy (E).

نوع من الذئاب موطنه الجزيرة العربية . ثوبه اغبس اللون ، بطنه الى الصهبة الخطية . طوله نحو ١٢٠ سم . وعلوه ٤٥ سم .

١١١٢٢ - ذئب أسترالية* ، دنكو
Canis dingo (S). Dingo (F).

قيل انه ليس من الذئاب بل هو كلب مستوحش . موطنه استرالية . جثته جثة الكلب ، طوله نحو ١٤٠ سم . وارتفاعه يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم . خطمه ذلق مستطيل . اذناه قصيرتان ، ذنبه منسدل الارتكار ، جثل الصوف ، ثوبه الى الصهبة الصنابية .

١١١٢٣ - ذئب الثبت
Canis laniger (S).
Loup laniger (F). Laniger wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه الثبت ، ثوبه الى الصهبة الريداء يسمر مع اقترابه من ثبج الظهر . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٦٠ سم .

١١١٢٤ - ذئب الحبشة
Canis simensis (S).
Cabéru, Loup d'Abyssinie (F). Cabéru, Kabéru, Abyssinian wolf (E).

نوع من الذئاب موطنه الحبشة وجميع مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . جسمه اهيف الشكل ، طوله نحو ١٢٥ سم . وارتفاعه نحو ٨٠ سم . خطمه ذلق مستطيل . اذناه كبيرتان ، ذنبه جثل الصوف اللبد ، ثوبه الى الصهبة يعبق مع اقترابه من ثبج الظهر وينحرف الى الابيض التبي عند البطن .

١١١٢٥ - ذئب أمريكي*
Canis occidentalis (S).
Loup occidental, L. d'Amérique (F). Black wolf of America (E).

نوع من الذئاب ، موطنه أمريكا الشمالية من المكسيك الى كندا . ثوبه متباين الالوان التي تختلف باختلاف المناطق وفصول السنة . جثته قريبة الشبه من جثة الذئب المألوف .

١١١٢٦ - ذئب أمغر* ، ذئب العفورة
Canis jubatus (S). Loup à crinière, L. rouge, L. des pampas, Aguara (F). Red wolf, Aguara (E).

نوع من الذئاب موطنه أمريكا الجنوبية . جثته مستطيلة الشكل وقوائمه كذلك . ثوبه الى الصهبة السفعاء المواج . ثبج ظهره الى السمرة العابقة . عفرته بيضاء دون ان تكون جلدية الوضوح . يألف الاماكن الرطبة يقتنص الحيوان والطير والافاعي لكنه يخشى الانسان .

١١١١٥ - ذئار القطن*

Glomerella gossypii, Gloeosporium gossypii, Colletotrichum gossypii (S). Anthracnose du cotonnier (F). Anthracnose of cotton tree (E).

فطر مجهرى يصيب القطن من سوقه الى عفازه فيؤذيه اشد الاذى . مظهره الخارجى يقع صغيرة مستديرة لونها الى الحمرة تركب السوق والاوراق والعفاز فتسبب يباس النسيج المنحارة بعد ان تقمرها وتعطب التيل داخل العفازة وقد تخضبه بالاحمر او توقع فيه العفن || يكافح عند ظهوره باستعمال احد الفواطير الكيماوية غير المرتكزة على النحاس || ومنهم من طهر البذار بالحرارة التي تخلص قوة الانتاش بعد ان تقضي على جراثيم الفطور .

١١١١٦ - ذئار اللوبياء*

Glomerella lindemuthianum, Gloeosporium lindemuthianum, Colletotrichum lindemuthianum (S). Anthracnose du haricot (F). Bean anthracnose (E). Brennfleckenkrankheit der bohnen und erbsen (D).

فطر مجهرى يصيب اللوبياء من سوقها الى ثمارها فيؤذيها ويعطبها . مظهره الخارجى يقع مهدبة لا قياسية الشكل والحجم تغلب فيها الاستدارة لونها يراوح من الصهبة الى السمرة . تركب السوق والاوراق والقرون فتقمرها وتحول من الخارج الى الداخل فتعطب الحب وتوشم ببقع حنطية تغلب فيها الحمرة || يكافح عند ظهور الوصم باستعمال سائل يوردر المحلول من ١ الى ١,٥ ٪ او غيره من الفواطير الكيماوية . ومن المستحسن ، في سبيل الحيلة والوقاية ، تطهير البذار عند استعماله وذلك بنقعه نحو ربع ساعة بالفرمول المركز من ١ الى ٠,٤ ٪ .

١١١١٧ - ذئب ، سبع
Le Loup, la Bête (F).
Lupus (E).


السبع والذئب اسمان لكوكبة نجوم واحدة موقعها في الجنوب الغربى . مركزها تحت برج العقرب خلف كوكبة قنطورس القابض على يد السبع || عدد نجومها ٥١ والعرب تسمي هذه الكوكبة مع كوكبة قنطورس مجتمعتين « الثماريخ » || أشهر نجم منها يقع في المرتبة الثالثة ويدعى « ليقون » .

١١١١٨ - ذئب ، بلسكال
Canis lupus (S).
Loup (F). Wolf (E).


جنس حيوانات من فصيلة الكلبيات ورتبة اللوامح . انواعه وسلالاته عديدة جميعها من الحيوانات الضارية المفترسة . يعيش على الجيف وعلى لحوم الحيوانات التي يتمكن من افتراسها . لا يقرب الانسان الا عند الجوع القاهر || قد الكلب الكبير طوله يراوح من ١٠٠ الى ١٦٥ سم . ارتفاعه من ٤٠ الى ٨٥ . رأسه مستعرض القفن ، ذلق الخطم . عيناه مستديرتان ، اذناه منتصيتان . ذيله جثل الور منسدل الارتكار . ثوبه اغيش اللون يهت ويمبق مع فصول السنة || يألف الجبال والسهول والصحارى . وهو حاد البصر والسمع ، مرهف احساس الشم ، سريع العدو ، قليل الجسارة ، كثير الحذر والخوف || محبل الانثى يدوم ٦٣ يوماً توضع في نهايته من ٤ الى ٦ جراء تبقى مغضضة الاجفان نحو ١٠ ايام . رضاعتها تدوم من ٥ الى ٦ اسابيع || انثى الذئب ذئبة . وجمع القطة اذوب وجمع الكثرة ذئاب . وللذئب اسماء عديدة ، أشهرها : السيد والمخاطف والسرطان والسلق وذؤالة والعلمس وأويس . والانثى سلفة ومسمام || ومن كناه الشهيرة : ابو مذقة وابو جمعة وابو جاعد وابو تهامة وابو رعدة وابو سلعامة




ذئار القطن




ذئار اللوبياء



ذئب اغبس



ذئب استراليه




ذئب امريكي



ذئب امغر



ذئب مألوف



ذئب مصري



ذيل الارنب



ذيل الثعلب



ذيل الحصان



ذيلفان

Mousetail (E). Ackerfuchsschwanz, Kölbchengras (D). Alopecoro agreste, Codolino del campi (I).

نبات عشبي بري كلابي من فصيلة النجيليات يكثر في المراعي وفي الأراضي المروية .

١١١٤٢ - ذيل الحصان * Hippuris vulgaris (S).

Pesse d'eau, Pin aquatique (F). Mare's-tail, Bottle-brush, Witche's milk (E). Gemeiner cannwedel, Schaftholm (D). Coda di cavallo, Pino acquatico, Falso abeto (I).

نبات عشبي منقعي من فصيلة الزمكيات . ساقه منتصبة تعلو نحو ٥٠ سم . أوراقه هدية ضمية التجميع . أزهاره محورية الارتكاز ، لبد ، متراكبة || يقال انه لا يخلو من بعض الخواص الطبية وانه مدر للبول .

١١١٤٣ - ذيل الخروف هو الخزام الابيض ، اطلبه .

١١١٤٤ - ذيل الفار Polypogon (S). Polypogon, Queue de rat (F). Annual beard grass (E). Wilder fenchel (D). Polipogono (I).

جنس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة النجيليات . تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم . أوراقها صفية خلية النصل . أزهارها سنبل لبد مستدير || يكثر في الأراضي المروية . ترعاه الماشية بشبهة .

١١١٤٥ - ذيل القط

هو العسوية من النجيليات العلفية ، اطلبها .

١١١٤٦ - ذيل الكلب هو السامر ، اطلبه .

١١١٤٧ - ذيلان ، لزان مجنح

Podocytisus (S). Podocytis (F). Podocytisus (E).

جنبه برية وتزيينية معمرة من فصيلة السنفيات . مهدا هضاب وهام البحر الابيض المتوسط . ساقها فرعاء تعلو من متر الى مترين . أوراقها سنانية الشكل . نصالها معتدلة الساكة لونها الى الخضار البحري . أزهارها عنقودي التجميع ، منتصب الارتكاز . أزهارها الى الصفرة الذهبية . حنابلها مبطلطة ، مجنحة الحواشي ، مستطيلة الزيدات || تنويرها يستمر طوال شهر تموز .

١١١٤٨ - ذيلبة Urostège (F).

الذيلبة هي الصفحة الواحدة من الصفائح التي تغلف مدب ذئب الحية . ج ذيلاب . اما صفحة البطن فتدعى دعبلة .

١١١٤٩ - ذيلفان * Gastrana (S).

Gastrane (F). Gastrana (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة الطليسيات . انواعه المعاصرة المعروفة نحو عشرة . اعطانها جميع بحار العالم القديم || اصداها شبه بيضية الشكل ، كبيرة القد ، بعضها يطول نحو ٦ سم . ألوانها متداخلة الاحمر والوردي والاصفر . اجسامها كبيرة . مشاعها مستطيلة ، طليقة || لحومها مأكولة ، جيدة الصنف .

١١١٥٠ - ذيلي Caudal (F). Caudal (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بذيل الحيوان ، كقولك زعنفة ذيلية .

١١١٥١ - ذيم Difformité (F). Deformity (E).

معابة في الشكل مرجمها عدم التناسب .

١١١٥٢ - ذيوغ راجع تسامع .

١١١٢٧ - ذئب ذفر Canis nubilus (S).

Loup odorant (F). Sweet-smelling wolf (E).

نوع من الذئب ، موطنه جبال فلوريدا وجوارها ، ثوبه الى الصهبة الجذوية . طوله بما فيه الذئب يبلغ نحو ١٤٠ سم . وارتفاعه ٧٠ سم .

١١١٢٨ - ذئب مألوف * Canis lupus (S).

Loup commun (F). Common wolf, European wolf (E).

هو الذئب الشائع المعروف . موطنه شاسع الاطراف يمتد من اقاصي الشرق الى اوروبا الشمالية . ثوبه الى الصهبة الخطية السمر . طوله نحو ١٦٠ سم . وارتفاعه ٧٥ سم . وهو من انشط انواع جنسه واصليها عوداً واخيها خلقاً .

١١١٢٩ - ذئب مصري * Canis lupaster (S).

Loup d'Egypte (F). Egyptian wolf (E).

نوع من الذئب ، موطنه فسيح الارحام يمتد من شواطئ البحر الاحمر الى صحارى ليبيا وتونس . ثوبه اغبس اللون . بطنه الى الصهبة الصنابية . قوائمه الى الجذوة السمر . طوله نحو ١٣٠ سم . وارتفاعه ٥٠ سم .

١١١٣٠ - ذئبان

بقية الوبر بد الجز . والوبر على عنق البعير ومشفرة .

١١١٣١ - ذئبة Louve (F). She-wolf (E).

انثى الذئب .

١١١٣٢ - ذئبتين

الذئبتين لجهان ليران من كوكبة التنين مركزها على مؤخره .

١١١٣٣ - ذئال هو الثور الوحشي .

١١١٣٤ - ذئالة ، ذئالات Marcoures

رتيبة حيوانات من القشريات العشاريات الارجل .

١١١٣٥ - ذينخ

الدينخ نجم احمر في اصل ذئب التنين ، راجع تنين .

١١١٣٦ - ذينخ

الدينخ : قنر النخلة ، ج ذينة . يقال ذينخت النخلة اذا اذا لم تقبل الابار ولم تعقد شيئاً .

١١١٣٧ - ذينخ هي الضيع الرقطاء ، اطلبها .

١١١٣٨ - ذيفان ، توكسين Toxine (F). Toxin (E).

هو القشب ، اطلبه .

١١١٣٩ - ذيل Queue (F). Tail (E).

هو الذئب او ما اسبل منه فتعلق .

١١١٤٠ - ذيل الارنب ، شعر الارنب

Lagurus (S). Lagure, Queue de lièvre (F). Hare's-tail grass, Turk's-head grass (E). Echter hasenschwanz, Hasenschwanzgras (D). Coda di lepre, Gatto grasso Plumino (I).

من اليوناني بمعنى ذيل الارنب . جنس نباتات عشبية مرجية حولية برية وتزيينية من فصيلة النجيليات . أوراقها كثيفة التجميع خلية النصل المستعرض القصير . أزهارها سنبل ، سنبلتها بيضبة الشكل صوفية الملمس تشبه ذيل الارنب طولها نحو ٤ سم . وهي قابلة للتخصيب بمختلف الالوان ، كثيرة الاستعمال التزييني .

١١١٤١ - ذيل الثعلب ، ثعلبية الحقول

Alopecurus agrestis (S). Alopécure des champs, Vulpin des champs (F). Black grass, Slender foxtail,

أنجزت «المطبعة الكاثوليكية ش.م.ل»
في عاريا - لبنان
طباعة الجزء الأول من «الموسوعة في علوم الطبيعة»
في العام ١٩٨٨

*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature
se compose de quatre volumes, dont le dernier
comprend les lexiques des termes
allemands,
anglais,
français,
grecs,
italiens et
latins.*

Edouard Ghaleb
Ingénieur agronome

ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE

ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,
Microbiologie, Affections animales et végétales.

Termes techniques:

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

Volume I

2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE



Dar el-Machreq sarl
Beyrouth

**ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**



Dar el-Machreq sarl
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban



Distribution :
Librairie Orientale – Boîte Postale 1986
Beyrouth, Liban

ARTICLES ET INDEX
en arabe, anglais, français
allemand, italien, latin et grec






Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



DAR EL-MACHREQ
BEYROUTH